



NAZ. CENTR.

203

5 D

33

ROMA

VITT. EMAN. II

203?

203, 5, II 33

$\frac{1}{2}$ ora

6

METHODVS
PRACTICÆ
MEDICINÆ:




203. 5. D. 33

Omniū humani corporis affectuum causas,
signa, & curationes exhibens.

*Publicè olim inter legendum ab HIERONYMO
CAPIVACCIO, Medico celeberrimo, in
Patauinis scholis tradita:*

Nunc verò elegantiori ordine quàm antea
composita & recognita.



LVGDVNI,
APVD IACOBVM ROVSSIN,
Typographum Regium.

M. D. XCVI.

BRITISH MEDICAL

Containing the history, description, and treatment of the various diseases of the human body, with the principles of medicine, and the practice of the several branches of the profession.



LONDON:
Printed by J. B. ROBERTSON, at the
Printers, in Pall-mall.



TYPOGRAPHVS

MEDICINÆ

CANDIDATIS.



De huius operis tertiatione.



ORVM profectò qui apud Italos nostra ætate fœliciùs in studio & studio Medicinæ sudarunt nemo melioribus auspiciis cursus palmã consecutus est, quàm Hieronymus Capiuaccius, vir fœlicis ingenij, paucis equidem eruditione inferior, multis variis experimentis, & frequenti rerum vsu superior, qui dum publicè doceret in Academia

Pataurina, & præclaris omnium nationum ingeniis ad diuinam prope-
modum artem præiret, eam sibi lau-
dis & gloriæ palmam tam æquis ti-
tulis vindicauit, vt iam meritò exi-
stimetur is qui Medicinam à mul-
tis iam sæculis gloriosissimam præ-
stantissimamque à Maleferiatis Me-
dicastriis & sceleratis impostoribus
conspurcatam restituit. Fuit tum
generis, tum eruditionis splendore
clarissimus, naturalis Philosophiæ
indagator perspicacissimus, qui
postquam diu in euoluendis Græ-
corum, Latinorum, ac Arabum Me-
dicorum sententiis consenuisset, ne-
glecta valetudine, vt veram sanita-
tis restituendæ ægris corporibus me-
thodum pararet, maturius sanè
quàm oportuit fatis functus est. Ex
his quæ viuens publicè docuerat
conflata est Medicinæ Praxeos Me-
thodus, in qua exactè adeò omnium
humani

humani corporis affectuum causas,
symptomata, & remedia inquiri
& rimatur, vt nemo sit, nisi infen-
sum habeat Apollinem & Æscula-
pium, qui in ea natuum Medicinæ
splendorem penè extinctum cla-
rius fulgere non miretur. Opus vtile
profectò, & omnibus Bibliopola-
rum officinis exquisitum, commen-
datum obtulerūt primùm Venetiæ,
sed rude adhuc & indigestū, cui nu-
per secundis vigiliis Beyerius Fran-
cofordiensis Medicus, per Germa-
niam celeberrimus ornatum addi-
dit. Nos postremò vtriusque colla-
tionis editione illud recognitum, &
climatum elegantioribus, & multò
cōmodioribus typis, vt Capiuaccij
nominis & instituti esset nostra
Gallia particeps, excusimus. Quòd
si conatus hosce meos Rempubli-
cam litterariam iuuandi non infe-
liciter cessisse intellexero, habebis


propediem , amice Lector , nostra
opera maiores & vberiores tanti vi-
ri foeturas: cuiusmodi sunt selectio-
res & exquisitiores quædam obser-
uationes de vrinis , de anatome , de
lue venerea , de differētiis pulsuum ,
de recta singulis humani corporis
affectibus medendi ratione , quas
tota plaudente Italia olim suis au-
ditoribus proposuit. Hoc in limine
te scire volebam. Vale.





LIBER PRIMVS.

De Capitis, & Partium huic annexarum affectibus. Cap. 1.

- 1  E differentiis Externorum capitis affectuum : & speciatim de capillorum Defectu : ubi comprehenduntur Area, Capillorum destitutum, Caluitium, Tarasque pilorum, in mento praesertim, ortus. 1
- 2 De capillorum Excessu : tam in copioso prouentu, quam in indecora duritie. 13
- 3 De precauenda Canitie, pilisque tingendis. 15
- 4 De Achoribus, sine capitis ulcuscus manantibus. 17
- 5 De Pityriasi, seu furfuribus & squamulis capitis. 19
- 6 De Phtheiriasi, seu pediculatione. 32
- 7 Enumeratio capitis Internorum affectuum : & primum de Capitis dolore : ubi communia quaedam tum theorica, tum practica, fusius explicantur. 25
- 8 De Phrenitide. 75
- 9 De Lethargo seu veterno. 98
- 10 De Melancholia, tam ea qua accidit primario affecto cerebro, quam qua ob consensum vel à toto, vel ab hypochondriis. 106
- 11 De Mania, seu furore. 136
- 12 De Obluione, & Fatuitate : seu de Memoria

mentisq̃ue detrimento.	142
13 De Vertigine.	148
14 De Incubo, seu Ephialte.	159
15 De Comitiali morbo.	164
16 De Apoplexia.	186
17 De Comate, seu in somnum delatione : ubi Digressio physiologica, de Somni natura & causis.	198
18 De Caro exquisito.	203
19 De Vigiliis præter naturam.	205
20 De Comate vigili, seu catocio spurio.	210
21 De Catocio exquisito, seu catalepsi.	211
22 De Tremore.	213
23 De Torpore, seu stupore.	222
24 De Resolutione, seu paralyfi.	227
25 De Convulsione, seu spasmo.	239
26 De oris tortura.	251
27 De Catarrho, seu destillatione.	255
28 De Sternutatione.	271
29 De Hydrocephalo, seu capitis hydropo.	276
30 Enumeratio affectuum oculorum : & primum de Lippitudine; seu ophthalmia: ubi Digressio pathologica, de Signorum medicorum natura.	280
31 De Phlyctenis, seu pustulis corneæ.	297
32 De Ulceribus corneæ.	300
33 De Procidencia tunica rhagocidis seu corneæ rupturæ.	308
34 De Suppuratione, seu hypopyo.	310
35 De Effusione pupillæ, seu mydriasi.	312
36 De Tabo pupillæ.	315
37 De Suffusione.	317
38 De Sugillatione, seu macula oculi.	324
De	

39	De Pterygio, seu vngue oculi.	326
40	De Albugine, & cicatricibus oculorum.	329
41	De Epiphora, seu lacrymarum effluxu.	333
42	De Rhœade, seu imminutione carnis lacrymalis.	337
43	De Encanthide, seu nimia carnis lacrymalis eminentia.	339
44	De Aegilope, & Anchilope.	340
45	De Mœcie oculi, seu atrophia.	343
46	De Expresione oculi.	345
47	De Strabismo.	346
48	De Visione lasa, citra morbum foris apparentem.	349
49	De Laso auditu.	359
50	De Laso olfactu.	369
51	De Sanguinis e naribus eruptione.	374
52	De Affectibus dentium præcipuis.	377
53	De Faucium affectu, qui Angina dicitur.	386

LIBER SECVNDVS.

De Medij Ventris, id est, Thoracis, Pulmonum,
& Cordis affectibus. Cap. I.

I	DE Tussi morbosa, ubi Digressio pathologica, de Morbi natura, in genere: quibus nim. in categoriis sit reponenda.	394
2	De Respiratione deprauata: nim. de Dyspnœa, Asthmate, & Orthopnœa.	409
3	De Dolore thoracis: potissimum de Pleuritide.	418
4	De Empyemate, vel Suppuratione.	440
5	De Inflammatione pulmonis.	444
6	De Spuitione cruenta.	446
7	De Phthisi, seu tabe ex ulcere pulmonis.	460

8	De Cordis palpitazione.	468
9	De Virium lapsu : nimirum de Syncope, & Lei- porhymia.	476

LIBER TERTIVS.

De partium imo ventre contentarum affectibus.

I. Œsophagi affectus.

1	De lasa Deglutione.	483
---	---------------------	-----

II. Ventriculi affectus.

2	Enumeratio affectuum ventriculi : & primum de Intemperie ventriculi.	493
---	---	-----

3	De Imminuta ventriculi magnitudine.	534
---	-------------------------------------	-----

4	De Tumore ventriculi.	539
---	-----------------------	-----

5	De Ulcere ventriculi.	568
---	-----------------------	-----

6	De Oris ventriculi dolore.	573
---	----------------------------	-----

7	De Fame morboſa : nim. de Inappetentia, Fame canina, Pica, & Bulimo.	585
---	---	-----

8	De Siti morboſa deprauata.	607
---	----------------------------	-----

9	De Lasæ alimenti in ventriculo confectione, qua eſt atreſia, ſegadatreſia, & diaſtopa.	614
---	---	-----

10	De Singultu.	626
----	--------------	-----

11	De Vomitu, & Nauſea.	639
----	----------------------	-----

12	De Cholera, ſeu bilis inferna ſupernaq; eruptio- ne.	653
----	---	-----

III. Intestinarum affectus.

13	Enumeratio affectuum intestinarum : & primum de Dolore intestinarum tam Colico, quam Ili- aco : ubi & de Alui constipatione.	660
----	--	-----

14	De Lumbricis, ſeu vermibus intestinarum.	695
----	--	-----

15	De Proſtutio alui, in genere.	710
----	-------------------------------	-----

16	De Fluxu leuenterico, ſeu leuitate intestinarum	721
----	---	-----

De

17 De Sanguinolento alui fluxu, vel defluxu hepatico, dysenteria, & temesmo. 725

IV. Hepatis affectus.

18 De Hydrope, seu aqua inter cutem. 734

19 Iecinoris affectuum magis accurata tractatio, &
1. de morbis, hepar ut membrum simile infestantibus: qui sunt, Intemperies, Imbecillitas, Cachexia, & Hydrops. 741

20 De Obstructione iecoris. 767

21 De Regio morbo, seu arquato, tum flavo, tum nigro. 778

22 De Scirrho, seu duro hepatis tumore. 787

23 De Ulcere iecoris. 791

24 De inflammatione iecoris. 792

V. Lienis affectus.

25 De Viuis lienis in genere: quatenus ab hepatis distant affectibus: & speciatim de Scirrho, qui frequenter splenem obsidere solet. 804

26 Plenior de Duro lienis tumore dissertatio. 808

VI. Renum affectus.

27 De Urina profluvio, seu passione diabetica. 813

28 De Lithiasi, seu calculo renum. 820

29 De Renum exulceratione, seu abscessu. 829

VII. Vesicæ affectus.

30 De Mictione imminuta & ablata: siue de Dysuria, & Ischuria. 832

31 De Retentione urina paulo copiosior tractatio. 838

32 De Mictione depravata, seu Stranguria. 843

VIII. Partium genitalium affectus.

33 De Gonorrhoea, seu inuito seminis profluvio. 845

34 De Extincta virilitate, seu impotentia rei Venerea. 488

LIBER QVARTVS.

De Matricis affectibus.

I. Mensium purgationem concernentes affectus.

1 De differentiis affectuum muliebrium: & 1. de Suppressione mensium: ubi etiam de sanguine mēstruo nonnulla cognitu digna afferuntur. 862

2 De Menstrua purgationis exsuperantia. 886

3 De Uteri stillicidio. 896

4 De Fluore muliebri, seu uterino. 901

II. Spectantes conceptum.

5 De Sterilitate: ubi de Conceptione, seminis natura & potentia, fœtusque conformatione agitur. 911

6 De Fœtu monstroso, siue irrito & inutili conceptu. 930

7 De Mola, seu rudi carne in utero concepta. 934

III. Parturitionem attinentes.

8 De Abortu: seu parturitione ablata & corrupta: ubi etiam cause partus secundum naturam explicantur. 937

9 De Partu laborioso ac difficili. 945

IV. Symptoma uteri, quatenus hic cōsideratur ut pars seruiēs indiuiduo, non speciei.

10 De Strangulatu ab utero. 948

V. Appendix.

11 De Virginitatis probabilibus indiciis: ubi deflorationem non posse certis signis deprehendi docetur. 955

LIBER QVINTVS.

De Arthritide, & Lue Venerea.

SECTIO PRIOR.

De Articularum doloribus.

958

SECTIO POSTERIOR.

De Venerea virulentia. Cap. I.

- 1 **D**E Nomine, Definitione & Causis Luis Ve-
9 9
- 2 De Differentiis. 973
- 3 De Signis. ibid.
- 4 De Indicationibus. 977
- 5 De Prasagiis. 978
- 6 De Curationis parte qua Cheirurgia absoluitur.
979
- 7 De Parte curationis Pharmaceutica, totum cor-
pus respiciente. 980
- 8 De Medicamentis magis specialibus ad ipsam
luem directis, tum alterantibus tum Vacuanti-
bus: & primum de eorum viribus. 982
- 9 De vsu Guaiaci, seu ligni Indici: & quomodo
Sarsa parilla, China, Sassafragia Indica, cum
guaiaco, tanquam alexipharmaco principali,
miscenda & artificiosè temperanda veniant:
quomodo item modo dicta seorsim usurpanda.
985
- 10 De administratione Hydrargyri, formalitus &
suffumigy: deque noxis emendandis, que ar-
gentum viuum comitari solent. 992
- 11 De Curatione morborum & symptomatum, que
occasione Luis Venerea suboriuntur. 996
- 12 De Vi&us ratione in morbo Gallico obseruanda.

LIBER SEXTVS.

De Febribus. Cap. 1.

- 1 **D**E Definitione Febris : deque proprietatibus eius essentiam consequentibus , qua signorum communium loco sunt . Dissoluuntur etiam nonnulla circa finitionem difficultates. 1003
- 2 De Causis februm eidentibus seu externis. 1008
- 3 De Differentiis februm principalibus, ab essentia seu calore desumptis. 1009
- 4 Digressio pathologica, de Morbi natura ac definitione : ad sequentem doctrinam de differentiis februm intelligendam, necessaria. 1011
- 5 De communibus seu non principalibus februm differentiis. 1014
- 6 Omnes febres ad propositum aliquam speciem seu differentiam referri posse , exemplis aliquot docetur. 1018
- 7 De Corporibus ad febres dispositis. 1018
- 8 De Temporibus februm vniuersalibus & particularibus : quomodo in singulis ea observari & cognosci debeant. 1019
- 9 De febre Ephemera: seu Diaria. 1. quid sit , quae eius causa & indicia: tum quomodo alias nonnunquam in febres transeat: Obiter digressio de Pulsibus aspergitur certe luculentissima. 1034
- 10 De Indicationibus, Praesagio, & Remediorum materiis in febre Diaria. 1043
- 11 De Putride febris Definitione & Causis: ubi quoque vniuersim de Generatione & Corruptione mistorum corporum agitur , putredinisque natura explicatur. 1048
- 12 De Differentiis februm putridarum. Simul de Inuasio

- Inuasionum & Circuituum causis : deque vera
intermittentis febris origine , contra veterem
opinionem, & Ferneliū.* 1056
- 13 *De Signis februm putridarum diagnosticis : de-
que signorum usu, seu applicatione.* 1064
- 14 *Digressio, qua Rigoris & cognatorum symptom-
ium natura explicatur.* 1070
- 15 *De Curatione febris putrida in genere: & primum
de Indicationibus.* 1074
- 16 *De Materia curationis cheirurgica, Venasectione
scilicet, cucurbitulis & hirudinibus: ubi quoque
de hemorrhoidibus.* 1077
- 17 *De Pharmaceia : & primum de clementer va-
cuantibus, tum per Os, tum per Aluum.* 1088
- 18 *De Medicamentis materiam morbificam præpa-
rantibus, qua vulgo Concoquentia dicuntur.
Vbi de Coctionis & Cruditatis natura ac dif-
ferentiis, discursus physicus.* 1095
- 19 *De medicamentis, ore, aluo, urina, per cuius mea-
tus purgantibus. Cum Digressione, de tempore
exhibendorum catharticorum.* 1103
- 20 *De usu medicamentorum Alterantium.* 1113
- 21 *De Vici ratione, in febribus putridis obseruan-
da.* 1114
- 22 *De Putridis febribus in specie: & primum de febre
Biliosa seu tertiana intermittente, tam exquisi-
ta, quam notha.* 1125
- 23 *De Tertiana continua exquisita & notha.* 1132
- 24 *De Sanguinea febre, id est, de Syncho putrida,
& experte putredinis, neque sanguinea biliosa
finitima.* 1136
- 25 *De febre Phlegmatica.* 1139
- 26 *De febre Syncopali, seu cum oris vetriculi offen-
sione,*

	<i>sione, tum Humorosa è crudorum succorum co-</i> <i>piatum minuta, e succis valde tenuibus.</i>	1143
27	<i>De febre Quartana, & cognatis Quintana,</i> <i>Sextana, Septimana, Nonana.</i>	1146
28	<i>De Hecticis febribus.</i>	1150
29	<i>De Pestilentis febris Definitione, Causis, Diffe-</i> <i>rentius, & Signis.</i>	1156
30	<i>De Praservatione à febre pestilenti.</i>	1162
31	<i>De ratione Curandi febrem pestiferam.</i>	1156

LIBER SEPTIMVS.

De Venenis. Cap. i.

1	Q <i>Vid sit Venenum: & qua ratione in corpus</i> <i>agat.</i>	1171
2	<i>De Differentiis Venenorum.</i>	1181
3	<i>De Indiciis.</i>	1187
4	<i>De Indicationibus.</i>	1189
5	<i>De Prasagiis.</i>	1192
6	<i>Quomodo venenis in genere cheirurgia, pharma-</i> <i>ceia, & diata sit occurrendum.</i>	1194
7	<i>Specialis quorundam venenorum tractatio: &</i> <i>primum de Napello.</i>	1202
8	<i>De Anacarda.</i>	1205
9	<i>De Opio & Meconio.</i>	1206
10	<i>De Helleboro albo.</i>	1208
11	<i>De Cantharidibus.</i>	1211
12	<i>De Canina rabie.</i>	1212

F I N I S.



PRACTICÆ
MEDICINAE,
LIBER PRIMVS.



DE CAPITIS, ET PARTIVM
HVIC ANNEXARVM AFFECTIBVS.

CAPVT I.

Enumeratio Capitis affectuum externorum: & primum de Capillorum defectu: nimirum, areis, defluvio capillorum, caluitio, tardòque pilorum ortu.



VTIA alia dicuntur ratione Sanitatis, alia ratione Pulcritudinis naturalis. Vitia ratione sanitatis læsa, sunt affectus præter naturam partium viuentium, lædentes operationes: & sunt morbi, propriè ita dicti. Vitia autem ratione pulcritudinis naturalis,

sunt affectus partium non viuentium, non lædentes operationes, sed pulcritudinem naturalem: ideoque morbi sunt, sed non propriè ac simpliciter, verum in parte exornatoria: (quam ita Galenus vocat c. 2. l. 1. κ.τόπ.) seu in parte, quæ agit de decoratione. Facultas autem Comitoria, quæ versatur circa pulcritudinem, non naturalem, sed fucatam, non est pars artis medicæ. Oportet tamen Medicum & hanc artem callere, propter forminas regias, vt Galenus ait, quibus obedire oportet; ea tamen ratione, vt dum exerceamus artem

*Exornatio
vis pars
medicinæ.*

*Comitoria
facultas.*

istam, hoc faciamus citra detrimentum sanitatis.

Externi Nos autem in præsentia agemus de affectibus partium
capitis af- capitis non viuentium, vsum tamen præstatum: & proinde
fectus præ- ratione Capillorum loquemur de horum defectu, id est, de
cipui. alopecia, de ophiasis, de defluxio capillorum, de caluitio: item
 de capillorū excessu: tandē de vitiatō capillorū colore, id est,
 de canitie. Ratione Cutis, loquemur de furfurib⁹, seu de por-
 rigine: de pediculis: de vlcēribus, siue sint achores, siue faui.

DE DEFECTV CAPILLORVM.

Nomen. **S**vb capillorum defectu comprehendimus areas, id est,
 alopeciam & ophiasin: item defluuium capillorum, calui-
 tium, tardum pilorum ortum, nam quidam, annum agen-
 tes vigesimumquartum pilos in mento desiderant.

Definitio. Defectus autem capillorum est affectio, qua cutis capi-
 tis glabra redditur. Affectio dicitur, non morbus, c. i. l. i.
 x. ror. Est enim symptoma, quod non necessario in mor-
 bum refertur: licet enim aliquando pili deficiant ob mor-
 bum, vt in lue Gallica: possunt tamen etiam citra morbum
 deficere, dum alimenti est vitium. (sic etiam mala coctio
 dari potest, quæ in morbum non refertur.) In affectione, de
 qua loquimur, non læditur actio sed decorus aspectus. Et af-
 fectio, qua cutis capitis glabra redditur: sicut contra, in ex-
 cessu capillorum, cutis capitis hirsuta & hispida redditur.

Deficien- Porro ad generationem & conseruationem pilorum tria
zium pilo- requiruntur: cutis, cui capillorum radices inherent: materia
ri causa. ipsa: & calor agens. Cutis requiritur, quæ nec sit humidior,
 nec siccior, nec densior, nec laxior: sed in horum medio sita.

I. Cutis Quod si vitium sit cutis, pili deficiunt: & si cōsistat in nimia
vitia. humidate, vel laxitate, est defectus, qui dicitur *Defluuium ca-*
pillorum. Si cutis siccior & aridior sit, fit defectus qui *Caluities*
 dicitur. Hoc habetur ē Galen. aph. 28. sect. 6. aph. 69. sect. 5. vbi

II. Ma- Hipp. dicit, eunuchos non caluescere: nam propter testium
teria vi- abscissionem similes redduntur fœminis, quæ ob nimiam
tia. humiditatem non possunt caluescere. Materiz vitium est
 defectus, vel corruptio. Si materia deficiat, fit defectus capil-
 lorum, qui modo caluitium, modo defluuium capillorū di-
 citur: defluuium, quando per vniuersam capitis cutim adest
 materiz defectus: caluitium, quādo defectus est potissimum
 in syncipite. Si materia corrumpitur, radices pilorum neces-
 sario cadunt. Hæc materia corrupta, si aliquas tantum capi-
 ris partes occupat, fit defectus capillorum qui est cum arcis,

& tunc est alopecia, aut ophiasis: si omnes partes indifferenter occupat, fit defectus, qui defluuium capillorum dicitur. Quidam asserunt alopeciam, & ophiasin fieri à materiæ defectu. Sed longè fallūtur: primo enim adest materia, sed corrupta. Deinde in iis, qui lue Venerea laborant, ob materiam corruptam omnes capilli defluunt. Tertiò hoc aduersatur auctoribus: nam præter Alexand. & Auicennam, Galenus aph. 11. sect. 5. dicit, in tabidis fieri defluuium capillorum, ob materiæ vel defectum, vel prauitatem. Et aph. 34. sect. 6. aperte dicit, sicut alopecia & ophiasis fiunt à prauis succis, ita & defluuium capillorum ab iisdem oriri. Nec illi se tueri possunt Galeni auctoritate, dum c. 2. l. 1. x. 767. ait, defluuium capillorum fieri ob defectum materiæ: sic enim ait Galenus: est autem alia pilorum affectio, quæ defluuium capillorum dicitur. Per illam, intelligit diuersam ab ea affectione, de qua c. 1. egit. locus autem est ibi de defectu capillorum ob prauos succos: ergo hic loquitur de alia affectione, quæ fit ob defectum materiæ. Non igitur valet illorum consequentia; quoddam defluuium capillorum fit ab alimēti defectu; ergo omne defluuium capillorum fit à defectu alimenti. Quare concludendum, tum ophiasin & alopeciā, tum etiam, quandoque defluuium capillorum fieri à materia corrupta. Materia hæc corrupta, seu prauus succus, est bilis, pituita falsa, vel atra bilis. Auicennas etiam proponit sanguinē corruptum: nec tamen dissentit à Græcis: nam per sanguinem corruptū, intelligit ita corruptum, vt non seruet amplius naturam & formam sanguinis; si enim forma sanguinis persisteret, non possent abradi radices capillorum. Quod si ergo corruptio accadat secundum partem tenuem, degenerat in bilem: si secundum partem crassam, degenerat in atram bilem: & sic cum Græcis sentit. Causæ propter quas generantur hi succi, alie sunt internæ, alie externæ. Internæ sunt vel ratione totius, vel ratione partis. Ratione totius, quando corpus est cacochymum, id est, totum refertum prauis succis, qui facile capiti communicantur. Concurrunt vitia alicuius partis, vt cerebri, ventriculi, iecoris, & lienis, itémque vteris: quæ partes dum afficiuntur intemperie, vel obstructione, facile prauis humores generantur, qui in caput delati, pilorum radices depascunt, præcipue dum iecur lue gallica laborat. Causæ externæ non necessario occurrentes, sunt percussiones capitis, quibus caput ita debile redditur, vt ali-

mentum delatum non possit regere : & sic corruptum alimentum deinde depascit radices capillorum. Causæ necessario occurrentes, sunt res non naturales : vnde adolescens ille boni habitus, alopecia tamen affectus fuit, quia in esu fungorum deliquerat, cap. 1. lib. 1.

III. Caloris vitia.

Tandem ad pilos producendum, requiritur calor agens validus, coniunctam potius habens siccitatem, quam humiditatem. Vnde corpora calida & sicca magis sunt pilosa : calore enim diminuto, pili deficiunt : defectus autem hic caloris aliquando est cum intemperie in passivis, scilicet cum humiditate, vel siccitate.

Differētia.

Si ergo vitium est vel Cutis, vel Materiæ, vel Caloris agentis, prodit defectus pilorum ; ut quandoque sit Area, quandoque Defluuium capillorum, interdum Caluitium, aliquando Tardus pilorum ortus. Areæ vel fiunt secundum formam Rotundam, & dicitur alopecia, quia vulpes sæpe hac affectione laborat : vel secundum formam Oblongam, & dicitur ophiasis, quia serpens hac sæpe afficitur. Arabibus tyria dicitur, quia serpentes his vocantur tyræ. In ophiasis non est æqualitas, sicut in alopecia : vnde Auenzoar c. 4. tract. 1. l. 1. quaerit, cur in ophiasis non cadant pili æqualiter secundum rectum & rotundum, sed secundum oblongum & obliquum ! Causam esse dicit, quia ophiasis pendet à materia acri & tenui, quæ non est vndique æqualis, sed inæqualis, ita ut alia sit tenuior, alia crassior. Dat exemplum, si aqua pura, inquit, in terram decidat, parat sibi iter rectum : quod si quis super aquam proiciat terram, vel lutum, aqua non amplius facit iter rectum, sed obliquum. Sic in ophiasis est inæqualitas arearum, quia materia est inæqualis.

Signa.

In defluvio capillorum pili deficiunt indifferenter, secundum omnes partes cutis capitis. Areæ oculis patent. Si caluitium est, pili deficiunt in syncephite. Si fuerit tardus ortus pilorum, cognoscitur, quod non assunt pili in ea quantitate, quæ requiritur pro ratione ætatis. Cognito capillorum defluvio ; aduertendum, an sit ratione cutis, an ratione materiæ. Si ratione cutis ; hæc est rarior, humidior, vel densior, siccior, Si rarior & humidior, cognoscitur, quia præcesserunt causæ humectantes & rarefacientes cutim, item frequens usus balnei aquæ dulcis, seu lotio frequens capitis cum aqua dulcis tepida : adest mollities cutis & capillorum : & ab humectantibus ac rarefacientibus maxime læditur æger. Quod si cutis

Si cutis sit densa & sicca, præcessere contraria: oppositorum enim eadē doctrina. Si fiat ob materiæ vitium, materia vel deficit, vel corrupta est. Si deficiat materia, necessario præcessit aliqua immodica euacuatio alicuius humoris, præcipue vero sanguinis: præcessit coitus immodicus, vel morbus diuturnus, vnde conualescentes interdum depilantur, ob defectum materiæ. Et tunc ægri nō percipiunt vllam acrimoniā, vel pruritus, quia materia non est corrupta. At, si materia fuerit corrupta, non præcesserunt proposita: percipiunt ægri pruritū: assunt morbi, qui possunt hoc præstare: verbi gratia, si fuerit morbus gallicus, aut si fuerit aliquis morbus, qui cessauit citra euacuationem, & ei succedat capillorum defluuium, nemini dubium esse potest, hoc defluuium pendere à praua illa materia, quæ morbum causauit. Hoc declaro ex Aph. 34. sect. 6. vbi Galenus dicit, nos non debere appellare caluitium, sed defluuium capillorum: dum enim sunt varices, & nulla apparet sequens euacuatio, & sequitur defluuium capillorum; certè hoc dependet ab illa materia, quæ causabat varices. Sic cognoscuntur areæ, quæ necessario pendent à prauis succis. Hic enim succus, num sit bilis, pituita, vel atra bilis, facile cognoscitur. Nā l. 1. c. τὸ π. si cutis fuerit albicans, vitiū pendet à pituita: si pallida, à bile: si nigra, à melancholia. Addit Galenus c. 18. l. 14. meth. prægressam viuendi rationem. Si quis enim fuerit vsus biliosis cibis, à bile pēdebit, &c. Et ne erremus in hoc signo, ratione coloris cutis, monet Auicennas, vt fricemus aliquātum cutem capitis, quia per frictionē materia illa corrupta petit superficiē cutis. Sed modica sit frictio, non violenta; alias etiā sanguis attrahitur, & cutis fit rubicunda. Alexander addit, cognosci hæc vitia è colore capillorū, non defluxorū: (quia hi non assunt:) sed illorum qui assunt (non omnium, quia quidam non sunt vitiati, alias & hi defluerent) & sunt in confinio areæ, qui aliquo modo contaminati sunt. Tardus pilorum ortus faciliē cognoscitur; fit enim ob vitium agentis caloris, aut ob vitium cutis. Si sit vitium caloris; cognoscitur, quia corpus est frigidum, languidum. Si autem corpus fuerit robustum & calidum, vitium in cutem referri debet. Vtrum porro cutis sit humidior & laxior, vel siccior & densior, id supra tradidimus.

Si cutis fuerit siccior, humectanda: si humidior, exsiccāda: *Indicatio-*
 si densior, rarefacienda: si rarior, densanda. Quoad materiam *nos.*

si hæc deficiat, est addendum. Si corrupta sit; vel vndique corrupta est, vel imminet, ne corrumpatur. Si est corrupta, tunc est cruda, vel cocta. Si cruda, est coquenda; si cocta, euacuanda. Si imminet, ne materia corrumpatur; imminet vel ratione totius, vel ratione partis. Si ratione totius, totum est corroborandum: si ratione partis, pars est corroboranda. Exempli gratia, si hoc immineat ratione caliditatis iecoris, corroboratio consistit in iecoris refrigeratione. Si sit etiam malam proprietatem iecoris, ut in lue gallica, corroboratio est in depulsa mala proprietatis iecoris. Denique si sit vitium ratione debilitatis caloris, corroboratio consistit in augendo calorem.

Dubitatio.

Principiū alopecia, non est alopecia.

Hic autem dubitatio quædam tollenda: Cur Galenus cap. i. l. t. x. τὸν. dicat, principium alopecia, non esse alopecia; & cur reprimentia conueniant, non in alopecia, sed in principio alopecia? Quoad primum: res que sunt, sunt similes, aut dissimiles cap. 2. l. v. loc. aff. Similaris rei principium, habet eandem essentiam cum similari re perfecta: sic intemperies, cum sit quiddam simile, fit ut principium intemperiei sit intemperies. At rei dissimilares principium, non habet eandem naturam cum re perfecta: ut, principium domus, non est domus; quia hæc est quid dissimulare. Alopecia igitur est vitium, quod necessario formam aliquam requirit, necessario est area: & quia est aliquid dissimulare, ideo principium alopecia non est alopecia. Quoad secundum: in principio alopecia materia est in fluxu, nondum firmata & impacta, quia nondum pilorum radices sunt deaustatæ: ob id, cum materia sit in fluxu, licet reprimere. At, cum adest alopecia, iam radices capillorum sunt corruptæ, quod significat materiam esse fluxam & firmatam, quæ non cedit reprimentibus. Et sic patet cur in principio alopecia conueniant reprimentia, non autem in alopecia ipsa.

Prognostica.

Area curari possunt: quia succus vitiosus, & materia in cute impacta, potest eradicari. Sed notandum, hæc vitia quandoque facilius & citius remoueri, quandoque difficilius & serius: pro discrimine & progressu arearum. Alopecia enim facilius euellitur, quàm ophiasis, secundum Auicennam & Alexan. quia in ophiassi non modo abraduntur pilorum radices; sed etiam abraditur cuticula: & ita ophiasis est affectus sauior: Celsus & Auēzoar dicunt ophiassi facilius curari. Pro quorum salute dicendum, eos loqui de ophiassi, non absolute, sed quate

quatenus est affectus puerilis : & quia pueri facilius sanantur, hi auctores (respicientes ad hanc facilitatem curationis, quæ habetur ratione ætatis) dixerunt, ophiastin facilius curari, scilicet in pueris, quam alopeciam in iuvene adulto. Sed cæteris paribus, ophiastin difficilius curatur. Augetur etiam & minuitur curandi difficultas pro arearum progressu : recentes enim areæ facilius tolluntur: sic alopecia recens facile tollitur, antiqua difficulter, vel numquā. Præterea si per modicam frictionem cutis capitis, mutetur color cutis; cito & facile vitium illud depellitur: at, si per modicam, vel mediocrem frictionem, non mutetur color cutis, vel vix mutetur; vitium illud non nisi difficulter, & longo temporis spatio tolli poterit. Si medio modo se habeat, medio etiam tempore tollitur. Quoad defluuium capillorum, hoc fit, vel ratione cutis, vel ratione materiæ. Si ratione cutis, si sit laxior, vel humidior, possunt indicationes expleri. Si deficiat materia, possumus addere. Si materia corrupta sit, idem est dicendum, quod diximus de areis. Si defluuium capillorum sit è morbo Gallico, non possumus curationē polliceri, nisi prævideamus, num possit auferri morbus Gallicus. In caluitio non possumus audacter curationem polliceri: est enim insanabile, aph. 34. sect. 6. si fiat ratione ætatis; quia ætate ita ficcatur cutis, ut non possit laxari, nec possit restitui humiditas. Auicennas dicit, caluitium (quod scilicet accidit ante debitum tempus) posse remoueri, & retardari. Quoad tardū pilorum ortum: si in causa sit vitium agentis, ut si corpus est frigidum; possumus calefacere & curare. Si fiat vitio cutis, si hæc sit laxior & humidior, possumus promittere salutem, quia possumus densare & siccare. Si verò cutis sit densior & siccior, non possumus ita polliceri salutem: vnde quidam calidi temperamenti extremam attigerunt senectutem sine pilis in mento.

Dictorum affectuum curatio.

Quoad areas: & primum quoad cheirurgiam, hæc respicit totum, vel caput. Cheirurgia merito totius, consistit in venæ sectione, quæ locum non habet, nisi peccet sanguis, id est, nisi redundet. Euacuatio sanguinis potest fieri duplici præsidio; vel debili, ut frictionibus; vel valido, ut sectione venæ. Si morbus est debilis, utendum auxilio debili;

Arearum curatio.

Obiectio soluitur. valido, si validus. At aræ non sunt morbus validus; imo ne morbus quidem, nisi in parte exornatoria: Ergo non videntur egere sectione venæ. Dico in venæ sectione considerandam esse, non tantum vehementiâ morbi præsentē, sed etiâ imminētem. In aræis imminet vehemēs morbus, cuius ratione vacuandus est sanguis valido auxilio. Nā in aræis vtendum est topicis remediis calefacientibus, discutientibus, & attrahentibus à centro ad circumferentiam. Si his medicamentis vteremur sine euacuatione sanguinis, ad caput sanguis attraheretur, & attractus posset causa esse phlegmonis cerebri, vel meningum. Quare, ratione huius maximi motui imminētis, dum sanguis redundat, vena secanda. Galenus in cura alopecie, c. l. l. i. n. rón. non meminit venæ sectionis, quia ibi non tradit curationem morborum, sed rationem cōponendorum medicamentorum, desumptis indicationibus à locis affectis. Ideo non loquitur de omnibus indicationibus, seu instrumentis. Circa quantitatem. Non est vacuandus sanguis in multa copia: dum enim adest aræa, impossibile est, vt corpus sit exquisitè plethoricum; quia aræa pendet à cacochymia, non tamen exquisitè, id est, non adest sanguinis redundantia, sed nothæ cacochymia: non excedamus igitur 3 vj. vel viij. Quo tēpore? Lenita aluo. Quæ venæ secandæ? Variæ, pro varia dispositione ægri. Si enim affectio pendebit è iecore, aperietur basilica dextri brachij: si à liene, basilica sinistri: si ex hæmorrhoidibus, his applicabuntur hircudines. Si è mensibus suppressis, saphena secabitur. Quod si ætas, timiditas, aut vires debiles non possunt ferre sectionē venæ, accedendum ad auxilia quæ gerunt vicem sectionis venæ, ad cucurbitulas videlicet, quæ modo dorso, modo popliti, modo cubito sunt applicandæ, pro varia ægri dispositione. Cheirurgia vero, quæ respicit caput, duplex est, & proponitur ab Auicē. Alia euacuat caput, alia potius euacuat materiam existentem in cute capitis. Pro euacuatione capitis, dicit Auicēnnas, caput esse fricandum, & si per frictionem illam insigniter rubicundum fiat caput, ita vt turgidæ conspiciantur venæ circa frontem & tempora; tunc secandam esse venam frontis: vt postea capiti tuto remedia queāt applicari. Quòd si non appareat illa rubedo, desistendum à sectione illarum venarum. Notandum tamen, prius secandam esse venam cubiti, deinde venam frontis. Cheirurgia, quæ euacuatur materia existens in cute capitis, proponitur,

ab Alexandro & Auicenna: Et est hæc. Si area sit contumax, cutis capitis scarificanda est: sic enim euacuantur serosæ illæ materiæ, quæ abradunt radices capillorum. Prius tamen totum euacuari debet, pharmaco, aut venæ incisione, ne attrahatur materia.

De lenientibus, præparantibus, purgantibus, & totum, & caput, dicemus infra cap. 7. de dolore capitis. Auicennas monet, si infans areis corripitur, sufficere abstinentiam: non danda pharmaca. Si puer fuerit decem annorum, possumus dare *psllularum cochiarum* 3 j. Si fuerit in ætate pubere, ascendimus ad 3 s.

Medicamēta communia.

Quoad localia, secundum Gal. c. 1. l. 1. κ. τόπ. conueniunt attenuantia, discutientia, & gignentia bonum alimentum. Debent ergo calida esse, & tenuium partium: quare vitentur adstringentia. Auicennas, ob materiæ confluxum ad caput, perimiscit aliqua corroborantia, quæ non sunt valde stiptica, ut ol. ros. compl. Ego tantum tres formulas proponam, debilem, mediocre, validam: quibus vtendum prout areæ facile, vel difficulter cedunt. Debile medicamentum, hoc est:

Topica.

Rz cūseris amygd., amar. persicorum, radicum cannarum, abrotanis, thuris in aceto macerati, ana ziss. ol. amygd. amar. adipis censeris ana ziss. Misce, fiat linimentum. Mediocre: Rz pulv. staphidis ag. in aceto acerrimo macerata ziss. spuma maris, seu alcioni, sulphuris ignem non experti, sem. cruce, utriusque veratri ana 3j. ol. de Kerua, fellis taurini, resina terebinth. ana 3j. Mis. pro linimento. Resinapini est in communi usu: multo tamen valentior est resina terebinthina, quæ est magis tenuium partium. Validissimum: Rz euphorbii, sinapis, piperis albi, nasturtii ana 3 j. adipis vrsi, si haberi possit, sin minus, adipis anseris sylvestris ziss. stercoris capra combusti 3 ij. succi cepæ 3 ij. ol. laurini, vel costini 3 vj. Mis. pro linimento. Si malum vrget, Auicennas ascendit ad cantharides, quæ possunt macerari in aceto, vel in decocto staphidis agrie. Possumus, vsu postulante, vti cantharidibus, cum pice liquida. Auicennas etiam vtitur lacte rithymali. Prout enim rebellis est affectus, pro eo ad valentia ascendendum. Hinc Galenus, c. 1. l. 1. κ. τόπ. & c. 18. l. 14. meth. monet, vt quandoque incipiamus à valentioribus, non semper à debilioribus: si enim malum rebelle, non est æger debilibus frustra cruciandus. Num autem malū rebelle sit, cognoscitur hoc modo. Antequā adhibeantur medicamenta proposita, fricanda cutis est panno aspero, vel radice bryoniæ, vel foliis ficuum, vel, si homines

delicati hanc frictionem non ferant, caput fouendum spongia, in tepida imbuta; vt his rationibus laxentur pori cutis, quo medicamēta penetrare & operari queant. Quoad vtēdi tempus: Post euacuationem totius, & capitis, abradendi pili, idque sæpius, quoties renascuntur: deinde præscriptis medicamentis fricanda est cutis: tum medicamēta proposita adhibenda. Vt autem in alopecia & ophiassi sciamus, an vtendum sit leuioribus vel fortioribus, fricanda est cutis: si enim per frictionem moderatam mutatur, vt calida reddatur, & secundum calorem fiat rubicunda, vel citrina; tunc debemus applicare medicamēta debilia; quia hinc cognoscimus, affectionem esse debilem, non contumacem. Si verò per frictiones insignes non mutatur cutis, vel vix mutatur; debemus auspicari à valentioribus; quia indicium est admodum rebellis affectionis. Deinde sciendum, num in medicamentis, quæ primum applicauimus, sit insistendum, an verò transeundū ad alia, vel debiliora, vel calidiora. Si ergo post remotionem medicamentorum, cutis facta sit calidior ad tactum, item rubicundior, & tumidior, & si ad sit indicium aliquod exulcerationis, tunc descendendum ad debiliora; alias fierent vlcera & inflammationes in capite. Si non fiat mutatio proposita, ascendendum ad validiora. Hinc monet Galenus, c. 18. l. 14. meth. vt non semel, sed bis, & sæpius quotidie aduertamus, quomodo se habeat cutis, post remotionem medicamentorum. Si enim leuis sit mutatio, debemus in illis progredi: si nulla sit mutatio, ascendendum ad validiora: si multa sit mutatio, descendendum ad debilia, & partes oblinenda: *adipe anserino, & gallina*; mitigant enim feruorem & acrimoniam, introductam à validis medicamentis, & simul attenuant: non autem vtendum anodynis crasse facientibus, quia astringunt.

*Villus in
areis.*

Quoad dietam in areis. Aër erit calidus, vt succi adhærentes radicibus capillorum, euocentur à centro ad circumferentiam. Auicennas præcipit, vt pileus conficiatur è pellibus, vt fiat sudor, & per sudorem euacuatio: quod potiss. hyeme fieri debet. Galenus dicit, in æstate adhibenda esse medicamenta sub radiis solaribus, quia aër ille adiuuat: in hyeme vtendum his medicamentis in balneis, vel in hypocaustis. Sit ergo semper aër calidus. Cibi sint boni succi: victus medicus. Al vino abstinendum, quia caput petit. Quod si consuetudo vinum poscat, id erit pauciferum & subastringens.

Curatio defluuij Capillorum.

Capillorum defluuium pendet à vitio materiæ, vel cutis. *Defluuium*
 Vitium materiæ est corruptio, vel defectus. Si praua sit ma- *capillori.*
 teria, iisdem occurrendum, quibus vsi sumus in curatione *Si à praua*
 arearum. Quod si peculiaris aliqua sit deprauatio succorum, *materia.*
 vt in morbo gallico, non vtendum propositis medicamen-
 tis, sed adhibenda ea, quæ priuatim luem gallicam respiciunt.
 Si ergo in morbo Gallico pili defluant, non debemus cura- *Defluuium*
 re, vt pili detineantur, quod quidam faciunt, ad motis astrin- *in lue Ven-*
 gentibus, ladano, oleo mastichino, rosis, myrto: hæc enim *nerca.*
 in causa sunt, vt morbus Gallicus sæuissimus fiat, quia suc-
 cus vitiosus, impactus radicibus capillorum, adhuc magis fi-
 gitur, & lues illa in corpus retrocedit. Quare post euacua-
 tionem totius & capitis, cum bibunt decoctum guaiaci, Lu-
 na augescente capilli abradendi, & his euulsis, quotidie ca-
 put sequenti vngue vngendum, ter, quater, & quinquies:
 renascuntur enim pili celerrime, & admodum firmi. *R. pul.*
corticis guaiaci, abrotani combusti, vel rad. canna, ana ʒ ss. decocti
guaiaci, quo pro syrupo ager vtitur ʒ ij. olei caryophyllorum vn-
guentariorum ʒ j. ol. amygd. ʒ ss. vini albi montani subdulcis ʒ iss.
Misc. fiat decoctio in duplici vase, per 12. vel 14. horas, seruetur
ad vsum.

Si pendeat defluuium ab inopia materiæ: secundum Ale- *Si ab ino-*
 xandrum & Galenum, vtendum medicamentis, quæ habent *pia mate-*
 vim attrahendi materiam, item attractam conseruandi, non *ria.*
 absumendi: tertio quæ habent vim, vt materia attracta in
 cute detineatur & hæreat, non defluat. Quare debent esse
 calida, vt attrahant: item humida, ne absumant, quia siccitas
 consumeret: item astringentia, densantia, vt materia hæreat,
 non defluat. Alexander ergo caput fouet aqua tepida, quæ
 calfacit, & humectat: & inungit caput *hydreleo*, ad mate-
 riam attrahendum & conseruandum: præterea vtitur aliquo
 condensante, vt oleo rosato, mastichino, myrtino, vino stiptico, &
admisceat ladanum. Sic his astringentibus vtitur: quibus non
 debemus vt in defluuio capillorum è praua materia obor-
 to. Quoad quantitatem: pro ʒ j. calefacientis & humectan-
 tis, misceri debet ʒ j. condensantis & astringentis: verbi
 gratia, pro ʒ j. hydrelei, imponatur ʒ j. ladani, vel alterius ad-
 stringentis. Victus his respondeat. Aer temperatus. Ci-
 bus mediocris, optime nutriens, humectans, quia materia
 deficit.

*Si à cutis
raritate.*

deficit. Vinum vinosum deficcatur: quare mediocre est. Si defluuium capillorum fiat vitio cutis: fit quia cutis est rarior, vel densior. Si sit rarior, vtendum condensantibus & astringentibus: ideo Auicennas probat *baccas & fulsa myrti, cortices nucum vstos, gallas immaturas cum vino stipico, myrobolanos chebulas, emblicas. Vti etiam possumus oleo lentiscino & myrsino. Alexander caput fouet frigida, vt densetur cutis. Aer sit frigidus: cibis crasse faciens, vt caro bubula, pedes vituli: vinum granatorum restringentium.*

*Si à cute
densa.*

Si defluuium fiat ob densitatem cutis: contrariis occurrendum. Ideo Auicennas vtitur attenuantibus validis, *vt cœnere ranarum, sinapi, calamintha, ruta, euphorbio: abluis caput aqua alterata cum alcyonio, aqua salita. Aer sit calidus: victus extenuans, condiantur cibi cinamomo, feniculo & calefacientibus. Potus sit vini vinosi, tenuis, & antiqui, quoniam extenuare volumus: vel aquę alteratę cinamomo, feniculo, &c.*

Curatio Caluitij.

Caluitium.

Si fiat ratione defectus, occurrédum *oleo amygd. & hydreleo. Auicennas infantes suscipit curandos, & qui non deueniunt ad senectutem: de senibus enim actum est, quia materia in illis non potest refici.*

Si fiat ratione densitatis cutis, conueniunt extenuantia, quę proposita sunt in areis.

Curatio tardi pilorum ortus.

*Tardusor-
tus pilorū.*

Si fiat ratione caloris agentis, vtendum calorificis: verbi gratia expurgato corpore, exhibendę sunt *aqua Apontheses, & medicamenta calefacientia: vt corpus quod est frigidum, calidum reddatur. Optimę etiam sunt confectioes calefacientes. Si fiat ob vitium cutis: si cutis sit humidior, rarior, ficiore: propositis patet quid sit agendum. Si non oriantur pili, vt oriri deberent, ob densitatem cutis: difficillime tollitur affectio. Tunc ergo Auicennas accipit *cantharides, ablatiis aliis & pedibus, exsiccat in umbra: deinde conterit & decoquit in ol. amygd. vel viol. vel in oleo communi: his mentum inungit, quia hoc modo fiunt crustę, quibus decidentibus nascuntur pili. Mentum etiam inungi debet melle anacardino. Vngula etiam asini combusta & trita, permiscenda oleo sesamino, &**

pars

pars vngenda. Sic una formicarum, permiscenda oleo de been, & pars ea vngenda. Possimus etiam accipere auellanarum medullam, contritamq; miscere cum oleo raphani. Vngatur etiam mentum cum cinere abrotani, & oleo antiquissimo. Prestantiss. est secretum, aqua è fauo mellis destillata. Si enim vngatur ea mentum in vitio ob cutis densitatem, mirabiliter pili erumpunt: sumatur mel sicuti extrahitur, vna cum cera & apibus, id est, fauus mellis, & totum destilletur.

CAPVT II.

De excessu Capillorum.

RE excessum capillorum intelligimus, tum *Nomen* nimiam pilorum longitudinem, tum duritiem pilorum nimiam, quidam enim pilos ita duros habent, vt videantur pili suum cap. 3. lib. 1. κ. τόν.

Si pili sunt prolixiores, impediunt, quo minus partibus medicamenta admoueri queant: vnde hi demendi. Durities vero pilorum, tum indecoros reddit homines, tum infensa & molesta est.

Sed primo loquemur de primo excessu: & proponemus remouentia pilos: & prohibentia nouam generationem pilorum. Remouentia pilos sunt duplicia, alia dicunt Psilothra, *Remouentia pilos.* quæ à pilis cutem denudant: non tamen inde pilorum radices absumuntur, sed cutis tantum redditur depilis. Alia sunt, quorum vis intro magis penetrat, ita vt radices pilorum tollantur: & hæc dicuntur extirpantia pilos. Psilothra pertinent ad partem exornatoriam: extirpantia ad facultatem comitoriam. Psilothra sunt calida, & habent vim abrasendi. *Psilothra.* At, ne exulceretur cutis, mitiora miscenda sunt cum validioribus. Galenus ergo probat pumicem usum. Prestantissimum est medicamentum, quod recipit calcem viuam & auripigmentum, commista cum amylo, cum farina hordei, cum succo persana. *cap. 64. l. 6.* Atius permiscet cum succo oryzae, & contundit omnia, ad inhibendum exulcerationem, in mortario plumbeo. Aequa erit portio calcis & auripigmenti, si volumus medicamentum non multum validum: at, si volumus validius, imponemus auripigmentum in maiori copia, verbi gratia. R. auripigmentum 39. calcis viua 31. persana colata q. s. misce, & in mortario plumbeo fiat linimentum. Auicennas monet, si forsan institutum nostrum, sit tollerere

lere pilos, vt pili qui renascuntur sint molles, non duri, & teneriores, non asperi in psilothro imponendos cineres vitis, verbi gratia, ad 3 iij. & locum diligenter esse fricandum post remotionem medicamenti, deliniendum locum cum *furina hordei, fabarum, & seminum melonum*. Sic enim pili nascuntur molles & tenues, Auicennas etiam, si imminet exco-riatio: (quod è dolore cognoscitur:) auellit medicamentum: & si leuis est exco-riatio, lentes exco-ricatas tritas cum aq. ros. misce cum modico ol. ros. compl. & oblini locum. Si exco-riatio sit insignior, confugiendum ad medicamentum validius, ad unguentum rosatum, & in frigidans Galeni, sed sine aceto. Ratione mali odoris, Auicenn. miscet odorata: hinc probat *cretam permixtis aromatibus, vt caryophyllis, cinamom. macis: si homines distiores fuerint, addetur aliquid moschi, vel ambre.*

**Exstirpan-
tia pilos.**

Quoad medicamenta penitus exstirpantia: proponit Galenus leporem marinum, qui ignotus est nobis: item hepar thynni putrefactum, qui magnus est piscis, & haberi potest: probat cedriam, sandaradam, urticam marinam, lachrymam bederae, bryoniae, vitis albae. Hinc Aëtius dicit, si pubes puerorum inungatur cum lachryma vitis albae, tardissime nasci pilos in pube. Eandem vim habet succus exsudans è viridibus sarmentis, dum ad ignem comburuntur. His pili tolluntur.

**Prohiben-
tia pilorum
incrementum.**

Prohibentia, ne pili tam facile pullulent, habent vim densandi cutem: pili enim per apertos poros egrediuntur. Oportet etiam, vt habeant vim propellendi materias ad partes internas, ideo debent esse frigida & reprimentia. Hinc Auicennas probat succum hyoscyami, mandragora: ascendit ad opium, permixtum cum aceto: utitur cinere ranarum lacustrium, quem permiscet cum macilagine psyllij, cum hyoscyamo. Sed aduertendum, ne mulieres vtantur istis in tempore purgationis menstruum, vel imminentibus menstruis: maxime enim hoc obesset.

**Pili crassi
vt reddan-
tur tenues.**

Quoad pilos duriores, vt reddantur molliores & tenues: oportet vti iis, quæ habent vim deterforiam, & ex Aëtio sunt tenuium partium. Galenus probat *furinam hordei, fabarum, crui seu orobi, axistolochias, utrumque veratrum, cinerem sepiarum, & animalium quæ ostrealia sunt*, in quibus est vis attenuandi & detergendi, absque erosione. Et hæc possent misceri cum succo prisanæ, id est, cum aliquo detergente, & attenuante. Si volumus odorata reddere, miscemus *melissam, schananthum, moschum, &c.*

CAPVT III.

De vitiatō colore capillorum.

E tinctura capillorum agentes, paucis prosequi-
mur Canitiem, quia est vitium turpe, præcipuè
in fœminis. Sed è pilorum tinctura, fœminæ in-
terdum labuntur in apoplexiam, epilepsiam, ve-
ternum, catochum, in destillationes periculosas,

*Tinctura
capillorum
causæ uti-
dum.*

in mortem, cap. 3. l. 1. κ. τόπ. Quare his prudenter vtendum.
Canities fit ex humore pituitoso, lento, viscido, qui languide
à calore propellitur. c. 5. l. 2. de temperament. Quare hæc pi-
tuita est serum pituitæ, id est, corruptio quædam, contracta
è pituita, quæ temporis progressu putrescit. Tempora potiss.
canescunt, quia ibi est musculus carnosus & humidus. Cani-
ties ergo secundum Galenum, indicat temperiem, frigidam
& humidam. Adest putredo, è materia humida, diu deten-
ta, & non transpirata.

*Canities
causæ.*

Quoad imminuentem igitur canitiem, cum fiat propter
imbecillitatem caloris, & ratione illius materiæ pituitosæ
putrescentis, oritur indicatio, vt pituita collecta & putre-
scens euacuetur, prohibeaturque, ne amplius gignatur, coa-
ceruetur & putrescat. Et hinc rectè Auicennas occurrit me-
dicamentis purgantibus totum & caput, vt pituita euacuetur:
de quibus nos agemus c. 7. de dolore capitis. Ad prohibendum
autem, ne materia pituitosa generetur, oportet siccare, cal-
facere, roborare caput & ventriculum: quod fit *magnis anti-
dotis*, de quibus cap. de dolore capitis. Ne vero hæc materia
colligatur, cum id fiat ob cutis densitatem, pritur indicatio
aperiendi poros cutis, vt exhalet materia. Debemus ergo
vti oleis calidis, ab Auicenna propositis, vt oleo de bern, de co-
stis, oleo quod fit è medulla colocynthidis, oleo è sinapi, è caryophyllis
unguent, cuius frequenti usu homines à canitie præseruantur.

*Ad cani-
tiem immi-
nentem.*

Dum autem pili iam cani facti sunt, vtendum tingenti-
bus pilos. Quæ tingunt pilos nigro colore, non debent esse
stiptica, aut permiscenda iis, quæ sunt tenuium partium, ne
stiptica noceant. Galenus & Auicen. multa proponunt. Ad
nigros capillos sequens medicamentum expertum est, & per
mensem nigros seruat, sine detrimento: R. gallarum immatur.
3 iij. (optima sunt, quæ ex Istria deferuntur.) decoquantur in sar-
ragine cum ol. communi, tandiu, donec fere omnes galla disrupta
sint: tum imponantur super pannum luteum, qui ligno incumbat,

*Tingentia
pilos.*

*Denigratio
capillorū.*

& sic detineantur per noctem: post confusa in mortario confecto & cupro, religantur in puluerem, & exsiccentur. Addantur deinde squama aru ℥j. alcanna, id est, foliorum ligustri ℥ij. folia bac pulveriscentur: caryophyllorum pulverisatorum xy. Hic puluis proiciatur in vas figulinum non magnum, quale Patavij solito emitur: & vas repleatur vino aromatico, vel montano generoso. Post addantur aluminis rocha ℥ij. corticum granatorū, corticum nucum viridum ana ℥is. rorismarini, salvia ana Manip. ℞. Omnia misceantur, & decoquantur ad consumptionem medietatis vini. Quod si ergo tingere volumus capillos, oportet accipere vini & pulueris eam quantitatem, quæ sufficiens esse videtur pro illa vice: misceri autem puluis cum vino debet, ut ea oriatur consistencia, quæ in ptisana colata requiritur. Capillis oblitis, locus inuoluatur panno lineo, & maneat inuolutus per 2. vel 3. horas: dein tollantur petiæ istæ lineæ, & abluatur locus æquali portione aquæ & lixiuij, ita ut caput mundū reddatur. Et, si forte post abluionem aliquid medicamenti remaneat, vel in barba, vel in capite: sumatur pannus, immersus aquæ; quæ sit referta copioso sapone, & eo optime fricetur ac detergatur caput, & vndique exsiccentur. Deterfa autem materia medicamenti, caput siccandum: postea inungendum oleo caryophyllorum vnguentariorum. Durat hoc donec augentur pili, interdum mensem integrum. Sed faciendum est Luna decresciente, ut diutius detineatur. Et notandum, quod illæ petiæ seruari possunt, ad eundem usum, pro aliis vicibus.

*Ut capilli
fiat fului,
nitidi.* Sequenti medicamento pili redduntur nitidissimi, fului, & splendentes: ℞ rad. cannarum, faui mellis, ana lb ij. lupinorum in succo herba lanaria maceratorum ℥is. fol. ligustri ℥j. fl. verbasci albi maceratorum in aceto 3vj. macis xy. salis communis ℥is. croci xy. Misc. & destillentur omnia in alembico vitreo: & sub radiis solaribus inungantur radices capillorum. Vel fauus mellis destilletur, & primo aqua exhibet, deinde oleum: quod oleum erit admirabile, ad reddendū capillos nitidos & splendentes.

*Facies ut
nitida fiat.* Faciei cutis splendēs & nitida reddetur, hoc medicamentum: ℞ aq. cochlearum, limoniorum, florum fabarum, polygonati, siue sigilli Salomonis, malvarum: (intelligo semper flores:) ana lbj. Misc. & hæc aqua erit optima. Verum, ut sit magis efficax, simplicia proposita imponantur in aqua polygonati, & destillentur in alembico vitreo: & erit aqua ad faciei nitore comparandum valde idonea, si moderate facies inungatur.

CAPVT IV.

De Tineis, seu de Acholibus, & Fauis.



ACTENVS de capillorum vitiiis: sequuntur affectus ad Cutem capitis pertinentes, vt sunt Tinea, Porrigo, & Pedicularis morbus.

Transitio.

Tinea dicitur à similitudine illius vermis, qui abradit vestes. Dicitur etiam vlusculum capitis. Est ergo tinea vlusculum capitis, cutim depascens. ca. 8. *Definitio.*
 α. τ. ε. ν. Vlucis est soluta vnitas, cum deperditione cutis capitis, à mordente succo excitata. Dicitur, cum deperditione cutis, ad differentiam vulneris.

Fit à mordaci succo: qui talis est, vel natura, vt bilis ichor; vel talis est ratione putredinis, vt alij humores, & præcipuè salsa pituita: nec tantum à salsa pituita fit tinea, sed ab aliis etiam, cum Alexandro. Causæ huius succi mordacis vel sunt internæ, vt mala viscerum dispositio: vel externæ, vt mala dicta, esus ciborum acrium & salforum.

Causa.

Tinex sex species sunt. 1. Psyracia, in quibus cutis secundum superficiem exulceratur, nec admodum eius mutatur color. 2. Exanthemata, id est efflorescentiæ, quæ ad cranium penetrant, cutim mutant in colore, & eam reddunt asperiores: Alexander dicit, ea esse subrubicunda & aspera. 3. Exulceratio papillaris, sunt vluscula magis penetrantia, in quibus fit attractio materie, & tumor quidam instar papillæ. 4. Ficus; quando magis mordax est succus, fit dolor, & maior materie attractio; oritur tumor instar papillæ ficus, c. 2. l. 2. meth. 5. Si adhuc maior est acrimonia succi, non tantum fit tumor, sed foramina quædam exigua, è quibus tenuis materia prodit, qui dicitur ichor: unde hæc affectio vocatur Achor. c. 8. l. 1. α. τ. ε. ν. Arabes vocant asphati: nam Auicennas ait asphati esse pustulam humidam, à qua ichor emanat: item, esse exulcerationem, habentem foramina plura exigua, è quibus aqua emanat, in qua est nonnihil visciditatis. Postremo, si adhuc magis vigeat vis succi abradentis, maxima fiunt foramina, è quibus emanat materia instar mellis; unde Fauus dicitur, & meliceris. Hæ sunt differentie tinex: quæ omnes in hoc conueniunt, quod ratione putredinis sunt contagiosæ. I I. A loco affecto sumuntur differentie: prout Magis vel Minus penetrant. Ab efficientibus causis; vt procedunt ab

Tinea omnis est contagiosa.

11.

Ichore, Pituita salsa, Flava bile, vel Melancholia.

Signa. Cognoscitur hæc affectio, quia homines ratione pruritus coguntur ad scalpendum. Apparet etiam indicium in cute. Succedit dolor, tumor, apparent foramina. Quæ autem sit differentia huius affectionis, facile cognoscitur è materia ipsarum declarata. An verò prodeat magis ab hoc, quam alio succo, docet Alexander, dicens: si exiens est tenue pallidum, erit humor biliosus; si viscidum, pituitosus; si exiguum, & vix exit, indicium est succi melancholici. Cognoscimus etiã è signis indicantibus hunc vel illum humorem;

Indicationes.

Cum soluta sit vnitas, oritur indicatio vniendi. Vnionem autem impediunt, dolor, inflammatio, & succus deprauatus: ratione doloris, oritur indicatio mitigandi; ratione phlegmonis, oritur indicatio remouendi (de speciebus inflammationis agemus cap. 8. vbi de phrenitide) ratione succorum, si sunt fixi & impacti, discutiendum & abstergendum, præcipuè si crassi sunt; si sunt in fluxu, est repercutiendum; si sunt fluxuri, est diuertendũ, atq; toti corpori prouidentũ.

Prognostica.

Hi scopi absolui possunt, quia est vlcusculum: si tamen affectio sit inueterata, difficilis est curationis.

Topica. 1.

2. Galenus in achoribus proponit discutientia: quæ leuiora sunt, aut fortiora: illa conueniunt, si affectus est in superficie: hæc, si in profundo. Cum cutis bonum alimentum attrahere non possit, conueniunt reprimentia, quoties habemus materiam, quæ in fluxu est, citra corporis repletionem. Discutientia & reprimentia conueniunt simul, quoties habemus materiam impactam, & imminet malum aliquod, vt inflammatio. Sed abstinendum à frigidioribus, & ab obturantibus, & ab ingratis: vnde Archigenes male proponit semperuiuum, quod nimis refrigerat; cerussam, quæ obturat; urinam tauri, quæ ingratum facit medicamentum. Re-

Materia auxiliorũ.

primentia secundum Galenum sunt, baccha myrsi, cortex pini, rubus canis, lycomotorus, oleum myrtinum, de rubo canis, de lycomoro: oleum oblinit & discutit, myrtus reprimis. Conueniunt etiam lentiscus, fructus & radix cyperi, cupressi, lentes. Discutientia alia leuiora, vt bordeum, oleum vitæ, betæ folium & radix, bryonia, spuma argenti, cadmia, manna thuris, lupini, concha vsta. Fortissima sunt: sal, fex vsta, chalcitis, calx vina, fel, potiss. calidorum & siccorum animalium; vnde fel suillum omnium est moderatissimum, quia humidum. Addit etiam Galenus sulphur, rad. eucum, siluestris, rad. asparagorum, rad. lilij, rad. veratri viridisque, folia

folia fici, succum ireos, succum scilla decoctæ in fornace, medicamentum est charta combusta, quævis veram chartam non habemus. Excipi hæc possunt oleo veseri, oleo lucerne, oleo amygd. amararum, melle, vino, & aceto; non tamen indiscriminatim. Excipienda sunt melle & oleo, cum discutere volumus. Vino excipimus, acri quidem si volumus discutere, austero, si volumus reprimere. Aceto excipimus, siue repellamus, siue discutiamus; est enim tenuis substantia, & habet partem calidam, ac frigidam. Ex his formulæ præstituentur: vt in achoribus incipientibus ratione matæ Formule.
 riæ in fluxu: R. baccharum myrti, rubi canini, sycomotori ana ℥ ij. vini austeri ℔ ij. fiat decoctio ad tertias. Discutiens leue: R. hordei integri, rad. betæ, bryonia ana Man. s. olei veteris. ℔ s. vini acris ℥ ij. fiat decoctio ad tertias: Deinde facta expressione adde pulueris cadmia, lithargyri, lupinorum ana ʒ j. cochlearum vstarum ʒ j. Misc. Reprimens simul & discutiens: R. fol. lentisci P. j. fructuum cypersi, cupressi, lentisci ana ℥ s. aceti mediocris ℔ s. Misc. & fiat infusio in aceto feruente per 24. horas: dein facta expressione, adde olei myrtini, ol. ros. compl. ana ʒ j. Misc. Validum medicamentum, quo tinea quæcunque eradicatur, multis secretum: R. rad. cucum. agrest. utriusque helleb. asparagorum ana ʒ j. Macerentur omnia in aceto acerrimo feruente per 24. horas: dein facta expressione adde succorum ireos, scilla decoctæ in fornace, sulphuris ignem non experti, calcis vinea ana ʒ ij. ol. laurini ʒ j. resina therebinth. ʒ j. Misc. fiat unguentum. Quoad vtendi modum, actu calida admoveantur. Tempus applicandi est post corporis purgationem.

Notandum circa Pharmacum, & venæ sectionem in his morbis. Hæc duo valida auxilia sunt, qui in morbis vehementissimis conueniunt, aph. 29. sect. 2. Sed sciendum, his vtendum esse, non ratione morbi præsentis, quia hic est leuis, sed ratione morbi imminētis: cum enim debeamus vt localibus medicamentis calidis, periculum est, ne ratione caliditatis attrahatur materia in caput, & fiat inflammatio, &c.

*Purgatio
& phlebotomia.*

CAPVT V.

De porrigine, seu furfuribus.



PURFURES, ita dicuntur, quia è capite decidit Nomen.
 materia quædã, quæ similis est furfuribus. Por-
 rigo autem dicitur, quæsi prurigo, quia in hoc
 affectu homines infestantur pruritu quodam.

Definitio.

Est autem porrigo solutio vnitatis, in superficie cutis, capitis à materia furfurea pendens. Hæc definitio tradita est per causam effectiuam, non per causam formalem: quia porrigo est tristis sensus pruriginosus, ideo ad dolorem refertur; vnde quæ causa formalis est doloris, ea etiam causa formalis est porriginis. Solutio ergo vnitatis est causa efficiens: à qua pendet hic sensus tristis pruriginosus; ita vt solutio vnitatis sit causa immediata sensus pruriginosi. Hæc solutio vnitatis residet in superficie cutis capitis. Idem dicit Auicennas; in affectu furfuraceo adesse leuem excoitationem in superiori cutis superficie. Postremò diximus, pendens à materia furfurea. Diximus, pendens; non caulata. Nam effectus à causa sua dupliciter producitur: primò, vt non dependeat in esse & conseruari à suo producente; vnde fit, vt remoto efficiente, permaneat effectus. Secundo producitur effectus à suo producente, ea ratione, vt, quamprimum tollitur producens, ilico euanescat effectus, quoniam effectus in esse, & conseruari pendet à suo producente. In proposita ergo finitione diximus, pendens: quia solutio vnitatis, quæ est causa affectus furfuracei; in esse & conseruari pendet à materia furfurea: vnde materia hac ablata, ilico cessat solutio vnitatis. Hinc colligitur illam solutionem vnitatis non esse morbum, sed affectionem, quia de ratione huius affectionis est, vt ad remotionem causæ remoueat etiam ipsa affectio.

At secus est loquendum de ipso morbo: quia morbus necessario habet permanentiam. Hinc colligitur materiam hanc furfuraceam sibi vindicare locum causæ efficientis, & quandoque locum exeuntis mutati, quando extra caput egreditur, quia egreditur id, quod non deberet egredi: habet autem locum efficientis, quatenus est causa soluens continuum.

Causa.

Porro hæc materia furfurea producitur è corruptis ichoribus: per hos autem ichores intelligo tenuem portionem excrementitiam succi alimentalis, quæ tenuis portio est vehiculum succi alimentalis. Et hæc portio est ea, quæ concessit in tenue excrementum tertiæ concoctionis. Cum ergo ichor sit tenuis portio excrementitia succi alimentalis; necessario ichor proportionem habet cum succo alimentali. Hinc fit, vt sanguis ichorem habeat mitem; bilis & melancholia immitem; quia tales sunt eorum succi. Porrigo igitur

igitur fit à corruptis ichoribus sanguinis, bilis flauæ, pituitæ, melancholiæ. Et hoc accidit, aut vitio capitis, aut vitio partium subiectarum, aut vitio totius. Vitio capitis, vbi caput calidius & humidius est, vel, vbi calidius & siccus. Auicennas dicit, hunc affectum fieri à nuda siccitate. Nos ichores necessarios esse dicimus. Sed Auicennas sic est intelligendus, vt voluerit ratione siccitatis nudæ ichores adeo excrefcere, vt in materiam furfuraceam abeant: loquitur de causa efficiente ichores similes furfuribus, non quod hic affectus prodeat è siccitate tantum. Concurrent præterea vitia partium, vbi iecur est calidum, ventriculus frigidus: vbi deprauati sunt succi, vbi præcessit mala viuendi ratio.

*Auicenna
concilia-
tio.*

Porrigo causatur ab ichore vel pituitoso, vel melancholico, vel bilioso, vel sanguineo. Et vitatur hic ichor vel in capite, vel in aliis corporis partibus.

*Differen-
tia.*

Facile cognoscitur hæc affectio, è furfuribus decidentibus: conqueruntur homines de sensu tristi pruriginoso. Differentiæ facile cognoscuntur: quia, è Celso, si malum pender ab ichore pituitoso, materia furfuracea decedens, aliqua è parte madida erit: si ex ichore bilioso & melâcholico, siccitas apparebit. Et si è bile, citrinus erit color: si è melancholia, niger. Vtrum autem hæc materia sit genita vitio capitis, vel partium infernarum: recurrendum ad signa, indicantia intemperiem capitis & aliarum partium.

Signa.

Cum affectus hic originem ducat è materia furfuracea, illa depellenda est. Cum autem causetur vitio ichoris, oportet perpendere, an ichores geniti sint, an vero metus sit ne gignantur.

*Indicatio-
nes.*

Si geniti sunt, vel fluxerunt ad caput, vel sunt in fluxu. Si fluxerunt, oritur indicatio euacuandi eos. Si sunt in fluxu, oritur indicatio reprimendi. Si metuitur ne gignantur, periculum illud imminet, vel propter vitium capitis, vel aliarum partium.

Si vitio capitis, caput est corroborandum: si calidius & humidius, refrigerandum & siccandum: si frigidius, calfaciendum, &c. Si procedat vitio aliarum partium, illarum vitiis occurrendum. Hæ indicationes facile absolui possunt: nec opus est, vt in prognostico tempus teramus.

Quoad cheirurgiam: sanguis vacuandus, si in toto redundet sanguis. Et quia hic affectus levis est, nec morbus dici potest, ideo hac ratione leui præsidio sanguis demendus.

Curatio.

Cum autem ratione topicorum, quæ calida sunt, periculum inflammationis capitis, ideoque morbus magnus imminet, utendum valido auxilio: & proinde, si velimus cito curare, & totum corpus sit refertum sanguine, vena secanda est, ut sanguis cito remoueat. At, si velimus longo tempore furfures remouere, possumus uti debili auxilio, ut inedia, frictione, balneo, qui sanguinem longo tempore euacuant.

Topica.

Medicamenta è c. 6. l. 1. κ. τόπ. debent esse detergentia, attenuantia, astringentia: abitergentia, ratione materiae impectæ: attenuantia, ut materia, quæ resolui debet, attrahatur a centro ad circumferentiam: at ratione ichorum qui sunt in fluxu, ne tam facile suscipiantur, oportet uti reprimentibus, ut ichores fluentes recedant: & astringentibus, ut partes corroborentur, ne ita facile suscipiant. Hinc Archigenes probat medicamentum confectum ex atramento iutorio, id est, chalcantho, in hoc enim sunt partes nitrosæ, quæ detergunt; item calidæ ac tenues quæ discutiant, & robur addunt. Sed hoc medicamentum nimis vehemens est. Quare ita in curatione progrediendum. Expurgato corpore & capite, abluatur caput mediocri lixiuio, & addantur lixiuio surfures, fumaria, beta, radices oxylaphati; & ita abluatur caput: ablutum & liccatum caput, oblinatur cum farina fabarum, lupinorum, orobi, & addatur aliquid salis mineralis, & subigatur cum aceto, & cum oleo amygdal. amaro. Et hoc medicamentum detineatur in capite, per 2. 3. vel 4. horas, vel per totam noctem. Rursus deinde abluatur caput, urgente necessitate, lixiuio valentiore: unde lixiuio addatur siaphisagria, medulla colocynthidis, agaricus, rad. cucum. agrestis, & ita abluatur caput. Si his non tollatur malum, deueniendum ad medicamentum validissimum Auicennæ, quod efficitur æquali portione calcanthi, salis mineralis, & sulphuris ignem non experti, & bac cum ladano permiscetur, dissoluta in oleo mastichino, ratione corroborationis. Terram Cimoliam non propono, quia nos ea caremus. Nos medicamentis propositis addere possumus terram illam, quæ proxima est thermis Aponensibus, vel aliis thermis sulphureis, quæ terra redolet naturam sulphuris.

CAPVT VI.

De Phtheiriâ, seu morbo pediculari.



Definitio.
 Hic affectus est solutio vnitatis in profundo cutis capitis, à pediculo dependens. Dicitur solutio vnitatis, quia qui patiuntur hunc affectum, porriginis & dolore afficiuntur: & vbi dolor, ibi necessario solutio vnitatis.

Hæc vnitatis solutio, ad differentiam porriginis, est in profundo cutis capitis. c. 7. l. i. x. τρά. Hæc solutio vnitatis non causatur, sed dependet à pediculo: vnde ablato pediculo, non est amplius affectus: ideo hæc affectio non est morbus. Et pediculus nō est morbus, sed causa efficiens morbi, quatenus efficit solutionem vnitatis, à qua pendet tristis ille sensus, qui est causa doloris.

De ortu, causisq; pediculorum.
 Est enim pediculus quoddam animal, toto genere præter naturam, quia maximè infestum est naturæ humanæ: vnde homines interdum moriuntur ex hoc affectu. Generantur in cutis profundo: quia in superficie, & parte exteriori cutis non ita viget calor, vt possit animal procreare. Gignitur è succis modice calidis, & modice putrescentibus. Sunt modice calidi succi: nam calidiores ad totam deueniunt ariditatem, vel acrimoniam, vt non sint apti ad vitam suscipiendum. Sunt etiam putrescentes modice: nam vbi putredo est insignis, materia non potest vitam suscipere, sed fit ophiassis, aut alopecia. Porro hæc materia modice calida, modiceque putrida, sunt reliquæ tertie coctionis, & perinde reliquæ tertie coctionis, & perinde reliquæ materię sanguineæ, pituitosæ, melancholicæ; raro autem materię biliosæ, propter amaritudinē bilis; quamuis materia biliosa permixta esse potest cum reliquiis aliorum humorum. Causæ sunt internæ, & externæ. Internæ, discrasia capitis calida & humida, item humida tantum: densitas cutis capitis ratione cuius materia detinetur, & non potest euaporare; intemperies etiam calida & humida cerebri: & intemperantiæ aliorum viscerum, præcipuè intemperantiæ in humido: vnde in pueris, sceminis, eunuchis, vigent pediculi, propter eorum humiditatem. Causæ externæ non necessario occurrentes sunt, commercium cum pediculosis, vt in præliis & nauibus. Causæ necessario occurrentes sunt, aer frigidus, & præcipue vbi occurrit capiti rariori, quia ratione raritatis repletur caput, frigiditas densat, & etiam

est in causa, vt materia detenta aliquantulum putrescat, & ita fiat idonea ad vitam suscipiendum. Præterea sunt cibi prauī, vt esus fungorum, ficuum, &c. Intermisio solitæ lotionis capitis: euacuatio solita suppressa, vt suppressa cauteria; vel remissæ purgationes, quæ quotannis fieri solent. Est etiam exercitium à cibo, vnde caput crudis vaporibus repletur, & potiss. post coitum solent pediculi multiplicari, secundum Auicennam, quia præter illud exercitium, adest vapor ille spermaticus, qui conducit ad multiplicandos pediculos. Hoc animal producitur è virtute calidi viuidi, vnde concurrit etiam Sol: sicut enim Sol & homo generant hominem: ita Sol & aliquid proportionatum pediculis, generant pediculos.

Differētia.

Signa.

Indicationes.

Oritur pediculus è sanguine, pituita, vel melancholia, &c. Facile cognoscitur ex egressu, è colore, & è pgressa diætā. Geniti pediculi, sunt interficiendi. Si respiciemus ad nondum genitos, occurrendum causis: & ideo cōsiderare oportet succum vitiosum, qui vel actu reperitur in cute capitis, vel imminet vt reperiatur. Si actu adest, oritur indicatio euacuandi. Si imminet, vel est ratione capitis, vel aliarum partium. Si ratione capitis, si est humidius, est siccandum; si frigidius, calfaciendum, &c. Si vitio totius, vel aliarum partium, illis vitiis est occurrendum.

Prognostica.

Si pediculi orti sunt à commercio, & affectus nouus est, facile curatur: contra, si inueteratus, & si ortum ducit è cacochymia. Hinc Silla Dictator ex hoc affectu mortuus est: nam adest assidua illa afflictio, adest cacochymia in corpore: vigiliis continuis, propter illam afflictionem, intenditur cacochymia; & huius ratione vires dissoluuntur. Malignitas huius affectus, secundum Auicennam, elucet ex inappetentia, dum emaciantur homines, & color corporis vitiatur, dum abraduntur venæ.

Localia.

Medicamenta esse debent interficientia pediculos, & dissoluentia pediculorum materiam, de qua illi generantur. Interficientia pediculos, debent esse frigida, quia pediculi calido fouentur: debent esse sicca, quia humido aluntur: debent esse amara, quia dulcibus oblectantur. Ratione materiæ, quæ nutrit pediculos, debent medicamenta esse calida, & discutientia, exstirpantia, & euocantia à centro ad circumferentiam illos ichores semicorruptos, qui generant pediculos. Inde debent esse medicamenta inuicem permixta, quæ

quæ habeant contrarias vires. Plurima Galenus proponit c. 7. l. i. n. τόν. poriss. staphidem agriam, quæ pedicularis herba dicitur: semina huius herbe macerantur aceto acerrimo. Proponit etiã sandaracham, auripigmentum (sandaracha est auripigmentum magis costum:) Hæc applicanda sunt, si pediculi sint sub axillis, & circa pubem, & infernas partes. At si sint in mento & capillis, circa caput, non debemus his uti, quia sunt depilatoria. Sed aliis tuto uti possumus: ut sunt, radix oxylapathi, radix beta, quæ ratione nitrositatis confert, alumen rotundum, sal minerale, muria, aqua marina, fel tauri, oleum amygd. amar. abrotanum, absinthium, brassica, folia psica, & alia amara. Delicationibus ita præscribatur: R. rad. oxylapathi ℥j. oleum amygd. am. Decoquantur in s. q. aceti. Validius: R. aluminis rotundi ℥iiss. rad. beta ℥ss. felis taurini ℥ij. ol. amygd. amar. ℥j. Misc. fiat linimentum. Hoc approbatum in usu est: R. sem. staphidis agria ℥ij. infunde in aceto acerrimi ℥iiss. per noctem, deinde coletur, & locus inungatur. Est in usu etiam; hydrargyrum cum pomo cotto: & vnicæ vice depellit pediculos.

Causa.

CAPVT VII.

De differentiis interiorum Capitis affectuum.

Et primum de Capitis dolore.



EXPLICATIS affectibus capitis Externis: ad Interos deinceps nos vertemus: ut sunt, dolor capitis, phrenitis, lethargus, inelancholia, mania, læsa memoria, vertigo, catochus, incubus, epilepsia, apoplexia, carus, stupor, tremor, paralytis, conuulsio, somnus immoderatus, vigilie superflue, destillatio. Hæc vitia omnia pertinent ad functionem animalem, vnicæ destillatione excepta. Porro, quoniam actio animalis pertinet ad facultatem vel cognoscentem, vel mouentem; & si ad cognoscentem, vel non principalem, id est, ad tactricem: vel principalem, id est, imaginatricem, ratiocinatricem, & memoratricem: sciendum igitur, prædicta vitia, vel vnâ lædere actionem, vel plures, vel omnes; item, interdum cum inflammatione, interdum circa inflammationem; propterea, aliquando cum angustia, aliquando citra angustiam. Verbi gratia, dolor capitis ad tactum pertinet; mania ad principem facultatem; tremor ad motum voluntarium; stupor ad sen-

Transitio.

Collatio
affectuum
capitis in-
ternorum.

sum & motum; apoplexia & soporosi affectus ad omnes functiones: phrenitis & lethargus vitia sunt inflammatoria; epilepsia & melancholia carent inflammatione: tandem mania & melancholia sunt vitia citra angustiam; vertigo & epilepsia cum angustia.

*Methodus
in expli-
candis sin-
gulis affe-
ctibus in-
uenta per
analysin.*

In his autem tractandis vitiis septem capita explicabimus: nomen, definitionem, differentias, signa, præsidia, prognosticum, & tandem præsidiorum materias. Ratio huius ordinis est: quod medici finis est, morbum expugnare: expugnatur autem præsidiorum materiis. Num verò ad harum usum descendere oporteat, præscire oportet per prognosticum. Ad prognosticum necessaria est cognitio indicationū & præsidiorum: ut pateat, num ad illa accedendum sit præsidia. Sed quoniam indicatio sumitur à cognita essentia indicantis, & cognitio fit per signa, idcirco de signis etiam agendum. Quoniam autem indicans vtile & artificiosum indicat per essentiam specificam & determinatam, & hæc constituuntur à differentiis: iure de differentiis dicendum. Et cum utraque essentia specifica, & determinata, supponat essentiam genericam, ideo dicendum est de definitione: definitio autem rei, supponit etiam nominis definitionem. Huic insistentes methodo, internos deinceps capituli affectus persequemur.

De dolore Capitis: primumque de definitione, & causis.

Nomen.

Intelligimus hic dolorem, quo homo secundum caput in sensu cruciatur.

Doloris generatio.

Definitio autem ut pateat, primum oportet proponere modum, secundum quem generatur dolor. Ut enim dolor excitetur, necessarium est qualitatem tactilem, primam, vel secundam, occurrere corpori nervoso, inque id ea violentia agere, ut soluat continuum. Hæc solutio continui, quoniam agit, non quando facta est, sed dum fit; ideo sub ratione inotus euadit sensus obiectum commune, non proprium, sed impropportionatum; & ita agit in corpus nervosum, ut huius tum perceptio, tum affectio, corrumpatur: unde obiectum impropportionatum in instanti impertitum cerebro, à sensorio interno iudicatur dispropportionatum, & diuersum ab obiecto iucundo. Deprauata ergo est

est sensus interni actio : & hinc , ad differentiam voluptatis malæ, vis appetens : vnde emergit dolor , ceu affectio appetitus , contraria voluptati.

Hæc igitur doloris capitis esto definitio: quod sit sensatio corrupta, partium nervosarum capitis, dependens à solutione unitatis.

Pauca hic de definitionibus medicis dicenda. Definitum igitur, si est secundum naturam, in huius definitione finis proponi potest, qui habet rationem boni : at si definitum est præter naturam, finalis causa non proponitur: vnde & in cephalalgia definienda finis est omisus. Præterea in definienda substantia & accidente, duplex est discrimen: nam substantia per solam formam & materiam, sine causa efficiente de-

*Definitio
κεφαλalgias.*

Finis, quādo ponendus in definitionib.

finitur: accidens vero etiam per causam efficientem definiri oportet, si modo intellectus debet acquiescere : ratio est, quoniam substantia constat è materia & forma, cūque forma materiæ insit sine medio, sit vt & essentia & causa sit: contra in accidente, forma inest subiecto ope causæ efficientis, verbi gratia, priuatio luminis inest Lunæ, virtute interpositionis terræ inter Solem & Lunam : & hinc merito in definitione cephalalgias proposuimus causam efficiētem.

Quādo causa efficiens locum habet in definitionibus.

Alterum discrimen est, quod in definitione substantiæ, genus habet rationem materiæ, differentia formæ, quia hæc rei dat esse, contra in accidente, forma est genus, materia & efficiens differentia: cum enim accidens insit subiecto, ideo per subiectum vnum accidens ab alio distinguitur: & cum à causa efficiente, pendeat essentia accidentis, ideo hæc locum formæ tenet, vltimæque differentiæ.

Genus quādo formæ, & quando materia rationem habeat.

Quoad igitur formam capitis doloris, diximus κεφαλalgias esse sensationem corruptam : vt hinc intelligatur dolorem esse symptoma non morbum : & in genere læsæ actionis, ad differentiam symptomatū, quæ sunt exeuntia mutata, vel qualitates mutatæ. Diximus etiam dolorem esse actionem corruptam, ad differentiam actionis imminutæ & ablata. Cæterum, tria hic explicanda: primum, qua ratione dolor sit actio : deinde quomodo sit actio corrupta : tum quomodo actio corrupta sit forma doloris. Quoad primum: dolor & actio est & passio : dicitur enim passio, seu affectio, primum ratione corporis nervosi, nimirum membranarum cerebri, quæ suscipiunt obiectum dolorificum, & quidem receptione violenta : cum igitur omnis sensatio

Explicatur definitio κεφαλalgias.

Quomodo dolor sit actio, & passio.

posita

posita sit in affectione seu receptione, etiam dolor erit affectio. Deinde etiam dolor dicitur affectio ratione appetitus sensitui: (non enim est discordia inter philosophos & medicos:) qui in dolore non iudicat, non agit, sed male afficitur & patitur, quemadmodum bene afficitur in voluptate. Dolor autem est actio, quatenus positus est in iudicio, & quatenus pertinet ad cerebrum organum iudicans, à quo fit iudicium: non ad corpus neruosum, cuius sola est receptio, vt in methodo anatomica docuimus. Obiici autem potest è c. 75. artis medicæ, quod dolor omnino à læsa actione differat. Responsio. Galenus eo loci de actione tantum propria loquitur: vbi verum est, quod dolor non sit actio propria, sed communis tamen est, quod ibi non negatur: verbi gratia, delirium est actio propria capitis, dolor autem non est propria capitis actio, quia etiam ad alias partes spectat. Dicitur autem hæc actio corrupta, seu deprauata, non quatenus affectus dolorificus seu improporcionatus iudicatur, is enim recte iudicatur dolorificus: sed quatenus fit cum violentia. Ita, si fel admoueaturn lingue, & hæc amarum sentiat: in hoc non est error: sed quia fel agit cum violentia. Sic in cholericâ passione, ventriculi expulsio est deprauata: nam fit cum violentia. Explicandum denique restat, quomodo sensatio corrupta sit causa formalis. Dicimus igitur secundum medicos hoc verum esse, qui sunt artifices sensati, & respiciunt ad id, quod est in sensu, seu ad id quod indicat, cuius gratia medicamentis debent vti. Secundum philosophos vero sensatio corrupta potius habet rationem causæ efficientis: vnde philosophus cap. 4. lib. 10. Eth. statuit, dolorem esse affectionem, cuius affectionis causa efficiens, sit sensatio corrupta: nam in generatione doloris: (vt supra etiam docuimus:) postremo occurrit affectio appetitus sensitui: vnde philosophus lib. 2. de anima ait, vbi dolor & voluptas, ibi appetitus: & Hippocrates ait, qui dolent, dolorem tamen non sentiunt, his mens ægrotat: necessario igitur in dolore etiam afficitur sensorium internum. At medici, vt sensati artifices, pro forma accipiunt causam efficientem, præsertim spectantem ad receptionem obiecti dolorifici: si enim, verbi gratia, dolor fiat, è neruo pedis puncto, aut vulnerato, medicamenta pedi applicantur, non capiti, seu menti. Huc respiciens Galen. c. 2. 1. 2. de loc. aff. ait: dolorem esse tristem sensum, sicuti voluptas est sensus iucundus. In exquisito enim dolore nulla

prorsus

*Quomodo
dolor sit a-
ctio deprau-
ata.*

*Quomodo
doloris for-
ma, sit sen-
satio cor-
rupta.*

prorsus est voluptas: licet spurius dolor voluptatis sit particeps, non tamen eodem tempore, quemadmodum in dolore pruriginoso, seu mordicante, in quo primum est voluptas, mox tristis sensus. Hæc de causa formali dicta sint.

Subiectum doloris capitis, est corpus neruosum, c. 7. l. 12. *Subiectū.*
meth. c. 6. l. 3. de plac. c. 5. l. 7. de plac. c. 9. l. 3. de vsu part.

Huius autem doloris causa, dependet à solutione vnitatis: *Causa efficiens.*
qua dolor in sensu tactus, à dolore reliquorum sensuum distinguitur: cum enim in omni sensu & dolor sit & voluptas: (c. 3. l. de simp. diff. c. 6. l. 1. de simp. caus.) solus tamen dolor in sensu tactus sit à solutione vnitatis.

Per hanc etiam solutionem vnitatis, distinguitur dolor à grauitate, quæ etiam est sensatio corrupta partium neruosarum, sed citra solutionem continui, c. 1. l. 2. x. tēx. c. 5. l. 3. de loc. aff.

Continui ergo solutio est causa proxima doloris: (quia vnius effectus, vnicæ tantum est proxima causa:) vnde Hippocrates in l. de homine, vt Galenus refert c. 6. l. de rig. inquit, quando natura mutatur & corrumpitur, id est, vnitatis soluitur, dolorem accidere. Hæc solutio vnitatis, quatenus causa doloris dicitur, est obiectum tactus improporcionatum, & quidē obiectum commune: (nimirum motus violentus: vnde Auicē. veritate coactus, 3. coll. 1. ait, dolorem fieri cum solutione vnitatis, è malo motu:) & per se sensibile, quod propria ratione agit in sensum, ad differentiam sensibilis per accidens: non tamen potest hoc obiectum commune agere, sine proprio obiecto, id est, sine qualitate tactili, vel prima, vel secunda, ad differentiam proprii sensibilis, quod & per se agit, & sine motu. Porro hæc solutio vnitatis est realis, com. 34. l. 3. de fract. quamuis modo Euidens sit, modo Ratione contemplabilis, de qua postrema & Galenus loquitur, c. 6. l. de inæq. intemp.

Doloris proxima causa, est continui solutio.

Hæ ambæ vnitatis solutiones, id est, tam euidēs, quam ratione contemplabilis, differunt, & conueniunt. Cōueniunt quidem, quod neutra est morbus, sed tantum causa, vtraque enim est in fieri: siquidem Galenus c. 6. l. 1. de sym. caus. dicit, doloris causam esse in fieri, non in facto esse: vnde dolor, siue capiatur vt actio, siue vt passio, sit, quia facultas, vel iudicans, vel recipiens frustratur, ob errorem externum, id est, solutionem vnitatis, non ob morbum: sicut in passione cholericæ expultrix læditur ob errorem externum, id est ob causam morbificam. Differunt etiam prædictæ vnitatis solutiones, quia euidens degenerat in morbum. Solutio enim

Solutio continui dupl.

vnitatis

*Obiectum
proprium
concurrrens
in excitand
do dolore.*

*Doloriscan
se, vna im
mediata,
tres princi
pales.*

*Intemperies
est doloris
causa, qua
tenus ina
qualis.*

vnitatis quæ fit à gladio, & est in fieri, degenerat in solutam vnitatem, quæ in facto est, id est, in morbum, à quo tamen morbo nequaquã fit dolor. At continui solutio ratione contemplabilis, non mutatur in morbum: vnde Galenus ait, inflammationem citra vlcus, licet cum dolore sit coniuncta, non tamen esse morbum in soluta vnitatem. Quoniam autem solutio vnitatis dolorem excitat, quatenus est motus violentus, id est, obiectum cõmune, quod sine proprio agere nequit: sciendũ, necessario aliquod obiectum proprium concurrere: quod, si secundũ naturã est, sensum facit, si præter naturam, dolorem. In sensu igitur tactus, obiectum illud propriũ concurrrens cum motu, est qualitas tactilis, tum prima, calor, frigus, hum. siccitas: tum secũda, graue, leue, durũ, molle, lubricum, aridũ, asperum, leue, crassum, tenue, acutum, obtusum.

Licet ergo vna sit immediata doloris causa, nimirum solutio continui: tres tamen sunt causę principales, nim. copia, qualitas prima, qualitas secunda: à qualitate enim prima fit solutio vnitatis, ratione contemplabilis: à reliquis causis euidentibus fieri potest solutio continui. Proinde, cum Galenus ait, doloris causas esse intemperiem, & vnitatis solutionem, loquitur de causis principalibus, non autem de immediata, quam vnionis solutionem appellauimus. c. 1. l. 2. de ratione vict. acut. c. 7. l. 12. meth. c. 80. artis medicinalis. Præterea cum Galenus c. 12. l. 2. simp. ait, dolorem fieri ab intemperie, vel à cacoehymia, vel ab vtraque simul: non in genere ibi Galenus loquitur, sed ad mordicationem respicit, quæ producitur vel ab intemperie continentis, vt opus sit alteratione: vel ab intemperie & copia contenti, seu materiæ, vt non tantum alteratione, sed etiam vacuatione opus sit.

Intemperies in genere sumpta, potest esse causa doloris; quatenus est inæqualis, id est, prout partim est in fieri, partim in facto esse: dolor enim existit, dum fit mutatio, nondum est facta. Id tamen notandum, intemperiem inæqualem hic sumi ratione partis neruosa: nam id quod hunc inæqualem dyscrasiam producit, est intemperies in facto esse. Verbi gratia, bilis caliditas est in facto esse, sed agens in partẽ neruosam, afficit illam partem caliditate inæquali, vt vna portio sit magis calefacta, quam reliqua: sicut in musculi inflammatione est intemperies inæqualis. Intemperies igitur in genere est causa doloris, quatenus inæqualis existit.

Porro intemperies speciatim considerata, omnis potest dolorem

Dolorem excitare, siue composita sit, siue simplex: sola humiditas excipitur c.1. l.2. κ. τδπ. adeo enim hæc agit debili-
ter, vt vnitatem soluere nequeat: imo humiditas etiam vni-
tatem fouet. Obiicitur autem e. c. 1. l. de ratione vict. vbi ait
Gal. dolorem fieri, dum pars subito alteratur & simul, id est,
cum violentia: id quod ab humiditate quoque fieri posse Gal.
asserit. Respondeo violentam alterationem, à qualibet prima
qualitate fieri posse, & proinde etiam ab humiditate, verum
non sola, sed coniuncta, cū caliditate aut frigiditate. Eodē in-
que prorsus modo intelligendus est Galen. c.3. l. de inæq. in-
temp. vbi ait dolorē fieri, dum alteratur & corrumpitur na-
tura, id quod ab humiditate quoque fieri affirmat. Dolorem
quoque fieri ab humiditate, ait Galen. c.6. l.1. de natura hum.
vbi tamen loquitur de qualitate cum substantia, quæ copia
sua est causā doloris: ait enim dolorem fieri ab humido, dum
quis nimio potu repletur. Dolor ergo excitatur à calidita-
te, frigiditate, & siccitate: ab hac quidem remissus, ab illis
vero, quæ maximæ sunt actiuitatis, vehementissimus, c.1. l.
2. κ. τδπ. Calor dolorem excitat, quatenus fundit & liquat,
tanta violentia & immoderantia, vt soluatur continuum:
frigus autem, quatenus partem contrahit, condensat, astrin-
git, vt humidum exprimitur: vnde partes diuelluntur, vt
fiant spatia vacua, tum quia humor exprimitur, tum quia
mollis partis substantia contrahitur: vnde cum spatia fiant
vacua, non seruetur continuitas, dolorque oritur. Quoad
tempus, calidum citius agit, quam frigidū, quia promptius
penetrat. Siccitas moderatos facit dolores, cap.1. lib.2. κ. ςδπ.
quia enim minoris est actiuitatis, minori etiam cum vehe-
mentia continuum soluit. Cum ergo Galenus dicit, c.7. l.12.
meth. dolores vehementes fieri à sicco, non puram ibi in-
telligit qualitatem, sed materiam siccam. Siccitatem, ait
Auicennas, per accidens efficere dolorem: calor enim & fri-
gus, quia maximæ sunt actiuitatis, non solum continuum
soluunt, sed etiam sensum prauum imprimunt: siccitas ve-
ro, quæ minoris est actiuitatis, continuum quidem soluit, sed
violentum sensum non imprimit, quare per accidens, id
est, per solutionem vnitatis cauulat dolorem. l.1. fen.2. doc.2.
c.19. Et hinc Auerroes 3. coll. c.31. proponens dolorem, vt fit
ab intemperie, tanquam à causā essentiali, proponit calorem
& frigus, non siccitatem. Hæc de qualitatibus primis.

Secundam qualitatem Galenus & Auicennas exprimunt
per

*Qua in-
terius do-
lorem exci-
tare queat.
Obiectio de
humidita-
te.*

*Calor, vt
sit causa
doloris.
Vs frigus.*

Vs siccitas.

Cur secunda qualitas à Galeno ex-primatur per unitatis solutionem. per solutionem unitatis, non per durum, vel acutum, &c. si-
cut prima qualitas expressa est per cal. frigus, &c. Causa au-
tem huius discriminis est, quia dum dolor fit à calido vel fri-
gido: solutio unitatis est causa immediata, sed non principa-
lis: at, dum fit à secunda qualitate, solutio unitatis est causa
& immediata & essentialis: nam euidenter soluitur unitas:
nec pars dolens afficitur à secunda qualitate, vt à prima: pars
enim à caliditate dolorifica incalescit, à materia autem dura,

*Quādo se-
cunda qua-
litas fa-
ciat dolo-
rem.* dolorem inferente, non euadit dura. Porro non omnis se-
cunda qualitas potest esse causa doloris, sed illa tantum, quæ
potest soluere cōtinuum, vt durities, non mollities: hinc Ga-
lenus ait, fieri dolorem à causa erodente, excedente, quas-
sante, siccante, distendente, diuellente, rumpente, c. 2. l. 1. de
fac. natural. c. 6. l. 2. de caus. sym. c. 3. de inæq. intemp. cap. 7.
l. 12. meth.

*Causarum dolorifica-
rum consi-
deratio me-
dica.* Ut autem hæc omnia memoriæ mandari queant: causa
doloris perpendenda erit secundum Speciem, & secundum
Vitium speciei. Si secundum Speciem: causa est Interna vel
Externa. Interna est contentum: & potiss. vel Vapor, vel Mi-
nera: & minera, vel est Ichor, vel Humor: & humor, vel San-
guis, Pituita, Bilis, vel Melancholia: adhuc humor vel Ali-
qua doloris mentalis, vel excrementitius. Externa causa potissime ca-
pitur ab Assumendis, & Foris incidentibus: Assumenda, sunt
cibi, potiones, medicamenta, venena: Foris incidentia etiam

*Vitii spe-
ciei.* sunt medicamenta, venena, præterea lapides, ligna, &c. Vi-
tium speciei, quamuis esse possit secundum Substantiam,
& Substan-
tia vitii. Quantitatem, Qualitatem, & Vbi: hoc tamen in loco vitium
tantum petendum est à copia & qualitate. Vitium pertinens
ad substantiam, non est hoc in loco perpendendum: etsi enim
materia aliqua toto fit genere præter naturam, & proinde
peccet secundum substantiam, vt est virulentia Gallica, &
materia putrida: doloris tamen causa est per copiam, aut qua-
litatem, non per substantiam: sic verbi gratia, virulentia Gal-
lica dolorem excitat, non ratione formæ, sed quâlibet taci-
li secunda, nim. acrimonia. Illud interim non negamus, vi-
tium in substantia esse causam doloris intensioris. verbi gra-
tia, si dolor fiat à bile, lue venerea infecta, intensior erit do-
lor, quam à bile simplici, quia tunc caliditas, à qua fit do-
lor, est organum formæ magnæ actiuitatis, Quoad vitium,

in Quantitate, patet copiam esse doloris causam, vnde ple-
nitude quoad vasa, excitat dolorem, non quoad vires. Non
autem

autem vitium in copia est idem cum grauitate : nam & flatus copiosus vnitatem soluere potest, qui tamen grauitatis, est expers. Materia ergo copiosa soluit continuum, per tensionem, vel ruptionem, siue sit humor, siue flatus copiosus. Sed oritur dubium: cum enim solutio vnitatis in dolore, sit obiectum commune, itidemque copia & magnitudo sit obiectum commune, videri posset ex iis quæ diximus, commune sensibile sine proprio agere, quod est contra philosophos. Respondemus, quod materia peccans secundum quantitatem, necessario afficiatur prima qualitate: quæ si non est vitiosa, tantum sit sensus; si vitiosa, non modo sit sensus, sed sensus tristis. Notandum autem materiam copiosam efficere dolorem per tensionem & ruptionem si intrinseca sit materia; per contusionis modum, si extra est materia, cap. 2. l. 14. meth. Vitium secundum qualitatem, pertinet ad primam & secundam qualitatem. Ad primam, vt si materia est siccior: vnde Galenus c. 7. l. 12. meth. ait; distensionem fieri à materia, quæ copia, aut siccitate distendit; ideòque is dolor insignis est, cum fiat per distensionem; nam si aliter capietur siccitas, remissum potius efficit dolorem, vt supra diximus. Quoad secundam qualitatem: si materia sit intra corpus, causa doloris est, materia dura, grauis, acris; si autem externa est, etiam acuta materia. Excipitur scabrities, tenuitas, crassities. Nam scabrities, nisi cum duritiè sit coniuncta, non soluit continuum: aut duritiè iuncta, acerbioris doloris est causa; vt calculus asperior magis cruciat. Sic tenuitas non facit dolorem, nisi iungatur cum calore, acrimonia, vel aliis qualitatibus, quæ tunc citius & maiori agunt impetu. Sic crassities non nisi per grauitatem agit. Si materia sit externa, soluit continuum per duritiem, grauitatem, acrimoniam (vt fieri solet à caustico medicamento) sed præterea accedit acuties: hinc à materia graui & dura sit contusio, seu pressio; ab acri, erosio; ab acuta, incisio. Quoad motum: motus est vitium adiuuans, non principale, verbi gratia, bilis, habens impetum in caput, est doloris causa, non vt mouetur, sed vt peccat vel copia, vel qualitate.

Ex his concludendum; dolorem capitis esse sensationem corruptam partium neruolarum capitis: quæ sensatio corrupta pendet à solutione vnitatis; cuius causa efficiens peccat copia vel qualitate: & genita est vel in corpore, vel extra corpus: si in corpore, vel extra, vel intra caput; siue genere-

3. Quali-
tatis vitia.

4. Motus.

tur ob læsam facultatem, siue ob errorem externum.

De differentiis dolorum capitis.

*Differen-
tia.*

*I. Forma-
les differen-
tia, trium
generum.*

*Primo à
subiecto,
seu parte
dolente.*

- Hactenus de nomine & definitione τῆς κεφαλῆς: sequuntur differentia. Est autem distinctio doloris capitis sumenda ab essentia, id est, à definitione; nimirum à forma, à subiecto, & efficiente. Forma doloris est tristis sensatio: à qua nos in genere sumemus differentias, non doloris tantum capitis, sed & aliarum partium, è l. 2. de loc. aff. Tristis autem sensatio multiplex est, prout multiplex subiectum afficitur, & vario modo causa efficiens agit: ideoque necessario distinctio hæc sumitur, vel à subiecto, vel à causa efficiente, vel ab utroque. A subiecto dolor prodit Pungitiuus, Frangitiuus, Tensiuius, Laxatiuus, Grauatuius, aliquo modo Stupidus, & Pulsatiuus. Dolor pungitiuus dicitur, quia sentitur sensus punctorius: eiusque subiectum propriū est membrana; corpus nimirum densum & solidum; vt sic causa dolorifica adhæreat loco, qui minorem habet resistentiam.
2. Frangitiuus pertinet ad periostium, seu membranam ossi adhærentem: & hic dolor producitur à materia, quæ residet inter os & periostium, vt periostium rumpi, seu frangi videatur.
 3. Tensiuius, tractiuius, seu conuulsiuus proprius est nervorum & tendinum: fitque à causa cum replete, tum inani.
 4. Laxatiuus, diuulsiuus, seu laceratiuus, spectat ad carnem musculosam & nervosam: & producitur à materia, carnem extendente.
 5. Grauatuius spectat ad viscera, sensus exquisiti expertia, vt sunt renes, lien, hepar, pulmones, cerebrum: producitur à materia, quæ replet viscus ἀναισθητον, ita vt soluatur vnitas membranæ ambientis illud viscus; vnde
 6. dolor. Dolor veluti stupidus pertinet ad dētes, quorum substantia radios spiritus animalis admittit; & hic dolor fit ab
 7. acidis & astringentibus. Pulsatiuus pertinet ad arterias, quæ pulsant; non tamen dolent: nam dolor, seu doloris causa, est in partibus vicinis arteriarum, quæ pulsant vi inflammationis. Hæ sunt formales differentia; à subiecto desumptæ.

*Secundo à
specie cau-
sa effici-
tu.*

Si capiantur formales differentia; à causa efficiente: oportet causam efficientem perpendere secundum Speciem, & secundum Vitium speciei. Species est Vapor, vel Minera. Si vapor, fit dolor Expers grauitatis: si minera, fit dolor Particeps grauitatis. Si perpendatur causa efficiens secundum eius

eius vitium, quamuis solutio vnitatis fiat à quantitate & qualitate, non autem à motu & quiete: motus tamen & quies, vt coniunguntur cum vitio quantitatis vel qualitatis, sunt in causa vt dolor secundum formam differat: vnde differentie formales sumendæ sunt à quantitate, qualitate, & vbi. Quoad vitium secundum copiam, fit dolor Extensiuus, cum pars extenditur secundum profunditatem; vt vesica à lotio copioso. Vitium in qualitate, pertinet ad qualitatem primam vel secundam: in prima est vitium secundum caliditatē, frigus, siccitatem. Si secundum caliditatē, fit dolor Mordicatus, sed cum sensu caliditatis. Si secundum frigiditatem, oritur dolor Mordicatus, sed cum sensu frigoris, nisi vi frigiditatis, vel causæ refrigerantis, sensus vel imminuatur, vel auferatur: dolor enim fit, si causa refrigerans agat in partem, sed resistentem; quod si pars non resistat, non fit dolor, sed potius stupor, qui admodum improprie dicitur dolor stupefactius, cum potius sit remedium doloris, & via ad sensum ablatum, id est, ad paralyfin: fit autem dum frigus est intensum, & pars debilior, vt quamuis solvatur vnitatis, obiectum tamen hoc dolorificum, & solutio vnitatis sensorio iudicanti offerri nequeat. Si vitium est secundum siccitatem, fit dolor Exasperatus. Si causa efficiens peccet secundum qualitatem secundam: hæc qualitas est durities, grauitas, acrimonia, & acuties. Si peccatum sit secundum duritiem, fit dolor Compressius. Si secundum grauitatem, fit dolor cum sensu Grauitatis: vt hic dolor differat à dolore grauius, qui est proprius viscerum. Si secundum acrimoniam sit peccatum, fit dolor nomine carens, quem tamen vocare possumus Mordicatum, cum propensione ad scalptum. Si peccet secundum acutiem, fit dolor cum sensu Punctionis, vel incisionis. Si vitium sit secundum motum, fit dolor Turgidus, vel Errans, quæ sit à materia errante. Quod si materia quæ mouetur, sit dura, oritur dolor contusius: cuiusmodi oriri solet, dum calculus renalis mouetur in vesicam. Si vitium sit secundum quietem, fit dolor stabilis. Hæc sunt differentie formales, quæ sumuntur ab efficiente.

*A copia.**A qualitate.**A motu, & quiete.**Tertio à*

Si differentie formales simul capiantur & à subiecto, & à subiecto & causa efficiente: subiectum potest esse vel Totum corpus, causa efficiens vel Pars eius aliqua. Si totum corpus, dolor erit Lassitudinalis, seu Fatigatorius: cuius species sunt, dolor Tenuis & mul.

Inflatiuus, Vlcerosus, Extensiuus, Apostemosus seu inflammatorius. Hæ species conueniunt, quod omnes totum corpus respiciunt: differunt autem ratione causæ efficientis; nam dolor lasitudinalis, inflatiuus, producitur à vapore, à flatu; vlcerosus à materia acri; extensiuus à materia copiosa; inflammatorius à materia & copia & qualitate peccante. Si subiectum non sit totum, sed pars; hæc afficitur à causa peccante in quanto, vel quali, vel simul in quanto & quali. Si materia peccat secundum quantitatem: fit dolor Extensiuus, qui tamen extensiuus dolor est determinatus, ad differentiam doloris lasitudinalis. Si materia peccet in quali, & quidem sit calidior: fit dolor Mordicatiuus, cum sensu acrimoniæ, seu sensu vlceroso: est autem dolor cum sensu vlceroso, si materia acris agit in periostia, vt in lue venerea; si enim ea materia in cutim agat, oritur dolor pruriginosus. Si materia sit crassa, & affligatur etiam membrana crassa, cuiusmodi est crassities intestinorum; siquidem materia cum magno impetu agat, fit dolor Perforatiuus: si minori agat impetu, fit dolor Acualis Auicennæ dictus. Tandem si vitium sit & in quanto, & in quali, vt si materia sit copiosa & calidior: fit dolor Extensiuus inflammatorius, non lasitudinalis. Hæc de differentiis formalibus.

2. *Differentia à subiecto.*

A subiecto duobus modis accipi possunt differentiæ: primum, vt est subiectum causæ principalis ratione partis, quæ afficitur ab obiecto tactili: secundo, vt est subiectum affectionis, quæ fit pariter ab obiecto tactili. Si primo modo: subiectum est pars tum Neruosa, tum Experts neruositatis; quemadmodum est arteria, vena, cerebrum: ideo Galen. ca. 1. l. 1. c. 10. proponens differentias à subiecto, proponit etiam cerebrum. Si secundo modo capiatur subiectum: pertinet solum ad partem neruosam. Et sic facile intelligi potest Galenus loco citato. Præterea dolor pertinet vel ad Totum caput, vel ad Partem: & si ad partem, vel Dextram, vel Sinistram; vel Anteriorem, vel Posteriolem; vel Externam, vel internam. Vnde sciendum ad partem, tam internam, quam externam, pertinere membranas, neruos, arterias & venas: ad externam autem cutim & carnem: ad internam, cerebri substantiam.

3. *Differentia à causa efficiente.*

Restant differentiæ, quæ sumuntur à causa efficiente. Cum ergo dolor fiat à solutione vnitatis, & hæc soluatür à causa morbifica: perpendenda est hæc causa, vel secundum speciem,

speciem, vel secundum vitium. Secundum speciem, dolor fit à causa Interna, vel Externa. Interna est in corpore: & est Continens, vel Contentum. Contentum est Vapor, aut Minera: vapor quilibet esse potest: minera potest esse quilibet tum Ichor, tum Humor. Vitium causæ, est Copia, vel Qualitas, si qualitas, est Prima, vel Secunda: si prima, intemperies Simplex, vel Composita: si secunda, est durities, grauitas, acrimonia, & acuties.

Non autem dissentit à nobis Galenus, inter initia l. 2. *Affectio- nes sex, ob quas caput dolet: secundum Galenum.* ἡτόν. vbi sex tantum differentias seu species κατὰ διαφορὰς proponit. Prima est simplex qualitas, sine materia: altera est humorum qualitas: tertia, humorum copia: quarta est, dum humor transitum spirituum & liquorum prohibet: quinta, cum in parte propter imbecillitatem generantur flatu: sexta est causa externa. Et hæ differentię omnes propriam postulant curationem. Ratio autem horum sex ita potest elici. Dolor fit à causa externa & interna. Causa interna, id est, principalis est mediata, vel immediata. Immediata, est qualitas, vel quantitas. Quare hætenus duæ sunt differentię doloris. Qualitas porro pertinet, & ad partes similes, & ad humores. Si ad partes similes, oritur prima species doloris: si ad humores, oritur secunda, proposita à Galeno: si quantitas sit causa, oritur tertia species. Causa mediata pertinet & ad contenta, & continetia. Si ad contenta, oritur quarta species doloris, in qua humores prohibent transitum liquorum & vaporum: vnde liquores qui non possunt pertransire, sunt causæ immediatæ solutionis vnitatis: at humor prohibens transitum, est causa mediata, sed principalis: quia vbi medicus occurrit humori impediendi transitum, tunc humores transeunt, & non retinentur, sicut etiam vapores: ideoque tunc non fit solutio vnitatis, vel dolor. Si causa mediata pertineat ad continetia, oritur quinta doloris species, in qua generantur flatu, ob partis, & proinde continetis imbecillitatem: vnde flatu sunt causa proxima solutionis vnitatis: imbecillitas partis causa principalis: quia vbi occurrimus imbecillitati, non generatur flatu, nec soluitur vnitatis, neque dolor oritur. Causa externa, est sexta doloris species, à Galeno proposita.

De Signis.

Hæc de differentiis: sequuntur Signa. Primum ergo si in Signa.

Signa sub-
iecti.

Idem.

genere capiatur dolor, æger cum significat, dum de dolore conqueritur, nisi mens ægroter. Quoad signa differentiarum quæ à forma sumuntur; has differentias similiter patet facit æger, conqueritur enim modo de dolore pungitui, modo de frangitui, &c. Si differentia sumantur à subiecto, harum quædam significantur ab ægrotaute, verbi gratia, si conqueratur de dolore, vel secundum totum caput, vel secundum partem; eamque dextram vel sinistram, anteriorem vel posteriorem. Vtrum autem affecta sit pars interna, vel externa, sic cognoscitur, è c. r. l. 2. κ. 767. Si enim dolor accedit ad radices oculorum, afficitur pars interna; præsertim si per contactum non exacerbetur dolor: si contra, pars externa afficitur. Cæterum, particula affecta, aliæ sunt communes parti internæ & externæ: aliæ pertinent solum ad partes vel internas, vel externas. Particulæ communes sunt, membrana, nervi, artèriæ, & venæ. Membrana affecta cognoscitur è dolore pungitui: nervus, è tensui: arteria, è pulsui: venam affici, docent plenitudinis signa, de quibus alias, & præterea dolor extensius. Particula, quæ sedes occupant determinatas, sunt, cutis, caro, & cerebri substantia. Si cutis lædatur, cognoscitur, quia etiam leuem contactum ægre fert patiens: præterea caloris & coloris accedit mutatio. Si caro afficiatur, cognoscitur è dolore laxatiui, & præsertim è dolore, qui cruciat secundum frontem & tempora: nam in his partibus caro residet. Cerebrum læsum esse cognoscitur è dolore grauatiui.

Signa cau-
se efficien-
tiæ.

Causa ex-
terna.

Pars d'or-
gatos.

Vapor.

Minera.

Idem.

Sequuntur signa differentiarum, quæ sumuntur à causa efficiente. Causa efficiens perpenditur secundum speciem, & secundum vitium speciei. Quoad speciem: causa est interna, vel externa. Num externa causa sit prægressa, facile ægri vel astantes referre possunt. Causa interna, est continens, vel contentum. Si est pars continens, id est, si pars affecta est intemperie, cognoscitur, quia dolor non erit cum sensu grauitatis; præterea non erit dolor errans, seu turgidus; aderunt etiam signa huius vel illius partis, intemperie affectæ. Si causa sit contentum, opposita aderunt indicantia. Contentum potest esse vapor, vel minera. Vapor cognoscitur ex absentia grauitatis, è leuitate, è dolore tensui, & præterea è iuuamento dum flatus exeunt, adhuc è tinnitu aurium, è prægressis causis, quæ possunt flatus producere. Minera cognoscitur è grauitate, è causis quæ humores generare possunt,

sunt, è iuuamento, quod sequitur humoris euacuationem. Minere species sunt, sanguis, bilis, pituita, & melancholia. Si 1. sanguis sit causa, indicatur è signis plenitudinis, è dolore tē-
suo, rubedine, calore miti, è iuuamento, quod sequitur san-
guinis euacuationē. Bilis indicatur è dolore mordicatio, è 2.
vigiliis, excremētis amaris reiectis per os, è pallore, è calore
mordaci, è causis prægressis, quæ possunt bilē generare, tan-
dem è iuuamento, quod sequitur bilis euacuationē. Pituita 3.
indicatur è dolore, cū insigni grauitate, è somno, è pituitosis
excremētis, è faciei decoloratione, è calore remisso, è causis
prægressis, quæ potuerunt pituitam generare, è iuuamento
quod sequitur vacuationē pituitæ. Melancholia cognoscitur 4.
è dolore remisso, exasperatio, stabili, citra insignē grauita-
tem, è vigiliis, è carentia excrementorum, vel si sunt excre-
menta, sunt sicca, crassa, arida, nigricātia, indicatur præterea
è calore remisso, & colore obscuriore, è causis quæ melan-
choliā generare potuerunt, & è iuuamento, quod melan-
choliæ euacuationē sequitur. Signa quæ indicant vitia spe-
cierum, pertinent ad quantitatem, qualitatem, motū & quie-
tem. Copia cognoscitur è dolore extensiuo, è causis, quæ
copiosam materiam generare possunt. Verbi gratia, è ci-
bis pituitosis, in magna copia assumptis, indicatur pituita
copiosa, &c. Vitium in qualitate, est qualitas prima, vel se-
cunda. Prima, est intemperies simplex, vel composita. Sim-
plex est caliditas, frigiditas, siccitas. Caliditas igitur indica-
tur è dolore mordicatio, cum sensu caliditatis, calorifica
sunt prægressa, & refrigerantia iuuant. Quod si caliditas
est putrefactiua, indicatur è fœtore narium & oris, item è
febre: quando autem caliditas est organum luis venereæ,
signa assunt luis venereæ, de quibus suo loco. Frigiditas in-
dicatur è dolore mordicatio, cum sensu frigiditatis, causæ
refrigerantes sunt prægressæ, frigida nocent, calida iuuant.
Siccitas cognoscitur è dolore exasperatio, citra sensum ca-
loris vel frigoris, siccantia præcessere, & humida iuuant. Cō-
posita qualitas, indicatur è signis iam propositis, sed cōplica-
tis. Secunda qualitas est durities, grauitas, acrimonia, & acu-
ties. Durities cognoscitur è dolore compressiuo, prægressæ
sunt causæ magna violentia resoluentes, vel etiā prægressæ
sunt causæ refrigerantes & crassefacientes; quinetiam dolor
est cum sensu grauitatis, nec cedit medicamētis, quia est du-
rities. Acrimonia cognoscitur è dolore mordicatio, cum

*Quæ indi-
cans vitia
specierum.*

1.

2.

sensu caliditatis; itē e dolore vel vlceroso, vel pruriginoso, ē vigiliis, vel ex indiciis bilis. Grauitas indicatur ē dolore cū sensu punctionis. Vitium secundum motum cognoscitur ē dolore errante: vitium secundum quietem, ē dolore stabili.

3.

Indicātia

materia

morbifica

generatiō-

nem.

Num ma-

teria reti-

neatur in

capite per

detentio-

nem, vel

generatio-

nem.

Num caput

afficiatur

per idionā

tiōem, aut

consensu.

Idem.

Iam etiam cognoscendum est, num materia reperitur in capite, vel per detentionem, vel per generationem: & si per generationem, num generetur in capite, vel extra: si extra, num fluat in caput per transmissionem, vel receptionem; item, per motum vel criticum, vel symptomaticum. Detentio enim cognoscitur ex excrementis, non amplius ex euntibus. Vtrum autem causa detentionis sit error externus, vel morbus, sic cognoscitur: si enim sit error, praecessere, verbi gratia, copiosi cibi, potus copiosus, item altringentia, crasse facientia, siue sint esculenta, siue medicamenta. Si haec non sint praegressa, iudicare licet, detentionē prodire ē morbo: Et si morbus sit obstructio, cognoscitur, quia subito sit detentio; si intemperies, paulatim. Quoad generationem, cognoscere oportet, num materia generetur in capite, vel extra caput: id quod nihil est aliud, quam cognoscere, an dolor capitis sit per essentiam, vel per consensum. Non est dicendum (cap. ult. l. 2. de loc. aff.) sicuti aliqui dicunt, dolorem assiduū esse per essentiam; interpolatum, per consensum: hoc enim est falsum. Etenim dolor continuus potest esse per consensum, si semper materia extra caput genita, in caput euaporet: potest etiam per interualla dolor affligere, etiam si sit per essentiam, si nimirum per interualla materia generetur in capite. Quare cum Galeno alio modo dicendum, dolorem esse per essentiam, si nullum extra caput sit vitium, & sint iudicia capitis male affecti: per consensum autem, si nullus morbus sit in capite, sed extra caput, vnde & materia extra caput generatur. Porro, si vitium sit tam in capite, quam extra caput, per consensum tunc erit dolor, si morbus extra caput primo fuerit obortus, post morbus in capite: item si morbus extra caput sit intensior illo, qui est in capite: praeterea si capitis dolor ad incrementum & decrementum vitij extra caput augeatur & minuatur: si contra fiat, dolor est per essentiam. Cum autem materia fluat in caput vel attracta, vel transmissa: haec discernenda erunt. Attractio indicatur e caliditate capitis. Susceptio indicatur ex humiditate capitis, vel frigiditate. Rursus dignoscendum, num materia fluat per motum criticum, vel symptomaticū.

Criticus

Materia

attractio,

vel trans-

missio.

Criticus fluxus, cognoscitur è signis coctionis, è facili agrotantis tolerantia, e dolore qui non potest esse vehemens ratione facultatis. Motus symptomaticus cognoscitur è signis contrariis, id est, è cruditate, è mala tolerantia, è dolore qui potest esse vehemens, ratione facultatis.

*Materia
fluxus criti-
cus vel
symptoma-
ticus.*

De Scopis, seu Indicationibus.

Sequuntur indicationes: de quibus in genere hic agemus, quatenus cuiuslibet partis dolorem spectent. Supponemus autem præsidia, quæ requirit determinata cerebri proportio: & indicationes quæ capiuntur à virtute. Indicationes samuntur ab essentia: doloris autem essentia est tristis sensatio, procedens à causâ morbifica, soluentē continuum. Tristis sensatio, itemque causa adiuuans, indicant remedium anodynum, quod dolorem mitigat, non autem prohibet ne reuertantur: at causâ principalis indicat remedium sanans, prohibensque dolorem redire, ca. 18. lib. 3. simp. Cum autem tristis sensatio pertinere queat ad iudicium & receptonem: anodynum, causâ iudicij indicatur à vehementia sensorij iudicantis, id est, cerebri, quæ vehementia pertinet ad affectionem cerebri, productam ab obiecto tactus improporcionado. Cum ergo verè indicans, indicet contrarium in eodem genere, ut calidum indicat frigidum: patet quod in dolore affectio sensifica, indicet contraria affectionem sensificam, quæ tamen vim habeat vehementiorem (cum indicatum vehementius esse debeat indicante) ut tanta in sensorio indicante excitetur passio, quo affectio, præcedens, nimirum dolorifica, remittatur. Quod si organum iudicans ab affectione indicata magis afficitur, quam à dolorifica: etiam facultas iudicans ab eadem magis afficietur, & propterea derelinquet obiectum dolorificum, ceu id, quod minus agit in organum iudicans. Eodem enim modo fieri solet, ut fortibus imaginationibus detenti, non intueantur ea, quæ ante oculos feruntur; quia sensorium iudicans magis afficitur à fortibus imaginationibus, quam ab obiecto visus, ut sic obiectum visus, vincatur ab affectione organi imaginatricis. Constat igitur, quod indicans sit affectio sensifica præter naturam; eius subiectum, est organum iudicans, id est, cerebrum, & producit hanc affectio à motu dolorifico & vehementi: patet etiam, quod indicatum sit affe-

Indicationes.

1. *Anodynum præsidium.*

2. *Anodynum perti-
nens ad iudicium.*

*Obiectum
dolorificā
affectionē
obscurans,
seu iudi-
cium ane-
rens.
Proprium.*

ctio sensifca, organi iudicantis, quæ vehementior fit affe-
ctione indicante, & proinde ab obiecto vehementiori pro-
ducatur, quam sit obiectum dolorificum. Potest autem hoc
obiectum, quod affectionem dolorificam dissipat, tum iu-
cundum esse, tum iniucundum: iucundum, quatenus obie-
ctum: verbi gratia, dulce, mitigat dolorem: iniucundum,
quatenus dolor vehementior minorem sedat. Porro idem
obiectum potest esse Proprium, vel Commune. Proprium
pertinet ad quemlibet sensum: pertinet enim, verbi gratia,
ad visum, dum aspiciamus obiectum aliquod vehementer
vel iucundum, vel iniucundum: ad auditum, cum aliquid au-
dinus cum voluptate, vel cum dolore, ira, timore; neimpe si
quis verbis indignis reprehensus turbetur & irascatur; aut
si minis alicui metus iniiciatur: ad odoratum, dum olfactui
offertur aliquid vehementer iucundum, vel iniucundum:
ad gustum, dum quid gratum offertur, vt dulce: ad tactum,
dum occurrit obiectum solummodo iucundum, quod sen-
sorium tactus ea voluptate afficiat, vt iudicans sensorium
auertatur ab obiecto dolorifico: non autem in tactu locum
habet obiectum iniucundum, quia non potest in sensorio
iudicante imprimi affectio, quæ sit efficacior affectione do-
lorifica, nisi per vnitatis solutionem, & hinc per medium
obiectum commune. Obiectum commune, licet sit magni-
tudo, numerus, figura, motus & quies: potiss. tamen locum
habet figura & motus. Figura quidem, si per eam inprimat-
ur vel timor, vel voluptas: sicut voluptas imprimi solet è
figura rei amata. Motus etiam concurret in ratione iniu-
cundi, & tum causa doloris à motu sedari solet. Materia,
producens in sensorio iudicante affectionem, quæ sit vehe-
mentior dolorifica, potest esse cheirurgica, medicinalis, diæ-
terica. Cheirurgica est, dum scarificamus, dum administra-
mus ligaturas dolorificas. Medicinalis est, dum vtimur acri-
bus, in quibus est vis exulcerandi. Diæterica potest esse
simpliciter & medicinalis: simpliciter, vt sunt cibi & portio-
nes suaves, motus corporis mediocris, intuitus & auditio
rerum iucundarum, quæ ad animi accidentia reducuntur:
diæterica medicinalis, vt esculenta amara, visio & auditio
obectorum iucundorum. Ad tale igitur anodynum respi-
ciens Galenus, cap. 7. l. 1. de tuend. val. ait, infantium dolores
mitigari papilla nutricis ori indita, & motu mediocri, voce
cantuque suau.

*Materia
anertens
iudicium
in dolore.*

Anodynum, quod pertinet ad receptionem, quæ quantum fit in parte nervola, est duplex, Calidum, & Frigidum, c. 18. l. 5. simp. Calidum reuera & propriè est anodynum, estque calidum in eo gradu, in quo est caliditas corporis patientis, quemadmodum etiam suppurans, unde est calidum & humidum, sed non in vno tantum gradu, verum modo temperatum, modo temperato calidius, prout est corpus patientis. Est præterea hoc anodynum emplasticum & viscidum, vt poris occlusis, halituosi spiritus detineantur, conserueturque & temperamentum corporis patientis, & substantia, quantitasque calidi innati. Indicatur hoc anodynum à calore naturali, & temperamento partis: dum enim hæc seruantur, seruat etiam virtus robusta, vt citra noxam tristem illam sensationem possit fugare, quo mitior euadat dolor. Est ergo hoc anodynum indicatum vitale, quia indicatio fit à simili, & sic fit conseruatio. Frigidum anodynum, non reuera, sed tantum secundum dici est anodynum, quia partem quasi sensu priuat, & stupore afficit. Frigidum ergo hoc necessario indicatur à calido, quod est organum tactus: nam quo pars calidior, eo etiam sensum habet magis exquisitum. Proinde ne obiectum violentia sua afficiat partem nervosam: oportet remouere naturalem caliditatem partis nervosæ, quæ caliditas naturalis, rationem habens causæ morbi, indicat frigidum vehemens, quod dum applicatur parti affectæ nervosæ, inhibeat receptionem obiecti disproportionati: vel etiam dum assumitur, refrigeret organum tum recipiens, tum iudicans: nam opium exhibitum, non tantum agit in partem recipientem, sed etiam in cerebrum iudicans. Est ergo medicamentum hoc frigidum materia præsidij, indicati à calore naturali, & temperatura organi, tum recipientis, tum iudicantis.

Anodynum, quod indicatur à causa adiuuante (c. 18. l. 5. 3. Anodynum, simp.) est calidum in primo, & tenuis substantiæ, vacuans, indigerens, rarefaciens, concoquens, reddens æquabilem materiam illam, quæ reperitur in parte dolente, siue sit humor, siue flatus: & si humor, siue copiosus, siue acris, siue lentus, siue crassus: & si spiritus seu flatus, siue crassus, siue frigidus. Anodynum ergo calidius esse oportet temperamento: & indicatur ab humore, vel vapore, qui causæ sunt doloris non principales, sed adiuuantes: potest enim dolor fieri à sanguine, tanquam à causa principali, interimque etiam fieri potest, vt vapor

2. Anodynum perti-
nens ad re-
ceptionem.
Calidum.

Frigidum,
& vacuans.

3. Anodynum, indi-
catis à cau-
sa adiu-
uante.

vapor vel humor parti dolenti adhæreat, quorum vi dolor augeatur. Sedatur ergo hic dolor, dum hæc materiæ vacuantur & attemperantur, cutisque densitas rarefit: quod consequimur anodyno calido in primo, & tenuis substantiæ. Hæc de anodynis, quæ dolorem mitigant: quæ tamen non sunt sanantia, quia non prohibent doloris reditum, nec diriguntur ad causam principalem, verbi gratia, ad sanguinem, dum hic est causa principalis.

II. Præsidium sanans, quod indicatur a causa principali: eius nimirum.
1. Specie.

Præsidium sanans est, quod causam doloris aufert, ita ut non amplius reuertatur. Indicatur autem à causa principali, quæ consideranda est secundum speciem, & secundum speciei vitium. Quoad speciem, causa est Externa, vel Interna. Ab externa causa non sumitur indicatio: licet capiatur indicatio ab affectu, quem causa externa produxit, verbi gratia, in dolore à Solis ardore, oritur indicatio refrigerandi partem calefactam, &c. A causa interna determinata sumitur indicatio: (ad differentiam genericæ, & specificæ: siue causa interna sit continens, siue contentum, verbi gratia, si causa sit sanguis, sanguinis vitium est adimendum, si pituita, pituitæ, &c. Quoad vitium speciei, ab hoc vitio generico, generica sumitur indicatio, à vitio specifico specifica, à determinato determinata. Verbi gratia, si dolor fiat à sanguine, sanguinis vitium in genere, ut est sanguis præter naturam, indicat remedium remouens. Si perpendamus sanguinis vitium specificum, ut verbi gratia, peccat in quanto, indicat remedium remouens, quod contrahitur, & fit specificum minuens, ad differentiam alterantis. Si denique perpendamus sanguinem peccantem in quantitate determinata, verbi gratia, ad libram, indicatur remedium determinatum, minuens ad libram. Vitium ergo speciei, vel pertinet ad causam principalem, vel ad causam causæ principalis. Quoad causam principalem, licet huius vitium tantum pertineat ad copiam & qualitatem: quia tamen hæc ipsa vitia connectantur cum substantia, motu, & quiete: ob id indicationes sumendæ sunt à quolibet vitio. Si igitur vitium sit secundum substantiam, oritur indicatio eradicandi: si secundum copiam, minuendi: si secundum qualitatem, alterandi per contrarium: si vitium sit secundum motum, si quidem hic sit criticus, non est prohibendus: & propterea in febricitantibus reprimentia capiti applicata nocent, ubi dolor est criticus: si autem motus non sit criticus, inhibendus: Modus autem

2. Vitio speciei.

autem inhibitionis varius est: fieri enim potest, per attractionem, impulsione, vel interceptionem: si vitium sit secundum quietem, indicatur remedium discutiens, seu minuens. Causa autem, quæ auctor est causæ principalis, est mēbrum generans: vt, si gignit per intemperiem, oritur indicatio alterandi. Verbi gratia, si dolor capitis fiat à pituita, genita in ventriculo frigidiori, indicatur remedium calefaciens ventriculum. Hæc de indicationibus. Vbi notandum, Platonem *Cur vacuatum nō sit* & omnes medicos, recte statuere, non esse alterandum, nisi *si illa mem-* prius vacuatum sit corpus; nos tamen, licet hæc non propo- *lio.* fuerimus, accusari non possumus: quia tantum loquimur de quid agendo, non autem de quando agendo.

De Prognosticis.

VT autem sciamus, num ad præsidiorum materias descendere debeamus: considerare nos oportet Prognosticum: *Prognostica.* quod non aliunde petitur, quam è victoria vel virtutis, vel rerum præter naturam. Virtus generalem quendam discursum postulat, omnibus vitiiis applicabilem, de quo alias dicemus. In præsentia autem tantum digrediemur circa res præter naturam, id est, circa tristem sensationem, & circa causas effeëtrices principales: in quibus cōsiderabimus, num sint vehementes, ratione essentia, dignitatis, vel facultatis. Quantum igitur ad tristem sensationem in dolore capitis, *1. à dolore.* non est insignis vehemētia ratione essentia, nec enim quisquam ob capitis dolorem mortuus est, aut seipsum interfecit, sicut euenire consuevit in dolore colico, in dolore aurium, oculorum, dentium, quia capitis partes sensum obtinent minus exquisitum: Galen. c. 1. l. 2. π. 76π. Licet autem capitis dolor non sit vehementissimus: aliqua tamen è parte est vehemens, & propterea quo est vehementior: (habet enim latitudinem quandam:) eo magis sit periculosus. Quoad vehementiam dignitatis, dolor est vehementior, si afficiatur pars interna, quam si externa: imo interna parte affecta, tanta est vehementia ratione dignitatis, vt imminet phrenitis, lethargus, apoplexia, cæcitas. Quantum ad vehementiam ratione facultatis, exigua est vehementia, si ægrotantes leuiter ferant dolores, nec vitia periculosa sint annexa: contra, dolor est vehemens ratione facultatis, si patiens difficulter tolleret dolorem, si oboriatur animi deliquium, si vigi

2. *A dolore.*

Secundum speciem:

Secundum vitium.

si vigiliae sint pertinaces, si annectatur delirium, Haec de dolore: sequitur causa efficiens, in qua oportet perpendere vehementiam & secundum speciem, & secundum speciei vitium. Quoad speciem, causa est externa, vel interna de quibus non statuendum, vnam semper magis vel minus esse periculosa: Fieri enim potest, ut dolor producat a causa externa, qui tamen summe sit periculosus, ut dolor a magno ictu factus, magis est periculosus, quam si fiat a pituita dulci. Quandoque contingit oppositum, exempli gratia, dolor factus a bile insigniter putrescente, est periculosior, quam si fiat a Solis ardore. Quare necessarium est, ut cuiuslibet causae vehementia perpendatur. Interna igitur causa, est intemperies, vel materia: materia, est vapor, vel minera: minera, est sanguis, bilis, pituita, vel melancholia. Facilius quidem occurri potest sanguini & bili, quam pituitae & melancholiae: tamen, ut vitium est vehementius, pro eo periculum intenditur. Verbi gratia, dolor qui producit a sanguine putrescente, est periculosior, quam si fiat a pituita dulci. Breuiter ergo dicendum de vitiis cuiuslibet speciei. Et primum quoad vitium continētis, id est, partis similis, quod vitium est qualitas, nimirum intemperies: haec est Simplex, vel Composita: simplex, est calida, frigida, sicca. Si igitur in his dyscrasiis reliqua sint paria, calida magis est periculosa, quia frigidis tollenda est, quae non agunt citra noxam: sicca autem difficilius est curationis, quia pertinaciter siccitas resistit humido. Si non seruetur paritas, magis periculosus est dolor, qui est vehemens, secundum essentiam, dignitatem & facultatem. Verbi gratia, si frigiditas sit in habitu, si pertineat ad cerebrum, si denique officiat coctioni ipsius cerebri. Contentorum vitium pertinet ad formam, quantitatem, qualitatem, & ubi: ac proinde quo vitium est vehementius, eo dolor est periculosior, verbi gratia, si dolor fiat a materia corrupta, venefica, admodum copiosa, acris, viscida, crassa, impacta: item ratione dignitatis, a materia occupante cerebrum: tandem si ratione vehementiae facultatis, assint vigiliae, imminuat animi deliquium. Quoad causam externam, similiter pro huius vehementia statuere oportet. Exempli gratia, si dolor fiat ab insigni contusione, ut consequatur delirium, succedat vomitus, quia triplex adest vehementia, dolor est admodum periculosus: contra, si causa externa sit debilis, secundum propositas vehementias.

De curationis parte, qua manus fit opera.

Quoad materias Cheirurgicas agendum est de Venæ-
sectione, de hirudinibus, de cucurbitulis, de frictionibus, de
ligaturis, de foniculis & vesicatoriis.

Vena in eo capitis dolore secanda est, in quo sanguis habet *Venæ sectio.*
rationem causæ principalis, vel sine qua non: dummodo vir-
tus & in præsentia, & in futurum ita possit esse robusta, ut
phlebotomiam perferat. Quoad rectam administrationem: 1.
si dolor sit vehementior, in quo sanguinis actio est summa,
unica vice tantum sanguinis emittendum, quantum sufficit,
si virtus sit robusta: si secus, partiri detractionem oportet.
Hinc in dolore à sanguine, si imminet inflammatio, & vi-
tium maximi momenti, & proinde sanguis sit summæ acti-
uitatis unica vice sanguis euacuandus. De modo: prout san- 2.
guis est tenuior vel crassior, pro eo foramen modo angu-
stius, modo amplius est faciendum. Quando agendum: Si 3.
sanguis præsens est vehementior aliis indicantibus, est in
causa, ut ilico aperiatur vena, citra moram: si contra, pri-
mum licet medicamentum exhibere, mox venam secare.
Quoad ubi agendum: pro sanguinis varia subsistentia, variæ 4.
venæ secandæ. Si enim sanguis euacuandus sit in capite, ve-
na capitis tundenda: sique dolor occupet partem capitis po-
steriorem, vena frontis est aperienda, per quam fit & eua-
cuatio & reuulsio. Si sanguis euacuandus sit infra caput: tum
sanguinis subsistentia pertinet ad locos vel supra renes, vel
infra renes: si supra, aperienda basilica: si infra, venæ cru-
rum tundendæ. Si sanguis euacuandus subsistat partim in
capite, partim infra caput: tunc, si magis potest sanguis in
capite existens, aperienda est cephalica: si magis potest san-
guis extra caput, aperienda est cubiti vena media, vel cepha-
lica: (non basilica:) per quas vacuatur sanguis existens in
capite, & extra caput, quauis per cephalicam euacuetur
magis caput quam thorax. Porro sanguis infra caput, modo
pertinet magis ad dextram partem, modo ad sinistram: &
hinc cubiti pedumque venæ secandæ, modo dextræ: modo
sinistræ, dextræ, si dolor sit in dextera parte, & similiter. Quo *Arteriari*
ad sectionem arteriarum, cum non reperiantur, qui audeant *sectio.*
secare: ne ægri prorsus deserantur, optimum est occurrere
medicamentis siccantibus & astringentibus arterias, ut in-
hibeatur fluxus, de quibus medicamentis suo loco.

Hirudines

Hirudines.

Hirudines sanguinem vacuant, minus vehementer, quam venę sectio. Prout autem actio sanguinis indicantis est vehementior, pro eo etiam oportet hirudinibus vti vicibus paucioribus: nam prima statim vice euacuabitur sanguis copiosus, si insignis erit actio. Quoad modum, si sanguis euacuandus erit crassior: prius aqua tepida locus diutius foueri debet, vt sanguis fundatur, cedat, & egrediatur. Tempus vtendi est, dum sanguis indicans, sua pręsentia vincit alia indicantia. Verbi gratia, hirudines sunt applicandę capiti, per sectionem venę cubiti. Quoad vbi: pro varia subsistentia sanguinis, variis etiam locis applicandę sunt hirudines: nimirum cruribus, hæmorrhoidibus, brachiis, post aures, temporibus, fronti, & naribus: nam & Galenus in dolore capitis antiquo narium venas aperiebat. c. 2. l. 2. x. rōx.

Cucurbitula scarificata.

Cucurbitulę scarificatę, vel sunt materia principalis: dum indicans non admodum est vehemens: vel non principalis, dum sanguis vehementer peccans est euacuandus, virtusque interim materiam principalem, id est, venę sectionem prohibet. Pręterea cucurbitulę scarificatę sunt materia remedij anodynij, ratione iudicij: causant enim dolorem, vt sic dolor dolorem sedet. Quoad vsum: si sanguinis actio sit vehementior, applicandę plures cucurbitulę, & ea vice sapius sunt repetendę, vt sanguis insignis actiuitatis vnica vice euacuetur. De modo: si sanguis ægre exeat, propter crassitiem: oportet foramina esse laxiora, & scarificationem profundiorē. De quando & vbi, idem dicendum, quod de Hirudinibus diximus.

Cucurbitula non scarificata.

Non scarificatę cucurbitulę, vacuant tum Sensibiliter, tum Insensibiliter. Sensibiliter, dum, verbi gratia, post sectam venam frontis, vel post hirudines admotas, cucurbitula applicatur, sine scarificatione, vt adiuuet venę sectionem & hirudines, sanguinemque non egredientem educat. Sed hæc doctrina est extra methodum medendi: nam hoc in loco indicās est venę sectio, vt est debilis, &c. Proinde si hoc modo sumatur cucurbitula: nō est, cur eius vsus proponatur. Insensibiliter vacuantes cucurbitulę non scarificatę, vires habēt varias. Excitant enim dolorem, & ea ratione, sunt materia remedij anodynij, ratione iudicij. Pręterea, quatenus vel reuellendo, vel deriuando, commouent naturam morificam, id est, vaporem, vel mineram, sunt materia remedij non anodynij, sed indicantur à causa principali, & sine qua non. *Vsus harum*

harum cucurbitularum præscribi debet e consequentibus vehementiam, tum tristis sensationis, ratione iudicij, tum vaporis, tum mineræ; siue sint causæ principales, vel sine quibus non: quemadmodum dictum est de cucurbitulis scarificatis. Verbi gratia, si cucurbitula vsurpetur causa iudicij dolorifici; vt dolor maioris erit actiuitatis, ita maior probatur cucurbitula; à maiore enim dolor excitatur vehementior, qui minorem remittit. Prout etiam maior est dolor, pro eo cucurbitula maiori cum flamma est administranda. Præterea eo tempore est applicanda, quo tristis sensatio, seu affectio illa sensifica, est vehementior aliis indicantibus. Tandem cucurbitula adhibenda est partim qua subsistit vis, cuius causa sit receptio: vt propterea sit applicanda parti nervosæ.

Frictiones, & Ligaturæ, quamuis possint reuellere deri- *Frictiones*
uareque materiam cum principalem, tum sine qua non; ta- *Or ligatu-*
men quatenus hæc materiæ sunt dolorificæ, id est, vehemen- *ra.*
tes, sunt materia anodynæ, ratione iudicij: probantur ergo satis vehementes. In vsu, omnia obseruanda, quæ de cucurbitulis diximus.

Fonticulus est vlcus, quod fit à causa comburente, vel *Fonticuli.*
igneæ, actu aut potentia: producitque per mediam cru-
stam, seu escharam, qua decidente, vlcus fit cauum, cum cu-
tis amissione, vt egrediatur materia morbifica, quæ & susci-
pitur, propter imbecillitatem, & quandoque attrahitur pro-
pter dolorem, si nimirum fonticulus est cum dolore. Est
ergo fonticulus materia remedij siccantis, indicati à causa
principali, & sine qua non. *De usu.* Prout materia morbifica
est maioris actiuitatis; ita fonticuli & maiores, & plures
fieri possunt. *Quomodo:* vt causa morbifica minus cedit; pro
eo etiam fonticulus est efficiendus, vt non modo cutis ab-
sumatur, sed etiam caro; & sic aliquando vsque ad ossa fon-
ticulus est perducendus, *Quando:* vt materia morbifica præ-
sens vincit alia indicantia; ita eo tempore vsurpandi fonticuli.
Interdum ergo diutius sunt seruandi, imo quandoque
toto vitæ tempore, ob præsentiam materiæ morbificæ. *Vbi:*
pro varia subsistentia materiæ morbificæ, fonticuli sunt
inurendi, modo in capite, modo infra caput; & si infra caput,
modo sub occipitio, modo artubus. Variat tamen locus ad-
ministrandi fonticulos in dolore capitis, prout materia
morbifica, vel est vacuanda, vel reuellenda, vel deriuanda. Si

simpliciter est materia vacuanda, administratur fonticulus futuræ coronali. Si materia sit reuellenda, infigitur artubus inferioribus, id est, cruribus, femoribus. Si materia sit deriuanda, id est vacuanda, & reuellenda (nam hanc esse deriuationis naturam, in cap. de phrenitide docebimus) si quidem magis videatur vacuanda, oportet inurere locum infra occipitium: si magis sit reuellenda, inurêdæ spatulæ; & si adhuc magis videatur vacuanda materia, brachium inurendum: ratio est; nam quo propior fonticulus est capiti, eo promptius materiam suscipit. Porro in loco, cui applicatur fonticulus, virtus est perpendenda: si enim pars alias vulnere fuerit affecta, si doleat, si plus iusto sit emaciata, signum est imbecillitatis, & virtutis prohibentis fonticulos: ita, si in hydropico tumida appareant crura, non debent fonticuli applicari cruribus, quia virtus ita prohibet, vt æger moreretur, si applicarentur.

Vesicatorium.

Vesicatorium est vlcus, cum amissione cuticulæ, productum à materia acri & mordaci, quæ cuticulam penetrat, & hanc acute separat, vt exciteretur vesica, quæ remota permanet vlcus: vnde pars hoc vlcere affecta, attrahit propter caliditatem & dolorem, recipitque propter imbecillitatem. Vesicatorium igitur, prout dolorificum, est materia anodynæ, ratione indicij: prout autem habet vim calefaciendi & exulcerandi partem, est materia remedij sanantis; quia ratione caliditatis & doloris fit attractio materiæ morbificæ; ratione imbecillitatis, fit eiusdem receptio; vesicatorium

Quomodo differat vesicatorium à fonticulo.

enim partem reddit debilem. Differentia autem est inter vesicatorium & fonticulum: nam vesicatorium citius agit, quia citius dissoluitur vesica, quam eschara: & proinde dum materia morbifica euacuanda est maligna, quæ celerrime est educenda, magis probantur vesicatoria, quam fonticuli.

Materia vesicatorij.

Materiæ autem e quibus fit vesicatorium, sunt acres: vt cantharides, sinapi, euphorbium, fermentum, acetum scilliticum, flammula loui, batrachii, ranunculæ, allium, &c. Verbi gratia, *℞ canthar. præparat. ʒ iij. sinapi ʒ ss. fermenti ʒ ij. aceti scillitici parum. fiat pasta pro vesicatorio.* Hæc tamen pertinent ad me-

Usus vesicatoriorum.

thodum componendi, non ad inediendi methodum. De usu: Prout affectio organi iudicantis, & actio materiæ morbificæ erit vehemens; pro eo & maiora & plura erunt adhibenda vesicatoria. *Quomodo.* Prout maior est resistentia & affectio, nis propositæ, & materiæ morbificæ; pro eo, vel parum detinendum

tinendum est vesicatorium, vt solum absumatur cuticula; vel diutius, vt etiam cutis absumatur. *Quando.* Vsurpanda sunt vesicatoria, dum indicans hoc dominatur reliquis indicantibus; imo, perseverante presentia indicantis, quandoque longiori tempore sunt seruanda. Solent autem conseruari beneficio cerati sacri, beneficio diachylon simplicis, vel cum gummi; errant enim qui semper vtuntur cerato diapalma. Vbi agendum sumitur à substantia indicantis, quemadmodum in fonticulis dictum. Id tamen notandum, virtutem partis robustiorem requiri in fonticulis, quam in vesicatoriis. Cæterum Galenus cap. 1. lib. 4. x. ræx. dum emplastro vtitur, pilos deradit, vel pro inunctionibus, breuiiores reddit, vt medicamenta efficacius operentur. Nos tamen huius deraſionis pilorum non meminimus: quia hæc materia cheirurgica, est extra methodum medendi, & pertinet ad materiam secundam: nam pilorum remotio respicit medicamenti applicandi imbecillitatem, non respicit corpus nostrum; pili enim impediunt operationem medicamenti: vnde id quod indicat, non est in corpore, sed est ceratum, &c.

Deraſio pilorum.

De curatione per medicamenta.

Materia medicinalis in capitis dolore est triplex. 1. Materia remedij anodynæ. 2. Materia remedij sanantis. 3. Materia remedij requisiti à proportionem cerebri. Materia igitur remedij anodynæ, respicit, vel iudicium, vel violentam receptionem, vel causam adiuuantem. Anodynum ratione iudicij est duplex, vel est enim dolorificum, vehementius affectione sensifica vel dirigitur ad sensorium diiudicans, vt eius caliditas naturalis veluti exstinguatur. Dolorificum est, si aliquod acre medicamentum parti applicetur, quod eam exulceret, vt *veratrum album vel nigrum, cantharides, summula iouis, colocynthi, euphorbium, scammonium, sinapi, piper, Zinziber, & alia dolerifica*: his enim dolor extra caput excitatur, vt capitis dolor mitigetur. Vnde notandum, cantharides, verbi gratia, esse materiam remedij indicati in methodo medendi, dum iis vtimur ad excitandum dolorem; sunt enim tunc materia remedij indicati ab affectione organi iudicantis: dum autem iisdem vtimur, ad efficiendum vesicatorium, cantharides sunt extra methodum

Pharmaceutica.

1. Anodynum.

Anodynum ratione iudicij.

Dolorificum.

- medendi. *Vsus* est euentissimus è superius traditis. Illud saltem notetur, parti exulcerandæ adimouendos esse pulueres propositorum medicamentorum, ad $\text{3 } \beta$. & dum capitis dolor sedatur, excitatum iam dolorem extra caput, rursus adimendum esse butyro.

Soporiferas & opiatas. Medicamentum autem quod natium calorem sensorij iudicantis dissipat, est soporiferum: vt succus lactuæ, nymphae, solani, mandragora, capita papaueris, opium, magna antidoti, philonium Roman, diaspermation, requies Nicol, pilula de cynoglossa. Opium tutius datur in medicamentis compositis: vis enim opij, & fermentationis, & calidorum medicamentorum vi minuitur; vnde misceri cum opio debet, crocus, castoreum,

Quando vti possimus opiatas. *Or.* Galenus cap. 1. lib. 2. α . $\rho\omicron\tau$. improbare videtur opiata: quia dolor capitis secundum essentiam non est admodum vehemens: paullo tamen post, in dolore à bile, probat pastillum opiatum. Auicennas quoque cap. 10. & 19. eadem probat. Responsio: si vehementia κεφαλαλγίας, consideretur secundum essentiam, non probantur opiata; at si capiatur secundum facultatem, dolor ita vehemens esse potest, vt opiatis vti cogamur: si nimirum dolor à causa calida oriatur, vnde vigiliæ existunt, quæ vehementer deliciunt vires; vnde vtendum opiatis, quæ torporem inducunt, & bilem refrigerant. De vsu opiatorum. Prout maior est actiuitas indicantis, pro eo dosis opiati augeri debet, dummodo virtus ferat: vnde in insigni dolore, licet exhibere $\text{3 } j$. vel α β . Philonij Rom. id quod virtus perferre solet in capite calido, in corpore temperamenti calidioris, in florida ætate, in dolore recenti: (nam in antiquo vires languent.) Si virtus sit debilis, minuenda est dosis, vt sufficiat exhibere à $\text{3 } \beta$. ad gr. xv. *Quomodo.* Opiata non debet actu frigida administrari, sed calida vel tepida. *Quando.* Debemus autem ea vtī, cum indicans superat reliqua indicantia. Post vsurpationem vero opiata, secundum Galenum loco citato applicari debent calorifica, vt anethum, cinnamomum, &c. quæ corrigunt nocuentum, quod ab opiato potest excitari. *Vbi agendum,* indicatur à subsistentia indicantis: cum ergo materia in capite subsistere queat, opiata administranda per os, applicanda naribus, fronti, &c. Notandum tamen melius esse, vt opiata applicentur, quam vt exhibeantur, nam exhibita nocent hepati & ventriculo: præterea tutius applicantur fronti, quam suture coronali, vel parti capitis posteriori, quoniam virtus talia frigida

gida non sustinet: oxyrrhodina tamen coronali suturæ possunt applicari.

Anodynum causa receptionis, est calidum & frigidum. De frigido nihil dicemus: quia eius materia iam est proposita, nimirum soporifera medicamenta & opiata; quæ ratione iudicij, agunt in cerebrum iudicans; ratione receptionis, agunt in partem nervosam, cuius unitas soluitur. Porro, calidum oportet esse simile corpori affecto, & emplasticum. Huius remedij materia proponitur cap. 8. lib. 5. simp. nim. *hyarelaum, farina tritici, panis à tritico modice coctus, adeps porcinus, butyrum, lac bubulum, caprillum, ouillum, amygdala dulces, mucilago ualua, omenta animalium pinguium.* V s v s. Pro maiori molestia receptionis, maior dosi vsurpari debet. Verbi gratia, *R. panis à tritico modice cocti, & optime triti 3 j. adipis iusto 3 ss. butyri 3 j ss. Mis. ad ignem. Possimus etiam uti pane, decocto in lacte.* Si indicans sit vehemens, medicamentum iam præscriptum satis crassum, id est, in magna copia adhibebitur. *Quomodo.* Est autem hoc medicamentum actu calidum applicandum, determinatè, ut est pars affecta; sic enim crassus conseruatur. *Quando.* Applicandum est hoc medicamentum, dum dominatur receptio. *Vbi.* Est applicandum parti, cuius unitas soluitur.

Anodynum ratione causæ adiuuantis, est calidum in ordine primo, & tenuis substantiæ. Cuius materia est oleum *anethinum, cap. 18. lib. 4. simp. item chamamelinum, oleum co mune cum vino albo tenui, flores chamameli, vinum cum sanguine, oleum cum tymino, &c.* Hæc materiæ cutim rarefaciunt, & vapores, humoresque ad superficiem euocando, materiam morbificam euacuant. V s v s: *Quantum.* Si causa adiuuans sit insignis actiuitatis: proposita administrentur in magna dosi. *Quomodo:* administrentur actu calida. Tempus opportunum sit, dum causa adiuuans vincit alia indicantia: dum enim vincitur ab aliis indicantibus, non debetis hæc applicare. Verbi gratia, cum adiuuans vincitur à copiosa materia, replete totum corpus; primo totum est vacuandum, deinde anodynum vsurpandum. *Vbi:* applicandum est parti recipienti.

Dictum hæcenus de anodyno: sequitur materia remedij *Inter-*sanantis. Hæc materia respicit causam principalem, cum *perici.* internam, tum externam. Interna est, tum Dyscrasia partium *Similarium,* tum materia morbifica. Quoad dyscrasias præ-

ponemus medicamenta, quæ simplices tollunt: unde & patebunt medicamenta, quibus composita curantur. Simplex interperies, quæ dñlõrem facit capitis, est calida, frigida, vel calida dys-
crasia. sicca. In calida probatur oleum rosaceum, succus mori, folia per-

ulaca, & potiss. cum flore polenta, id est, cum flore farina, com-
 fecta ex bordeo viridi affo. cap. 1. lib. 2. x. rōt. Probatur etiam
 succus portulacæ, polygoni, pampinorum vitis, endiuie, item om-
 phacium, aqua rosacea, folia vitis cocta & trita, cum mulsæ dilu-
 ta; item spongia imbuta in aqua simplici vel rosacea. Alexander,
 si calor non est ingens, vititur rosaceo cum aceto; si ingens, addit
 lacteam. Cum his frigidis, licet commiscere calida, quæ
 sint instar vehiculorum: nimirum, ol. chamamelin. & anethi-
 num, sicut etiam Aetius facit: imo hæc etiam calida seruant
 calorem natium, ne à frigidis siucris lædatur: tum hæc
 calida, materiam adiuuantem euocant. In frigida inter-

Frigida
intemper-
vies. perie probatur oleum irinum, laurinum, cui propter odorem
 ingratum miscere licet macim, cinnamomum, & folia odorata.

Galenus probat farinam coctam, cum mulsæ, sed præterea cum
 vino, cum maiorana, serpillo, origano, calaminta: licet etiam
 vit cyperorum adipe anserino: probatur spongia, cum vino aro-
 matico. Si frigida interperies sit in habitu, ascendere licet ad
 euphorbium, cum oleo & cera. Hoc modo: ꝛ euphorbii 3 y. olei
 communii, vel anethini 3 ij. cera, liquefacta in prædicto oleo 3 vj.

Efficacis-
simū me-
dicamen-
tum, Gal.
ca. 3. lib. 2.
x. rōt. Misce. Sed præterea Galenus in cap. de Hemictania, vt stre-
 nuum medicamentum hoc probat: ꝛ crocomagmati, piperis
 albi, ana 3 ij. euphorbii, si recens est 3 ss. si non est recens 3 j.
 stercoris columbini, atramenti scriptorii, ana 3 ss. Terantur cum
 aceto acerrimo, & vino generoso: & pars affecta primum frice-
 tur; deinde hoc medicamentum applicetur. Alexander pru-

dentissimus, cap. 10. lib. 1. monebat, vt, si forsan validius hoc
 medicamentum videretur, ei commisceatur modicum vel
 amyli, vel lactis. Crocomagina, etsi varie paretur, hic ta-

Alt. cap.
169. l. 2. ca.
30. l. 6. ar.
ter cap. 30.
lib. 14. men modus secundum Aetium est optimus: ꝛ croci 3 ij.
 myrrhe el. ros. sic. amyli, gummi ana 3 j. terantur cum vino.
 Rosæ hic permiscuntur, non vt refrigerent partem affe-
 ctam, quæ antea frigida laborat interperie; sed vt miti-
 gent medicamenta calidiora, & astrictione sua conseruent
 robur calidorum medicamentorum. Stercus columbinum
 monet Galenus capiendum esse à columbis montanis, nam
 est medicamentum magis valens. Atramentum scriptoriū,
 admodum

admodum turpe reddit caput: adeoque in huius medica- Therma
 menti compositione omitti potest. Præter hæc, in dolore *fallacia*
 capitis ab intemperie frigida, probatur aqua sulphuræ natu- *sulphuræ:*
 rales. At si harum aquarum sit penuria, sic possumus præ- *ad imita-*
 scribere: ꝑ sulphuris viui lb j. salis lb ss. maiorana, serpilli, sta- *tionem na-*
 chadis, calamintæ mon. saluæ, beton. rosmar. pulegy, melissa, ana *turalium*
 At. j. aqua communis lb c. fiat decoctio ad consume. 4. partis pro *ad caput*
 stillicidio. Cum hac aqua conficere possumus stillicidium per *directa.*
 plures vices: secus autem fieri solet, dum est copia aquarum
 sulphurearum sponte scaturientium. Tandem in dolore cō-
 tumaci, Rhasis hoc vititur medicamento: ꝑ euphorbij, sinapis,
 castorei, piperis albi, styracis, calamitæ, ruta, marrubij, ana ꝑ j. redi-
 gantur in puluerem, & vino generoso aspergantur, & fermentur
 trochisci: & dum usurpantur, excipiantur vel vino odorato, vel
 oleo de costo, vel simili medicamento calefaciente. Nostris tempo-
 ribus nullo alio medicamento vti solent, quam oleo chama-
 melino: probatur etiam, tanquam strenuum, oleum destillatum
 ex apiso, è feniculo, ex aromatibus, è magnis antidotis, & olei ma-
 gni Hericæ Ducis, quod veluti miracula facere videtur: probatur
 etiam oleum destillatum è guaiaco; & admirabile est oleum destilla-
 tum è *sassafrasæ*. In sicca intemperie vtimur, malua, althea; *Sicca int-*
 amygdalis dulcibus, oleo communi, aqua tepida, lacte, medullis, pin- *temperies;*
 guedini bus potiss. gallina. His igitur medicamentis vtimur, ad
 remouendum dyscrasias, quæ dolorem excitant. *usus.*
 vtimur medicamentorum. Quantum: Quo maioris actiuitatis
 est intemperies; eo maior probatur dosis. Quomodo: In hoc
 conueniunt omnes dyscrasie, vt, quando sunt difficilis pas-
 sionis, id est, quando sunt in habitu, indicent, medicamen-
 tum secundum eum modum esse administrandum, quo effi-
 cacissime agat, nimirum in modum stillicidij, in substantia
 solida; vnde Galenus in calida intemperie probat assiduam
 irrigationem cum oleis: non enim sufficit simplex inunctio.
 Cæterum in frigida intemperie stillicidium probatur vehe-
 mentius; nam propter motum excitatur calor. Dissident
 autem dyscrasie; nam prout vario modo resistunt, pro eo
 etiam medicamenta vario modo sunt administranda. Quia
 igitur intemperies calida, melius vincitura frigido actu; idcir-
 co expedit vti medicamentis actu frigidis. Contra, in frigida
 intemperie, actu calidis: in sicca; moderate calidis, In intem-
 perie igitur calida probatur rosaceum frigidissimum. Ne
 autem medicamentum à corpore calefiat, & hinc rursus

corpus calefaciat, Rhases superponit pannum, infusum aqua & aceto, actu frigidis. Quando agendum, indicatur ab intemperie præsentis, sed vincente alia indicantia. Quod si dyscrasia vincatur à materia, existente vel in toto, vel in capite; oportet prius euacuare & totum, & caput, antequam applicentur medicamenta causa intemperiei. Quod etiam in alopecia Galenus obseruat, cap. 2. lib. 1. c. 104. Vbi agendum: si dyscrasia sit extra cranium, medicamenta sunt applicanda: si in cranio, medicamenta sunt applicanda, & exhibenda per os. Applicantur autem suturæ coronali & naribus: nam per has vias facile medicamentorum vis in cerebrum produci-
tur. Cæterum quæ applicantur naribus, sint suavis odoris; quæ exhibentur, suavis saporis: vt iucunda fiat curatio. Hæc de medicamentis, respicientibus intemperiem.

2. Materia
morbifica.

Sequuntur medicamenta quæ respiciunt materiam mor-
bificam. Hæc materia multiplex est: vel enim reperitur Extra caput, & est admodum mediata: vel in capite, & tunc est aut Intra, aut Extra cranium: si intra cranium, dolorque etiam cruciet intra cranium; materia est causa immediata; si vero dolor cruciet extra cranium, eadem materia resi-
dens intra cranium, est causa mediata, immediata autem quæ extra cranium subsistit. Nos confusionem fugientes, primum loquemur de materia extra caput, deinde de ma-
teria existente in capite. Materia igitur existens extra caput, vel residet Citra iecur, & dicitur prima superfluitas, vel

Prima su-
perfluitas.
Tenuis.

Vltra, & dicitur cacochymia. Prima superfluitas, vel est Te-
nuis, vt serosa & bibulosa; vel Crassa, vt melancholica &
pituitosa. Tenuis vacuatur, vel per Os, vel per Aluum. Per
os vacuatur beneficio vomitorij, quod conficitur ex aqua
hordeaceæ tepidæ, cum iulapio acetoso simplici, vel Symplo acetoso
simplici, vel etiam cum aceto. Per aluum vacuatur, vel exhibitis
per os, vel immixtis per sedem. Per os: Item anna el. sy. ros. sol.
ana ʒ ij ss. cum aqua endiuia. fiat passio brevis. Vel, R. floris cassia
rec. ext. ʒ x. manna el. ʒ iij. siccitum diarhodon Abb. ʒ ss. Mis.
& cum saccharo fiat bolus. Per sedem euacuans, iniicitur clys-
mi modo: R. cremoris hordei lb j. sacchari tubri ʒ ij. olei vel com-
munis vel violacei ʒ iij. oni vitellum, salis communis ʒ j. Misce
pro clystere.

Crassa.

Si crassa fuerit superfluitas, vomitorium erit tale:
R. filicis raphani ʒ j ss. oxymellis simpl. ʒ ij. iuris pinguis tepidi ʒ x.
Misce pro vomitorio. Aluum subducet hoc sequens, per os
exhibendum. R. mellis ros. sol. ʒ v. iuris pulli parum, sine portio
brevis.

brevis. Si patiens forsitan non admittet syrupum rosaceum, nec medicamentum in bolo, sed solum in portione, cupe-
retque inanuam, hæc quia non euacuat superfluitates cras-
sas, sed tenues, ideo adiungenda sunt ea, quæ mannam
adjuvant: *℞ manna el. ʒ iij. oxymellis simp. ʒ ij. β. cum iure pulli,*
fias posio brevis. Hic oxymel attenuat & abstergit mate-
riam, quam deterfam facilius manna educit. Si patiens de-
sideret bolum: *℞ specierum hiera simp. ʒ iij. cum melle rosa.*
fiant boli. Vel: *℞ flor. cassiæ noniter extractæ ʒ j. manna el.*
ʒ ij. specierum hiera simpl. ʒ ij. β. Misce cum saccharo, fiant boli.
Per eodem immitti potest sequens: *℞ hiera picra ʒ iij. mellis*
rosati ʒ iij. olei vel communis, vel chamamelini ʒ iij. β. salis
communis ʒ j iuris alterati cum furfuribus ʒ x. succi betæ, vel
mercuria ii ʒ ij. Misce pro clysmo. V s v s. *Quantum.* Prout
maior est actiuitas primæ superfluitatis, pro eo etiam ma-
ior erit dosis euacuantium. Verbi gratia, dare licet cas-
siam ad ʒ ij. mel. ros. sol. ad lb β. syr. ros. & mannam ad ʒ v.
Species hieræ ad ʒ iij. & ultra: vnde Galenus cap. 11. lib. 7.
meth. præbebat duo magna cochlearia; sed nos possumus
exhibere ultra duo cochlearia magna, ob penuriam bonæ
aloes. Dubitari autem potest, cur Galenus cap. 1. lib. 2. *κρό-*
σταuat summam dosin specierum hieræ esse ʒ j. Respon-
sio: Galenus ibi respicit ad hieram, vt attenuat pituitam
impactam in tunicis ventriculi, ideoque in minore copia
sumit, vt diutius manens in ventriculo, magis attenuet; si
enim in maiori dosi exhiberetur, non detineretur in ven-
triculo, & sic non attenuaret impactam materiam. At lib. 7.
meth. Galenus proponit hieram, quatenus sensibiliter eua-
cuet, ideoque maiorem aloës copiam sumit. *Quomodo:* Si
prima superfluitas ægre patiatur, exhibeatur medicamen-
tum in bolo: si facile, in portione. Item in difficili passione
primæ superfluitatis, clysmi confici debent e copiosis ele-
ctariis, & exigua portione iuris, vt sic desineantur & magis
operentur. Ad vires tamen semper nos respicere oportet:
quæ si non admittant medicamentum in forma pilularum,
exhiberi debet in portione. Nihil nos diximus de medica-
mentis, quæ cum cassia miscentur, vt sunt semina anisi,
quæ ruditer oportet esse contusa: hæc enim non pertinent
ad præsens negotium, sed ad methodum componendi.
Quando: medicamenta hæc usurpanda sunt, dum prima
superfluitas vincit alia indicantia, nimirum ante præpara-

Vsus me-
dicamen-
torum in
prima su-
perfluita-
te.

Nota.

tionem materiae. Et cum prima superfluitas quotidie generetur, saltem alternis diebus vti oportet lenientibus, id est, clysmis, nisi sponte fluat aluus. *vbi*: Euacuare licet per vomitum, si prima superfluitas subsistentiam habeat circa os supernum: per sedem, si subsistat circa fundum, aut secundum tenuia intestina, vbi quidam medicamentum per os exhiberi dicunt: si materia subsistit in crassis intestinis, per sedem oportet immittere medicamentum.

Cacochymia.

Sequuntur medicamenta, quæ respiciunt cacochymiam. Est autem cacochymia, materia biliosa, pituitosa & melancholica: ideoque primum dicendum de præparantibus, deinde de purgantibus idque generaliter, vt ad omnes morbos accommodari queat.

Præparantia materiam biliosam.

Præparantia igitur bilem, pro huius varietate varia sunt. In bile enim pallida, vtimur *Syrupo ros. recens. de acetosascitra, de succo acetosa, de cich. de end.* quibus syrupis additur decoctum è cichoraceis, ex hordeo. Si bilis sit flaua, & præsertim si vitellina; ascendere licet ad *Syrupum viol. nenuph. de papau.* ob insignem huius bilis caliditatem: decocta fieri poterunt è lactuca.

Quod si bilis sit particeps alicuius visciditatis; permiscere licet *Syrupum acetosum simpl.* Notandum verò, cum in corpore bilioso dulcia facile in bilem mutantur; syropos præscribendos esse in parua quantitate, diluta in magna dosi: vt

Præparantia materiam pituitosam.

℞ Syrup. de fencho, de succo acetoso, ana ℥ β. decocti endiu. lact. hard. ℥ β. Si materia sit pituitosa, & quidem salsa: *℞. Syrup. de beton. oxym. simpl. de cich. simpl. ana ℥ β. decoct. beton. cichor. ℥ iij. Misce pro syrupo.* Betonica hic vtimur, propter materiam pituitosam; sed quia est salsa & calida, addimus cichoracea. Si pituita non sit salsa, sed moderate frigida, vt dulcis, & potissimum insipida: hunc syrupum possumus præscribere: *℞ Syrup. de beton. mellis ros. col. oxymel. simp. ana ℥ vj. decocti beton. petroselini ℥ iij. Misce pro syrupo.* Si pituita sit frigidior, cuiusmodi est acida: *℞ Syrup. de beton. compos. de stach. de hyssopo, oxym. compos. ana ℥ β. decocti salvia, beton. stach. hyssopi ℥ v. Misce hoc pro syrupo.*

Præparantia melancholicam.

Crassa huius pituita, licet etiam vti syrupo de corticibus cytri, de menta, de duab. & quinque rad. cum decocto maiorana, rorismar. origani, &c. Si materia sit melancholica, sicque exusta: *℞ Syrup. viol. de succo borrag. de fum. ana ℥ β. decocti lupul. borrag. capill. Veneris viridium ℥ iij. Misce.* Probatum etiam syrupus de pomis simplex, de succo buglesse, de lupul. Sin autem materia melancholica non sit exusta:

exusta : R Syr. de corticibus citri , de fumaria ana ʒ j. decocti
melissæ , fumaria , sem. citri ʒ iij. Mis. pro syrupo. *Vtendi ra-*
rantium e superioribus patet: illud saltem notetur circa mo- *tio.*
dum , vt causa materiæ biliosæ exhibeantur syrupsu actu fri-
gidi , & præsertim si bilis sit calidior , vt vitellinatin reliquis
licet vti syrupsu actu calidis.

Quantum ad medicamenta , quæ cacoehymiam præpara- *Purgantia.*
tam purgant : notandum , purgantia aliquando probari in
cephalalgia à causa primitiua : verbi gratia , si capitis do-
lor fiat ob Solis ardorem , ita vt Solis ardor tantum calefa-
ciat , purgantia non probantur , quia non adest materia pur-
ganda : Si autem Solis ardor non modo calefaciat caput , ve-
rumetiam commoueat materiam , purgantia probantur ,
secundum Auicennam. In materia ergo biliosa , R rhab. ele- *Cholagoga.*
cti ʒ iij. infunde s. a. in decocto end. & filtra diligentis expres-
sione adde elect. de succo ros. ʒ ij. manna el. syrupsu ros. sol. ana
ʒ j ʒ ss. Mis. & fiat potio brevis. Vel , si patiens bolum optet:
R pulv. rhabarb. el. ʒ j. elect. de succo ros. ʒ j ss. trochiscorum de
violis cum scammon ʒ j. floris cass. non. exte. ʒ ss. Mis. & cum
saccharo fiat bolus. Licet etiam hoc medicamentum præscri-
bere in dolore capitis. R Massa pil. aur. ʒ iij. dacridy gr. iij.
cum syrupo de soncho , fiant pilule num. ʒ. Si materia pituitosa , *Phlegma-*
sic purganda : R Massa pil. coch. ʒ j ss. mastichin. ʒ ss. cum si- *goga.*
rupo de beton. fiant pil. v. Probaturretiam agaricus , hiera Pachijs
diaphanicon. & in consumaci dolore à pituita , probantur pil.
fusiæ , pilule de exph. trochisci albandal. In materia melan- *Melanago-*
cholica : R Massa pil. coch. cum hellebore preparatarum ʒ j ss. *ge.*
de fumaria ʒ ss. cum syrupo de pomis , fiant pilule num. ʒ. Licet
etiam vii sena , polypodio , epithymo , veratro nigro : unde pra-
batur syrupus de polyp. de epith. de pomis comp. de fumaria
comp. confectio. Hæmæch. Id tamen maxime notandum , è cap. *2. l. 1. c. 1. x. in omni capitis morbo , siue à bile fiat : siue à melancholia , semper phlegmagoga esse miscenda : & ob id Galenus semper purgat cum hiera è colocynthide , addito scammonio , propter materiam biliosam : hellebore nigro , propter melancholiam. Vsu. Quantum. Pro maiori actiuitate ma-*
terix , vt pendet à maiori quantitate , probatur etiam ma- *Vsu pur-*
ior dosis purgantium. Sed notandum , cum materia in *gantium.*
dolore capitis expurganda sit satis distans , augendam es-
se dosin medicamenti , ne facultas in longo itinere hebescat.
Sed hoc non pertinet ad methodum medendi , verum ad
metho

methodum componendi : quæ docet , ne medicamentorum vires in itinere frangantur , opus esse medicamento vehementiori, vel in dosi maiori. *Quomodo.* Probantur pilulæ, præsertim in materia pituitosa & melancholica, quæ non ita cedunt, sicut biliosa. *Quando :* Exhibenda sunt medicamenta, dum materia purganda vincit alia indicantia, vt si sit concoctasitem si cruda, sed turgens interim, aut venefica, aut petens cerebrum, præsertim vbi imminet epilepsia, vel apoplexia, vel phrenitis. *Vbi agendum.* Subsistentia huius materiæ indicat, medicamenta per os esse exhibenda. Si fortasse prohibeat ventriculus, applicanda sunt medicamenta propolita vmbilico, sunt immittenda per sedem : vnde probantur clysmiacres, præsertim quia hi : (teste Galeno c. 1. l. 2. x. réx.) vacuant, quæ sunt circa ventrem, circa mesenterium, & quæ circa sima hepatis sunt, vt sic per partem, post partem fiat vacuatio etiam à remotis. Hæc de materia, quæ extra caput consistit.

*Materia
morbifica
consistens
in capite:
mediata
tamen.*

Materia mediata residens in capite, vel generatur In capite, vel Extra caput. Si in capite generetur, residet vel In venis, vel Extra venas. Si in venis, hæc materia vacuatur soluentibus, de quibus dictum. Si reperiatur extra cerebri venas, vacuatur præsertim per os : deinde etiam per nares : hæc enim materia nihil aliud est, quam crassum excrementum, quod necessario generatur in capite, & perducitur in infundibulum, & hinc ad glandulam, vt postea per foramina, & ea quidem ampla, ad palatum pertinentia, per os expurgetur. Verum perducitur etiam aliqua portio excrementi ad carunculas mamillares, & hinc ad nares, & proinde ad narium foramina, quæ perducuntur ad internas partes ipsius palati. Vnde hæc materia modo per os, modo per nares est euacuanda. Fit autem vacuatio capitis : (secundum Galenum, c. 2. l. 2. x. réx. & c. 1. l. 6. x. réx.) per medicamenta caida, tenuis substantiæ, acris, detergentia, suavis & odoris, & saporis, & quantum fieri potest non venefica. Calida enim attrahunt materiam : in intimo capitis existentem : tenuia penetrant : acris per medium tactum irritant expultricem : detergentia faciunt, ne materia viscida ita hæreat, suauitas saporis & odoris, facit, vt medicamenta cum iucunditate operentur : non debent esse venenata hæc medicamenta, quia petunt organum olfactus, linguam, & ophagum, tracheiam, ventriculum, pulmones. Medici tamen interdum venenatis

*Qualitates
eorum me-
dicamentorum,
quib.
vacuatur
materia in
capite ex-
sistens.*

Medici tamen interdum venenatis

vti coguntur, dum materia ad summum vehementiæ ascendit: vtuntur enim *felle, colocynthide, c. 2. l. 3. x. 7. π. scammonio, oxymelle cum turbit, & cum scammonio*, dum sc. respiciunt ad pituitam cum bile permistam, sicut Auicenna. c. 29. tract. 1. licet etiam vti *hierā A. chigenti cum colocynth.* Verum hæc omnia probantur, non quatenus sunt venenata, sed quoniam attrahunt determinatos humores.

Dubitare autem quis posset, quomodo hæc medicamenta deducantur de potentia in actum, cum non ingrediantur ventriculum, nec longo tempore in ore detineantur, sicut alia in ventriculo? Dicendum est: medicamenta quæ agunt à proprietate occulta, non egere adeo multo tempore, vt ad actum deducantur, sicuti requirunt ea, quæ manifestis agunt qualitatibus: ambra enim festucas trahit, si solum calefiat, & magnes ferrum, si solum fricetur. Accedit etiam, quod medicamenta, quæ applicantur ori, vel naribus, minore cum difficultate materiam determinatam attrahunt, ob vicinitatem: quam ea, quæ ingrediuntur ventriculum, quippe quæ materiam magis remotam, in artubus, venisque distantibus hærentem, debeant attrahere. Ex his ergo pater, eos decipi, qui non probant hæc medicamenta vehementia, quod putent ea non deduci de potentia in actum. Illud tamen obseruandum, vt, quantum fieri potest, minus vehementia administrentur: nisi materia sit contumax, nimirum frigida, crassa, viscida, impasta.

Porro horum medicamentorum, quæ purgant materiam in capite existentem, certi quidam sunt gradus: alia enim sunt debilia, alia mediocria, alia fortiora. Debilia sunt, *mastriche, ibus, origanum, pulegium, beta, manna, oxymel simplex.* Mediocria: *hyssopus, folia & rad. capp. sal. nigella, sapa, matorana, struthium, eruca, nasturtium, cuminum, calamitha mont. dictamnium Cret. acorus, bacca lauri, folia lauri, piper, Zinziber, pyrethrum, succus cyclaminis, succus iridis, oxymel simpli. allium, repa, sinapi, confectio illa, quam vulgo appellant mustardam.* Vehementiora sunt *rhâb. agaricus, sena, epithym. polypod.* Adhuc vehementiora sunt *scammonium, turbit, colocynthis, cithymalus, euphor. elater, utrumque veratrum.* Sed quia hæc medicamenta nocere possunt, vel acrimonia, vel iniucunditate odoris & saporis, in medicamentis cõponendis oportet addere corrigentia: propter acrimoniam, *sanum graecum, caricæ pingues, passulas dulces, oleum viol. oleum amygd. dulcium:* propter odorem, aromata,

Quomodo medicamenta ore detenta, in actum deducantur.

Ordines medicamentorum quibus caput purgatur.

ambra,

amburam, moschum, galliam odoratam, syracem, calamitam, asan-
odoratam: propter ingratum saporem miscenda sunt dulcia,
ut saccharum, mel, vinum dulce, passule, carica, & cetera.

Ratio vi-
di caput-
purgis.

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

phoro-

V s v s. Quisunt. Summa dosis probatur, vbi summa est
 materię actiuitas. **Quomodo.** Si materia maxime resistat, for-
 ma medicamentorum erit solida, vt sunt turundę, linimen-
 ta, & masticatoria: sin minus medicamenti liquidis vti pos-
 sumus, vt sunt decocta, seu gargarismi. **Quando.** Oportet his
 vti, dum materia vincit alia indicantia, & non vincitur a
 materia existente in toto, vel in ventriculo. Vincit autem
 materia hæc expurganda materiam actu soluentem conti-
 nuum. **Quare caputpurgia** sunt administranda post vacua-
 tionem totius & ventriculi, nimirum ante cibum, & ante ro-
 pica medicamēta. **Vbi.** Cum materia subsistat intra cranium:
 iure hæc medicamenta applicantur naribus & ori, nisi sit
 prohibens. Purgantia quidem per nares prohibentur, dum
 nares afficiuntur vlcere, vel aliquo tumore, dum nares ob-
 tinent venas cum orificiis laxis, vt periculum imminet he-
 morrhagię narium: item dum vitium aliquod oculorum
 adest: quæ enim per nares purgant, facile oculis possunt
 officere. Præterea dum cerebrum, vel vertigini, vel epilepsię
 est obnoxium, fugienda sunt ea, quæ per nares purgant:
 sternutamento quippe insigniter cerebrum agitur, vt fa-
 cile vertigo, aut epilepsia oriatur. Purgantia per os prohi-
 bentur, si adest vitium palati, gingivarum, dentium, linguę,
 item vitia ventriculi, tracheę, pulmonum, dum hæ partes
 facile suscipiunt cerebri excrementa, secundum Auicē.
 cap. 29. tractat. 1.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Formula.

Iam formulas aliquot trademus, purgantium tum per os,
 tum per nares. Purgantia per os, sunt masticatoria, garga-
 rismi, & inunctiones. Masticatorium debile hoc erit: *R. ibu-*
ris 3 j. mastiches 3 ij. cera, caricarum pinguium ana 3 j. β. Mis. pro
masticatoria. Mediocre erit: *R. sinapi, piperis albi, pyrethri, salis*
communis ana 3 j. cum melle, fiat masticatorium. Vehemens erit:
R. eupharhij, clarij ana 3 β. staphisagria 3 β, moschi odorati
gr. iij. cera, ladani ana 3 ij. Mis. pro masticatorio. Gargarismus
 debilis erit: *R. caricarum pinus, origani, foliorum lapathi folio-*
rum, hedere, fol. betæ, ana P. j. aqua communis lb iij, fiat decoctio
ad consumptionem 4. part. deinde R. prædicta decoctionis lb β. oxy-
melis simpl. 3 j. β. Mis. pro gargarismo. Mediocris: *R. cumini, cala-*
mintha mont. hyssopi, rad. & fol. capp. ana P. j. sinapi, piperis,
pyrethri,

pyrethri, ana ʒ j. omnia ruditer contundantur : deinde recipe aqua salvia lb iiij ʒ. fiat decoctio ad consumptionem partis tertiae : deinde recipe praedicta decoctionis lb ʒ. oxymellicis scill. ʒ j ʒ. Misco. pro gargarismo. Vehemens gargarismus : & euphorb. ʒ ʒ. colocynth. agar. ana ʒ j. foliorum cucumeris agrest. P. j. aqua calamintha lb iiij. fiat decoctio ad consumptionem dimidij : deinde recipe praedicti decocti lb ʒ. oxymel. scill. ʒ ij. Misco pro gargarismo. Linimentum palati debile erit : & succi Linimentum betae, malua, lapathi, ana ʒ ʒ. oxym. simpl. ʒ j. Misco. pro linimento. Mediocre, & pulueris sinapi, nasturiij, piperis albi, ameos, ana ʒ ij. macerentur in aceto acri, deinde recipe succi iros, cyclam. hyonia ana ʒ ʒ. mellis ʒ j. fiat linimentum. Huius classis etiam erit mustarda. Vehemens erit linimentum : & sapon. euphorb. staphysagr. scammonij ana ʒ j. oxymel. scill. ʒ j ʒ. Misco. Licebit etiam theriaca & mithridatio palatum inungere.

Purgantia per nares, sunt liquida, pulueres, turundae. Liquida Liquida sunt administranda, ut operentur sine detrimento : aeger ergo declinabit caput suum ad posteriora, & violentia aliqua liquor immittatur intra nares, interim aeger os repleat aqua vel vino, maxime dum vehementiora naribus admoventur : sic enim medicamentum non ingreditur os, quod iam repletum est, aut ingressi vires venenatae franguntur, ne ori, subiectisque partibus obesse queat. Haec tamen admonitio est extra methodum. Liquidum autem debile, naribus applicandum, sic potest praescribi : & succi betae, fol. hederæ ana ʒ j. manna el. ʒ ʒ. Misco. pro naribus. Mediocre : & pulv. pyrethri, piperis, sinapi ana ʒ ʒ. suc. cyclam. iros, ana ʒ j ʒ. olei liliorum alb. cum aromat. oxym. scill. ana ʒ vj. Misco. Vehemens erit : & elaterij gr. vij. dactylij ʒ j. pulv. utriusque veratri gr. xv. Misco. His vehementioribus dolores contumacissimi superantur. Pulueres per arundinem in nares sunt insufflandi. Debilis hic erit : & betae, maioran. fol. hederæ, manna el. ana ʒ j. fiat pulvis. Mediocris : & pyrethri, pulv. albi sinapi, caryophyll. ana ʒ j. Misco. & fiat pulvis. Vehemens : & colocynth. staphisagria, utriusque veratri ana gr. xv. moschi gr. iiij. Misco. & fiat pulvis. Turunda debilis erit : & succi betae, fol. hederæ ana ʒ j. cera ʒ j ʒ. Misco. & fiat turunda. Pulueres, Turunda. Mediocris : & pulv. sinapi, nasturiij, praesij, pyrethri, piperis albi ana ʒ j. ladani, cera ana ʒ ij. Misco. & fiat turunda. Vehemens erit : & euphorbij, elaterij, colocynth. ana ʒ ʒ. moschi gr. iiij.

gr. iij. styr. calamit. gr. iij. ladani 3 ij. Mif. & fiat turunda.

Materia

mediata

extra ca-

pue genita,

in capite

tamen con-

sistens.

Deriuatio.

Repercus-

sio.

cap. 16. l. 5.

fimp.

Materia

reprimen-

tum.

et 1610.

et 1610.

Haecenus de medicamentis, quæ respiciunt materiã mediatam intra cranium contentam, & quidem in capite genitam. Sequuntur ea, quæ respiciunt materiam intra cranium contentam, quæ tamen extra caput genita, in hoc cõfluxit. Hæc igitur materia, quæ in caput fluxit: inque venis residet, non extra venas: & præterea nondum est impacta: retrahitur vel Deriuatione, vel Repercussione: (reuulsio enim spectat materiam, quæ nondum fluxit: de qua in c. de phrenitide:). Deriuatio fit per nares, per os, per brachia: & vel materia cheirurgica, vel medicinali, de quibus omnibus iam dictum est. Reprimentia probantur in qualibet cephalalgia, quæ fouetur a materia fluxa, vel calida, vel frigida, c. 11. l. 13. meth. tam enim frigidus, quam calidus humor est repellendus, modo non moueatur motu critico, l. ad Glauco. Reprimentia autem debent esse frigida, & crassæ substantiæ, contraria enim sunt attrahentibus, calidis & tenuis substantiæ. Debent etiam reprimentia esse astringentia, vt partem cui applicantur possint densare, ne propter laxitatem facile suscipiant. Porro notandum: (quod tamen ad methodum componendi pertinet:) astringentia non posse penetrare, ideoque imbecillitati eorum esse occurrendum, per ea quæ reprimentia vehunt, nec tamen eorum vim frangunt, vt sunt tenuia & frigida. Reprimentia debilia sunt, c. 1. l. 2. x. τὸν. oleum chamamelinum: (sed confectum erit oleum olinis immaturis, alias non esset reprimens,) ol. rosas. completum: mediocria, ol. rosas, omphacinum, aqua ros. Valentiora, succus semperuini, portulacæ, lactucæ, polysij, polygoni, pampinorum vitis: unarum immaturarum, mororum immaturorum, myrsillarum, granatorum acerb. arantiorum acerbiorum. Hæc validiora probantur, dum materiæ morbificæ impetus est admodum vehemens, id est, si materia est calidior. Probantur, inquam, si modo virtus ratione qualitatis calidi innati id permittit: si enim remissa sit caliditas innati calidi, valde frigida, seu vehementer repellentia non admittuntur: & hinc Galenus probat oleum chamameli, si corpus non tolerat vehementer frigida: vt ip. foeminis, eunuchis, pueris, & in iis, qui sunt albicantis coloris. Cæterum in dolore particulari ex ebrietate, probatur oleum ros. cum succo hederae, & potiss. cum succo brassicæ, qui naturaliter ebrietati aduersatur, vini-que vapores reprimat: vnde Theophrastus memorat, si prope vitem plantetur brassica, eam à vite recedere, & remotiorem apparere.

apparere. Quoad vehiculum reprimentium, Galenus acetum *ὄχημα* re-
 omnibus aliis anteponeit, quia ob exiguum calorem, multam *primen-*
 frigiditatem, & tenuem substantiam, incidit, discutit, repri-
 mit. cap. 8. lib. 1. κ. τόν. siccat etiam, c. 20. l. 1. simp. Dubitatur
 autem de aceto, quomodo in cephalalgia vsurpetur, cum
 tamen dolorem exciter, cap. 19. lib. 2. simp. acrimonia enim
 sua morsum excitat: præterea cum ea, quæ contra dolorem
 valeant, sint mitigantia, aut laxantia, quorum hæc sunt ano-
 dyna ratione causæ adiuuantis, illa sunt anodyna suppuran-
 tia, acetum vero neutro modo concurrat, est enim frigidum,
 & non emplasticum, sed potius tenuis substantiæ. Respon-
 deo: Si acetum sumatur vt medicamentum principale, id est,
 copiosum, agit cum vehementia & soluit vnitatem, dolo-
 remque intendit. Si autem sumatur, vt medicamentum non
 principale, sed vt secundarium, quod saltem deferat repri-
 mens & principale medicamentum; tunc administratur in
 exigua copia, nec soluit continuum, quomodo & nos su-
 mimus. Vt autem sciatur, qua proportionem acetum sit per-
 miscendum, oportet ad tria respicere, nimirum ad vim aceti,
 ad imbecillitatem reprimentis, ad permittentia ac prohi-
 bentia. Quoad vim aceti, vt acetum est acrius, ita in minori
 copia miscendum. Imbecillitas reprimentium cognoscitur
 è materia reprimenda, & parte cui reprimens applicatur. In
 materia perpendimus motum & quietem: dum enim mate-
 ria mouetur maiori impetu, opus est copiosiore aceto; dum
 quiescit in parte profundiore, similiter opus est copiosiore
 vehiculo: pars densior, copiosius exigit acetum. Permitten-
 tia & prohibentia, sunt res secundum & præter naturam.
 Secundum naturam est virtus: quæ si bona, acetum ea copia
 miscendum, quæ indicatur ab imbecillitate reprimentis: sin
 contra, in minori copia acetum est miscendum. Res præter
 naturam, sunt materia morbifica, vis doloris, vigilia. Mato-
 ria morbifica, si fuerit sicca, vt biliosa, vel melancholica, pro-
 hibetur acetum copiosum, quia exsiccat. Doloris vehemen-
 tia, quia anodynum indicat, prohibet acetum copiosum,
 quod continuum soluit. Vigiliæ si absint vehementes, pro-
 hibent acetum: ideoque si hæc sint vehementissimæ, loco
 aceti misceri potest acidum citri, vel limonis, vel arantiorû,
 ita tamen vt hi fructus sint maturi, misceri etiam potest suc-
 cus acetosæ. Proportio autem aceti ad reprimentia debet
 esse à suboctupla, ad subquadruplam: vt pro reprimentis 3 j.

misceri debet aceti 3 j. ad minimum, vel 3 ij. ad summum.

Oxyrhodini- Restat vt formulas quasdam reprimentium tradamus.
nerum for Sanguinem reprimit sequens: R. ol. ros. omphac. 3 ij. aqua rosat.
myla, 3 j. aceti 3 vj. Misce, & concutiantur omnia in mortario plumbeo,
pro oxyrhodino. Sequenti reprimitur bilis, si vigilie non sint
intensæ. R. olei rosati omphac. aqua rosac. ana 3 j. succi endi-
uia, omphacini, ana 3 v. aceti 3 vj. Misce pro oxyrhodino. Si vi-
gilie sint intensiores, biliosa materia hoc medicamento est
reprimenda: R. ol. rosati omph. 3 j. aqua ros. 3 j. olei viol. 3 j.
succi lact. 3 j. aceti 3 iij. s. vel aceti loco, acidi citri. 3 j. Misce.
Pituitam hoc reprimit. R. oleum ros. compl. 3 y. olei chamam.
confecti cum olinis immaturis 3 j. aceti 3 vj. Misce pro oxyrhodino.
Melancholia hoc reprimitur: R. oleum ros. compl. 3 j. s. chamie-
mel. 3 s. succi malua 3 j. aceti 3 v. Misce.

Admini- V s v s. Quantum. Dosis compositi (simplicium enim do-
stratio re- sis pertinet ad artem componendi) maior erit, pro maiori
pellatium. actiuitate materie reprimendæ: vnde dum applicatur repri-
mens cum linteo, exigua debet fieri expressio, si magna sit
materie actiuitas: contra, si exigua actiuitas materie, pan-
nus valenter debet exprimi. Quomodo. Reprimentia actu fri-
gida sunt administrauda, nisi prohibeat vel materia repel-
lenda, vel virtus. Materia enim repellenda, si est calida, tunc
consentiunt indicationes, quoniam & vt calida, & vt repel-
lenda, indicat frigidum: ideoque reprimens magis actu fri-
gidum esse debet. At materia frigida, vt frigida, indicat ca-
lida; vt reprimenda, indicat frigida: ideoque cum dissen-
tiant indicationes, reprimens actu nec calidum, nec frigi-
dum, sed tepidum debet administrari, ca. 15. li. 1. ad Glaucon.
Si virtus constet, id est, si calor innatus capitis vigeat, si ca-
put calidum est, reprimens actu frigidū potest administrari:
sin minus, tepidum, vt eunuchis, sceminis, puerulis, senibus,
in ambiente frigido. Quando. Reprimens est administrandū,
dum materia reprimenda alia indicantia vincit: non vero
habet locū, cum materia repellenda vincitur à materia exsi-
stente in toto, vel destillante in pulmones, præcipue si acris
sit, aut maligna: tunc enim autequam vtamur repellentib-
us, vacuandum totum corpus, destillationis materia mi-
nuenda & attemperanda. Et quoniam materia repellenda,
vincit materiam resoluendam: ideo primum repellentibus,
deinde resoluentibus vti oportet. Vbi. Cum materia repel-
lenda sit in capite: reprimens applicandum capiti. Eligenda
autem

autem est capitis pars, per quam reprimentia promptius permeent ad materiam repellendam: vt sunt partes circa nares, & circa futuram coronalem.


Hactenus de materia Mediata. Sequuntur medicamenta. *Materia* quæ respiciunt materiam immediatam, residentem in parte nervosa. Et hæc materia, siue vapor sit, siue humor, euacuatur medicamentis superius propositis, in dyscrasia frigida. Quibus quædam adiicienda. Si ergo materia sit vapor, 1. probatur medicamentum confectum è feniculo, emmino, aniso, chamemelo, anetho, dauco, betonica, &c. cuiusmodi est etiam ceratum sacrum, ceratum de betonica. Vfus patet è superius propositis: quibus saltem duo addemus: primum, his actu calidis esse vtendum: alterum, hæc esse vsurpanda post totius & capitis euacuationem. Si materia sit humorosa & impacta; dissoluenda est medicamentis propositis, quæ calida sunt, & tenuis substantiæ, quibus etiam vti licet in phrenitide & lethargo: quamuis mitiora probentur ad bilem & sanguinem; vehementiora ad pituitam & melancholiam. Verum notandum, vt, si materia fuerit sicca, cum resoluentibus misceantur emollientia: alias materia crassa & scirrhusa euaderet, & curationem non admitteret; cuiusmodi est pituita & melancholia. Notetur etiam in compositione medicamentorum resoluentium, vt, si humor infectus fuerit lue venerea, misceantur alexipharmaca. Resoluentia sunt, & quidem mitiora, chamemel, anethum, beton, salvia, maioran, rosmarinus: mediocria, origanum, puleg, serpillum, nardus, fenic, nigella, calamintha mont, dictamnium Creticum: fortiora, piper, sinapi, euphorbium, scammonium, colocynthis, veratrum, radix cucum. agrestis, semina columbinus, thapsia, &c. Emollientia sunt: ammoniacum, adeps anserinus, medulla vituli, malua, althea, emplastrum de melilotto, diachylon: quæ vt reddantur odorata, misceri oportet, maceen, aromata, moschum. Inter alexipharmaca hæc faciunt, china, salsa parilla, quaiacum, saffasras. Notetur Galenum addere acetum, reprimentibus, non autem resoluentibus; quia hæc tanquam, calida & tenuis substantiæ, non egent vehiculo. Facultas autem medicamentorum resoluentium excipitur modo aqua, modo vino, modo oleo: vnde formæ variæ horum medicamentorum solent præscribi: verbi gratia, si solidum fiat medicamentum, tunc fieri solent trochisci, pulueres, pilule odoratæ, linimenta, emplastra, cerata. Sed obiter animaduertenda est differentia inter inunctionem, vnguen-

*Usus re-
soluentiu.*

tum, linimentum, emplastrum, & ceratum: inunctio fit è solo oleo, sine odoris & cera: vnguentum fit ex odoratis, sed sine cera: verbi gratia, si componatur medicamentum, ex oleo lil, alb, cum aromat. & ol. chamæme, linimentum fit ex oleo & cera, vt pro olei 3 j. sufficiant ceræ 3 ij. emplastrum recipit ceram & farinam, qualis in resoluente medicamento est farina orobisceratum fit è cera admodum copiosa, vt pro olei 3 j. sumatur ceræ 3 ij. iiij. vel vj. *Recta administratio resoluentium*, patet è propositis. *Quantum.* Magna dosis indicatur, si materia impacta sit magnæ actiuitatis. *Quomodo.* Resoluens est administrandum actu calidum: magis quidem, si materia fuerit frigidior, & si virtus ferat: minus, si materia calidior, & si æger non queat perferre vehementer actu calida. Præterea, si materia magis resistat; resoluentia debent vsurpari in forma solida, vt magis agant: si contra, in liquida. *Quando.* Resoluentibus vtendum est, quando materia impacta vincit alia indicantia: non autem iis vtendum, si materia impacta vincitur à materia redundante in toto, vel in cerebro: vnde ante resoluentia, & totum, & caput vacuari debent. *Vbi.* Cum materia impacta subsistentiam habeat in capite, huic applicandum est ceratum sacrum & exhibendum decoctum guaiaci.

Vt vero, quæ hactenus de materia morbifica dicta sunt, rectius intelligantur, subiectum ex quælibet addidi.

In cap.



Causa externa.

Aër.

Ventus.

Ebrietas.

Causa externa non necessario occurrentes.

Odores.

Hucusque de remedio sanante, quod respicit causam internam: sequitur remedium sanans, respiciens causam principalem externam. Causæ igitur externæ, vel Necessario occurrunt, vel non necessario. Necessario, aër, potus. Ab aëris caliditate dum fit dolor; probantur refrigerantia; proposita supra in calida intemperie, sed remissiora. Si dolor fit ab aere frigidior, probantur calida, proposita in dyscrasia frigida. Si dolor prodeat à ventis, oportet cum Auicenna considerare, num ventus sit calidus; ut æstiuus & austrinus: vel Frigidus, ut hyemalis, & aquilonaris. Si ventus calidus, perpendendum, num introierit, vel per nares, vel per aures, vel per vtrumque: Si enim per aures ingressus fuerit, oportet in aures instillare, vel *oleum chamæmelinum, vel methinum.* Hæc olea, licet ventus sit calidus, probantur tamen propter dissolutionem; unde tepida sunt administranda. Si per nares ventus introierit, medicamentum etiam per nares immittendum. Sed licebit etiam medicamentum applicare futuræ coronali. Et si contingat, ut imprimatur intemperies calida; licet postea refrigerantibus uti. Si dolor fiat à vento frigido: utendum est medicamentis calfacientibus & resoluentibus propositis, modo per nares, modo per aures, prout introiit ventus frigidus. Si ab immodico potu fiat dolor, nimirum ex ebrietate; vacuatio debet fieri, secundum Auicem, vel per vomitum, vel per alium: optimumque est, ut dormiât, quia somnus saepe è toto vapores resoluit, & dolorem tollit: sin hæc minus conducant, ad ea confugiendum, quæ possunt vini vapores reprimere, ut *oleum rosæ, cum succo brassicæ.* Causæ externæ non necessario occurrentes, sunt contusio, plaga; &c. in quibus recurrendum est potius ad propria capita. Postremo breuiter quoque dicendum est de cephalalgia, quæ producitur ex odoribus. Si enim dolor capitis fiat à malis odoribus, secundum Auicennam occurrendum est contrariis, nimirum bonis. Contra, si fiat à bonis, occurrendum etiam est odoribus contrariis, non quidem foetidis, sed in qualitate contrariis; ut si dolor fiat ab odore calido, remoueat per rem odoratam frigidam, boni odoris, verbi gratia, si dolor fiat à moscho, (sunt enim qui huius odorem ferre nequeunt) occurrendum est *violis, rosis:* & contra, si dolor fiat ob odorem frigidi, occurrendum calidis, ut *ambra.* Hoc licet quidam in scholis proponant, non tamen à me, ut verum fatear, admittendum probatur.

Hactenus de medicamento anodyno & sanante. Sequuntur medicamenta, quæ respiciunt proportionem cerebri, quæ capitalia dicuntur. Hæc medicamenta tria in se continent: primum enim non iuuant in omni affectu capitis: si enim verbi gratia capitis affectus sit calidus, & medicamentum cephalicum sit calidum, nocebit. Secundo, cephalica etiam possunt prodesse in vitiis aliarum partiû: calida enim cephalica, etiam prodesse possunt in ventriculi affectu frigido. Tertio, dicuntur cephalica, quia maiori cû vtilitate affectibus capitis administrantur. Non enim dicuntur cephalica, quod conueniant in omni affectu capitis, quia in aliquibus nocent: nec quod prosint solum in capitis affectibus. Cur autem cephalica magis iuuant caput, quam aliam partem, nulla alia ratio reddi potest, quam quod habeant proportionem, quæ eius sit naturæ, vt limitet contrahatque facultatem medicamenti, quo maioris sit actiuitatis & vtilitatis ratione capitis, quam ratione aliarum partium. Cephalica alia sunt Calida, alia Frigida, alia Temperata. Calida probantur in dolore capitis, à causa frigida: frigida, à causa calida: temperata in omni dolore. Calida sunt, *stæchas, rosmarinus, maiorana, salvia, hyssopus, calamintha mont. magna antidoti*: quæ non tantum sunt capitalia, verum etiam cordialia, splenetica. Frigida sunt *rose, saccharum rosæ, viol. santali, diarbodon Abb.* Temperata sunt potissimum *cranium humanum*, quod desumitur aut ex homine viuente (nimirum vulntrato) aut è cadavere iam defuncto, item *peonia mas, non femina.* *Vsus. Quantum.* Hoc desumitur à proportionem capitis, quatenus est maioris, vel minoris actiuitatis: cum autem cerebri proportio non agat, sed limitet facultatem agendi; ob id, vt facultatis actio erit vehementior, ita capitalia in maiori dosi erunt administranda; vt pro maiori robore cerebri, seu facultatis, opus sit maiori quantitate medicamentorum. *Quomodo.* Cum proportio seruetur calidis; hæc medicamenta moderate calida sunt administranda. *Quando.* Cum proportio præsens vincit alia indicantia, sunt vsurpanda cephalica: non autem quando vincitur à materia replente vel totum, vel caput: Ante enim vsum capitalium, prius totum & caput vacuare oportet. *Vbi.* Cum proportio subsistentiam habeat in cerebro: propterea hæc medicamenta capiti sunt applicanda, & naribus, & futuræ coronali, & per os exhibenda.

Vsus cephalicorum.

De victu in cephalalgia insitnendo.

Vitium ra-
tio.

Aer.

De materia medicinali diximus. Restat materia dietetica: quam ita explicabimus, vt ad quodlibet capitis vitium queat accommodari. Aer, quatenus est materia alimenti, erit expers fumi, pulueris, venti, & cuiuslibet vaporis noxi; sed purus, odoris suauis, vt probe alat spiritus. Quatenus autem aer est materia remedij, pro varia doloris causa varius probatur in causa calida, alterabitur *pomis, rosti, folijs vitis, aqua ros.* erit etiam aer lucidus, non obscurus: & si vigilie insistent, alterandus est aer *lactuca, nymphæa.* In causa frigida, aer alterabitur *origano, pulegio, saluia, maiorana, caryophyllis:* & si contingat somnum esse coniunctum, debet etiam alterari *aceto acvi.*

Cibus.

Cibus, vt est materia alimenti, erit boni succi, paucorum excrementorum, *εὐπικτος & ὑγρόδωτος*, suauis odoris & saporis: vt carnes optimæ, pisces, panis probus, &c. Cibus autem vt est materia remedij, vel est materia anodynæ, vel sanantis. Cibus habens rationem anodynæ, erit suauis, dulcis, vt pateriens oblectetur: vnde infantum dolores lacte mitigat Galenus ca. 7. li. i. de tuæd. san. Cibus, vt est materia remedij sanantis, varius probatur, vt varium est vitium causæ principalis: quod pertinet ad substantiam, quantitatem, qualitatem, & vbi. Vitium secundum substantiam est, si verbi gratia materia sit putrida; vnde probatur cibus conditus *aceto, acetosa, acido citri:* & si adsit virulentia venerea, licet cibum alterare *salsa, china,* potest etiam lignum *guaiacum* cum cibus misceri. In vitio secundum quantitatem, probatur victus minuens, vt cremor hordei, *panarella* liquidior. In vitio secundum qualitatem ita procedendum; Si vitium in frigiditate sit positum, tunc cibus est condiendus *feniculo, melissa, pulegio, aromatis,* melle, *saccharo, roremarino,* probanturque calida cum condimentis, tum opsonia. Si in caliditate consistat vitium, cibi condiendi *lactuca, acetosa, endinia, soncho, hordeo, &c.* & si forsitan vigilie sint annexæ, præstat cibum præbere ex *amygdalis,* quandoque etiam danda emulsio *sem. papau. albi.* Si vitium ad siccitatem pertineat, cibi condiendi sunt *borragine, buglossa, malua, amygd. bugro,* adipe etiam gallinæ aut vituli. Si vitium sit in materia tenuitate, condiuntur cibi *omphacio, granatis acerbis, cerasis* acerbis, *cyonius.* Si materia sit crassior, & quidem calida, cibi condiendi *aceto, aceto, sem. melon.* Si materia

crassa & frigida, cibis permiscenda aromata. Si materia sit
 scida & calida: condiantur cibus *hordeo*: si frigida, *melle*, *oxy-*
lle, *saccharo*. Quod vitium secundum vbi: si spectet ad mo-
 um, condiantur cibi incrassantibus propositis in materia
 nui: si spectet ad quietem, condiantur cibi alterantibus,
 opositis in crassa materia. Recta administratio ciborum.
 Quantum agendum, indicatur ab indicante vt agit: indicans
 virtus, ratione alimenti: affectio cerebri & tristis sensa-
 o, est indicans ratione anodynii: materia morbificata prin-
 palis, est indicans ratione remedij sanantis. Vnde si inten-
 or est actio virtutis, id est, si virtus est debilis, non fert
 ediam, probanturque cibi copiosi. Si dolor sit intensior,
 ateria remedij anodynii dicitur esse copiosior, vnde cibi
 ondiendi materia dulci, & copiosa. Præterea, si summa sit
 ctio materiæ principalis, verbi gratia calidæ, cibi condi-
 i, exempli gratia endiuii copiola, & sic de aliis. *Quomodo*. Si
 irtus debilis est & facile labitur, probantur cibi liquidi, quia
 acilius corpora potu, quam cibo implentur. Causa autem
 ateriæ, si materia fuerit frigida, actu calidis vtimur. *Quan-*
o. Cibandum, dum iudicans vincit: non autem dum vinci-
 ur, quod fit, si cibus in ventriculo existat: vnde hic primo
 ncoquendus est.

*vsus cibi-
rum.*

Potus omnis debet esse cibi vehiculum: interdum tamen *Potus.*
 tiam est alimentum. Varius autem administrandus est po-
 us, prout est materia vel alimenti, vel anodynii, vel sanantis,
 a tamen vt semper sit cibi vehiculum. Potus, vt est alimen-
 um, eius materia est *vinum*, *aqua cum saccharo*, *melle*, *carne*,
 caro tamen non debet esse copiosa, alias potius esset cibus,
 non cibi vehiculum, vt ius consummatum destillatum. Po-
 us, vt est materia anodynii, debet esse suavis, vt *vinum dul-*
e, *aqua saccharata*, *mulsa*. Potus denique, vt est materia sanan-
 is, debet varius esse: oportet enim vt respiciat vitium se-
 undum substantiam, quantitatem, qualitatem, & vbi. Si
 nim materia est putrida, probatur *aqua cum aceto*, vel cum
 yripo acetoso simp. vel cum inlepo. Et si coniuncta sit lues ve-
 nerea; aqua alterabitur *salsa*: vel *vinum fiat è salsa medicatum*.
 Si peccatum sit secundum quantitatem; probatur *aqua sim-*
plex, quia non egemus potu nutriente. Si materia sit cali-
 or, non probatur vinum, sed *aqua vel simplex*, vel alterata
 ndiuii, aut alio refrigerante. Si materia sit frigida; probatur
 vinum, vel aqua alterata *saccharo*, *salina*, *roremarino*: vel etiam

*Relia ad-
ministra-
tio.*


imponenda sunt aromata. Si materia est sicca; conuenit *vinum dulce, aqua cum lacte, cum amygdalis.* Vfus. Idem dicendum, quod de cibo: præterquam circa Quando agendum explicari oportet, quando aqua, & quando vino vtendum. De aqua. Materia morbifica non prohibet aquam, siue sit copiosa, siue calida: frigida etiam & cruda materia non prohibet aquam, modo calidis corrigatur: crassa item viscidaque non prohibet aquam, dum corrigitur attenuantibus & detergentibus. Aqua vero prohibetur à virtute, quando imbecillis est, non secundum solida, sed secundum spiritus, vt in syncope: tunc enim illico est roboranda, id quod per aquam fieri nequit, sed per vinum, quod valenter restaurat, l. de marcore. Vinum prohibetur à materia cruda, copiosa, calida, & à materia quæ in caput mouetur: materia enim cruda & copiosa, agitata à vino, in caput fertur: calida vino redditur calidior: & quæ in caput habet impetum, adhuc magis in caput ducitur, cum tamen sit retrahenda. Quare dum materia est concocta, dum copia minuta, caliditasque remissa, & motus in caput refractus: cum magis possit virtus ad iudicandum vinum, quam materia morbifica ad prohibendum, ideo est exhibendum.

*Cetera res
non natu-
rales.*

Reliquæ res non naturales respiciunt facultatis custodiam, potissimum coëctricis, & hinc etiam aliarum facultatum: ideoque in his modus est seruandus, verbi gratia in cephalalgia, si magis coëctio desideretur, quam distributio; somnus superabit vigiliam, repletio inanitionem, quies motum: contra, si magis exoptetur distributio. Si proba sit concoctio & distributio, omnia hæc erunt mediocria, nullum excedet. Quod si ob malam dispositionem corporis, proportio mutetur, vt somnus plus iusto vigiliis excedat: tunc somnus excedens non est amplius materia diætetica, sed facta est mutatio in causam morbificam, vt in sermone de somno dicemus. Motus erit mediocris. Sunt etiam materiæ remedij anodynæ ratione iudicij, quæ pertinent ad animi accidentia, vt visus & auditus rerum iucundarum, cap. 7. lib. 1. de tuen. san. Hæc de cap. dolore.

CAPVT VIII.

De Phrenitide : & primum de Defini-
tione , & Causis.

 Voniam sæpe in cephalalgia per modum attra- *Transitio.*
ctionis caput ita repletur , vt oboxiatur affectio
putrida , & hinc inflammatoria , à sanguine vel
calidiora , vt fiat Phrenitis , vel frigida , vt fiat Le-
thargus : merito iam de Phrenitide & Lethargo est dicendum.

Phrenitidem Auicennas vocat Sirsen calidum , id est , apo- *Nomen.*
stema capitis calidum , voce Persica : & Karabitum , voce Ara-
bica , quod significat , delirium perpetuum. Nec ταυτολογεί
Auicennas , dum proponit Sibare : per hoc enim non intelli-
git Karabitum in genere , sed in specie delirium atrabila-
rium , quod Alexander vocat phrenitidem ferinam. Gale-
nus *φρενιδα* vocat , i. prorhet. 4. Loquemur autem nos de
phrenitide exquisita : in qua necessario adest delirium perpe-
tuum , & febris secundaria. Hæc ita generatur. Succus ve- *Generatio*
hementer calidus , procedens à toto , vel à parte , si vel trans- *phreniti-*
missus , vel attractus caput petat , & ita per cerebrum eius- *du.*
que membranas excurrat , vt & membrana potissimum te-
nuis , tumore calido : cerebrum autem intemperie calida
cum materia afficiatur : fit Phrenitis. Si membranae primum
afficiantur , præcedit dolor. Et cum cerebrum calido mor-
bo afficiatur : ita labefactatur princeps cerebri facultas , vt
eius actio necessario corrumpatur , hincque fiat delirium
assiduum.

Phrenitis ergo seu delirium phreniticum , est actio depra- *Definitio.*
uata principalis cerebri , dependens ab intemperie calida
cum materia , coniuncta cum tumore calido membrana-
rum. In hac doctrina sequimur Galenum , in commen. lib. 1.
prorhet. cap. 8. lib. 4. de præf. puls. cap. 7. lib. 2. de causis symp.
cap. 7. lib. 3. de loc. aff. com. 73. sect. 2. lib. 1. Epid.

Forma est functio principalis deprauiata : nō morbus , cau- *Forma.*
sa , vel symptoma excrementorum aut affectus inutatis
deoque dum Auicennas ait , phrenitidem esse apostema ca-
dum , tradit definitionem non per causam formalem , sed
per efficientem. Per deprauiatam etiam actionem , distin-
uitur phrenitis , ab actione imminuta & ablata , id est , à fatui-
tate & amentia. cap. vlt. lib. 2. de caus. symp. Vt phrenitis est
functio

functio deprauata principalis: distinguitur ab eo vitio in quo laeditur actio non principalis. Vbi notandum in instrumento actionem principalem, vel simpliciter, vel secundum quid esse principalem. Simpliciter principalis est vncia: nam vni instrumento tribuitur vnica actio principalis, vt cerebro ratiocinatio. Actio principalis secundum quid, dicitur principalis, ratione actionum inferiorum: vt imaginatio, non est actio cerebri principalis, ratione discursus: sed si referatur ad actiones cerebri naturales, est principalis. In praesentia nos intelligimus deprauatam actionem principalem, & simpliciter, & secundum quid, id est, imaginationem, & discursum.

Subiectum.

Subiectum phrenitidis est cerebrum. cap. vlt. lib. 2. de loc. aff. Sed notandum, cum ad facultatem cerebri principalem pertineat discursus imaginatrix, & memoria: in phrenitide deprauari discursum & imaginationem: memoriam non deprauari, sed auerri: vnde matulam petunt, vt mingant, mingere tamen obliuiscuntur.

Causa efficiens, ut in functione exprimitur.

Quae in definitione sequuntur (nimirum dependens ab intemperie calida, &c.) spectant causam efficientem. Dependens, dicimus: quia forma phrenitidis est actio, & quid in fieri. Addimus, ab intemperie calida, cum materia: ad differentiam lethargi, in quo cerebri morbus est tumor. Praeterea dicimus, cum tumore calido membranarum, ad differentiam maniae, & assidui delirii e septo transuerso. Nam In mania functio princeps deprauata, dependet ab intemperie calida, vel sine, vel cum materia: sed citra tumorem membranarum. Sic in delirio perpetuo e diaphragmate, non est tumor in membranis, licet cerebri functio princeps deprauetur, sed in transuerso septo est vitium. Hinc Galenus cap. 14. lib. 4. de caus. puls. respiciens ad causam, vt est tumor ait, lethargum fieri ex affecto cerebro: phrenitidem, ex affecta pia matre, & ex affecto diaphragmate: respicit enim ad tumorem inflammatorium, qui in lethargo pertinet ad cerebrum, in phrenitide exquisita ad membranas, in spuria ad diaphragma. Quare in phrenitide legitima subiectum causae formalis, est cerebrum, ratione tumoris: subiectum autem causae efficientis, est cerebrum: ratione intemperiei. Hae superficie tenus de causa efficiente.

Plenior

causa eff.

declaratio.

Verum cum tota pene curatio ex his dependeat: exactius singula erunt explicanda. In phrenitide igitur, ratione causae efficientis

efficientis, duo sunt morbi: Calida dyscrasia cum materia: tumor calidus membranarum. Calida est dyscrasia cum materia: nam in phrenitide non abundat humor in cerebri ventriculis, alias cerebrum afficeretur vt pars instrumentalis: sed abundat in cerebri substantia, cum cerebrum afficiatur vt simile. cap. 7. lib. 3. de loc. aff. Porro intemperies hæc est calida, quia actio deprauatur: non frigida, quia nec imminuitur, nec aboletur. Calida autem hæc intemperies, modo Humidam, modo Siccam dyscrasiam habet coniunctā: quia materia illa calida vel est Sanguis, vel sanguinis Ichor, & Bilis. Dum enim sanguis exsuperat, citra tumorem, parit intemperiem calidam & humidam: quæ, cum habeat annexam inflammationem membranarum, fit vt oriatur delirium asiduum. Et talis phrenitis est exquisita, sed non exacta: ad differentiam phrenitidis exquisitissimæ, quæ fit ab intemperie calida & sicca, de qua tit. 3. lib. 1. prorrheticorum, Intemperies hæc morbosa, occupat cerebrum, vel secundum Partem, vel secundum Totum. Si secundum partem, est intemperies inæqualis, quæ in vna parte est intensior, in alia remissior: ita vt etiam in vna parte intemperies possit esse morbosa: in alia intra sanitatis latitudinem. Et ex hac intemperie fit phrenitis tumultuosa. Si dyscrasia ad totum pertingat cerebrum, est intemperies æqualis, excitans phrenitidem hecticam, quæ primum est in habitudine, mox in habitu. Æqualis quidem fit intemperies, si materia morbifica occupat totum cerebrum: inæqualis, si partem. tit. 33. lib. 1. prorhet. Est etiam alia differentia dyscrasiæ æqualis & inæqualis: nam in inæquali cerebrum non afficitur tumore, cap. 8. lib. 4. de præf. è puls. vt enim tumore afficiatur cerebri substantia, necesse est, vt materia morbifica prius occupet totum cerebrum. Materia ergo in phrenitide primum fluit, secundo hæret secundum partem cerebri, tertio hæret secundum totum cerebrum. com. 73. sect. 2. lib. 1. Epid. & tandem fit tumor etiam in substantia cerebri: vnde Auicenna ait, phrenitidem interdum fieri ex apostemate cerebri, & Paulus inquit, in phrenitide cerebrum modo caliditate affici, modo inflammari. Et hæc de intemperie, ad cerebri substantiam pertinente.

Calida intemperies cerebri.

Intemperies cerebri æqualis, vel inæqualis.

Phrenitis tumultuosa & hectica.

Tumor membranarum in phrenitide necessarius est, c. 14. l. 4. de caus. puls. aph. 73. sect. 2. l. 1. Epid. c. vlt. l. 2. de caus. symp.

Tumor meningum.

Cum autem omnis tumor sit morbus in intemperie, nō autem

tem

tem necessario in mala compositione: quæritur, cur in phrenitidis finitione propositus sit membranarum tumor, non autem intemperies calida, cum materia tendente. Sciendum igitur inflammationem dupliciter sumi posse: primum, ut est morbus, separatus ab alio quocunque morbo: secundo, ut est tumor, separatus, non ab aliis morbis, sed ab aliis tumoribus. Primo modo, inflammatio est intemperies calida & humida, cum sanguine tendente. cap. 12. & 13. l. de morb. differ. c. 3. lib. de inæq. intemp. & hoc modo, inflammationis genus est intemperies: (quæ in inflammatione semper est morbus) non tumor, qui non semper morbus est, sed interdum morbus, interdum symptoma, secundum Galenum locis citatis. Si inflammatio sumatur secundo modo, pro tumore separato ab aliis tumoribus, ut sumit Galenus in l. de tumoribus præter naturam, definitur: quod sit tumor præter naturam, cum intemperie calida, & materia sanguinea. Per tumorem enim seu per genus, convenit inflammatio cum reliquis tumoribus: Additur cum intemperie calida, ad differentiam scirrhi, œdematis: Additur etiam cum materia sanguinea, ad differentiam erysipelatis & cancri. Secundum priorem modum, intemperies in inflammatione primum locum obtinet: tumor secundum, quia non semper est morbus. Secundum posteriorem modum, primum locum obtinet magnitudo aucta, quia tumor est morbus partis instrumentalis, ad differentiam similis: secundo, est morbus in intemperie. Soluta unitas excluditur in inflammatione, nisi coniungatur vlcus: ut enim Galenus ait, cap. 11. l. de differ. morb. si membrum inflammetur citra vlcus, tres sunt morbi, vnus in mala compositione, alter morbus calidus, tertius humidus: at si membrum sit inflammatum & exulceratum, tunc sunt quatuor morbi. Notandum quoque in inflammatione ante suppurationem tres solum esse morbos: suppuratione autem accedente, addi quartum morbum: vnde Auicenna dixit, in tumore præter intemperiem & malam compositionem esse etiam morbum in soluta continuitate. Cum ergo in membranis cerebri sit tumor, qui necessario est morbus, propterea in definitione propositus est potius tumor, quam intemperies. Hic autem tumor cum sit calidus, potest esse inflammatorius, erysipelaceus, & canerosus. Inflammatorius fit à sanguine feruente, qui est in confinio bilis flauæ, vnde excitat delirium perpetuum,

*Inflam-
matio.*

petuum, causatque phrenitidem exquisitam. Erysipelas exquisitum dupliciter sumitur: vel enim simpliciter est exquisitum, vel secundum quid. Exquisitum simpliciter in cute tantum consistit, non in partibus profundioribus. cap. 1. & 3. l. 14. meth. & producitur ab ichore sanguinis, vel etiam à flava bile, sed mista cum serositate, aut cum ichore sanguinis. Quod fiat ab ichore sanguinis, testatur Galenus cap. 1. lib. 2. ad Glauc. ubi ait, erysipelas fieri à sanguine tenuissimo & calidissimo, id est, ex ichore sanguinis, quem Galenus interdum vocat bilem rubram. Quod autem erysipelas etiam fiat à bile flava, testatur Galenus commen. apho. 2. l. 1. aphorismorum, & cap. 5. l. 2. de diff. febr. & l. de atra bile. Sed notandum, quod Galenus locis citatis, per bilem flavam intelligat, separatam à sanguine, pituita, & melancholia, mistam tamen cum ichore sanguinis, vel cum serositate, non cum humore. Flava bilis sincera, exulcerat: ideoque non producit erysipelas, sed herpetem: necesse igitur est, ut misceatur cum ichore sanguinis, vel cum serositate, in producendo erysipelate. Hinc, cum Galenus cap. 10. lib. de tumoribus præter naturam, ait, causam erysipelatis esse bilem, mistam vel sanguini, vel aquoso sanguini: hic per sanguinem non intelligit humorem sanguineum, sed ichorem sanguinis: si enim bilis misceatur cum succo sanguineo, non ichoroso, non seroso, fit erysipelas phlegmonodes: at ibi Galenus loquitur de erysipelate exquisito, quod non est particeps inflammationis. His consentit, quod scribit Galenus cap. ult. l. de plen. solam bilem nec tumorem, nec pondus producere: nam antequam fiat tumor & sensus ponderis, bilis hæc exulcerat. Cum autem Galenus cap. 12. lib. de cris. ait, bilem impermistam & copiosam, facere erysipelata & herpetes, id oportet intelligere hoc modo, ut bilis separata ab humoribus, mista autem ichori sanguinis, vel serositati, producat erysipelas: separata vero etiam ab ichore sanguinis, producat herpetes. Eodemque prorsus modo intelligendus est Galenus cap. 5. l. de different. febr. Dubitatur autem, quomodo Galenus dicat, erysipelas indicari colore pallido, vel flauo, vel misto, cap. 1. & 9. lib. 14. method. Responsio: erysipelas fit à flava bile, mista cum serositate. Hæc autem mistio triplex esse potest: aut enim portio serosa dominatur, unde color pallidus: aut flava bilis dominatur, unde color flauus: aut æquales

æquales vtriusque sunt portiones, vnde color medius inter flauum & pallidum. Hac de erysipelate externo exquisitiss.

*Erysipelas
internum.*

Erysipelas exquisitum, producitur ab ichore sanguinis, & è flaua bile, mista vel cum ichore sanguinis, vel cum serositate: sicuti dictum est de erysipelate externo: sed præterea erysipelas internum, fit etiam à flaua bile, quæ serositati expers est, ad differentiam externi erysipelatis. Hinc Galen. cap. 7. l. 3. de loc. aff. ait, phrenitidem exquisitam initiorē fieri à bile pallida, id est, à bile flaua, permista cum serositate: vehementiorem, à bile flaua, separata à serositate. Hac de causa etiam vehementior phrenitis produci potest à bile æruginosa, com. 10. lib. 1. prorrh. Si enim phrenitis fit ab atra bile, id est, à flaua præassata, cap. 7. lib. 3. de loc. affect. multo magis fieri potest phrenitis à bile æruginosa, quæ minus praua est, quam atra.

*Cur erysipelas
externus
non fiat à
sincera bile
flaua.*

Quæri autem potest, cur erysipelas cutaneum non possit fieri à flaua bile sincera, sicut internum: sed necessario permistum habeat sanguinis ichorem, vel serum? Responsio. Allium appositum exulcerat, per os assumptum non exulcerat, quia partes externæ promptius patiuntur quam internæ: præterea allium appositum non refringitur à cibo, quæmadmodum si assumitur.

Similiter de flaua bile statuendum: nam cum sincera est, exulcerat partes externas, non internas, quia partes externæ, vt imbecilliores, facilius patiuntur: præterea bilis sincera, in partes externas producta, si separata sit à sanguine ichoroso & sero, facile exulcerat, cum non assit, quod bilem flauam possit corrigere: at dum flaua bilis ad internas fluit partes, non prorsus expers esse potest sanguinis & serositatis: & propterea ab his mitigatur acrimonia, ne exulceret, vt hinc fiat erysipelas: licet autem nascantur sanguis & serum, hæc tamen non sunt causa principalis, quia non sunt in magna copia. Ex his concludendum in phrenitide exquisita, tumorem esse erysipelaceum: qui produci potest ab ichore sanguinis, à bile pallida, flaua, & æruginosa.

*Cancerosus
tumor.*

*Causa generans materiam mor-
bificam in
phrenitide.*

Tandem phrenitis etiam producitur à tumore cancroso, qui fit à flaua bile præassata, & in atram versa. cap. 10. lib. 1. prorrh. c. 7. l. 3. de loc. aff.

Ex his ergo patet, quicumque tumor sit in phrenitide, materias morbificas esse vehementer calidas. Generantur hæc materiæ extra caput, non in capite, sed hepate: idque vel

ob

ob Errorem externum, vt è medicamentis calidis, victu calido; vel Læsa hepatis facultate: quæ vel Impeditur ob angustiam, vel Labefactatur ob intemperiem calidiorem; siue sit natiua, siue ascititia, siue in habitudine, siue in habitu. Materia autem genita in hepate, fuit ab Hepate, vel à Toto corpore, & fuit, vel Transmissa, vel Attracta. Hæc ad explanationem definitionis.

Porro è proposita definitione colligitur, phrenitidem esse morbum compositum, & quidem primum (non ex accidente) totius instrumenti, id est, cerebri, quatenus hoc est compositum è propria substantia & membranis: est enim intemperies calida cerebri, est morbus in magnitudine, est intemperies calida meningum. Hæc demonstrari possunt è cap. vlt. l. de morb. diff. Morbus enim, vel est Simplex, vel Compositus, Simplex est intemperies, aut mala compositio. Intemperies est morbus per se partis similis, ex accidente totius instrumenti, quatenus singulæ instrumenti partes intemperie laborant. Mala compositio est morbus, primo totius instrumenti: vnde Galenus ait, cap. 6. l. 2. meth. si hepatis vena afficiatur intemperie, morbum esse ex accidente hepatis; at si vena hepatis afficiatur obstructione, morbum esse primo totius hepatis. Et cap. vlt. l. de diff. morb. si membrum luxatur, & inflammatur, luxatio est morbus primum totius instrumenti, inflammatio autem, id est, intemperies ex accidenti est morbus totius instrumenti. Morbus compositus, occupat vel vnā instrumenti partem, vel plures. Si vnā, est morbus compositus, ex accidente totius instrumenti: vt si oculi sola tunica annata afficiatur inflammatione & ulcere; item si vena hepatis afficiatur & obstructione & intemperie. Quod si morbus compositus occupat plures instrumenti partes: tunc primo, non ex accidente, est morbus totius instrumenti. Recte ergo phrenitidem diximus morbum compositum primo totius instrumenti.

*Phrenitis
est morbus
compositus
primo totius
cerebri.*

De differentiis.

Differentiæ phrenitidis sumuntur à Forma, Subiecto, & Differentia. Forma est functio principalis deprauata. Hinc tres species oriuntur: aut enim deprauatur Imaginatio, aut Ratio, aut vtrique actio c. 2. l. 4. de loc. aff. c. 3. lib. de diff. temp. Excluditur memoria, nam hæc imminuitur, vel aufertur, non deprauatur: læditur autem, quia in phrenitide phan-

*2. à Forma.
3. à Differentia.*

tasinata plus iusto numerosa memoriae offeruntur.

2. à Sub-
iecto.

Differentia à subiecto. Cerebrum in phrenitide afficitur, secundum sedem vel Anteriorem, vel Mediam, vel vtramque; ventriculus enim anterior est locus apprehensionis interioris, postremus memoriae, medius cogitationis. Nec obstat, quod in phrenitide lædatur totum cerebrum: quatenus enim cerebrum secundum se totum afficitur, non est subiectum

Anima
sentientis
interiores
facultates
sedibus esse
disclusas;

formæ, sed est subiectum causæ efficientis. Quare statuendum est cum Auicenna in cap. de anatom. cerebri, & cum omnibus Græcis, principes cerebri facultates diuersas sedes obtinere: quatenus enim sunt facultates determinatæ, postulant sedes donatas peculiari proportionem; sicut facultas *χλωρῆς & αἱματοποιτικῆς*. Stabilire hoc videtur Galenus comment. cap. 27. lib. 1. prophet. inquit, si humor in vna aliqua cerebri parte firmetur, consequi symptomatis speciem, quæ peculiaris & affinis sit, tum naturæ partis, tum humori, verbi gratia, si humor firmetur in parte anteriore, oboritur phrenitidis species, in qua læditur imaginatio; item, si humor sit sanguineus, oritur phrenitidis species, quæ est cum risu, ratione sanguinis. Addit Galenus: dum materia transiit in cerebro, de vna parte in aliam, seruari speciem affectionis, id est, manere vitium phreniticum, ab aliis affectibus separatum (non enim ita debent hæc intelligi, ut à multis eo rapiuntur, quasi tunc seruentur species, seu differentia phrenitidis eadem; sic enim Galenus sibi ipsi contradiceret) sed pro parte affecta symptomata permutari, ut modo imaginatio, modo ratio lædatur. Aduersarij ex hoc loco concludunt: si, dum materia sedem in cerebro mutat, eadem tamen species phrenitidis manet, permutatis solum symptomatis; facultates sane principes non differunt loco subiecto. Responsio. Non manet eadem species phrenitidis, sed eadem species morbi.

3. à Causa
efficiente.

Differentia à causa efficiente. Causa efficiens est vel in Cerebro, vel in Membranis. Causa efficiens, residens in cerebro, semper est intemperies calida cum materia: eaque modo Humida, modo Sicca; præterea modo Aequalis, modo Inæqualis: & si æqualis, vel in Habitudine vel in Habitu. Porro, quoniam intemperies est cum materia; etiam materia subdiuidi potest. Consideratur enim vel secundum Speciem, vel secundum speciei Vitium. Quoad speciem: est quidem materia calida; sed hæc potest esse, vel Ichor sanguinis.

nis, vel Humor: si humor, Sanguis, vel Bilis: bilis, Mistra, vel Sincera: mistra, cum Ichore sanguinis, vel cum Serositate: si bilis flaua est sincera, est vel Exusta, vel Non exusta: si non exusta, vocatur bilis flaua: si exusta, hæc mutatur vel in Æruginosam, vel Atram, à qua producitur phrenitis ferina. Vitium materiæ, pertinet ad Copiam, vel ad Vbi. Ad copiam, vt vel Non tendit, vel Tendit, cum nimirum est in summa copia. At vbi vitium pertinet, vt materia occupat cerebrum, vel secundum Partem, vel secundum Totum. Causa efficiens, residens in membranis, est tumor calidus: qui est, vel Inflammatorius, vel Erysipelaceus, vel Cancerosus. Causæ autem horum tumorum fuere propositæ à Galeno, lib. 1. prorhet. ab initio vsque ad com. 33. & com. 73. sect. 2. l. 1. epid. cap. 3. lib. de different. sym. cap. 2. lib. 4. de loc. aff. cap. 4. lib. 5. de loc. aff. cap. 10. lib. 3 de caus. puls. cap. 14. lib. 4. de caus. puls.

De signis.

Signa phrenitidis, alia Imminentem indicant, alia Præ-
 sentem. Imminens indicatur è vigiliis, è somno turbulento, sermone immodico, dolore occipitis, ex vrina primum crassa & opaca, mox tenui & diaphana, è calore capitis, ex oculorum mutatione; conspiciuntur enim squalentes, & color eorum mutatur. His symptomatis significatur, materiam calidam caput petere: vnde læso cerebro, oculi magna è parte spiritu animali destituuntur, vt propterea secundum colorem mutantur. Quod autem imminente phrenitide, dolor occiput tenet, causa est, quia vena circa iugulum in duos ramos diuiditur, qui per vertebrae retro ascendunt ad caput. Phrenitis præsens in genere indicatur è delirio assidu-
 Signa im-
 minentis
 phreniti-
 dis.
 duo, quod ad remissionem malorum extra caput non remittitur, quoniam videlicet cerebrum primaria affectione laborat. Indicatur præterea è vigiliis turbulentis, quia calor naturalis quasi inflammatus, foras mouetur. Indicatur à respiratione magna & rara; nam phrenitici respirare obliuiscuntur, cap. 3. lib. 1. de diff. respir. vnde cum per obliuionem rara fiat respiratio, magnitudine raritas suppletur. Potest etiam alia causa reddi; nam quia facultas motrix à cerebro prodit, beneficio spirituum animalium; sane dum cerebrum læsum est, facultas motrix non ita petit musculos, & hinc rara fit respiratio: cum autem propter febrem augeatur necessitas auctauidi calorem cordis, hinc magna fit
 Signa præ-
 sentis phre-
 nitidis in
 genere.

respiratio. Et per hanc respirationem phrenitis distinguitur ab inflammatione diaphragmatis: tunc enim respiratio modo est exigua & frequens, modo magna & angustosa. Indicatur etiam phrenitis e siti non multa, quamvis presentes sint intensæ sitis causæ: ratio est, quia mens agrotat: item quia animales spiritus ob læsum cerebrum, non mittunt radios sufficientes ad os ventriculi superius, ad quod sitis pertinet. Pulsus in phrenitide, est parvus cap. 14. l. 4. de caus. puls. quia cor compatitur: itemque durus, ob membranam cerebri inflammatam: item celer & creber, quia summa adest necessitas propter febrem: non nihil vndosus est, quia afficitur cerebrum, quod est membrum molle: interdum est subtre-mulus, dum virtus languet, & syncope imminet: pulsus est præcisus, cum convulsione quadam; nam ob necessitatem natura nititur extendere arteriam, quæ tamen duritie sua obstat. Præsens etiam phrenitis indicatur è febre continua, & sæpe continente: meningum enim tumor calidus est continuus: indicatur è continente febre, quia propter tumorem calidum meningum, sæpe putredo in magnis vasis oritur: ideoque si phrenitis sit mitior, & fiat trāsmissio à venis magnis ad parvas, tunc accessiones magna è parte sunt de tertio in tertium, com. aph. 12. sect. 1. magna è parte, ait Galenus, quia interdum accessiones fiunt de quarto in quartum, dum scilicet tumor est atrabilarius. Indicatur etiam præsens phrenitis, è lingua aspera, modo nigra, modo citrina; quia vapores linguam petentes, primum absument humiditatem linguæ extimam, vt sicca fiat, deinde etiam interior, vt lingua fiat aspera seu inæqualis: &, si vapor sit simpliciter biliosus, lingua apparet citrina; si vehementer exustus & fuliginosus, nigra: quamvis etiam nigredo fiat à calore vehemente, qui partes diaphanas absument.

Signa differentiarum.

1. *A forma.*

2. *A subiecto.*

Signa differentiarum à Forma, sunt facilima: hæ enim differentie cognoscuntur è modo delirij, cap. 2. lib. 4. de loc. aff. cap. 3. lib. de sym. diff. Verbi gratia, si quis phreniticus imaginetur strepitum fieri in suo cubiculo, & iubeat expelli strepitus auctores: læsa sane est imaginatio, non ratiocinatio. Sed hæc facilia.

Differentie etiam à subiecto facile cognoscuntur: si enim totum cerebrum afficiatur, vt Aëtius monet, omnis cerebri actio principalis erit læsa: si sola imaginatio, læsa est pars anterior, &c. Signa causæ efficientis sequuntur. Causa efficiens

ciens spectat ad cerebrum, vel ad membranas. Quantum ad cerebrum, causa efficiens est intemperies calida cum materia: (de materia dicendum, ubi sermo erit de causa efficiente, residente in membranis) ideoque circa intemperiem cognoscendum, num sit humida, an sicca: secundo an æqualis. Intemperies calida & humida cognoscitur è signis indicantibus sanguinem: de quibus infra. Præterea è delirio cum risu, Intemperies calida & sicca cognoscitur, quia symptomata sunt fortiora, nec deliria fiunt cum risu, quia ipsorum causa est ichor sanguinis, bili admodum confinis. Si intemperies sit inæqualis, ægri exclamant, loco consistere nequeunt: vnde phrenitis hæc tumultuosa vocatur, com. 33. lib. 1. prorhet. Si æqualis est intemperies, non ita patet phrenitis, sed est obscura & blanda: vnde vocatur phrenitis hectica: quam prudens medicus cognoscet, quia prægressa est phrenitis tumultuosa, quæ postea ita delitescit, ut dormire ægri videantur, cum tamen non dormiant: præterea ægri manus mouent citra impetum, ac si quid quærere aut tangere velint; nec mouent manus citra tremorem, qui tamen tremor solum apparet medico diligenti. Horum signorum ratio est hæc: cum enim afficiatur cerebrum, & secundum hanc intemperiem, & secundum calidum innatum, & secundum spiritus animales; fit ut omnes facultates lædantur; vnde licet aliquid inuenire studeant, quia tamen motrix languet, manuum motus est debilis, & cum tremore. & ideo cum vigilandi in potentia. Pulsus est paruus, quia cor læditur. Dignoscenda etiam est intemperies in habitudine, & in habitu: in habitudine est, si desierunt symptomata phrenitidis tumultuosæ: in habitu, si contra: sciendum tamen intemperiem æqualem in habitudine cito deduci in habitum. Cæterum intemperies cerebri coniunctam habet materiam, cuius vitium cognoscendum est, quatenus pertinet ad copiam, & ubi. Quoad copiam, si materia sit admodum copiosa, ut tendat: cognoscitur, quia futura coronalis veluti distrumpi videtur, oculorum venæ maxime turgent, & sunt signa phrenitidis hecticæ in habitu. Quoad ubi oportet cognoscere, materiam, ut occupat vel totum cerebrum, vel partem. Si pars occupatur, erunt signa phrenitidis tumultuosæ: si totum, erunt signa phrenitidis hecticæ. Causa efficiens, pertinens ad membranas, est tumor inflammatorius, erysipelaceus, canerosus. Inflammatorius cognoscitur

3. *A cau-
sa effc.*

*Intempe-
ries cerebri
signa.*

1.

2.

3.

*Vitij mate-
ria signa.*

*Tumoris
meningum
signa.*

è signis indicantibus sanguinem, è delirio cum risu, è rubore oculorum, è plenitudine venarum capitis, è dolore non admodum vehementi & mordaci. Erythelaceus, fit ab ichore sanguinis, à bile pallida flaua. æruginosa. Si ab ichore sanguinis, signa aderunt copiosi sanguinis in toto redundantis: & cum ichor sanguinis accedat ad naturam bilis; indicatur è delirio sine risu, è deliriis molestis, ex oculorum rubedine tendente ad flauitiem. Si fiat à bile pallida; cognoscitur è delirio sine risu, è vigiliis adhuc magis assiduis, ex oculorum rubedine remissa, & vergente ad flauitiem satis remissam, præterea è calore acri. Si fiat à flaua bile; omnia sunt deteriora, & oculi sunt flauis, caliditas est admodum acris in capite, assunt signa flauæ bilis in toto exsurgentis.

Si fiat à bile æruginosa: tunc omnia symptomata adhuc sunt deteriora, delirium nequaquam cum risu, & ægrotantes sunt propensi ad percutiendum, vigiliæ sunt pertinacissimæ, oculorum color flauus, cum obscuritate, & calor acerrimus, delirium est ferinum, & si sunt accessiones inuadunt de quarto in quartum.

De indicationibus.

Indicationes. Indicationes sumuntur à Virtute, & Rebus præter naturam. Virtus totius languens, indicat alimentum, cuius beneficio custoditur quantitas & qualitas partium viuentium, & spiritus. Virtus partium capitis, capitalia requirit. Res præter naturam, pertinent vel ad Caput, vel ad ea quæ sunt Infra caput. Quæ pertinent ad caput, sunt Dyscrasia cerebri calida cum materia, & Tumor calidus meningū. Omittimus causas fluxionis. Si enim fluxio fiat per attractionem; & primum propter dolorem; in phrenitide non habet locum, quia mens ægrotat; si fiat attractio propter calorem, hic corrigitur vt intemperies calida. Si fluuius fiat per receptionem: vt per vnitatem, & humiditatem: hæc vitia coniunguntur reprimentibus & astringentibus, & siccantibus. Quare ratione capitis indicatio desumitur, ab intemperie calida cū materia, & à tumore calido. Quoad res præter naturam, infra caput existentes, vel sunt Contenta, vel Continentia. Contenta, vt materiæ morbificæ: continentia, vt febris, quæ semper pertinet ad putredinem: & quandoque

Est intemperies calida iecoris. Ab his ergo indicationes sunt delumendæ. Intemperies calida indicat refrigerantia: si sicca, etiam humectantia: si humida, siccantia. In omni quidem phrenitide est refrigerandum, magis tamen ubi dyscrasia est calida & sicca: unde in phrenitide erysipelacea magis refrigerandum, quam in sanguinea. Hinc Galenus cap. 8. lib. 13. meth. ait, in erysipelate magis refrigerantia, in inflammatione magis euacuantia indicari. Notandum obiter, intemperiem, quatenus ut morbosa consideratur, esse indicans curatorium: at si capiatur intemperies verbi gratia meningum, uti causa est intemperiei cerebri, indicatio statui potest præseruatoria. Hæc intemperies indicat. Quoad materiam; tam ea quæ tumoris est causa, quam quæ coniuncta est cum intemperie calida in substantia cerebri, est indicans curatorium: eæ enim materię sunt causæ continentes ex usu: remota enim materia, quæ tumorem meningum efficit, remouetur etiam tumor: idem dicendum de materia, quæ fouet cerebri dyscrasiam. Materię igitur varia species, indicat remedia determinata, verbi gratia sanguis, ut est species huius materię, indicat remedium, quod dirigitur ad sanguinem, id est, ad hanc speciem tumoris, &c. Item pro vario vitio specierum, varia etiam indicantur præsidia; prout vitium est in substantia, quantitate, qualitate, & ubi. Si vitium est in substantia, id est, si materia feruens computruit, quod semper fit; indicatur præsidium è toto euacuans, seu eradicans: modo magis, modo minus, pro materię copia. Eradicatio enim materię in tumoribus, secundum Galenum cap. 9. lib. 13. meth. fit vel per Translationem à capite ad alias partes: vel per Expulsionem extra corpus. Translatio fit per Impulsionem, vel Attractionem. Impulsio fit, dum partes repletæ materiam expellunt, ope reprimentium. Attractio fit, dum partes sanæ attrahunt à læsa parte, ope caloris & doloris. Expulsio extra corpus, fit per effluxus Sensibiles, vel Insensibiles. Effluxus sensibilis fit, vel per meatus capitis, tumore affectos, vel per meatus partium vicinarum, quarum dum meatus aperiuntur, etiam aperiuntur meatus partis affectæ: & hæc vacuatio fit per modum deriuationis. Effluxus insensibilis, fit per poros cutis capitis, quæ vacuatio dicitur resolutio, discussio & relaxatio. Hi ergo sunt modi eradicationis materię, tum fluxilis, tum impactæ: fluxilis enim cedit remediis

*Dyscrasia
calida.*

*Materia
morbifica.*

*Reprimens
non esse
indicatū.*

repellentibus, attrahentibus etiam ad partes sanas, & euacuantibus per meatus sensibiles: impacta tantum cedit digerentibus. Vnde obiter contra nonnullos notandum, reprimens non esse indicatum, quia respicit materiā & fluentem, & fluxam: quæ cum duo sint indicantiā, non possunt vnum indicare. Quod autem reprimens dirigatur ad materiam fluentem & fluxam, colligitur ē cap. 17. lib. 14. metho. ubi asseritur, quod in generatione vlceris, dum materia fluit, reprimentibus in maiori copia vti debeamus, quam dum materia non fluit. Quod etiam colligitur ē ca. 16. lib. 13. meth. cap. 15. lib. 11. meth. cap. 2. lib. de tum. præter naturam. Verum dubitare quis posset, cur digerentia & reprimentia, non indicata, sed modi vacuationis, seu eradicationis dicantur: cum tamen methodus docere videatur, materiam impactam esse digerendam, fluentem & fluxam, sed nondum impactam, esse reprimendam: id quod methodus per indicationes docere videtur. Respondendum: hanc doctrinam pertinere non ad methodum medendi, sed ad methodum medicamentorum, quæ nos docet, eam esse viam in medicamentis reprimentibus, vt vacuent materiam tam fluentem, quam fluxam, sed nondum impactam: medicamentorum etiam methodus docet, digerentia non obtinere facultatem, vt vacuent materiam impactam. Haftenus de indicationibus, quæ sumuntur à rebus præter naturam, in capite existentibus. Res præter naturam, quæ sunt infra caput, sunt Contenta, vel Continentia. Contenta vt varia

Contenta.

sunt specie, ita etiam determinata indicant remedia. Contentorum autem vitia in phrenitide, ad quæ indicationes diriguntur, pertinent ad Formam, Quantitatem, Qualitatem, & Motum: ad formam, quia materia putrescit: ad copiam, quia fieri vix potest, vt in corpore non peccet, humor vel principalis, vel non principalis: ad qualitatem, quia contenta sunt calidiora, & adhuc calidiora redduntur, ratione febris: ad motum, nam materia infra caput existens, caput petit. Hinc oriuntur indicationes: nam materia putrida est eradicanda, copiosa minuenda, calidior refrigeranda, & quæ mouetur retrahenda. Retractio fit per impulsiones, vel per attractionem à capite infra caput, vel interceptionem. Retrahens enim est indicatum, quod indicatur à motu vitioso materiæ morbificæ: impulsio, attractio, interceptio, non sunt indicata, sed sunt modi retractionis. Impulsio, seu

*Retractio-
nis modi.*

reper

repercussio, est modus retractionis, quo materia habens impetum in caput in phrenitide, retrahitur, ut acquirit motum deorsum: & sic repercussio, ratione materiæ fluentis, est modus retractionis: interim tamen ratione materiæ fluxæ, est modus euacuationis. Attractio, est modus retractionis, ad partes inferiores, à capite: attractionis autem modus est duplex, deriuatio, & reuulsio: deriuatio dicitur, dum fit attractio ad partem loco affecto vicinam: reuulsio dicitur, dum fit attractio ad partes remotas. cap. 6. & cap. 11. lib. 13. meth. & hæc reuulsio spectat materiam fluentem tantum, deriuatio respicit & fluentem proximam, & fluxam, sed non impactam, cap. 2. lib. 2. ad Glauc. Interceptio est, qua materia retrahitur, sed citra impulsione, & citra attractionem à parte affecta: si enim quis verbi gratia frigida abluat os, fit retractio materiæ, quæ caput petit; citra tamen impulsione & attractionem. Hæc de indicationibus Contentorum. Continentia in phrenitide sunt partes similes corporis totius, ratione febris: & præterea ratione iecinoris, est intemperies calidior: unde oritur indicatio refrigerandi & humectandi totum corpus, sicut & iecur; præterquam in phrenitide sanguinea, in qua iecur refrigerandum & exsiccandum est, cum ob caliditatem & humiditatem, copiosum generet sanguinem.

De præsagiis.

Artem prognosticandi in duobus posita est: primum, ut prænoscamus, an victoria sit futura, vel è parte morbi, vel è parte virtutis: secundo, ut prænoscamus, num victoria cito vel tarde sit futura. Num victoria sit futura è parte morbi, vel virtutis, cognoscitur è vehementia rerum præter naturam, & virtutis. Virtus postulat discursum generalem, de quo in præsentia non est agendum. In rebus præter naturam, perpendenda est vehementia triplex: essentiæ, dignitatis, & facultatis, idque & secundum morbum in genere, & secundum differentias. Num autem victoria cito vel tarde sit futura, cognoscere oportet è motu morbi tardo, vel veloci, in quam sententiam Galenus cap. 4. lib. 3. de crisi-
 1. bus ait, in morbis considerari debere, speciem, vehementiam, mores, & motum: quibus verbis auctor respicit, tum ad victoriam futuram, tum ad victoriæ tempus. Hanc prognosticandi artem applicabimus phrenitidi.

*Generale
presagium,
de magni-
tudine hu-
ius affe-
ctus.*

Phrenitis ergo est vitium admodum periculosum, vt passim lib. 1. prorrh. docetur, nulla enim insignis vehementia desideratur. Essentia enim vehementia insignis est; quia est insignis recessus à naturali statu, secundum causas, morbos, & symptomata: Capitis intemperies calida est admodum vehemens, febris est assidua, causa etiam huius vehementia est insignis, materia enim est putrida & acris: symptomata quoque sunt vehementia, nam functiones principales corrumuntur, vigilie sunt insignes. Vehementia dignitatis adest maxima, nam intemperies propria ratione est vehemens, ratione dignitatis, quæ vehementia intenditur, quod in phrenitide occupatur cerebrum, cruciantur membranae, offenditur totum corpus. Vehementia tandem ratione facultatis est insignis in phrenitide: nam pulsus in hac vt plurimum sunt parui, vnde vitalis facultas debilis arguitur, ca. 14. lib. 4. de caus. puls. cap. 14. lib. 1. ad Glaucon. Phrenitis ergo vt plurimum est mortalis, non tamen perpetuo, com. 73. sect. 2. lib. 1. epid. vnde & Alexander gloriatur, se aliquos liberasse. Hæc de prognostico in genere.

*Differen-
tiarum pro-
gnostica.*

Iam de prognosticis differentiarum: cuius generis varia à Galeno proponuntur, lib. 1. prorrh. à com. 1. vsque ad com. 13. & lib. 1. epid. 2. 73. & lib. 3. epid. 3. 75. & aphor. 72. sect. 4. & aphor. 12. sect. 7. Versabimur autem circa differentias, quæ sumuntur à forma, & à causa efficiente: differentias à subiecto omitemus, nam dum perpendimus vehementiam dignitatis differentiarum, quæ sumuntur à forma & efficiente, patet etiam vehementia differentiarum à subiecto. In differentis à forma insignis est vehementia secundum essen-

*Prognosti-
ca differen-
tiarum à
forma.*

tiam; si delirium est multum. Insignis etiam vehementia ratione dignitatis, si lædatur & imaginatio & ratio: minor est vehementia, si sola ratio lædatur: adhuc minor, si sola imaginatio: vtrisque enim læsis, cerebrum afficitur secundum partem anteriorem & mediam, vna læsa, secundum vnā tantum. Omittitur vehementia facultatis, quia hæc à causa efficiente potissimum dependet.

*Prognosti-
ca differen-
tiarum à
causa effi-
ciente.*

Quoad differentias, quæ sumuntur à causa efficiente: pendere oportet vehementiam intemperiei & materiae. Quantum ad intemperiem: vehementia essentia est insignis, quia maximus recessus à naturali statu, & intemperies in summo gradu, vnde assidua sunt vigilie: est etiam vehementia secundum essentiam, dum intemperies est in habitu,

*1. Ab in-
temperie.*

ad differētiā intemperiei, quæ est in habitudine: vnde Galen. dixit, in fine lib. 12. meth. dum conuulsio succedit phrenitidi exitiali, actum esse, hæc enim phrenitis habet intemperiem in habitu. Ratione dignitatis vehementia est insignis, dum intemperies est æqualis, quæ occupat omnes cerebri partes. comm. 33. lib. 1. prorhet. vnde si intemperies in phrenitide est æqualis & in habitu, mors est prædicenda. Ratione facultatis vehementia est insignis, si symptomata sunt vehementiora: vt si motus voluntarius fiat debilis: si phrenitici admodum debiliter se moueant: si vox amittatur: si pulsus debilis: si aluus affatim excernat. cap. 14. lib. 1. ad Glau. (non enim sumitur prognosticum à voce amissa, & cæc. sed hæc tantum sunt signa, quæ patefaciunt vehementiam insignem ratione facultatis.) Quoad materiam in hac considerantur species, & vitium. Quoad speciem: si phrenitis fiat à sanguine, vehementia erit remissa: si ab ichore, intensior: si à bile flaua, adhuc intensior: ab ærugino-fa, adhuc intensior: si ab atra, intensissima. cap. 7. lib. 3. de loc. aff. atra enim bilis maxime à naturali statu recedit: at nō prorsus desperandum: nam Alexander fatetur, se liberasse phreniticum ex atra bile. Vitium materiæ pertinet ad substantiam, quantitatem, qualitatem, & vbi. Prout igitur materia magis erit putrida, copiosa, calida, & prout ea quæ fluit, maiori cum impetu caput petit, quæ autem fluxit prout magis quiescit: pro eo maior est vehementia secundū essentiam. Hinc febris verbi gratia in phrenitide, quo vehentior, eo vehementius materiæ vitium significat, secundum essentiam substantiæ, quantitatis, qualitatis, in febre enim vehementiore, materia magis est putrida, copiosa, calida. Adhæc si extensio obseruetur in cerebro, vt contingere solet in phrenitide hectica: insignis est recessus secundū copiam, vt phrenitis sit statuenda lethalis. Quod si materiæ vitium est vehemens secundum essentiam, ita lædi solet cerebrum, vt & ventriculus compatiatur, vomitusque fiat: qua de causa, comm. 10. lib. 1. prorhet. scribitur: vomitum in phrenitide pessimum esse, si fiat citra læsionem ventriculi. Facit quoque ad essentia vehementia, aphor. 72. sectio. 4. vrina enim alba & perspicua in phrenitide, significat magnam cruditatem, & insignem vehementiam materiæ, vt etiam facultas naturalis compatiatur: præterea hæc vrina significat flauam bilem in caput rapit, ideoque materiam esse vehementem

secundum

*1. A mater
ria.*

secundum motum. Hæc de vehementia materiæ secundum essentiam. Ratione dignitatis, insignior est materiæ vehementia, quatenus materia occupat plures capitis partes. Ratione facultatis, materiæ vehementia est maior, ut eius vis est vehementior. Si ergo rigor in phrenitide sit criticus, manifeste indicat remissionem vehementiam ratione facultatis, ut per sudorem liberetur phreniticus, & tunc sunt signa coctionis: contra indicatur insignis vehementia facultatis, si rigor sit symptomaticus, com. 13. lib. 1. prophet. si etiam sudor sit frigidus, & extrema frigida, com. 75. sect. 3. Epid. nam hæc symptomata significant vehementiam facultatis in materia morbifica admodum insignem, quia calor, una cum spiritu competit, & externa derelinquit. Adest etiam insignis vehementia ratione facultatis, dum phrenitis succedit inflammationi pulmonis, com. aph. 12. sect. 7. nisi enim cerebri facultas esset imbecillis, non admitteret materiam morbificam. Ex his ergo patet, phrenitidem ut plurimum esse lethalem, raro salubrem.

Quando salus, aut mors sit futura.

Num autem cito sit futura mors vel salus, prædicti potest esse motu morbi. Phrenitis enim ut plurimum velocis est motus, nec septimum pertransit, sed in sexto etiam interimitur. Quod si autem phrenitis non sit exacte exquilita: non est ita celeris motus, sed terminatur ii. 2. vel etiam 20. com. 75. sect. 2. lib. 1. Epid. Maxime autem motus velocioris aut tardioris signum esse solet febris: ardens enim est signum motus velocioris: non ardens, non ita velocis.

De Curatione.

Curatio.

*Vena sectio
comune remedium,
omnium specierum
phrenitis, secundum
Aueniennam.*

DE prognosticis hætenus egimus. Sequuntur remedia rum materia. Quoad cheirurgiam, in omni phrenitide vena est secanda. cap. 21. lib. 13. meth. quia in omni specie phrenitidis est vitium vehemens in sanguine. In sanguinea quidem phrenitide, sanguis habet rationem causæ principalis: in biliosa & atrabilaria, habet sanguis rationem causæ adiuvantis, vel causæ sine qua non: nisi enim sanguis misceretur cum bile, non fieret tumor sed exulceratio: & sic sanguis habet rationem causæ adiuvantis. Nec repugnat Galenus cap. 2. lib. 2. ad Glau. dum ait, in erysipellate non esse secandam venam: loquitur enim de erysipellate externo: at phrenitis est erysipelas internum. Sanguis etiam interdum

habet

habet rationem causæ sine qua non : nam interdum sanguis infra caput abundat , vt sit impedimento , quo minus capiti possimus occurrere. Quoniam ergo in phrenitide sanguinea, sanguis habet rationem causæ principalis: merito in hac specie maior sanguinis copia est educenda, quia tunc quoque maior ipsius copia in toto abundat. Considerandum autem num virtus venæ sectionem permittat : proinde in hæctica phrenitide, non est vena secanda: in tumultuosa licet secare, nisi hæc aliis morbis successerit, nam virtus est debilis : propterea in tumultuosa incipiente vena aperiatur. Si igitur virtus prohibeat phlebotomiam, huius loco vicaria vsurpanda, de quibus in doctrina de dolore capitis egimus. *Vsus.*

Quantum ? Cum summa sit sanguinis actio, sanguis vnica vice est euacuandus : vnde Auicennas ad animi defectum euacuabat, in sanguinea tantum, non in biliosa. *Quomodo ?* in biliosa phrenitide, foramen angustius, in atrabilaria latius esse debet, in sanguinea mediocre, quia sanguis in tenuitate medio modo se habet. *Quando ?* Si sanguis vincit alia indicantia, statim eadem hora vena secanda. cap. 11. lib. 13. method. Et Rhases aperit venam , antequam symptomata phrenitidis complicentur , id est , antequam materia copiosa in caput fluat. Præterea statim vena secanda , quia cito virtus succumbit. Galenus cap. 14. lib. 4. de caus. puls. ait, rarissime pulsus esse magnum in phrenitide, vt plurimum paruum, scilicet respectu ad maximum, ideo statim tundenda vena. Et hinc Auicennas primum secat venam, deinde clysmo vtitur. Caterum, si plures in phrenitide venæ sint secandæ: primum est secanda vena, ratione sanguinis existentis infra caput: secundo, ratione sanguinis in capite: quam primum vena cubiti, deinde frontis: ratio est, quia magis potest sanguis infra caput: si enim primum vena frontis secetur, sanguis infra existens, caput petens, magis repletur. *Vbi ?* Auicennas secat cephalicam, per quam & caput & totum vacuatur, magis, quam per basilicam & communem. Monent Auicennas & Alexander si non sit possibile, habere manus phrenitici, secandæ esse venam in fronte, vt sanguis e capite vacuetur: id quod intelligendum de phrenitide biliosa & atrabilaria, in qua non est copiosus, in toto sanguis, & ægri sunt admodum inobedientes: at in sanguinea hoc præceptum nequaquam habet locum, quia sanguis copiosior facit delirium mitius, vt ægri brachia porrigant, possimusque cephalicam aperire.

*Recta administratio
venæ sectis
non.*

Cautiones.

aperire. Addit etiam Auicennas si virtus non permittat, ut vena brachij secetur:aperiendam esse frontis venam, e qua, vtpote minorem, sanguis in minore copia effluit, vnde minor iactura & dissipatio spirituum. Hoc documentum non solum in phrenitide, sed in quolibet etiam morbo longo seruandum, ut, si vires non sint admodum robustae, tutius sit minores venas aperire. Non ergo sunt reprehendendi practici, qui in diuturnis morbis secant saluatellam.

Cucurbitulae.

Quod si in sanguinea phrenitide, virtus non ferat venae sectionem: oportet cucurbitulis scarificatis uti: quae non possunt applicari dorso, ratione dispositionis febrilis: nec applicari possunt partibus inferioribus, ut naribus & cruribus, sed cubito applicari debent: ratio est, quia dum applicantur infernis partibus, vicem gerunt venae sectionis, potissimum basilicae: at si brachiis applicentur in summitate, vicem gerunt sectionis venae cephalicae: Et propterea, cum in phrenitide sit aperienda cephalica, per quam etiam caput euacuatur: ideo dum non possumus aperire cephalicam, cucurbitulas brachiis applicare debemus. Possunt etiam cucurbitulae scarificatae prodesse, propter materiam impactam. In usu

Recta administratio cucurbitulae.

quaedam notanda sunt circa tempus, & locum: reliqua enim patent, e doctrina de dolore capitis. Quoad tempus: cucurbitulae scarificatae, quae administrantur propter materiam impactam, debent adhiberi post totius corporis euacuationem, & post euacuationem materiae existentis in capite, sed nondum impactae. Gal. enim c. 21. l. 13. meth. ait in phrenitide cucurbitula capiti admota, & scarificata, quandoque reuocauit phreneticum a morte. Miror equidem his temporibus, preceptum hoc non usurpari: ideoque hortor vos, ut vrgente necessitate, id est, in pertinaci phrenitide, hanc cucurbitulam usurpetis, sicut & nos aliquando vti sumus. Quoad locum, adhiberi debet futurae coronali: oportetque magnam esse cucurbitulam.

R. B.

*Materia medica-
lis. Num
soluentia loci
habeant
in phreni-
tide.*

In phrenitide probantur medicamenta, proposita in dolore capitis, ab intemperie calida cum materia: addemus saltem quaedam notatu digna. Circa medicamenta igitur gratia totius, id est, circa soluentia, duo sunt explicanda: primum, an in phrenitide sint usurpanda: deinde, quo tempore sint usurpanda. Num usurpanda sint dubitatur: Auicenn. enim improbat soluentia medicamenta, quia nimium calefaciunt. Et tamen idem Auicennas proponit scammonium. Pro solutione dicendum, Auicennam improbare scammonium, quando vir-

tus non ferat: admittere autem si virtus possit sustinere. Vtitur autem Auicennas scammonio non sincero, neque etiam misto cum aliis soluentibus, sed cum lubricantibus, & his quidem frigidis: vnde probat lubricantia, quæ sanguinis feruorem extinguunt, vt sunt, *serum lactis, pruna, tamarindi, cassia, manna*: quæ medicamenta in sero sunt dissoluenda. Notandum igitur soluentia cum lenientibus duobus modis posse misceri: primo vt electiue educant: secundo, vt instar stimuli & calcarium, adiuuent facultatem lenientium. Si primo modo vsurpentur lenientia, oportet vt in minima dosi exhibeantur, verbi gratia *℞ flor. cass. non. extr. 3 x. manna el. 3 ij. dacrydij ḡ v.* hæc enim minima est dosi dacrydij. Si secundo modo soluentia administrentur, vt scilicet adiuuent lenientia, oportet soluentia miscere infra minimam dosin, verbi gratia dacrydium ad ḡ iij. Pro vt igitur materiæ biliosæ, dacrydium misceri debet, modo in dosi minima, modo citra hanc. Et sicut Auicennas miscet scammonium seu dacrydium: ita nos possumus miscere, *elect. de succo ros. diaprun. solut. cum scammo. & multo magis rhab.* Quod si phrenitis sit atrabilaria, possumus miscere *senam, polypodium, epithymum, imo etiam helleborum nigrum.* Secundo explicandum, quando soluentia sint exhibenda? Videtur Auicennas, & ante, & post concoctionem soluentia probare. Sed sciendum, Quando agendum sumi ab indicante præsentem, vincente alia indicantia: ideoque si contingat, vt bilis admodum vehementer, & insigni impetu moueatur in caput, magis potest ad indicandum, quam cruditas ad prohibendum, imò magis potest, quam materia turgens: Quare tunc ante coctionem in phrenicide soluentia sunt exhibenda. Si autem bilis non sit tantæ vehementiæ: propinanda sunt soluentia post concoctionem.

Hæc de medicamentis ratione totius. Quoad medicamenta ratione capitis: hæc euacuant caput per meatus vel Sensibiles, vel Insensibiles. Vacuantia per meatus sensibiles, id est, per os, per nares, probantur citra masticationem, nam phreniticus non obtemperat. cap. 21. l. 13. meth. Vnde Galenus vngebat palatum, medicamentis propositis in dolore capitis. Licet etiam euacuare per nares sternutatoriis vt autem hæc efficacius operentur, ante sternutatoria parabitur euaporatio, seu suffumigium, cum *thymo, pulegie, origano, cassia in aseto.* si enim per nares fiat euaporatio in caput, materia

Quando v-
tendu pur-
gantib. in
phrenide.

Caput pur-
gia, per os
& nares.

materia præparabitur, vt promte sternutatoriis cedat.

Topica.

1. Reper-
cutientia:
vide præ-
cedens cap.

Vacuantia per meatus insensibiles, euacuant per modum vel repercussionis, vel digestionis, prout materia vel impacta est, vel non impacta. Quoad reprimentia, Galenus c. 21. l. 13. meth. probat oxyrhodinum. Sed cum phrenitis sit multiplex: ideo in sanguinea phrenitide: *R. ole. ros. compl. ʒ. ol. rosati omphac. ana ʒ. j. β. aceti ʒ. β. Misc.* Si phrenitis producatur vel à bile pallida, vel ab ichore sanguinis, ita parabitur reprimens: *R. ol. omphac. ʒ. ij. olei ros. compl. ʒ. j. aceti ʒ. ij. Misc.* hic minor est quantitas ol. ros. compl. & aceti, quia hæc phrenitis est calidior, quam superior. Si fiat à bile flaua. *R. ol. ros. omphac. ʒ. ij. aceti ʒ. ij. Misc.* non miscetur ol. ros. compl. quoniam hæc phrenitis est calidior. Si phrenitis fiat à bile æruginosa: *R. ol. ros. omphac. ʒ. ij. β. ol. violati ʒ. β. succi lactuc. ʒ. ij. acidi citri ʒ. β. Misc.* Postremo in calidissima phrenitide, quæ fit ab atra bile: *R. ol. ros. omphac. ʒ. ij. olei nenuph. ʒ. vj. succi lactuc. ʒ. β. acidi citri ʒ. β. Misc.* Quoad dirigentia: primum applicanda sunt minus vehementia, deinde ascendendum ad vehementiora. c. 21. l. 13. method. Minus vehementia sunt, *ol. anethinum, chamamelin, columba viuentes diffetta, omenta animalium, melilotus, mucilago sem. lini*: vehementiora sunt, *origanum, puleg, thym, ruta, mentha, stachas, hyssopus, castorium, sinapi*. Digerens igitur mite, erit tale: *R. ol. chamem. aneth. ana ʒ. j. β. mucilag. sem. lini ʒ. j. aceti ʒ. ij. Misc.* Mediocre erit: *R. ol. rutacer, lib. alb. cum aromatibus, ana ʒ. ij. orig. puleg. stachad. ana p. β. vini generosi ʒ. ij. fiat decoctio in duplici vase, ad consumpt. tertia partis vini, deinde cola, & utere.* Vehemens erit: *R. pulu. dictamni cret. colocynth. castorij, sinap. ana ʒ. j. olei de costâ, de euphorb. ana ʒ. β. ol. lil. alb.*

2. Dirigen-
tia.

Vsus medi-
camentori-
opiorum
in phreni-
tide.

cum aromatibus ʒ. j. β. Misc. Vsus horum medicamentorum patet è sermone de dol. cap. Vnum monebimus circa Quando agendum, in omni inflammatione obseruandum. In principio enim phlegmones, probantur refrigerantia & astringentia: in incremento tepida, & mediocriter astringentia: in statu moderate calefacientia & laxantia: in declinatione, calefacientia, & valenter discutientia. c. 16. l. 3. simp. Ratio talis est: Quando agendum, sumitur ab indicante præsentem, dum vincit alia indicantia. Quoniam igitur materia morbifica in principio magis potest, quatenus mouetur: igitur in principio opus est reprimentibus: In augmento materia fluxa vincit, quatenus fluxit, sed nondum impacta est: vnde cedit moderate reprimentibus, & digerentibus: In statu vincit materia impacta:

impacta: igitur solis digerentibus tunc vtendum: In declinatione maxime impacta est materia; proinde applicanda sunt valenter discutientia. Sicuti igitur probantur reprimentia in principio & augmento, sed valentiora in principio ita dirigentia applicabuntur in statu & declinatione, sed valentiora in declinatione. Reprimentia valentiora sunt, *oleum rosatum omphacinum, &c.* non ita potens est, *oleum rosatum completum*. Quoad dirigentia, in augmento probantur tepida, id est, remissa calida, in vigore, moderate calefacientia & laxantia, id est, quæ moderata sint, & secundum caliditatem, & tenuitatem partium: tandem in declinatione, adhibentur calefacientia, & vehementer discutientia, id est, quæ vehementia sunt, & secundum caliditatem & tenuitatem. Notandum vero, in phrenitide probari admodum valentia, & valentiora, quam indicet materia morbigica; nam materia morbigica est intra cranium: vnde Galenus cap. 8. li. II. meth. in inflammatione intra cranium probat *castorium*, quamuis sit calidius, quam conueniat materiæ phlegmonem producenti: & hoc fit quia vis medicamenti in transitu frangitur.

Quoad dietam, Anicennas probat aerem purum & frigidum, sine picturis: quoniam in phrenitide mens & spiritus plus iusto agitantur. Cibi debent esse contrarij materiæ morbigicæ, præsertim secundum vitium in quantitate & qualitate. Quoad vitium materiæ in quanto, probatur victus minuens, prout materia copiosa caput petens, maioris est actiuitatis: quia ergo in statu phrenitidis summa est actiuitas; ideo tunc victu tenuissimo vti oportet. Actiuitas è motu morbi cognoscitur: proinde cum in phrenitide motus sit velox, victus tenuis requiritur. Si phrenitidis terminus futurus est in quarto die, opus est victu tenuissimo: si quartum excedet, minus tenui vtendum. Notandum, si inflammatio teneat ventriculum, aut iecur, probari victum magis tenuem, quam in inflammatione aliarum partium, & quam in phrenitide; nam in ventriculo & iecore, alimentum pro toto corpore concoquitur, et metus fit, ne alimentum male concoctum inflammationem augeat cap. 17. lib. II. meth. Quoad vitium materiæ in qualitate: probatur victus refrigerans in phrenitide, modo magis, modo minus. Vnde in phrenitide sanguinea, cibi sunt parandi cum *endivia, acetosa, sem. mal. bordeo*. In biliosa addere oportet *lactucam*. Et si à bile

Dieta.

Aer.

Cibus refrigerans.

Cibus refrigerans.

materia preparabitur, vt promte sternutatoriis cedat.

Topica.

1. Reper-
cutientia:
vide pre-
cedens cap.

Vacuantia per meatus insensibiles, euacuant per modum vel repercussionis, vel digestionis, prout materia vel impacta est, vel non impacta. Quoad reprimentia, Galenus c. 21. l. 13. meth. probat oxyrhodinum. Sed cum phrenitis sit multiplex: ideo in sanguinea phrenitide: *℞ ole. ros. completi, ol. ros. saci omphac. ana ℥ j β. aceti ℥ β. Misc.* Si phrenitis producat vel à bile pallida, vel ab ichore sanguinis, ita parabitur reprimens: *℞ ol. omphac. ℥ ij. olei ros. compl. ℥ j. aceti ℥ ij. Misc.* hic minor est quantitas ol. ros. compl. & aceti, quia hæc phrenitis est calidior, quam superior. Si fiat à bile flaua. *℞ ol. ros. omphac. ℥ ij. aceti ℥ ij. Misc.* non miscetur ol. ros. compl. quoniam hæc phrenitis est calidior. Si phrenitis fiat à bile æruginosa: *℞ ol. ros. omphac. ℥ ij. β. ol. violati ℥ β. succi lactuc. ℥ ij. acidi citri ℥ β. Misc.* Postremo in calidissima phrenitide, quæ fit ab atra bile: *℞ ol. ros. omphac. ℥ ij. olei nenuph. ℥ vj. succi lactuc. ℥ β. acidi citri ℥ β. Misc.* Quoad dirigentia: primum applicanda sunt minus vehementia, deinde ascendendum ad vehementiora. c. 21. l. 13. method. Minus vehementia sunt, *ol. anechinum, chamamelin. columba viuentes diffelta, omenta animalium, melilotus, mucilago sem. lini:* vehementiora sunt, *origanum, puleg. thym. ruta, mentha, stachas, hyssopus, castorium, sinapi.* Digerens igitur mite, erit tale: *℞ ol. chamem. aneth. ana ℥ j β. mucilag. sem. lini ℥ j. aceti ℥ ij. Misc.* Mediocre erit: *℞ ol. rutæ, lil. alb. cum aromatibus, ana ℥ ij. orig. puleg. stachad. ana p. β. vini generosi ℥ ij.* fiat decoctio in duplici vase, ad consumm. tertia partis vini, deinde colat, & utere. Vehemens erit: *℞ pulu. dictamni Cret. colocynth. castorij, sinap. ana ℥ j, olei de casto, de euphorb. ana ℥ β. ol. lil. alb.*

2. Dirigen-
tia.

Vsus medi-
camentorū
topicorum
in phreni-
tide.

cum aromatibus ℥ j β. Misc. Vsus horum medicamentorum, patet è sermone de dolicap. Vnum monebimus circa Quando agendum, in omni inflammatione obseruandum. In principio enim phlegmones, probantur refrigerantia & astringentia: in incremento tepida, & mediocriter astringentia: in statu moderate calefacientia & laxantia: in declinatione, calefacientia, & valenter discutientia. c. 16. l. 3. simp. Ratio talis est: Quando agendum, sumitur ab indicante præsentē, dum vincit alia indicantia. Quoniam igitur materia morbifica in principio magis potest, quatenus mouetur: igitur in principio opus est reprimentibus: In augmento materia fluxa vincit, quatenus fluxit, sed nondum impacta est: vnde cedit moderate reprimentibus, & digerentibus: In statu vincit materia impacta:

impacta: igitur solis digerentibus tunc vtendum: In declinatione maxime impacta est materia; proinde applicanda sunt valenter discutientia. Sicuti igitur probantur reprimentia in principio & augmento, sed valentiora in principio ita dirigentia applicabuntur in statu & declinatione, sed valentiora in declinatione. Reprimentia valentiora sunt, *oleum rosatum emphasinum, &c.* non ita potens est, *oleum rosatum completum*. Quoad dirigentia, in augmento probantur tepida id est remissa calida, in vigore, moderate calefacientia & laxantia id est, quæ moderata sint, & secundum caliditatem, & tenuitatem partium: tandem in declinatione, adhibentur calefacientia, & vehementer discutientia, id est, quæ vehementia sunt, & secundum caliditatem & tenuitatem. Notandum vero, in phrenitide probari admodum valentia, & valentiora, quam indicet materia morbigica; nam materia morbigica est intra cranium: vnde Galenus cap. 8. li. ii. meth. in inflammatione intra cranium probat *castorium*, quamuis sit calidius, quam conueniat materiæ phlegmonem producenti: & hoc fit quia vis medicamenti in transitu frangitur.

Quoad dietam, Avicennas probat aerem purum & frigidum, sine picturis: quoniam in phrenitide mens & spiritus plus isto agitantur. Cibi debent esse contrarij materiæ morbigicæ, præsertim secundum vitium in quantitate & qualitate. Quoad vitium materiæ in quanto, probatur victus minuens, prout materia copiosa caput petens, maioris est actiuitatis: quia ergo in statu phrenitidis summa est actiuitas: ideo tunc victu tenuissimo vti oportet. Actiuitas è motu morbi cognoscitur: proinde cum in phrenitide morus sit velox, victus tenuis requiritur. Si phrenitidis terminus futurus est in quarto die, opus est victu tenuissimo: si quartum excedet, minus tenui vtendum. Notandum, si inflammatio teneat ventriculum, aut iecur, probari victum magis tenuem, quam in inflammatione aliarum partium, & quam in phrenitide: nam in ventriculo & iecore, alimentum pro toto corpore concoquitur, vt metus sit, ne alimentum inale concoctum inflammationem augeat cap. 17. lib. ii. meth. Quoad vitium materiæ in qualitate: probatur victus refrigerans in phrenitide, modo magis, modo minus. Vnde in phrenitide sanguinea, cibi sunt parandi cum *endiuia, aserosa, sem. mal. bordeo*. In biliosa addere oportet *lactucam*. Et si à bile

Dietæ.

Aer.

Cibus tenuis.

Cibus refrigerans.

Primi. æruginosa vel atra fiat, addantur in cibis, *emulſio ſeminum melon. papau. albi, nymphaea, &c.* Quoad potum, in phrenitide, ſit aqua vel ſimplex, vel hordeacea, vel alterata cum *acetosa & endiuia.* Quoad modum, Alexander probat tepidam, non actu frigidam potionem: quamuis enim potio actu frigida, febrilem mitigare videatur, inflammationem tamen reddit crudiorē, & hac ratione magis eam accēdit, vnde & febris & delirium augetur. Vinum Alexander probat pauciferum, dilutum: vinum enim phreniticorum ferocitatem mitigat, & ferinos mores ad hilaritatē transfert: vinū etiam ſomnū conciliat, coctionem & diſtributionem iuuat, vires reſcit, ſi modo recte uſurpetur. *uſu.* Vnde cum Alex. in parua copia vino uti oportet, & tempore oportuno, id eſt, dum magis vinum indicatur, quam prohibetur: indicatur autem vinum à virtute imbecilli, cuius imbecillitatis ſignum ſunt multæ vigiliæ, cum pulſu debili, leiſythymia, oris ventriculi imbecillitas, corporis frigiditas, vini conſuetudo. Cæterum videndum, num quod virtus poſtulat, res præter naturam permittant: id quod faciunt, febris remiſſa, calor præcordiorum debilis, materia concocta: ideoque, cum materia in ſeptimo concoquatur rationabiliter, Auicennas poſt ſeptimum, non ante, pauxillum ym admittit. Somnus etiam eſt conciliandus. Alius quotidie ſit lubrica. Arceatur omnis motus, & urgente neceſſitate, etiam ligetur æger, ſed citra vnitatis ſolutionem, nam hæc eſſet materia cheirurgica, non dietetica. Quoad animi accidentia, Alexander probat ad reuocandum mentem, vt pauci amici aſſideant, prudentes, grati & venerabiles ægro.

*Cetera res
non natu-
rales.*

CAPVT IX.

De Letharga.

Remen.



LETHARGVS conuenit cum phrenitide, quatenus eſt malum inflammatorium: cōuenit etiā cum cephalalgia à pituita, quatenus producitur à ſanguine pituitoso. Vocatur lethargus & vterque. Loquimur autem de Lethargo exquisito, in quo omnes pene animæ functiones, potiff. memoria, veluti aboleri videntur: & ad differentiam ſpurij lethargi, malum eſt inflammatorium, ac proinde febribus particeps. Vt autem generetur lethargus, neceſſarium eſt, ſanguinem pituitolum ita

ita

ita caput petere, vt cerebrum inflammetur & subsequatur febris, omnisque functio animalis fere deficiat. Definitur lethargus exquisitus, quod sit functio deficiens principalis cerebri, dependens ab inflammatione pituitosa. Pro cuius definitionis intelligentia, legatur Gal. com. 1. sect. 1. l. 1. prophet. com. aph. 3. sect. 2. com. aph. 30. sect. 3. ca. 5. l. 3. de loc. aff. c. 3. l. de sym. diff. c. 3. l. quod animi mores, & c. cap. 8. lib. 4. de praesag. c. puls. c. 13. & 14. l. 4. de caus. puls. c. 21. l. 13. meth. Forma est functio deficiens principalis. Si enim formaliter accipiatur lethargus, est symptoma, in genere actionis (principalis) imminuta. Subiectum est cerebrum, ad differentiam functionum principalium aliorum viscerum: vnde admodum imminuitur imaginatio, discursus, memoria. Qua de causa Gal. c. 5. l. 3. de loc. aff. ait, in lethargo memoriā & rationē perire: & c. 3. l. de diff. sym. dicit, imaginationem veluti deficere.

*Definitio.**Forma.**Subiectū.**Causa efficiens.**Inflammasio est in lethargo.*

Causa efficiens, à qua lethargus dependet, est inflammatio pituitosa: qua lethargus verus à notho distinguitur: qui fieri potest à vaporibus pituitosis, prodeuntibus à febre pituitosa principali, non symptomatica. Præterea spurius lethargus fieri potest à pituita copiosiore, quæ vel in capite detinetur ob angustiam, vel generatur ob frigiditatem. At exquisitus lethargus fit ab inflammatione, quam necessario sequitur febris: quæ tamen non accidit in mania, in morbo bilioso, quia in eo non fit inflammatio. Nec sufficit ad febrem excitandam, vt materia putrescat: nam in dolore capitis à pituita, excernitur quandoque putrida pituita, non tamen est febris, quia non est inflammatio. Adhæc lethargus secundum speciem contrarius quodammodo est phrenitidi, cap. 21. lib. 13. meth. genere ergo cum phrenitide conueniat oportet, ideoque vtrumque vitium est inflammatorium. Dixit autem Galenus, quodammodo hæc esse contraria secundum speciem: nam vtrumque vitium est calidum, quia inflammatorium: at phrenitis est inflammatio vehementer calida; lethargus autem est inflammatio admodum remissa calida. Nec his repugnat Galenus, dum lib. 11. simpl. cap. de castorio scribit, in lethargo, si absit febris, probari castorium: de notho enim lethargo ibi loquitur. Sed notandum, inflammationem lethargicam differre à phrenitica, & materia, & loco. Materia enim in phrenitide est admodum calida, in lethargo est exigue caliditatis. Et in hac materia vitium esse potest in substantia, quantitate, qualitate, & vbi in substantia,

*Discrimen lethargici & phrenitidis.**1. In materia.*

nam in lethargo materia pituitosa putrescit : in quantitate, nam fit morbus in magnitudine aucta : in qualitate , nam sanguis, pituitosus est aliquantisper calidus, crassus, viscidus: est etiam vitium secundum motum, vt fluit in caput: secundum quietem, vt in cerebro hæret. Loco etiam lethargus distat à phrenitide: in hac enim membranz inflammantur, in lethargo cerebri substantia. cap. 13. & 14. lib. 4. de caus. puls. com. aph. 30. sect. 3. com. 1. lib. 1. priorher. Materia quidem in cerebro residet, non autem in ventriculis, sed in poris cerebri, secundum Auicennam. Lethargus ergo auctore Auicenna, fit à causa & Refrigerante. & Calefaciente. A refrigerante, vt dum generatur pituita; de qua causa aibi diximus. A calefaciente, vt dum causa agit in sanguinem pituitosum, hunc putrefaciendo. Causa autem illa calefaciens, vel per Se calefacit, vel per Accidens. Per se, vt dum post generationem sanguinis pituitosi, calefit sanguis : vt sunt cepæ. Per accidens calefacit, frigus constipans.

2. In loco affecto.

Causarum lethargi sub diuisione.

Vnde in lethargo somnus & obliuio oriatur.

Dubitatur autem cum in lethargo vigeat somnus & obliuio: quomodo ab inflammatione fieri queat? Pro solutione dicendum, somnum fieri posse etiam à sola humiditate: vnde Galenus cap. 8. lib. 4. de præfag. & puls. ait, coma fieri propter humidas dyscrasias. Neque in lethargo somnus est ita profundus, vt in comate, & caro. Quoad obliuionem, & inertiam imaginationis, seu discursus: scire oportet cum Galeno in arte med. cerebrū esse aptum, ad actiones obeundum, dum substantiam obtinet tenuem, ac stabilem, quæ formas facile suscipit: hæc autem in lethargo desiderantur: nam in eo cerebrum ita se habet, vt spongia, aqua repleta, vnde instar spongiæ, in tumorem attollitur: sicut igitur spongia ita repleta humiditates non suscipit, ita cerebrum repletum non suscipit, aut vix suscipit: vt imaginatio veluti deficiat. Præterea, vt spongia repleta, non sinit humiditatem per suos poros penetrare: ita species permeare non possunt per cerebrum, vnde discursus & imaginatio laeduntur.

Loca quædam Galeni expli- cantur.

Sed quædam loca Galeni, non omnino iam dictis contentire videntur. Nam cap. 21. lib. 13. meth. ait lethargum fieri ab humore frigido. Responsio: Loquitur ibi Galenus, in respectu ad phrenitidem: huius enim ratione humor in lethargo est frigidus, non tamen absolute est frigidus: eodemque respectu Auicennas ait, lethargum esse apostema frigidum, cum tamen assit inflammatio. Ait etiam Galenus com. aph. 3. sect. 2.

fest. 1. lethargum fieri à forti refrigeratione, coniuncta cum humiditate. Dicendum quod Galenus in eo loco respiciat ad lethargum nocturnum, non ad exquisitum. Porro & hoc est animaduertendum, quod Auicennas dicit, medicos nominare lethargum aposterna frigidum; siue sit melancholicum, siue phlegmaticum. Hinc quis colligere posset, lethargum fieri à melancholia, quod tamen fallum est. Sed Auicennas, parum curans voces, admittit; apostema melancholicum posse nominari lethargum. Hæc de definitione.

Differentiæ à forma nullæ sunt, nisi secundum magis & minus. Differentiæ à subiecto nullæ sunt; subiectum enim semper est cerebrum, secundum omnes partes: nisi quis dicat, inflammationis materiam, occupare vel Cerebrum; vel Cerebrum, & membranas. Quoad differentias à causa efficiente, cum inflammatio semper sit pituitosa, differentiæ tantum sunt secundum magis & minus: nam inflammationis materia est magis vel minus putrida, copiosa, humida, crassa, viscida; item, magis vel minus mouetur, magis vel minus est impacta, magis vel minus hæret in cerebro, aut in membranis.

Lethargus imminens, indicatur è sensu grauitatis secundum caput & totum corpus, ex inertia secundum omnes functiones, à tremore: hæc enim symptomata arguunt caput repleti sanguine pituitoso. Præsens autem lethargus in genere indicatur, ex actione animali principe deficiente, & potiss. memoria: item è somno præter naturam, cap. 10. lib. 3. de caus. puls. at in lethargo minus est profundus somnus, quam in caro: nam in lethargo ægri interrogati respondēt, non autem in caro; & ratio est, quia in lethargo pituita putrescit, & materia est particeps alicuius caliditatis. Indicatur etiam è tremore, è decubitu supino, cum iaceant lethargici distensis manibus & cruribus: indicatur ex anhelitu tardo & debili; nam facultas motrix non potest mouere: at anhelitus non est inæqualis, sicuti in affecto diaphragmate: indicatur etiam cum Galeno cap. 13. lib. 4. de caus. puls. è pulsu magno, nam fluxio irritat facultatem, sed hic pulsus est remittens, non potest perseverare in magnitudine, nam facultas, frangitur: indicatur è pulsu molli, quia cerebrum est viscus molle: præterea indicatur è pulsu minus veloci & frequenti, quam in peripneumonia, nam cerebrum à corde magis distat, quam pulmo: sed in lethargo pulsus est magis imbecil-

Differentia

Signa imminens.

Præsentis in genere.

*Reprimens
non esse
indicatū.*

repellentibus, attrahentibus etiam ad partes sanas, & euacuantibus per meatus sensibiles: impacta tantum cedit digerentibus. Vnde obiter contra nonnullos notandum, reprimens non esse indicatum, quia respicit materiā & fluentem, & fluxam: quæ cum duo sint indicantia, non possunt vnum indicare. Quod autem reprimens dirigatur ad materiam fluentem & fluxam, colligitur è cap. 17. lib. 14. metho. vbi asseritur, quod in generatione vlcæ, dum materia fluit, reprimentibus in maiori copia vti debeamus, quam dum materia non fluit. Quod etiam colligitur è ca. 16. lib. 13. meth. cap. 15. lib. 11. meth. cap. 2. lib. de tum. præter naturam. Verum dubitare quis posset, cur digerentia & reprimentia, non indicata, sed modi vacuationis, seu eradicationis dicantur: cum tamen methodus docere videatur, materiam impactam esse digerendam, fluentem & fluxam, sed nondum impactam, esse reprimendam: id quod methodus per indicationes docere videtur. Respondendum: hanc doctrinam pertinere non ad methodum medendi, sed ad methodum medicamentorum, quæ nos docet, eam esse viam in medicamentis reprimentibus, vt vacuent materiam tam fluentem, quam fluxam, sed nondum impactam: medicamentorum etiam methodus docet, digerentia non obtinere facultatem, vt vacuent materiam impactam. Haftenus de indicationibus, quæ sumuntur à rebus præter naturam, in capite existentibus. Res præter naturam, quæ sunt infra caput, sunt Contenta, vel Continentia. Contenta vt varia sunt specie, ita etiam determinata indicant remedia. Contentorum autem vitia in phrenitide, ad quæ indicationes diriguntur, pertinent ad Formam, Quantitatem, Qualitatem, & Motum: ad formam, quia materia putrescit: ad copiam, quia fieri vix potest, vt in corpore non peccet, humor vel principalis, vel non principalis: ad qualitatem, quia contenta sunt calidiora, & adhuc calidiora redduntur, ratione febris: ad motum, nam materia infra caput existens, caput petit. Hinc oriuntur indicationes: nam materia putrida est eradicanda, copiosa minuenda, calidior refrigeranda, & quæ mouetur retrahenda. Retractio fit per impulsionem, vel per attractionem à capite infra caput, vel interceptionem. Retrahens enim est indicatum, quod indicatur à motu vitioso materiæ morbificæ: impulsio, attractio, interceptio non sunt indicata, sed sunt modi retractionis. Impulsio, seu

*Retractio-
nis modi.*

reper

repercussio, est modus retractionis, quo materia habens impetum in caput in phrenitide, retrahitur, vt acquirit motum deorsum: & sic repercussio, ratione materię fluentis, est modus retractionis: interim tamen ratione materię fluxę, est modus euacuationis. Attractio, est modus retractionis, ad partes inferiores, à capite: attractionis autem modus est duplex, deriuatio, & reuulsio: deriuatio dicitur, dum fit attractio ad partem loco affecto vicinam: reuulsio dicitur, dum fit attractio ad partes remotas. cap. 6. & cap. 11. lib. 13. meth. & hæc reuulsio spectat materiam fluentem tantum, deriuatio respicit & fluentem proximam, & fluxam, sed non impactam, cap. 2. lib. 2. ad Glau. Interceptio est, qua materia retrahitur, sed citra impulsione, & citra attractionem à parte affecta: si enim quis verbi gratia frigida abluat os, fit retractio materię, quę caput petit; citra tamen impulsione & attractionem. Hęc de indicationibus Contentorum. Continentia in phrenitide sunt partes similes corporis totius, ratione febris: & præterea ratione iecinoris, est interperies calidior: vnde oritur indicatio refrigerandi & humectandi totum corpus, sicut & iecur; præterquam in phrenitide sanguinea, in qua iecur refrigerandum & exsiccandum est, cum ob caliditatem & humiditatem, copiosum generet sanguinem.

De præsagiis.

Artis prognosticandi in duobus posita est: primum, vt prænoscamus, an victoria sit futura, vel è parte morbi, vel è parte virtutis: secundo, vt prænoscamus, num victoria cito vel tarde sit futura. Num victoria sit futura è parte morbi, vel virtutis, cognoscitur è vehementia rerum præter naturam, & virtutis. Virtus postulat discursum generalem, de quo in præsentia non est agendum. In rebus præter naturam, perpendenda est vehementia triplex: essentię, dignitatis, & facultatis, idque & secundum morbum in genere, & secundum differentias. Num autem victoria cito vel tarde sit futura, cognoscere oportet è motu morbi tardo, vel veloci, in quam sententiam Galenus cap. 4. lib. 3. de crisi bus ait, in morbis considerari debere, speciem, vehementiam, mores, & motum: quibus verbis auctor respicit, tum ad victoriam futuram, tum ad victorię tempus. Hanc prognosticandi artem applicabimus phrenitidi.

*Generale
presagium,
de magni-
tudine hu-
ius affe-
ctus.*

Phrenitis ergo est vitium admodum periculosum, ut passim lib. 1. prorrh. docetur, nulla enim insignis vehementia desideratur. Essentia enim vehementia insignis est; quia est insignis recessus à naturali statu, secundum causas, morbos, & symptomata: Capitis intemperies calida est admodum vehemens, febris est assidua, causa etiam huius vehementia est insignis, materia enim est putrida & acris: symptomata quoque sunt vehementia, nam functiones principales corumpuntur, vigilie sunt insignes. Vehementia dignitatis adest maxima, nam intemperies propria ratione est vehemens, ratione dignitatis, quæ vehementia intenditur, quod in phrenitide occupatur cerebrum, cruciantur membranæ, offenditur totum corpus. Vehementia tandem ratione facultatis est insignis in phrenitide: nam pulsus in hac ut plurimum sunt parui, unde vitalis facultas debilis arguitur, ca. 14. lib. 4. de caus. puls. cap. 14. lib. 1. ad Glaucon. Phrenitis ergo ut plurimum est mortalis, non tamen perpetuo, com. 73. sect. 2. lib. 1. epid. unde & Alexander gloriatur, se aliquos liberasse. Hæc de prognostico in genere.

*Differen-
tiarum pro-
gnostica.*

Iam de prognosticis differentiarum: cuius generis variæ à Galeno proponuntur, lib. 1. prorrh. à com. 1. usque ad com. 13. & lib. 1. epid. 2. 73. & lib. 3. epid. 3. 75. & aphor. 72. sect. 4. & aphor. 12. sect. 7. Versabimur autem circa differentias, quæ sumuntur à forma, & à causa efficiente: differentias à subiecto omitemus, nam dum perpendimus vehementia dignitatis differentiarum, quæ sumuntur à forma & efficiente, patet etiam vehementia differentiarum à subiecto. In dif-

*Prognosti-
ca differen-
tiarum à
forma.*

ferentiis à forma insignis est vehementia secundum essentiam; si delirium est multum. Insignis etiam vehementia ratione dignitatis, si lædatur & imaginatio & ratio: minor est vehementia, si sola ratio lædatur: adhuc minor, si sola imaginatio: utrisque enim læsis, cerebrum afficitur secundum partem anteriorem & mediam, una læsa, secundum unam tantum. Omittitur vehementia facultatis, quia hæc à causa efficiente potissimum dependet.

*Prognosti-
ca differen-
tiarum à
causa effi-
ciente.*

Quoad differentias, quæ sumuntur à causa efficiente: pendere oportet vehementia intemperiei & materia. Quantum ad intemperiem: vehementia essentia est insignis, quia maximus recessus à naturali statu, & intemperies in summo gradu, unde assidua sunt vigilie: est etiam vehementia secundum essentiam, dum intemperies est in habitu;

*1. Ab in-
temperie.*

ad differentiam intemperiei, quæ est in habitudine: vnde Galen. dixit in fine lib. 12. meth. dum conuulsio succedit phrenitidi exitiali, actum esse, hæc enim phrenitis habet intemperiem in habitu. Ratione dignitatis vehementia est insignis, dum intemperies est æqualis, quæ occupat omnes cerebri partes. comm. 33. lib. 1. prorhet. vnde si intemperies in phrenitide est æqualis & in habitu, mors est prædicenda. Ratione facultatis vehementia est insignis, si symptomata sunt vehementiora: vt si motus voluntarius fiat debilis: si phrenitici admodum debiliter se moueant: si vox amittatur: si pulsus debilis: si alius affatim excernat. cap. 14. lib. 1. ad Glaucl. (non enim sumitur prognosticum à voce amissa, & cæc. sed hæc tantum sunt signa, quæ patefaciunt vehementiam insignem ratione facultatis.) Quoad materiam in hac considerantur species, & vitium. Quoad speciem: si phrenitis fiat à sanguine, vehementia erit remissa: si ab ichore, intensior: si à bile flaua, adhuc intensior: ab ærugino-fa, adhuc intensior: si ab atra, intensissima. cap. 7. lib. 3. de loc. aff. atra enim bilis maxime à naturali statu recedit: at nō prorsus desperandum: nam Alexander fatetur, se liberasse phreniticum ex atra bile. Vitium materiæ pertinet ad substantiam, quantitatem, qualitatem, & vbi. Prout igitur materia magis erit putrida, copiosa, calida, & prout ea quæ fluit, maiori cum impetu caput petit, quæ autem fluxit prout magis quiescit: pro eo maior est vehementia secundū essentiam. Hinc febris verbi gratia in phrenitide, quo vehementior, eo vehementius materiæ vitium significat, secundum essentiam substantiæ, quantitatis, qualitatis, in febre enim vehementiore, materia magis est putrida, copiosa, calida. Adhæc si extensio obseruetur in cerebro, vt contingere solet in phrenitide hecticæ: insignis est recessus secundū copiam, vt phrenitis sit statuenda lethalis. Quod si materiæ vitium est vehemens secundum essentiam, ita lædi solet cerebrum, vt & ventriculus compatiatur, vomitûsque fiat: qua de causa, comm. 10. lib. 1. prorhet. scribitur: vomitum in phrenitide pessimum esse, si fiat citra læsionem ventriculi. Facit quoque ad essentiam vehementia, aphor. 72. sectio. 4. vrina enim alba & perspicua in phrenitide, significat magnam cruditatem, & insignem vehementiam materiæ, vt etiam facultas naturalis compatiatur: præterea hæc vrina significat flauam bilem in caput rapî, ideoque materiam esse vehementem secundum

*1. A materia
ria.*

secundum motum. Hæc de vehementia materiæ secundum essentiam. Ratione dignitatis, insignior est materiæ vehementia, quatenus materia occupat plures capitis partes. Ratione facultatis, materiæ vehementia est maior, vt eius vis est vehementior. Si ergo rigor in phrenitide sit criticus, manifeste indicat remissiorem vehementiam ratione facultatis, vt per sudorem liberetur phreniticus, & tunc sunt signa coctionis: contra indicatur insignis vehementia facultatis, si rigor sit symptomaticus, com. 13. lib. 1. propher. si etiam sudor sit frigidus, & extrema frigida, com. 75. sect. 3. Epid. nam hæc symptomatica significant vehementiam facultatis in materia morbifica admodum insignem, quia calor, vna cum spiritu competit, & externa derelinquit. Adest etiam insignis vehementia ratione facultatis, dum phrenitis succedit inflammationi pulmonis, com. aph. 12. sect. 7. nisi enim cerebri facultas esset imbecillis, non admitteret materiam morbificam. Ex his ergo patet, phrenitidem vt plurimum esse lethalem, raro salubrem.

Quando salus, aut mors sit futura.

Num autem cito sit futura mors vel salus, prædici potest è motu morbi. Phrenitis enim vt plurimum velocis est motus, nec septimum pertransit, sed in sexto etiam interimitur. Quod si autem phrenitis non sit exacte exquilita: non est ita celeris motus, sed terminatur 11. 2. vel etiam 20. com. 75. sect. 2. lib. 1. Epid. Maxime autem motus velocioris aut tardioris signum esse solet febris: ardens enim est signum motus velocioris: non ardens, non ita velocis.

De Curatione.

Curatio.

*Vena sectio
comune re-
mediū, om-
nium spe-
cies phre-
nitidis, se-
cundum
Alicennā.*

De prognosticis hætenus egimus. Sequuntur remedia rum materia. Quoad cheirurgiam, in omni phrenitide vena est secanda. cap. 21. lib. 13. meth. quia in omni specie phrenitidis est vitium vehemens in sanguine. In sanguinea quidem phrenitide, sanguis habet rationem causæ principalis: in biliosa & atrabilaria, habet sanguis rationem causæ adiuvantis, vel causæ sine qua non: nisi enim sanguis misceretur cum bile, non fieret tumor, sed exulceratio: & sic sanguis habet rationem causæ adiuvantis. Nec repugnat Galenus cap. 2. lib. 2. ad Glaucom. dum ait, in erysipelate non esse secandam venam: loquitur enim de erysipelate externotat phrenitis est erysipelas internum. Sanguis etiam interdum habet

habet rationem causæ sine qua non : nam interdum sanguis infra caput abundat , vt sit impedimento , quo minus capiti possimus occurrere. Quoniam ergo in phrenitide sanguinea, sanguis habet rationem causæ principalis: merito in hac specie maior sanguinis copia est educenda, quia tunc quoque maior ipsius copia in toto abundat. Considerandum autem num virtus venæ sectionem permittat : proinde in hæctica phrenitide, non est vena secanda: in tumultuosa licet secare, nisi hæc aliis morbis successerit, nam virtus est debilis : propterea in tumultuosa incipiente vena aperiatur. Si igitur virtus prohibeat phlebotomiam, huius loco vicaria vsurpanda, de quibus in doctrina de dolore capitis egimus. *Vsus.*

Quantum? Cum summa sit sanguinis actio, sanguis vnica vice est euacuandus : vnde Auicennas ad animi defectum euacuabat, in sanguinea tantum, non in biliosa. *Quomodo?* in biliosa phrenitide, foramen angustius, in atrabilaria latius esse debet, in sanguinea mediocre, quia sanguis in tenuitate medio modo se habet. *Quando?* Si sanguis vincit alia indicantia, statim eadem hora vena secanda. cap. 21. lib. 13. method. Et Rhases aperit venam , antequam symptomata phrenitidis complicentur , id est , antequam materia copiosa in caput fluat. Præterea statim vena secanda , quia cito virtus succumbit. Galenus cap. 14. lib. 4. de caus. puls. ait, rarissime pulsus esse magnum in phrenitide, vt plurimum paruum, scilicet respectu ad maximum , ideo statim tundenda vena. Et hinc Auicennas primum secat venam, deinde clysmo vtitur. Cæterum, si plures in phrenitide venæ sint secandæ: primum est secanda vena , ratione sanguinis existentis infra caput: secundo , ratione sanguinis in capite : quam primum vena cubiti, deinde frontis: ratio est, quia magis potest sanguis infra caput: si enim primum vena frontis secetur , sanguis infra existens, caput petens , magis repletur. *Vbi?* Auicennas secat cephalicam, per quam & caput & totum vacuatur, magis, quam per basilicam & communem. Monent Auicennas & Alexander si non sit possibile , habere manus phrenitici, secandam esse venam in fronte, vt sanguis e capite vacuetur: id quod intelligendum de phrenitide biliosa & atrabilaria, in qua non est copiosus, in toto sanguis, & ægri sunt admodum inobedientes : at in sanguinea hoc præceptum nequaquam habet locum , quia sanguis copiosior facit delirium mitius, vt ægri brachia porrigant, possimusque cephalicam aperire.

*Relta ad-
ministratio
venæ sectio
nō.*

Cautiones.

aperire. Addit etiam Auicennas si virtus non permittat, vt vena brachij secetur:aperiendam esse frontis venam, & qua, vtpote minore, sanguis in minore copia effluit,vnde minor iactura & dissipatio spirituum. Hoc documentum non solum in phrenitide, sed in quolibet etiam morbo longo seruandum, vt, si vires non sint admodum robustæ, tutius sit minores venas aperire. Non ergo sunt reprehendendi practici, qui in diuturnis morbis secant saluatellam.

Cucurbitula.

Quod si in sanguinea phrenitide, virtus non ferat venæ sectionem:oportet cucurbitulis scarificatis vti:quæ nō possunt applicari dorso,ratione dispositionis febrilis: nec applicari possunt partibus inferioribus, vt naribus & cruribus, sed cubito applicari debent: ratio est, quia dum applicantur infernis partibus, vicem gerunt venæ sectionis,potissimum basilicæ:at si brachiis applicentur in summitate, vicem gerunt sectionis venæ cephalicæ: Et propterea, cum in phrenitide sit aperienda cephalica, per quam etiam caput euacuatur: ideo dum non possumus aperire cephalicā,cucurbitulas brachiis applicare debemus. Possunt etiam cucurbitula

Recte administratio cucurbit.

scarificatæ prodesse,propter materiam impactam. In vsu quædam notanda sunt circa tempus,& locum:reliqua enim patent,è doctrina de dolore capitis. Quoad tempus: cucurbitulæ scarificatæ,quæ administrantur propter materiā impactam,debent adhiberi post totius corporis euacuationem,& post euacuationem materiæ existentis in capite, sed nondum impactæ.Gal.enim c.21.l.13.meth. ait,in phrenitide cucurbitula capiti admota,& scarificata, quandoque reuocauit phreneticū a morte.Miror equidē his temporib, præceptum hoc non vsurpari:ideoque hortor vos,vt vrgēte necessitate, id est,in pertinaci phrenitide, hanc cucurbitulam vsurpetis, sicut & nos aliquando vsi sumus. Quoad locum,adhiberi debet futuræ coronali: oportetque magnā esse cucurbitulam.

R2.

*Materia medica-
lis. Num
soluentia lo-
cis habeant
in phreni-
tide.*

In phrenitide probantur medicamenta, proposita in dolore capitis, ab intemperie calida cum materia:addeamus saltem quædam notatu digna. Circa medicamenta igitur gratia totius,id est,circa soluētia,duo sunt explicanda:primum, an in phrenitide sint vsurpanda: deinde, quo tempore sint vsurpanda.Num vsurpanda sint dubitatur:Auicēn.enim improbat soluentia medicamenta,quia nimium calefaciunt.Et tamen idem Auicennas proponit scammonium.Pro solutione dicendum,Auicennam improbare scammonium,quādo vir-

tus non ferat: admittere autem si virtus possit sustinere. Utitur autem Auicennas scammonio non sincero, neque etiam misto cum aliis soluentibus, sed cum lubricantibus, & his quidem frigidis: vnde probat lubricantia, quæ sanguinis feruorem extinguunt, vt sunt, *serum lactis, pruna, tamarindi, cassia, manna*: quæ medicamenta in sero sunt dissoluenda. Notandum igitur soluentia cum lenientibus duobus modis posse misceri: primo vt electiue educant: secundo, vt instar stimuli & calcarium, adiuuent facultatem lenientium. Si primo modo vsurpentur lenientia, oportet vt in minima dosi exhibeantur, verbi gratia *R. ster. cass. nou. extr. 3 x. manna el. 3 ij. dacrydij ʒ v.* hæc enim minima est dosi dacrydij. Si secundo modo soluentia administrentur, vt scilicet adiuuent lenientia, oportet soluentia miscere infra minimam dosin, verbi gratia dacrydium ad ʒ ij. Pro vt igitur materiæ biliosæ, dacrydium misceri debet, modo in dosi minima, modo citra hanc. Et sicut Auicennas miscet scammonium seu dacrydium ita nos possumus miscere, *elect. de succo ros. diapr. solut. cum scammo. & multo magis rhab.* Quod si phrenitis sit atrabilaria, possumus miscere *senam, polypodium, epithymum, imo etiam helleborum nigrum.* Secundo explicandum, quando soluentia sint exhibenda? Videtur Auicennas, & ante, & post concoctionem soluentia probare. Sed sciendum, Quando agendum sumi ab indicante præsentem, vincentia alia indicantia: ideoque si contingat, vt bilis admodum vehementer, & insigni impetu moueatur in caput, magis potest ad indicandum, quam cruditas ad prohibendum, imò magis potest, quam materia turgens: Quare tunc ante coctionem in phrenicide soluentia sunt exhibenda. Si autem bilis non sit tantæ vehementiæ: propinanda sunt soluentia post concoctionem.

Hæc de medicamentis ratione totius. Quoad medicamenta ratione capitis: hæc euacuant caput per meatus vel sensibiles, vel Insensibiles. Vacuantia per meatus sensibiles, id est, per os, per nares, probantur citra masticationem, nam phreniticus non obtemperat. cap. 21. l. 13. meth. Vnde Galenus vngebat palatum, medicamentis propositis in dolore capitis. Licet etiam euacuare per nares sternutatoriis: vt autem hæc efficacius operentur, ante sternutatoria parabitur euaporatio, seu suffumigium, cum *thymo, pulegio, origano, scellum in aqua*: si enim per nares fiat euaporatio in caput, materia

Quando v.
rendu pur-
ganib. in
Pernind.

Caput pur-
gia, per os
& nares.

materia præparabitur , vt promte sternutatoriis cedat.

Topica.

*1. Repercussio-
nentia:
vide præ-
cedens cap.*

Vacuantia per meatus insensibiles, euacuant per modum vel re percussio- nis, vel digestio- nis, prout materia vel impa- cta est, vel non impa- cta. Quoad reprimentia , Galenus c. 21. l. 13. meth. probat oxyrhodinum. Sed cum phrenitis sit mul- tiplex: ideo in sanguinea phrenitide : *℞ ole. ros. compl. 3. ol. ro- sati omphac. ana 3 j. β. aceti 3 β. Misc.* Si phrenitis producat- ur vel à bile pallida, vel ab ichore sanguinis , ita parabitur re- primens : *℞ ol. omphac. 3 ij. olei ros. compl. 3 j. aceti 3 ij. Misc.* hic minor est quantitas ol. ros. compl. & aceti, quia hæc phreni- tis est calidior, quam superior. Si fiat à bile flaua. *℞ ol. ros. omphac. 3 ij. aceti 3 ij. Misc.* non miscetur ol. ros. compl. quo- niam hæc phrenitis est calidior. Si phrenitis fiat à bile æru- ginosa: *℞ ol. ros. omphac. 3 ij. β. ol. violati 3 β. succi lactuc. 3 ij. acidi citri 3 β. Misc.* Postremo in calidissima phrenitide, quæ fit ab atra bile: *℞ ol. ros. omphac. 3 ij. olei nenuph. 3 vj. succi lactuc. 3 β. acidi citri 3 β. Misc.*

*2. Dirigen-
tia.*

Quoad dirigentia : primum applicanda sunt minus vehementia, deinde ascendendum ad vehemen- tiora. c. 21. l. 13. method. Minus vehementia sunt, *ol. anethinum, chamamelin. columba viuentes dissecta, omenta animalium, meli- lotus, mucilago sem. lini* : vehementiora sunt, *origanum, puleg. thym. ruta, mentha, stachas, hyssopus, castorium, sinapi.* Digerens igitur mite, erit tale : *℞ ol. chamam. aneth. ana 3 j. β. mucilag. sem. lini 3 j. aceti 3 ij. Misc.* Mediocre erit: *℞ ol. rutacei, lil. alb. cum aromatibus, ana 3 ij. orig. puleg. stachad. ana p. β. vini generosi 3 ij.* fiat decoctio in duplici vase, ad consumpt. tertia partis vini, deinde colat, & utere. Vehemens erit: *℞ pulu. dictamni Cret. colocynth. castorij, sinap. ana 3 j. olei de casto, de enphorb. ana 3 β. ol. lil. alb.*

*Vfus medi-
camentoru
topi-
corum
in phreni-
tide.*

Vfus horum medicamentorum, patet è sermone de dol. cap. Vnum monebimus circa Quan- do agendum, in omni inflammatione obseruandum. In prin- cipio enim phlegmones, probantur refrigerantia & astringentia: in incremento tepida, & mediocriter astringentia: in statu moderate calefacientia & laxantia: in declinatione, calefacientia, & valenter discutientia. c. 16. l. 3. simp. Ratio talis est: Quando agendum, sumitur ab indicante præsentē, dum vincit alia indicantia. Quoniam igitur materia morbifica in principio magis potest, quatenus mouetur: igitur in prin- cipio opus est reprimentibus: In augmento materia fluxa vin- cit, quatenus fluxit, sed nondum impa- cta est: vnde cedit mo- derate reprimentib. & digerentibus: In statu vincit materia impa- cta:

impacta: igitur solis digerentibus tunc vtendum: In declinatione maxime impacta est materia; proinde applicanda sunt valenter discutientia. Sicuti igitur probantur reprimentia in principio & augmento, sed valentiora in principio: ita dirigentia applicabuntur in statu & declinatione, sed valentiora in declinatione. Reprimentia valentiora sunt, *oleum rosatum emphasinum, &c.* non ita potens est, *oleum rosatum completum*. Quoad dirigentia, in augmento probantur tepida: id est, remissa calida, in vigore, moderate calefacientia & laxantia, id est, quæ moderata sint, & secundum caliditatem, & tenuitatem partium: tandem in declinatione, adhibentur calefacientia, & vehementer discutientia, id est, quæ vehementia sunt, & secundum caliditatem & tenuitatem. Notandum vero, in phrenitide probari admodum valentia, & valentiora, quam indicet materia morbifica; nam materia morbifica est intra cranium: vnde Galenus cap. 8. li. II. meth. in inflammatione intra cranium probat *castoreum*, quamuis sit calidius, quam conueniat materiæ phlegmonem producenti: & hoc fit quia vis medicamenti in transitu frangitur.

Quoad dietam, Avicennas probat aërem purum & frigidum, sine picturis: quoniam in phrenitide mens & spiritus plus iusto agitantur. Cibi debent esse contrarij materiæ morbificæ, præsertim secundum vitium in quantitate & qualitate. Quoad vitium materiæ in quanto, probatur victus minuens, prout materia copiosa caput petens, maioris est actiuitatis: quia ergo in statu phrenitidis summa est actiuitas; ideo tunc victu tenuissimo vti oportet. Actiuitas è motu morbi cognoscitur: proinde cum in phrenitide motus sit velox, victus tenuis requiritur. Si phrenitidis terminus futurus est in quarto die, opus est victu tenuissimo: si quartum excedet, minus tenui vtendum. Notandum, si inflammatio teneat ventriculum, aut iecur, probari victum magis tenuem, quam in inflammatione aliarum partium, & quam in phrenitide: nam in ventriculo & iecore, alimentum pro toto corpore concoquitur, vt metus sit, ne alimentum male concoctum inflammationem augeat cap. 17. lib. II. meth. Quoad vitium materiæ in qualitate: probatur victus refrigerans in phrenitide, modo magis, modo minus. Vnde in phrenitide sanguinea, cibi sunt parandi cum *endiuia, acetosa, sam. mal. bordeo*. In biliosa addere oportet *lactucam*. Et si à bile

Dieta.

Aer.

Cibus re-

nuis.

Cibus re-

frig.

Pyth. æruginosa vel atra fiat, addantur in cibis, *emulso seminum melon. papau. albi, nymphæa, &c.* Quoad potum, in phrenitide, sit aqua vel simplex, vel hordeacea, vel alterata cum *acetosa & endiuia.* Quoad modum, Alexander probat tepidam, non actu frigidam portionem: quamuis enim potio actu frigida, feruorem mitigare videatur, inflammationem tamen reddit crudiorē, & hac ratione magis eam accedit, vnde & febris & delirium augetur. Vinum Alexander probat pauciferum, dilutum: vinum enim phreniticorum ferocitatem mitigat, & ferinos mores ad hilaritatē transfert: vinū etiam somnū conciliat, coctionem & distributionem iuuat, vires reficit, si modo recte vsurpetur. *vsu.* Vnde cum Alex. in parua copia vino vti oportet, & tempore oportuno, id est, dum magis vinum indicatur, quam prohibetur: indicatur autem vinum à virtute imbecilli, cuius imbecillitatis signum sunt multæ vigiliæ, cum pulsu debili, leiporhymia, oris ventriculi imbecillitas, corporis frigiditas. vini consuetudo. Cæterum videndum, num quod virtus postulat, res præter naturam permittant: id quod faciunt, febris remissa, calor præcordiorum debilis, materia concoctat: ideoque, cum materia in septimo concoquatur rationabiliter, Auicennas post septimum, non *Cetera res* ante, pauxillum yim admittit. Somnus etiam est conciliandus. Alius quotidie sit lubrica. Arceatur omnis motus, & urgente necessitate, etiam ligetur æger, sed citra vnitatis solutionem, nam hæc esset materia cheirurgica, non diætetica. Quoad animi accidentia, Alexander probat ad reuocandum mentem, vt pauci amici assideant, prudentes, grati & venerabiles ægro.

CAPVT IX.

De Letharga.

Ætym.

LETHARGVS conuenit cum phrenitide, quatenus est malum inflammatorium: cōuenit etiā cum cephalalgia à pituita, quatenus producitur à sanguine pituitoso. Vocatur lethargus & vterus. Loquimur autem de Lethargo exquisito, in quo omnes pene animæ functiones, potiss. memoria, veluti aboleri videntur: & ad differentiam spurij lethargi, malum est inflammatorium, ac proinde febribus particeps. Vt autem generetur lethargus, necessarium est, sanguinem pituitosum

ita

ita caput petere, ut cerebrum inflammetur & subsequatur febris, omnisque functio animalis fere deficiat. Definitur lethargus exquisitus, quod sit functio deficiens principalis cerebri, dependens ab inflammatione pituitosa. Pro cuius definitionis intelligentia, legatur Gal. com. 1. sect. 1. l. 1. prophet. com. aph. 3. sect. 2. com. aph. 30. sect. 3. ca. 5. l. 3. de loc. aff. c. 3. l. de sym. diff. c. 3. l. quod animi mores, & c. cap. 8. lib. 4. de præsag. c. pul. c. 13. & 14. l. 4. de caus. pul. c. 21. l. 13. meth. Forma est functio deficiens principalis. Si enim formaliter accipiatur lethargus, est symptoma, in genere actionis (principalis) imminuitur. Subiectum est cerebrum, ad differentiam functionum principalium aliorum viscerum: unde admodum imminuitur imaginatio, discursus, memoria. Qua de causa Gal. c. 5. l. 3. de loc. aff. ait, in lethargo memoriā & rationē perire: & c. 3. l. de diff. sym. dicit, imaginationem veluti deficere.

Definitio.

Forma.

Subiectū.

Causa efficiens.

Causa efficiens, à qua lethargus dependet, est inflammatio pituitosa: qua lethargus verus à notho distinguitur: qui fieri potest à vaporibus pituitosis, prodeuntibus à febre pituitosa principali, non symptomatice. Præterea spurius lethargus fieri potest à pituita copiosiore, quæ vel in capite detinetur ob angustiam, vel generatur ob frigiditatem. At exquisitus lethargus fit ab inflammatione, quam necessatio sequitur febris: quæ tamen non accedit in mania, in morbo bilioso, quia in eo non fit inflammatio. Nec sufficit ad febrem excitandam, ut materia putrescat: nam in dolore capitis à pituita, excernitur quandoque putrida pituita, non tamen est febris, quia non est inflammatio. Adhuc lethargus secundum speciem contrarius quodammodo est phrenitidi, cap. 21. lib. 13. meth. genere ergo cum phrenitide conveniat oportet, ideoque utrumque vitium est inflammatorium. Dixit autem Galenus, quodammodo hæc esse contraria secundum speciem: nam utrumque vitium est calidum, quia inflammatorium: nam phrenitis est inflammatio vehementer calida; lethargus autem est inflammatio admodum remissa calida. Nec his repugnat Galenus, dum lib. 11. simpl. cap. de castorio scribit, in lethargo, si absit febris, probari castorium: de notho enim lethargo ibi loquitur. Sed notandum, inflammationem lethargicam differre à phrenitica, & materia, & loco. Materia enim in phrenitide est admodum calida, in lethargo est exigue caliditatis. Et in hac materia vitium esse potest in substantia, quantitate, qualitate, & vitiis substantia,

Inflammatio est in lethargo.

Discrimen lethargici & phrenitidis.

1. In materia.

sect. 2. lethargum fieri à forti refrigeratione, coniuncta cum humiditate. Dicendum quod Galenus in eo loco respiciat ad lethargum nothum, non ad exquisitum. Porro & hoc est animaduertendum, quod Auicennas dicit, medicos nominare lethargum apostema frigidum; siue sit melancholicum, siue phlegmaticum. Hinc quis colligere posset, lethargum fieri à melancholia, quod tamen falsum est. Sed Auicennas, parum curans voces, admittit, apostema melancholicum posse nominari lethargum. Hæc de definitione.

Differentiæ à forma, nullæ sunt, nisi secundum magis & minus. Differentiæ à subiecto nullæ sunt; subiectum enim semper est cerebrum, secundum omnes partes: nisi quis dicat, inflammationis materiam, occupare vel Cerebrum; vel Cerebrum, & membranas. Quoad differentias à causa efficiente, cum inflammatio semper sit pituitosa; differentiæ tantum sunt secundum magis & minus: nam inflammationis materia est magis vel minus putrida, copiosa, humida, crassa, viscosa; item, magis vel minus mouetur, magis vel minus est impacta, magis vel minus hæret in cerebro, aut in membranis.

Lethargus imminens, indicatur è sensu grauitatis secundum caput & totum corpus, ex inertia secundum omnes functiones, à tremore: hæc enim symptomata arguunt caput repleti sanguine pituitoso. Præsens autem lethargus in genere indicatur, ex actione animali principe deficiente, & potiss. memoria: item è somno præter naturam, cap. 10. lib. 3. de caus. puls. at in lethargo minus est profundus somnus, quam in caro: nam in lethargo ægri interrogati respondent, non autem in caro; & ratio est, quia in lethargo pituita putrescit, & materia est particeps alicuius caliditatis. Indicatur etiam è tremore, è decubitu supino, cum iaceant lethargici dissentis manibus & cruribus: indicatur ex anhelitu tardo & debili; nam facultas motrix non potest mouere: at anhelitus non est inæqualis, sicuti in affecto diaphragmate: indicatur etiam cum Galeno cap. 13. lib. 4. de caus. puls. è pulsu magno, nam fluxio irritat facultatem, sed hic pulsus est remittens, non potest perseverare in magnitudine, nam facultas, frangitur: indicatur è pulsu molli, quia cerebrum est viscus molle: præterea indicatur è pulsu minus veloci & frequenti, quam in peripneumonia, nam cerebrum à corde magis distat, quam pulmo: sed in lethargo pulsus est magis imbecil-

Differentia.

Signa imminens.

Præsentis in genere.

*Signa differentia-
rum.*

lis, quam in peripneumonia, quia cerebrum est pars magis principalis. Indicatur ab excrementis pituitosis. Et cum Auicenna. è lotio quandoque retento propter obliuionem, & musculi sphincteris imbecillitatem, ob quam imbecillitatē non fit integra vrinæ excretio. Indicatur etiam è febre, quæ inflammationem sequitur, ideoque secundaria est, cum in caro sit principalis. c. 21. l. 13. meth. c. 5. l. 3. de loc. aff. Quoad signa differentiarū, & primū earū, quæ à forma sumuntur; è vehementia & remissione symptomatum cognoscitur lethargū magis vel minus esse vehementem. Differentia è subiecto, cognoscuntur è vehementia symptomatum. Verbi gratia ex obliuione magis læsa, cognoscitur potiss. esse læsum cerebrū secundum partem posteriorem. Quoad differentias quæ sumuntur ab efficiente, oportet cognoscere sanguinem pituitosum, secundum eius vitium, & locum. Quoad vitium, quodcumque sit, cognoscitur è signis, traditis in sermone de dol. cap. Quoad sedem sanguinis pituitosi, si occupetur tantum cerebrū, prægressa est sola grauitas; si etiā pertineat ad mēbranas, vt monet Auicenna. præcessit dolor punctorius.

Indicationes.

Prælidia sumuntur ab essentia rei; id est, à forma, à subiecto, & efficiente. Forma est functio deficiens, vt prodit à facultate veluti obdormiente: Obdormit autem facultas ob cerebri affectionem morbificam. Hinc oritur indicatio extinguendi vehementiam affectionis morbificæ, per aliam affectionem vehementiorem, qua imminuatur prior affectio, vt mens sopita agat. Indicationes, quæ sumuntur à subiecto, id est, à cerebro, patent è cephalalgia. Causa efficiens est inflammatio pituitosa: quid indicet inflammatio, docetur in capite de Phrenitide: quid pituita possit indicare & secundum speciem, & secundum vitium, in sermone de cephalalgia docuimus.

Prognostica.

Lethargus est malum summe periculosum, & quidē maiori periculo iunctum, quam inflammatio pulmonis, cap. 13. lib. 4. de caus. puls. Nam quoad morbum, quia est tumor calidus; est insignis vehementia essentia. Causa est sanguis pituitosus, putridus, copiosus, viscidus, crassus, impactus, quare est summa vehementia essentia. Sicut etiam ratione symptomatum; nam functio principalis quasi deficit. Si perpendamus vehementiam ratione dignitatis, ea certe summa est: primum enim est morbus in intemperie: quare est vehementia, ratione dignitatis. Adhæc detinetur cerebrū, quare augetur

Augetur vehementia dignitatis: augetur etiā. quia annexa est febris, morbus vehemens ratione dignitatis. Nec desideratur vehementia facultatis: nam in lethargo motus voluntarius totius corporis veluti deficit. Quamuis autem lethargus sit vitium periculosum; non tamen est prorsus mortale: vnde Hipp. l. 2. de morbis ait: lethargū interficere in septimo, & si hunc pertranseat, hominem sanitati posse restitui: si enim in lethargo affectio protrahitur, tunc vis mali minuitur, & virtus est constans, cum aph. 30. sect. 7. Proinde perpendenda est vehementia differentiarū. Quoad formā igitur, lethargus est insignis vehementiæ secundum essentiam, si plane abolita sit actio. Ratione dignitatis, maior est vehementia, si insignior est noxa secundū omnes actiones: hoc enim significabit cerebrū esse vehementer læsum, secundū omnes partes, & propterea summā esse vehementiā ratione dignitatis. Ratione facultatis, omittitur vehemētia, nam pertinet ad causam efficientē. Causa igitur efficiens est sanguis pituitosus: & proinde insignior vehementia erit ratione essentia, si vehementior erit putredo, si materia erit copiosior, crassior, viscidior, admodum impacta. Ratione dignitatis summa erit vehementia, si magis à materia occupetur cerebrum, quam eius membranæ. Ratione facultatis, cum Auic. si accidentia sint fortiora, sudor sit admodum copiosus, vt recedat à vehementia facultatis, si anhelitus sit facilis, & symptomata declinent, & parotides erumpant. Quoad euentum lethargi, an sit futurus vel cito, vel tarde; cū lethargus sit velocis motus, ideo cum Hipp. l. 2. de morbis, interficit in septimo: & si protrahitur lethargus, bonus sequitur euentus. Vnde colligitur, mortē cito contingere: salutē tarde; nam motus velox pendet à materia morbica ratione dignitatis, & ideo cito interficit, quia occupatur cerebrū: nō enim is motus velox prodit à vehementia essentia, & præsertim secundum vitium materia in qualitate, & vbi, quia materia secundum hæc vitia accepta, est crassa, viscida, hærens, ideoque tardi motus.

*Prognostica
ca e differe-
rentia,*

*Euentus le-
thargi quid
sperandum;*

Galenus cap. 21. lib. 13. meth. iubet statim venam esse secandam, quia dum vehementer sanguis peccat, vincit reliqua indicantia. Vfus patet ex alibi dictis. Probantur cucurbitulae scarificatae, interdum quatenus sunt non principales, id est, quatenus gerunt vicem sectionis venæ, quando scilicet virtus non tolerat venæsectionem: interdum etiam probantur vt materiae principales, causa sanguinis in capite

*Curatio:
Venese-
ctio.
Cucurbit.*

collekti. Probantur etiam cucurbitulæ non scarificatæ, quatenus minuunt affectionem morificam cerebri, vt facultas veluti dormiens excitetur: & sic concurrunt cucurbitulæ non scarificatæ, vt materiæ dolorificæ. Laudantur eadem quoque, vt euacuant per modum attractionis, propter calorem & dolorem. *Vfus* patet è sermone de dolore capitis.

Frictiones. Frictiones & ligaturæ conueniunt, quatenus dolorificæ sunt, & materiam à capite retrahunt. Vius patet è sermone de dol. cap. Vbi quoque de vesicantibus & fonticulis locuti sumus. Et quoniam in lethargo hæc materiæ probantur, quatenus sunt dolorificæ: curandū, vt perseveret dolor; hoc enim cessante, cessat etiā utilitas. Proinde ferro candente inurendum est caput infra occipitium, eschara excitata incidenda, & vi euellenda: prodest etiam circa peripheriam escharæ applicare vesicatorium, præsertim, quod conficitur ex allio crasse confuso & applicito, quod admodum est strenuum & efficax vesicatorium. Hæc igitur medicus prudens cheirurgis imperabit.

Pharmacia.

Clysmiata.

Vomitoria.

Soluentia.

Medicamenta probantur eadem, quæ proposita sunt, in dol. cap. à pituita. Satis igitur sit peculiariora quædam annotare. In euacuatione igitur totius, obseruandum, vt pro alui lenitione utamur clymnis acribus, & similibus suppositoriis. E quibus hæc conficiantur; supra est traditum. Addit Auicenna, si ventriculus repletus esse videatur, probari vomitorium ex oxymelle scillit. Verbi gratia, *R. oxym. scill. 3 j ss. succi raphani 3 ij. iuris tepidi 3 viij. M. pro vomitorio.* Quoad ea quæ per os exhibentur, & per aluum purgant; Auicenna hæc non exhibet, nisi propter morbi longitudinem, & dum febris sua caliditate non prohibet. Per morbi longitudinem, videtur intelligere lethargum, qui septimū pertransierit, vt sit expectanda salus: sed, vt supra diximus, mors succedit cito, salus autem longo temporis spatio. propter visciditatem & crassitatem pituitæ: & propterea non est præter rationem soluens exhibere. Præterea, si contingat vt sit admodum vehemens lethargus, & totum sit repletum; non abs re purgantia propinat, si febris non sit admodum vehemens. Exhibet autem modo castorium cum scammonio, modo solum castorium, modo hieram cum colocynthide. Si enim Lethargus sit particeps tremoris, & febris fuerit remissa, probatur castorium cum scammonio: si febris sit intensa, probatur castorium sine scammonio: hæc deinceps, purgationis gratia, clymnis acribus

supplere

supplere oportet. Si lethargus tremore sit expers, probatur hiera cum colocynth. Ratio horum est: nam dum lethargus est particeps tremoris, sanguis pituitosus maxime cum impetu petit caput, ut neruorum principia angustetur, & hinc fiat tremor. At pituita non potest cum impetu caput petere, nisi habeat vehiculum, quod est bilis: & hinc Auicenn. utitur scammon. ut vehiculū detrahat: utitur etiam castorio, ut attenuet & abstergat materiam pituitosam, quo neruorum principia ab angustia liberentur, & hinc tollatur tremor. Si lethargus particeps sit tremoris, sed febris vehemens: exhibet Auicenn. solum castorium: nam febris prohibet scammonium, non prohibet castorium, quia magis potest pituita, ad indicandum attenuantia ac detergentia, quā febris ad prohibendam castorij calorem: pituita deinde attenuata & deterfa clysteris acribus vacuanda, Sed oritur dubitatio, quia Galen. li. ii. simpl. cap. de cast. probat castoriū si non adsit febris, aut si non admodū calida: cur igitur Auicennas idem probat in febre intensā? Dicendū, quod Galenus ibi loquatur de castorio cū piperet: nos castoriū hic possumus medicamentis frigidis corrigere: vnde loca piperis immiscere possumus cichoracea. Si cū lethargo non aderat tremor, Auicenn. exhibebat hieram cum colocynthide, cuius locos nos exhibere possumus, pil. coch. dissolutas in decocto cichorij. Ratio est: quia, ubi tremor non adest in lethargo, materia pituitosa sensum caput patit, ideoque sine bile est: vnde solum pituita est euacuanda, sed cito, ne figatur: Et hinc Auicennas probat acres clysmos.

Sequuntur ea, quæ insensibiliter euacuant. Auicennas igitur cum Alexandro, si febris non sit vehemens, probat castorium solum: cum oxymelle: probat etiam castorium, si sit vehemens. Exhiberi ergo poteris castorium ad ℥ j. oxymel, ad ℥ ij cum iure, alterato cum cich. & beton. ad ℥ iiij. Quæ applicantur, sic possunt præscribi: ꝑ. olei anethini ℥ ij. vini aromatici ℥ j. nitri ℥ ij. sem. urticae piperis albi, pyretri, ana ℥ ss. fiat inunctio: & hac inunctione fricetur totum corpus.

Ratione capitis, quæ sensibiliter vacuant, fuerē proposita in dol. cap. à pituita. Auicennas potissimum probat hyssopum, calamintham, origanum, & mel scititicum. Sed hoc maxime in lethargo est notandum, ut administrentur ingrata per os, & per nares, ut excitetur facultas. Potissimum probantur sternutatoria, quia lethargici non masticant, auctore Galeno, in fine lib. de org. odoratus. Porro, quæ materiam à capite va-

Ratio me-
dicamen-
torū Ani-
cenna.

Insensibi-
liter va-
cuan-
tia.
Totum.

Caput va-
cuan-
tia.

*Reprimen-
tia.*

cuant insensibiliter, patent è serm. de cephalalgia. Notādum autem hoc loco cum Galeno, cap. 21. lib. 13. meth. probari reprimentia, sed mitiora, vt sufficiat vti *oleo ros. compl. non omphacino cum aceto* : & Auicennas prudentissimus post duos

*Resoluen-
tia.*

dies miscet *castorium*. Quoad resoluentia, hic multo magis quam in phrenitide valida ea esse oportet. Alexander maxime probat *pilos humanos crematos & laugatos*. Nos hoc vti possumus resolvente: *℞. sinap. ʒ. β. piperis albi. pyrethri. nigellæ. ana ʒ. j. β. ammoniaci. opopanax. ana ʒ. ij. resina quantum sufficit, fiat dropax*. Licet etiam hoc vti medicamento: *℞. castorij ʒ. ij. pilorum humanorum cremat. ʒ. ij. succi scille ʒ. β. mithridatij antiqui ʒ. ij. aceti scillit. ʒ. β. Misc. & applicetur hoc medicamentum capiti, fronti, & collo*.

Dieta.

Quoad dietam, Auicennas probat aërem calidum, siccuu, luminosum, id est, contrarium aëri phrenitidis. Cibus sit minuens & attenuans : è quibus conficiatur, nouistis: Alexander, vbi somnus est, miscet amygdalas, quibus vtitur causa vehiculi aliorum ciborum. Potus, sit aqua hordei, cum cinnamomo: sit etiam vinum tenue. Non autem dabitur potus actu frigidus. Quoad tempus, aqua est exhibenda vique ad statum, inclusiue: vinum in declinatione: ratio è dictis patet. Quoad somnum, non permittatis, vt assiduo dormiant.

*Ad urina
retentionē.*

Quoad inanitionem & repletionem, si contingat, vt lotium retineatur: *℞. rad. raph. apij. ana ʒ. j. pariet. malu. althææ. ana p. j. contusis adde. ol. aneth. buiyri. ana ʒ. j. β. ol. de scorp. ʒ. β. Misc. & hoc medicamentum actu calidum applicetur pectini & petinæ. Manibus etiam, secundum Auicennam comprimere possumus vesicam, & musculos abdominis. Reliqua patent. Et hæc de lethargo sufficiant.*

C A P V T X.

De Melancholia: & primo de Definitione, & Causis.

Nomen:



RE & delirium melancholicum, intelligimus illud vitium, in quo corrumpitur imaginatio, cum timore & mœrore. cap. 7. lib. 3. de loc. aff. vnde si contingat, vt maniacus timeat & tristetur, duplex est delirium, scilicet maniacum, & melancholicum. Generatur autem delirium melancholicum hoc modo.

modo. Oportet vt capiti occurrat causa morbifica, vi cuius *Generatio*
 producat phantasma tenebricosum, quod ita afficiat cere-
 brum, saltem secundum sedem imaginatricis, & quandoque
 secundum sedem etiam ratiocinatricis, vt harum facultatum
 functio deprauetur. Quamobrem delirium melancholicum *Definitio.*
 est functio corrupta principalis, cum timore & mœrore,
 cerebri anterioris; dependens ab affectione tenebricosa. *Forma.*
 Forma, est functio corrupta principalis, cum timore & mœrore:
 sic enim distinguitur melancholicum delirium, ab atrabila-
 rio, in quo functio principalis corrupta est, & cum mœrore,
 sed non cum timore. Subiectum est cerebrum anterius: vn-
 de necessario corrumpitur imaginatio: interdum etiam ra-
 tio, sed non perpetuo. Hinc Galenus cap. vlt. lib. 2. de caus.
 sympt. ait, delirium melancholicum esse multarum specie-
 rum, & corruptis speciatim imaginationibus: sique in alium
 intendatur, corrumpi etiam rationem, vt melancholici in-
 terdum seiplos interficiant.

Causa efficiens, est affectio tenebricosa. Hinc Galenus
 cap. vlt. lib. 2. de caus. sympt. & cap. 7. lib. 3. de loc. aff. ait: sicuti
 externæ tenebræ pauorem inducunt: sic atræ bilis color ti-
 morem efficit, dum cerebri substantiam affectione veluti
 tenebricosa afficit. Porro causa immediata affectionis tene-
 bricosæ, est phantasma tenebricosum: quod, ad differen-
 tiam probi phantasmatis, male afficit cerebrum. Sicuti enim
 in sensu externo, obiectum improporcionatum male afficit:
 ita in functionibus internis idem contingit. Tenebricosi
 phantasmatis causa, est Externa, vel Interna. Externa per-
 tinet ad immoderata animi accidentia, quæ ad metum &
 mœrorem attinent: nam ab his excitatur phantasma tene-
 bricosum, vt homo sine causa & tristetur & timeat. Hinc
 Galenus ait, capite septimo, libro tertio, de loc. aff. externas
 tenebras omnibus fere hominibus pauorem inducere, nisi
 vel admodum audaces sint, vel docti. Et Hippocrat. apho-
 risino 23. sectio. 6. inquit: Si metus & mœstitia longo tem-
 pore perseuerent, melancholicum esse affectum. Metus
 autem & mœstitia diuturna duobus modis sumi possunt:
 primum, vt ratione horum viscera refrigerantur, & de
 his suo loco dicemus: secundo hæc sumuntur, vt pro-
 creant phantasma tenebricosum, quod afficit cerebrum
 circa præsentiam & materiæ melancholicæ, & intem-
 periei: verbi gratia si melancholicus imaginetur, se esse
 capite

Causa efficiens.

*Tenebricosi phantasma
 sis causa
 externa.*

capite destitutum, & ratione pilei plumbei liberetur: cui dubium, esse affectum melancholicum, citra materiam, citra intemperiem?

*Interna
Causa tene-
bricosa phā-
ntasmatis,
est impuri-
tas spiritus
animalis.
Melācho-
lica mate-
ria est im-
puritatis
Causa.*

Causa interna immediata, est calor naturalis cerebri; prout mistum habet spiritum animale tenebrososum, vī cuius omnia phantasmata tenebrosa euadunt: At spiritus animalis tenebrosus redditur propter materiam melancholicam, teste Galeno, cap. vlt. lib. de vsu respir. Ad bonam enim actionem opus est spiritu copioso & puro: si ergo impurus sit spiritus, functio corrumpitur. Causa autem impuritatis spiritus animalis, hoc in loco, est matētia melancholica, etiam secundum Alexandrum, cap. 17. lib. 1. Per spiritum autem hic intelligimus spiritum, pertinentem ad cerebrum antērius. Neque obstat, quamuis dicat Galen. cap. 7. lib. 3. de loc. aff. spiritum animale non reperiri in antēiori cerebro: nam loquitur ibi de spiritu animali, vt est organum sensus & motus: secus enim statuendum est, si spiritus animalis sumitur pro organo principum facultatum. Vnde Galenus cap. 4. lib. 1. de caus. sympt. ait, dum prior ventriculus repletur, intemperies accidit cerebro, & spiritui in ventriculis antērioribus. Item, cap. penul. lib. 7. de plac. ait, spiritum animale per totum cerebrum esse diffusum. Spiritus ergo animalis, pertinet ad cerebrum antērius, dum euadit tenebrosus, est in causa corruptæ imaginationis, cum timore & mērore. Notandum autem cum spiritus animalis sit organum facultatis animalis, sicut facultas animalis dupliciter se habet, ita & spiritus animalis bifariam concurrit. Declaro, propter aduersarios. Facultas vel influit, vt est facultas sensitiua & motrix: vel non influit, vt facultas principalis. Influens eget spiritu animali, vt per ipsius vel substantiam, vel radios influens, in parte agat, vt verbi gratia est vis motrix in oculis, in artubus: hic spiritus potissimum pertinet ad postremum ventriculum, diciturque primum organum sensus & motus: primum quidem organū dicitur, rationē temporis, nam facultas primo influit, deinde influxa operatur, & quidem alio instrumento præcipuo, quod est constitutio illius partis, & calidum insitum. Facultas non influens, id est principalis, eget spiritu animali, vt coniungitur cum calido innato cerebri, & residet in poris cerebri. Quod si ergo materia melācholica petat cerebri ventriculos: non oritur melancholia, sed necessariū est, vt materia occupet poros. Quo

sensu

sensu Hippocrates par.7.lib.6.Epid.circa finem,inquit:si melancholia repat in corpus cerebri, fieri epilepsiam:si in mentem, oboriri melancholicum affectum: vbi per corpus cerebri intelligit totum cerebrum, vt dissimulare, nam in epilepsia cerebrum vt dissimulare afficitur: per mentem intelligit substantiam similem, quæ est sedes mentis.

Ex his ergo colligere possumus, in affectu melancholico corrumpi imaginationem, ob errorem externum: nam pendet ab affectione tenebricosa cerebri: cuius causa est phantasma tenebricosum, quod producitur à causa externa, vel interna, vt spiritus animalis fiat tenebricosus, quem Syluestrem vocat Auicennas: Horum nullum est morbus. Sed confirmari etiam potest idem, hac ratione. Si enim imaginatio læderetur læsa facultate: id contingeret, quia facultas vel impediretur, vel labefacteretur. Non impeditur: alias enim cerebrum afficeretur vt dissimulare: cum tamen Galenus dicat affici vt simile. cap.7.lib.3. de loc.aff. Non labefactatur: alias enim necessario cerebrum afficeretur intemperie, vi cuius imaginatio corrumpereetur; quod falsum est: nam si esset intemperies, vel esset calida vel frigida, non potest esse calida, quia delirium esset maniacum, cum furore: neque potest esse frigida intemperies, nam actio non corrumpereetur, sed imminueretur, aut auferretur. Hic tamen quis dicere posset, ab intemperie frigida deprauari actionem, si frigida intemperies est coniuncta cum materia. Sed *periphras.* hoc est: nam dum intemperies frigida coniungitur cum materia melancholica, corrumpitur imaginatio à sola materia: si enim vacuatur materia melancholica, & relinquatur intemperies frigida: imaginatio non amplius corrumpitur, sed imminuitur, aut auferitur, vt non sit affectus melancholicus, sed potius fatuitas, amentia. Idem enim hoc loco statuendum est, quod statui potest de ventriculo frigido, cum materia acris: nam propter materiam acrem corrumpitur ventriculi actio: qua materia euacuata, cum relinquatur frigida intemperies, hac actionem imminuet, non corrumpet. Dubitare autem quis posset, è cap.7.lib.3. de loc. aff. vbi Galen. inquit, in melancholico affectu cerebrum affici vt simile: ac proinde affici intemperie, lædique facultatem. Respondeo: licet multis modis intelligi queat, cerebrum affici vt simile: in nullo tamen illorum modorum vi frigiditatis corrumpetur imaginatio. Primum enim si intelligamus

28.

In melancholia corrumpitur imaginatio ob errorem externum. respondetur.

Obiectio.

Alia obiectio.

mus cerebrum affici vt simile, id est, vt materia, ingreditur in substantiam similatē cerebri, non in ventriculos, tunc imaginatio corrumpitur à materia, non ab intemperie. Secundo modo, si intelligatur, cerebrum affici vt simile, vi caliditatis, vt in phrenitide, vi cuius caliditatis generatur materia melancholica: tunc imaginatio corrumpitur à materia, non autem ab intemperie calida. Tertio modo, si intelligatur affici cerebrum vt simile, quatenus afficitur intemperie frigida: tunc intemperies hæc frigida cerebrum prehendit, vel ante delirium melancholicum, vel post: si ante, tunc delirium non fit immediate propter frigiditatem cerebri, sed quatenus ob cerebri frigiditatem cor in consensum trahitur, vt ob cordis vitium gignatur materia melancholica, quæ dum cerebrum occupat, fit delirium: si intemperies frigida occurrat post melancholiam: tunc à materia melancholica refrigeratur cerebrum, delirii autem causa est materia, non intemperies frigida. Quare causa interna immediata phantasmatis tenebricosi, est calor naturalis cerebri vt habet mistum spiritum animale, tenebricosum redditum à materia melancholica.

*Spiritus animalis im-
pueitas du-
plex. 1. in
propria sub-
stantia.*

Porro spiritus animalis dupliciter redditur tenebricosus: primo secundum propriam substantiam: secundo ob mistionem materię melancholicę. Secundum propriam substantiam redditur tenebricosus, in melancholia per Essentiam, in qua læditur coctio cerebri ob errorem externum, qui est materia e qua: pimum vel aer impurus, vt euenire solet in peste, vel spiritus vitalis cordis tenebricosus: spiritus enim animalis ex aere, & spiritu vitali generatur. Excluditur autem læsio facultatis: nam si in caput feratur spiritus vitalis bonus, quamuis cerebrum sit intemperatum: non tamen ille mutatur in animale tenebricosum: nam si cerebrum sit calidius, fiet spiritus animalis calidior, & delirium maniacum: si autem cerebrum sit frigidius, e bono spiritu vitali generabitur animalis vel exiguus, vel frigidior, vade functio imminuitur, vt fiat fatuitas, non autem melancholia, quoniam videlicet hic spiritus vitalis non fit tenebricosus. Licet autem e spiritu bono vitali, à capite intemperato non possit generari spiritus animalis tenebricosus: nihilominus e probo sanguine in iecore genito, à corde distemperato generari potest spiritus vitalis tenebricosus. Hoc vt intelligatur, supponendum est, maximum esse discrimen in-

ter sanguinem & spiritum: nam spiritus est mistum à prædominio igneum, ratione vigoris: à prædominio acreum, ratione molis. Spiritus ergo ratione ignis, obtinet partes luminosas, ratione aeris diaphanas: ut spiritus quasi sit expers portionis terrestris & opacæ, quæ diaphanum terminat, ideoque sit inuisibilis: sanguis autem partes opacas obtinet, ut sit visibilis. Vnde, dum spiritus vitalis probus fertur in caput intemperatum, non fit tenebricosus, quia partes opacæ desiderantur: at dum cor intemperie affectum agit in probum sanguinem, potest hunc mutare in spiritum vitalem tenebricosum, propter partes quas habet opacas. Constitutum igitur sit, spiritum animale secundum propriam substantiam tenebricosum fieri, ob errorem externum: qui est vel aer impurus, vel spiritus vitalis tenebricosus. Iam etiam intelligenda est causa spiritus vitalis tenebricosi. Spiritus ergo vitalis tenebricosus, est opus præter naturam genitum in corde, quod sequitur læsam coctionem cordis: læditur autem coctio cordis, vel læsa facultate, vel ob errorem externum, vel utroque modo. Læditur facultas ob intemperiem calidam, item ob intemperiem frigidam, quæ efficacior est, si etiam sit sicca. Intemperies enim calida, dum agit in sanguinem etiam bonum, resolvit portiones diaphanas & luminosas, quæ facilius resolvuntur, unde opacus redditur sanguis. Idem efficit intemperies frigida & sicca, exprimendo portiones diaphanas & luminosas. Diximus autem intemperiem frigidam & siccam potissimum consumere partes diaphanas: nam intemperies calida reddit spiritum tenebricosum, sed feruentem, ut fiat delirium ferinum. Intemperies autem frigida & sicca, originem ducit vel à capite, vel ab alia causa. A capite, dum caput, seu cerebrum est affectum intemperie frigida & sicca, sine materia, vi cuius cor refrigeratur, ut gignat spiritum vitalem tenebricosum: qui delatus in caput, mutatur in animale spiritum tenebricosum: nam summus inter viscera consensus est. Hinc Avicennas dixit, melancholiam fieri ab intemperie frigida & sicca, sine materia: sed ea ratione, ut cõpatiatur cor, frigidumque & siccum euadat. Caput etiam refrigeratur & siccatur ab aere septentrionali. Refrigeratur etiam cerebrum, à solitudine, & mœstitia cum vigiliis, cap. 7. li. 3. de loc. aff. aphor. 23. sect. 6. dum enim cerebrum refrigeratur, etiam cor compatitur, ut spiritum vitalem gignat tenebricosum,

*Spiritus vi-
talis quib.
de causis
reddatur
tenebrico-
sus.*

I.

2. cosum, qui in cerebro in animale tenebricosum mutatur. Potest etiam frigiditas & siccitas fieri ex aliis causis: vt è medicamentis applicitis, de quibus in malis cordis. Si autem spiritus in corde tenebricosus fiat ob errorem externum: hic error est præsertim sanguis melancholicus, genitus in
3. hepate, siue gignatur læsa facultate, siue alio modo. Generatur denique spiritus vitalis tenebricosus, simul & facultate læsa, & ob errorem externum: id quod euenire solet in febribus pestiferis, in febribus prope mortem: nam spiritus vitalis generatur è materia febrili, ab intemperie cordis, vt delatus in caput, mutetur in spiritum animale, adeo syluestrem, vt patientes mortuorum recordentur, maximèque timeant & mœsti sint. Et hæc de spiritu animali, quatenus secundum propriam substantiam redditur tenebricosus.

2. Impuri-
tas spiritus
animalis
ob permi-
ssionē ma-
teriae.

1. Materia
species.

Verum spiritus animalis etiam redditur tenebricosus, ob permissionem materiae melancholicæ. Circa hanc materiam intelligere oportet, Speciem, Vitium, Causas Generantes, & causas Detinentes. Species materiae, potest esse vapor melancholicus, vel Minera, seu humor. Si vapor sit: cerebrum non afficitur primaria affectione, si autem sit minera, cerebrum afficitur primaria affectione. cap. 7. lib. 3. de locis aff. Per primariam autem affectionem non intelligimus cerebrum affici per essentiam: vt quidam nugantur. Nam Galenus loco cit. in melancholia per consensum à toto, statuit cerebrum affici primaria affectione: quare per hanc intelligimus affectionem ex usu, quæ utile indicat. Hinc in melancholia hypochondriaca, quæ fit è flatu, satis est si occurramus mineræ: at si affectus melancholicus fit ex humore, oportet occurrere humori, non modo extra caput, verum etiam in capite existenti. Porro minera est Legitima, vel Spuria. Legitima, est humor, obtinens formam & accidentia humoris melancholici: vt, si materia sit frigida, sicca, nigra, crassa. Spuria, est humor, sola nigredine similis melancholiæ.

2. Vitium
materia.

Vitium materiae pertinet ad Quantitatem, Qualitatem, & Vbi. Ad quantitatem: nam etsi melancholia in exigua copia mista sit, cum spiritu animali, tamen nocet. In qualitate etiam vitium est, quia materia præter naturam est frigida & sicca, quare non exusta, teste Galeno cap. 7. lib. 3. de loc. aff. distinguiturque hæc materia à naturali, tum alimentali, tum excrementitia: nam alimentalis est expers aciditatis: excrementitia quidè est acida, cap. 4. lib. 5. de vl. p. verum

quæ

quæ est præter naturam, multo est acidior, & propterea frigidior, siccior, & crassior. Vitium quod ad ubi spectat, locum habet in melancholia per consensum, secundum motum. In melancholia per consensum materia peccat secundum motum: in qualibet autem melancholia, siue per essentiam, siue per consensum, materia melancholica peccat secundum quietem; nam præter naturam quiescit in cerebro. Quoad motum igitur, cum pateat quodnam sit mobile, digredi oportet, circa terminum à quo, & circa terminum ad quem: unde etiam patebit spatium per quod. Terminus à quo potest esse totum, in melancholia per consensum à toto: totum autem est frigidum & siccum, frigiditate non nativa, sed ascititia. Nam cum Galeno cap. ult. lib. 2. de temperan. si quis à principiis generationis sit frigidus & siccus; hic non est melancholicus, sed pituitosus. Vnde in affectu melancholico totum corpus ante vitium melancholicum est calidum & siccum: vi autem materiæ melancholicæ postea euadit totum corpus frigidum & siccum, nam refrigeratur & siccat à materia melancholica, quæ frigida est & sicca. Hinc Galenus cap. 59. art. med. ait, dum corpus calidum & siccum euadit frigidum & siccum, melancholia dominatur. Terminus à quo, in affectu melancholico, potest etiam esse corporis pars: & tunc fit melancholia Hypochondriaca, originem ducens à ventre inferiori. Quamuis autem plures partes sint in ventre inferiori, Galenus tamen saltem ventriculum & lienem proponit, cap. 7. lib. 3. de loc. aff. cap. 6. lib. 5. de loc. aff. Auicennas addit mesenterium, hepar, & vterum. Cuius discriminis causa fuit, quod Galenus non in proposito, sed exempli tantum gratia sermonem habuit de affectu melancholico; Auicennas vero è proposito de hoc malo verba facit. Sed hic obseruandum, quamuis in melancholia hypochondriaca materia pendeat à pluribus partibus: necessario tamen affici os ventriculi supernum. Hinc Galenus dicit, c. 6. lib. 5. de loc. aff. si patiens sit spleneticus, & accidat ut melancholia hypochondriaca afficiatur; coniiciendum est, quod è splene vitiosa sanies, id est, materia melancholica vitiosa in ventriculum irruat; ut, quamuis hypochondriaca fiat à liene, accidat tamen, quia materia impertitur ventriculo, id est, orificio superno. Hinc etiam Galenus cap. 7. lib. 3. de loc. aff. asserit, tertium melancholiæ genus oriri à ventriculo: & medicos hoc tertium genus vocare melancholiam hypochon-

driacam. Insignis enim est inter os ventriculi & cerebrum consensus. Dicit etiam Galenus cap. vlt. lib. de plenit. si melancholia infestet os ventriculi; homines fieri morosos & tristes. Terminus ad quem, semper est cerebrum: quod tamen diuersimode concurrit: nam interdum Attrahit, interdum Suscipit. Attrahit ratione doloris, & præcipue dum calidius est: ubi notandum, caliditatem cerebri, quæ tractionis causa est, semper excedere caliditatem loci, à quo caput trahit: terminus enim ad quem, semper est calidior terminus à quo: Sic caput trahere potest à toto, à liene; quia caput esse potest calidius liene: non autem trahit caput à corde: Vnde Auicennas loquens de melancholia à corde, non proponit caput calidum. Suscipit etiam caput, ob frigiditatem & humiditatem: ac perinde non semper in melancholia caput est humectandum, sed interdum etiam siccandum. Hinc Auicennas ait, melancholiam quandoque fieri à corde calido & capite humido. Et hæc de vitio materiæ.

3. *Causa generantes melancholicam materiam spuriam.*

Sequuntur causæ generantes materiam melancholicam tum Spuriam, tum Legitimam. Spuria materia tantum est melancholica ratione nigredinis: & generatur à causa refrigerante. Vnde Auicennas & Aetius scribunt, quod frigiditas clarum sanguinis colorem reddat nigrum. Sumpserunt hoc à Galeno, qui c. 2. l. 3. de caus. sym. inquit: sanguinem nigrescere à frigiditate; partes enim diaphanæ & luminosæ exprimuntur, ut sanguis magis reddatur opacus. Hæc autem causa refrigerans, si pertineat ad caput, fit melancholia; per essentiam: ad quam respiciens Galenus, c. 7. l. 3. de loc. aff. ait, melancholiam per essentiam fieri è solitudinibus, è mæstitia, cum vigiliis; nam ex his caput refrigerari potest. Si autem frigiditas spectet ad partes infra caput: tunc fit melancholia per consensum à toto, repleto sanguine nigrescente.

Melancholica materia exquisita à quibus causis oritur.

Materia melancholica exquisita, secundum Galen. c. 10. l. 2. ad Glauc. c. vlt. l. 2. de temperam. c. 7. l. 3. de loc. aff. producit vitio vel Alimenti, vel Agentis. Alimenti vitio; ut si quis alatur carnibus suillis, brassica, lente, pane fursuraceo, caseo antiquo, & aliis à Galeno propositis, c. 7. l. 3. de loc. aff. Agentis vitio producit: dum calor est intensus, ut dissipatis partibus tenuioribus, materia reddatur crassa & nigra: unde Galenus loc. cit. ait, melancholiam per morbos febriles generari. Porro hic calor intensus, viget vel in capite, vel Extra caput. Si in capite, fit melancholia per essentiam: nam

cap. 7. lib. 3. de loc. aff. caput ante affectum melancholicum, si detineatur calida aliqua dispositione, ut inflammatione, phrenitide, &c. generat materiam frigidam & siccam; à qua postea ipsum quoque caput frigidum & siccum enadit. Caput igitur ante morbum fuit calidum: sequente morbo fit frigidum. Si calor vigeat infra caput, potest esse membrum, generationi humorum vel Destinatum, ut hepar; vel Non destinatum, ut ventriculus secundum fundum, mesenterium, lien, & uterus. Si iecur generet melancholiam copiosam; hæc toti per venas impertitur: unde fit melancholia per consensum à toto. Hic autem affectus potissimum viget in ætate declinante, in qua iecur ita calidum esse potest, ut generet melancholiam. Et in hac ætate declinante, cum in toto caliditas marcescat: facile corpus totum à melancholia redditur frigidum & siccum. Secus statuendum de senibus, propter frigiditatem hepatis; ob quam non generatur melancholia. At in ætate florente, licet maxime vigeat caliditas iecoris; quia tamen in hac ætate, etiam totum corpus vehementer est calidum; non ita facile à materia melancholica frigidum & siccum reddi potest. His fundamentis adductus Galenus cap. 7. lib. 3. de loc. aff. ait, homines colore rufos donatos, promptè incidere in intemperiem melancholicam, flauos non item: qui enim colorem habent rufum, assimilantur hominibus ætatis declinantis; qui flauum, hominibus florentis ætatis. Quoad reliquas partes abdominis, earum concurrunt suo calore, qui intensus est redditus propter obstructionem & angustiam: unde hæc partes inflammatione veluti affici videntur. cap. 7. lib. 3. de loc. affect.

Causæ detinentes, secundum Galenum cap. 10. lib. 2. ad Glanc. cap. 7. lib. 3. de loc. aff. pertinent ad melancholiam per consensum à toto; quatenus vi harum causarum, in venis totius corporis colligitur materia melancholica. Unde causa interna esse potest lienis vitium, ut vel non Attrahat excrementum melancholicum, vel non Suscipiat, vel non Expellat. Non attrahit; si lien sit frigidior: non suscipit, si afficiatur lien vel tumore, vel angustia: non expellit, ob frigiditatem, ob angustiam: ut propterea in toto colligatur materia melancholica. Huius classis est nensum suppressio, ob venarum utriusque angustiam, & præsertim in mulieribus, generantibus sanguinem melancholicum. Causæ externæ sunt causæ astringentes; siue sint cibi, siue medicamenta astringentes.

gentia, & præsertim post vsum ciborum melancholicorum, Præterea huc facit, consueta vacuatio suppressa, vt hæmorrhoidum, vteri (notandum obiter: mensium suppressionem, vt refertur in suam causam internam, verbi gratia, in angustiam venarum vteri, numerari inter causas internas: Si autem capiatur, vt consueta vacuatio cohibita, recensetur inter causas externas, quæ pertinet ad inanitionem & repletionem.)

De differentiis.

- Differentia.* In melancholia corrumpitur imaginatio cum timore & **1. A for-** mærore: & corrumpitur vel Sola, vel Simul cum ratione. **ma.** Galenus cap. 7. lib. 3. de loc. aff. cap. vlt. lib. 2. de caus. symp. ait: delirium melancholicum multiplex esse, prout speciatim imaginatio corrumpitur: alius enim imaginatur, se esse factum testaceum, alius Atlantem non sustinere mundum. Causa autem varix imaginationis est affectio tenebricosa varia, ynde & phantasma tenebricosum est varium. Diuersa autem sunt phantasmata, pro varietate causæ Externæ, & Internæ. Quoad causam externam: vt varia fuit cuiusque vitæ conditio, ita varium producit phantasma. Verbi gratia, si quis imaginetur se esse prophetam, ante astronomiæ studuit: si quis imaginetur se esse regem, ante cum principibus vixit, &c. Quoad causam internam, pro varia corporis dispositione, varix fiunt imaginationes: Verbi gratia, si aliquis sit siccioris habitus, putabit se esse testaceum: si patiens flatus copiosos obtineat, imaginabitur se esse capite destitutum, &c. Quoad differentias à subiecto: cerebrum afficitur, vel tantum secundum Anteriorem partem, vel etiam secundum Mediam. Suntuntur etiam differentia ab efficiente, id est, à causa phantasmatizans. Hæc causa est Externa, vel Interna. Externa pertinet ad Animi accidentia, & non ulterius subdividitur. Causa interna est spiritus tenebricosus. Est autem spiritus tenebricosus, vel secundum Propriam substantiam, vel ob Mixturem materiæ melancholicæ. Si secundum propriam substantiam; tunc genitus est, ex impuro vel Aëre, vel Spiritu vitali. Aer non subdividitur. Spiritus vitalis procreatur à corde. Causa autem cur vitiosus & impurus procreetur, est Simplex vel Composita. Simplex est Læsa facultas, vel Error externus. Composita est simul læsa facultas, & error externus. Læsiō facultaris est vel intemperies Calida, vel potiss. Frigida. Frigida producit, vel à Frigiditate, vel
- 2. A sub-** iecto.
- 3. Ab effi-** ciente.

vel à Siccitate capitis, vel Citra hæc. Error, & causa composita, non subdiuiduntur. Si altera è parte spiritus reddatur tenebricosus, ob mistionem materiae melancholicæ, diuisionem admittit. Et primum, quoad speciẽ, materia est Vapor, vel Minera. Minera est Legitima, vel Spuria. Vitium materiae, ratione quantitatis, & qualitatis, habet differentiam secundum Magis & Minus. Verbi gratia, materia est, magis vel minus frigida, sicca, crassa. Quoad vitium secundum ubi, ratione quietis, est differentia secundum Magis & Minus. Ratione motus, & primũ causa termini à quo mouetur materia; dicendum, moueri vel à Toto, vnde est melacholia per consensum à toto: vel à Parte, vnde est melacholia per consensum ab hypochondriis. Et, si à parte mouetur materia, mouetur vel à Fundo ventriculi, vel à Mesenterio, vel ab Hepate, vel à Liene, vel ab Vtero. Terminus ad quem est cerebrum: quod vel Attrahit, vel suscipit. Quo ad causas generantes; cum generetur materia melancholica, modo Spuria, modo Legitima: ideo & causa generans est duplex. Causa generans spuriam materiã, est causa refrigerans, quæ diuisionẽ admittit secundum Magis & Minus: & præterea diuisioni subiicitur, vt ratione loci pertinet vel Ad caput, vel Infra caput. Causa generans legitimã melancholiam, subdiuitur: est enim vel Intemperies, vel Victus melancholicus. Si intemperies est calida, differre potest secundum Magis & Minus: & præterea differre potest ratione loci: & est vel in Capite, vel in Toto, vel in Iecore, Liene, in Fundo ventriculi, in Mesenterio, &c. Causa detinens est Interna, vel Externa. Interna est vitium Lienis, vel Venarũ sedis, vel Vteri. Externa causa est astringens: & hæc differre potest secundum Magis & Minus: & præterea secundum speciem, vt pertinere potest ad materiam specificam, vel Medicinalem, vel Diætericam.

De Signis.

Imminens melancholia indicatur è præsentia causarum, è vigiliis, è somno turbulento, cum tristibus imaginibus, ex inertia totius corporis & sermonis, ex oculorum lumine obtenebrato: hæc enim omnia indicant imminere phãtasma tenebricosum, à quo postea cerebrum afficitur. Quoad melancholiam præsentẽ, cum Galeno cap. 3. l. quod animi mores, ca. vi. lib. 2. de caus. symp. cap. 7. li. 3. de loc. aff. indicatur è timore & mœrore, sine causa: nam, prout cerebrum afficitur

Signa melancholia imminẽtis.

Signa præsentis: in genere.

*Difficilis
Hippocra-
tis apho-
rismus.*

affectione simili tenebris, ita sit timor & incertor. Produci-
tur autem hæc affectio, non à colore nigro, vt Galeno ascri-
bit Auerroës; sed à phantasinate tenebricoso, quod in cere-
brum agit, vt in organum imaginatricis. Notandum Hip-
pocratem aph. 40. sect. 7. dixisse; si lingua repente inconti-
nens fiat, vt aliqua pars corporis stupore afficiatur, esse id
melancholicum. Galenus in commento inquit, se ignorare,
cur hæc sint melancholica: quoniam linguæ paralyfis &
stupor sunt vitia, quæ potius fiunt à pituita, quam à melan-
cholia: Cum hoc ignorarit Galenus, nos forsitan magis id
ignoramus. Dicendum tamen fortassis, Hippocratem per
melancholiam, non intelligere eam, de qua in præsentia est
sermo: sed loqui de paralyfi linguæ, & de stupore alicuius
partis, vt fiunt potius à melancholia, quam à pituita. Para-
lyfis enim & stupor capiuntur, vel vt simpliciter generan-
tur, vel vt respiciunt subiectum, quod afficitur. Si capiantur
primo modo, vt simpliciter generantur, paralyfis & stupor
potius fiunt à pituita. Si autem capiantur vel respiciunt sub-
iectum, cum hoc possit esse vel totum, vel pars: rationabile
est, totum affici à materia copiosa, partem à minus copiosa:
& præterea cum melancholia sit in minori copia, quam pi-
tuita: ob id, dum afficitur vel lingua, vel alia corporis pars,
ad differentiam totius: dicendum, hanc affectionem prodire
à melancholia, vt à materia minus copiosa.

*Signa dif-
ferentia-
rum.*

1. *A for-
ma, &*
2. *A sub-
iecto.*
3. *A cau-
sa effi-
ca.*

Quoad cognitionem differentiarum, & primum ratione
formæ: has manifestabit sermo ægri. Differentiæ à subiecto
etiam facile cognoscuntur: nam, verbi gratia, si obseruemus
solam imaginationem esse corruptam: statuendum cere-
brum secundum partem tantum anteriorem esse affectum:
si etiam ratio afficiatur; cerebrum etiam secundum me-
diam partem est affectum. Quoad differentias à causa effi-
ciente: cum fiat hoc vitium ab affectione tenebricosa, cuius
causa est phantasma tenebricolum, quod produci-
tur à causa externa, vel interna; nam difficulter hæc distinguuntur, ex
origine & curatione: Ex origine, si, verbi gratia, originem
duxerit ex animi accidentibus: è curatione, vt si remouea-
tur ex impositione pilei plumbei, iudicabitur malum oriri
à causa externa: contra, si ab interna. Quoad internam, cum
sit spiritus tenebricosus redditus, vel secundum propriam
substantiam, vel missionem materiæ melancholicæ: iudi-
cabitur tenebricosus esse redditus, secundum propriam sub

*Cause in-
ternæ si-
gna.*

Substantiam, si delirium sit assiduum : si præsentes, vel prægressæ sint huius causæ, de quibus loco suo dictum est. Si enim fiat tenebrosus ob permissionem materiæ melancholicæ: pariter causæ aderunt, vel præcesserunt. Vnde, quoad spiritum tenebrososum secundum substantiam, cum causa sit, vel aër, vel spiritus vitalis: aër facile cognoscetur. Si nulum sit vitium in aëre, iudicandum est, malum prodire è spiritu vitali. Verum spiritus vitalis gignitur, vel læsa facultate, vel ob errorem externum, vel utroque modo. Si gignatur læsa facultate; cognoscitur è signis indicantibus cor vel calidius, vel frigidius : de quibus in propriis locis. At, cum frigiditas producat vel à cerebro, vel ab alia causa: Si producat cordis frigiditas à frigido cerebro, signa erunt frigidi cerebri, & præcessere causæ refrigerantes, ut animi accidentia: Si vero non prodeat à capite, præcesserunt causæ refrigerantes cor. Et si fiat ob errorem externum, id est, ob sanguinem melancholicum, erunt signa hepatis calidioris, neque signa erunt totius corporis frigidi & sicci. Si generetur & læsa facultate, & ob errorem externum : cognoscitur facillime è signis febris pestilentis, & mortiferæ. Si generetur spiritus tenebrosus ob permissionem materiæ melancholicæ: cognoscenda sunt signa speciei, vitij, causarum generantium, & detinentium. Quoad speciem : vapor cognoscitur, quia symptomata sunt mitiora, delirium est per intervalla, non adest gravitas, & signa assunt hypochondriacæ. Si minera, seu humor est causa: omnia erunt graviora. At minera, si sit spuria: cognoscitur è causis refrigerantibus : si legitima, è signis causarum calefacientium. Quoad vitium: & primum in quanto: cognoscitur materia esse in maiori copia, è vehementia symptomatum, è gravitate. Vitium in qualitate, pertinet ad frigiditatem, siccitatem, & crassitatem, sed secundum magis & minus : id quod cognoscitur ex intensione & remissione symptomatum. Quoad ubi, cum respiciat motum, & quietem: materia quiescens cognoscitur è perseverantia symptomatum. Quoad motum ; & primum quantum ad terminum à quo : esse totum corpus cognoscitur, è cap. 7. lib. 3. loc. aff. si corporis habitus antea fuerit calidus, nunc autem sit frigidus & siccus: præterea cognoscitur è suppressa aliqua vacuatione consueta sanguinis melancholici: præterea è vitio melancholico prægresso. Partem autem esse terminum à quo : cognoscitur

*Spiritus
tenebrico-
si, secundum
substantiā,
signa.*

*Signa te-
nebricosi
spiritus,
ob missio-
nem melan-
cholia.*

*Species ma-
teria ut
cognosca-
tur.*

*Vitij si-
gna.*

*Hypochon-
driaca si-
gna.*

ē signis melancholiæ hypochondriacæ, nimirum, quod prius oriuntur symptomata circa ventriculum, quam circa caput: adhæc, vt ventriculi symptomata intenduntur, ita etiam delirium melancholicum intenditur, & vt illa remittuntur, ita etiam minuitur delirium. Cum autem in hypochondriaca possit affici, fundus ventriculi, lien, iecur, &c. singula ē propriis capitibus cognoscuntur. Facile etiam cognoscitur terminus ad quem, id est, num caput attrahat, vel suscipiat. Si attrahit; cognoscitur ē calore & dolore. Si suscipit; cognoscitur ē signis frigiditatis, vel humiditatis cerebri: de quibus in dol. cap. Facile cognoscitur, an causa generans, sit causa melancholiæ, vel spuria, vel legitima, e signis caliditatis aut frigiditatis. Causæ detinentes admodum facile cognoscuntur e sermone ægri, & assidentium. Et quotiescumque sunt internæ; an pertineant, vel ad lienem, vel ad hæmorrhoidas, vel ad vterum: ē propriis locis petendum.

De indicationibus.

Indicationes.

A subiecto.

A causa effie.

Ab affectione tenebricosa.

Præsidia sumuntur ab essentia: essentia autem pertinet ad formam, subiectum, & causam efficientem. Forma non est ex usu: nam pendet ab affectione. Quoad subiectum, cum sit cerebrum & calidum innatum: oportet conseruare & fouere proportionem cerebri, vt in sermone de dolore cap. Quoad causam efficientem, cum sit affectio tenebricosa, cuius causa est phantasma tenebricosum, quod producit a causa externa, vel interna: si capiatur causa efficiens, vt affectio tenebricosa morbose; indicat affectionem contrariam tenebricosæ & morbosæ: vnde Paullus huc respiciens, dicit, mentem ad alia esse diuertendam. Verbi gratia, phantasma quod imprimit in cerebro affectionem, est vsurpandum, vt imprimat affectionem, quæ sit efficacior, quam tenebricosa. Hoc remedium in affectu melancholico quandoque est sanans, quandoque anodynum. Si enim affectio tenebricosa pendeat a causa externa, est sanans, quia malum non amplius redit; verbi gratia, cum per pileum plumbeum, homo prorsus liberatur: At si melancholia producit a causa interna; erit remedium anodynum, non sanans: nam huius beneficio, inquit Paullus, mens ad alia deducitur; ac non prohibet hoc remedium mali reditum, quoniam adest causa interna. Quare indicatio est haurienda a causa interna.

& proinde à spiritu animali tenebricoso. Hic autem est tenebricosus, vel secundum propriam substantiam, vel ob mixturem materiæ melancholicæ. Si sit tenebricosus secundum propriam substantiam, non videtur pertinere ad methodum medendi, & videtur esse indicans inutile, quia remouetur ad remotionem materiæ: ablato enim impuro aere, vel spiritu vitali, ilico spiritus animalis purus euadit: vnde in id incumbendum esse videtur, quo aer, spiritusque vitalis cito puri reddantur. Quod si ergo, verbi gratia, spiritus animalis tenebricosus fiat è prauo aère, & pro remedio vsurpetur bonus aer; certe hæc materia remedij supponit indicans; de quo tamen, quodnam sit, ambigitur? Spiritus enim animalis tenebricosus non indicat vtile; aer autem non indicat, quia est causa externa.

*A defectu
puri ali-
menti, spi-
ritus ani-
malis.*

Pro resolutione scire oportet, spiritum tenebricosum, ea ratione qua est morbificus, indicare remouens: minus genericum est spiritus vitalis, vt vel excedit, vel deficit: in præsentia, vitium in excessu non est ex vsu, dum enim auferatur alimentum impurum, ilico cessat excessus prauitatis: quare indicans est vitium secundum defectum; defectus enim puri alimenti, indicat purum alimentum: vnde indicatio est à præsentia vitio, cuius essentia est defectus puri alimentis: defectus puri alimenti, si est aeris, indicat purum alimentum æreum, si spirituum, indicat alimentum spiritale: vt alimentum æreum, ceu indicatum, pro materia habeat aërem bonum, qui non est indicans, alimentum autem spiritale pro materia habeat spiritum vitalem purum.

Cum ergo opus sit puro vel aère, vel spiritu: Quoad aërem, huius inuentio est extra methodum medendi. Quoad spiritum vitalem, cum sit causa morbifica interna, ideo habet rationem indicantis: spiritus enim vitalis purus, est materia remedij; impurus est indicans. Cum autem spiritus vitalis impurus pendeat, à vitio vel Generantis, vel Materiæ, vel à vitio Vtriusque: ob id indicans vtile capi debet à vitio propositorum. Virium agentis pertinet ad cor; ideoque remedia sunt referenda ad cor, quæ foueant vel proportionem cordis, vt cordialia; vel dirigantur ad cordis vitia dissipanda. Verbi gratia, si intemperies calida est, indicantur frigida: & si frigida, indicantur calida. Et si contingat, vt intemperies cordis frigida, foueatur à frigiditate & siccitate cerebri; oritur indicatio calefaciendi & humectandi cerebrum.

*Ab impu-
ritate spi-
ritus vi-
talis.*

2. Materia è qua, est sanguis melancholicus, genitus à seci-
nore calidiore: vnde oritur indicatio vacuandi sanguinem
3. melancholicum, & refrigerandi iecur. Si producatu-
r ratione vtriusque, id est, & ratione vitij agentis, & materiae opus
est, & cor refrigerare, & materiam febrilem euacuare:

*A mistio-
ne materiae
melancholice, cum
spiritu ani-
mali.* Quatenus spiritus animalis tenebricosus redditur, propter
misionem materiae melancholicae: sumendae sunt indica-
tiones à materia melancholica: & quidem à specie, à vitio;
à causa generante, & detinente. Quoad speciem, siue sit
vapor, siue minera, tam spuria, quam legitima; prodit
remedium determinatum, quod alias docuimus. Verbi

1. *A specie
materiae.* gratia, si melancholia copia peccet, erit minuenda mate-
ria, sed melancholica, vnde euadit remedium determina-
tum causa speciei. Quoad vitium quantitatis, indicatur mi-
nuens. Quoad vitium qualitatis, cum sit materia frigida
sicca, crassa; oritur indicatio calefaciendi, humectandi, &
2. *A vitio
materiae.* attenuandi. Quoad vitium secundum vbi, & primum ra-
tione quietis; vt materia melancholica quiescit, est dimo-
uenda & discutienda: vt autem est in capite, est discutienda
in capite, vt sit indicans determinatum. Quoad motum, in
hoc oportet perpendere tum fluxum, tum fluxum termi-
num. Fluxus, vt est praeter naturam, indicat remedium re-
trahens: quod contrahitur à termino morbifico motus, ni-
mirum à termino à quo, & ad quem. Hi autem termini

possunt bifariam perpendi, Simul, & Seorsum. Si simul per-
pendantur, motus vitiosus est, vel ab ante ad post, aut con-
tra: vel à dextro ad sinistrum, & contra: vel à supra ad infra,
& contra: & propterea indicatur remedium retrahens, vel
ad anteriora, vel posteriora; vel dextrorsum, vel sinistror-
sum: vel sursum, vel deorsum. Cum ergo in melancholico
affectu materiae motio sit ab inferioribus ad superiora: indi-
catur retrahens ad inferiora. Si seorsim perpendantur ter-
mini: quantum ad terminum à quo, cum sit infra in affectu
melancholico: hic terminus vel est communis, vel determi-
natus. Communis terminus in melancholia est totum: de-
terminatus terminus, in melancholia scilicet hypocondria,
sunt hypocondria. Si ergo melancholia fiat per con-
sensum à toto, vt terminus à quo sit communis: indicatur
remedium retrahens infra, sed ad omnes partes, non modo
ad brachia, sed etiam ad crura, non modo ad dextrum la-
tus, sed etiam ad sinistrum. Si autem terminus à quo sit
deter

determinatus : indicatur remedium retrahens infra , sed ad partes determinatas, verbi gratia, cum in melancholia hypochondriaca , terminus a quo sit regio abdominis : est vel media, vel dextra, vel sinistra: si media, vt si melancholia fiat per consensum à fundo ventriculi, à mesenterio, & iis partibus quæ pertinent ad mediam regionem abdominis: indicatur remedium retrahens infra abdomē, ad vtramque partem, id est, ad crus & dextrum, & sinistrum. Si autem fiat ab hepate: tunc indicatur remedium retrahens infra iecur, ad dextrum crus. Si fiat à liene, indicat remedium retrahens infra lienem, ad crus sinistrum. Notandum harum propositarum partium situm, non indicare retrahēs, cum à situ non capiatur indicatio : sed situm esse signum termini morbifici à quo. Secundo notandum, differentiam esse inter retrahēs infra, ad dextrum vel sinistrum, vt indicatur à motu, ratione vel vtriusque termini, vel ratione solius termini à quo: nam primum remedium, respicit vtrumque terminum indifferenter, id est, ad dextrum & sinistrum: præterea indicat remedium retrahens ad terminum oppositum termino à quo, verbi gratia, si materia fluat ad dextrum, indicatur retrahens ad sinistrum. At si remedium respiciat solum terminum à quo: remedium non est indifferens, verbi gratia si sursum moueatur materia in liene, indicatur retrahens infra ad partem sinistram. Terminus ad quem, indicat vel vt attrahit, vel vt suscipit. Si attrahat, causa doloris, indicat remedium vel sanans, vel anodynum: Si attrahat causa caloris, indicat refrigerans. Si indicat terminus ad quem, vt suscipit, causa frigiditatis, vel humiditatis: semper contrarium indicat. Quodlibet autem horum remediorum est retrahēs, verbi gratia si terminus ad quem, sit calidus, indicat frigidum retrahens, cuius beneficio retrahitur materia, vt nō amplius fluat. Causæ etiā generantes suas habent indicationes. Cum igitur materia melancholica sit spuria, vel legitima: si fuerit spuria, oritur indicatio calefaciendi, modo cerebrum, modo cor, prout causa generans materiam spuriam frigidam, pertinet ad cor, vel ad cerebrum. Si legitima sit materia, si generetur vitio agentis, sique ad caput pertineat, non indicat: nam causa generans legitimam melancholiam in capite, est intemperies calida, quæ præcessit: indicatio autē non sumitur à præterito. Si pertineat ad iecur, oritur indicatio refrigerandi iecur. Et si materia melancholica causa generans,

3. A causa generatio.

est

est calor auctus ratione angustiae, quemadmodum contingere solet in melancholia hypochondriaca: indicatio utilis non ab angustia, sed à materia obstruente capitur, ut copiosa materia, sit euacuanda, viscida detergenda, &c. Quoad vitium melancholicum, ab hoc non sumitur indicatio: si enim vsurpentur cibi, qui sunt materia alimenti indicati à virtute, malum euanesceat. Quoad causas detinentes, cum sint vitia lienis, sedis, vel vteri: siue sint dyscrasiae, siue obstructions: desumentur indicationes è propriis capitibus.

De Prognosticis.

Prognostica.

VITIVM hoc non est contemnendum, quia læditur actio principalis: ut propterea vitium sit vehemens ratione dignitatis, saltem causa melioris vitae. Vnde cum Hippocrates ait, aphor. 53. sect. 6. desipientiam cum risu esse bonam, cum studio periculosa: Galenus in com. addit, nullam desipientiam esse securam. Patet igitur non esse vitium despiciendum. Quoad vim differentiarum, & primum quoad differ-

Prognostica differentiarum.

entias à forma: si imaginatio tantum corrumpatur: non adeo insignis est vehementia: Si autem cum imaginatione corrumpatur etiam ratio: est vitium magis vehemens ratione essentiae & dignitatis, quia imaginatio in priori est cerebri parte, ratio in media. Quoad differentias à causa efficienti: cum melancholia fiat ab affectione tenebriosa, cuius causa

A forma & subiecto.

A causa efficiente.

A causa externa.

Ab impuritate spiritus animalis secundum substantiam.

est φάντασμα, cuius phantasmatis causa est externa, vel interna: Si causa sit externa, malum est admodum remissum: nam causa externa est minimae vehementiae, ratione essentiae: vnde cum Alexandro hæc melancholia solo artificio curatur. Causa interna est spiritus animalis tenebriosus: qui, si talis reddatur secundum propriam substantiam: si quidem hoc fiat ratione aeris impuri, hæc melancholia facile curatur, aeris mutatione. Maior est difficultas in curatione, si fiat à spiritu vitali: tunc enim spiritus animalis magis recedit à naturali statu, vnde maior est vehementia essentiae: adhuc, aer solum pertinet ad cerebrum, spiritus autem vitalis & ad cor, & ad cerebrum, vnde etiam est vehementia dignitatis. Caterum, cum spiritus vitalis tenebriosus generetur in corde ob varias causas: si gignatur vitio agentis, tunc cor est calidum, vel frigidum: dyscrasia frigida vehementior est ratione essentiae, quam calida: nam frigida potest

potest esse intensa, calida non, quia esset delirium ferinum: præterea, quoniam cor suapte natura est calidum, sit vt frigida intemperie existente maior sit recessus. Frigiditas cordis produci potest, vel à frigido & sicco cerebro, vel ab alia causa: dum paritas seruator, vitium est peius, si fiat à cerebro frigido & sicco: nam malum est geminatum, quia adest morbus frigidus & in corde & in cerebro: & præterea additur vehementia dignitatis, cum lædatur cor & cerebrum. Verum, si ante cor non lædatur cerebrum, malum est remissius. Quod si contingat, cerebri frigiditatem esse vehementem, & in habitu; necessario malum melancholicum vsque ad mortem comitatur: vnde est com. aphorif. 36. sect. 6. talis melancholia minatur stuporem, conuulsionem, cæcitatem. Si spiritus vitalis tenebricosus producitur ob errorem externum, nimirum vitio materiæ melancholicæ: id est, sanguinis melancholici in hepate geniti: curari potest, euacuando sanguinem, & iecur refrigerando, si huius ratione spiritus vitalis reddatur tenebricosus. Hoc autem modo facilius fieri potest, modo difficilius, pro diuersitate causæ generantis, de qua paulo post. Si fiat spiritus vitalis tenebricosus, vitio & agentis & materiæ, vt in febribus prope mortem: patet vitium esse lethale: Sed hæc melancholia potius est secundaria, quam principalis, nam pendet à vitio febris: est autem prorsus mortalis hæc melancholia: nam & agentis & materiæ omnis vehementia est in summo: Agens enim est cordis intemperies febrilis, maxime recedens à statu naturali, vt insignis sit vehementia essentix: est intemperies cordis, quare summa vehementia dignitatis & facultatis, morsque est proxima. Materia è qua, est vapor febrilis, maxime recedens à statu naturali, vnde summa vehementia secundum essentiam: nocet cordi, quare vehemens, ratione dignitatis: deicit facultates, quare vehemens, ratione facultatis. Quod si spiritus animalis (non vitalis) fiat tenebricosus ratione permixtæ materiæ: oportet perpendere in materia, vehementia speciei, vitij, causæ generantis, & causæ detinentis. Quoad speciem, vapor citius vincitur: quia minus recedit à spiritu, quam minera. Et minera spuria facilius curatur, nam recedit solum per colorem: exquisita difficilius, quia etiam recedit secundum alia vitia. Quoad vitium materiæ: ratione quantitatis, vt materia est copiosior, ita difficilius est curationis, vt immineat epilepsia, stupor, cæci-

*Ab impu-
ritate spi-
ritus ani-
malis ob
mixturem
melancho-
lia.*

1.

2.

125. ob copiosam materiam, com. aphor. 56. sect. 6. Ratione qualitatis, quo materia frigidior, sicciore, crassior, eo erit difficiliore curationis, nam adest maior vehementia ratione essentiae. Ratione quietis, quo materia magis quiescit, eo malum difficiliore est curationis. Ratione motus, & primū ratione fluxus, prout materia maiori cum impetu mouetur in caput, malum magis redditur periculosum, nam est maior vehementia ratione essentiae. Quoad terminos, à quo, & ad quem: si simul perpendantur; si materia prorsus moueatur ab infra ad supra, malum magis est periculosum: minus autem periculosum, si materia incipiat moueri infra: Quod cognoscens Hippocrates, ait aphor. 11. sect. 6. atra bile vexatis, hæmorrhoides superuenientes, bonum. Si termini motus seorsim perpendantur: quantum ad terminum à quo, vt pertinet ad partes magis præcipuas, ita etiam augetur periculum, ob vehementiam dignitatis: vnde malum perus est: si prodeat à iecinore, quam si à liene, cæteris paribus.

3. Quoad terminum ad quem, minus periculi est, si fiat modo attractionis, quam receptionis. Quoad causas generantes, si perpendatur causa generans, ratione materiae spuriae, si fuerit frigiditas, siquidem hæc ad cor pertineat, deterior est: nam magis recedit à naturali statu, & præterea insignis est vehementia, ratione dignitatis, quia in corde. Si hæc intemperies frigida pertineat ad cerebrum, cum Galeno capite septimo, libro tertio, de loc. aff. si recens sit, facile curatur. Ratione exquisitæ materiae melancholicæ, si fiat vitio alimentum, facile tollitur. Si fiat vitio agentis, cum sit calor intensior: difficultas curationis pendet à vehementia essentiae, & potissimum materiae: nam caliditas, quæ ad caput pertinet, iam desit ante affectum melancholicum: vt curatio dirigatur ad materiam, quæ magis vel minus vincitur, pro ratione vehementiæ, vt dictum est. Si autem caliditas sit infra caput, ratione essentiae non est admodum vehemens, alias enim generaretur materia exusta, vnde delirium fieret ferinum, non melancholicum. Curationis ergo difficultas posita est in materia obstruente: quæ interdum ita est crassa & viscida, vt non possit expugnari: & vos in praxi obseruabitis, melancholiam hypochondriacam quandoque non posse curari. Detinentes causæ attinent ad lienem, hæmorrhoides, vterum. Vnde malum difficilius: quo lien frigidior, quo lienis obstructio vehementior, quo lienis tumor maior: & si

tumor

tumor sit scirrhus, melancholia est incurabilis: idem dicendum de hæmorrhoidibus, & de vitis vteri.

De Curatione.

GALENVS cap. 7. lib. 3. de locis aff. non proponit, phlebotomiam in melancholia per essentiam, quamvis malum sit vehemens saltem ratione dignitatis, & virtus robusta. Non autem probat, quia in hac melancholia per essentiam, adest materia melancholica excrementitia, genita à procedente caliditate capitis: ideoque cum alia sit à sanguine, nec sanguis in toto redundet, Galenus venam non secat. At si contingat, melancholiam esse per essentiam in capite, & à iecinore generetur sanguis copiosus, vena erit secanda. Galenus ergo non admittit venæ sectionem, dum respicit ad materiam quæ est principalis, siue sit immediata, siue mediata. Verum si respiciamus ad causam sine qua non, Galenus non improbare venæ sectionem: non enim licet caput euacuare, nisi totum euacuetur. Præterea Galenus loc. cit. respicit ad melancholiam recentem, quæ, ut ipse ait, leuioribus tollitur: at si producat longius, requirit fortiora, ut totum sit euacuandum. In melancholia autem per consensum à toto, vena est secanda: nam è necessitate in toto peccat sanguis vehemens secundum essentiam, cum caput petat: ut vena secta necessario egrediatur sanguis melancholicus, non tenuis. Ideoque recte intelligendus est Galenus cap. 7. lib. 3. de loc. aff. dum ait, in melancholia si aperiatur vena cubiti, inspicendum esse sanguinem, & si egrediatur sanguis tenuis, ilico esse supprimendum: si autem crassus & melancholicus, esse permittendum ut exeat. Galenus hoc in loco respicit ad melancholiam, quatenus sit per consensum vel à toto vel à parte: & secat venam ratione cognitionis, ut scire queat, an sit melancholia per consensum à toto, an per consensum ab hypochondriis. Sic venæ sectio Galeno est signum: siquidem in opere de locis affectis circa signa versatur: nec ibi proponitur ut materia remedij. Quod si ergo sanguis egrediatur non melancholicus: oportet iudicare, melancholiam non esse per consensum à toto. Recte ergo diximus in omni melancholia per consensum à toto, in venis totius redundare sanguinem melancholicum. Hæc de venæ sectione gratia melancholiæ per consensum à toto. Quoad melancholiam

Curatio.

Vena sectio in melancholia per essentiam.

Vena sectio in melancholia per consensum à toto.

In melan- melancholiam hypochondriacam : in hac probatur venæ se-
cholæ hy- ctio, quia in hypochondriis generatur materia cum sangui-
pochōdria- ne mixta : adhuc ob materiam obstruentem caliditas inten-
ca. ditur: insuper, nisi sanguis euacuetur, tuto non possumus uti
 calidis medicamentis, ad materiam melancholicā obstruen-
 tem: adhuc, hypochondriaca affectio est veluti inflammatio,
 quare conuenit venæ sectio, ut ex accidenti refrigeret. Li-
 cet ergo sanguinem euacuare in qualibet melancholia : sed
vsus vena copiosiores in melancholia per consensum à toto. Quoad
sectionis. rectam administrationem: pro vehementia sanguinis, quan-
 doque confertim licet euacuare sanguinem. Vnde Auicen-
 nas in illa melancholia, quam vocat Alchatrab, vnica vice
 sanguinem euacuat, & iubet detineri foramen apertum ad
 leipothymiam. Quoad modum: amplius seu maius foramen
 faciendum. Quoad tempus, cum sanguis vincit alia indi-
 cantia: ideo cum Auicenna à venæ sectione est incipiendum,
 nisi virtus prohibeat: nam si sit debilis, reficienda virtus,
 mox vena secanda. Et, si virtus non permittat venæ sectio-
 nem, ad cucurbitulas confugiendum, & ad hirudines. Quo-
 ad Vbi, hoc indicatur à subsistentia sanguinis: Si ergo san-
 guis in capite contineatur, vena frontis secanda: si in toto,
 vena cubiti, si intra hypochondria, venæ crurum: & in me-
 lancholia à toto, si sanguis subsistat & in toto, & in capite,
 secanda est vena cubiti, & frontis. Cæterum in melancho-
 lia per consensum à toto, si totum est repletum causa hepa-
 tis: secanda vena dextri cubiti: si autem sanguis detineatur
 in toto, causa lienis: secanda vena cubiti sinistri. Et hoc mo-
 nere volui, eo quod supra dixi, in melancholia locum habe-
 re causas generantes, ut est hepar, & causas detinentes, ut est
In melan- lien. In melancholia hypochondriaca, nunquam est secanda
cholæ hy- vena brachij, licet practici hoc non obseruent: fundamētum
pochōdria- est, nam sanguis subsistit infra iecur: & præterea sanguis ille
ca non esse sursum mittit vapores, ut oporteat deorsum retrahere, non
secandam ad brachia. Adhuc, cum sanguis vitiosus pertineat ad hypo-
venam cu- chondria, & bonus sanguis attineat ad totum (non enim est
biti. melancholia per consensum à toto, sed per consensum ab
 hypochondriis) per sectionem venæ cubiti, vacuatur san-
 guis bonus, & non melancholicus: & facta hac euacuatione,
 ne detur vacuum, fit attractio ad superiora sanguinis melan-
 cholici. Hinc Galenus cap. 7. lib. 3. de loc. aff. iubebat, ut in
 melancholia vena cubiti secetur, & si sanguis non melan-
 cholicus

cholikus egrediatur, ilico esse suppressendum: at in venis totius dum sanguis est melancholicus, est melancholia per consensum à toto: dum autem in toto sanguis non est melancholicus, si est melancholia per consensum, necessario est melancholia hypochondriaca. Quare in omni melancholia hypochondriaca hoc observandum, dum sanguis est euacuandus, ut euacuetur per venas crurum, vel per venas hæmorrhoidum, sic enim sanguis melancholicus euacuabitur & reuelleretur ad inferiora: id quod per sectam cubiti venam nunquam assequemur.

Quoad Hirudines, quamvis possint applicari hæmorrhoidibus in melancholia per consensum à toto: potissimum tamen probantur in hypochondriaca. Sed de his, & aliis, in sermone de dolore capitis egimus.

Hirudines.

Medicamenta sunt Vacuantia, & Alterantia. Vacuantia, vacuant per meatus Sensibiles, vel Insensibiles. Alterantia respiciunt vel Inducantia, vel Proportionem tum Cerebri, tum Cordis. Cum autem triplex sit melancholia: videndum, quæ medicamenta magis in vna, quam in alia specie probentur. Itaque quoad vacuantia per sensibiles meatus, & primo in melancholia per essentiam: si hæc materia genita est à spiritu vitali tenebricoso; causa sanguinis melancholici probatur medicamentum mite, ut *senæ, polypodium, epithymus, cum sero lactis*, propter iecoris caliditatem, ob quam genita est materia melancholica. At si melancholia per essentiam facta sit ob mitionem materiæ melancholicæ, genitæ in capite: hæc melancholia est vel recens, vel antiqua: Si recens: purgantia medicamenta vehementiora non probantur: ratio est, quia materia solum abundat in capite, unde exigua est materia nec pertinaciter hæret: & Galenus cæ. 7. lib. 3. de loc. aff. gloriatur, se recentem melancholiam per essentiam curasse solo balneo, & victu euchymo. Si inueterata sit: fortiora sunt usurpanda, ait Galenus loc. cit. ubi per fortiora, non intelligit vehementer soluentia, sed loquitur in respectu ad balneum, & victum euchymum: quibus medicamentum leniens est fortius. Adhæc in ea melancholia materia est genita in capite, ut in toto alij succi possint dominari, nimirum pituitosus & biliosus succus; qui quibus medicamentis purgandi sint, in sermone, de dol. cap. diximus. Quare per fortia, intelligemus medicamenta, quæ melancholiam in capite existentem strenue possunt euacuare:

Pharmacis.

1. Vacuantia sensibilibus.

1. In melancholia per essentiam.

humor enim in capite existens, maxime vacuationi resistit. Sunt autem hæc medicamenta quæ valide vacuât per os & nares, vt per meatus sensibiles; & quæ vacuant per futuras, vt per meatus insensibiles: de quibus medicamentis omnibus in sermone de cephalalgia. Si melancholia sit per consensum à toto: quoad medicamenta quæ euacuant per meatus sensibiles, probantur vacuantia & primas superfluitates, & purgantia materiam melancholicam, in toto existentem: quæ medicamenta modo leuiora, modo fortiora sunt administranda, pro vehementia materiæ. Quæ sint hæc medicamenta, patet ex alibi dictis. At propter iuniores quædam monere oportet. Primum si materia melancholica fiat vitio iecoris calidioris, generantis melancholiam: cum soluentibus miscenda sunt frigida. Si autem melancholica materia reperiatur in toto, causa lienis detinentis: miscenda sunt potius calida cum soluentibus. Vnde Galenus capite nono, libro decimoquarto, method. cum epithymo miscet modo serum, modo mulsam: serum ratione iecinis: mulsam ratione causa detinentis, nimirum lienis.

2. In melā-
cholia. per
consensum
à toto.

Notanda
in usu sol-
uentium.

1.

2.

Passula
laxativa.

cum vti debeamus leuioribus & fortioribus soluentibus, & vitium quandoque sit diuturnum: formulas quasdam seu receptas trademus: præsertim modum explicabimus ordinandi passulas, de quo medicamento in sermone de dol. cap. nihil diximus. Quare R. fol. sena ʒ ij. epithymi minimi incisi ʒ j. infundantur in infusione solutiuæ rosarum per 24. horas: deinde facta diligenti expressione, adde passul. dul. lb j. & fiat infusio in prædicta infusione, & immittantur in vas, addito saccharo, & seruentur ad usum. Et hoc erit satis mite medicamentum, quo poteritis vti ab ʒ β. ad ʒ ij. & si volueritis, vt efficacius operetur: addetis mel ros. solutiuum. Medicamentum autem forte erit: R. cort. helleb. nigri ʒ iij. sem. anisi, citri, cinnamomi, ana ʒ vij. passul. d. ʒ ij. fiat infusio in sero lactis: deinde facta diligenti expressione, adde manna el. ʒ ij. Mis. & fiat potio brevis. Hic helleborus niger est basis: serum, frigiditate sua helleborum corrigis, & detergendo adiuvat: semina cum cinnamom. corrigunt vim hellebori nigri deleteriam, vt sunt medicamenta cordialia: sua etiam caliditate & tenuitate adiuvant: passula autem vt dulces, corrigunt amaritudinem: vt habent vim lubricandi, adiuvant: manna, vt dulcis, corrigis amaritudinem: vt habet vim lentendi, adiuvat.

Tertio

Tertio notandum circa Quando, in melancholia per consensum à toto, circa vacuantia leuiora & fortiora. Hæc melancholia correspondet quartanæ exquisitæ: in qua Galenus lib. I. ad Glaucon, capite proprio præcepit, primum vtendum esse leuioribus, innox fortioribus: nam materia melancholica in principio indicat leuiora, & prohibet fortiora, quoniam in principio est crassa, & non est æqualis: vnde leuiora medicamenta alliciunt portionem minus crassam, nec agitant crassiorem, nam sunt debilia: at fortiora agitant illam materiam, ideoque primum leuioribus vtendum. Præterea medicamenta leuiora sæpius sunt exhibenda, fortiora raro: vnde Aëtius probat *epithymum* quotidie, & Auicennas singulis mensibus, non quotidie, vacuat cum fortibus: fundamentum sumitur à virtute, quia virtus non perfert fortia ita frequenter vsurpata. Notandum quarto de medicamentis lenientibus, quod interdum sint præmittenda: quod præceptum colligitur à Galeno in libro de melancholia secundum Ruffi sententiam: vbi, inquit, melancholicos quandoque ad sanitatem perducere, dum dimittuntur medicamenta; nam virtus assiduo vsu medicamentorum languet. Verum tum à medicamentis desistendum est, cum maiori difficultate ægri ea perferunt: Hoc autem tempus est æstiuum, & hyemale: vnde Galenus cap. I. lib. quos & quando, & c. ait, purgandos esse melancholicos, & melancholicos obnoxios, autumnino, & vere ineunte; ad differentiam illorum corporum, quæ sunt obnoxia biliosis morbis, Nam materia melancholica, & similiter pituitosa, in veris initio magis possunt, quam materia biliosa: etenim per hyemem humor genitus & collectus ita vrget, vt, nisi veris initio purgetur, procedente vere moueatur, & morbos efficiat. At materia biliosa, cum exigua sit in principio veris, & copiosior vere gignetur magis, quam hyeme; cum periculum sit ne agat ineunte æstate; in fine veris est purganda. Verum cum Galenus loc. cit. respiciat ad præseruationem, si contingat, vt malum melancholicum sit admodum vehemens, vel æstate, vel hyeme; his etiam temporibus oportet purgare materiam, quia tum maxime potest ad indicandum. Quinto notandum, materiam melancholicam interdum adeo esse contumacem, vt medici *antimonio* vt cogantur, & quandoque *veratro albo*. Hæc dicta sint causa melancholice per consensum à toto. Quod si

3. In melancholia hypochondriaca.

melancholia fuerit hypocondriaca: secundum Auicennam, antiqua multoties indiget vomitu, cum *veratre albo*. Ceterum, cum in melancholia hypocondriaca etiā pituita peccet: propterea hic probantur purgantia, quæ non modo melancholiam, sed etiā pituitam educunt: eaque cum leuiora, tum fortiora, quæ in dolore capitis fuere proposita. Verum Auicennas in malo pertinaci probat *album veratrum*: sicut & Græci. Sed consulo vt ab eius vsu caueatis: nam insignis detrimentum potest asferre: de quo Oribasius diligenter & prolixè.

2. **Diaphoretica.** Medicamenta vacuantia per insensibiles meatus, siue citra sudorem, siue cum sudore: sunt debilia, mediocria, & vehementia. Debilia etiā inter diætericas materias recenseri possunt, vacuantque excrementa tertiæ concoctionis: inter quæ præcipuum est *balneum aque dulcis*: quod probatur in qualibet melancholiæ specie, at diuersa ratione. Breuiter ergo sciendum, balneum pertinere ad solium frigidæ, ad aerem, ad solium calidæ. Solium frigidæ in nulla melancholia probatur: prohibetur enim à materia melancholica frigida, ab intemperie frigida nondum morbosa, & morbosa in melancholia per essentiam: hæc enim à solio frigidæ intenderentur: Nec conuenit in melancholia per consensum à toto, prohibet etenim frigiditas totius: In melancholia denique hypocondriaca, cum incipiat totum refrigerari, frigidum etiā balneum improbat. Præterea in affectu melancholico (ad differentiam febris hæticæ cui solium frigidæ conuenit) nec febris adest, nec virtus debilis, cuius ratione opus videatur aqua frigida, calidum instum vniens. Aer balnei est calidus, & habet vim euacuandi: vnde probatur magis in melancholia per consensum à toto: minus in melancholia per essentiam: adhuc minus in melancholia hypocondriaca. Ratio est, quia in melancholia per consensum à toto, aer balnei vacuat materiam melancholicam in toto existentem, in melancholia per essentiam, materia est solum in capite, vt vacuari possit solio calidæ, aëreque balnei exiguo sit opus: in melancholia hypocondriaca, cum materia resideat in hypocondriis, aer non ita agit in illas partes: & excrementa totius corporis, tertiæ scilicet concoctionis, solio calidæ euacuantur, vt non ita egeamus aëre balnei. Solium calidæ, mediocriter excedentis, cum sit insignis caliditatis, calefacit & euacuat: ideoque probatur in

affectione melancholica, in qua agemus euacuatione. At so-
 lium modo debet esse calidius, modo minus calidum: in me-
 lancholia per consensum à toto probatur calidius: minus
 calidum in melancholia per essentiam: & in melancholia
 hypochondriaca sufficit caliditas ad excrementa tertiæ co-
 ctionis euocanda. Varius ergo balnei vsus est. Quoad quan-
 tum, cum actio sit vehementior in melancholia per consen-
 sum à toto: ob id æger in hac melancholia diutius debet
 detineri, & in aëre, & in solio, quam in reliquis melanchol-
 iæ speciebus. De modo: Et aër, & solium calidæ, in melan-
 cholia per consensum à toto, debent esse actu magis calida.
 Quoad quando: sunt administranda balnea, dum materia
 vincit alia indicantia: non autem dum vincitur à materia re-
 plente partes internas: quare est administrandum balneum
 post medicamenta vacuantia per sensibiles meatus. Quoad
 vbi agendum: ratione subsistentiæ excrementorum tertiæ
 coctionis, in qualibet melancholiæ specie, balneum est toti
 corpori adhibendum. Et ratione materiæ melancholicæ, si
 melancholia sit per essentiam in capite, balneum præsertim
 circa caput vsurpandum: si melancholia sit per consensum à
 toto, toti adhibendum: in hypocondriaca, hypocondriis; vt
 hypocondria foueri possint spongia, aqua calida madefa-
 cta; at propter calidum innatum, *aliquid mastiches* miscendū.
 Hæc ergo mitis est materia, vacuans per meatus insensibi-
 les. Mediocris materia potest esse inunctio, quæ sæpius cum
 balneo administratur. Vnde cum Aetio probatur inunctio
 à nitro, & oleo non astringente, & proinde communi, vel chamame-
 lino, vel anethino: vt liceat pro qualibet vncia olei, immiscere
 nitri ℥j. vsque ad ℥ iij. Et probatur hæc inunctio potiss. in
 melancholia per consensum à toto. Quoad vsum, quædam
 admonebimus, circa modum, & vbi. Quoad modum, inun-
 ctio adhibeatur calide & fricando: quia frictio, vt magis
 potest exercitatione, ita est in causa, vt melior fiat euacua-
 tio materiæ melancholicæ: vt aliqua è parte, com. aph. 15.
 sect. 3. colligitur. Quoad Vbi, in melancholia per essentiam
 inunctio secundum caput probatur: in melancholia per con-
 sensum à toto, toti applicanda: in melancholia hypochon-
 driaca hypocondriis. Adhæc inter mediocriter vacuantia
 per meatus insensibiles, connumerare licet calida; infra
 quartum gradum, quæ sint tenuia, & expertia formæ sum-
 maz actiuitatis, vt est ruta, anethum, chamamelu, serpillum, puleg.

*Vsus bal-
 nei.*

*2. Medio-
 cris dia-
 phoretica.
 Externa.*

Interna.

cuminum, feniculum, daucus: ius galli, ius columba, quorum animalium ventres sunt replendi iam propositis medicamentis: Sed inter hac licet etiam recensere aromaticum rosat. & acyminum, quæ medicamenta potissimum probantur in melancholia hypochondriaca, in qua generatur materia melancholica visceris caliditate accidentali; nam, ut suo loco audiuitis, intenditur caliditas, propter obstructionem. Quoad fortiora vacuantia per insensibiles meatus, Auicennas probat scillam, magnus antidotos, quemadmodum etiam Galenus theriacam probat in quartana. Monebat Aërius, theriacam hyeme & vere incoante esse exhibendam, in affectu melancholico frigido. Valeant igitur; qui in febribus quolibet tempore, etiam æstiuo, exhibent theriacam, & sic ægros interficiunt. Inter fortiora in melancholia hypochondriaca, probantur medicamenta è chalybe, è guaiaco, è synapi. Medicamentum è chalybe erit proponendum in malis lienis, infra cap. 16. lib. 3. Nunc notandum, chalybis limaturam optime esse conterendam, & detinendam per plures dies in aceto: metalla enim ita sunt tenuiora, & minus mordacia: acetum autem debet esse antiquum & acerrimum, & confectum è vino non astringente. Ponatur autem hoc medicamentum ad ignem per plures dies: sed melius est ut præparetur in diebus canicularibus Sole illo feruido: & oportet miscere attenuantia & dissoluentia proposita, & cordialia cito proponenda. Quoad guaiacum, cum hoc etiam oportet miscere resoluentia, cordialia, capitalia, & potissimum sassafras. Quoad synapi: est medicamentum rubrificans, quod conficitur secundum Aëtium cap. 10. lib. 6. è synapi & sicubus siccis: & hoc medicamentum applicatur parti hypochondriorum affectæ.

I.

Alterantia.

1. Quæ alterant cocticia.

Alterantia, respiciunt Indicantia, & Proportionem. Indicantia sunt vel Contenta, vel Continentia. Causa contenti, conueniunt in omni melancholia alterantia; nam in omni melancholia adest materia melancholica contenta: sed in hypochondriaca, respicere etiam oportet ad pituitam. Quæ autem sint alterantia pituitam & melancholiam; diximus in serm. de dol. cap. Verum, in iuniorum gratiam, cum materia melancholica sit frigida, sicca, crassa, & quandoque dura: causa calefaciendi & humectandi licet uti borag. buglossos, liquiritia, causa attenuationis, licet uti melissa, ruta, arisfol. scilla; oportet miscere acetum, & præsertim si pituita sit permixta. De aceto dubitatur, quia Auicennas ait, timorem esse propter

pter malitiam : quod etiam insinuasle videtur Hippocrates, com. 38. lib. 3. de vict. acut. Dicendum, improbari acetum simplex, quod vim habet siccandi, & refrigerandi : non autem improbari acetum mistum. Vnde Aëtius probat acetum acre, vinosum, miscenda autem sunt calida, & ratione siccitatis etiam humida, vt *borag. insculum*: & Aëtius dabat post cibum, nam ob cibi præsentiam non ita cito agit in ventriculum, corrigiturque à cibo. Postremo in affectu melancholico, propter duritiem materiæ, probantur, *malua, althæa, passula dulc. amygdala, &c.* Vfus horum ex alibi dictis patet.

Restant ea, quæ continentia alterant: Continentia sunt Totum, vel pars. Causa totius, solū in melancholia per consensum à toto refrigerato & exsiccato, probatur *balneum aquæ dulcis, citra sudorem*, nā ubi est sudor, materia medicinalis est vacuās, de qua in præsentia non loquimur. Et in administratione huius balnei, in melancholia scil. per consensum à toto, misceatur *malua, althæa, borago*, decoquantur carnes pingues, & præterea totū corpus inungatur *ol. amygd. vel adipe gallinæ*, addito. causa penetrationis, exiguo vino tenuis substantiæ. Causa partis, id est, capitis, cordis ventriculi, iecoris, lienis, & vteri; vt partes afficiuntur morbis calidis vel frigidis, ita variis oportet vti medicamentis: de quibus in propriis capitibus. Propter iuniores: Si, verbi gratia, pars sit calidior, vti licet *sero caprino, thermis refrigerantibus*, vt est *balneū B. Mariae virg. in agro Patanino: aqua refrigerans*: licet etiam vti cōseruis refrigerantibus. Si pars sit frigidior, probatur *aqua Aponensis*: bibita ratione partis frigida: nam secus interficietis ægrotautes. Extra sint *ol. calefacientia, conseruæ*, de quibus in prop. cap. Quoad alterantia, respicientia Proportionem: quæ

2. *Quæ alterant continentia.*

respiciunt capitis proportionem, fuere proposita in sermone de dolore capitis. Quæ respiciunt proportionem Cordis, proponuntur à Rhase in cap. de melancholia, ubi probat *medicamentum Lætificans*, quod cum admodum sit compositum, si quis desideret lætificans minus cōpositum, ita poterit præscribere: *℞ succi melissæ, cum saccharo depurati ℥ 3. sem. citri mundator. cortic. citri ana 3 j. croci ʒ v. dianthos 3 j. cum syrupo de corticibus citri fiat electarium*: cuius dosis sit à 3 j. vsque ad 3 ℥. Adhuc minus compositum lætificans esse potest: *℞ succi melissæ ʒ 3. sem. citri. 3 j. conserua melissæ, dianthos, ana 3 j. Mis. &* fiat electarium. Dos is à 3 j. ad 3 vj. Adhuc licet vti *diabro, diatmoschū, gallia moschata, magnis antidosis*. Hec ergo

3. *Cephalica.*

4. *Cordialia lætificantia.*

sunt lætificantia calida. Lætificantia frigida sunt *acetosa, acidum citri, caphura, santali, margarita*. De quibus infra cap. 8. lib. 2. ubi de cordis *παλυσ*. In affectu ergo melancholico, pro vario corporis statu, utendum, modo calidis, modo frigidis, modo mistis. Vfus patet ex alibi dictis.

Diaeta. Materia dietetica erit eadem, quæ in dolore cap. à melancholia est præscripta; sed primum notandum, cum melancholia sit malum diuturnum, probari victum conseruantem, non minuentem, nec augmentem. Et si contingat, ut corpus euadat siccius: probatur victus augens. Secundo notandum, cum alimentis miscenda esse lætificantia: & con-dienda cibaria, *boragine, buglossa & melissa etiam*, nisi calor partis prohibeat. Et in melancholia hypochondriaca, probatur etiam *acetum acre*, cuius cochlear vnum dabat Aëtius, post omnem cibum: hoc enim minus siccatur, & attenuatur, & (quod maioris est vtilitatis) reddit cibum attenuantem, ut in hypochondriaca materia crassa obstruens vincatur. Vltimo ea probantur animi accidentia, quibus minuitur affectio tenebricosa, vnde Paulus ait, mentem ad alia esse auertendam: quod fieri potest verbis, & proinde per medium sensum auditus: item operibus, & per medium sensum tactus: verbis, ut cantu, fabulis, operibus, ut imponendo capiti pileum grauem, ut melancholicus non amplius imaginetur, se esse sine capite, &c.

CAPVT XI.

De mania.

Nomen.



Generatio.

MANIA affinis est Mania, seu furor; nimirum delirium citra timorem, cum exca-
descencia, ut sæpenumero asidentes percutere
tentent. Generatur hoc malum, dum capiti oc-
curret causa calefactiua ex vsu, citra tumorem, ut cerebrum
afficiatur secundum substantiam: & ita afficiatur, ut gene-
retur spiritus animalis non tenebricosus, sed igneus: ut
phantasma igneum euadat: cerebrumque afficiat veluti
igneae affectione; ut corrumpatur actio cerebri principalis,
nempe vel imaginatio, vel ratio, vel vtraque. Delirium igitur
maniacum est functio corrupta principalis cerebri, de-
pendens ab affectione ignea, ex vsu affecto capite, citra tu-
mo

Definitio.

Forma.

Subiectū.

morem. Forma & subiectum colliguntur è Galeno, cap. ult. li. 2. de caus. sym. dū ait, in mania deprauari principes facultates cerebri. Aetiū hanc functionē dicit esse imaginationem.

Causa efficiens.

Causa efficiens est affectio ignea: per quam mania distinguitur à delirio melancholico, in quo affectio est tenebricosa. In hunc sensum Galenus scribit, cap. penult. lib. de usu respirat. maniam produci à spiritu igneo. Sicut enim spiritus animalis tenebricosus, producit phantasma tenebricosum, ut cerebrum afficiatur affectione tenebricosa: ita spiritus animalis igneus, producit phantasma igneum, & hinc affectionem igneam. Addimus: ex usu affecto capite: ut hoc delirium maniacum distingueretur, à delirio maniaco, quod fit in accessionibus februm biliosarum: nam in his febribus spiritus animales ignei euadunt, propter vapores, qui non sunt ex usu: vnde sponte dissipantur. At in mania, spiritus animalis redditur igneus, affecto capite ex usu, id est, affecto capite à causa morbifica, quæ utile indicat, ad differentiam

Causa subdiuisio.

vaporum. Hæc causa morbifica duplex est: aut enim mania fit è mordacibus succis, aut è calida intemperie, com. aph. 53. sect. 6. ca. ult. li. 2. de caus. sym. Spiritus ergo animalis igneus, est opus præter naturam; quod modo fit ob errorem externum, qui est mordax succus: modo labefactata facultate cerebri, ob calidam intemperiem. Similiter functiones principales in hoc malo læduntur, modo ob errorem externum, modo ob læsam facultatem: nam cerebri calida intemperies, & generare potest spiritum igneum, & esse in causa functionis corruptæ: vehementior tamen est, ratione læsionis functionum principum, quam ratione generationis spiritus ignei. Itaque cum duo sint ex usu, videlicet, calida intemperies, & mordax succus: Quoad calidam intemperiem, causas habet, de quibus dictum in sermone de dolore. cap. Quoad succum mordacem, ut colligitur è com. aph. 58. sect. 6. hic succus est sanguineus, biliosus, atrabiliaris. Sanguinem proponit Galenus; aph. 40. sect. 5. succum biliosum & atrabiliarium, aph. 56. sect. 6. Hic succus gignitur in iecore, vel læsa facultate, ob caliditatem iecoris, vel etiam propter obstructionem: sed præterea generari potest ob errorem externum, id est, ob chylum calidiorem in ventriculo genitum, è victu calidiore. Postremo dictum fuit in definitione, citra tumorem: ut mania distingueretur à phrenitide: nam

Mania, nō est cum tumore.

pendens ab affectione ignea, affecto capite ex usu; sed cum tensione, cum tumore. Hanc ob causam in phrenitide necessario coniungitur febris: mania sæpe est sine febre.

Differentia.

Quoad differentias, & primum à forma; dicendum, actionem læsam corruptam, esse vel Imaginationem, vel Rationem, vel Vtramque. Ratione subiecti: cerebrum afficitur, secundum partem vel Anteriorem, vel Mediam, vel Vtrâque. Ratione causæ efficientis: hæc est, vel Intemperies calida, vel Succus mordax: & hic succus, vel est Sanguineus, vel Biliosus, vel Atrabilarius.

Signa.

Mania in genere leuissimo negotio cognoscitur: videlicet ex imaginatione corrupta, cum excandescencia, cum procliuitate ad percutiendum. Facile etiam cognoscuntur differentia à forma, & subiecto, è traditis in doctrina de phrenitide. Quoad differentias à causa efficiente: Si causa efficiens sit intemperies: cognoscitur è delirio perpetuo vni-formi, quod simile est delirio ebriorum, secundum Galenum aph. 33. sect. 6. Si autem causa sit succus, cognoscetur è delirio nec assiduo, nec vni-formi: nam succus modo non fluit, modo fluit: & fluens, modo fluit in maiori copia, modo in minori; vt propterea non sit vni-forme delirium. Quis autem sit succus, cognosci potest ex Actio, & è Galeno aph. 33. sect. 6. si enim succus fuerit sanguineus, cum excandescencia erit risus: si biliosus, cum excandescencia erit studiū: si atrabilarius, & quidem per putrefactionem, cum excandescencia erit fletus, si per adustionem, alios æger percutit, & proprias carnes mordet, &c. Præsidia haurienda sunt è Subiecto & Causa efficiente. Quoad subiectum, cerebri proportio cum calido innato seruanda. Causa efficiens, est affectio ignea: & quod in cerebro est ex usu. Ab affectione ignea, indicatur anodynum. A causa ex usu, indicatur præsidium sanans. Nam ab affectione ignea, dum mens ad alia adducitur, solummodo mitigatur delirium, potestque redire: & ideo præsidium hoc non est sanans, sed anodynum. Causa ex usu, secundum Alexandrum, si est intemperies, indicat alterans per contrarium, id est, refrigerans: Si succus mordax: hic succus indicat & secundum speciem, & secundum vitium. Species succi triplex est: ideoque triplex prodit præsidium determinatum. Quoad vitium: si in mania succus putrescat, est erandicandus. Et quia copia peccat, est minuendus. Et quia est calidus & siccus, per contrarium est alterandus. Et

quia

quia in mania peccat, ratione motus, & quietis: ratione motus, indicat retrahens ad inferiora: & cum terminus à quo sit iecur, indicat retrahens deorsum & dextorsum, sicut docuimus in doctrina de melancholia: ratione quietis, indicat discutiens: quatenus in capite, indicat discutiens materiam quiescentem in capite.

Malum hoc periculosum est: nec enim vlla desipientia est *Prognostica in genere.*
secura. aph. 53. sect. 6. quia semper adest vehementia, ratione essentiae, & dignitatis. Ratione essentiae, & ratione sympto-

statis, quia est functio principalis corrupta, est magnus recessus à naturali statu: & ratione causae: hæc enim ipsa quoque multum recedit à naturali statu. Dignitatis est vehementia: quia malum pertinet ad cerebrum. Periculum autem v- *Prognostica differentiarum.*
rium est, pro vehementia differentiarum. Vnde quoad for-

mam, vitium hoc maniacum est magis periculosum, si duz laxantur functiones: quia insignior est vehementia ratione dignitatis, cum cerebrum secundum duas partes afficiatur. Quoad causam efficientem, malum peius est, si intemperies simul cum succo mordaci vigeat. At si causa seorsim perpendatur, intemperies in habitu est pessima: nam vitium ratione essentiae est maximum. Quoad succum: prout hic varius est, ratione speciei, & vitij: ita vario modo prognosticandum. Quantum ad speciem: mania est minus periculosa, si fiat à sanguine: magis periculosa, si fiat à bile: maxime periculosa, si ab atra bile, & præsertim si succus atrabilarius genitus est per adustionem: nam hic succus in capite exsuperans, maxime recedit à naturali statu. Quoad vitium succi: delirium maniacum est magis periculosum, dum materia morbifica magis putrescit, vel magis est copiosa, vel magis acris, vel magis cum impetu in caput mouetur, nam magis hæret & figitur: hæc enim vitia magis sunt vehementia secundum essentiam. Hippocrates aphorismo 3. *Explicatio aphorismi 3. sect. 7.*
sect. 7. ait à furore difficultas intestinorum, vel hydrops, vel mentis alienatio, bonum. Difficultas enim intestinorum & hydrops, sunt signa, quæ significant materiam morbificam deorsum retrahi, nec ita esse vehementem secundum essentiam, secundum vitium in motu, quia materia retrahitur infra. Per mentis alienationem Galenus intelligit delirium, quando in furore delirium sit vehementius: hoc enim est bonum signum, quod dirigitur ad materiam, ut peccat secundum quietem, significat enim materiam perti-

pertinaciter quiescentem iam incipere moueri: vt minor sit
vehementia ratione essentia,

Curatio.

Venæsectio.

Quoad materias cheirurgicas, probatur venæsectio in fu-
rore, si sanguis peccet, vel vt causa principalis, vel vt adiu-
uans, vel sine qua non. Sanguis principaliter, concurrat, si
mania fiat à sanguine: est causa adiuuans, si mania fiat à ma-
teria mista cum sanguine: cōcurrit, vt sine qua non, si in ma-
nia sanguis abundat extra caput. Vnde Aëtius ad hoc postre-
mum respiciens, dicebat venam esse secandam, vt aliis auxi-
liis detur locus. Norandum, si in hoc malo sanguis peccet,
verbi gratia, vsque ad libram: potius libram esse vacuandam,
quam 3 xj. nam præter vitium in copia, in mania etiā adest
vitium in caliditate: beneficio venæsectionis; principaliter
euacuatur sanguinis copia: secundario feruor exstinguitur.
In recta administratione, digrediemur circa Quantum, &
Vbi. Quoad Quantū: cum sanguis sit summæ adiuuitatis, in
hoc malo: expedit vna vice euacuare, si vires tolerēt. Quoad
Vbi: si sanguis subsistat in toto, & in capite, cum Aëtio tun-
denda cephalica: Si in toto saltem redundet sanguis: tunc
sanguinis subsistentia sequitur vel copiam, vel motum: si
copiam, aperiatis venam cubiti vel communem; vel inter-
nam: si sequatur motum, aperiatis venam crurum. Si san-
guis tantum reperiatur in capite: cum Aëtio aperienda vena
frontis: & cum Auicenna possunt etiam aperiiri venæ sub
lingua. Alexander addit cucurbitulas, hirudines, puluerem
acrem: vt cruentum & sanguinolentum reddatur caput. No-
randum autem citra puluerem acriorem, quod numerari
possit inter materias medicinales, dum puluis agit citra so-
lutionem vnitatis: inter cheirurgicas, dum agit cum solutio-
ne vnitatis, sicut hoc in loco, dum caput reddit cruentum.
Ad has tamen materias non est confugiendum, nisi materia
pertinaciter sit impacta.

*Pharma-
sera.*

Vacuatio.

1.

Medicamenta probantur, vt in phrenitide, & vt in dolore
capitis à sanguine, & à bile. Quædam tamen hic notanda.
Quoad vacuatio per meatus sentibiles, probatur vehemen-
tia in mania, nam materia morbifica est vehemens: & ma-
niacus non admittit medicamenta copiosa: & præsertim
vsurpari possunt, cum non sit febris. Causa igitur bilis, detur
dacrydium: propter atram bilem, detur veratrum nigrum. Et
quoniam maniaci non sunt obedientes, secundum Paulum
exhibebuntur medicamenta cum placentis, cum fuscis, cum
passulis:

passus : Alexander etiam dabat *cum ouis*. Medicamenta autem hæc vehementer soluentia, quamprimum sunt exhibenda: materia enim magis est potens, quam materia furiosa. Medicamenta caput vacuantia, etiam sint fortiora: & propterea Aëtius ascendeat *ad Elaterium*, *ad albi veratrum*. Quoad euacuantia per insensibiles meatus: Alexander probat *balneum aqua dulcis*, & iubet, vt patiens longo tempore in folio calidæ detineatur, quo vapor acris euocetur. Alterantia eadem conueniunt, quæ in dolore cap. à materia acri. Quoad continens autem, cum sit vel totum, vel pars: ratione totius, probat Alexander, vt post balneum totum corpus inungatur *hydrelao*, *aqua*, & *oleo*. Ratione capitis, quod debet refrigerari, Aëtius frigida applicat capiti: Paulus admo- uet *oxyrhod. ol. ros.* Auic. si calori iungatur siccitas, addit *la-Enc. papan.* & ratione caloris naturalis cerebri, cum frigidis miscet *chamamelum*. Causa iecoris, probantur frigida, de quib. in mal. iecoris.

Dieta ita est instituenda, vt fuit propositum, in dol. cap. & phrenitide. Notandum igitur cum Aëtio in hoc malo im- probari dulcia, nam bilescunt. Auicennas improbat obstruen- tia: nam materia morbifica non est detinenda. Probat autem quæ mouent vrinam: vnde in mania vtendum diureticis va- lidis, & in magna dosi, vt materia cito euacuetur, & non co- gamur frequenter vti diureticis. Quoad potum: Aëtius sua- det, vt à vino penitus abstineamus: aut si exhibendum sit vi- num, raro exhibeamus. Alexander vsu postulante, modicum vini exhibet, quod caput non petat. Auicennas dicit, vinum esse exhibendum in declinatione, sed admista plurima aqua. Ratio horum omnium dictorum est: quia vinum dum cale- facit, & materias in caput ducit, habet rationem causæ mor- bificæ: quatenus autem nutrit, habet rationem alimentis: quare probatur solum vt materia alimentis. Vnde in mania, si magis potest virtus quam materia morbifica: probatur vi- num: ante declinationem magis potest materia: in declina- tione magis potest virtus: vinum ergo in declinatione est exhibendum. Vigiliæ in hoc malo superant: ideo somnus conciliandus, cibique condiendi *papauere*. Quoad inanitionem, si aliud sit stiptica: opus est vti clysmo, secundum Auicennam. Quoad motum & quietem, cum agitentur mania- ci, quies debet superare motum: vnde cum Paulo interdum in lecto sunt ligandi. Postremo, quoad animi accidentia: cum

Galeno

2.

3.

Alterantia?

Videtur vti.

Potum.

Somnus.

Inanitio.

Quies.

*Animi ac-
sidentia.*

Galeno aphor. 13. sect. 6. quia maniaci promptissimè incidunt in furorem, occasione causæ externæ: ob id studendum, vt vsurpentur animi accidentia, quæ furorem mitigare possunt: & hoc tum verbis, tum operibus est efficiendum, & ita operibus, vt interdum etiam verbera adhibeantur.

CAPVT XII.

De memoria, & ratiocinatione læsis.

Nomen.



N eodem capite, de labefactata memoria, & ratione verba faciemus: nam Galenus cap. 5. lib. 3. de loc. aff. voluit vtrumque malum à simili morbo proficisci: vt, si vna vehementer lædatur, necessarium sit vtramquè facultatè lædi, cum vna alteri compatiatur. Quoad Nomen, læsa memoria, dicitur obliuio morbose exquisita: obliuio enim quid commune est, memoriz & imminutz & ablata. Dicitur autem morbosa, ad differentiam non morbose, de qua Galen. cap. 12. lib. art. med. loquitur, inquiring, obliuionem indicare humidam cerebri substantiam. Obliuio autem morbosa fit, vitio vel Obiecti, vel Organi, id est, aut ob errorem externum, aut labefactatam facultate. Si ob errorem externum, est obliuio morbosa, sed non exquisita, vt in phrenitide, de qua in præsentia non loquimur: Si fiat læsa facultate: hæc vel Impeditur, vel Labefactatur: impeditur in epilepsia, apoplexia, & de hac non loquimur: si labefactatur, est obliuio morbosa exquisita, de qua nos in præsentia, & Galenus cap. 5. lib. 3. de loc. aff. Vitium ratiocinatricis, dicitur discursus morbosus, vt quid commune diminutz & ablatae rationis. Vnde Galenus dicit cap. vlt. lib. 2. de sympt. caus. cap. 5. lib. 3. de loc. aff. si ratio imminuatur, vitium vocatur *μωρη*, & *μωρεως*: si auferatur, dicitur amentia, fatuitas, stulticia, stoliditas. intelligitur autem stulticia morbosa exquisita, quæ fit non impedita facultate, vt in epilepsia, sed labefactata ob intemperiem. Eadem igitur dyscrasia in posteriori cerebri parte est causa obliuionis: in media parte est causa discursus morbose exquisiti. Quod si ergo diligenter sermo fiat de obliuione, nihil desiderari poterit circa læsionem discursus.

Transitio.

Vt autem intelligatur generatio obliuionis morbose exquisitæ, primum intelligendum, quomodo memoria fiat secundum

secundum naturam: hinc enim patebit etiam, quomodo & ratio & imaginatio secundum naturam obeantur. Breviter ergo sciendum, ad functiones principes obeundum, tria esse necessaria: videlicet agens, instrumentum, & obiectum. Agens est anima, & proinde substantia inuisibilis, quæ nec intentioni, nec remissioni est subiecta: vnde si senex haberet oculum iuuenis, videret instar iuuenis. In anima autem reperitur facultas, ad omnes animæ functiones obeundas instituta. Facultas vero non operatur, nisi euadat determinata: cum vnius facultatis vnica tantum sit functio. Hinc in cerebro triplex est principalis actio, quia tres sunt in cerebro facultates determinatæ. Cæterum, cum facultas communis & indifferens degeneret in determinatam, sciendum, determinari eam beneficio proportionis sui instrumenti: quæ proportio in cerebro, vt cerebrum est simile, pendet à determinata proportionem substantiarum elementorum: vt autem proportio reperitur in cerebro, quatenus est dissimulare, pendet à proportionem eorum, è quibus constituitur compositio, id est, à conformatione, magnitudine, numero, & compositione: vnde proprietas compositionis nominari potest. Instrumentum est cerebrum, sed præditum & calore innato, & constitutione. Per calidum innatum, intelligimus calidum ingenitum in cerebro, sed mistum cum spiritu animali, qui spiritus non pertinet ad ventriculos cerebri, sed ad propriam cerebri substantiam. Per constitutionem intelligimus temperiem cerebri, compositionem & vnitatem. Si hæc duo instrumenta, id est, calidum innatum, & constitutio, inter se conferantur, tunc ratione conseruationis facultatum, primum locum tenet calidum innatum: ratione autem functionum, constitutio. Verum, quantum ad constitutionem, cum ea triplex sit, primum locum obtinet temperatura, respectu compositionis, & vnitatis: vt si vitium sit in intemperie, facultas labefactatur, sin in compositione, vel vnitatem impediatur: si in calido innato sit vitium, lædatur actio quæ errorem externum.

Obiectum est, in quod agit facultas, & à quo facultatis organum afficitur. Hoc autem obiectum cum esse possit vel corpulentum, vel spiritale: in præsentia locum habet obiectum spiritale: vt si lædatur obiectum, lædatur actio per errorem externum. Cum igitur, è traditis, anima agat virtute facultatis determinati organi, & obiecti: certe anima

Ad functiones principes obeundum, tria necessaria. Agens.

Instrumentum.

Obiectum.

anima in cerebro residens, memoriæ munia obire potest, per facultatem memoratricem, quæ contrahitur à cerebri proportionem, secundum partem posteriorem. Hæc facultas bene agit, si nullum sit vitium in calido innato, nullum in constitutione, nullum in obiecto. Cæterum cum Aristotele libello de mem. * facultas memoratrix bene agit, si phantasmata recipiat, conseruet, ac (dicant alij quicquid velint) iudicet. Vnde Aristoteles respiciens ad receptionem, inquit, hebeti ingenio esse immemores, quorum cerebrum ita sit crassum, vt non permittat insigi imagines: ad retentionem respiciens, dicit, cerebrum humidius nihil retinere, instar aquarum vehementer & cum impetu fluentium: tandem insinuans iudicium, (vbi respicit non ad facultatem, sed ad facultatis opus) dicit, memoriæ, id est, memoriæ opus esse habitum phantasmatis, tanquam imaginis. Quare, si est habitus animi: igitur est cognitio, igitur est iudicium: vnde subdit Philosophus, memoriæ contemplari phantasmatis impressionem. Vnde obiter colligere potestis, etiam imaginatricem iudicare & contemplari: & hac de causa in vertigine patientes se errare cognoscunt, quia non est vitium secundum iudiciū: in affectu autem melancholico non cognoscunt se decipi, quia in eo est error secundum iudicium.

*Obiectio
soluitur.*

Obiici autem solet à Galeno in libro de offic. med. ad artes constituendum, memoriæ concurrere, vt conseruet sensum autem & mentem, inuenire & iudicare. Quare secundum Galenum memoria non iudicat: Pro solutione scire oportet: dari cognitionem integram, quæ in suo genere ad aliud non refertur: & hæc cognitio fit, vel sine discursu, vel cum discursu: Si sine discursu, sufficit sensus, vt recipit & iudicat, vt fiat ille habitus, seu illa cognitio, quæ vocatur peritia: si autem cum discursu fiat cognitio, ad edendum integram cognitionem, id est, scientiam, necessario etiam concurrat ratiocinatrix, nam hæc perfectè potest inuenire & iudicare, nec eius iudicium refertur in iudicium vel imaginatricis, vel memoratricis: sed contra, imaginatricis & memoratricis iudicium famulatur ratiocinatrici. Galenus igitur respiciens ad iudicium integrum, & ad integram cognitionem, proponit solum sensum & mentem. Posset quoque alia esse dubitatio: nam Galenus cap. 6. lib. 2. de mot. musc. ait, imaginatricem imaginari, & recordari: nihil autem de memoratrice agit? Responso. Anima est unica substantia, quæ tamen

*Aliud dicitur
dum.*

tamen plures habet partes; & vnica pars plures habet facultates; vnica autem facultas, vnica tantum habet operationem. Vnde Galenus loc. cit. respiciens ad animæ partem in cerebro, hanc vocat imaginatricem, sicut etiam lib. 6. de placit. Quare imaginatrix accepta non pro facultate, sed pro parte animæ, imaginatur & recordatur. Constitutum igitur sit, facultatem memoratricem, in cerebro posteriori residentem, recipere, conseruare, & iudicare, citra compositionem & diuisionem, id est, citra discursum.

Quare ad producendum obliuionem morbosam exquisitam, necessarium est, vt causa morbifica agat in cerebrum, secundum partem posteriorem, vt cerebrum ita afficiatur frigida intemperie, vt memoria secundum iudicium lædatur. Obliuio igitur morbosa, est functio vehementer læsa principalis, cerebri posterioris, dependens ab intemperie frigida. Forma est functio læsa vehementer principalis. Galenus enim cap. 5. lib. 3. de loc. affect. in hoc malo memoriam vel aboleri, vel saltem grauiter lædi. Subiectum est cerebrum posterius, ad quod memoria attinet, vt aibi à nobis est demonstratum.

Efficiens causa, est frigida dyscrasia: per quam hæc obliuio distinguitur, & à non morbosa, & à morbosa non exquisita, qualis est in epilepsia ob angustiam. Hinc Galenus ca. 5. lib. 3. de loc. aff. proponit frigidam omnino intemperiem: ratio est, nam receptio læditur à sicco, retentio ab humido, iudicium à frigido; & cum in obliuione læsio sit secundum iudicium, necessario dependet à frigida intemperie. Hæc intemperies frigida, est cum materia, vel Sine materia. Sine materia, vel Simplex, vel Composita, id est, vel frigida & sicca; vel frigida & humida. Materia, quæ est cum intemperie, est vel Pituita, vel Melancholia. Causæ autem intemperierum & materierum traditæ sunt in doctrina de dol. cap.

Quoad differentias, & primum à forma: obliuio est Imminuta, vel Ablata. Præterea actio principalis læsa, pertinet vel ad Solam memoriam, & dicitur obliuio, vel ad Memoriam simul cum ratione, & dicitur stultitia. Differentiæ à subiecto: cerebrum posterius vel Solum afficitur, vel Simul etiam medium cerebrum. Differentiæ à causa efficiente: dyscrasia frigida, vel est Sine materia, vel cum materia, &c.

Obliuio in genere, vt actio animalis læsa, est nota, & potius rationem signi habet, quam signati, quia offertur sensui, genere.

Signa differentia-
tum.

dum audimus patientem conqueri de obliuione, & de læsa memoria: Operatio læsa naturalis, ignota est, & cognoscitur per excrementa; at obliuio non est actio naturalis læsa, sed animalis; quæ cum seipsam patefaciat, nõ eget signis. Quod autem obliuio sit exquisita, cognoscitur inde quod sensum inuadit, non repente, vt in epilepsia. Quoad differentias, & primum à forma: num memoria sit inminuta, vel ablata, manifestum est, & è verbis ægri intelligitur. Num læsa sit, vel solum memoria, vel etiam ratiocinatio; & hoc quoque verba patientis manifestabunt: si enim memoria solum læsa est, non recordatur, sed discurret: si etiam ratiocinatio, non discurret æger, sed perpetuo vel affirmat, vel negat, nec verbum verbo componit. Quoad subiectum, num afficiatur pars cerebri posterior, an media quoque, cognoscitur ab operatione, quæ pertinet ad differentias formales; si enim læsio tantum est in memoria, laborat pars posterior; si etiã in ratione & discursu, media quoque pars afficitur. Quoad differentias à causa efficiente, num sit intemperies sine materia, aut cum materia, simplex, aut composita, item num materia sit pituitosa, aut melancholica; horum omnium signa in sermone de dol. cap. tradidimus, & possunt etiam peti è cap. 5. lib. 3. de loc. affect. aliisque locis Galeni sapius citatis.

Indicatio-
nes.

Quoad præsidia; intemperies contrarium indicat. Materia morbifica secundum speciem, indicat remedia determinata, id est, respicientia vel pituitam, vel melancholiam. Quoad vitium materierum; hoc attinet ad quantitatem, qualitatem, & vbi (non ad substantiam) propterea oportet euacuare & calefacere vtramque materiam; pituitam siccare & detergere; melancholiam humectare, tandem oportet materiam & retrahere, & discutere.

Prognostica.

Malum periculosum est, nam insignis est vehementia essentia & dignitatis. Vehementia autem facultatis, non necessario est in hoc malo: ideoque in eo, homo non moritur, sed malum comitatur hominem vsque ad mortem. Essentia est vehementia, quia est intemperies frigida, admodum recedens à naturali statu. Vehementia dignitatis est, quod dyscrasia est in cerebro, parte principali: vnde, etiam si obliuio non sit exquisita, periculosa tamen est ob vehementiam dignitatis; nam cum Auicenna & Aëtio, minatur paralytin, epilepsiam, apoplexiam, & quandoq; etiam mor

mortem: nam materia morbifica interdum additur vehementia facultatis. Periculum augetur vel minuitur, pro vehementia differentiarum. Quoad differentias à forma: obliuio minus est periculosa, dum imminuta est actio, quam dum ablata; propter vehementiam essentiae: item minus periculosa, si tantum afficiatur memoria, quam si etiam discursus, propter vehementiam dignitatis. Quoad differentias à causa efficiente, incurabile est malum, si frigiditas sit in habitu; & praesertim si coniuncta sit siccitas. Praeterea, minoris est discriminis, si procedat à pituita, quam si à melancholia, propter vehementiam essentiae; nam dum in cerebro redundat melancholia, maior est recessus à naturali statu, quam dum redundat pituita.

Quoad materiam cheirurgicam, licet affectus hic sit vehemens, & vires ita robustae, vt sustineant album veratrum; à nemine tamen probatur venae sectio; quia in obliuione morbosa exquisita sanguinis vitium vehemens desideratur; nec enim in hac obliuione, sanguis habet rationem causae principalis, quia non fit à sanguine, sed à pituita, &c. non concurrir etiam sanguis vt adiuuans, nam sincera est vel pituita, vel melancholia: denique non concurrir, vt causa sine qua non, nam dum cerebrum afficitur morbo frigido, necessario etiam reliqua viscera compatiuntur, vt sanguis copiosus generari nequeat, qui curationem impediat. At si obliuio sit non exquisita, vena secari potest; nam sanguis potest habere rationem causae adiuuantis, si misceatur cum pituita, aut melancholia; & talis obliuio coniuncta est cum risu. Praeterea in obliuione non exquisita, sanguis potest habere rationem causae sine qua non: vtpote, si iecur non compatiatur.

Quoad medicamenta, Auicennas probat vehementer vacuantia & alterantia: vnde Aëtius confugit quandoque ad *helleborum album*, maximeque probat *hieram Rusi*, & *colocynth. ex agarico*, cum *veratro nigro*, si coniungatur melancholia. *Hiera* illius dosis est, causa purgationis ʒ ss. causa discussionis flatuum ʒ ss. vel magnitudo fabae. cap. 115. lib. 3. Admonet Aëtius circa album veratrum, vt exhibeatur, dum necessitas urget: non enim expectandum, donec morbus ad tantam vehementiam perducatur, vt non cedat. Medicamenta alterantia, quae etiam insensibiliter vacuare possunt secundum Aetium ita habent: applicetur *calamintha cocta in aceto*

Prognostica differet.

Curatio.
Vena sectio non probatur in obliuione exquisita.

Pharmaceutica.
Vacuantia.
ca. 23. li. 6.

Alterantia.

acerrimo, cum nitro, pipere albo, castorio & sinapi: intro exhibean-
tur, castorij 3 j. fragmenta item cornu cerni. Auicennas probat
acorum conditum. Probatur etiam medicamentum cōfectum
ex equali portione olibani, cyperi, piperis, croci, myrrha: quod exhi-
betur ad 3 j. singulis diebus. Quidam etiam ascendunt ad con-
fectionem anacardinam. Sed notandum, his potissimum uten-
dum esse, in obliuione morbose exquisita exacte, quæ sit ab
intemperie frigida, coniuncta cum humiditate, vel etiam
cum pituita: non enim probantur, si sit coniuncta siccitas
vel materia melancholica.

Diala. Extreme senes medicamentis curandi non sunt, sed sola
dixta. Aër igitur sit luminosus: iusto nec frigidior, nec cali-
dior. Cibus sit mediocris & attenuans, quia vitium est diu-
turnum, & si materia adest, ea est crassa. Vinum sit tenue, al-
bum, non admodum vetus. Reliqua ad viuendi rationem
pertinentia sint moderata. Prodest in hoc malo spes: inter-
dum & ira prodest, quia facultas animalis excitatur: nam per
iram vitalis spiritus efferuescit, qui postea petens caput,
huic refrigerato prodesse potest. Hæc de laxa memoria &
fatuitate.

CAPVT XIII.

De Vertigine.



Nomen,

VONIAM vertigo etiam pertinet ad faculta-
tes principales: ideo de hac dicendum: postea
enim loquemur de incubo, epilepsia, apoplexia,
& caros. Per vertiginem autem intelligimus il-
lud vitium, in quo obiecta circumduci videntur: at patien-
tes agnoscunt falsam esse & visionem, & imaginationem.
Vertigo alia est Morbosa, alia Non morbosa. cap. 8. lib. 3. de
loc. aff. Morbosa originem habere potest, vel citra externam
causam, vel cum parua occasione. Vertigo autem non mor-
bosa est, cuius origo est occasio insignis. Vnde vertigo mor-
bosa, non oritur tantum, ob vnicam, seu plures rotationes,
sed facile & leuissime: de qua morbosa nos in præsentia lo-
quemur. In hac vertigine oportet vt causa morbosa occur-
rat capiti, & ita agat, vt caput secundum ventriculos læda-
tur; vt vel citra externam occasionem, vel leui occasione,
spiritus animalis, in ventriculis cerebri residens, motu mor-
bosa

osa afficiatur; vt cum hic motus morbificus ad circularem vergat, afficiatur cerebrum secundum sedem facultatis imaginatricis, vt cerebri substantia afficiatur affectione, non tenebricosa, vt in melancholia; non ignea, vt in mania, sed circulari; vt hinc corrumpatur imaginatio, vt patiens imaginetur obiecta circumagi. Et cum spiritus animalis ita agitur, & non distribuatur in oculos secundum naturæ leges, læditur etiam visio. Et tandem, cum spiritus agitur in parte cerebri anteriore, vitium impertitur ventriculis etiam postremis, vt non prodeant in vniuersum corpus radij spiritus animalis, quemadmodum opus esset: vnde etiā detrimentum fit secundum motum voluntarium.

Vertigo igitur est functio corrupta principalis, cerebri *Definitio.* anterioris, cum læsione visus & motus totius corporis, dependens ab affectione cerebri circulari. Functio corrupta *Forma.* dicitur, ad differentiam imminutæ & ablata: principalis, ad differentiam non principalis: cerebri, ad differentiam functionis principalis aliorum viscerum: anterioris, ad differentiam corruptæ rationis, nam in vertigine corrumpitur imaginatio: sed præterea corrumpitur imaginatio, cum læsione visus & motus, ad differentiam delirij melancholici: dependens ab affectione circulari & morbosa, ad differentiam vertiginis non morbosæ, item ad differentiam epilepsiæ & apoplexiæ; nam in vertigine affectio hæc circularis, immediate producitur à spiritu animali, qui circumducitur præter naturam; quod locum non habet in vertigine non morbosa, neque in epilepsia, vel apoplexia. Forma igitur vertiginis, est corrupta imaginatio, cum læsione visus & motus. Subiectum præsertim est cerebrum, secundum partem anteriorem: aliquo modo etiam oculi. Efficiens, est affectio circularis, vt producitur à spiritu animali, quatenus præter naturam circumducitur. *Subiectum.* *Causa efficiens.*

Hæc iam singula, plenius confirmabimus. Formalis causa igitur pertinet imaginationem, visionem, & motum voluntarium. Ad imaginationem: nam, teste Galeno com. 42. lib. 4. de ratione victus, vertiginosi sibi imaginantur, vel caput proprium circumduci, vel exteriora: spiritus enim animalis, vt circumducitur, producit phantasma: quod ita cerebrum afficit, vt obiecta circumduci ægri imaginentur. Ad hanc ergo imaginationem confert obiectum, quod extra circumagitur, quales sunt rotæ molendinorum: sensatum

emum secundum Auicennam, efficit in organo sensitivo formam; seu speciem sibi similem, ut reliqua etiam visibilia circumduci videantur: quemadmodum & lingua, amaritudine affecta, etiam dulcia iudicat amara. Adhuc obiectum externum, quod circumducitur, est causa corruptæ imaginationis, quatenus vi obiecti, spiritus præter naturam mouetur, capite 8. libro 3. loc. affect. Quoad visionem, hæc quandoque corrumpitur, quandoque imminuitur, & quandoque repente destruitur, commun. aphor. 17. sect. 4. Ratio est: nam si spiritus solum afficiatur motu: tunc, si fieri potest, ut transmittatur ad oculos, non destruitur visio: si autem non transmittatur, destruitur. Quoad motum voluntarium, cum Galeno capite 8. lib. 3. loc. affect. vertiginosi interdum cadunt: nam ob morbosum motum spirituum animalium, desiderantur radij, qui per totum corpus distribuuntur.

Subiectū.

Quoad subiectum, est cerebrum anterius potissimum: unde Galenus cap. 8. lib. 3. loc. affect. ait: in vertigine etiam per consensum, affectionem cerebro esse ascribendam: multo ergo magis in vertigine per essentiam, cerebrum subiecti habebit rationem.

Causa efficiens, est motus circularis spiritus animalis.

Causa efficiens, est affectio illa circularis, ut producitur à spiritu animali, qui præter naturam circumducitur. Sicut enim vertigo non morbosa fit, cum quid cerebro vertitur, quoniam inordinatus fit motus tum humorum, tum spirituum: ita in vertigine morbosa, malum producitur ob inordinatum motum, cap. 8. lib. 3. loc. affect. Hinc Auicenn. proponit, spirituum animalium motum circularem & vndosum, Vertiginis igitur causa efficiens, est spiritus animalis, vitiosus redditus. Fundamentum colligitur ex Auicenna: nam ad edendum functiones sensitivas, spiritus animalis concurret ut instrumentum corporeum & patiens, sed primum, & dignius. Dicit Auicennas, spiritum esse instrumentum corporeum: ad differentiam facultatis animæ, quæ est organum incorporeum & spiritale: constitutio autem partis viuentis, est organum corporeum, sed materiale, non spiritale: organum autem corporeum, quod proinde est substantia, est spiritus animalis, & calidum insitum in substantia cerebri, mistum cum spiritu animali. Dixit etiam, spiritum esse organum passibile; ad differentiam facultatis, quæ non patitur, non suscipit magis & minus. Dixit quoque hunc

hinc spiritum animale esse organum primum, & dignius:
 primum, ratione temporis, quia simulatur facultati, ante-
 quam transmittatur: dignius, ob præstantiam substantiæ.
 Spiritus animalis in ventriculis existens (de quo Auicen-
 nas loquitur) est primus, ratione temporis: nam phantasma-
 ta primum recipiuntur in spiritu ventriculorum, deinde in
 calido innato cerebri. Idem spiritus, est instrumentum di-
 gnius, ob præstantiam substantiæ: nam si spiritus animalis,
 in ventriculis existens, confetatur cum temperatura, spiri-
 tus dignior est, quia temperatura saltem est qualitas: Si con-
 feratur cum calido insito, adhuc dignior est spiritus anima-
 lis, in ventriculis residens, nam ab hoc perficitur calidum
 insitum. Notandum tamen, spiritum animale in ventricu-
 lis existentem, esse digniorem, ratione dignitatis substan-
 tiæ, non autem ratione operationis, nam ad edendum fun-
 ctionem, temperatura est dignior, secundum locum tenet
 calidum innatum, & postremo spiritus animalis ventricu-
 lorum. Constitutum igitur sit omnem vertiginem produci
 à spiritu animali, residente in ventriculis cerebri, ut hic spi-
 ritus affectus est motu vitioso, inordinato, & veluti circu-
 lari. Quamobrem vertiginis forma, ut est functio læsa, neces-
 sario fit ob errorem externum, non læsa facultate: dicant alij
 quicquid velint. Neque obstat, quamvis in vertigine interdum
 cerebrum afficiatur morbo: hic enim morbus est causa vitij
 spiritus animalis, non autem est causa actionis læsæ. Est au-
 tem hic error externus, animalis spiritus. Hic spiritus est opus
 quoddam præter naturam, quod sequitur læsam cerebri re-
 tentionem, non attractionem, non expulsionem, non altera-
 tionem. Si enim esset alteratio læsa, produceretur spiritus vel
 imparus, vel calidior, vel frigidior: at vitium est solum se-
 cundum motum, quare non sequitur alterationem. Neque
 sequitur læsam attractionem, quia hic spiritus iam est geni-
 tus, & residet in ventriculis. Tandem non sequitur expulsio-
 nem læsam: quamvis enim interdum impediatur transitus
 ad oculos: vertigo tamen fit, quia in ventriculis præter na-
 turam mouetur. Sequitur ergo retentionem, dum retentrix
 iam est debilis, ut si quid præter naturam contingat, non pos-
 sit seruare spiritum, quin præter naturam moueatur. Verum
 retentio læditur, vel læsa facultate, vel ob errorem exter-
 num. Facultas læditur, primum, ut labefactatur, ca. 8. li. 3. loc.
 aff. dum videlicet, sit vertigo propter intemperiem inæqualem,

*Vertigo fit
 tantum ob
 errorem
 externum.*

*In vertigi-
 ne læditur
 retentrix
 cerebri.*

*1.
 Quando re-
 tentio læ-
 ditur læsa
 facultate.
 1. Ob dys-
 crasiam.*

id est, secundum Auicem. dum intemperies diuersa est à naturali temperamento, cuius origo est è caliditate, vel frigiditate: siue hæc calefacientia & refrigerantia admoueantur, siue assumantur; vt repente præter naturam, cerebrum vel calefiat, vel refrigeretur; vt motus morbificus in spiritu excitetur, citra motorem corporeum: nam cum sit intemperies contraria temperaturæ cerebri & spirituum, fit agitatio in spiritu, quemadmodum, dum aqua & ignis aggregantur. Et ideo non est dicendum, ob intemperiem inæqualem generari vapores, sed produci motum prauum in spiritu animali. Præterea læditur retentrix, vt impeditur ob semiangustiam ventriculorum anteriorum cerebri: angustia autem illa non est coalescentia, nam cerebrum non sustinet vlcus: non est constipatio, nam intra ventriculos cerebri, non potest colligi caro, vel materia, quæ constipet: non est subsidencia, quia hæc fit à materia, praua qualitate affecta, & proinde non citra conuulsionem, vnde potius fieret epilepsia, quam vertigo. Quare hæc angustia potest esse compressio: vnde Paulus cap. 12. li. 3. dicit, vertiginem fieri à contracta caluaria, vt comprimantur ventriculi anteriores cerebri. Est autem hæc compressio semiangustia: nam si integra esset angustia, esset carō. Et hæc compressio pertinet ad partem anteriorem: nam si fieret in parte posteriore, accideret obtusescencia, non vertigo. Præterea semiangustia potest esse obstructio: vnde Galenus cap. 8. lib. 3. loc. aff. vt & Auicem. inquit, fieri vertiginem propter multitudinem vaporis. Oportet ergo intelligere vaporis Speciem, Vitium, & Causam generantem. Quoad speciem, vapor est Sanguineus, Biliosus, Pituitosus, vel Melancholicus. Vitium in vertigine, pertinere potest ad Substantiam, Quantitatem, Qualitatem, & Vbi. Ad substantiam, vt si homo, qui vertigine afficiatur in febre pestilenti; vnde vapor procul dubio est putridus: similiter, si prodeat à lue venerea. Pertinet ad quantitatem, quoniam vapor residens in ventriculis cerebri, cuius in parua copia obest. Pertinet vitium ad qualitatem: vt vapor est calidior, vel frigidior. Vaporem calidum tangit Galenus, cap. 8. lib. 3. l. aff. vbi non proponit vaporem frigidum, quia solum, exempli gratia, loquitur de vertigine; non è proposito. Vaporem autem frigidum proponit, com. c. 23 lib. 3. aphorismorum. Vitium etiam spectat ad vbi; primum, vt vapor præter naturam quiescit in ventriculis: deinde secundum

1. Ob angustiam.

Compressio.

Obstructio.

Materia
obstruentis
considera-
tio.

dum motum, vt vapor mouetur, ab infernis ad caput, modo per viam crisis, modo sine crisi, siue per vasa, siue per alios ductus. Causa generans est multiplex: prout varios humores, & hinc varios vapores generare potest. Vnde notandum cum Galeno cap. 8. lib. 3. de loc. aff. si vapor generetur. In capite, vertiginem esse per essentiam: si Extra caput, per consensum; & tunc materia vel in Toto gignitur, vel in Parte: si in parte, vel in Ventriculo, vel in Intestinis, secore Liene, Thorace, Vtero. Notandum autem differentiam esse inter vaporem melancholix, & vertiginis: nam vapor in melancholia non est ex usu, non indicat vtile, nam à vapore in melancholia non producit angustia: contra in vertigine vapor est ex usu, quia causa est morbi, nimirum obstructionis. Cæterum, cum facultas retentrix in vertigine, impeditur ob compressionem & obstructionem: compressio non eget aliqua occasione; & ideo secundum Auicennam, dum causa externa percutit, simul fit compressio, & spiritus agitur. Obstructio vero postulat occasionem; sed leuē: vnde Galenus cap. 8. lib. 3. l. aff. ait, vertiginosos ē parua occasione obtenebrari. Leuis igitur occasio, non est causa disponens, sed corpus dispositum, seu cerebrum impellens in vertiginem, vt, verbi gratia, est mora sub radiis solaribus, balneum post repletionem, motus à cibo & corporis & animi, motus in gyrum, prospectus ab alto, intuitus obiectorum, quæ vel velociter, vel circulariter mouentur. Alia autem ē parte retentio læditur in vertigine ob errorem externum, cap. 8. lib. 3. loc. aff. aph. 17. l. 4. aphorismorum, vertigo nimirum quæ fit per consensum à ventriculi ore superiore, demorso ab humore. Paulus proponit inter vertiginis causas, vehementes cruciatus. Auicennas dicit, vertiginem fieri ob famem, in his, qui famem facile non tolerant; vt secundum Auicennam, vertigo fiat, propter rem, incipientem continuari cum cerebro sua qualitate non substantia, vt lædatur os superius ventriculi, & ita lædatur, vt cerebrum compatiatur. Vnde non fit, quia per famem vapores petunt cerebrum, sed impertitur qualitas: nam persentitur morsus oris ventriculi, propter magnitudinem neruorum, qui à cerebro ad os ventriculi perducuntur, per quos impertitur non materia, sed qualitas realis, quæ dolorifica est, & causa symptomatis. Dum ergo qualitas dolorifica impertitur spiritui animali, vt est aduersaria spiritui, ita agit, vt spiritus secundum natu-

Vapor, in melancholia (&) vertigine ut differat.

Occasio vertiginis.

2.
Quomodo retentio lædatur ob errorem externum.

ram detineri non possit: Et proinde fit vertigo, citra morbum, citra angustiam, & ob errorem externum.

*Differen-
tia.*

Sequuntur differentiae: & primum à forma, quæ posita est in læsa imaginatione, visione, & motu voluntario. Imaginatio læditur, cum Galeno com. 42. l. 4. de ratione vict. ut patientes imaginentur, circumduci vel Caput, vel Exteriora: si enim spiritus animales agitentur solum in cerebro: imaginantur caput circumduci; si secundum oculos; exteriora circummagi videntur. Quoad visionem, cum Galeno loc. cit. visio vel Non aufertur, & tunc vertigo seruat nomen generis; vel Aufertur, & dicitur vertigo tenebricola, *σκότωμα*: si enim non prohibeatur transitus spirituum animalium ad oculos, non aufertur visio. Quoad motum voluntarium, differentia est secundum Magis & Minus; prout motus spirituum, magis vel minus est vehemens: nam in motu vehementiori, radij spiritus animalis minus distribuuntur, ut propterea patientes concidant. Ratione autem causæ efficientis dicendum, spiritum animale præter naturam moueri, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Si læsa facultate; vel Labefactata ob intemperiem inæqualem, vel Impedita, aut ob Compressionem, aut Obstructionem: obstructio autem cum fiat à vapore, differentia lumen dæ sunt, à vaporis specie, vitio & causâ generante: ut in explicatione definitionis diximus. Si ob errorem externum: hic nil aliud est, quam qualitas dolorifica. A subiecto non sumuntur differentia: quia semper est idem.

Signa.

Vertigo in genere, & secundum differentias à forma facile cognoscitur è verbis patientis. Sufficiat ergo proponere signa ratione causæ efficientis. Num igitur spiritus animalis præter naturam moueatur, vel læsa facultate, vel ob errorem externum, distinguitur e præsentia & absentia, vel læsionis facultatis, vel erroris. Si fiat læsa facultate; hæc læditur ob intemperiem, compressionem, & obstructionem. Intemperies cum Auicena cognoscitur è leuitate capitis, & è prægressis causis quæ alterare possunt, vel adhibitis, vel al-

*1. Læsa fa-
cultatis si-
gna.*

*Signa om-
nium, quæ
in materia
obstruentis
consideran-
tur.*

sumptis. Compressio nota est per seipsum. Obstructio cognoscitur ex absentia aliarum causarum, & e signis indicantibus vaporis speciem, vitium, & causam generantem. Quoad speciem, an vapor sit sang. pit. bil. &c. cognoscitur è traditis de dol. cap. Quoad vitium, & quidem in substantia; cognoscitur, si febris sit putrida, si adsit lues venerea: vitium in

quan

Quantitate vaporum, cognoscitur e vehementia & remissione s. symptomatum: nam si vehementiora sint symptomata, significant maiorem copiam. Quoad vitium in qualitate: primum, vapor calidus, cognoscitur e vigiliis, sensu caliditatis, e signis mineræ calidæ. Vapor frigidus, cognoscitur e priuatione sensus caliditatis, e somno, e signis mineræ frigidæ. Quoad vitium secundum vbi: an sit vitium, vel solum in quiete, vel etiam in motu: cognoscitur e signis, indicantibus vertiginem per essentiam, & per cōsensum. Quoad motum, oportet cognoscere modum motus, spatium & terminum à quo. Modus motus, num sit criticus, vel symptomaticus, cognoscitur in febribus, e signis cruditatis, vel coctionis. Spatium cognoscitur: quia si per venas fluit, causa generans pertinet ad hepar: si per arterias, pertinet ad cor, & sunt signa vaporis admodum calidi. Cognoscere etiam oportet, num vapor caput petat per vasa exteriora, vel interna. Si per exteriora, vasa colli & capitis turgent: idem cognoscitur e pulsu arteriarum, & tandem ex astringentibus applicitis, si iuuant: si enim non iuuant, statuendum, vaporem per interna spatia caput petere. Quoad terminum à quo, an sit vel totum, vel pars: cognoscitur e signis indicantibus vitia vel totius, vel partis. Quoad causam generantem: cognoscere oportet, an vapor sit genitus in capite, vel extra: & hinc an vertigo sit per essentiam, an per consensum. cap. 8. lib. 3. l. aff. Si vapor in capite gignatur, præcesserunt, vel etiam sunt præsentia symptomata, ad caput attinentia. Verbi gratia, dolor capitis, læsio in sensibus externis, tinnitus aurium, &c. Si vapor generetur extra caput: symptomata pertinebunt ad locum extra caput. Verbi gratia, si generetur in ventriculo, cognoscetur e læsa ventriculi coctione, ex inappetentia, e grauitate secundum ventriculum, &c. Quoad errorem externum, cum sit qualitas dolorifica, facile cognoscetur, verbi gratia, e fame, e morsu oris ventriculi, cap. 8. l. 3. Laff.

Præsidia sumuntur à causa efficiente, id est, à spiritu animali, qui præter naturam mouetur, vel læsa retentrice, vel ob errorem externum. Si lædatur facultas, & quidem ob intemperiem: indicatur alterans per contrarium. Si morbus sit compressio: est negotium quod pertinet ad cheirurgos. Si obstructio: indicatio capitur à vapore, qui cum emanet à mineræ: ob id indicationes sunt potill. capiende à vaporis & humoris specie, vitio, & causa generante, de quibus in cephalalgia.

Si

2. Erroris
externi si-
gna.

Indicatio-
nes.

Si malum fiat ob errorem externum, cum sit qualitas spiritalis, quæ producitur ab affectione dolorifica: quid indicet dolorifica affectio, patet è superius traditis.

Prognostica.

Vertigo est malum, proximum epilepsiæ & apoplexiæ, com.aph.17.sect.3.& proinde non est despicienda: cum in ea sit vehementia essentia & dignitatis: nam insignis est recessus secundum imaginationem, secundum visum, secundum motum voluntarium. Et præterea adest dignitatis vehementia, quia cerebrum afficitur. Verum discrimen occurrat pro vehementia differentiarum. Vnde si perpendantur differentia, quæ à forma sumuntur: vertigo est magis periculosa, si caput circumduci videatur; quam si solum exteriora. Similiter magis periculosa est vertigo, ut vehementior est læsio, & in visione, & in motu voluntario: nam sunt effectus causæ magis vehementis. Quoad differentias à causa efficiente: Si causa efficiens sit morbus, & primum si intemperies inæqualis: non admodum periculosa est vertigo, quia dyscrasia inæqualis non difficulter tollitur. Si morbus sit compressio, est vertigo admodum periculosa: quod tamen periculum intenditur, prout compressio vehementior est ratione essentia, ratione dignitatis, ratione facultatis. V.g. si causa comprimens multum angustet, erit insignis vehementia ratione essentia: si comprimatur magnū capitis spatium, erit vehementia dignitatis: si compatiatur ventriculus, à percussione capitis, erit vehementia facultatis: Vnde cum triplex hæc vehementia coniungitur, vertigo est lethalis. Si morbus sit obstructio, diuersimode prognosticandum, prout obstructio est magis, vel minus vehemens. Et cum pendeat obstructio à vapore, prognosticum petendum à vehementia vaporis, secundum speciem, vitium, & causam generantem. Quoad speciem, si vapor sit sanguineus, est vertigo, quæ minatur delirium. Si vapor melancholicus, vertigo minatur epilepsiam: quod insinuauit Aëtius, dicens, vertiginosos esse insaniam obnoxios, si ante oculos obuersentur sanguinolenta: imminere autem epilepsiam, si purpurea appareant: Et ratio esse potest: sanguis enim fluxilis existens, ratione humiditatis non ita facile hæerere potest parietibus ventriculorum, ut potius fiat delirium: at melancholica materia, cum sit sicca, magis hæret, magis figitur, ut possit esse causa epilepsiæ. Quoad vitium speciei: patet, vertiginem esse magis periculosa, si vapor sit putridus, si sit admodum copiosus, si sit insignis

Insignis caliditatis & frigiditatis, si velocioris motus, & præsertim si motus non sit criticus, si generetur in capite. Vnde, cæteris paribus, vertigo per essentiam magis est periculosa, quam quæ est per consensum.

Materiæ administrandæ sunt, vel Extra accessiōem, vel In accessiōe. Extra accessiōem, Rhases & Auicennas venam secant. Auicennas enim ait, si vertigo fiat à sanguine, aut ab humore contento in corpore, venam esse secandam: si autem cum sanguine fuerint humores diuersi, aut vertiginis causa humor præter sanguinem, purgationibus vtendum. Sic autem Auicen. est intelligendus: Si vertigo fiat à sanguine, id est, à vapore sanguineo, qui prodit vel ab humore sanguineo existente in capite, vel ab humore sanguineo existente in toto: vena est secanda. nam adest sanguis: at si fiat vertigo à vapore sanguineo, prodeunte à sanguine existente in capite, diuersi autem humores fuerint in toto corpore, id est, si humores in toto maxime recedant à natura sanguinis: vt si vertigo fiat à vapore, prodeunte ab humore non sanguineo: vtendum est purgantibus: quia humores recedunt à natura sanguinis. Perpetuo ergo secanda vena, si sanguis abundet, vel vt causa principalis, vel vt causa adiuvans, vel vt causa sine qua non. *usus. Quantum.* Quâuis propter sanguinem vehementis actiuitatis, in vertigine sanguis esset euacuandus: non tamen id, propter virtutem, acernatim fieri debet: nam vertiginosi è qualibet occasione concidunt: vena igitur potius in vertigine iteratis vicibus est secanda. *Quomodo.* Foramen fiet angustum, propter virtutem, ne si amplum sit, confertim spiritus egrediantur: & vena tundatur ægris decumbentibus, non sedentibus: & expedit munire caput cum oxyrhodino. *Quando.* Causa virtutis vena secanda extra paroxysmum. Vnde dum Aëtius inquit, secandam esse venam, siue sit principium accessiōis, siue post: respexit ad vertiginem, in qua accessio accessiōi succedit: in qua vertigine, propter tam frequentes accessiones, sanguis est ita vehemens, vt magis possit ad indicandum, quam virtus ad prohibendum. At si vertigo non habeat tam frequentes & continuas accessiones, vena extra accessiōem est secanda. *Vbi.* patet: pro varia enim subsistentia, variæ venæ sunt secandæ. Addit Gal. c. 9. l. 6. de tuen. san. etiam arteriarum capitis sectionē, si vapor caput petat per arterias externas: quæ materia est remediij retrahentis, per modum interceptionis.

Quoad

Quoad medicamenta. Si vertigo fiat ab intemperie calida, siue frigida, patent medicamenta, è dol. cap. Si morbus sit compressio, tollitur his, quæ traduntur in cap. de percussione capitis. Si morbus sit obstructio, cum obstructio fiat à vapore, cuius varia species, varium vitium, varia causa generans: requiruntur diuersa medicamenta, quæ omnia sunt proposita. Satis sit hoc loco notare: si vapor ducatur per vasa exteriora, cum non ita liceat vasa dissecare, nos vti posse hoc medicamento: *℞ boli Armen. sang. Dracon. gall. immatur. corall. rub. acacia, balaust. hypocist. ana ʒ i. aqua resæ. vel plantarum ʒ ij. Misc.* & applicetur hoc medicamentum actu frigidum, & seruetur etiam actu frigidum. Si tandem vertigo fiat ob errorem externum: error externus, est causa, vel intrinseca, vt in vertigine morbose, vel extrinseca, vt in vertigine non morbose, quam abundantis doctrinæ gratia proponimus. Si causa fuerit interna est causa dolorifica, cuius medicamenta patent è dol. cap. Notandum autem, si forte vertigo fiat à causa dolorifica, prodeunte ab ore ventriculi, vt è fame: cum Auicen. probatur *panis buccella, seu mica, infusa in succis astringentibus, ut in succo granatorum acidorum, omphacis:* sic enim excrementa, quæ propter famem petunt os ventriculi, expelluntur ad fundum. Si vertigo fiat à causa dolorifica, id est, ab humoribus mordacibus: exhiberi debet *syrupus ros. sol. vel castia cum hiera speciebus,* vt humores euacuentur: postea ad roborandum os ventriculi exhibebitur *diarhod. Abb. diatrion santal. ad ʒ i. sacchari ros. ad ʒ ʒ ss.*

Vertigo non
morbose.

Si error externus fuerit causa vertiginis non morbose, Auicennas probat somnum, & quietem corporis ac animi: Quod si non remoueatur vertigo, dat buccellas, in succis stipriscis propositis. Quibus verbis Auicennas respicit ad accessionein vertiginis.

Dieta.
Aer.
Cibus.

Aër non sit luminosus & splendens: & si vertigo prodeat ab intemperie calida, sit aër frigidus, si contra, calidus. Cibus, vt respicit motum spiritus animalis, debet esse crassificiens, modo calefaciens, modo refrigerans. Si autem dispositio frigida fuerit, in vltima mensa exhibere licet *diacydonien cum melle, puluer. coriandri.* Si dispositio vergat ad calidum, probantur *pyra cydonia cum saccharo.* Si eibus respiciat causas, ob quas mouetur spiritus animalis, vt variae sunt causæ, ita varij cibidandi, sicut docuimus in dol. cap. In vertigine ex affectione dolorifica, id est, è fame, probantur cibi asstringentes,

gentes, propositi, ratione spirituum animalium: at notandum discrimen esse: nam cibus qui datur causa motus, debet exhiberi in altera mensa, post alios cibos: si autem exhibetur causa effectiōis dolorificæ, exhibendus ante omnes cibos. Potus non sit vinum, quia in vertigine caput facile repletur. Quod si vertigo à frigiditate ortum trahat: cum Actio quidem vinum potest exhiberi, sed album, tenue, non vinosum, non valde vetus, & moderatum, id est, in moderata copia. In vertigine à causa dolorifica, vinum probatur astringens. Motus fiat citra inclinationem capitis & dorsi. cap. 3 l. 5. de tuen. san. Et quoad motum oculorum, oportet ut vertiginosi inspiciant obiecta non profunda, non quæ vehementer agitantur, aut quæ circulo mouentur, nec luminosa: nam facile agitantur spiritus.

Totus.

Motus.

Accessio in vertigine sponte euanescit. Quod si tamen pertinax esse videtur, probantur materiæ diuercentes, intercipientes, & roborantes spiritus. Diuertunt, suppositoria acris, ligaturæ, frictions. Intercipiunt, ut in vertigine à fame, *miaz panis*, infusa in liquore astringente. Roborantur spiritus secundum Paulum, odoratis: vnde in vertigine à causa calida, odorata fiant ex aqua ros. ex aceto, si prodeat à causa frigida, cum *mojcha*, *ambri*, *assa* odorata, &c. Hæc ergo de vertigine.

In paroxysmo qua resurpanda.

CAPUT XIII.

De Incubo.

DE Incubo iam agemus, quia est malū quodammodo medium inter vertiginem & epilepsiam, estque via ad epilepsiam. Per incubum autem intelligimus illud malum, quod *ἐπιδύμις* dicitur, in quo patientes tempore somni imaginantur se suffocari: dum à somno ilico excitantur, vix assurgunt, sed loquuntur, & mox recordantur affectiōis, & falsam imaginationem fuisse agnoscunt. Quomodo generetur hoc malum, difficile est intellectu. Ego tamen dicerem incubum generari, dum vapor crassus, replet ventriculos cerebri, & potissimum postremū, ut radij spiritus animalis non possint prodire, qui radij gratia respirationis in somno, impertiantur musculis, respirationi destinatis: vnde fit ut læsa respiratione, istis sensus oboriatur grauitatis & suffocationis, qui dum

Nomen.

Generatio.

*Definitio.**Forma.**Subiectū.**Causa efficiens.**Causa phantasmatis in incubo.**Obstructio cerebri.*

dum offertur sedi sensus communis & imaginatricis, sit et patiens imaginetur, obiectum graue ita comprimere thoracem, ut veluti suffocari videatur. Incubus ergo est functio corrupta principalis cerebri anterioris, dependens ab affectione phantasmatis, grauitatis & suffocationis auctoris. Forma est functio corrupta principalis, Subiectum, est cerebrum anterius, quod sedes est imaginatricis.

Causa efficiens est affectio phantasmatis, grauitatis & suffocationis auctoris: qua delirium in incubo distinguitur ab omni delirio: à delirio quidem melancholico, nam in incubo, non est affectio tenebricosa: à maniaco, quia non est affectio ignea: à delirio in vertigine, quia non est affectio circularis: sed est affectio aggrauans, comprimens. Et patientes in incubo cognoscunt, falsam esse imaginationem, qua spiritus animalis non redditur impurus, sicuti in delirio melancholico. Verum cum affectio prodeat à phantasinate, ut est auctor imaginationis, grauitatis & suffocationis: explicanda est huius phantasmatis causa. Producitur ergo hoc phantasma ab obiecto, quod procedit è noxa, attinente ad thoracem, ut est organum respirationis: nam, cum patiens nitatur thoracem mouere causa respirationis, & non possit ilico thorax grauitatis & suffocationis sensum generare: quæ tristis sensatio dum offertur cerebro, prodit phantasma, quod ut originem duxit à tristi sensu grauitatis & suffocationis, ita in cerebro imprimit affectionem, ut imaginatio fiat grauitatis & suffocationis. Sed forte quis quæret, quam ob causam thoraci occurrat noxa grauitatis & suffocationis? Sciendum, causam esse penuriam radiorum spiritus animalis, propter oppilationem cerebri, secundum Auicennam: ut remota oppilatione, homo subito liberetur. Intelligere ergo oportet, oppilationis essentiam, sedem, tempus, & causam efficientem. Essentia est obstructio: sit enim hoc malum à vapore crasso, intra meatus incluso: non autem est integra obstructio, alias radij prorsus detinerentur. Quoad sedem, hæc obstructio attinet ad cerebrum posterius, non ad ventriculos anteriores: nam à parte posteriori prodeunt radij spiritus animalis, causa motus voluntarij: ut sedes & locus affectus functionis corruptæ, sit cerebri anterioris substantia, sedes autem obstructionis, sit ventriculus posterior, non substantia cerebri, nam alias læderetur memoria. Quoad tēpus obstructionis, dicit Auicēnas, oriri tempore somni, dum morus vigiliarum

vigiliarum cessat, id est, in principio somni: nam in vigiliis, vapores vel caput non petunt, vel si caput petunt, resoluuntur: Contra, in principio somni, vapores petūt capitis interna, nec resoluuntur: unde si vapores sint copiosi & crassi, vt repleantur ventriculi, ita impediuntur radij, vt cum Aëtio & Paulo, quāuis patientes surgere velint & clamare, non tamē possint: quod in somno secundum naturam non euenit, siquidem sensus in somno non prorsus oriantur, c. 1. l. 5. de gen. anim. Quoad causam obstructionis, omnes dicunt communē causam esse vaporem. Quare intelligēda est vaporis species, vitium, & causa generans. Quoad speciem, secundum Auicē. vt plurimum est vapor crassus, sanguineus, pituitosus, aut melancholicus, quandoq; vapor alimenti cerebri. Auicē. per materias sanguineas intelligit tum sanguinem crassum, tum sanguinem mutatū in semen crassum, à quo prodeunt vapores. Per vaporem alimenti intelligit excrementum tenue coctionis cerebri, quod excrementum potest degenerare in vaporem. Quare quoad speciem attinet, est vapor sanguinis, pituitæ, melancholiæ, seminis, & alimenti cerebri. Vitium spectat ad substantiam, quantitatem, qualitatem, & vbi. Vitium in substantia excluditur, nam vapor putridus sua acrimonia nō potest ita aggregari, vt causa sit incubi. Vitium in quanto locum habet: nam in incubo vapor insigni copia exuberat. Locum etiam habet vitium in qualitate, nam vapor est frigidus, crassus: unde vapor ex alimento cerebri prodiens, secundum Auicēnam incrassatur. Quoad vitium secundum vbi; in quolibet incubo est vitium secundum quietem, nam vapor præter naturam quiescit: in aliquo autem incubo vapor peccat etiam secundum motum, vt est vapor prodiens ex suis mineris, qui in caput eleuatur & mouetur. Quoad causam generantem, vapor in incubo vt plurimum, extra caput generatur, ex suis mineris: quandoque autem generatur in capite, dum frigus externum vehemens repente occurrit capiti in principio somni, nam hoc frigus prohibet alimenti vaporem diffari, & impellit intus & incrassat.

*Vapor ob-
structionis
causa*

Quoad differentias desumptas à forma; cū forma sit fun-
ctio corrupta imaginariis, phantasmatibus grauis & suffo-
cantis: differentia prodit, prout patiens imaginatur phantas-
ma vel Variorum colorum, vel phantasma Veneris cū. Harum
differentiarum causa, est vis varia mineræ, vel ratione co-

Differentia

loris, vel vt potest venetis cupiditatē promouere. A subiecto non sumuntur differentia. A causa efficitur sumuntur differentia, & potissimum à vapore, secundum speciem, vitium, & causam generantem. Quoad speciem, vapor est vel Sanguineus, vel Pituitosus, vel Melancholicus, vel Seminalis, vel Excrementum tenue cerebri. A vitio sumuntur differentia, secundum quantitatem & qualitatem, secundum Magis & Minus. Quoad vbi, dicendum, peccare vaporem, vel Motu & quiete, vel Quietē tantum. A causa generante, vt generatur, vel In capite, vel Extra: & si extra, vel in Ventriculo, vel *Fig. 4.* Hepate, vel Testibus. Incubus in genere, & secundum differentias à forma, patet è verbis patientis. Quoad differentias, quæ sumuntur à causa efficitur, oportet cognoscere vaporis speciem, vitium, & causam generantem. Species cognoscitur è signis, indicantibus humores, seu mineras, à quibus eleuantur vapores: de quibus signis alias. Auicenna ait, dum humor causat phantasma suo colore, si phantasma rubedinem præ se ferat, indicari vaporem sanguineum: si præ se ferat albedinē, indicari vaporem pituitosum: si nigredinē, melancholicū: si venerem, seminale. Verū, cum phantasma albicās possit esse indicium & vaporis pituitosi, & vaporis excrementi cerebri: vos suo loco distinguētis, è signis indicantibus causas generantes. Quoad vitium & secundum quantitatem, & secundum qualitatem, vt hæc vitia differant secundum magis & minus, cognoscētis è vehementia & perseverantia symptomatum: si symptomata erunt vehementia vehemens etiam vitium indicatur. Quoad vbi, an vitium sit solum secundum quietem, nec ne: cognoscitur è signis indicantibus causas generantes. Vnde, quoad cognitionem causa generantis, cum possit generari vapor, vel in capite, vel extra: cognoscētis in capite generari, si homo dormiat in aere frigido, ita vt tempore somni aliquod refrigerans extrinsecus capiti occurrat. Sin minus, statuendum, vaporem extra caput generari. Vtrum autem generetur in ventriculo, hepate, vel testibus, è propriis capitibus petendum.

Indicationes.

Præsidia quæ ex usu sunt, capiuntur à minera, & causa generante. Quoad mineram è qua, species minere indicat remedium determinatum; vitium, indicat contrarium; verbi gratia si minera sit sanguis copiosus, indicatur præsidium minuens sanguinem. Causa generans, vel generat mineram, vel vaporem refrigerat & incrassat. Causa generans mine

mineram, ut varia est, ita variè sumuntur indicationes, verbi gratiâ si causa generans pituitam sit ventriculus frigidior, oritur indicatio calefaciendi ventriculum, &c. Causa generans, quæ vaporem refrigerat & incrassat, nil aliud indicat, quam remedium calefaciens.

Malum hoc, secundum Rhafem, diligenter est tractandum, nam minatur epilepsiam, apoplexiam, melancholiam: etenim si eueniat, ut vapor hæreat in ventriculis cerebri, sit epilepsia: si vapor adeat totam cerebri substantiam, sit apoplexia: si vapor misceatur cum spiritibus animalibus, sit melancholia. Viget autem vehementia essentia & dignitatis, secundum causam, morbum, & symptomata. Nam quoad causam, vapor est copiosus, crassus, frigidus; unde vehemens secundum essentiam. Obstructio, seu morbus est insignis; quare vehemens secundum essentiam. Symptomata & ipsa vehementia; nam attinent ad imaginatricem, ad respirationem. Dignitatis vehementia adest, quia morbi, causæ & symptomata attinent ad cerebrum, partem præstantem. Ceterum augetur periculum, pro vi differentiarum, earum potissimum quæ sumuntur à causa efficiente. siquidem forma pædet ab efficiente. Unde, cum causa efficiens sit vapor; quoad speciem; morbus est magis periculosus, si vapor sit melancholicus, quia maior est recessus à naturali statu. Quoad vitium; incubus est periculosior, si vapor sit copiosior, frigidior, crassior, magis quiescens: ut propterea cum Paulo & Aetio, incubus sit magis periculosus, dum diurnus est, dum frequens, & æger stupidus permanet: nam hæc significant vaporem admodum copiosum, frigidum, crassum, & quiescentem. Et, ut incubus est frequens, significat causam generantem esse magis vehementem; verbi gratia si generetur à ventriculo frigido, quo frigidior erit ventriculus, eo etiam incubus erit magis periculosus. Quoniam autem vapor potest esse causa incubi modo per essentiam, modo per consensum: ut plurimum incubus per essentiam est minus periculosus, quia producitur à frigore externo, caput refrigerante: magisque recedit à naturali statu frigiditas ventriculi, quam capitis, producta ab ambiente frigido, & præsertim quia ventriculi frigiditas potest esse in habitu.

Prognostica.

*Curatio.
Medica.*

Vena secanda est, si incubus fiat à vapore sanguineo, ut Rhases iubet. Quoad medicamenta in incubo per consensum, Avicennas probat medicamenta causa totius in incubo per toto.

essentiam, probat medicamenta causa capitis: & in quolibet incubo, siue per essentiam, siue per consensum probat capitalia. Causa igitur totius probantur validiora: cuiusmodi sunt *pilule coctia*: & causa melancholicę, *coctia cum veratro*. Auicennas propter humorem copiosum & crassum, proponit hoc medicamentum: *℞. euphorbij, in alio exemplari legitur, hellebori nigri ʒ j. scammonij ʒ i. pulpa colocynth. ʒ xv. seminum anisorum ʒ j. Misco.* Hoc medicamentum dirigitur ad incubum è melancholia: unde resipit helleborum nigrum in maiore dosi: scammonium additur propter bilem, quę habet rationem vehiculi, & præterea potest crassos humores attenuare, & expultricem sopitam excitare: colocynthidis additur, quia in omni malo capitis pituita est purganda: anisum additur, ut soluentium facultas delecteria frangatur. Huius medicamenti summa dosis erit ʒ j. & dabitur, si virtus sit fortis,

Topica pro capite.

quia est medicamentum satis potens. Quoad medicamenta causa capitis: in incubo per essentiam probatur oleum lil. alb. oleum anethinum, cum nucibus cupressi, si coquantur in vino astringente, ad consumptionem vini. Probantur etiam emplastra rubrificantia, quę conficiuntur e *sin. pi.* Nam olea proposita, calefaciunt caput refrigeratum: & præterea virtute astrictionis repellunt vapores, qui possunt reprimi. Emplastra autem rubrificantia, capitis frigiditatem prorsus superant, & vapores, qui non cedunt reprimētibus medicamentis, discutiunt.

Cephalica.

Aet. ca. 12.

lib. 6.

Villm.

Quoad medicamenta capitalia, Auicennas cum Græcis probat nigrum *peonia maris fructum*, si ʒ xv. sita cum aqua in potu exhibeantur per plures dies, ut cerebri proportio foueatur.

Dixta ex alibi dictis patet. Id notandū, improbari in somno decubitum supinum: nam est in causa, ut caput repleatur.

CAPVT XV.

De Epilepsia.

Nomen.



EPILEPSIA, alias dicitur, morbus sacer, Herculeus, comitialis, ab Hippocrate in lib. de morb. sacro, & Galeno lib. 6. epid. circa finem. Per epilepsiam intelligimus illud malum, quo infelices correpti, etiam stantes ilico in terram collabuntur, secundum totum corpus conuelluntur, omni sensu priuantur, & omni principali functione cerebri destituuntur.

Generatio.

Generatur malū hoc dum causa morbifica occurrit cerebro,

cerebro, ut cerebrum lædatur & secundum ventriculos, & secundum poros. Vnde dum læditur secundum ventriculos, id est, secundum ventriculorum parietes; cerebrum contrahitur, ut quod noxium est expellat, vnde & nervi contrahuntur, & hinc corpus musculorum, ut totum corpus convulsione afficiatur. Dum autem cerebrum efficitur secundum poros, omnis animalis functio aboletur, etiam extra cerebrum: nam vis animalis non influit. Sed præterea aufertur vis etiam animalis in cerebro: nam cerebrum secundum poros ita afficitur, ut spiritus animalis mistus cum calido innato afficiatur, ut citra intemperie functio principalis aboleatur.

Definitio hæc esse potest: epilepsia est functio ablata principalis totius cerebri, cum amissione motus & sensus partium nervosarum, & convulsione totius corporis, dependens à causa morbifica, cerebrum secundum ventriculos & poros lædente: Colligitur hæc definitio è com. 45. sect. 2. & aphor. 19. sect. 3. & lib. 6. epid. circa finem, & cap. 2. lib. 4. de loc. aff. sed potissimum è cap. 7. lib. 3. loc. aff. nec minus ex Avicenna in capite proprio:

Forma completur symptomatum triplici genere: ut propterea & triplex esse debeat subiectum. Primum symptomatis genus fuit functio abolita principalis: secundum, amissio motus & sensus: tertium, convulsio. Notandum, cur primo loco in definitione proponatur functio principalis, deinde functio ablata motus & sensus, tertio, functio corrupta secundum motum, id est, convulsio: & præsertim hoc est intelligendum, quia Galenus cap. 7. li. 3. loc. aff. dicit, epilepsiam esse convulsionem. Vnde ferme omnes moderni, ut Altimarus & alij, ducti non ratione, sed nuda Galeni auctoritate in superficie intellecta, dicunt epilepsiam esse convulsionem. Sciendum ergo causam fuisse, quoniam convulsionis subiectum est totum corpus, quatenus convellitur: motus autem & sensus subiectum, sunt partes nervosæ: functionis autem principalis subiectum est cerebrum. Vnde, cum epilepsia sit vitium, quod principaliter attinet ad cerebrum, non ad totum: ob id nos in definitione primum symptoma statuimus esse functionem principalem abolitam, quia functionis principalis subiectum est cerebrum: secundo loco proposuimus motum & sensum, quia subiectum sunt partes nervosæ, quæ prodeunt à cerebro: tertio proposuimus convulsionem, quoniam pertinet ad musculos, qui ad dis-

Definitio.

Forma.

*Ablatio
functionis
principalis.*

ferentiam neruorum non prodeunt à cerebro, nec à spinali medulla. Hæc ergo fuit causa, ob quam symptomata, in definitione ita disposuimus. Galenus autem cap. 7. lib. 3. loc. aff. ait, epilepsiam esse conuulsionem, quia cap. 6. lib. ej. locutus est de conuulsione, & propterea pergens in sermone de conuulsione, dicit epilepsiam esse conuulsionem. Vnde etiam Auicennas, cum locutus esset de incubo, in quo motus totius corporis læditur, dicit, epilepsiam esse vitium, in quo prohibentur membra animata à sensu & motu. Nos autem respicientes ad formam, vt attinet ad subiectum principale, primo loco proposuimus functionem principale, cuius subiectum est totum cerebrum, vt aboleatur omnis functio principalis: vt conuulsio epileptica distinguatur à tetano, & reliquis conuulsionibus, in quibus principalis functio non deperditur. Deinde dictum est, cum amissione motus & sensus, partium neruosarum. Vnde cum Auicenna in epilepsia prohibentur membra animata neruosa à motu & sensu, vt motus voluntarius auferatur. Si aboletur sensus ergo multo magis motus voluntarius. Nam sensus causa receptionis in patiendo constituitur; motus autem voluntarius est prorsus actiuus. Notandum, nos intelligere motum voluntarium esse ablatum, vt procedit à facultate, quæ non influit. Et tandem dictum, cum conuulsione totius corporis, è cap. 7. lib. 3. loc. aff. Propterea sciendum, quantum attinet ad conuulsionem, hanc esse motum prauum non ablatum, retractionis partium, dependentem à musculis præter naturam contractis: nam in ipsa retrahitur pars, id est, totum membrum, vt ipsa sit affectio præter naturam membri: cum etiam in motu secundum naturam membrum patiatur. Verum, vt conuulsio est motus prauus, & hinc dependet à musculis violenter retractis: secundum hanc rationem non est functio aboluta, sed praua & corrupta. Et propterea scire oportet, si verbi gratia brachium conuellatur, quod ossa patiantur, musculi vero agant, è comm. aphorism. 42. sectio. 2. At in conuulsione musculi concurrunt præter naturam, citra influxum facultatis, quia facultas non influit. Vnde in epilepsia motus voluntarius est ablatum ratione facultatis; corruptis causis musculorum: Verum omnia dependent à causa morbifica, cerebrum secundum ventriculos & poros lædente. Postremo, cerebrum affici secundum ventriculos & poros colligitur è capite secundo, libro quarto.

Sensus, & motus amissio.

Motus corruptus, seu conuulsio.

Subiectum.

loca affectio. vbi ait, in epilepsia cerebrum affici magis
 secundum ventriculos, quam secundum corpus: contra in
 apoplexia, cerebrum magis affici secundum corpus. Per
 corpus autem Galenus intelligit cerebrum, vt instrumen-
 tale, non vt simile: quare secundum poros, non secun-
 dum temperiem: nam epilepsia cito fit & cito desinit. Per
 ventriculos intelligit Galenus omnes ventriculos, vnde
 capite secundo, libro quarto loc. affect. ait: vt in caro cere-
 brum magis afficitur secundum partes anteriores; ita in
 apoplexia & epilepsia, affici secundum vtramque partem:
 quamuis cum Auicenna primum lœdantur partes antero-
 res. Sciatis autem quod quamuis epilepsie causa sit mul-
 tiplex: & quælibet earum sit causa conuulsionis secun-
 dum ventriculos cerebri: non tamen esse conuulsionem le-
 gitimam, id est, solius morbi: cum hæc conuulsio neque ex
 inanitione sit, neque è repletionem. Notum est ex inanitione:
 nam cum Galeno capite septimo, libro tertio, loc. affect. epi-
 lepsia cito fit, & cito desinit. Vnde notandum, Galeni syl-
 logismum hunc fuisse: conuulsio quæ cito fit, & cito desi-
 nit, non fit ex inanitione: at conuulsio epileptica cito fit, &
 cito desinit. Ergo non est ex inanitione. Decipiuntur igitur,
 qui putant hoc loco maiorem propositionem esse,
 quod cito fit, & cito desinit, non refertur in intemper-
 riem: nam maior est hæc conuulsio, quæ cito fit & cito
 desinit, non est ex inanitione. Hanc probat Galenus, nam
 inquit: vt vel cerebrum, vel tenuis eius membrana ad ari-
 ditatem corio similem perueniat, hoc nequaquam cito
 fieri potest: at epilepsia cito fit, & cito desinit: Ergo non
 est ex inanitione. Verum, quamuis maior à Galeno pro-
 posita, capite septimo, libro tertio, loc. affect. non fit, quod
 cito fit, & cito desinit, non refertur in intemperiem; ta-
 men hæc maior proponitur à Galeno capite vltimo, libro
 secundo, de caus. sympr. siquidem ait, epilepsiam & apo-
 plexiam cito generari & discuti, quod in corporum dyscra-
 sia non potest accidere. Vt hæc sit vera propositio cum
 Galeno, quod cito fit, & cito desinit, non referri in in-
 temperiem. Quod dictum ita intelligendum, vt Galenus
 per intemperiem intelligat intemperiem ex vsu, è qua su-
 mitur indicatio utilis. Hoc verum esse, colligitur quia ipsam
 comparat succo pituitoso, collecto in vetriculis cerebri, qui
 succus ita est ex vsu, vt hoc euacuato ilico cesset malum. Vt

*Epilepsia
 non est
 conuulsio
 legitima.
 I. Rati.*

verum sit, quod cito fit, & cito desinit, non referri in intemperiem ex usu. Vt secus sit statuendum, de intemperie non ex usu. Dyscrasia ex usu est intemperies in febre hectica: non ex usu, in ephemerata: ut ephemerata cito fiat, & cito desinat: quod non esset statuendum, si esset intemperies ex usu. Sed ad rem redeamus. Probauimus hucusque in epilepsia conuulsionem non esse ex inanitione: iam docebimus eam etiam non esse ex repletione: nam conuulsio ē repletionem est motus prauus, cuius causa est solum materia morbifica, non facultas: at in epilepsia, etiam per essentiam, facultas concurrat: quā de causa Galenus c. 7. l. 3. loc. aff. ait, in epilepsia cerebrum seipsum quatere, ut expellat noxia, & cap. ult. lib. 1. de symp. caus. ait, in epilepsia conuulsionem esse motum vitiosum cerebri: vnde patet concurrere expultricem facultatem cerebri. Præterea & aliud est argumentum, quo conuulsio legitima excluditur, ab epilepsia: Nam conuulsio epileptica pertinet ad cerebrum: at, secundum Galenum com. 1. lib. 5. aphor. conuulsio legitima fit vel inanitis, vel repletis corporibus nervosis, à quibus motus voluntarius perficitur. Vnde consequens est, cum cerebrum nec sit nervosum, nec perficiat motum voluntarium: ob id conuulsionis legitimæ subiectum esse non posse. Dictum autem fuit epilepsiam non esse conuulsionem legitimam, ut pertinet ad cerebrum: nam cum Galeno cap. 7. lib. 3. de loc. aff. in epilepsia præter spuriam conuulsionem potest interdum coniungi legitima conuulsio ē repletionem, quemadmodum colligitur e lib. 6. epid. circa finem, utpote si irrigentur neruorum exortus. Itaque in epilepsia, ut læditur cerebrum secundum ventriculos, conuulsio necessario est spuria, ut sit motus prauus solius expultricis: nam causa morbifica ita parietibus ventriculorum cerebri adhæret, ut ē ca. 7. li. 3. loc. aff. cerebrum contrahatur, quo noxam expellat. Vnde & Auicennas ait, cerebrum in epilepsia expellere id, quod nocet: Queamodum ventriculus expellit in singultu. Singultus autem ē lib. 2. de caus. sym. est motus solius expultricis. Quare conuulsio epileptica erit motus prauus expultricis cerebri, irritatæ à causa morbifica: sicut enim in singultu impacta est materia in ore ventriculi: ita etiā in epilepsia impacta est parietibus ventriculorum cerebri. Et hinc est, quod dicit Galenus c. 2. l. 5. loc. aff. epilepsiam mediam esse inter carum & apoplexiam: nam in caro, cum obstructio sit integra, materia occupat ventriculos

*Conuulsio
in epilepsia est spuria, ratione cerebri.*

os cerebri, non impacta est, vt in epilepsia, & in singultu.

Hactenus patet, epilepsiam producā à causa morifica, vt *Causa efficiens: primum interna, seu cum Galeno cap. 7. lib. 3. loc. aff. epilepsiam fieri, vel per Essentiam, vel per Consensum ab ore ventriculi, aut ab aliis partibus.* Primum digrediemur circa epilepsiam per essentiam: secundo circa epilepsiam per consensum ab ore ventriculi: tertio ab aliis partibus. Quantum ad epilepsiam per essentiam: causa est Vapor, non minera. Ratio est: nam, vt testatur Auerroës (quamuis impudenter in Medicos inuehat) si causa epilepsie per essentiam esset minera frigida, seu humor crassus, viscidus, hærens in ventriculis cerebri; nequaquam fieri posset, vt epilepsia tam cito fieret, & tam cito euanesceret. Argumentum Auerrois instat est à *Causa epilepsie per essentiam est Vapor.* Adhæc è Galeno ca. 7. li. 3. loc. aff. in epilepsia causa est quandoq; pituita, quandoq; melancholia, quæ melancholia quia non generatur in capite, non potest esse causa epilepsie per essentiam. Verissimum enim est in epilepsia per essentiam materiam generari in capite. Quare epilepsie causa immediata est vapor. Vnde Auicennas ait, epilepsiam fieri à materia, à minera; sed addit, vt ab hac materia procedat vapor. Vt, quamuis melancholia non generetur in capite, generari tamen possit in capite vapor; vt sit epilepsia per essentiam. Cum ergo causa sit vapor; necessarium est intelligere & vaporis speciem, & vitium, & causam generantem. Quoad speciem, cum Auicenna, vt plurimum est vapor pituitosus, quandoque melancholicus, quandoq; sanguineus: cuius tamen vaporis sanguinei minera, est sanguis vergēs vel ad pituitosum sanguinem, vel ad melancholicum. Quoad *Vaporis consideratio: quatenus causa est epilepsie.* vitium. Vapor in epilepsia per essentiam, peccat copia, quietate, & quiete. Copia; nam secus vapor non læderet cerebri & secundum ventriculos, & secundum poros. Peccat qualitate; vt est frigidus, crassus: vnde cum sit proportio inter vaporem & mineram, rationabiliter dixit Galenus ca. 7. lib. 3. loc. aff. epilepsiam per essentiam, semper fieri à crasso humore, quatenus scilicet ab hoc eleuatur vapor: & hic vapor necesse est vt sit frigidus, nam vapor calidus non posset ea copia aggregari, vt esset epilepsie causa. Quietate peccat; tam præter naturā in capite detinetur. Quoad causam ge-

nerantem, est calor debilis, pertinens ad cerebrū: quare tum
 intemperies frigida, tum calidum innatū imbecille, vi quo-
 rum præsertim generatur pituita. Et hinc corpora obnoxia
 sunt epilepsiæ, in quibus potius pituita viget: tum quoad æta-
 tes, tum quoad sexum. Quoad ætates, cum Paulo, epilepsiæ
 obnoxij sunt senes, & pueri paruuli. Senes, quia frigidi &
 sicci: in frigido autem & sicco intemperamento multipli-
 catur pituita: & potius sunt senes non vsque adeo decrepiti:
 nam in decrepitis fit potius apoplexia; nisi contingat, vt in
 decrepita ætate homines sint robusti, seu minus imbecilles,
 qui solent obnoxij esse epilepsiæ. Pueri sunt obnoxij: nam &
 humidi sunt, & alimento humido vtuntur. Vnde quemad-
 modum admonet Hippoc. in lib. de morb. sacro, si fœtus in
 utero vel non purgetur, vel diminute; in cerebro colligitur
 pituita: quæ dum fœtus in lucem editur, nisi vel per vlcera,
 vel per saluam expurgetur, causare solet epilepsiam. Galen.
 addit, com. aph. 29. sect. 3. iuuenes etiam subiectos esse epi-
 lepsiæ; verum non vi ætatis, sed ob errores frequentes &
 vehementes, qui in iuuenili ætate committuntur. Quoad
 sexum, Celsus ait, inares frequentius corripitur epilepsiâ: nam
 fœminæ quamuis frigidioris sint crasseos, tamen & minus
 delinquant, in viuendi ratione, &, si delinquant, beneficio
 purgationis menstruæ non ita facile corripuntur. Est porro
 hoc loco explicandum, quæ sit vis tum vaporis, tum mine-
 ræ, à quibus prodit epilepsiâ. Quoad vaporem, vt adhæret
 parietibus ventriculorum cerebri, causat conuulsionē: vnde
 quamprimum transponuntur vapores, id est, à parietibus ad
 cavitatem, ilico cessat conuulsio, & patientes immoti iacēt.
 Vt autem vapor lædit cerebrum secundū poros; est in causa
 ablatae functionis & principalis, & sensus motusque volun-
 tarij. Neque obstat, quod dicit Galenus com. aph. 45. sect. 2.
 apoplexiam fieri ob immodicam priuationem virtutis mo-
 tiuæ, epilepsiam autem propter motum vitiosum: hoc non
 obstat: nam motus vitiosus intelligendus est, non vt proce-
 dit à facultate, quia non influit; sed vt procedit à musculis
 præter naturam contractis. Humor autem est in causa ob-
 structionis, siquidem cum Galeno cap. 7 lib. 3. loc. aff. in epi-
 lepsiâ cerebri ventriculi obstruuntur: sed cum Auicenna ob-
 structio non est integra; nam non fieret conuulsio; quemad-
 modum etiam non fit in apoplexia & caro:
 Verum si epilepsiâ fiat per consensum ab ore ventriculi

*Causa epi-
 lepsiæ per
 consensum.*

& aliis partibus : notandum fieri epilepsiam per consensum non modo ab ore vetriculi, & à parte externa, verum etiam ab alia parte interna, & à toto corpore. Nec propterea improbandus Galenus: quia non loquitur de epilepsia è proposito, sed respicit solum ad cognationem locorum affectorum. Auicenn. autem è proposito loquitur : vnde omnes epilepsiarum species proponit. Ob id in epilepsia per consensum breuiter intelligere oportet causæ speciem, vitium, & causam generantem. Quoad speciem, c. 7. l. 3. aff. c. 6. l. 3. l. aff. causa hæc est vel Vaporosa substantia, vel Qualitas. Quoad vaporosam substantiam, ea est multiplex, vt minera est multiplex: est enim chylus morbosus, è lacte productus in pueris: item est succus pituitosus, biliosus, melancholicus, sanguineus, vt esse possit & sanguis non menstruus & menstruus: est etiam semen: vermis quoque defunctus: nam viuens morsu, non autem vapore in causa est. Quoad qualitatem: hæc species duplex est, nimirum spiritalis, vt dolorifica: Materialis, vt venefica. Vitium & vaporis & qualitatis sequitur. Vitium vaporis pertinet ad substantiam, quantitatem, qualitatem, & motum: non dico vbi, sed motum. Auicennas proponit malitiam substantiæ, id est, vitium in substantia, cuiusmodi est vapor putridus, prodiens è succis putrescentibus, id est, chylo vel lacte putrescente, è verme mortuo: proponit etiam vaporem lædentem quantitate & copia, verbi gratia, dum vapor prodit à pituita non admodum frigida, sed à subdulci: tertio proponit qualitatem euidentem, dum ait in epilepsia vapores agere congelatione, frigiditate: quarto proponit vitium secundum qualitatem reconditâ, inquiens, vaporem magis agere venenositate, verbi gratia, qualitate euidente agit vapor frigidior, prodiens à pituita acida: & vapor calidior, procedens à bile acriore: venefica qualitate agit vapor procedens ab excremento venefico: proponit denique vitium secundum motum, inquiens, epilepsiam fieri à vapore, qui in caput mouetur. Et cum in hoc vitioso motu immobile pateat, sat erit digredi circa terminum à quo, spatium per quod, & terminum ad quem. Terminus à quo, secundum Auic. est Totum, & Pars. Totum Galenus non ignorat, licet non proponat, cap. 7. l. 3. l. aff. Ait enim, Galenus, com. 27. l. 4. de ratione vict. fieri epilepsiam, dum spiritus non potest pertransire meatus, ob sanguinem venas supra modum opplentem: & dum hoc contingit: (vt addit Auic.) vapor

1. Species,
Substantia
vaporosa,
& Quali-
tas.

2. Vitium
primum
vaporis.

vapor quandoque attinet ad digitos pedis, quandoque ad digitos manus: cum enim sanguis venas ita replet, vt spiritus penetrare non permittat, fit vt veluti in mortuo corpore concreascit sanguis, & cum Auicen. à sanguine abscindatur calor natiuus: vt ita corrumpatur sanguis, vt prodeat vapor vel qualitas venefica: cuius vis dum perducitur in cerebri ventriculos, fiat epilepsia. Hæc igitur epilepsia fit à vapore sanguineo, prodeunte à toto corpore, à venis totius: vt propterea sit epilepsia etiam per consensum à toto. Quoad epilepsiam, quæ fit per consensum à parte: hæc pars est Externa, vel Interna. Si externa, necessario est pars nervosa, vt iure attineat ad omnes artus supernos & infernos. Si interna, secundum Auicen. est stomachus, mesenterium, splen, testes, vterus. Quoad spatium per quod: Auicen. proponit vasa, id est, venas & arterias: proponit spatia insensibilia, proponit nervos. Sed sciendum, moueri vaporem per nervorum circumferentiã. Terminus ad quem, est cerebrum: præsertim quia suscipit, ob imbecillitatẽ, vel Proportionis, vel Constitutionis. Proportio est cõtracta à parentib. vel in conceptione, vel informatione. Constitutio autẽ est intemperies cerebri frigida, vel humida, itẽmque raritas. Verũ vt raritas est effectus vitiosæ formatricis: ita intemperies potest esse quandoque natiua, quandoque ascititia. Quoad vitium qualitatis: ad substantiam & quantitatem non attinet, quia sermo est de qualitate: eius ergo vitium pertinet solũ ad qualitatem, & ad motum, sed metaphoricum: (id est, quia corpus proprie mouetur, non qualitas:) ideoque Auicennas respiciens ad hunc motum, inquit, ad cerebrum eleuari qualitatem puram, sine substantia. Quod si igitur qualitas est spiritalis, vitium est, quia hæc qualitas est dolorifica: si materialis, quia venefica. Quoad dolorificam qualitatem: hæc lædit os superius ventriculi: ratio est, è c. 6. l. 3. loc. aff. nam ventriculi os supernum ob *iuuandm* in consensum ducit cerebrum. Vnde Grammaticus ille, cogitans, vel in ediam sustinẽs, &c. epilepsia corripiebatur. Causa horum est: quia ob immodicam cogitationem, & itam, compatitur ventriculus: & per in ediam proprie afficitur ventriculus: vt in ventriculi affectione quomodocunque afficiatur, succi prauis, excrementis & acris: (si quando hos in corpore abundare contingat:) petant os ventriculi; & soluant continuũ, vt cerebrum in consensum ducatur. Quoad qualitatem materialem, hæc est

venefica:

Vitium qualitatis.

venefica:quemadmodum tradit Galen.c.7.l.3.loc.aff. Neque obstat,quamuis adolescens ille sensu frigiditatis persentiret: nam frigiditas erat affectus à veneno procedens. Quoad vitium secundum motum metaphoricum:sufficiat perpendere terminum à quo,& spiritum.Terminus à quo,primum qualitatis dolorificæ, est os ventriculi superius, ob sensum exquisitum:qualitas enim dolorifica aliarum partium, non est æque potens ad efficiendum epilepsiam. Qualitatis autem veneficæ terminus à quo, c.7.l.3.loc.aff.est pars nervosa: ad differentiam vaporis venefici, qui potest etiam prodire à parte non nervosa. Qualitatis igitur veneficæ terminus à quo, est pars nervosa,& præsertim externa; vnde,cum Galeno,in adolescente è tibia oriebatur:sed attinere etiam potest ad omnes artus. Spatium per quod, & qualitatis spiritalis,& veneficæ,est idem: nimirum nervus,per quem fit ascensus,& motus ille metaphoricus:vt cum Galeno alteratis per continuitatem partibus,qualitas sine substantia cerebro impertiatur. At solum nervi per continuitatem alterantur: vt propterea terminus à quo sit pars nervosa:spatiū sit nervus.

Causa autem quæ generat vaporem: cum fiat, quoniam facultas non potest mineram regere:propterea oportet intel- 3. Causa generans.
ligere, quis sit mineræ auctor. Minera autem cum sit vel Non venefica, vel Venefica: quoad non veneficam, patet quis huius sit auctor,ex alibi propositis.Verbi gratia, pituita generatur vel à ventriculo frigidiori,vel è cibis pituitosis,& sic de reliquis. Verum, si minera sit venefica, cum Galeno,cap.vlt.lib.2. de diff. feb. & lib.6. loc.aff. circa finem, non generatur à facultate partis:verbi gratia, semen veneficum non generatur à facultate testium: quo fit,vt venena quandoque sola vacuatione superentur, citra alterationem partium. Quare minera euadit venefica, quoniam vel suapte natura est praua, vel quia ob longam detentionem prauitatem consequitur. Quia enim hæc minera praua est excrementitia, parti non amica, expultrici non cedit, & derelicta est ab alteratrice, vt in alimentum mutari nequeat:non potest in eodem consistere, sed semper deterior redditur, præsertim cum sui præsentia reddat calidum insitum imbecillum. Etenim si venenum sit calidum:minuit substantiam calidi innati, & complexionem reddit igneam,estque in causa vt calidum moueatur, & feratur ad circumferentiam.Si autem materia praua sit frigida:efficit intemperamentum frigidum,

gidum, & motum calidi innati ad circumferentiam quasi aufert. Cum ergo calidum innatum ob præsentiam materiæ prauioris, patiatur secundum quantitatem, qualitatem & motum: fit ut venenum, quo diutius detinetur, eo peius euadat, eoque copiosius: humores enim vitiosi, sua alteratione vicinos inficiunt, & in suam naturam mutant: quod si verum est de succis vitiosis, multo magis de veneno, utpote succo viriosissimo, cap. 99. art. med. Videre hoc est in veneno canino: nam ubi homines sunt demorſi à cane rabido, primis diebus & mensib. ab omni labe immunes esse videntur: sed postea, cum venenum caninum seipsum multiplicat, symptomata illa erumpunt. Sequitur causa generans Qualitatem dolorificam, vel veneficam. Doloris causa est, quæ in orificio ventriculi unitatem soluit. Veneficæ qualitatis causa Interna, vel Externa est. Interna, modo est proposita. Externa est: veluti dum animal veneficum pūgit, ut Scorpio. Hæc de causis epilepsiæ per consensum: circa quas notandū, in epilepsiâ per consensum, ventriculos cerebri non obstrui, nisi vapor peccet copia: non autem obstrui, si sola peccet qualitate; ideoque falsum esse, omnem epilepsiâ fieri ab obstructione. Hæc de causis principalibus.

Causa externa epilepsiæ.

Causæ non principales, secundum Auicennam, sunt causæ Externæ, quæ plerunque adiuuant principales: & sumuntur à rebus non naturalibus, vel necessario vel non necessario occurrentibus. Necesſario occurrit aer: de quo loquens Hippocrates in l. de morb. sacro dicit, aerem & in pueris, & in senibus, esse posse in causa epilepsiæ: in pueris quidem, ut vi aeris pituita fluit in ventriculos cerebri, cum caput vel caleſcit, vel refrigeratur: aer enim calidus pituitam liquat: frigidus autem exprimit causam principalem in cerebri ventriculos. Quoad senes, ait Hippocrates, hyemæ his esse infensissimam, ver aliquo modo: hyems est infestissima: si enim in hyeme caput vi ignis caleſcat primum, dum deinde homo in aere frigido versatur, & post e frigiditate ad teporem accedit, seu ad aerem calidum, tunc pituita, causa principalis epilepsiæ frigiditate exprimitur, calidate liquatur, ut promptissime in cerebri ventriculos fluat. Verno tempore fit epilepsiâ, ubi caput est insolatum, inquit Hippocrates, non ita in æstate: nam in æstate non vigent repentinæ mutationes, ut in vere. Et propterea dicit Hippocrates apho. 10. sect. 3. veræ epilepsiâ fieri. Et apho. 4. sect. 3. ait, quando eadem die aer modo

modo est calidus, modo frigidus, exspectare oportet morbos autumnales: inter morbos autem autumnales narrat epilepsiam, aph. 2. 2. sect. 3. Quoad cibum, hic secundum Auicennam est causa inouens, id est, non principalis, quatenus est immodicus: præsertim si fiet ex apio, quod à proprietate impellit materiam ad ventriculos cerebri. Huius classis est hirci hepar comestum. Adhæc immoderata potio vini: vnde Galenus cap. 2. lib. 3. de temp. ait, epilepsiam fieri è vino. Item, somnus, præsertim post cibum copiosum. Euigilatio repentina. Coitus plurimus. Immoderata repletio. Alui constipatio. Immodicus motus à cibo. Timor, siue è tumultu, siue vocis repentinæ. Quoad causas non necessario occurrentes, Auicennas proponit Corium caprinum, recès excorticatum indutum: adhæc suffumigium è cornu caprino, è myrrha, è marrubio, ex hepate hirci tosto, è lapide Gagate, è bitumine: His enim epilepsiæ causa principalis mouetur, & impellitur in ventriculos cerebri.

Differentiæ si sumantur à forma: cum forma sit functio ablata principalis, cum amissione motus & sensus, & cōuulsione: differentia capitur solum ratione conuulsionis, secundum Magis & Minus: vnde interdum cōuulsio adeo est exigua, vt Auicennas vocet spasmum non sensatum. A subiecto non sumuntur differentiæ: semper enim est idem. Causa efficiens, vel est Principalis, vel Excitans principalem. Causa principalis, est causa epilepsiæ, vel per Essentiam, vel per Consensum. Quoad epilepsiam per essentiam: differentiæ sumuntur à vapore: quare à specie, vitio & causa generante. A specie: Vapor est Pituitosus, Melancholicus, vel Sanguineus: & si sanguineus, vergit vel ad Pituitosum, vel ad Melancholicum. Quoad vitium: quilibet vapor peccat Copia, Frigiditate, Crassitie, & Quiete: quare differentiæ sumuntur secundum Magis & Minus. Quoad causam generantem, cum vapor generetur in capite, à calore imbecillo, è materia: differentiæ sumuntur ab Agente, & à Materia. Ab agente, vt est vel Intemperies cerebri frigida: vel Calidum innatum refrigeratum. A materia, vt est vel Pituita, vel Melancholia, vel Sanguis. Quoad causam epilepsiæ per consensum: causa vel est Vapor, vel Qualitas, Vapor, est specie multiplex, vt minera est multiplex: vnde vapor est vel Chylosus, vel Pituitosus, vel Bilius, vel Melancholicus, vel Sanguineus, vel Seminalis, vel Verminosus. Vaporis vitium, pertinet

Differentia à forma.

Differentia à causa eff.

Epilepsia per essentiam.

Epilepsia per consensum.

Ob vaporem.

pertinet ad Substantiam, Quantitatem, Qualitatem, vel Evidentem, vel Reconditam. Secundum motum autem varpor cum semper peccet, à motu simpliciter accepto non sumuntur differentia: sed sumuntur à termino à quo, à spatio, à termino ad quem. A termino à quo, ut est Totum, vel Pars; & si pars, vel Externa, vel Interna: & si interna, vel Ventriculus, vel Mesenterium, vel Testes, Vterus, &c. Spatium, est Vena, Arteria, aut Nervus. Terminus ad quem, est causa Proportionis, vel Constitutionis: & si causa est constitutionis, est vel Intemperies, vel Raritas. Quoad causam generantem, ut hic vapor prodit è varia minera, varia etiam est causa generans: potissimum tamen causa generans est venenositatis, vel Expers, vel Particeps. Sed qualitas etiam causa est epilepsia per consensum. Quoad speciem igitur, qualitas vel est Dolorifica, vel Venefica. Quoad vitium, differentia est secundum Magis & Minus: nam dolor semper fit à causa dolorifica: qualitas venefica à causa venefica. Ceterum, ratione motus metaphorici: qualitas dolorifica pro termino à quo semper habet os ventriculi: unde non oriuntur differentia: qualitas venefica, pro termino à quo habet partem nervosam externam: & hæc admittit differentias, ut pertinere potest ad artus vel Infernos, vel Supernos. A spatio non sumuntur differentia: nam semper est nervus. Causa generans est vel Soluens continuum, vel Venefica. Postremo, quoad causas non principales hæc causæ sunt externæ, & occurrunt Necessario, vel Non necessario.

*Causa non princip.
Signa imminētis epilepsia.*

Epilepsia imminens cognoscitur, ratione causæ principalis è notha obliuione, è malis somnis & insomniis, è debili motu, quandoque è morsu linguæ, è præcedenti vertigine, è prægresso incubo: hæc enim significant caput lædi. Si coniungatur his, capitis grauitas, faciei pallor, & mutatio complexionis totius: indicia sunt, nō modo imminētis epilepsia, sed etiam per essentiam. Oportet etiam præcognoscere epilepsiam imminentem, vi causæ non principalis: quia dum aggressi sumus curationem epilepsia, oportet scire, an sit absoluta curatio, necne: nisi enim sit absoluta, nos oportet pergere. Cognoscitur autem è præsentia causarum, non necessario occurrentium, Verbi gratia, si fiat suffumigium è bitumine, & patiens non corripitur epilepsia: iudicandum est superatam esse causam principalem: sin minus, oppositum statuendum.

Epilepsia

Epilepsia præsens in genere seipsam patefacit, cadit enim homo in terram & conuellitur. Differentiæ etiam à forma notissimæ sunt. Causa autem efficiens, & primum principalis, utrum sit causa epilepsiæ per essentiam, an per consensum, cognoscitur è symptomatibus, & in paroxysmo, & extra paroxysmum, cap. 7. lib. 3. loc. aff. In paroxysmo, si epilepsia sit per essentiam, cognoscitur è conuulsione vehementi & longa, è spuma copiosa: si per consensum, conuulsio est debilis, ut quandoque fiat sine spasmo sensato, secundum Aui-cennam: præterea, spuma vel exigua, vel nulla. Causa huius discriminis est: nam in epilepsia per essentiam caput repletur & vaporibus & humoribus. Sed cur fiat spuma, in sermone de apoplexia explicabimus. Extra paroxysmum, si epilepsia sit per essentiam, tunc ante paroxysmum fuit capitis grauitas, capitis dolor, assunt signa intemperati cerebri: Si contra, cognoscetis esse epilepsiam per consensum.

In epilepsia essentiam, cum huius causa sit vapor, cognoscitur species vaporis, id est num vapor sit pituitosus, melancholicus, vel sanguineus: è signis indicantibus mineras, de quibus in dolore cap. Quoad vitium, cum differentia sit secundum magis & minus; cognoscetur è vehementia & debilitate symptomatum. Causa generans, est agens, & materia è qua, Agens utrum sit vel calidum innatum cerebri, vel intemperies; cognoscitur hoc modo. Si vitium fuerit in calido innato: minera est genita extra caput: si agens sit intemperies; minera est genita in capite. Ideoque cum epilepsia melancholica & sanguinea, minera generetur extra caput: iudicandum est inter initia vaporem generari ab imbecillo calido innato: & ratio est, quoniam ob præsentiam materiæ morbificæ magis patitur calidum innatum, quam temperies.

Si epilepsia sit pituitosa: an pituita generetur in capite, vel in ventriculo, cognoscetis è propriis capitibus. Quoad materiam è qua: quænam sit hæc materia, patet è signis, traditis in sermon. de dolore capitis. Quoad epilepsiam per consensum, cum huius causa sit vapor, vel qualitas: hæcque dolorifica aut venefica: Si nulla præcessit causa dolorifica, nec signa sint venenit: iudicandum causam esse vaporem. At cum vapor interdum possit esse veneficus, distinguetur à sola qualitate venefica: ut, si malum procedat à parte interna, sit vapor: si à parte externa, potest esse qualitas, &

vapor; ac patiens referet, se sentire vel auram quandam, vel puram frigiditatem. Cæterum, si causa epilepsiæ per consensum sit vapor: oportet cognoscere vaporis speciem, vitium & causam generantem. Species cognoscitur è cognitione mineræ, de qua in propriis capitibus, verbi gratia si procedat à verme, in doctrina de vermibus, &c. Quoad vitium & causam generantem: hæc cognoscuntur è signis, indicantibus vitia & causas generantes mineratum, de quibus in dol. cap. Quoad signa qualitatis in epilepsia per consensum: & primum quoad speciem: si qualitas sit dolorifica, cognoscetis è causis agentibus in os ventriculi, verbi gratia è fame, è morfu ventriculi, à verme, sed non mortuo. Si qualitas sit venefica, signa iam proposita non aderunt. Quoad vitium in qualitate secundum magis & minus, cognoscetis è vehementia & imbecillitate symptomatum. Ratione motus metaphorici: terminum à quo, & spatium, manifestabit patiens. Quoad causam generantem, an generetur in ventriculo, vel in alia parte nervosa, facile etiam audietis ab ægro grante. Quoad signa causæ non principalis, quæ potius est dicenda occasio quam causa, cum sit externa: ab ægro & absentibus declarabitur, siue necessario, siue non necessario occurrat.

Causa non principalis.

Indicationes, in paroxysmo.

Præsidia sumuntur, causa tum Accessionis, tum Totius epilepsiæ. Ratione accessionis, ut sciamus quid agendum sit tempore accessionis, præsidia sumuntur à sensu ablato, à conuulsione, & à causa efficiente principali. A sensu ablato indicatur remedium dolorificum, ut pars nervosa ita afficiatur, ut obiectum dolorificum impetuiatur cerebro, ut cerebrum ad indicandum excitetur. A conuulsione sumitur præsidium, ut cum vi conuulsionis partes sursum trahantur, oriatur indicatio retrahendi deorsum. Quoad causam efficientem, ab hac sumitur indicatio, ut residet in capite, in qualibet epilepsiæ accessione; quandoque autem ut impetum habet in caput, atque secundum hanc rationem fouet materiam residentem in capite. Unde causa materiæ residentis in capite, oritur indicatio vacuandi materiam in capite existentem. Ratione autem causæ habentis impetum in caput, oritur indicatio retrahendi deorsum. Notandum, nos nihil dixisse de ablatione principum facultatum, nec de motu ablato, quæ tamen symptomata locum habent in accessione epilepsiæ: ratio est, quia hæc functiones ablatæ ilico resurgunt.

quantulum detracta causa residente in cerebro: ideoque non
 una ex usu. Iudicium autem tangibilis qualitatis, excitatur
 remedio dolorifico. Quoad indicationes hauriendas extra *Extra pa-*
 roxysmum, non sumuntur à forma: nam forma non est *roxysmū.*
 sensibilis: sed sumuntur à subiecto & efficiente. A subiecto:
 ut cerebri calidum innatum seruetur, & proportio fovea-
 tur. Quoad causam efficientem: & primum in epilepsia per
 sentiam; cum causa sit vapor genitus in capite, à calore
 imbecillo, è materia copiosa, frigida, crassa, viscida, genita
 vel in capite, vel extra caput: Primum ratione copiae mate-
 ria, oportet vacuare, sed præterea calefacere, attenuare, de-
 tergere. Ratione materiae extra caput, oritur indicatio re-
 trahendi. Ratione imbecillitatis caloris, oritur indicatio ca-
 lefaciendi. Ratione membri generantis, oritur indicatio per
 contrarium alterandi, verbi gratia si generetur pituita in
 ventriculo frigidior, oritur indicatio calefaciendi ven-
 triculum. Quoad epilepsiam per consensum: cum huius *Epilepsia*
 causa efficiens sit vapor, vel qualitas: quoad vaporem: ra- *per consen-*
 tione motus, indicat retrahens ad infra: & quoad reliqua *sum.*
 itia vaporis, hæc non indicant: nam dum occurrimus mi-
 nera, vapor sponte delitescit. Vnde, quoad mineram, ut va-
 porem est specie, varia indicat & ea determinata. exempli gra-
 tia si pituita sit copiosa, frigida, viscida: indicat vacuans;
 refrigerans, detergens, sed pituitam: & ita euadit indica-
 tum determinatum. Similiter è varia causa generante mi-
 nera, variae oriuntur indicationes, verbi gratia si bilis ge-
 neretur à iecore calidior, iecur refrigerandum. Quoad
 qualitatem, si sit dolorifica, patet quid dolor indicet è sen-
 tione de dolore capitis. Si qualitas sit venefica, postulat
 bezoarticum. Si qualitas procedat à bestia, postulat be-
 zoarticum theriacale. Si non à bestia, postulat bezoarticum
 exipharmacum.

Malum hoc in genere non est exigui momenti, nam *Prognosti-*
 symptomata sunt vehementia secundum essentiam & di- *ca.*
 versitatem: sed perpendenda est vis differentiarum. Quoad *Differētia*
 differentias à forma: epilepsia periculosior est, si functiones *à forma.*
 ablatae, diutius ablatae manent: præterea, si convulsio est *Differētia*
 vehementior & diuturnior: nam hæc indicant causas effi- *à causa ef-*
 cientis insignem vehementiam. Quoad causas efficientes & *ficiente in*
 primo, quoad epilepsiam per essentiam, cum causa efficiens *epilepsia*
 sit vapor, genitus in cerebro, è minera, existente in capite: *per essētiā.*

*Epilepsia
à pituita.*

perpendenda est vis vaporis, secundum speciem, vitium, & causam generantem. Quoad speciem, vapor est pituitosus, melancholicus vel sanguineus: cæteris paribus, magis est periculosa epilepsia, si causa sit vapor melancholicus, nam dum hic peccat in capite, est maior recessus à naturali statu, maiorque vehementia secundum essentiam. Cæterum, ut vapor secundum speciem differt, ita conuenit secundum vitium, & causam generantem: quo igitur hæc erunt vehementiora, eo periculosior est epilepsia: & si hæc ad summum vehementiæ attollantur, epilepsia est incurabilis. Sed propter iuniores digrediemur circa epilepsiam per essentiam, ut sit à pituita, vel à melancholia. Quoad epilepsiam quæ sit à pituita: ut spuma oris erit copiosior, ita periculosior est epilepsia: indicatur enim pituita admodum copiosa. Periculosa etiam epilepsia est, si mutetur in paralyfin, secundum Auicennam: indicat enim pituitam copiosam. Adhuc peior epilepsia est, si mutetur in apoplexiam: indicatur enim pituita ad summum copiosa. Adhæc inueterata epilepsia, est incurabilis, & producit usque ad mortem, secundum Hippo. in l. de morb. sacro: nam in epilepsia recenti minor est vehementia secundum vitium & materiæ, & causæ generantis: in antiqua, contra; tempus ergo hoc in loco est signum vehementiæ. Insuper cum Hippoc. eodem in loco, putri & decrepiti vix euadunt: nam puerilis ætas indicat copiosam materiam, quæ præsertim copiosa est statuenda, si referatur in vias, quæ in puerulis sunt angustæ. Ætas senilis indicat vehementiam & ratione copix, & ratione frigiditatis, & ratione visciditatis: ideoque denotat insignem essentiæ vehementiam. Vnde ad ætates respiciens Hipp. aphor. 7. sect. 3. ait: quibus epilepsia occurrit ante pubertatem, mutationem accipit: quibus post 25. annum, sepe commoriuntur. Galenus in com. ait, qui ultra pubertatem procedunt magna e parte moriuntur: ut, quo magis ultra procedunt, periculum euadat maius. Hippo. respexit ad pituitam, ut copia peccat: Quod si vitium sit exiguum: mutatione aëris, cibi, & ætatis, liberantur, aphor. 45. sect. 2. propterea quod pituita non est admodum copiosa. Hic ætas concurret in ratione signi. Quod de ætate dictum, idem de febre statuendum. Galenus circa finem lib. 6. epid. ait: quartana laborantes, epilepsia non capiuntur: & si prius capiuntur, quartana superueniente liberantur. His verbis Galenus respicit ad materiam non copiosam: nam vi quartanæ ablu

absumitur, siquidem vi rigoris discutitur, & vi caloris febris attenuatur, & hinc vacuatur. Quoad epilepsiam per essentiam à melancholia, similiter dicendum, verbi gratia pro vario motu mutatur in melancholiam: ut si materia petat cerebrum secundum ventriculos, fit epilepsia, si misceatur cum spiritibus animalibus, fit melancholia. Vnde Galenus cap. 7. lib. 3. de loc. aff. & circa finem lib. 6. epid. ait, epilepticos eundem melancholicos ratione motus materiam. His iam propositis, si addatur vehementia facultatis, epilepsia redditur magis periculosa. Vnde Galenus cap. 19. lib. 4. de caus. puls. ait, si modice natura infestetur, nulla fit in pulsu mutatio: si natura, siue facultas vehementer angatur, fit in pulsu mutatio. Hic pulsus est signum vehementiæ facultatis: non sumitur prognosticum à pulsu, sed à vehementia. Quoad epilepsiam per consensum: huius causa est vapor: vel qualitas. Quoad vaporem, pro varia vehementia vaporis, vario modo prognosticandum: verbi gratia. Si fiat epilepsia à toto, est utilis & salutaris epilepsia, com. 27. li. 4. de ratione victus, nam in epilepsia per conuulsionem corpus incalcescit, unde sanguis digeritur, & in partes non principales expellitur, ut sanguinis vitium adimatur. Præterea epilepsia quandoque non diffi- culter tollitur: ut si fiat à vapore sanguinis menstrui: nam, cum Paulo & Auicenna, si mulier concipiat, dum deponit foetum, materiam, epilepsiæ causam vacuat. Epilepsia etiam interdum difficulter expugnatur: ut si fiat à vermibus: nam quandoque vix hi superari possunt. Epilepsia interdum est incurabilis: ut si fiat à vapore, in cuius motu terminus ad quem sit cerebrum, per proportionem vitiosam, quæ natura est. Si causa sit qualitas dolorifica: est curabilis, modo facile, modo difficulter, cap. 6. lib. 3. loc. aff. Difficultas & facilitas pendent à dispositione superioris ventriculi, ut hæc est vel vehemens, vel remissa. Vnde interdum homines per solum vomitum liberantur. Cæterum animaduertatis, quandoque negotium non esse ita facile: nam Grammaticus, qui libet euaserat beneficio victus & aloës: solum vi inedie quandoque correptus est epilepsia: unde prorsus ille Grammaticus liberari non potuit, propter ventriculi malam dispositionem. Si causa sit qualitas venefica, quandoque vincitur: ratio est, quia generatur in parte externa: ut mirum non sit, puerum à Galeno esse liberatum. c. 7. l. 3. de loc. aff. Si qualitas venefica è morfu bestię procedit: periculum intenditur pro vehementia qua-

*Epilepsia
à melan-
cholia.*

*De epi-
lepsia per
consensum.*

Motus epilepsia velox, vel tardus. litatis. Hæc de prognostico, ratione euentus in epilepsia. Vtrum autem cito vel tarde futurus sit euentus: sumitur a motu morbi, vt est velox, vel tardus. Epilepsia statuitur tardi motus à Galeno, aphor. 7. sect. 5. & cap. 4. lib. 1. de cris. Statuitur autem velocis motus, & proinde vitium acutum, cap. 21. lib. 4. de caus. puls. & ab Auicenna in tractatu de horis febrium. Si enim epilepsia sumitur pro vitio, quod completur e pluribus accessionibus: si accessiones sint raræ, cum debilibus symptomatibus, epilepsia statuitur chronica: contra, acuta, si accessiones sint frequentes & vehementes, vt cum Auicenna & Paulo hæc epilepsia euentum non modo cito habeat, sed statim iugulet nam accessionum raritas, cum imbecillitate symptomatum significat, motum tardum: contra velocem indicant accessiones frequentes, & cum vehementibus symptomatibus.

Curatio in paroxysmo. Cheirurgia.

Quoad materias præiudiciorum, & primum, ratione accessionis, si accessio sit vehemens, & diuturna probatur materia Cheirurgica, & Medicinalis. Quoad cheirurgicam: Aetius cap. 35. lib. 6. e sententia Dilymi, canficabat, seu pungebat magnam digitum pedis, & destillantem sanguinem labijs admovebat. Hæc materia, vt ego arbitror respicit tactum depeditum, & materiam in orbificam, caput perentem: est enim materia dolorifica, ideoque sit attractio ad partem punctam: Quemadmodum etiam fieri potest virtute ferri cadentis, quod infra occipitium apponitur. Admovebat autem labijs sanguinem forte ob contentum, qui est inter labia, & os ventriculi: hinc enim tremor labij solet esse, indicium futuri vomitus; unde cum huius causa afficiatur os ventriculi, vi huius potest etiam facultas cerebri excitari. Paulus præterea partes conuulsas in rectum dirigebat, & fricabat cum vehementia: non ergo est abs re, frictiones moliri cum pannis asperis, manibus inunctis oleo de casto, & permisso etiam sinapi. Quoad medicamenta, Paulus probabat oleum in gulam immittum cum pepna, vt os ventriculi irritaretur. Et applicabat naribus panchædænum, bitumen, picam, castoreum. Vnde probantur etiam magna antidoti, vt applicentur & naribus & palato. At corpus ante accessionem sic vacuandum: si repletum sit, ab his abstinere oportet, & vitendum dysimis acerbis. Si accessio non cedat, cum Paulo, est minima spes salutis. Iam etiam breuiter proponenda, quæ extra accessionem

Medicamenta.
N B.

sint vsurpanda. Galenus cap. vlt. lib. de venæ sectio. aduerius Erasistr. lecat venam in epileptico sanguine repleto: nam & tempus veris erat, nec corpus exercitiis destinatum, nec in ediam sustinuerat: quare erat copiosus sanguis. Vsus pater. Notandum tamen circa quando agendum, dixisse Celsum, in venæ sectione expectandum esse diem, quo æger prolabitur. His enim verbis insinuat secandam esse venam imminente accessione, vt vacuetur sanguis, & fiat reuulsio à capite. Cucurbitulæ & fonticuli patent ex alibi dictis. Notetur tamen cum Galeno cap. 7. lib. 3. loc. aff. & cum Rhafi, si epilepsia causa sit qualitas venefica, cucurbitulas scarificatas & vesicantia etiam esse applicanda parti primo affectæ, è qua procedit aura, vel qualitas.

Quoad medicamenta, & primum in infantibus, cum sit epilepsia potissimum per essentiam: nutrici danda medicamenta, quæ pituitâ euacuent: attenuent & detergant: de quibus in dolore capitis à pituita. Notetur autem cum Alexandro, acria esse vitanda, nam menses mouent, & lac minuunt: & si verbi gratia vti velimus *roremarino, feniculo, &c.* debeamus exhibere viridia, non sicca. Causa autem corporis infantis. Aëtius probat *mel despumatum* ad linguendum: probat odoramenta *è ruta*. Vngit etiam caput infantis *oleo anethino, oleo irino*: & capiti admouet puluerem confectum *è opere, adianto, iride*: præterea caput lauat *aqua calida* & sordes melle detergit. Applicat collo *radicem paonia*, vt stomachum tangat.

Eodem modo in adultis vti oportet Vacuantibus, & Alterantibus. Vacuantia, vacuant Sensibiliter, aut Insensibiliter. Quoad vacuantia sensibiliter, probantur Lenientia, Purgantia totum & caput, de quibus in dolore capitis. Quoad vacuantia insensibiliter, quædam monebimus. Vnde si epilepsia sit per essentiam, & potissimum sit pituitosa: cum Galeno in documento pro puero epileptico, probatur *medicamentum è scilla*: quare probatur *oxymel scilliticum, mel scilliticum, saccharum scilliticum*. Oxymel tamen scilliticum, efficacius est melle scillitico: at cum Galeno est noxium nervis: quare tutius est melle scillitico: & si hoc medicamentum conficiatur cum saccharo, minus etiam calefaciet. Quoad vsum medicamenti è scilla: dosis est à ʒ ij. vsque ad ʒ j. Quomodo: dabitur acti calidum hoc medicamentum. Tempus per 40. dies: nam materia morbifica per tot dies solet esse præsens.

Curatio, extra paroxysmū. Vena sectio.

Medicamenta, si infans laboret.

Curatio a-dultorum.

Vacuantia insensibiliter, in epilepsia per essentiam,

Aduertendum autem tempus esse opportunum, nisi prohibeat vel materia in toto existens, vel cibus ventriculum replens. Rhasis cum melle scilicito addit species, paratas à pyrethro, à stochade, ex agarico, & alius, &c. quorum plurima proponuntur à Paulo, & Aetio, quæ vim habent calefaciendi, attenuandi, & hinc insensibiliter euacuandi. Addit Alexander byssopi decoctum, & testatur huius solius beneficio se plerosque sanasse: sed præterea dat hoc decoctum modo fincerum, modo cum oxymelite. Quoad insensibiliter vacuantia in epilepsia per consensum: circa hæc primò notandum cum Rhasi, probari vacuantia per modum repercussionis: nam probat oxyrhodinum, non in epilepsia quacunque, sed in epilepsia per consensum à vapore calido: ut nullo pacto probetur in epilepsia per essentiam. Secundo notandum, Galeni auctoritate cap. 7. lib. 3. loc. aff. in epilepsia per consensum à parte externa probari medicamenta è thapsia, & sinapi: quæ sunt applicanda parti primo affectæ. Ceterum, ut in hac epilepsia fiat etiam retractio per modum interceptionis: expedit inter partem affectam, & caput, loco videlicet qui superior est parte affecta, imponere medicamentum, confectum in sanguine drac. bolo Armen. hypocistide gallico immat. malicorio, &c.

In epilepsia per consensum.

Alterantia.

Quoad alterantia, probantur quæ fuere ptoposita in del. cap. Satis sit quædam peculiaria notare. Probat ergo caninum humanum puluerisatum: maxime etiam iuuat oleum de stillatum ex hoc cranio. Alexander probat cranii asini, & pueri dat 3 iij. sabina cum aqua: ut hoc medicamentum sit vehiculum cranij. Galenus lib. 6. simpl. probat pæoniam. Alexander ca. 13. lib. 1. plura habet. Probant aliqui ungulam magnæ bestię, ad es. alciis, & portant in annulis. Optimum medicamentum, cuius beneficio cerebri proportio maxime foueri potest, hoc esse puto: R. pulueris radicis pæonia maris, sem. nigrorum pæonia, pyrethri, byssopi, ruta sylvestris, polij montani ana ʒ i. succi ruta, sampsuchis, ana ʒ ʒ. cranij humani puluerisati, & asinini cremati, ana ʒ ij. olei destillati è fecibus canis ʒ i. ʒ. radicis eryngij melle condita ʒ i. iheriaca antiqua, mithridatij antiqui, ana ʒ ʒ. conserv. bery. vortismar. ana ʒ y. cum oxymelle, vel melle, vel saccharo scilicito, fiat electarium: cuius dosis sis ana ʒ i. usque ad ʒ ʒ. & exhibeat post totius & capitis euacuationem, ieiuno ventriculo, per 30. aut 60. dies.

Dietæ.
Cibus.

Victus ratio patere debet, è traditis in d. cap. in epilepsia ergo per essentia probatur victus astringens: è principio i. de victu

visu atten. At pueris concedendi quandoq; fructus, ne clam copiose comedant: vt docet Galenus in docum. pro puero epileptico. Alexander *apium* vt noxium improbat: est autem nostrum petroselinum. Notandum præterea cum Auicen. vt in epilepsia cæna sit parcior prandio: nam est capitis vitium. Galenus in consilio pro puero epileptico iubet oppositum. Ideoque sciendum, eo tempore exstitisse consuetudinem, vt homines cubitum non irerent, nisi post multas à cæna horas: insuper respicit Gal. ad pueros, qui interditi dormiunt. Notandum præterea in epilepsia per essentiam, esse expectandâ horam prandij, non autem in epilepsia per consensum ab ore ventriculi: in fin. l. 6. de tuen. sanit. c. 9. l. de venæ sect. aduers. Erasist. c. 6. l. 3. lo. aff. nam non expectata hora prandij, ilico post cibum semiconcoctum exhibendus est cibus: vt ex epli gratia cibus sit exhibendus quarta hora diei, quamuis hora prandij sit hora sexta. Potus sit compar. Gal. in doc. pro pue. epil. exhibet *oxymel aqua dilutum*: hyeme calidum, æstate frigidum: nam respicit ad epilepsiam per essentiam. Quare potus erit attenuans: hyeme actu calidus, nam hyeme calidum innatum non dissipatur, non mouetur ad circumferentiam, sicut in æstate. Quoad vinum in epilepsia per essentiam, Alexan. & Auic. non probant vinum, nam caput replet, præcipue si sit antiquum. Verum cum hoc vitium sit diuturnû, & affligat vltra puerilem ætatem, potest etiam vinum concedi, sed pauciferum, substringens, medicatum, non antiquum, & moderata copia sumptum. Nam cum Auicenna & reliquis, tale vinum roborat, animam dilatat, spiritus fouet; & excusat à copiosa aqua, quæ refrigerando nocet; excusat ab aqua cinnamomi, quæ in caput euaporat: excusat à mulla, quæ in iuuenibus bilefcit. Ad hæc vinum vt medicatû, materias morbificas minuit, dum paratur *guaiaco, hyssopo, &c.* de quibus in dol. cap. à materia frigida. Nec nocet hoc vinum: nam accipitur in parua copia, vt propterea non petat caput. Quoad epilepsiam per cōsensum, probatur vinum, nisi causa sit calidior: vnde Gale. ca. 6. lib. 3. loc. aff. in epilepsia per consensum ab ore ventriculi, dicit: si patiens sit sitibundus, panē esse exhibendum, cum vino diluto, albo, substringente: nam ventriculum roborat, & caput non petit. Probat autem in sitibundo: nam sitis est affectio dolorifica, cui occurrendum. Quoad inanitionem: probatur vt excrementa non colligantur, in corpore. Vnde, cum per *balneum aquæ dulcis*: fiat inani-

*Quidem
apis palud
sri hoc erit
humidum, non
horum.*

Potus.

Vinum.

*Balneum;
num in epi
lepsia locū
habet.*

tio excrementorum tertix coctionis, cum Auicenna non est malum balneum: & Auicennas loquitur de epilepsia per essentiam, à pituita: si ergo probatur balneum in epilepsia pituitosa, multo magis probatur in melancholica. Sed notandum ex Auicenna cap. 10. noxiū esse, diu morari in balneo, & ante concoctionem cibi: vnde cap. 11. idem Auicenna probat balneum, post solutionem ventris, & euacuationem materierum cum citra hepar, tum vltra hepar: & vbi patiens quieuerit aliquot dies à medicamentis. Nam balneum ita administratum vacuat excrementa tertix coctionis: nec periculum est vel obstructionis, vel repletionis capitis, quæ nocumenta imminēt, si homo diutius moretur in balneo: & vsurpetur balneum, ventriculo & toto repletis. Vnde Galenus cap. vlt. lib. de venæ sectio. aduers. Erasistr. in epilepsia improbat balneum, quoniam loquitur de epilepsia corpore existente repleto: in quo corpore opus est venæ sectione, alias enim balneum non potest hoc corpus euacuare, quæ admodum oportet.

CAPVT XVI.

*De Apoplexia.**Nomen.*

PILEPSIÆ affinis est apoplexia aphor. 49. sect. 2. & cap. 2. lib. 4. de loc. aff. Per apoplexiam autem intelligimus illud malum, in quo patiens prorsus omnibus functionibus animalibus priuatur, vt etiam respiratio vehementer lædatur. Generatur hoc malum, dum causa morbifica occurrens capiti, angustat ferme è toto cerebrum, & secundum ventriculos, & secundum poros: vt cerebrum spiritus, insitus, & spiritus animalis, adeo destituantur motu ad circumferentiam, vt quilibet spiritus ad centrum ita impellatur, vt functio omnis animalis, saltem quo ad sensum, aboleatur. Apoplexia ergo est functio ablata animalis cerebri, & totius corporis, dependens à facultate impedita secundum totum cerebrum. Colligitur hæc definitio e Galeno, aphorif. 42. sect. 2. aphorif. 45. sectio. eiusdem aphorif. vlt. sectio. 3. aphorif. 56. sectio. 6. & potissimum cap. 7. & 10. lib. 3. de loc. affect. & cap. 2. lib. 4. de loc. aff.

*Generatio.**Definitio.**Forma.*

Forma apoplexiæ, est functio ablata animalis. Vnde apoplexia formatur, est symptomata, in functione ablata animalis, & priuatur.

& principali, & non principali. Vnde Galenus c. 3. l. de diff. sym. respiciens ad facultates principales, ait, in apoplexia re-
 trectricis facultatis functiones aboleri. Et apho. 42. sect. 2. dicit,
 in apoplexia respirationem repente lædi, & repente sensum
 motumque auferri. Respiratio ad sensum quandoque defi-
 cere videtur: & inter motus voluntarios, sola respiratio ser-
 uatur, propter maximam eius necessitatem, ob quam natu-
 ra, facultatem animale, seu radios spiritus animalis, in apo-
 plexia impertitur musculis respirationis. Cerebrum & to-
 tum corpus sunt subiectum apoplexiæ. Dum igitur propo-
 nitur cerebrum: facile colligere licet, ablatam esse functio-
 nem naturalem principalem: dum proponitur totū corpus:
 facile colligitur, functionem animale ablatam pertinere
 ad sensum & motum voluntarium: vnde Galenus ait, in apo-
 plexia totum corpus repente sensu & motu priuari, aph. 42.
 sect. 2. & cap. 3. de diff. sym.

Subiectum

Causa, est facultas impedita, secundum totum cerebrum.
 In apoplexia enim læditur functio animalis, non ob erro-
 rem externum, sed ob morbum, qui facultatem non labe-
 factat, sed impedit. Est autem morbus in mala compositione:
 vnde Auicenna dicit, apoplexiam fieri propter oppilatio-
 nem: & Galenus inquit, apoplexiam subito fieri, & subito
 desinere, c. 7. l. 1. loc. aff. c. ult. l. de caus. symp. id quod evenit
 ob malam compositionem. Et aph. 42. sect. 2. apoplexiam fie-
 ri, quoniam prohibetur transitus virtutis animalis. Quo sen-
 su aph. 45. sect. 2. addit, apoplexiā fieri ob omnimodam caren-
 tiam potentie motuæ. Angustia autē est integra: vnde in-
 quit, apoplexiam fieri à succis, qui ventriculos cerebri abun-
 de, id est, è toto implent. c. 7. l. 3. loc. aff. Notandum tamen,
 in quadam apoplexia angustiam esse integram: in quadā non
 integrā, in qua scilicet seruatur respiratio. Diximus autem
 facultatem impediari secundum totum cerebrū, id est, secun-
 dum partem anteriorem & posteriorem: præterea secundum
 ventriculos, & secundum poros: ad differentiam cari, in quo
 angustia est solum secundum ventriculos. Hinc Galenus c.
 2. l. 4. aff. dixit, in apoplexia & epilepsia lædi cerebrum, &
 secundum ventriculos, & secundum corpus, hoc est, secun-
 dum poros: differentiam autem esse, quoniam in epilepsia
 cerebrum magis afficitur secundum ventriculos, minus se-
 cundum corpus: in apoplexia, contra. His verbis significat:
 in apoplexia lædi cerebrum magis, & secundum ventres,

Causa efficiens est angustia: non dyscrasia.

Angustia est integra vel non.

*Angustia
causa ex-
terna.*

*Causa in-
terna,
Qualitas
spiritualis.*

*Qualitas
materialis.*

*Materia
causans an-
gustiam.
Materia
particeps
inflam-
mationis.*

& secundum corpus, id est, omnibus modis, quam in epilepsia: ita tamen, vt si in apoplexia conferamus nocumentum, & ventriculorum & pororum, maius sit nocumentum secundum poros, id est, secundum corpus, vt docetur c. 3. l. 3. l. aff. Cum igitur cerebrum laedatur secundum poros, non secundum substantiam: morbus sane non est intemperies, sed mala compositio in ventriculis & poris cerebri: quæ mala compositio est angustia. Angustia hæc secundum poros est Densitas: secundum ventriculos est Subsidentia, Compressio, & Obstructio. Apoplectica angustia, secundum Auicennam, fit aut propter Clausionem, aut propter Repletionem, id est, fit à causa Externa, vel Interna. Causa externa est ictus, percussio: vt si ventriculi cerebri ob ictum comprimantur, fit angustia, quæ dicitur compressio. Si autem ob angustiam, ob compressionem, seu ob ictum, dolor impertitur cerebro: angustia illa non est compressio, sed subsidentia. Causa interna, est qualitas vel materia. Si apoplexia fiat à qualitate, fit propter clausionem, ratione sc. qualitatis: si fiat à materia: fit propter repletionem. Qualitas est Spiritualis, & Materialis. Spiritualis, est qualitas dolorifica: vnde fit apoplexia propter clausionem, dum ad cerebrum peruenit, quod dolorem facit: & hæc angustia est subsidentia. Et, cum qualitas dolorifica quandoque vigeat extra caput: Auicenn. cap. 13. dixit, apoplexiam procreari à cōtinuitate alicuius in ebri: vnde datur apoplexia per consensum. Potest etiam qualitas dolorifica interdum primo attingere ad caput, vt in apoplexia ex ictu: si enim ictu comprimantur ventriculi, est compressio: sed si propter ictum fiat dolor, est subsidentia. Qualitas materialis est frigiditas fortis: qualis esse solet venetica, à qua fit angustia, quæ est subsidentia: & oritur, dum stipantur vix cerebri, à vehemente frigidityte. Notandum quod Auicennas dicit, apoplexiam raro fieri à caliditate: raro enim accidit, vt à calida materia fiat apoplexia, quia sæpe numero fit à pituita. Quo loco auctor, per caliditatem, non intelligit simplicem caliditatem, sed calidam materiam, id est, sanguinem. Sequitur de materia, quæ angustia causa est: vnde fit apoplexia propter repletionem. Materia ergo hæc, vel est facultatis inflammatoria Particeps, vel Expers. Si particeps: est materia vel Admodum calida, vt in phrenitide: vel Remissa calida, vt in lethargo. Et hæc est angustia, quæ dicitur compressio: quia materia phrenitidis vel lethargi, comprimit

ventri

ventriculos & poros cerebri. Si materia sit expers facultatis inflammatoriae: humor est vel Calidus, vel Frigidus. Si humor calidus, est sanguis: ad quem respiciens Galen. aph. 42. sect. 2. ait, apoplexiam fieri à dispositione simili inflammationi: nam vt interpretatur Auicennas, hæc apoplexia fit à sanguine, qui non egreditur vasa, id est, venas & arterias: tunc enim fieret inflammatio, nec esset dispositio similis inflammationi. Dum ergo sanguis vasa non egreditur, sed ea vehementer replet: fit affectus similis inflammationi, & fit angustia, quæ est compressio: & ideo necessarium est, vt sanguis sit copiosus. Testatur etiam Galenus c. 7. l. de cur. per venæ sectionem, homines propter redundantem sanguinem apoplexia corripi. Si frigidus humor sit in causa, tunc fit angustia, quæ est obstructio. Hinc Galen. ait, apoplexiam fieri à frigido crasso & lento humore, c. 2. l. 4. loc. aff. c. 3. l. de atra bile. Et addit, aph. 56. sect. 6. fieri etiam propter humorē melancholicum. At apoplexia dubio procul sæpius fit à pituita: ideoque dicit Hippoc. aph. ult. sect. 3. senes apoplexia corripri. vnde & Galen. c. 2. l. 2. de temp. testatur, senes facile corripri morbis frigidis, & perinde apoplexia. Quæ autem sint causas generantes horum humorum, patet aliunde.

Differentiæ primum sumuntur à forma, vt forma attinet ad motum voluntarium, causa respirationis. Respiratio ergo vel ad sensum aufertur, vel Imminuitur: & si imminuitur, vel Magis vel Minus, com. aph. 42. sect. 2. A subiecto non sumuntur differentiæ: nam in omni apoplexia ratione principum functionum, subiectum semper est cerebrum: ratione sensus & motus, totum corpus. Causa effectrix angustiae apoplecticæ, est Qualitas, vel Substantia. Qualitas est vel Dolorifica, vel Frigiditas. Substantia, vel est Particeps inflammationis, vel Expers. Si particeps inflammationis: materia est vel Phrenitica, vel Lethargica. Si expers: humor est vel Calidus, vt sanguis: vel Frigidus, vt pituita, aut melancholia.

Apoplexia imminens indicatur è dolore capitis, è detrium stridore in somno, è motu corporis pigro, ex inflatione vena-
narum colli, è frequenti vertigine, incubo, epilepsia, & præ-
sertim si fuerit senex: nam hæc significant vigere in corpo-
re, & potiss. in capite vehementiam causæ efficiētis, & sum-
mam dispositionem patientis. Præsens apoplexia in genere
facile secundum Rhasin cognoscitur: homo enim quasi dor-
miens iacet, & sine somno stertit, & cum pungitur, non
sentit:

*Sanguis
& phlegma
virescens dicitur
hunc.*

*Pituita &
melancholia.*

*Differentia
à forma.*

*A causa
efficiente.*

*Signa im-
minentis
apoplexia.
Præsentis
apoplexia
signa, in
genere.*

sentit: quatenus enim iacet sine somno, patet motum esse ablatum: dum stertit, manifestum est, læsam esse respirationem: dum pungitur, & non sentit, constat sensum esse ablatum: aboletur etiam princeps functio, nam patiens extra paroxysmum fatetur, se non recordari. Ex his signis cognoscitur apoplexia distincta à syncope, præfocatione, caro. Distinguitur enim à syncope & præfocatione vteri: nam apoplecticus quasi dormiens iacet, & (quemadmodum dormiens:) seruat colorem suum, satis diuersum à colore cadaueris: at in syncope & præfocatione, color faciei, est similis colori cadaueris. Distinguitur à caro: quia primum apoplecticus sine somno stertit: præterea cum pungitur non sentit, at in caro, quamuis homo iaceat vt dormiens, non tamen stertit, maxime in caro leuiori: & si contingat, in caro esse stertorem, non est sine somno, sed cum somno profundo: & in caro si homo pungatur, sentit, quamuis enim non loquatur homo punctus, cognoscimus tamen eum sentire, quia vi punctiois mouetur. Quoad differentias, & primum à forma: respiratio modo magis, modo minus læditur, quod manifestum est, ideoque signis non est opus. Quoad causam effc. Si, verby gratia, qualitas sit dolorifica, cognoscitur è prægressis causis dolorificis, vel in capite, vel infra. Vt hinc etiam pateat apoplexia, quando fit per consensum. Et si causa sit frigiditas: ante accèssionē est sensus frigoris in membrō. Si humor fuerit: si quidem particops sit inflammationis, cognoscitur è febre, è signis vel phrenitidis, vel lethargi præcedentis. Si humor inflammationis sit expers: num sit sanguis, pituita, an melancholia, cognoscitur è signis humorum, de quibus alibi.

Signe diffinitiuum.

Indicatio- nes.

Præsidia primum sumuntur à forma. Sensus ergo ablati, indicat præsidium dolorificum. Quoad causam effc. hæc est qualitas, vel humor: ideoque in accèssione materiæ retrahere oportet, vt dictum est in sermone de epilepsia. Extra autem accèssionem, suppositis indicantibus viralibus: si causa sit qualitas, & quidem dolorifica: pater quid dolor indicet è superioribus capitibus: si qualitas sit frigiditas, oritur indicatio calefaciendi: & si foueatur à veneno, requirit bezoarticum, quod alexipharmacum vocatur. Humor, apoplexiæ causa, si particops est inflammationis: quidnam indicet, patet è propositis è sermone de phrenit. & de lethargo. Si sit expers inflammationis, vt humor, est varius specie, ita indicat præsidium

præsidium determinatum: & pro vitio varios, & pro causa generante varia, etiam præfugia varia haurienda. Verbi gratia, si apoplexia fiat à pituita copiosa, frigida, crassa, viscida, in capite residente, & genita in capite frigido humidoque: oritur indicatio vacuandi, calefaciendi, attenuandi, detergendi pituitam in capite existentem, calefaciendi atque exsiccandi caput, & sic de reliquis.

Apoplexia magna è parte est incurabilis, aphor. 42. sect. 2. Ideoque narratur inter morbos exitiales c. 10. l. 9. meth. quia omnis ferme vehementia adest. Nam insignis est recessus à naturali statu, secundum symptomata, morbum & causas. Secundum symptomata: nam omnis functio animalis est abata, & respiratio insigniter est læsa, licet quandoque seruetur. Est vehementia secundum morbum, quia insignis est angustia. Est vehementia secundum causas: quia vigent cause, quæ insignem angustiam promouent. Dignitatis vehementia est etiam in apoplexia: nam afficitur cerebrum, & secundum ventriculos, & secundum poros. Neque prorsus abest

vehementia facultatis, cum patiens necessario iaceat. At apoplexia quandoque lethalis est, quandoque curabilis, pro vi differentiarum. Quantum igitur ad differentias à forma: æsertim perpendenda est respirationis vehementia: vnde Galenus ait, apoplexiam vt plurimum esse incurabilem, propter respirationis læsionem, aph. 42. sect. 2. nam respiratio vehementer læsa, significatur vehementer lædi cerebrum, c. 7. l. 1. aff. Hinc quatuor constituuntur differentie læsæ respirationis, aph. 42. sect. 2. Aut enim respiratio ordinem seruat & apoplexia est debilis, id est, minus vehemens: aut respiratio est, inæqualis, inordinata, intermittens, & fit apoplexia vehementior: aut respiratio est magna & violenta, vnde apoplexia adhuc fortior: aut denique respiratio ad sensum auertur, & est apoplexia fortissima. Galenus ergo aphorismo 42. sectio. 2. respiciens ad vehemenciam harum differentiarum, statuit apoplexiam debilem, non solui facile, id est, quioribus medicamentis: vnde vt plurimum in paralyfin terminatur, cap. 2. l. 4. l. aff. statuit etiam apoplexiam fortem, læsa in qua respiratio est inordinata, esse incurabilem. Quod ergo apoplexia curari nequit, si inordinata sit respiratio, multo minus curabitur si sit deperdita. Porro apoplexiam in respiratione inordinata, vt plurimum esse incurabilem constat ex aph. 51. sect. 6. vbi sermo fit de apoplexia, in qua est

Pronostica in genere.

Pronostica differentiarum.

1. A læsa respiratione.

Sic respiratio inordinata: vt plurimum incurabilis est apoplexia.

respiratio

respiratio cum stertore, id est, de apoplexia forti. Stertor autem interdum est intensus, interdum remissus: unde significat apoplexiam fortem, sed modo magis, modo minus fortem: Rhasis vocat ægritudinem leuiorem, si homo parū stertit. Stertorem autem esse comitem fortis apoplexiæ, inde facile colligi potest: quoniam stertor fit, musculis gutturis ad expirationem concurrentibus: dum ergo stertor fit, signum est respirationis admodum difficilis, & potissimum signum imbecillitatis musculorum faucium: Nam in stertore sonus ille editur, quoniam spiritus, seu aer, diu in gutture moratur nec expelli potest, citra magnum musculorum conatum, ut in hunc spiritum muscoli agant, dum extrema adest necessitas, quæ viget in apoplexia forti, in qua radij spiritus animalis, vix ad thoracis musculos permeant, Verum, licet stertor pertineat ad fortem apoplexiam: non tamen omnis apoplexia in qua est stertor, est statuenda incurabilis. Apoplectici enim stertentes, intra septem dies moriuntur, nisi febris apprehendat, aphor. 51, sect. 6. Quare, cum Hippocrate, apoplexia fortis, insolubilis quidem est, sed ut plurimum: nam hic mos loquendi fuit Hippocratis, ut in com. apho. 43. sect. 2. notat Galenus. Concludamus igitur apoplexiam fortem, in qua respiratio est inordinata, & cum

Apoplexia cum respiratione ab- lata est incurabilis. stertore, ut plurimum esse incurabilem. Quod si vero in apoplexia respiratio auferatur: insinuare videtur Hippocrates, aph. 52. sect. 2. nunquam homines posse liberari: ratio patet: iam dictis. Dubitatur autem contra: quia foeminae præfocatae non respirant, & tamen reuiuiscunt. Item Auicenna ait: si contingat, ut in apoplexia respiratio auferatur, fieri posse ut homo restituatur. Responsio. Mulier præfocata viuere potest sine respiratione: nam in hoc vitio totum foeminae corpus ita refrigeratur, ut sufficiat sola transpiratio. Quam autem ad Auicennæ dictum: sciendum est, apoplexiam fieri vel à materia, vel à qualitate. Si fiat à materia, & adimatur respiratio, apoplexia semper est incurabilis: quia tunc corpus non est refrigeratum, ut sola transpiratio sufficere queat: & huc respicit Hippocra. At si apoplexia fiat à qualitate, quamuis adimatur respiratio, non tamen necessario est incurabilis: nam pro vitæ conseruatione sufficit transpiratio: minimè, si oriatur à qualitate frigida: tunc enim calidum innatum, secundum Auicennam, non vehementi eger euentatione, & expulsionem: ideoque in tali apoplexia tardanda est

sepultura, non minus 72. horis. Hæc de prognostico differentiarum à forma. Quoad causam efficientem; cum hæc sit qualitas, vel substantia: si fuerit qualitas, verbi gratia, dolorifica, pro vehementia causæ soluentis continuum, intenditur periculum: ut si percutiatur alicui caput, ut in terram cadat, & euomat, subsequaturque apoplexia: hæc magis est periculosa: at si non fiat vomitus, minus est periculosa: quia vomitus est signum vehementiæ causæ morbificæ. Si apoplexia fiat à qualitate frigida, quo frigiditas intensior, & venenositatis particeps, ita apoplexia in suo genere magis erit periculosa: non tamen prorsus est lethalis, quamvis respiratio aboleatur; nisi coniungatur vehementia facultatis, præsertim vitalis: hinc Auicennas ait, in apoplexia è frigiditate, cum respiratione ablata, hominem sanari: sed addit, si pulsus non cadat. Quod si apoplexiæ causa sit materia, si fuerit particeps inflammationis, est prauissima, nam summa est vehementia ratione essentiali: quia in phrenitide & lethargo, materia, quæ causa est apoplexiæ, est putrida, & admodum copiosa, ut comprimat: Et additur in hac apoplexia vehementia facultatis, nam omnis facultas languet, vi præcedentis inflammationis, siue phreniticæ, siue lethargicæ, ut prorsus de salute sit desperandum. Secus autem prædicendum, si materia non sit particeps inflammationis. Vnde, si causa fuerit sanguis, est curabilis: nam sanguis sola copia peccat, & in vasis detinetur. A materia melancholica raro fit apoplexia, sed si fiat, est admodum periculosa: quia in hac materia maximus est recessus à naturali statu, præsertim cum in cerebro ita copiosa resideat, ut efficiat apoplexiam. Si pituita fuerit in causa: prout vitium pituitæ magis est vehemens: pro eo etiam apoplexia vehementior: ideoque apoplexia pituitosa est periculosior, quo pituita est magis copiosa, magis frigida, crassa, viscida. Quoniam autem apoplexia pituitosa frequentius contingit: circa eius prægnoscendum necesse est, ut cognoscamus vitia pituitæ, eorumque victoriam vehementiam. Non ergo abs re erit, proponere signa, desumpta à febre, ab oris spuma, à temperatura corporis, & ab ætate. Quoad febrem, dicit Hippocrates, aphor. 1. sect. 6. apoplecticos stertentes intra septem dies mori, nisi febris apprehenderit: nam febris vim habet calefaciendi, extenuandi, & dissipandi materiam pituitosam, dummodo pituita non sit admodum copiosa. Hæc ergo febris est indicium pituitæ,

2. A causa effice.

A qualitate.

A materia, quæ particeps est inflammationis.

A sanguine.

A melancholia.

A pituita, & humore viscido.

Vitia pituita ut cognoscantur.

A febre.

non admodum vehementis: Vnde, si non vincatur pituita febre, signum est summæ vehementiæ, & perinde futuræ mortis. *Spuma oris*, est signum pituitæ vehementissimæ; vnde Rhasis dicit, si spuma in ore apparuerit, non esse mendendum. Vt autem pateat ratio huius dicti, oportet intelligere differentiam inter spumam apoplectici, & epileptici. Sciendum igitur, cum Galeno, apho. 42. & 43. sect. 2. spumam generari è materia humida & spiritali: agens autem esse, vel motum, vel calorem, vel vtrumque. Vnde, quoad spumam epileptici: huius materia humida est salua oris: materia spiritalis est vapor, qui è pulmone effertur; agens autem motus vehemens. In apoplexia autem spumæ materia humida, est propria pulmonis humiditas, non salua: materia spiritalis est fuligo à corde prodiens: causa efficiens, est cordis caliditas, & motus violentus spiritus, & vehementissimus pulmonis conatus, vt pulmones veluti comprimantur. Quare in apoplexia, dum spuma generatur, comprimuntur pulmones, vt calor cordis priuetur euentatione, & fuliginum expulsiōe, & hinc sequatur mors. Verum, cum spuma fiat quoniam summa cum violentia pituita lædit cerebrū: ideo spuma est signum summæ vehementiæ pituitæ. Quoad temperaturam: Auicennas ait, apoplexiam in corpore calido & sicco esse prauam: in tali enim corpore non generatur pituita, nisi à causa vehemēti: quare crasis calida & sicca: est signum vehementiæ pituitæ. Quoad ætatem: cum Paulo, apoplexia in iuuenibus est periculosior, & præsertim ætatem ætas iuuenilis & ætas, ad similitudinem craseos calidæ & siccæ, sunt signa vehementiæ pituitæ. Hæc de prognostico, quantum attinet ad futurum euentum simpliciter. Num autem euentus citò vel tarde sit expectandus: dicendum, cum cito esse expectandum. Et ob id Rhasis, respiciens ad apoplexiam pituitosam, ait, eum vel cito interficere, vel degenerare in paralyfin: nam apoplexia, cum Galeno aphor. 42. sect. 2 est vitium acutissimum, & velocis motus: ratio est, quia partes principes non possunt perferre passiones fortes, & simul diuturnas.

Curatio in paroxysmo. Quoad materias, & primum ratione accessiōis. Venæsectio probatur in apoplexia sanguinea, & in pituitosa quoque secundum Auicennam, si absint signa sanguinis: ibi enī sanguis habet rationem causæ principalis: hic, sine qua non.

2. heicurgia. Sic in apoplexia à qualitate dolorifica, vi percussiois & doloris

Vena sectio.

Loris fuit sanguis, ideoque peccat, & habet rationem causæ adiuuantis: vnde & in hac apoplexia vena est secanda. Nec virtus in apoplexia prohibet venæ sectionem, quia non resoluitur virtus, secundum spiritus, sed opprimitur saltem: & virtus secundum solida atque carnes non deficit. Quare in apoplexia secanda vena, si sanguis peccet: vbi notandum, vt, prout sanguis peccans erit, magis vel minus copiosus: ita etiam magis vel minus euacuetur. Et quoniam sanguis potius excedit in apoplexia sanguinea, secundum Auicenn. multum sanguinis vacuare oportet: secus in pituitosa, in qua sanguis non habet rationem causæ principalis. Quoad *usum*: *Quantum*. Rhasis ter & quater secat venam: neque obstat, quamuis sanguis sit summæ actiuitatis, vt propterea potius vnica vice & confertim euacuandus esse videatur: nam cum Aetio per iteratam venæ sectionem mouetur materia; nec virtus ita dissoluitur: addimus nos, iterata venæ sectione, etiā confertim sanguinem euacuari, nam exiguum est spatium inter vnā & alteram detractionem. Modus ex alibi dictis patet. *Quando*. Rhasis venam secat ilico: Auicennas eam aperit hora accessionsis: & iubet etiam in apoplexia pituitosa esse secandam venam ante acres clysteres: quia sanguis tempore accessionsis vincit alia indicantia, vt, nisi subito vacuetur, homo moriatur: nec virtus prohibet, nam in accessione potius suffocatur. Sed quæ vena prius, quæ posterius tundenda? Rhasis primo secat venas medias, secundo remotas à capite, tertio proximas: respicit enim ad apoplexiam, in qua sanguis abundat & in toto, & in capite: propter sanguinem igitur, qui simul replet totum & caput, primum secanda vena media, id est, cephalica, quia ille sanguis vincit alia indicantia: nisi enim subito minuatur sanguis in capite existēs, homo moritur: nisi etiam subito minuatur sanguis in toto existens, hic per capitis venam apertam in caput trahetur, vt homo similiter moriatur. Secundo loco, secantur venæ remotæ: nam magis potest sanguis in toto peccans, quam in capite: peccans enim in toto, habet impetū in caput, qui impetus augeretur, si primum vena capitis secaretur. Quare vltimo loco vena proxima secanda, siue sit vena narium, siue frontis, siue colli. Tēpore igitur accessionsis, spatio 12. horarum, tres venæ aperientur. Quoad *vbi*: Auicenn. secat venas colli, cephalicā, pedum & nariū: quia respicit ad varias subsistentias. Præterea Auicenn. inter materias cheirurgicas, addit

Ferru candens.

ferrum candens: quod prodest vt materia dolorifica, sensum ablatum reuocans: Confert etiam, vt materia quæ attrahit, ratione doloris & caloris. At hoc ferrum candens probatur in apoplexia pituitosa, non in sanguinea: & admoventi potest futura coronali, & infra occipitium. Rhasis probat & tartarinem ferream calefactam, multoties prope caput oppositam, vt capilli vrantur. Adhæc probatur cucurbitula magna cum insigni flamma: & citra scarificationem, & cum scarificatione. Probantur ligaturæ & frictiones dolorificæ: quæ administrentur manibus inunctis castorio, euphorbio, sinapi, aqua etiam ardente.

Cucurbitula.

Ligatura frictions.

2. Pharmacia.

Apoplexia sanguinea.

Reuulsio.

Si apoplexia prodeat à qualitate, siue fiat è percussione, siue alio modo: Auicennas nos remittit ad propria capita.

Si apoplexia fuerit sanguinea, sed citra inflammationem (nam si adest inflammatio, confugiendum ad sermonem de phrenit. & lethargo) probantur medicamenta retrahentia, per modum Reuulsionis & Repercussionis. Reuulsionis gratia, probantur clysmi acres; quoniam & in sanguinea apoplexia viget pituita: præsertim cum vi clysterum etiam sanguis retrahatur. Quoad usum: probantur hi clysteres post venam sectam: nam magis potest sanguis. Sed obiciat quis in apoplexiæ accessione sensus tactus est ablatu: Ergo clysmi acres non possunt expultricem irritare. Respondeo: probari clysmos tempore accessionis: nam attrahunt ad intestina, & ratione caloris, quia sunt calidi: & ratione similitudinis, quia verbi gratia componuntur è colocynthide, quæ similitudine pituitam attrahit, & ne detur vacuum. Vnde, vt facultas alteratrix in intestinis operetur, clysmi diu sunt detinendi: & ob id iubeat Rhasis, repetendos esse clysteres.

Qua ratio ne clysmi acubus usi queantur in apoplexia.

Quoad expulsionem: hæc fit ab expultrice, adiuta à motrice. Expultrici auxiliantur nerui, per sensum tactus, causa commodioris vitæ, cap. 9. lib. 5. vs. part. Caterum, cum expultrix sit necessaria causa vitæ, ideo assiduo agit, dum supernacaneum quiddam est præsens, & agit etiam citra sensum tactus: ideo ipsum quoque cerebrum, expers sensus, expellit. Quare, vt simpliciter expultrix exciteretur, sufficit præsentia supernacanei: quemadmodum etiam plantæ supernacaneæ expellunt citra sensum tactus: at causa vitæ commodioris, necessarium est, vt sit sensus tactus. Motrix quoque facultas ad expulsionem concurrat: ideoque, cum motus voluntarius sit ablatu, iubet Actius, abdominis musculos esse fricandos,

& com

& comprimendos. Sic ergo reuulsionis gratia clysmis Auicennas vtitur. Gratia repercussionis Auicennas probat odoramenta, non calefacientia, sed roborantia, id est, leuiter astringentia, verba gratia si odoramenta fiant è pomis, ex acetis, & aqua rosacea. Rhasis probat ex rhodino, confectum ex ol. ros. completo, & aceto. Sed notandum hæc reprimentia probari, in accessione apoplexiæ sanguineæ, non pituitosæ.

Quantum autem ad accessionem apoplexiæ pituitosæ; Auicennas probat vacuantia per meatus sensibiles & insensibiles. Quoad vacuantia per sensibiles meatus, & primū ratione totius corporis: primo vtitur clysmis acrioribus: secundo medicamentis, quæ per os exhibita aluum solunt: tertio vomitoriis. Ratio est: si quis enim ante clysmos vti voluerit purgantibus per os exhibitis: materia copiosa non cedit purgantibus. Si quis vtatur vomitoriis ante purgantia per aluum: cum totum corpus & caput sint repleta: caput vomitorio medicamento magis replebitur. Quantum igitur ad clysmos acres, probantur qui fuere propositi, in dolore cap. à pituita, verbi gratia. *R. colocynthidis, albi veratri, ana ʒ j. aristol. rot. censaur. min. cyclamin. ana P. ʒ. aqua lb iij. fiat decoctio sufficiens: & R. prædicti decocti lb j. olei rutacel ʒ j. ʒ. salis communis ʒ iij. Mis. & sine oui vitello fiat clyster.* Quoad vsum: cum Rhāsi licet vti & bis, & ter. Purgantia, quæ per os assumuntur, sunt pilula fætida, pil. sochia, etiam cum helleboro, præsertim si apoplexia sit melancholica. Sed quoniam pilulæ in accessione non possunt deuorari, ideo sunt dissoluendæ. Quoad quando: exhibendæ sunt tempore accessionis: nam magis potest materia quæ caput petit, quam possit cruditas: additque Aëtius, Apoplexiam nos cogere, vt temere omnia tentemus, quia mors imminet. Quoad vomitoria, Auicennas exhibet ʒ ij. olei de Kerua, & exhibet cum succo raphani. Recte etiam ab omnibus probantur vacuantia per os & nares, quæ debent esse valentia & amara: de quibus in dol. cap. Vacuantia per insensibiles meatus, debent esse vehementia, proposita in dol. cap. vnde recte Auicennas vtitur ol. hyntacco, cum py. ethro & castorio: vtitur oleo antiquo cum cucumere agresti, cum scilla: ascendit ad euphorbium & sinapi. Possimus etiam ascendere ad magnas antidotos. Auicennas applicat capiti, & principio spinalis medullæ. Sed magnæ antidoti etiam intra os immitti possunt. Studendum autem secundum Rhāsin, vt medicamenta in ventriculum descendant:

Repercussio.

Apoplexia pituitosa.

Clysmi acres.

Purgantia.

Vomitoria. Vacuantia per os & nares.

quare miscenda sunt dulcia: & exhibenda medicamenta liquida: & debent imponi in vase obtinente canalem perforatum, vt ad œsophagum perueniant: nam hoc modo ægris inuitis medicamenta in ventriculum descendunt.

Dista.

Quoad dietam. Aër in sanguinea apoplexia sit temperatus: in pituitosa & melancholica parum vergât ad calidum: nam aër frigidior, prohibet dissolutionem materię: calidior liquat. Cibus sit tenuissimus. Cauendum à vino: vnde in apoplexia sanguinea, probatur aqua hord. cum exiguo saccharo: in pituitosa, mulsæ cum hyss. salvia, pulegio: in melancholica: mulsæ cum melissa, & boragine.

Materię administrandæ extra accessiorem, patent è dolore capitis.

CAPVT XVII.

De Somno præter naturam, seu Comate, proprie ita dicto, vel Caro, communiter sumpto.

Transitio.



ABSOLVTA apoplexia dicendum est de Somno præter naturam, de vigiliis, de catocio, stupore, tremore, paralyſi, & conuulſione: vt sunt vitia ad animalem facultatem attinentia. Primū autem dicendum de somno & vigilia, quia magis spectant ad cerebrum: cum reliqui affectus magis ad neruos pertineant. Et prius de somno agendum, quam de vigilia: quia somnus magis affinis est apoplexiæ. Somnus ergo præter naturam, alias dicitur Subeth, coma, cataphora somnolenta, & cōmuniter carus. Per hunc somnum præter naturam intelligimus somnum profundum, citra inflammationem cerebri, ad differentiam somni in lethargo: & citra angustiam morbificam, ad differentiam somni in apoplexia, & caro exquisito. Hic autem notandum, eorum dupliciter sumi: communiter, & proprie. Si communiter accipiatur: coincidit cum comate, cum somno profundo, è com. 28. sect. 2. lib. 1. prophet. Si proprie sumatur: est somnus profundus, in quo aufertur sensus & motus, vt ibidem testatur Galenus. Nos ergo in præsentia per somnum profundum intelligimus affectum, distinctum à somno lethargi, apoplexiæ, & cari, proprie accepti.

*Digressio
physiologi-
ca.*

*Forma
somni.*

Vt autem intelligatur generatio somni præter naturam prius digredi oportet circa somnum secundum naturam. Sciendum

Sciendum igitur somnum & vigiliam, esse quidem proprietates, quæ communiter ad corpus & animam pertinent, magis tamen ad corpus. Somnus igitur est proprietas, corpori & animæ communis, sensuum opera consequens. Quare somnus est proprietas, seu affectio partis, ut pars est sensitiva, quatenus nimirum eo tempore ab opere desistit, post somnum tamē rursus sentire & operari potest: unde somnus secundum naturam est, ut ita dicam experfectibilis. Cum autē somnus secundum naturam sit affectio: quænam est hæc affectio? Respondet philosophus in lib. de somno & vigilia, esse copulam, seu immobilitatem partis sensitivæ. Forma ergo somni secundum naturam est copula: subiectū est pars sensitiva. Cum enim somnus non sit actio, sed affectio (nam subiectum patitur) affectio hæc pertinet potius ad quietē, quam ad motum, cum actiones intermittantur, cap. 9. lib. 3. de caus. puls. iure ergo philosophus statuit, hanc actionem esse copulam; seu immobilitatem. Subiectum est pars sensitiva, quæ primum (ut quod) concurret ad obeundum functiones, quarum in somno est intermissio. Vnde, cum in somno intermittantur principes functiones, nimirum sensus, & motus voluntarius: somnus debet esse affectio illius partis, quæ harum functionum est principium: hoc autem principium est ipsum cerebrum, quippe quod est sedes facultatis communissimæ, quatenus hæc ad animale contrahitur. Hinc Aulcennas dicit: somnum esse cerebri affectionem, quæ instrumenta, actiones animales intermittit, respiratione excepta. Neque obstat, quamvis Philosophus statuatur, functionum animalium originem esse cor: nam Philosophus respicit ad principium facultatis communissimæ, ut alibi docuimus. Non negasset tamen Aristoteles, facultatem communissimam, à corde prodeuntem, contrahi in cerebro, ut euadat animalis: ut cerebrum secundum hanc rationem sit somni subiectum. Vnde & Auerroes cap. 41. lib. 3. collectam statuit, cor esse radicem somni, cerebrum autem esse primum instrumentum: nam cerebrum, ait, est frigidissimū membrorum principalium. Cor radix somni dicitur, prout est sedes facultatis communissimæ: cerebrum autem concurret ut primum instrumentum, id est, ut in cerebro facultas cōmunissima euadit animalis: nam propterea cerebrū est frigidius, ut spiritum vitalem attēperet, & immutet in animale. Porro efficiunt causa somni, secundum Aristotelem, Galenum, &

Somnus est affectio partis sensitivæ.

Copula, seu immobilitas.

Subiectum somni est cerebrum.

Cor est somni radix: cerebrum, est primum instrumentum.

Efficiens causa somni, vapor condensatus angust.

Auicennam, est reciprocatio spirituum & caloris ad interiora: ideoque Auicennas, definiens somnum effectiue, dicit: quod somnus secundum naturam fit reductus spiritus animalis ad cerebrum, cum profundatione spiritus vitalis ad cor. Cum spiritu autem vitali etiam calor intro repit, ac profundatur: vnde dormientes interitus sunt calidiores, quam extrasecus autem in vigiliis, aphor. 1. sectio. 2. Quare causa efficiens somni secundum naturam, est reciprocatio spiritus & caloris. Cum autem somnus sit affectio, & proinde quid in fieri ita pendet à reciprocatione, vt reciprocatio vicem gerat causæ formalis, secundum Auerroem. Ceterum intelligere oportet à quo fiat hæc reciprocatio. Aristoteles inquit, eam fieri ab agente secundum naturam: ad differentiam somni præter naturam: sicut contra, teste Galeno, cap. 10. lib. 3. caus. puls. somnus præter naturam fit à causa violenta. Fit autem somnus à natura quando se conuertit ad alimentum. Vnde, si somnus durat post succos contactos, est morbificus somnus, & via ad mortem. Quomodo autem, fit hæc reciprocatio à natura? Secundum Aristotelem fit vi vaporis (hæc est causa communis) qui prodit ex alimento, cerebrumque petit. Prodit autem vapor ex alimento vel colliquato, quando somnus fit post cibum, vel post vigiliis, citra corporis laborem, quamuis homo non concedat post vigiliis: nam vt assiduo nutritur corpus, ita assiduo, ex alimento fit euaporatio in caput: vnde Galenus ait, cap. vlt. lib. de util. respir. euaporationem fieri e sanguine, ex alimento, in cerebrum. At vapor prodiens ex alimento, in caput, non est causa reciprocationis spirituum, nisi condensetur, ob frigiditatem cerebri: sic enim condensatus, prohibet egressum spirituum & radiorum, & proinde influxum facultatis animalis. Durat igitur somnus, quandiu durat vapor condensatus angustans. Causa finalis somni, secundum Aristotelem duplex est: præcipua est munus vigiliarum: homo enim dormit, vt commode per vigiliis propria munia obeat, id est, munia quæ attinent ad facultatem animalem, non autem ad naturalem: nam facultas naturalis non cessat ab opere suo vnuquam, quia dum operatur, parat sibi alimentum, quo fouetur; contra facultas animalis, quoniam actione propria non fouetur, propterea actionem suam quandoque intermittit. Causa finalis secundaria, est propria requies facultatis animalis: & hic finis secundarius ad præcipuum refertur:

*Quomodo
fiat reci-
procatio
spirituum,
& caloris.*

Finis somni.

nam facultas quiescit vt operetur. Ex his ergo quę hactenus dictę sũnt, possũt colligere τὴ ἀναλύσει definitionem somni secundum naturam: quod sit copula cerebri, dependens à retractione naturali spiritus animalis, vt homo functiones animales obire possit. Porro somnus hic naturalis, secundum Auicennā, vel Absolute est naturalis, vel Non absolute. Absolute naturalis est qui sit post vigilias, à cibo, vt spiritus in vigilis dissipatus restituatur: huiusque reciprocatio fit à vapore, ex alimento non colliquato. Somnus naturalis non absolute, quem Auicennas vocat somnũ non naturalẽ, fit post insignem laborẽ, vt spiritus plus iusto dissipatus reparetur: & in hoc somno fit reciprocatio à vapore alimentĩ colliquati.

His explicatis, quantum ad generationem somni præter naturam: sciendum, somnum præter naturam fieri, dum cerebro occurrit causa morbifica, ita agens, vt spiritus animalis præter naturam retrahatur in cerebrum, vt cerebrum ita afficiatur, vt difficulter homo expergiscatur. Dependet autem à reciprocatione præter naturam spiritus animalis. Quare Somnus præter naturam est copula morbifica cerebri, dependens à reciprocatione præter naturam spiritus animalis. Forma somni præter naturam, est copula, qua veluti ligatur subiectum, nimirum cerebrum.

Causa efficiens, est reciprocatio præter naturam spiritus animalis. Porro, causa, à qua fit reciprocatio hæc præter naturam, est vel Intemperies, vel Materia: cap. 10. lib. 3. de caus. puls. cap. 8. lib. 4. de præfag. puls. cap. 5. lib. 3. de loc. aff. cap. 2. lib. 4. loc. aff. com. 28. sect. 2. lib. 1. prophet. & Auicennas cap. de suberh. Quoad intemperiem, est intemperies cerebri vel frigida, vel humida, vel frigida & humida. At potior intemperies est frigida: nam frigiditas strenue condensat vaporem alimentĩ: humiditas autem vaporem condensatum à naturali frigiditate, conseruat. Quę autem causę sint intemperierum, patet alibi. Quoad materiam, est vapor, qui copia, & motu peccat: copia obstruit, motu fertur in caput. Vnde Aëtius dicit. Coma, id est, somnum præter naturam fieri, è vapore calido, & humido. Vt comatis causa immediata, prohibens spirituum egressum, non sit vapor, peccans vel qualitate tantum, vel qualitate & copia: nec possit esse humor, peccans vel qualitate, vel copia, vel simul & copia & qualitate. Declaro. Si enim vapor peccet sola qualitate, nimirum frigiditate, causa est comatis, sed mediata, quatenus cere-

*Definitio
somni secundum naturam.*

*Divisio
somni naturalis.*

*Generatio
somni præter naturam.*

Definitio.

Forma subiectum.

Causa efficiens.

Dyscrasia.

Materia.

*Coma fit à
vapore, sola copia
peccante.*

brum refrigerat, quod refrigeratum deinde vapores densat. Si vapor peccet copia & qualitate: copia satis obstruet, sed non erit coma, verum caros exquisitus. Si humor sola copia peccet, pariter fiet caros exquisitus, non coma de quo hunc loquimur. Si humor peccet sola qualitate, erit causa comatis, sed mediata, quatenus sua qualitate frigida cerebrum refrigerat. Si peccet humor & copia & qualitate, fiet caros exquisitus. Constitutum igitur sit, coma fieri à vapore, sola copia peccante. Hic vapor, secundum Auicennam prodit modo à Toto, modo à Parte. A toto, etiam cum Aetio, ut in febris: è vaporibus calidis & humidis. A parte, ut à ventriculo, per crapulas & ebrietates: & cum Auicenna prodire etiam potest à pulmone, & aliis partibus.

Differentia.

Quoad differentias, ratione formæ: Si copula cerebri sit remissior, fit somnus præter naturam, quem vocant Coma, seu cataphoram: si copula sit intensior, fit somnus præter naturam quem vocant Coma somnolentum, seu cataphoram somnolentam: & si adhuc sit copula intensior, fit somnus præter naturam quem vocant carum. A subiecto non sumuntur differentiae, nam semper est cerebrum. Ratione causæ effectricis: Reciprocatio spiritus animalis fit, vel ab Intemperie, quæ est aut Frigida, aut Humida, aut Frigida & Humida: vel à Vapore copioso obstruente: qui, ut peccat secundum motum, prodit vel à Toto, vel à Parte.

Signa.

Hoc malum in genere est notum: nam æger expergiscitur quidem, sed difficulter. Quoad differentias: coma cognoscitur cum Rhasi, quia patiens quasi dormiens iacet, sensum mouetur, oculos ut plurimum clausos habet: at ut clamoris oculos aperit, sed statim claudit: in summa, ingens ad somnum est inclinatio, ut patiens, nisi excitetur dormiat. Coma somnolentum cognoscitur, secundum Galenum in lib. de comate: quia ægri dormiunt diu & profunde, non loquuntur, difficulter sentiunt: & hæc cataphora somnolenta propria est lethargicorum. Causa efficiens, si sit intemperies, ægri non loquuntur: si vapor, cum Aetio, peregrina loquuntur, ac veluti delirant.

Præsidia.

Indicationes ex usu sunt: ut si somnus fiat ab intemperie, oriatur indicatio alterandi per contrarium: si causa sit vapor, est vacuandus & retrahendus: occurrendumque causæ generanti, ut alibi diximus.

Prognostica.

Vitium hoc despiciendum non est: nam somnus profundus

Quis potest mutari in coma somnolentum, in carum, in apoplexiam. Sed periculum pro vi differentiarum intenditur, verbi gratia coma est minus periculosum, comate somnolento: cum in hoc maior sit vehementia ratione essentia. Causa efficiens, potest esse intemperies, & vapor: quæ autem horum sit vehementia, patet è sermone de dolore capitis.

Quæ materiæ sint administrandæ, constat è dolore capitis. *Curatio.* Breuiter saltem quædã monebimus. Materia igitur cheirurgica probatur dolorifica: vt ligaturæ, frictiones, ferrum candens, præsertim in comate somnolento. Medicamenta probantur, quæ agunt in sensorium tactus, & in organum facultatis expultricis: vt sunt clysi acres, suppositoria acria sternutatoria. Si opus sit vt i oxyrhodo, conficiatur ex aceto capis, & oleo exiguo: nam oleum, secundum Auicennam, dormire facit. Aer sit luminosus. Cibus, mulsæ cum aceto. Et in hoc *Dietæ.* malo probantur animi accidentia, quæ possunt animam agitare, vt tristitia, ira, &c.

CAPVT XVIII.

De Caro exquisito, seu propriè ita dicto.

RE CARUM intelligimus exquisitum: nothus enim coincidit cum comate, de quo sumus locuti: intelligimus ergo carum exquisitum, cum Galen. capite secundo, libro quarto, de loc. affect. & comm. 21. lib. 2. de articul. in quo malo homo neque sentit, neque mouetur, non intelligit, non recordatur: respiratio non aufertur, sed quandoque læditur. *Nomen.*

Generatur hoc malum, dum causa angustat ventriculos cerebri, vt ea fiat reciprocatio spiritus animalis, vt omnis functio animalis aboleatur, excepto tactu, & respiratione, vt tactus imminuatur, & respiratio quandoque lædatur. *Generatio.* Caros igitur est functio ablata animalis, respiratione excepta, cerebri, & totius corporis, dependens à facultate impedita, secundum cerebri ventriculos. Forma, est functio *Definitio.* *Forma.* ablata animalis, respiratione excepta: vt caros distinguatur ab epilepsia, in qua est conuulsio: & distinguatur ab aliqua apoplexia, in qua respiratio aufertur. cap. 2. lib. 4. loc. aff.

At notandum circa tactum, & respirationem. Circa tactum statuit enim Galenus loc. cit. in caro hominem non sentire. Aetius autem inquit, in caro hominem, dum pungitur, sentire. Responsio. Tactus dupliciter potest considerari: quatenus scilicet in sensu tactus occurrit obiectum proportionatum, vel improporcionatum: Si occurrat obiectum proportionatum, homo de tētus caro non sentit, cum Galeno: si improporcionatum, sentit, cum Aetio. Quoad respirationem, Galenus cap. 2. lib. 4. l. aff. dicit, in caro non lædi respirationem: ubi per carum intelligit carum remissiozem: nam in vehementiori læditur respiratio. cap. 1. lib. 5. loc. affect. Subiectum, est cerebrum, causa functionū principalium: est quoque totum, causa motus: nam homo iacet, nec potest surgere.

Subiectū.

Causa efficiens.

Causa efficiens est facultas impedita secundum ventriculos cerebri: quia caros distinguitur ab apoplexia, in qua facultas impeditur etiam secundum poros. Cum igitur in caro impediatur facultas secundum ventriculos: morbus in hoc vitio est angustia ventriculorum cerebri. Per ventriculos, Galen. cap. 2. lib. 4. l. aff. intelligit, non modo anteriores, sed etiam potissimum medium: ait enim carum fieri, dum cranium comprimig ventriculos, & potissimum medium. Angustia in caro, est compressio, Subsidentia, & Obstructio.

Angustia causa.

1.

2.

3.

Compressio fieri potest à causa Externa, & Interna. Externa est causa percutiens, cap. 2. lib. 4. loc. affect. Interna, est affectus similis inflammationi, ut colligitur ex apho. 42. sect. 1. ad similitudinem apoplexiæ. Subsidentia quoque produci potest à causa externa, & interna. Subsidentia enim fit à qualitate dolorifica, vel à frigiditate. Si fiat à qualitate dolorifica, ut voluit Galen. cap. 2. lib. 4. loc. affect. dolor fieri potest à causa externa, ut ab ictu: vel ab interna, ut si aliqua corporis pars vi causa internæ doleat, ut fiat caros per consensum, quemadmodum & apoplexia fieri solet. Si fuerit qualitas frigida, fieri potest à causa vel extra caput refrigerante, vel à frigiditate genita in aliqua corporis parte, & proinde à causa interna. Obstructionis causa est Vapor, vel Minera. Vapor copiosius requiritur: vnde Paulus voluit in augmento & vigore accelsionum febrilium fieri carum. Minera, est pituita copiosa, frigida, humida, obstruens quidem ventriculos cerebri, sed non hærens in parietibus ventriculorum, quemadmodum in epilepsia & apoplexia.

Differentia.

Quoad differentias, à forma: In caro respiratio vel est In-

culpata,

culpada, vel Culpata. A subiecto non sumuntur differentia, quia idem. A causa efficiente, angustia est, vel Compressio, vel Subsidentia, vel Obstructio.

Quoad signa. Aetius statuit, earum distinctum cognosci *Signa.* ab apoplexia: nam dum patiens pungitur sentit, & corpus retrahit. Quoad signa differentiarum, & primum ratione formae: respiratio an sit inculpada, necne, per se patet. Quoad causam efficientem, & primum si fuerit compressio, cognoscitur è causis comprimentibus, ut ex ictu, è signis copiosis sanguinis. Subsidentia similiter cognoscitur e cognitione caularum. Causae externae, manifestae redduntur ab assidentibus. Causa interna, an prouideat ab aliqua parte: patiens manifestabit se per sensisse dolorem, vel frigiditatem in aliqua parte: unde assidentes referent, patientem ante paroxysmum esse conquestum de dolore alicuius partis. Obstructio, num fiat à vapore, an à pituita, patet è dolore capitis.

Quid indicet qualibet angustia: patet è serm. de apoplexia. *Prosidium.*

Malum hoc semper magni est momenti, com. 28. sect. 2. *Prognostica.*
 l. 2. prorhet. nam symptomatum adest insignis vehementia ratione essentiae, quia functio animalis est abolita: adest vehementia dignitatis, nam & symptomata, & causae pertinent ad cerebrum. Variè autem prognosticandum, pro vi differentiarum. Ratione formae, carus magis est periculosus, si laedatur respiratio. Ratione causae efficientis, si fuerit compressio ex ictu, est vitium ferme incurabile. Si compressio fiat à sanguine, curari potest, quia sanguis sola copia peccat, & in propriis vasis detinetur. Si angustia fuerit subsidentia: augetur & minuitur periculum, ut in sermone de apoplexia diximus. Si angustia fuerit obstructio, est malum curabile: potest enim superari & vapor, & minera. Vnde plerique gloriantur se curasse apoplexiam, cum tamè carus fuerit. Euentus cito exspectandus est: carus enim est vitii velocis motus.

Materiae patent, è traditis in serm. de Apoplexia, & de *Curatio.*
 dolore capitis.

CAPVT XIX.

De vigilia morboſa.

SOMNO præter naturam, opponitur illud vitium, quod *Nomen.* Auitennas Zaara vocat, id est, morbosam vigiliam. Huius generatio ut pateat, intelligenda est essentia vigiliae secundum

*Generatio
vigiliae se-
cundum na-
turam.*

secundum naturam. Vigilia igitur secundum naturam, cum Philosopho, est affectio cerebri, sicut & somnus: differentia autem est, quia in somno affectio est copula, in vigilia, affectio est relaxatio. Sicut igitur copula pēdet à reciprocatione spiritus animalis: ita relaxatio pendet à naturali effusione spiritus, ad instrumenta sensus & motus. Præterea, ut reciprocatio fit ab alimēti vapore condensato à cerebri frigiditate, secundum naturam, & conseruato à moderata humiditate: in vigiliis spiritus effusio fit, dum vapor cōdensatus est resolutus, ut spiritus animalis per radios instrumentis motus & sensus impertiat, ut homo his uti valeat. Vigilia ergo secundum naturam est relaxatio cerebri, dependens à naturali effusione spiritus animalis, gratia obeūdarum operationum.

*Generatio
vigiliae præ-
ter natu-
ram.*

Hinc facile colligi potest, vigiliā præter naturam fieri, quotiescūque cerebro occurrit causa morbilica, cuius vi alimēti vapor est, vel in cerebrū nō fertur: vel si deferatur, nec condensatur, nec cōseruatur, sed potius rarefit & absumitur, ut

*Definitio.
Forma sub-
iecti.*

importuna fiat egressio spiritus animalis. Vigilia ergo morbilica, est relaxatio cerebri, depēdēs ab effusione præter naturā spiritus animalis. Forma est relaxatio. Subiectū est cerebrum.

Causa efficiens.

Causa efficiens, est effusio spiritus animalis præter naturam. Vnde Gal. c. 10. l. 3. de caus. puls. ait: in vigiliis morbilico calorem naturalem foras moueri immodice: sicut enim spiritus animalis præter naturam egreditur, ita calidum inuentum immodice præter naturā mouetur ad circūferentiam. Spiritus autē animalis egreditur propter causam morbilicā, quæ multiplex esse potest. Ideoq; cum vigilia fiat, quoniam in cerebro desideratur alimēti vapor condensatus: sciēdum, quod cerebrum hoc vapore priuetur propter duas causas: prima causa morbilica est, quæ prohibet alimenti vaporem in caput deferri: altera est, quando causa morbilica vaporem in caput delatum, non densat, nec cōseruat. Declaro, discurren-

*Cause in-
terna.*

do, per causas & internas, & externas. Causa interna est Qualitas & Materia. Qualitas est Materialis, vel Spiritualis.

*1. Quali-
tas.*

Materialis proponitur à Gal. c. 5. l. 3. l. aff. vbi vult, vigiliarum causam esse intemperiem cerebri siue materię: quæ intemperies, vel est calida, vel sicca, vel calida & sicca: sed caliditas obtinet potiores partes, nam est maioris actiuitatis, vnde repellit et absumit vaporem, nec permittit, ut in caput deferatur: siccatas vero solum absumit. Qualitas spiritualis est, qualitas dolorifica. At quomodo hæc qualitas vigiliarū est causa

*Quomodo
qualitas do-
lorifica, ex-
citet vigi-
lias.*

Sciendum!

Sciendum dolorem duo efficere : primum enim soluit unitatem , vt obiectum improporcionatum in instanti agat in cerebrum , & cerebrum hoc obiectum, vt dolorificum iudicet. Secundo causa dolorifica qualitatem noxiam introducit, quam insinuauit Galenus aph. 30. sect. 6. dum ait, in magnis doloribus ad ventriculum fluere biliosas superfuitates: vt si dolor vigeat in intestinis, qualitas dolorifica impertiatur ori ventriculi: quemadmodum & vulnus capitis est causa vomitus, caput enim ventriculo communicat passionē, quæ passio nihil aliud est, quam qualitas spiritalis. Adhæc, c. 6. l. 5. loc. aff. Galen. dicit, syncopen fieri vitio stomachi, ob proprietatem doloris, id est, ob qualitatem dolorificam, quæ longe a'ia est ab intemperie. Si ergo causa dolorifica tribuat cerebro qualitatem dolorificam, est causa vigiliarum: non tamen semper: nam quandoque est causa reciprocationis caloris, vt fiat carus. Si causa dolorifica tribuat solum obiectum improporcionatum, tunc causa est, non somni, sed vigiliarum: non enim permittit alimenti vaporem in caput ferri: quia materia, propter dolorem, fluit in partem quæ primo afficitur, c. 3. & 5. l. 13. meth. Hæc de qualitate. Quoad materiam, *Materia* oportet intelligere speciem, vitium, & causam generantem. Species: est Vapor, vel Minera. Vaporis species tot sunt, quot sunt species mineræ. Minera igitur est vel sanguis, vel bilis, vel pituita, vel melancholia. Quoad vitium, est materia putrida, calida, sicca: putrida & calida, prohibet condensari vaporem alimenti: materia sicca alimenti vaporem absumit. Sanguis cōcurrit vt putridus, & calidus: bilis, vt calida, sicca: pituita, vt falsa, & proinde vt putrida calida: melancholia si sit exusta: vt calida, sicca: si non exusta, vt sicca. Causa generans quænam sit, alibi diximus. Causæ externæ vigiliarum, *Causa externa.* secundum Auicennam possunt esse aer lūminosus, secundum Paulum inedia, & cibus nimis copiosus, qui dum ob copiam non copuitur, facit, vt desideretur alimenti vapor: præterea est cibus pariens insomnia, vt fabæ: adhuc sunt cogitationes, rætrores, strepitus, & reliqui animi motus immodici: propterea quod magis possunt ad efficiendum egressum spiritus animalis, quam possit alimenti vapor ad reciprocationem spirituum.

Differētiæ nō sumūtur à forma, nisi vt relaxatio est Intenor, vel Remissior: Neq; à subiecto. Sed ab efficiēte: vt causa est Interna, vel Externa. Interna, est Qualitas, vel Materia.

Patet

Signa.

Pater autem hoc vitium in genere, & secundum differentias à forma: num scilicet relaxatio sit magis vel minus intensa. Num causa efficiens sit interna, vel externa, facile cognoscitur. Si autem causa interna sit: quænam hæc sit causa, patet è traditis in sermone de dol. cap.

Indicationes.

Si vigilia fiat ob vaporem non condensatum, idque ob intemperiem: oritur indicatio alterandi per contrarium: quare modo refrigerandum, modo humectandum. Si hoc fiat à materia: quid indicet materiae species, vitium, causa generis, etiam patet. Si fiat vigilia, quoniam vapor condensatus absuntur, à siccitate: oritur indicatio humectandi. Si vigilia fiat, quoniam vapor alimenti in caput non trahitur: & si id fiat, quoniam retrahitur à dolore: patet, quid dolor indicet. Si autem fiat quoniam vapor alimenti simpliciter deficit: indicatur praesidium generans vaporem alimentalem.

Prognostica in genere.

Vigilia est vitium vehemens ratione dignitatis, quia pertinet ad cerebrum: & si vigilia producat, accedit vehementia facultatis: vnde vigilie homines reddunt graciles, c. 12. l. 3. de tuen. sanit. aphor. 20. sect. 4. l. 6. epid. corpus enim dissolvitur, dum caliditas euaporans secum ducit non exiguas particulas corporeæ substantiæ. c. 6. l. 7. meth. com. vlt. l. 2. de ratione vict. vnde rationabiliter dicitur, quæ vigilie vires laxant, cap. 1. & 3. lib. 12. meth. Et additur aph. 18. sect. 7. vigilie succedere vel conuulsionem, vel desipientiam: conuulsio quædem succedit ex inanitione, nam vigilie vacuando siccant desipientia succedit, quia in vigilis sanguis redditur biliosus. Verum periculum intenditur pro vi differentiarum. Primum ergo ratione formæ, vt relaxatio est intensior, ita vigilie magis sunt periculosæ: & addit Auicennas, si tussis subsequatur, homo moritur: nam tussis est signum vehementis vigiliæ, qui sua vehementia ita siccat & exasperat

Prognostica in specie.

lat yngem. vt tussis oriatur. Ratione causæ efficiētis: si producat à causâ externa, minus est periculosa, & satis remissa vigilia, si causa sit interna: est qualitas, vel materia. Qualitas est intemperies, vel dolor. Intemperies si sit in habitibus incurabilibus, quemadmodum siccitas in senes. Si causa sit dolor pro vltoris vane prognosticandum. Si vigilia ratione materiae, fiat in phrenitide, in febribus, prognosticum est periculum è vehementia morborum. Si in causa fuerit materia simpliciter, siue sit materia biliosa, siue melancholica, siue falsa pituita: prognosticum est suum à vehementia materiae.

perire, vt alias docuimus. Vtrum autem euentus citò vel tarde sit futurus, cognoscitur è motu causæ: verbi gratia, causæ phrenitidis sunt velocis motus, pituita salsa, melancholia, tardi motus. At quamuis longa sit vigilia, non tamen est assidua, sed habet interualla: nam secus patiens obiret.

Quoad materias. Venæsectio non probatur, nisi vigilia comitetur morbum, cuius causa vena sit secanda: vt in phrenitide, in febribus. Quoad medicamenta: vigilia; enim procedat vel ab intemperie, vel à dolore, vel à materia: si ab intemperie, si quidem hæc sit calida: secundum Auicem, probantur *resura cucurbitæ, mucilago psyllij, virga pastoris, semperminum, lactuca, mandragora, capita papaueris*. Si intemperies sit sicca: vt licet, oleo amygd. dul. lacte, h. yro. Verum siccitati si coniuncta sit frigidity, prædictis addantur *thamamelum, fenumgræcum, melilot, malua, althæa*. Si siccitati sit coniuncta caliditas: prædictis addantur frigida iam superius proposita. Si vigiliæ causa sit dolor: secundum Auicennam, causa erit doloris mitigatio, de qua alibi. Si causa sit materia: si materia agat per mediam phrenitidem: patet quibus medicamentis sit vtendum. Si agat materia citra mediam phrenitidem, eam esse possit, vel pituita, vel melancholia, vel bilis: si fuerit pituita salsa: Auicennas probat oleam amygd. dulcorum, oleum cominum, & de oltum in duplice vase, cum aqua hordei, & cum vino albo subdilat, cum paucis chamæmelo, meliloto & serpillis respicit enim ad pituitam salis, quæ viscida est & crassa, vt dererit gentibus & attenuantibus opus sit. Si materia sit melancholica: cum sit frigida & sicca, oportet calida miscere humidis: vt sunt malua, althæa, oleum amygdal. adeps gallinæ, &c. Si materia fuerit biliosa: vt licet viola, lactuca, cucurbita, nymphaea, mandragora, foliis & capitibus papaueris, hyoscyamo, diacodis, philonio Romano, syropo de papau. requie Nicolai, pilulis de cynaglossis. His tamen frigidis calida sunt miscenda, & quædam etiam corrigentia, quæ dent penetrationem: Aetius proponit odoramenta & papaueris, & mandragoræ, & huiusmodi. vsus patet: monere tamen quædam licet, circa quibus & vbi quando. Cum Paulus, oportet hæc administrare, si adest febris, in declinatione accessionis: adhuc, primo ea sunt applicanda, deinde exhibenda. Vbi cum bilis substitutionem habeat & in toto, & in capite medicamenta & per os exhibenda, & capiti applicanda, nuntium, suture coronali, temporibus, naribus: at opium non applicetur suture.

Euentus.

Curatio.

Venæsectio.

Pharmacæia.

1. Intemperies.

2. Dolor.

3. Materia.

Signa.

Patet autem hoc vitium in genere, & secundum differentias à forma: num scilicet relaxatio sit magis vel minus intensa. Num causa efficiens sit interna, vel externa, facile cognoscitur. Si autem causa interna sit: quænam hæc sit causa, patet è traditis in sermone de dol. cap.

Indicationes.

Si vigilia fiat ob vaporem non condensatum, idque ob intemperiem: oritur indicatio alterandi per contrariū: quare modo refrigerandum, modo humectandum. Si hoc fiat à materia: quid indicet materiæ species, vitium, causa generas, etiam patet. Si fiat vigilia, quoniam vapor condensatus assumitur, à siccitate: oritur indicatio humectandi. Si vigilia fiat, quoniam vapor alimenti in caput non trahitur: & si id fiat, quoniam retrahitur à dolore: patet, quid dolor indicet: Si autem fiat quoniam vapor alimenti simpliciter deficit: indicatur præsidium generans vaporem alimentalem.

Prognostica in genere.

Vigilia est vitium vehemens ratione dignitatis, quia pertinet ad cerebrū: & si vigilia producat, accedit vehementia facultatis: unde vigilæ homines reddunt graciles, c. 12 l. 3. de tuen. san. aphor. 20. sect. 4 l. 6. epid. corpus enim dissoluitur, dum caliditas enaporans secum ducit non exiguas particulas corporis: c. 6 l. 7. meth. com. ult. l. 2. de ratione vict. unde rationabiliter dicitur, quæ vigilæ vires lædant, cap. 1. & 3. lib. 12. meth. Et additur aph 18. sect. 7. vigilis succedere vel conuulsionem, vel desipientiam: conuulsio quidem succedit ex inanitione, nam vigilæ vacuando siccant: desipientia succedit, quia in vigiliis sanguis redditur biliosus. Verum periculum intenditur pro vi differentiarū. Primum ergo ratione formæ, vt relaxatio est intensior, ita vigilæ magis sunt periculosæ: & addit Auicennas, si tussis subsequatur, homo moritur: nam tussis est signum vehementissimæ vigiliæ, qui sua vehementia ita siccatur & exasperatur, ut tussis oriatur. Ratione causæ efficiētis si prodeat à causa externa, minus est periculosa, & satis remissa vigilia: Si causa sit interna: est qualitas, vel materia. Qualitas est intemperies, vel dolor. Intemperies si sit in habitu est incuabitis, quemadmodum siccitas in sene. Si causa sit dolor: proinde doloris varie prognosticandum. Si vigilia ratione materiæ, fiat in phrenitide, in febribus, prognosticum est petendum è vehementia morborum. Si in causa fuerit materia simpliciter, siue sit materia biliosa, siue melancholica, siue salfa pituita: prognosticum est sumendum à vehementia materiæ,

perit, ut alias docuimus. Vtrum autem euentus cito vel tarde sit futurus, cognoscitur è motu causæ: verbi gratia, causæ phrenitidis sunt velocis motus, pituita salsa, melancholia, tardi motus. At quamuis longa sit vigilia, non tamen est assidua, sed habet interualla: nam secus patiens obiret.

Quoad materias. Venæsectio non probatur, nisi vigilia comitetur morbum, cuius causa vena sit secanda: ut in phrenitide, in febribus. Quoad medicamenta: vigilia, enim procedat vel ab intemperie, vel à dolore, vel à materia: si ab intemperie, si quidem hæc sit calida; secundum Auicem. probantur *raura cucurbitæ, mucilago psyllij, virga pastoris, sempernium, lactuca, mandragora, capitula papaueris*. Si intemperies sit sicca: uti licet, oleo amygd. dul. lacte, baryro. Verum siccitati si coniuncta sit frigiditas, prædictis addantur *thamamelum, fenugracum, melilos, malua, althea*. Si siccitati sit coniuncta caliditas: prædictis addantur frigida iam superius proposita. Si vigiliæ causa sit dolor: secundum Auicennam, cura erit doloris mitigatio, de qua alibi. Si causa sit materia: si materia agat per mediam phrenitidem: patet quibus medicamentis sit utendum. Si agat materia citra mediam phrenitidē, cura esse possit, vel pituita, vel melancholia, vel bilis: si fuerit pituita salsa: Auicennas probat oleum amygd. dulcium, oleum cominum, & de octam in daphn. vase, cum aqua hordei, & cum vino albo subdilatē, cum pauco chamamelō, meliloto & serpillō: respicit enim ad pituitam salisam, quæ viscida est & crassa, ut derer- gentibus & attenuantibus opus sit. Si materia sit melancholica: cum sit frigida & sicca, oportet calida miscere humidis: ut sunt malua, althea, oleum amygdal. adeps gallinæ, &c. Si materia fuerit biliosa: uti licet: violā, lactuca, cucurbita, nympha, mandragora, solis & capribus papaueris, hyoscyamo, diacodeio, philonio Romano, syrupo de papau. requie Nicolai, pilulis de cynoglossa. His tamen frigidis calida sunt miscenda, & quædam etiam corrigentia, quæ dent penetrationem: Aëtius proponit odoramenta & papauere, & mandragorā, bulb. sili. Vfus patet: monere tamen quædam licet. circa quædam & vbi. Quando. Cum Paulus, oportet hæc administrare, si adest febris in declinatione accessionis: adhuc, primo ea sunt applicanda, dein illa exhibenda. Vbi. cum bilis substantiam habeat & in toto, & in capite medicamenta & per os exhibenda, & capiti applicanda: nistrum, suture coronali, temporibus, naribus: ac opium non applicetur suture.

Picta. Quoad dixtam, probatur aer obscurus, & alteratus medicamentis soporiferis, id est, laetuca, papauere, &c. Probatur puluinar, si conficiatur è capitibus papaueris, & radice papaueris nigri, &c. Cibus sit varius, pro causæ varietate; & cum Paulo miscenda sunt soporifera, dum vigilia vrget. Paulus probat validum exercitium, à quo scilicet fit insignis colliquatio alimenti, vnde ex hoc vapor copiosus petit caput, & somnum excitat.

CAPVT XX.

De comate vigili.

Nomen.
Generatio.



Forma.

Causa efficiens.

Differentia.

Signa.

Presidia.

RE R Coma vigil, intelligimus malum, mistum è somno & vigilia præter naturā. Generatur hoc malum, dum causa contraria agit in cerebrum, vt cerebrum afficiatur modo copula, modo relaxatione. Coma vigil igitur est affectio mista è copula & relaxatione cerebri, dependens à quiete & motu præter naturam spiritus animalis. Forma est, quid mistum è copula & relaxatione: è copula, vt est coma: è relaxatione, vt est vigil. Subiectum est cerebrum. Causa efficiens, est spiritus animalis, quies seu reciprocatio, & motus, siue egressus. Quæ causæ sint reciprocationis & egressus spirituum, patet è superius propositis. Quoad differentias, & primum à forma: vel Copula vincit, vel Relaxatio: vnde cū Galeno in lib. de comate datur cataphora vigil pigra, dum copula vincit: datur cataphora vigil non pigra, dum relaxatio vincit. Ratione causæ efficientis dicendum: materiam vel esse Participem inflammationis, vnde prodit cataphora vigil phrenitica: vel expertem inflammationis, vnde producit, cataphora vigil non phrenitica à Galeno dicta. In genere hoc malum patet: nam cum Galen, loc. cit. æger vigilat, nec tamen surgere potest. Quoad differentias ratione formæ: cataphora vigil non pigra, cognoscitur è motu facili corporis & copioso: pigra contra. Ratione causæ efficientis: cataphora vigil phrenitica, cognoscitur è delirio: non phrenitica, ex absentia delirii, nisi hæc cataphora fiat è vino: si autem fiat è vino, cognoscitur inde, quod febris non adest, & præcessit potio vini copiosa. Indicationes, prognosticum, materiz: patet è traditis de simplici tum somno, tum vigilia.

CAPVT XXI.

De catocho exquisito.

ACTENVS dictum est de vitiis, attinentibus ad corpus & ventriculos cerebri. Iam dicendum de malis neruorum: nimirum, de catocho, tremore, stupore, paralyfi, & conuulsione. Et primum de catocho dicendum: quia in hoc vitio cerebrum per essentiam afficitur. Per catochum intelligimus malum, quod vocant catalepsi, detentionem, congelationem. Non explicamus causam harum vocum: videte Altimarum. Intelligimus autem catochum exquisitum, in quo patientes seruunt eundem situm, quem antea obrinebant: preterea audiunt, vident, imaginantur, recordantur: sed immoti instar statuarum manent, sensuque tactus orbantur, cap. 16. lib. 4. de caus. puls. Excluditur ergo catochus nothus, quem interdum Galenus coma vigil vocat: vt cap. 21. lib. 13. meth. cap. 2. lib. 4. de loc. aff. cap. 3. lib. de diff. symp. Quibus locis nonnulli, putantes Galenum loqui de catocho exquisito, vehementer sunt allucinati. Catochus exquisitus generatur, dum a cerebro frigido & sicco, est materia melancholica, producitur vapor frigidus & siccus, vt ilico expellatur in neruos: vnde nerui motui, qui aliis duriores sunt, a vapore frigido & sicco afficiuntur, & secundum partem internam condensantur, vt radios spiritus animalis non admittant: ideoque motus voluntarius vna cum tactu deperditur: afficiuntur etiam nerui secundum partem externam, secundum quam ita refrigerantur, vt rigidi, seu tensi permaneant, vnde homo ceu statua redditur immobilis. Quare catochus exquisitus est motus ablati, cum abolitione receptionis obiecti tangibilis totius corporis, dependens a densitate, cum frigidityte & siccitate neruorum motuorum. Hæc definitio colligitur è Galeno, com. 56. sect. 2. lib. 1. prorhet. non autem ex aliis locis, nam cap. 3. lib. de diff. sym. & alibi, respicit Galenus ad catochum spurium. Forma huius mali est motus ablati, cum abolitione receptionis obiecti tangibilis: patientes enim immoti manent. Vnde catochus distinguitur à tetano, & à catocho notho. A tetano: nam in hoc est motus corruptus, quia omnes muscoli mouentur ad suum principium. Distinguitur à catocho notho,

*Transitio.**Nomen.**N D.**Generatio.**Definitio.**Forma.*

quem etiam coma vigil nuncupant; quia in hoc, secundum Aëtium, patientes quandoque mouent manus ad caput: quod nequaquam fit in exquisito. Quoad sensum tactus: ait Galenus, homines in catotocho tangibilia non percipere. In definitione diximus, abolitam esse receptionem obiecti tangibilis: non autem functionem tactus esse ablatam: ut constaret, vitium hoc non esse positum in iudicio, sed in receptione: iudicium enim in sensu tactus attinet ad cerebrum, quod non est læsum: receptio autem pertinet ad nervos, qui sunt læsi. Subiectum huius accidentis est totum corpus: patientes enim manent immoti secundum omnes partes.

Subiectū.

Causa efficiens.

Causa efficiens, est densitas, cum frigiditate & siccitate nervorum motiuorum. Ut hæc intelligantur: supponendum, nervos constare e portione interna cerebri, seu medullari: & externa, seu membranacea. Quemadmodum igitur nervi in paralyti afficiuntur secundum internas partes, in convulsione secundum externas: ita in catotocho secundum utrasque afficiuntur: ut propter densitatem spirituum animalium radij, non transeant: propter frigiditatem & siccitatem nervi rigidi euadant. Diximus autem in finitione nervos motiuos affici, quoniam hi, ut duriores, facilius a frigido & sicco indurescunt. Quia ergo nervi molles non afficiuntur: ideo patientes cum Galeno audiunt, vident, sed oculi tamen non mouentur: & quia noxa non attinet ad cerebrum: recordantur & imaginantur. Cæterum cognoscere oportet, ob quam causam nervi ita afficiantur. Paulus proponit materiam frigidam & siccam, id est, melancholicam: quæ materia melancholica est vapor: cum hoc malum cito fiat & cito desinat, ut quatuor vicibus, aut pluribus quoque eodem die reuertatur: neque vacuatio aliqua sensibilis apparet, quia scilicet est vapor. Hic vapor, copia sua potest densare, & frigiditate atque siccitate veluti congelare. Materia e qua hic vapor generatur, est humor melancholicus, id est, frigidus & siccus. Agens causa, quæ hunc vaporem producit, interdum est calor imbecillis infra caput; dum videlicet vapor generatur e melancholia, infra caput collecta: semper autem agens est calor debilis capitis: & est capitis intemperies frigida, & sicca, secundum Galenum aph. 3. sect. 2. quæ intemperies vaporem frigidum & siccum, prodeuntem a loco extra caput, frigidiorum & sicciorum reddit. In catotocho ergo exquisito materia est melancholica: unde, dum Aëtius ait, catotochum fieri

Causa catotochi est vapor.

fieri

fieri à sanguine, loquitur de catocho notho.

A forma sumuntur tantum differentie secundū Magis & Minus. A subiecto non sumuntur differentie, nam semper est totū. Ab efficiente: Vapor generatur In capite, vel Extra:

Catochus in genere patet, Differentie à forma secundum magis & minus, cognoscuntur à diuturnitate & frequentia accessionū. Quoad causam efficientē: num vapor generetur in capite, vel extra: cognoscitur à traditis in serm. de dol. cap. 1

A vapore sumuntur hæ indicationes: vapor dissoluendus est, & retrahendus, si habet impetum in caput. A materia: qua, cum sit humor melancholicus frigidus & siccus: quid indicet, patet. Ratione agentis: cerebrum est, calefaciendum & humectandum.

Hoc malum, quantum attinet ad accessionem, cito & facile superatur: nem vaporis vehementia ratione essentie est remissa: nec adest insignis vehementia ratione dignitatis, quia vapor afficit nervos, non cerebrum: & ob id dicit Galenus com. 36. secl. 2. l. 1. prophet. adolescentem illum euasisse. Sed notandum: cum Aëtius inquit, catochum esse periculosiorem lethargo: quod respiciat ad catochum nothum, ad vitium mistum ex inflammatione phrenitica & lethargica: addit enim: aquam frigidam esse noxiam, quod augeat inflammationem. Maior est difficultas in præsertione: quia cerebrum est frigidum & siccum: ut absit vehementia essentie & dignitatis.

Materia extra accessionem vsurpanda, patet à dol. cap. à materia melancholica: In accessione id solum notetur, Rhasin probare oleum sesaminum, quod est calidum & siccum in secundo, & addit duodecimam enphorbij partem: quia videlicet, respicit ad discussionem vaporum in accessione. Nam extra accessionem oportet calefacere, & humectare.

CAPUT XXII.

De Tremore.



TREMOR solum pertinet ad motum, ad differentiam torporis, seu stuporis: ideo primo de Tremore dicendum. Per tremorem autem intelligimus morbosum: malum scilicet in quo totum mobile sursum & deorsum mouetur, c. 2. l. 2. de caus. sympr.

Generatio. & in l. de tremore, & aphor. 4. sect. 1. lib. 3. epid. Generatur hoc malum, dum causa morbifica occurrit corpori: vi cuius radij spirituum animalium ita deficiunt, vt, dum facultas motrix, voluntati obtemperans, ad mouendum insurgit, & membrum quidem attollit, sed non derinet, quin membrum, siue mobile, suo pondere deorsum tendat. Quare tremor morbosus, est motus prauus à sursum ad deorsum, assiduus, totius mobilis neruosi, dependens à facultate motrice, mouere tentante, præter naturam onerata. Forma est motus prauus à sursum ad deorsum: nam c. 1. l. 2. de caus. sympt. vult Galenus, tremorē esse motum prauum, ad differentiam inminuti, qui inminutus plerunq; est in stupore. Præterea, vt tremor est motus prauus: distinguitur à paralyti, in qua motus est ablat-
Definitio. tus. Dicimus, à sursum ad deorsum: vt tremor distinguatur à conuulsione, in qua est quidem motus prauus, sed membrum retrahitur. Notandum autē quod dicimus, à sursum ad deorsum: si sursum deorsum oportet enim exquisitissime loqui in definitione: ratio autem est: quia mobile, quatenus sursum mouetur à virtute, potius diminute mouetur, quā corrupte: at motus deorsum prauus est, nam mobile deorsum mouetur, cum non deberet moueri: & hic motus dependet à pondere, seu onere, inuita virtute. Addimus in finitione, causa formæ: quod sit assiduus motus: ad differentiam torporis, qui sane etiam est motus prauus, qui fit à virtute sursum, à pondere deorsum: sed quia torpor est leuis paralytis mēbri, ideo membrum ægre sursum mouetur, vt statim decidat, vnde fit huiusmodi motus per interualla, vt per quoddam interuallū post decidentiam, sursum attollatur membrum: contra in tremore hic motus est assiduus. c. 2. l. 2. de caus. sympt. c. 3. lib. de tremor. Ex hinc quoque. Auicennas ait, tremorē fieri à motu lacertorum secundum continuitatem. Subiectum est mobile totum neruosum. Mobile dicimus: ad exprimendū subiectum commune omni speciei tremoris: tremor enim interdum pertinet ad totum corpus, interdum ad partē: dum ergo dicimus mobile: potest hoc mobile esse vel totum, vel pars. Addimus, totum, scilicet mobile: ad differentiam pal-
Forma. pitationis, in qua non mouetur totum membrum, c. 5. l. 2. de palpit. Addimus, neruosum: vt constet, neruum esse præcipuam partem subiecti tremoris: vnde Galenus cap. 3. lib. 4. diff. puls. ait, tremorem spectare ad solos neruos: intelligens partem principalem.

Efficiens causa, est facultas motrix, mouere tentans, præter naturam onerata. Quatenus enim tremor dependet à facultate motrice, distinguitur à palpitatione, & legitima conuulsione: vnde Galenus cap. 3. & 4. lib. de tremore, ait, tremorem esse symptoma motricis imbecillis, quæ tentat mouere membrum. Dicimus oneratam esse facultatem, ad differentiam rigoris, cuius causa est sola expultrix: tremoris autem causa est, & facultas motrix, & mobilis membri pondus, & pondus quidem præcipuum sibi vendicat locum: vnde Galenus, respiciens ad hoc pondus, ad hoc inuoluntarium agens, cap. 6. de tremor. inquit, tremorem esse motum inuoluntarium: quod si absolute intelligatur, est falsum. Adimus facultatem motricem oneratam esse præter naturam: ad differentiam tremoris non morboſi: vt si fiat tremor ob onus iusto grauius, quod baiulus contingit: vel ob timorem. Cum igitur in tremore concurrat onus præter naturam, explicandum est, ob quam causam mobile euadat ponderosum. Sciendum igitur in tremore motum deprauari, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum, cap. 2. lib. 2. de caus. symp. ca. 3. & 5. lib. de trem. Læditur facultas ob morbum: qui morbus est densitas in poris neruorum, vt radij spirituum animalium saltem exigui permeent: vnde facultas motrix strenue membrum mouere nequit. Densitas hæc, vel est Semidensitas, vel Integra densitas: hæc secundum omnes partes mobilis, illa secundum aliquas: nam utroque modo radij deficiunt. Vnde Galenus insinuans integram densitatem, inquit, tremorem fieri, dum humores prorsus obstruunt, id est, dum integra est densitas. Quod si igitur integra fieret densitas secundum omnes partes, esset paralyſis. At tremor fit, dum integra densitas est secundum aliquas tantum partes, ita vt reliquæ fibræ non densentur. Cæterum densitas & integra, & nō integra, producitur à succo crasso, viscido, impacto: ad differentiam corporis, in quo humor nō est penitus impactus: ideoq; motus fit, qualis est in incipiente paralyſi, teste Galeno loc. cit. Succus ille crassus ac viscidus, est succus melancholicus, & vt plurimum pituitosus. Cum ergo tremor fiat, læsa facultate ob densitatem: merito Auicennas dixit, tremorem esse morbum instrumentalem. At si fiat tremor ob errorem externum: hic error pertinet vel ad Virtutem, vel ad Mobile, vel ad Vtrumque. Ad virtutem pertinet error, dum vitium est secundum radios spiritus

Causa efficiens.

Causa motus deprauati in tremore.

1. Læsa facultas, ob densitatem.

Causa densitatis.

2. Error externus. Vitium radiorum fluminum, & fluxorum.

animalis, quatenus hi nequeunt facultatem influxam, seruare robustam: dum igitur error spectat ad solam virtutem, vitium est in radiis fluentibus ad mobile. Dum error spectat simul ad virtutem & mobile, vitium est in radiis fluxis. Quoad errorem igitur causa virtutis: hic error positus est in defectu radiorum spirituum, vt vitium radiorum, sequatur vitium spirituum. Vitium autem in spiritu est, quoniam spiritus vel Non generatur, vel si generatur Resoluitur. Non generatur, vitio, vel Materie e qua, vel vitio Agentis. Vitium agentis est, dum cerebrum iusto est frigidius, vt contingit in decrepitis: & huc pertinent cause, quae cerebrum plus iusto possunt refrigerare. Vitium materiae e qua, est inopia alimentis: ideoque tremor oritur post morbos, vi quorum facultas nequit alimentum idoneum, conficere: idem euenire potest ob immodicas euacuationes, cum sensibiles, tum insensibiles, vt non infimum locum obtineat euacuatio quae fit per coitum. Spiritus autem geniti resoluuntur in deliquis animi. Error pertineus ad mobile, est pondus mobilis: quemadmodum contingit illi ancillae, cui in puerperio sanguis non fluxit: & Auicenna, metito etiam proponit porum copiosum. Error simul pertineus & ad virtutem, & ad mobile, est id quod agit in mobile cum violentia: siue sit Deleterium, vt punctio animalis venenati: siue Non deleterium, & hoc siue sit Qualitas siue Materia Qualitas (secundum Auicenna) est caliditas adurens, agens cum impetu: & frigiditas vellemens, vi cuius homines interdum quasi semimortui & trementes euadunt, dum iter faciunt per loca frigidiora. Quoad materiam, tremor fit ab humore, vehemente qualitate praedito, cuiusmodi est bilis: vnde Galenus aph. 26. sect. 6. dicit, in febribus atdēribus fieri tremores, quoniam biliosi humores ad neruos transfluunt. Haec ergo causae habent rationem erroris: respectu quidem virtutis, quatenus aduersantur radiis: respectu mobilis, quatenus laedunt calidum innatum.

Pondus mobile. Spiritus autem geniti resoluuntur in deliquis animi. Error pertineus ad mobile, est pondus mobilis: quemadmodum contingit illi ancillae, cui in puerperio sanguis non fluxit: & Auicenna, metito etiam proponit porum copiosum. Error simul pertineus & ad virtutem, & ad mobile, est id quod agit in mobile cum violentia: siue sit Deleterium, vt punctio animalis venenati: siue Non deleterium, & hoc siue sit Qualitas siue Materia Qualitas (secundum Auicenna) est caliditas adurens, agens cum impetu: & frigiditas vellemens, vi cuius homines interdum quasi semimortui & trementes euadunt, dum iter faciunt per loca frigidiora. Quoad materiam, tremor fit ab humore, vehemente qualitate praedito, cuiusmodi est bilis: vnde Galenus aph. 26. sect. 6. dicit, in febribus atdēribus fieri tremores, quoniam biliosi humores ad neruos transfluunt. Haec ergo causae habent rationem erroris: respectu quidem virtutis, quatenus aduersantur radiis: respectu mobilis, quatenus laedunt calidum innatum.

Agens in mobile cum violentia. Error simul pertineus & ad virtutem, & ad mobile, est id quod agit in mobile cum violentia: siue sit Deleterium, vt punctio animalis venenati: siue Non deleterium, & hoc siue sit Qualitas siue Materia Qualitas (secundum Auicenna) est caliditas adurens, agens cum impetu: & frigiditas vellemens, vi cuius homines interdum quasi semimortui & trementes euadunt, dum iter faciunt per loca frigidiora. Quoad materiam, tremor fit ab humore, vehemente qualitate praedito, cuiusmodi est bilis: vnde Galenus aph. 26. sect. 6. dicit, in febribus atdēribus fieri tremores, quoniam biliosi humores ad neruos transfluunt. Haec ergo causae habent rationem erroris: respectu quidem virtutis, quatenus aduersantur radiis: respectu mobilis, quatenus laedunt calidum innatum.

Differentia. Ratione formae, discrimin. tantum est secundum Magis & Minus: Ratione subiecti tremore afficitur, vel Totum corpus, vel corporis Pars. Notandum autem cum Auicenna si tremor fiat in vtraque manu, non necessario tremorem esse in pedibus: contra, si tremor sit in pedibus, necessario etiam esse in brachiis. Hic Auicenna sermonem habet de tremore, cuius causa potest esse communis manibus & pedibus: eamque causam affert triplicem. Prima causa est, dum a capite fluit materia, natura conatur

conatur seruare spinale medullā, vt materia morbifica fluat in ramos proximos, manuum scilicet & brachiorum, ad differentiam pedum. Secunda causa: si fluat materia in principium spinalis medullæ, natura facilius expellit materiam ad proximās partes, nimirum ad brachia & manus. Tertia causa est: quia facultas motrix in pedibus, non eget tam copiosis radiis spiritus animalis, vt manus: & hoc factum est propter maximā necessitatem pedum, qui totū corpus sustinere debent. Cæterū, cum facultas nō suscipiat magis & minus: valida virtutis in pedibus causa est, cum neruorū durities quæ maior est in pedibus, quā in manibus; (quod enim nerui magis recedunt à cerebro; eo duriores euadunt) tum calidū innatum neuorū pedum, quod efficacius & robustius est, quā in manibus: & Auicēn. hoc calidum innatum pedum, vocat spiritum motiuum: vt propter spiritum motiuum robustiorem in pedibus, non sit opus radiis ita copiosis, quemadmodum in manibus. Quoad differentias, quæ sumuntur à causa efficiente Tremor fit læsa facultate; aut ob Errorem externum. Si fiat læsa facultate, fit ob densitatem; prædeuntem à materia, vel Pituitosa, vel Melancholica. Error externus pertinet, vel ad Virtutem, vel ad Mobile, vel ad Vtrumque. Si ad virtutem: quatenus Spiritus vel Non generatur, vel Resoluitur. Si ad immobile, est materia onerans. Si ad vtrumque, est quod violenter agit: & hoc Deleterium, vel Non deleterium: Si non deleterium: est Qualitas, vel Materia.

Tremor in genere oculis conspicitur: vt etiam differentia à forma, & subiecto. Quoad causam efficientem. Si fiat tremor læsa facultate: cognoscitur ex absentia erroris externi: item è præcedenti destillatione vel abolita, vel imminuta, citra aliam euacuationem. Vtrum autem materia sit pituitosa, vel melancholica: cognoscitur è signis traditis in dolore capitis. Si fiat tremor ob errorem externum: primum si hic attineat ad virtutem, quoniam spiritus non generantur vitio agentis: cognoscitur è signis, indicantibus cerebrum frigidius, & hinc ex ætate senili: Si non generentur spiritus vitio materię: quæ cognoscitur è signis inopiæ alimentis, vt è morbis prægressis, & vacuationibus. Si spiritus resoluantur: cognoscitur ex animi deliquio. Si error attineat ad mobile: cognoscitur è repletionem cibi vel potus: præterea è suppressa aliqua euacuatione, vt contingit illi ancillæ puerperæ. Si error spectet ad vtrumque: cognoscitur è punctione

animalis venefici: ex insigni calore vel frigore occurrente; vel etiam è febre ardente infestante, &c.

Indicationes.

A subiecto.

A causa efficiens.

Galenus cap. 5. lib. de tremor. recte eos reprehendit, qui in omni tremore vtuntur calorificis: nam interdum etiam refrigerandum est. Vnde ab essentia sumendæ sunt indicationes: essentia autem tremoris posita est, in forma, subiecto, & efficiente. A forma non sumuntur indicationes, quia forma non indicat vtile. A subiecto sumuntur indicationes, quatenus mobile neruosum requirit præsidium, proportionem seruans, in omni affectu neruorum. Quoad causam efficientem: hæc est morbus, vel error externus. Morbus est densitas, procedens à materia: indicatio ex usu, non sumitur à densitate, sed à materia: materia ergo quatenus secundum speciem est pituitosa, vel melancholica: indicat præsidia vacuantia determinata: quatenus secundum vitium, est copiosa, frigida, crassa, viscida, quiescens, & quatenus interdum mouetur, ac generatur vel in capite, vel in ventriculo, vt materia pituitosa, vel in hepate, vt melancholica: patet quid hæc vitia indident. Si causa efficiens sit error externus: si pertineat ad virtutem, & hoc fiat, quoniam spiritus non generantur ob frigiditatem cerebri: oportet cerebrum calefacere: Si spiritus non generentur ob inopiam alimenti: indicatur alimentum augens. Si error pertineat ad mobile: cum sit materia copiosa, indicat vacuos. Si error ad vtrumque attineat: siquidem causa sit venefica, requirit bezoarticum: si calida, frigidum: si frigida, calidum: si materia febrilis, hæc euacuanda & attemperanda.

Prognostica.

Tremor despiciendus non est, cum mutetur in paralyfin. Multiplex autem tremoris euentus sumi potest à vi differentiarum. Ratione formæ, vt motus prauus est vehementior, ita etiam tremor est vehementior. Quoad subiectum; tremor in toto peior est, quam in parte: si in parte, tremor periculosior est, pro partis dignitate: ratio horum est, quia maior est vehemētia dignitatis. Auicennas addit, tremorem in sinistra parte esse magis periculosum: quod non sit propter vehementiam essentia, sed quia pars sinistra affecta, significat nobis vehementiam ratione facultatis: nam calidum innatum (quod est facultatis instrumentum) sinistræ partis facilius cedit & succumbit. Quoad differentias ratione causæ efficientis: si est morbus, vix curatur: nam morbus est densitas, producta à materia, quæ summe vehemens est. secundum

cūndum essentiam: vnde sæpenumero hic tremor comitatur homines vique ad mortem. Si causa efficiens sit error externus: si hic error pertineat ad virtutem, vt spiritus animales non generentur nisi in causa est cerebri frigiditas, vt in senibus, non recipi curationem: quia adest vehementia, & ratione essentia, cum sit insignis frigiditas, & ratione dignitatis, cum hæc frigiditas occupet cerebrum. Si hoc fiat ob inopiam alimenti: pro varia vehementia varie prognosticandum: verbi gratia, si inopia sit alimenti ob ieiunium, ob coitum, &c. his remotis aderit alimentum copia. Si spiritus resoluantur: vario modo prognosticandum, pro vehementia deliqui animi, & causarum deliqui: & de his in propriis capitib. dicendum. Si error spectet ad ponderosum mobile: materia ponderosa euacuata, tremor euanescit, cap. 5. lib. de tremor. Si error pertineat ad vtrumque: si causa sit venefica: pro vi veneni prognosticandum. Si causa non sit venefica, si fuerit qualitas: tremor facile superatur: Si fuerit materia: cum Gal. aphor. 26. sect. 6. in tremore, qui occurrit in febre ardente, vacuata materia, etiam tremor euanescit.

In tremore probatur venæsectio, dum sanguis peccat in *Curatio.*
 ratione causæ principalis, c. 5. l. de trem. c. 5. l. de venæsectione *Venæsectio.*
 aduersus Erasist. vnde Hippocrat. in puerpera venam secuit, quia sanguis erat suppressus, & habebat rationem causæ principalis. Non autem secunda est vena, si sanguis habeat rationem causæ sine qua non: ratio est: quia in tremore (cum non fiat hic motus prauus, nisi quando homines tentant se mouere) corpus potius quiescit, & per quietem refrigeratur tum corpus, tum calidum: vnde, si euacuetur sanguis, qui habet rationem causæ sine qua non: maior noxa, quam emolumentum sequitur: quoniam per venæ sectionem ex accidenti refrigeratur corpus. Sed notandum, vt, quando sanguis habet rationem causæ, sine qua non, possumus curare tremorem, venæ sectio suppleatur cucurbitulis, & potissimum cibi parcitate: vt sanguis imminutus non amplius curationem impediatur. Animaduertendum quoque, si cum tremore forte coniungatur vitium, requirens venæ sectionem, cauendum esse à venæ sectione quantum fieri potest: dico quantum fieri potest: nam si quis tremore affectus corripereetur pleuritide, angina, &c. cui dubium venam esse secundam: sed non ratione tremoris. Quoad vsum: Quantum, seu quid agendum specificum: sanguis non est euacuandus in multa copia: imminuta enim copia tremor

tremor tollitur : quod si autem tremor non cesset , sanguis minuatur saltem cibi paritate : & nisi cesset tremor , venæ sectio potius repetenda est , quam vt liceat vnica vice sanguinem copiosum euacuare. Quoad Vbi : Hipp. in fœmina , cui suppressa erat pûrgatio puerperij , aperiebat venam tali , id est , saphenam. At , si sanguis redundet in toto , secanda vena brachij. Auicennas & Paulus , probant cucurbitulas , cum magna flamma admotas , & scarificatas ; appositas parti affectæ , sed post totius & capitis euacuationem : Probantur autem hæ cucurbitulæ non in quocunq; tremore , sed solum in eo , qui fit à materia densante , vt materia illa euacuetur. Sûnt autem applicandæ variis partibus , prout variæ partes sunt affectæ : verbi grãtia si vitium sit in principio spinalis medullæ , applicandæ sũnt ceruici : Paulus applicabat vertebrais , vsque ad lumbos.

Cucurbitula.

Pharmacia.

Medicamenta nervorum.

I. Si tremor fiat a densitate.
Interna.

Medicamenta respiciunt vel subiectum , id est proportionem nervorum , vel causam efficientem. Quæ nervorum proportionem respiciunt , in omni nervorum inalo possunt vsurpãri : vnde probatur *castorium* , nisi aliquod in corpore calidum prohibeat : probantur magna antidoti : *Auicennas* commendat *cerebrum leporis assum* , *brasiliam* , *altheam*. Hæc medicamenta misceri possunt aliis , quæ respiciunt causam efficientem.

Ratione ergo causæ efficientis : si fiat tremor à densitate , seu materia densante : primum vacuandum est totum , & caput , medicamentis quæ in tremore vehementia esse debent : deinde ascendendum ad alia : vnde *Auicenn.* probat *castorium* , cum *melle scillitico* , cum *ruta* , cum *scalopendrio* : additque *Auicennas* semina *maluarum* , propter emolliationem : probat etiam *succum eupatori* , una cum *cerebro leporis assu* : probantur etiam alia calefacientia. Hæc administranda sunt actu calida. *Auicenn.* etiam probat *urina animalium pinguium* , ut *castratorum pinguium* , *agni pinguis* , de quibus etiam loquitur in serm. de parâ , y si *Paulus* ascendit ad *rubrificantiã*. Nos addere possumus , de *octo* , *guaiaci* , *seffafras* , & alia de quibus diximus in dol. cap. à materia pituitosa , & melancholica. Ex eodem loco & vsus patet : hic tamen quædam monebimus. In tremore igitur tale medicamentum componi potest : *pulverem rûte* , *scalopendrij* , *cerebri leporis assu* an. ʒ ij. *castorij* ʒ j. ss. (hæc medicamenta attenuant ac detergunt materiam , sicutque nervorum proportionem) *seminum maluarum* , *altheæ an.* ʒ ij. *succi eupatori* , *depurati cum saccharo* ʒ ss. *succi brasiliæ* ʒ ss. *michradati antiqui* ʒ iij. *mellis scillitici* ʒ ij. *dianthos*

Alanthos 3 ij. Mis. & seruetur hoc medicamentum in vase vitreo, & vas ultimum decimeatur per aliquot dies in aere calido. Hoc medicamentum è toto potest expugnare materiam densitatis causam, & nervos robórare. Dosis sit à ʒ β, vsque ad ʒ iʒ, si hoc medicamentum exhibeatur ante decoctum guaiaci, vel sassafras: nam in tremore oportet quandoque hoc decoctum exhibere per 40. dies ante syrupū. Quod si non exhibeatur decoctum guaiaci, vel sassafras, & solummodo detur medicamentum propositum, dosis eius esse debet à ʒ j. ad ʒ β. Hoc medicamentum tanta est utilitatis, vt & materię morbi ficę vires dissipet, & expultrix vehementer insurgat ad expugnandum materiam. Quoad vsum: dosis modo maior erit, modo minor, pro actiuitate materię. Præterea hoc medicamentum est exhibendum post purgationem totius: & per plures dies, si materia præsens sit per plures dies. Et est exhibendum per os, vt ipsius vis ad nervos perducatur. Extra quoque medicamenta sunt applicanda: vt oleum de casto, de castoreo, vulpinum, & alia: vt ad sinapismos ascendere liceat. Probantur quoque emollientia, vt ius carniū pinguium, & potissimum ius tauri vngulorū, cum radice cucumeris agrestis, cum malua, althæa. Et hæc medicamenta sunt applicanda parti primo affectæ. Causa resolutionis, probantur etiam balnea salina, vt aqua marina, item balnea sulphurea. Causa remolitionis, probatur balneum aquæ dulcis, sed cum iuribus pinguioribus. Hæc ergo medicamenta sunt vsurpanda, dum tremor sit læsa facultate, ob morbum.

Externa.

At si tremor fiat ob errorem externum: si error attineat ad virtutem, vt spiritus non generentur, ob cerebri frigiditatem, cum Auicenna singulis 10. diebus oportet exhibere pil. oochiar: exhibet etiam 3 ij. stachados, ad calefaciendum cerebrum: probantur etiam ea, quæ proposuimus in dol. cap. ab intemperie frigida, cum pituita. Si non generentur spiritus ob inopiam alimentī, tunc ebis occurrendum, cap. 5. lib. de tremore non tamen desistendum à medicamentis, quæ occurrere possunt vitiiis, vi quorum deficit alimentum, verbi gratia si deficiat alimentum, ob immoderatum fluxum sanguinis, occurrendum medicamentis, quæ fluxum sistunt. Si spiritus resoluantur, vt in deliquiis cardiacis, in leipothymia: calorifica extreme sunt noxia, & potius probantur frigida, de quibus in sermon. de cardiaca. Si error attineat ad mobile, verbi gratia si fiat tremor è copioso vino: cum Auicenna proba

2. Si tremor fiat ab errore externo.

2.

3.

4.

- probatur oleum paratum ē cucumere asinino, ē cannabe, ex banda-
 5. cacha, id est, trifolito communi. Si error pertineat ad virtutem &
 6. mobile: si causa sit venefica: confugiendum ad doctrinam de
 yenenis. Si causa sit vehementer refrigerans, verbi gratia po-
 tus frigidioris aquae, cum Rhasi probatur balneum, ea ratio-
 ne administratum, vt homo sudet: & deinde oportet vt in
 Sole moretur, vel saltem ingrediatur balneum sulphureum,
 7. vel marinum, & inungatur oleo de costo. Si materia sit calidior:
 caput inungendum est oleo communi & refrigerante, vt vio-
 latio, quo caput rigandum. Hæc medicamenta applicanda
 non tantum capiti, sed etiam à prima vertebra usque ad lum-
 bos. Probatur medicamentum, paratum ē cruda farina hor-
 deacea, qua sit oleo & aqua diluta. Et quia hic tremor fieri so-
 let in febribus: dum febris remittit, Paulus vngit corpus oleo
 veteri: & si febris perdurat, vtitur balneo cum oleo, aut hydra-
 leo, cum frictione molli. Diæta patet.

CAPVT XXIII.

De Torpore, seu stupore.

Nomen.



REMORI quodammodo similis est torpor.
 Loquimur autem hic de torpore in genere: qui
 prædicatur de quacunque torporis specie: intel-
 ligimus enim illud malum, in quo necessario
 tactus imminuitur, interdum & motus voluntarius viola-
 tur, dum enim vitium est in tactu, non necessario etiam est
 in motu, cap. 5. lib. 1. de sympt. caus. In sensu enim tantum
 est vitium, si afficiantur nervi sensitui. Quod si motus vo-
 luntarius solum vicietur: nisi admodum insignis sit læsio,
 tunc est noxa in nervis motuiis. Cum ergo detur torpor, in
 quo vitium tantum est in tactu, sine vitio motus: detur
 etiam torpor in quo est vitium solum in motu, sine vitio in
 tactu: nos per torporem intelligimus illud malum, in quo vi-
 tium necessario est secundum tactum, vt tactus locum obti-
 neat principalem: nec præter rationem: nam omnes nervi
 sunt sensitui, non omnes motui: ac proinde sensus tactus
 principem locum sibi vendicat. Torpor, sic acceptus, gene-
 ratur, dum corpori nervoso occurrit causa morbifica, vi cu-
 ius necessario afficitur corpus nervosum, propter imminu-
 tam receptionē obiecti tactus: & quâdoque etiâ ita afficitur,

Generatio.

vt motus quoque laedatur. Cū autē vitium in motu nō habeat locum in quolibet torpore, in definitione omittēdum. Torpor igitur exquisitus & genericus, est receptio imminuta obiecti tāgibilisnerui sensituii,depēdēs à frustratione tactus.

Definitio.

Forma torporis,est receptio imminuta obiecti tangibilis.

Forma.

Dicitur receptio, ad differentiam iudicij:nisi enim error fieret in receptione, non esset error in iudicio. Dicitur receptio imminuta: ad differentiam receptionis corruptæ, quæ fit in dolore:& ad differentiam, receptionis ablata, quæ locum habet in paralyfi. Additur, obiecti tangibilis: ad differentiam obiecti visibilis: si quidem & visio imminuta potest statui stupor oculi: at non est stupor exquisitus, de quo loquimur, ad tactum pertinens.Sed dubitatur:nam Gal. tap.2. l.2. loc.aff.ait, stuporem esse insignem refrigerationem. Responsio: Galenus ibi respicit ad stuporem, vt effectiue consideratur:nos autem in præsentia eum sumimus formaliter. Quare stupor exquisitus semper est receptio imminuta obiecti tangibilis.Sed quandoque fieri potest, vt stupor habeat annexum vitium in motu: quemadmodum accipitur à Galieno cap.1.l.1.de sym. caus. vbi ait, torporem esse compositum è difficultate sensus, & motus:vt à paralyfi non genere differat, cum & hæc pertineat ad sensum, motumque voluntarium, sed magnitudine, quia paralyfis producitur à causis validioribus. Sed notandum, si in stupore sensus imminuatur, & coniunctum sit vitium in motu: motum esse prauum, seu corruptum, præsertim vt membrum decedit, quemadmodum euidenter scribit Galen. cap.2.lib.2.de caus. symp. Differt autem torpor à tremore:quia in torpore,dum cadit membrum, non ilico sursum attollitur, sed interiecto euidenti interuallo:& ratio est, quia virtus imbecillior est in torpore, quam in tremore:vnde torpor est incipiēs paralyfis.

Subiectum torporis, est neruus, quatenus est sensituius: *Subiectū.* & proinde neruus mollis, qui est sensituius: & durus, quatenus, potest esse sensituius. In omni ergo torpore, subiectum est neruus, vt sensituius: in aliquo torpore, est neruus, vt motuius. Hinc Galenus ait, torporis causam contentiuam esse in neruo, cap.5. l.1.de sym. caus. Sed oritur dubium, è cap.2. l.2. loc.aff. vbi Galenus confutat Archigenem, dicentem, quod stupidus dolor pertineat ad neruos: stupor enim, ait Galenus, est indicium dispositionis, id est, frigiditatis, non autem loci: nam stupor non modo ad neruos pertinet, sed etiam ad

ad venas, arterias, carnes, &c. Responsio. Stupor dupliciter sumi potest: primo, vt sensibilibiter non appareat, & sic stuporis subiectum potest esse pars alia à parte nervosa: sed hic non est stupor exquisitus: secundo, vt sensibilibiter appareat, & sic residet in tali subiecto, quod suos affectus potest sentire, & pro voluntatis imperio moueri potest: & hoc subiectum est neruus.

Causa efficiens.

Tandem in definitione diximus, dependens à frustratione tactus: nam modo frustratur solum tactus: modo cum facultate tactrice frustratur etiam facultas motrix. Quare intelligendæ sunt causæ, ob quas hæ facultates frustrantur. Frustrantur igitur, vel ob Morbum, vel ob Errorem externum.

1. Angustia.

Si ob morbum, est affectus, qui cum Galeno c. 3. l. 1. de sym. caus. est stuporis causa continens: in quo stupore facultas læditur, & proinde ob morbum: vt iure Galenus proponat stuporem succedentem repletioni. At morbus talis est, vi cuius in cerebro ad neruos virtus transmitti prohibetur: quare hic morbus necessario est nerui angustia: vnde hunc stuporem Auicennas nominat morbum instrumentalem. Cæterum hæc angustia non est integra: est tamen intensior, quam in tremore: vnde torpor leuis paralysis dicitur, cap. 2. lib. 2. de caus. symp. Angustia hæc, cum Galeno cap. 5. lib. 1. de sym. caus. in neruo meatu habente, id est, in neruo optico, est obstructio & compressio: in neruo autem non habente meatu, est conspissatio, subsidentia (quæ densitas dicitur, cap. 2. l. 2. de caus. sym.) & compressio. De vitio nerui optici, in affectib. oculorum loquimur. Quoad angustiam nerui meatibus destituti: conspissatio est, dum neruus crassescit, duriorque euadit, vt pori occludantur, & impediatur transitus facultatis, id est, radiorum spirituum animalium. Nerui autem crassiores & duriores euadunt, propter succum glutinosum & crassum.

Consipissatio.

2. Bulbus.

Qui succus est vel alimentalis, vel excrementitius. Alimentalis, si nerui alimentum sit crassius & viscidius: Succus autem est excrementitius, si torpor fiat è suppressa aliqua euacuatione: vnde Galen. ait; torporem fieri ab humore excrementitio, cap. 2. lib. 1. de caus. symptom. Subsidentia fit à frigore violento: & secundum Auicennam, à siccitate, & humiditate: à siccitate, quatenus per hanc neruorum fibræ & membranae, id est, partes extrinsecæ colliguntur & vniuntur ab humiditate, quatenus nerui remolliuntur, vt claudantur pori. Compressio morbosa: (ad differentiam compressionis

Subsidentia.

Compressio.

non

non morboſæ, quæ, verbi gratia, fieri poteſt à ligamentis) ſit à cauſa, reſidente quidem extra neruum. ſed in corpore: vt, à tumore vel inflammatorio, vel non inflammatorio. Quod ſi *2. Error* facultas fruſtretur ob errorem externum: hic error attinet, *externus.* vel ad Virtutem, vel ad Membrum. Si ad virtutem: idem eſt dicendum, quod in tremore: Nam ſpiritus vel non gignun- *Vitium ſpi* tur, vel reſoluuntur: non gignuntur vitio agentis, ſi caput *ritium.* ſit frigidius, vt in ſenioribus: non generantur, vitio materiæ, dum deſicit alimentum, ob cauſas vacuantes. Si reſoluuntur ſpiritus: ſit ſtupor, dum proxima eſt ſyncope, & dum mors eſt propinqua. Si error pertineat ad membrum, cum Auicē- *Vitium ca* na, pertinet ad calidum innatum membri, quatenus calidum *lidi inna-* innatum patitur ſecundum complexionem, ſecundum ſub- *ti.* ſtantiam, ſeu quantitatem. Secundum complexionem patitur à cauſis refrigerantibus, vt ab opiatīs, ſcorpione aquatico, torpedine piſce, cap. 8. lib. 5. de vſu. par. cap. 2. lib. 2. loc. aff. hæ enim cauſæ ſpiritum ſeu calidum inſitum refrigerant. Vnde notandum, cauſam refrigerantem dupliciter agere poſſe: primo, vt denſat, vnde ſtupor ſit læſa facultate, ob morbum: ſecundo, vt minuit, ſeu remittit caliditatem caloris innati: & tunc ſit ſtupor ob errorem externum, non læſa facultate. Patitur autem calidum innatum ſecundum quantitatem, dum eius ſubſtantia, vi caliditatis vehementis diſſolvitur: vt contingere poteſt in balneis calidioribus, in febribus ardentibus. Hæ ergo ſunt ſtuporis cauſæ: & formæ eadem, quæ in tremore: vt differentia tantum ſit ſecundum magis & minus.

Quoad differentias à forma: Receptio imminuta obiecti *Differentia.* tangibilis, vel Simplex eſt, vel etiam Comiuſta cum læſione motus. Ratione ſubiecti: ſumuntur differentię & à neruo, & à nerui ſede: A neruo: nam hic vel tantum eſt Senſitiuus: vel & Senſitiuus, & Motiuus. A ſede nerui: nam neruus pertinet vel ad Totum, vel ad Partem. Quoad cauſam efficientem: ſtupor ſit læſa facultate, aut ob errorem externum. Si læſa facultate: ſi propter Conſtipationem, Denſitatem, vel Compreſſionem. Si ob errorem externum, pertinet ad Virtutem, vel ad Membrum.

Stupor in genere patet è verbis ægrotantis, nam æger fatetur ſe tactilia ægre percipere, &, ſi moueri cogatur, dolere, ſi quieſcat, non dolere, cap. 2. lib. 2. loc. aff. Cauſa autem cur per motum dolor excitetur, per quietē, nullus eſt: quia cum

in stupore sensus sit imminutus, facultas non insurgit ad expellendum excrementa tertiæ coctionis: dum autem homo mouetur, hæc excrementa agitantur, vnde expultrix cum impetu insurgit ad expellendum: & quoniam hæc excrementa tertiæ coctionis vi mouentur, soluunt continuum, vnde dolor fit: in quiete autem non soluitur continuum, ideoque non fit dolor. Sed hæc quaestio satis est difficilis. Differentiæ ratione formæ, num læsio sit tantum in tactu, an vero etiam in motu: manifestæ fient ab ægris. Ratione subiecti: si differentiæ, sumantur à nervo: an læsus sit nervus sensitivus, an morivus: æger patefaciet. Si sumantur differentiæ à sede nervi: an afficiatur pateriens secundum totum, vel secundum partem: cognoscetur è symptomatis, totum vel partem affligentibus. Ratione causæ efficientis: idem dicendum, quod de tremore.

Signa differentiæ.

Indicationes.

Prognostica.

Quoad præsidia: conueniunt cum tremore: cura enim stuporis & tremoris eadem.

Vitium hoc despiciendum non est: si enim protrahatur, degenerat in apoplexiam, epilepsiam, spasmus, & potiss. paraly sin, cum sit levis paraly sis. Augetur vero periculum, pro vehementia differentiarum. Quoad formam: stupor periculosior, si noxa est, & in sensu, & in motu: & præsertim si noxa sit vehemens, & perdurans. Ratione subiecti, vt significat vehementiam dignitatis, stupor est periculosior, quo plures partes occupantur: & quo viciniore sunt cerebro. Ratione causæ efficientis idem dicendum, quod de tremore. Sed notandum cum Auicenn. si stupor sit in toto, hominem mori vna die. Non loquitur hic Auicennas de quolibet stupore: nam paraly sis ad totum pertinens, non perimit hominem vna die, licet multo sit vehementior, quam stupor: loquitur autem de stupore, procedente ex insigni spirituum resolutione: vnde Auicennas dicit, hunc esse stuporem, qui euenit prope mortem, in hoc enim stupore nulla prorsus desideratur vehementia. Secundo, Auicennas dicit: torporem à siccitate difficillime curari, quia adest insignis vehementia ratione essentia.

Curatio.

Materiæ eadem locum hic habent, quæ in tremore: vnde nec à Paulo, neque ab Aëtio proponuntur.

CAPVT

CAPVT XXIII.

De Paralyſi.



QVONIAM torpor est leuis paralyſis, ideo iam de paralyſi dicemus. Per paralyſin, ſeu reſolutionem, intelligimus exquisitam: vitium ſcilicet in quo auferitur motus voluntarij: quamuis interdum auferatur ſolum motus, interdum cum motu etiam ſenſus: ea tamen ratione, vt non lædatur facultas principalis, nec omnes corporis partes, reſoluantur, quoniam non eſſet paralyſis, ſed apoplexia. Generatur paralyſis, dum corpori occurrit aliquid præter naturam, vi cuius muſculus orbatur facultate motrice, vt prorsus mouendi munere priuetur: vnde membrum concidere neceſſe eſt. Paralyſis ergo eſt motus ablaſus muſculi, dependens à fruſtratione facultatis motricis. Definitio hæc explicatur cum Auicenna in prop. cap. & cum Galeno cap. 6. & vlt. lib. 1. loc. affect. cap. 7. lib. 3. de loc. affect. cap. 3 & 4. lib. 4. loc. affect. cap. 5. lib. 1. de cauſ. ſym. ca. 2. lib. 2. de cauſ. ſym. cap. 5. lib. de atra bile. Forma eſt motus ablaſus: ad differentiam ſtuporis, in quo imminuitur, videlicet, ſecundum motum ſuſum: & ad differentiam tremoris atque conuulſionis, in quibus vitiis motus deprauatur. Sed in paralyſi motus ablaſus interdum eſt ſolus, interdum coniunctus eſt ſenſus ablaſus, cap. vlt. lib. 3. de loc. affect. Subiectum eſt muſculus, qui eſt organum motus voluntarij: non autem ſubiectum eſt corpus vniuerſum, ſic enim eſſet apoplexia.

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Subiectum.

Cauſa efficiens.

Cauſa efficiens eſt fruſtratio facultatis motricis: qua diſtinguitur motus ablaſus in paralyſi, à motu ablaſo diuerſo à paralyſi. Nam, ſecundum Galenum cap. 2. li. 2. de cauſ. ſym. quies eſt triplex: vna eſt, quæ fit à ſola potentia, dum videlicet brachium ſublatum immotum ſeruatur, vnde hic eſt motus tenſius, qui fit à ſola potentia: & hæc quies non habet locum in paralyſi: altera quies nec procedit à potentia, nec à cauſa morbifica, dum ſcilicet ſanum brachium ſuper ſolidum aliquod reclinatur, vt quieſcat: in qua quiete facultas non fruſtratur, ſed potius ſecundum naturam otio fruitur: ideoque nec hæc quies in paralyſi locum habet: tertia quies proficiſcitur à cauſa morbifica, vi cuius facultas

*Frustratio
facultatis
motricis.*

*1. Si facul-
tas influens,
non susci-
piatur.*

motrix otari cogitur, queadmodum in paralyfi. Intelligen-
dum igitur, qua ratione muscoli frustrentur facultate mo-
trice. Dicimus ergo frustrari facultatem, quoniam vel Læ-
ditur, vel Error aliquis externus occurrit. Facultas læditur:
dum in musculo motui destinato, & motu priuato, adest
morbus. Error autem externus locum habet: dum vitium
est extra musculum, siue illud vitium sit morbus, siue non
sit morbus. Quare in paralyfi, musculus motui destinatus
priuatur vi animali, quoniam hæc vel à cerebro in muscu-
lum influens, non suscipitur, vel quoniam non influit. Non
suscipitur à musculo: ob intemperiem muscoli vel frigidam,
vel frigidam & humidam: non autem fit paralyfis (secundū
Auicē.) ob intemperiem calidam, nec ob intemperiem sic-
cam, alias etiam corpora, hæctica febre correpta, paralyfi
afficerentur: quod tamē non accidit: Ratio est, quia calidum
non aduersatur radiis spirituum animalium, nec aduersatur
calido insito ipsius muscoli: contra, frigidum inimicum est
& radiis & calido insito. Non ergo intemperies calida, sed
frigida potest esse causa paralyfis. Et potuit hoc Auicē.
accepisse à Galeno, qui cap. 6. lib. 1. de loc. affect. admittit, pa-
ralysin in quibusdam fieri corporibus, quæ resident super
lapides frigidos, vel diu versantur in aqua frigida: vt hinc
musculi refrigerentur, & non possint facultatem admitte-
re. Notandum autem hanc frigiditatem pertinere ad mu-
sculos: sed potissimum secundum portiones nervosas. Præterea hæc
causa refrigerans, est vehemens, longe diuersa, à frigiditate
& humiditate hypofarcæ, in qua nec afficiuntur nervi, neq;
vsque adeo vehemens est frigiditas: vnde nec paralyfis fieri
potest. Et cum hæc intemperies pertineat ad musculos, se-
cundum partes nervosas, hæc intemperies non habet locum
in ductibus, seu viis, per quas facultas influit, quia per ductus
solum influit facultas animalis cum radiis: at muscoli mul-
tifariam concurrunt: nam facultas per musculorum nervos
influit & suscipitur: præterea à musculis fit motus, seu actio:
ob id non in ductibus, sed in musculis dyscrasia frigida est
causa paralyfis. Porro, si fiat paralyfis, quoniam facultas à
capite ad subiectas partes non influit: tunc non influit, vel
quia transmittitur quidem, sed prohibetur transitus: vel quia
non transmittitur. Transitus prohibetur ob morbum vel
nerui, vel spinalis medullæ: & si nervi, vel in musculo, vel
extra musculum: inter morbos tamen in nervis, & in spinali
medulla,

*2. Si facul-
tas trans-
mitte-
tur, non
prohibe-
atur.*

In medulla, exiguum est discrimen: quod si enim nervi musculorum resoluantur, est paralyſis per eſſentiam: ſi reſoluantur nervi extra muſculos, vel ſpinalis medulla, eſt paralyſis per conſenſum. Sufficiat ergo hoc loco ſimul recenſere morbos, tum nervi in muſculis, & extra, tum ſpinalis medullæ. Morbus ergo eſt, vel ſoluta unitas, vel anguſtia. Soluta unitas eſt cauſa paralyſis: quia viſ animalis, ſecundum naturæ leges, inſluit per nervos continuos: hinc Galen. cap. vlt. lib. 3. loc. aff. ait, paralyſin interdum fieri propter ſpinæ intioſionem. Anguſtia eſt morbus pororum: nimirum conſtrictio ſeu repletio, id eſt, compreſſio: deinde conſtipatio, quæ improprie vocari poteſt obſtructio: denique denſitas: nam eadem ſunt cauſæ ſtuporis & paralyſis, magnitudine tantum differentes, cap. 3. lib. 1. de cauſ. ſym. cap. 2. lib. 2. de cauſ. ſym. Cum ergo eadem ſint cauſæ: breuiter quædā monebimus, circa compreſſionem, conſtipationem, & anguſtiam compositam e compreſſione atque conſtipatione. Compreſſio fit e luxatione vertebrarum: non tamen quælibet luxatio vertebrarum ſpinæ eſt cauſa paralyſis, cap. 3. lib. 4. loc. affect. nam primum oportet, vt luxatio aſtatim & repente fiat, non ſenſim, alias non excitat paralyſin: præterea ſi luxatio fiat ſecundum rectitudinem, non fit paralyſis: ſi in obliquum, ſiquidem luxatio fiat in vertebris ceruicis, fit paralyſis: ſi fiat ſecundum lumborum partes, non fit paralyſis: ratio eſt, quoniam in lumbis totus nervus prodiit e vertebra ſuperiori: in ceruice autem e loco medio inter vertebram ſuperiorem & inferiorem: vt neceſſario in ceruice nervus comprimatur, præſertim ſi ſubſequatur inflammatio. Conſtipatio fit, quoniam nervi replentur, à ſucco craſſo, vel alimentali, vel excrementitio. Quoad excrementa, Avicen. inſinuans differentiam inter conuulſionem & paralyſin, ſtatuit, materiam excrementitiā morbiſicā in ſpāſmo occupare nervos, ſecundum partes externas, ſeu membranofas, à meningibus prodeuntes: in paralyſi autem occupare nervorum partes internas, ſeu medullares, prodeuntes à cerebri ſubſtantia. Anguſtia, miſta e compreſſione & conſtipatione, prodiit à tumore: nam tumoris materia, vt penetrat, habet vim conſtipandi, vt comprimit, habet vim comprimendi. Si denique fiat paralyſis, quoniam viſ non tranſmittitur: eſt paralyſis, quæ ſuccedit inflammationi vulnerum muſculorum temporalium: fit autem quoniam viſ animalis confluit in partem

*Solutio
unitatis.*

Anguſtia.

1.

2.

3.

3. Si facul-
tas non
transmit-
titur.

inflammata, vt pars illæsa paralyti, afficiatur. Omitto cerebri morbos: nam si vñ horum morborum non transmitteretur facultas, fieret potius apoplexia.

*Differen-
tia.*

Quoad differentias à forma vel Motus solus est ablati, vel simul etiam sensus. Ratione subiecti: paralytis attinet vel ad Dextram partem, vel ad Sinistram, vel ad Vtramque: Et hinc, ad Caput, vel Infra: Et si infra, ad artus Supernos, vel Infernos. Quoad causam efficientem: in paralyti virtus vel non Inluit, vel non Suscipitur: si non inluat, vel non Transmittitur, vel Retrocedit, vt in inflammatione, quæ subsequitur vulnus musculorum temporalium.

Signa.

Paralytis in genere, patet: et etiam secundum differentias à formis, & subiectis. Differentiæ à causa efficiente, patet: è traditis in sermone de torpore. Breuiter tamē sciendum si paralytis fiat, quoniam si facultas non suscipitur ob frigiditatem, cognoscitur è causis prægressis, refrigerantibus. Verbi gratia, si fuerint applicata opitata, si homo sederit super lapidem frigidum, vel etiam diu in aqua frigida fuerit commoratus. Si fiat paralytis, quoniam virtus non inluit: si fiat ob partium morbos: cognoscere oportet morbos, & morborum sedem. Morbus autem est soluta vnitas, vel angustia. Soluta vnitas facile cognoscitur, nam prægressa est causa incidens, vt post inentionem statim subsecuta sit paralytis. Angustia, densitas, compressio, constipatio, mistusque affectus è compressione & constipatione, facile cognoscuntur è traditis de torpore: verbi gratia, densitas cognoscitur è prægressa causa refrigerante: compressio, ex ictu, è luxatione: constipatio, è præcedente victu crassiore, è suppressa aliqua euacuatione: affectus mistus è compressione & constipatione, cognoscitur è signis, indicatibus tumores. Morbi sedem quod attinet, num sedes sit musculus, an vera sedes sit extra musculum, cognoscitur è cap. 6. lib. 1. loc. aff. Verbi gratia, si malum sit in musculo, vt in musculis manus, cognoscitur è prægressa percussione, vel frigiditate secundum manum: & præterea è macie secundum manum, quia ratione quietis, quæ est in paralyti, pars emaciatur: cognoscitur etiam, si iuuant ea, quæ parti resolutæ, id est, manibus, applicantur.

Quoad si contra euegiat: iudicandum est mali radicem esse extra partem affectam, extra musculum. Vtrum autem mali sedes attineat vel ad nervos, vel ad spinalem medullam: cognoscitur è cap. 3. lib. 4. loc. aff. ad quam rem opus est tenere originem

Originem neruorum, tum à cerebro, tum à spina. Postremo, si fiat paralyfis, quoniam facultas retrocedit: cognoscitur è prægresso vulnere musculorum temporalium, præsertim dum inflammatio subsequitur.

Præsidia sumuntur, sicut etiam in tremore, à subiecto, & *Indicatio*
causa efficiente. Ratione subiecti, seruanda est corporis ner-
ues.

uosi proportio. Ratione causæ efficientis, patet, si fiat, verbi gratia, ob frigiditatem, membrum esse calefaciendum: si fiat, quia vis non influit, propter solutam vnitatem, oritur indicatio vniendi: si propter densitatem, calefaciendi: quia densitas non est ex vñu, sed causa densitatis, nimirum frigiditas. Si morbus sit compressio: si à luxatione, vel à tumore: his occurrendum: vnde, verbi gratia, oritur indicatio, os reponendi in propriam sedem, & sic de reliquis. Si morbus sit constipatio: si fiat ab alimento crasso, oportet attenuare: si ab excremento, oportet excrementum euacuare. Si morbus sit mistum quid è constipatione & compressione: indicatio sumenda est à tumore. Si denique paralyfis fiat, quia facultas retrocedit: occurrendum vulnere musculorum temporalium.

Licet paralyfis hominem non occidit, ita tamen ad functiones ineptum reddit, vt eum mori satius esset, cap. vlt. li. 3. *Prognosis*
ca in genere.

loc. aff. non ergo negligenda. Varie autem prognosticandum, pro vi differentiarum. Paralyfis in genere maxime est periculosa, si præter essentia vehementiam, coniungitur etiam vehementia facultatis, verbi gratia, si membrum resolutum, magnitudinem, & colorem naturalem seruat, non est vehementia facultatis: contra, si non seruat: & præsertim (quemadmodum Auicen. notat) si lateris resoluti oculus imminuatur: hæc enim indicant facultatis imbecillitatem, vt membrum non possit nutrir: & oculus imminutus indicat etiam spiritus animalis defectum: quare est insignis vehementia ratione facultatis. Quoad differentias à forma: paralyfis minus est periculosa, si solum lædatur motus; vel sensus: magis, si in vtroque sit noxa. Quoad subiectum, paralyfis

Prognosis
ca differentia.

1.

2.

3.

1.

2.

est peior, in qua plures musculi corripuntur: est enim signum vehementia secundum essentiam, & formam, & efficientis. Quoad differentias à causa eff. si fiat paralyfis, quoniam non suscipitur facultas, ob musculum frigiditate affectum: hæc est curabilis: vnde piscator ille, cap. 4. loc. 3. de loc. aff. celeriter sanatus est. Si paralyfis fiat, quoniam prohibetur transitus facultatis animalis: si morbus sit soluta vnitatis: est paralyfis

incurabilis, quia nervus sectus coalescere nequit. aph. 19. sc. et 6. & propterea in talibus paralyticis curatio non aggredienda. Si angustia sit densitas: & hæc paralytis facile curatur: nam est affectus frigidus, qui à calido potest vinci. Si angustia sit compressio, si simplex sit compressio, siquidem pendeat à luxatione vertebrarum: cum Avicen. ut plurimum est lethalis: nam nervi insigniter contunduntur atque atteruntur: & præterea luxatas vertebrae, ad pristinam sedem reuocare, est admodum arduum. Si compressio sit ex ictu, secundum Avicen. si nervi vehementer conterantur: malum est incurabile: si non vehementer atterantur: est curabile. Signum autem est nervos vehementer atteri, si post ictum ilico oriatur paralytis: si non ilico oriatur paralytis post ictum, non vehementer conteruntur nervi, sed sit potius paralytis, ratione phlegmones quæ ictui succedit. Si autem angustia sit constipatio, si fiat ab alimento crasso: vix curari potest: ut etiam, si fiat ab excremento viscido, cap. 4. lib. 4. loc. affect. Si angustia sit vitium, mistum est compressione & constipatione: cum causa sit tumor vel inflammatorius, vel non inflammatorius: uterque tumor vinci potest: at facilius tumor inflammatorius: unde Galenus, respiciens ad tumorem inflammatorium, cap. 6. lib. 1. loc. affect. paralytin ex inflammatione spinæ curari 7. diebus: respiciens autem ad tumorem non inflammatorium, qui ad scirrhum vergit, cap. 4. lib. 4. loc. affect. gloriatur se hominem perfecte sanasse, qui afficiebatur paralyti ob tumorem non inflammatorium. Si fiat paralytis, quoniam virtus retrocedit: hæc ut plurimum est lethalis: nam vulnera, & inflammationes musculorum temporaliū, ita se habent, ut nulla prorsus desideretur vehementia.

*Curatio.
Vene sectione.*

Quoad materiam cheirurgicam: quædam notanda circa venæ sectionem, cucurbitulas, fonticulos. Quoad venæ sectionem: in paralyti secanda vena, si sanguis vehementer peccet. Peccat autem sanguis in paralyti: sub ratione causæ principalis, si paralytis fiat ab inflammatione, cum hæc à sanguine fiat. Peccat etiam sanguis quandoque, ut causa sine qua non potest fieri curatio, per alia remedia: ut si sit sanguis copiosus. At notandum, non esse in paralyti vacuandum sanguinem ea copia, qua peccat, verbi gratia si peccet ad lb j. Tatis est vacuare ad 3 viij. Ratio est: quia, secundum Aëtium, partes resolutæ, causa quietis refrigerantur: ut non sint magis refrigerandæ, per copiosam sanguinis euacuationem.

Quoad

Quoad vsum: dicemus quædam, circa Quædo, & Vbi. Quoad quando: Auicennas & Alexander secant venam ante alias materias: nam sanguis vincit alia indicantia: ideoque in paralyfi, secundum Aëtium, à venæ sectione ordiendum. Quoad Vbi: Aëtius monet, detrahendum esse sanguinem à parte sanam: nam in hac sanguis redundat, & virtus partis sanæ permittit. Quoad cucurbitulas. Auicennas probat & scarificatas, & non scarificatas: vt scilicet fiat vacuatio sensibilis, & insensibilis. Scarificatæ probantur: si paralyfis materia sit copiosa, non impacta: non scarificatæ: si sit impacta. Quoad vsum. Quando: Si cucurbitulis vtamur causa materiæ existens in loco affecto, oportet his vti post venæ sectionem: nam fluxa materia, vincitur à materia existente in toto. Vbi Auicennas applicat cucurbitulas super capita musculorum. Si pars non admittat cucurbitulas: secundum Aëtium hæc applicari poterunt partibus vicinis. Quoad cauteria: Aëtius vrit circa cavitatem occipitij, in sutura coronali, & circa futuram coronalem ad latera: & inquit beneficio vlcerū fluentium, hominem sanitatem recuperare. Conueniunt autem cauteria, non in omni paralyfi, sed in ea, quæ producitur à pituita, genita in capite: & quæ producitur à spinali medulla. Si ergo materia morbifica subsistentiam habet in principio spinæ, & in capite: Aëtius vlcera excitat, & in occipitio, & sutura coronali. Vnde si constipatio pertineat ad os sacrum: etiam hæc pars inurenda est.

Medicamenta alia sunt Vacuantia, alia Alterantia. Vacuantia vacuant Sensibiliter, vel Insensibiliter. Alterantia respiciunt vel morbum vel proportionem neruorū. Quoad vacuantia, & primum per meatus sensibiles: in paralyfi frequentiore, quæ producitur à constipatione, ob pituitā: Auicennas cap. 1. de neruorum malis, probat purgantia vehementia: quia materia morbifica est crassa & viscida: nec virtus permittens desideratur, cum nerui non sint partes principales. Probat igitur *pilulas de euphorb. Rhafis* probat *pilulas fetidas*. Alexander probat *bieras magnas, recipientes colocynthidem*. Quoad *pilulas fetidas*, componuntur è medicamentis purgantibus in secundo, tertio, quarto, gradu: in secundo quidem gradu purgat *centauryum minus*: in tertio, *biera, sagapenum, apopanax, colocynthis*, quæ purgat in tertia mansione tertij: in quarto purgat *euphorbium, elaterium*. Cum his purgantibus, in harum pilularum compositione, miscetur co-

Cucurbitula

Cauteria

Medicamenta

1. Vacuantia sensibiliter.

Pilule fetide.

*Hiera Ale
xandri ca.
16. lib. 1.*

piofiora adiuuantia, quam corrigentia: vnde hoc medica-
mentum est purgans in tertio, circa tertiam maffionem. Est
autem pilularum fœtidarum dosiſ minima, ʒ ij. vel ʒ ʒ. ſum-
ma ʒ viij. vel ʒ ij ʒ. quæ ſumma doſiſ, eſt pars decima totiuſ
compoſiti medicamenti. Sed dubitatur: nam ſi pilulæ fœtidæ
exhibeantur in ſumma doſiſ, nimirum ad ʒ ij ʒ. tunc euphor-
bium exhibebitur vnica vice ad ʒ xv. cum tamen ſumma
eiuſ doſiſ non excedere debeat ʒ xij. Reſponſio, Pharmaca
purgantia ſi ſola exhibeantur, non debent ſummam doſin
transcendere. Quod ſi autem pharmacum ſoluens cum aliis
exhibeatur, liquidem non fiat fermentatio: ne tunc quidem
purgans vltra ſummam ſuam doſin exhibendum. Si autem
fiat fermentatio, licet ſummam doſin transcendere, quia fer-
mentatione viſ purgantium refringitur. Quare pilulæ fœ-
tidæ, niſi ſint fermentatæ, non ſunt in hac doſi exhibendæ:
*Hiera Alexandri, componitur ex aloe, agar, polypodio, opopanace,
ſagapeno, veratro, colocynthide, ſcammonio: miſcetque Alexan-*
der, accommodata tum adiuuantia, tum corrigentia. Dubi-
tatur autem de ſcammonio. Nam Alexander monet, dum
exhibetur medicamentum purgans, nihil eſſe miſcendum
loco ſtimuli, qualis ſtimulus eſt ſcammonium: nam purgans,
propter ſcammonium, ſeu ſtimulum, redditur inutile: dum
enim volumus purgare pituitam, vel melancholiam, quæ
materiæ cum difficultate purgantur: non prodeſt medica-
mentum purgans cito ad ventrem deſerri, ſed expedit, vt
diu moretur in ventriculo, vt efficacius agat, & melius viſ
purgantis diſtribuitur. Hoc pernoſcens etiam Auicennaſ,
ſubet vt poſt hieram non bibatur aqua, vel propinetur ali-
quod dilutum: quo ſcilicet hiera in ſtomacho moretur. Qua
ergo: ratione Alexander, in compoſitione illiuſ medica-
menti, ad purgandum pituitam, immiſcuit ſcammonium?
Reſponſio: Si hac fermentatio, poteſt ſcammonium miſceri
cum medicamentis: & ſic Alexander hic miſcuit. Si autem
non fiat fermentatio medicamenti, ſi exhibeatur ad ma-
teriam frigidam purgandum: cum Alexandro nil eſt miſ-
cendum, quod ſtimuli habeat rationem, neque ſcammo-
nium, neque aliud. Si autem medicamentum purgans non
fermentatum exhibeatur, ad purgandum materiam cali-
dam vel bilioſam, licet miſcere aliquid loco ſtimuli: cum
enim purgans ſit calidum, prodeſt vt diu non moretur in
ventriculo & corpore: dum enim materia calida eſt pur-
ganda,

ganda, probabile est, corpus etiam esse calidum: ideoque hoc non est reddendum calidius, ob moram longam purgantis. Hinc Hippocrates comm. 12. libro secundo de ratione vitæ, quia vitium erat febrile & calidum, post purgans ilico exhibet *ptisanam*, ut medicamentum non diu moretur, sed statim descendat. Quoad usum, digrediamur tantum circa usum. Quantum, & Quando. Quoad quantum: Rhasis exhibet pilulas fortidas ad 3. j. si quæ summa est dosi, potestque imminui, pro aëritate causæ. Quoad quando agendum, Avicennas ait, fortiora medicamenta esse exhibenda, solum post quartum, septimum, vel decimum quartum diem: quia ante quartum diem magis potest cruditas ad prohibendum purgans. Nec obstat, quamvis dicat Rhasis, curam esse incipiendam à pilulis fortidis: nam Rhasis comparat materiam non crudam, cum morbificam, sed materiam existentem in toto, ad differentiam materię existentis in parte: quia dubio procul inchoandum est à purgatione totius, sed, ut diximus, post quartum: propterea quod procedente malo, materia morbifica magis potest ad indicandum, quam cruditas ad prohibendum. Notandum etiam circa quando agendum: Rhasin pilulas exhibere pluribus diebus, nam dabat singulis tribus diebus, tribus vicibus: deinde ante quartam vicem, quiescebat per aliquot dies: ratio est, quia respiciebat ad vim materię indicantis, & virtutis permittentis: quia enim materia diu est præsens, ob id pluribus vicibus purgans est propinandum: causa autem virtutis, penitus nulla, quia melius fert virtus.

Medicamenta vacuantia insensibiliter, cum Avicenna, debent esse fortia & pingua. Fortia hoc est vehementer calida, & admodum tenuis substantię: & ratio est, quoniam nervi & spinalis medulla profundas sedes obtinent. Debent esse pingua, ut horum ope medicamenta fortia diutius hæreant, nec eorū vis evanescat: & præterea pingua hæc medicamenta prohibent generationem scirrhi. Cæterum, quoniam medicamenta vehementer resolventia, minuunt substantiam calidi innati; Avicennas cum calidis in paralyti miscet frigida, quæ calidi insiti dissipationem prohibent: Avic igitur cum calidis miscet *semen cadiuini* & Gale. cap. 12. li. 7. *marz* 2. *iv*, miscet *oleum myrtinum*. Notandum autem ut refrigeratia, quæ cū calidis miscentur, sint moderata, non autem vehementia, ut est *opium*. Sed dubitatur, quia Gale. cap. 5. li. 6. *kará yiv*, ad

usum.

Causæ tan

sa dosi

vitendum.

Vacantia
insensibiliter.

ad paralyſin componit medicamentum ex opio & hyſeyamo;
 quæ vehementer ſunt frigida. Reſponſio. Frigida cum cali-
 dis biſariam poſſunt miſceri: nimirum vt agant vel in cor-
 pus, vel in medicamentũ calidum: ſi miſcentur frigida me-
 dicamenta, vt agant in corpus, non debent vehementer eſſe
 frigida: quia neruis aduerſantur: ſi autem miſceantur frigi-
 da, vt agant in medicamenta, & quidem in calida, non eſt
 inconueniens, frigidiora miſceri, vt opium: ſed tunc eſt ne-
 ceſſaria fermentatio, per quam frigida ita infringuntur, vt
 corrigant & conſeruent calida, nec corpus refrigerent, ſi-
 cut ante fermentationem: quemadmodum videmus refri-
 gerare theriacam recentem. His ita conſtitutis, patet, cur
 Arabes & Græci vtantur medicamentis calidis, miſtis cum
 emollientibus & refrigerantibus. Vnde in paralyſi probatur
 medicamentum filij Zachariæ, laudatum à Meſue, quod
 R. coſti ꝯ j. enphorij, piperis ana ꝯ j. cum iriſcentia, caſſorij ꝯ ſſ. olei
 de roſo tbb ꝯ ſſ. ſiut decoctio in duplici vaſe. Et ſi medicamentum va-
 letius deſideretur, addere licet ꝯ ij. vini generoſi, vt cyproj. & fiat
 C4.18. li.3. decoctio ad conſumptionem vini. Verum ne diffuat medicamẽ-
 tum, cum Paulo miſcenda eſt, pro ꝯ j. huius medicamenti,
 certe in vino lotæ ꝯ j. Meſues etiam ad paralyſin eſt denſita-
 res, probat medicamentum conſectum d'vulpe. Quare probatur
 oleum vulpini, & licet etiam vapore ventrem vulpis, aequali
 portione ſaluie, artemiſie, origani, baccarum lauri, ruæ, & potiſſi-
 mum radiorum vicia, & agreſtis: vel ſequatur vulpes, vel cum
 aqua muretis, & ſitum aqua ſulphurea, vel etiam cum vino, ad con-
 ſumptionem vulpis, vt fiat exalta decoctio. Et applicetur decoctio,
 applicetur ſitum vulpes: loca afflicta. Auicennas probat thermas
 reſoluentes, & dicit ad vſu & aqua, & luſia, & ſuſa. Probat etiam
 in hac paralyſi vapor, ſeu ſuffumigium d'pyrica, ſine molari la-
 pide, cum aceto medicato, & propoſiti medicamenti. Quod vſum.
 vſus reſol-
 mentum. Quantum: In hac paralyſi probatur ſumma doſis medica-
 mentorum: nam materia morbifica eſt frigida, craſſa, viſci-
 da, impaſta, ideoque tantæ eſt adiuuitatis, vt non cedat me-
 dicamentis, niſi vehementer agant, id eſt, niſi dentur in doſi
 ſumma ſita vt etiam quandoque ratione ſummæ doſis poſſit
 febris excitari: nam, ſecundum Auicennam paralytici à febre
 iunantur: vnde Rhazis conſcriptionem anacardinam, calidam in
 tertio gradu, exhibet ad ꝯ ij. noſtris temporibus aliquot grana
 dare ſolemus. Quomodo. Oportet hæc medicamenta admi-
 niſtrare eo modo, vt valide agant: quare Meſues iubet, vt in
 ſicco

sicco balneo fiat frictio partium, cum costo, cum aniso; danco, urtica, cum oleo confecto è sinapi, è scammonio, agarico, turbit, & colocynthide. Quando: Auicennas circa rubrificantia admonet, ne tanto tempore detineantur, vt locus exulceretur. Sed hinc quis inferre posset: Si locus non est exulcerandus. Ergo non probantur vesicatoria, & cauteria: quod tamen est falsum? Responsio. Si rubrificantia applicentur magnæ parti corporis, vt toti cruri: non debent detineri, donec exulceret: nam virtus partis prohibet, dum videlicet, pars, densitate affecta, est satis vasta & magna: tunc ergo tandiu detinenda medicamenta, donec pars rubicunda euadat: & dum pars rubicunda reddita comprimitur digitis, si rubicunda permaneat etiam post compressionem, ilico auferatur medicamentum, quia imminet exulceratio. At si medicamenta applicantur exiguæ parti corporis, vt osi sacro: tunc licet exulcerare. Quoad Vbi agendum: resoluentia sunt exhibenda per os, & applicanda. Quæ exhibentur, respiciunt materiã vbiq; subsistentem: hæc enim penetrant ad omnes corporis partes. Quæ applicantur, respiciunt materiam subsistentem in determinata parte. Notetur autem vt intus solum iucunda vsurpentur: quia oris & ventriculi virtus non permittit ingrata, quæ tamen interdum extra vsurpari queunt.

Alterantia respiciunt morbos, & neruorum proportionẽ. 2. Alterantia.
Quoad morbos: si est frigiditas, cum Galeno cap. 4. li. 4. loc. affect. probantur calorigifica: vt maxime probetur mora in vino alterato cum calefacientibus medicamentis propositis.

Medicamenta quæ respiciunt proportionem neruorum, Appropriata neruis.
sunt proposita in cap. de tremore. Maxime probatur acorus conditus saccharo, vel melle: item castorium, cerebrum leporis assum, grana pini magna, id est, matura. Et hæc sunt alterantia, quæ calefaciendo magis iuuant, ratione neruorum, quam ratione aliarum partium.

Quoad dietam, aer sit calidus & siccus ratione materiæ. Cibus autem sit attenuans, minuens, causa materiæ: at causa virtutis, cibus sit mediocris: causa proportionis neruorum, cibus debet confici, è seruantibus proportionem. Quare in paralyti probantur cibi optimi succi, conditi calefacientibus & siccantibus. Vnde recte Rhasis exhibet, ius cicoris, cum oleo & sinapi. Et Mesues dat cappares, conditas aromatibus. Abstinentium autem ab aceto, quod nimia violentia agit in neruos. Quoad victum imminuentẽ: hic admodum erit minuẽs: vnde

Dietæ.

unde Auicennas exhibet *aquam bordei*, non pro potu, sed pro cibo, *aquam melis*, *carnes lenis*, *uinum*. Ratione virtutis, *cibus erit mediocris*: vt *perdices*, *columbi*, *pulli gallinacci* moderata copia assumpti. Quoad cibum, qui seruat neruorum proportionem: Auicennas exhibet *nucleos pincos*, sed in secunda mensa, ideoque administrandi sunt pro opsonio in parua quantitate, & non pro condimento. Vnde errant, qui in paralyti admittunt magnam quantitatem pinearum; quia horum quidem & copulatum succum gignunt, sed crassum, & difficile coquantur: & proinde si pineæ vere pro cibo exhibeantur, victus non est tenuis, non mediocris, sed plenus, & crassefaciens, qui in paralyti maxime est noxius. Præterea, pro opsonio probatur *acorus conditus saccharo*, vel *mella: item, eryngij radices, similiter condite*. Quoad vsum. Quando cibandum. In paralyti est pituita, materia morbifica primis diebus vincit virtutem: & post quatuordecim dies materia vincitur à virtute; nam primis diebus materia est copiosior, nondum euacuata, virtus robusta, non defatigata à medicamento: contra, post quatuordecim dies: propterea ante decimum quartum diem, probatur victus minuens & tenuis: post decimum quartum diem probatur victus conseruans. Quoad potum. Auicennas probat magis *aquam*, in paralyti est pituita: nam vinum defert materias in neruos: & in paralyticis, utpote frigidityte, affectis, vinum facile acefcit: acida vero neruis inimica. Rhafis ergo probat *mulsam*, non admodum aquosam. Mesues parat *cum salua* & *matorana*. Verum in morbo longo, & potissimum causa ventriculi, licet etiam secundum Auicennam vinum concedere, sed antiquum, quia hoc non ita facile acefcit. Probat etiam medicatum, cum calidis, propositis in dolore capitis à pituita. Quoad vsum vini: quantum: in parua quantitate vinum est exhibendum: sic enim nec ita facile acefcit, nec defert materias in neruos. Quomodo: potus in paralyti non sit actu admodum frigidus, nam frigida nocent neruis, & secundum eorum temperiem, & secundum eorum calidum insitum. Quoad quando: vinum non est exhibendum ante quatuordecim dies, sed post.

CAPVT XXV.

De Conuulsione.



RE R. conuulsionem, seu spasimum cum Galeno cap. vlt. lib. de palpit. intelligimus prauum motum, quo membra ita afficiuntur, vt musculi ad propria principia vi contrahantur. Differt ergo spasmus à spasmate: nam spasma est malum, in quo nerui partes citra incisionem, experiuntur vnitatis solutionem, c. 2. lib. 1. meth. cap. 1. lib. 3. meth. cap. 1. lib. 6. meth. spasmus autem est motus prauus membri. Porro loquimur hic & de notha, & de exquisita conuulsione: quia amba genere conueniunt. Generatur autem conuulsio, dum causa morbifica occurrit neruo, cuius vi, nobis inuitis, musculi ad proprium principium retrahuntur: vt ad musculi retractionem, etiam membrum retrahatur, & motu conuulsiuo afficiatur. Conuulsio igitur est motus prauus retractionis mobilis, dependens à musculis contractis præter naturam à neruis. cap. 1. & 2. lib. 2. de caus. sympt. cap. 8. lib. 1. de motu muscul. Forma est motus prauus retractionis, cap. 1. lib. 3. de caus. sympt. quo cōuulsio distinguitur à paralyfi, in qua nō est motus prauus, sed ablatas. Additur retractionis, ad differentiam tremoris, in quo motus est sursum ad deorsum: at in conuulsione est motus prauus, sed retractionis. Ratione mobilis, hic motus est affectio: ratione agentis, est actio: animalis quidem in legitima conuulsione, naturalis in spuria. Subiectum est mobile, seu id, quod motu voluntario mouetur, quod à musculo mouetur: & sic distinguitur hic motus prauus retractionis, à motu prauo retractionis in singultu, qui attinet ad ventriculum, qui non est organum motus voluntarij.

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Subiectū.

Causa efficiens, sunt musculi præter naturam contracti à neruis: nam conuulsio est motus inuoluntarius, in quo musculi ad suum principium retrahuntur, aphorism. 39. sectio. 6. Nam musculi in spasmo non extenduntur, non transferuntur, non tensi manent: sed contrahuntur, cap. 8. lib. 1. de mor. muscul. Additur, præter naturam: ad differentiam contractionis musculorum secundum naturam, cap. 6. lib. 3. loc. aff. cap. 1. lib. 2. de symptom. caus. Sed cum musculi retrahantur interdum à neruis, interdum à ligamentis: in spasmo à neruis contra

Causa efficiens.

contrahitur: ut si membra à ligamentis contrahantur, manent contracta, non conuelluntur.

*Causa
fictiouis
nerui.*

*2. Laesa
facultas.*

Ceterum, nerui functio laeditur, vel Laesa facultate, vel ob Errorem externum: Laesa quidem facultate, in spasmo legitimo: ob errorem externum in notho.

*Commissio
e repletio-
ne.*

3. species.

Quoad laesionem facultatis: ad hanc respiciens Hippocrates, aphor. 39. sect. 6. ait: conuulsionem fieri vel ex inanitione, vel è repletione: nam in utraque conuulsione neruus morbo afficitur: quem Auicennas statuit esse morbum in magnitudine imminuta secundum longitudinem neruorū, quia nerui breuiores redduntur. Sed imminuta hæc magnitudo secundum longitudinem, coniunctam habet magnitudinem secundum latitudinem: vel auctam, & tum est conuulsio è repletione: vel imminutam, & est conuulsio ex inanitione. Quoad conuulsionem è repletione: huius causa est materia: cuius species est humor, non vapor, cap. vlt. lib. de palpit. vapor enim musculos implet, non neruos, cap. 2. lib. 2. de caus. sympt. Hic humor est sanguis, pituita, vel melancholia: bilis namque excluditur à spasmo è repletionem orto: antequam enim excitet magnitudinem in neruo, expellitur ab expultrice: hinc Galenus cap. vlt. lib. 12. method. ait: conuulsionem fieri, vel ex inanitione, vel è repletionem, vel à mordaci, id est, à bilioso humore: bilis ergo à materia replente distinguitur.

1.

Sanguis autem est causa spasmi, dum facit inflammationem: vnde Galenus cap. 2. lib. 2. de caus. sympt. ait: spasmus è repletionem fieri ex inflammatione: & idem dicit cap. 1. lib. 1. de mor. muscul. Porro phlegmone in parte neruosa, est causa spasmi, vel illius partis inflammata, vel totius corporis. Si inflammatio sit causa spasmi partis inflammata: tunc est conuulsio è repletionem, de qua loquimur: si autem sit causa conuulsionis totius corporis, est conuulsio, quæ non fit è repletionem, sed ob errorem externum: vnde Galenus com. 34. lib. 3. prognost. ait: conuulsionem fieri ex inflammatione partis neruosa, dum pars neruosa originem, id est, cerebrum in consensum ducit.

2.

A pituita frequentius fit spasmus, quam ab aliis humoribus: nerui enim alimento picuitoso nutriuntur: at si hoc non vincatur, abundat excrementum pituitosum, quod spasmi causa esse potest. com. aphor. 16. sect. 2. Melancholia rarius

3.

Vitium.

spasmi est causa. Quoad vitium materia: hoc pertinet ad sub

substantiam, dum conuulsio fit ab inflammatione, in qua sanguis putrescit ad copiam, nam morbus est in magnitudine: succi enim copiosi angustant corpora neruosa, cap. vlt. lib. de palp. ad qualitatem, ratione pituitæ & melancholiæ, quæ sunt materiæ frigidæ, viscidæ, crassæ: vnde Galenus aphor. 70. sect. 5. ait: conuulsionem fieri è lentis humoribus: vitium spectat ad quietem, cum succi quiescant præter naturam in neruis, non enim parum impacta est materia in neruis, aphor. 70. sect. 5. & coarctatur hæc materia secundum partes neruorum externas, quæ efficiuntur è membranis: hinc, quia materia conuulsionis est admodum crassa, & magis impacta, quam in paralyti, recte iubet Rhasis, in spasmo corpus magis esse inungendum, & magis fricandum oleo de costo, quam in paralyti. Causæ generantes has materias, patient ex alibi dictis. In conuulsione ex inanitione nerui exsiccantur. Neruorum siccitas in hac conuulsione, pertinet vel ad Solidam substantiam nerui, vel ad Roridam humiditatem. Si absumatur solida nerui substantia: conuulsio hæc producitur à causa vehementer & cum impetu siccante: vnde Galenus aph. 1. sect. 5. ait, ab helleboro albo conuulsionem fieri ex inanitione, dum substantia nerui violenter & cum impetu siccatur. Hæctica febre correpti, non conuuluntur: quia hæc corpora sensim, citra impetum, exsiccantur. Proinde si repentina fiat exsiccatio, idem contingit neruis, quod chordis vehementer siccatis, cap. 6. lib. 3. loc. affect. Causa autem hæc, vehementer, & cum impetu siccans, est vacuans Sensibiliter, vel Insensibiliter. Sensibiliter, vt dum fit conuulsio à veratro vehementer soluente, aph. 1. sect. 5. cuiusmodi etiam est conuulsio, quæ seri solet per immoderata profluvia muliebria, aph. 56. sect. 5. Insensibiliter euacuans causa, est, tum Siccans, tum Simul & siccans, & calefaciens. Siccans, vt si conuulsio fiat à vigiliis, aph. 18. sect. 7. Siccans causa & calefaciens simul, est tum Morbus, tum Causa. Morbus, vt phrenitis, vt febris: phrenitidem proposuit Galenus, cap. vlt. lib. de palp. cap. vlt. lib. 12. meth. febrem proposuit, cap. vlt. lib. de palp. aph. 13. sect. 7. cap. 2. lib. 2. de cal. sym. Oportet autem vt febris sit vehemens, & cum violentia siccans. Præter morbum potest etiam esse causa, ex aph. 13. sect. 7. vt si fiat conuulsio ob feruorem ambientis, ob cauteria, ob escharas, seu crustas, quæ vi ignis excitantur. Quod si in spasmo ex inanitione, minuantur rorida humiditas nerui: hic spasmus

*Conuulsio
ex inanitione.*

*Exsiccatio
solide neruorum
substantia.*

*Exsiccatio
roride humiditatis.*

siccus dicitur ab Auicenna, & producitur à frigiditate, id est, ab opiatīs, vel opio, congelante roridam humiditatem. De hac conuulsionis specie, nec Altimarus, nec alij quicquam. Accepit autem Auicennas à Galeno, cap. ult. lib. 12. meth. vbi ait, conuulsionem fieri ex ingenti frigore, quod efficit quippiam veluti gelu.

2. Error
externus.

Quoad conuulsionem, quæ fit ob errorem externum: hanc Auicennas vocat, spasmus non proportionatum ad materiam: scilicet in quathoc est, ad subiectum: inter hunc enim spasmus, & subiectum non est proportio: nam spasmus est motus voluntarius: subiectum autem est mobile nervosum, quod in conuulsione spuria subiectum est, non facultatis motricis, sed expultricis: spasmus enim non proportionatus sit à causa, quam nervi refugiant, & expellunt: pertinet ergo ad facultatem expultricem. Hæc causa, secundum Auicem, specie est multiplex: potest esse Substantia, potest esse Qualitas. Substantia est Vapor, vel Minera. Qualitas est Venefica, vel Spiritualis. Materialis est Venefica, vel

1. Vapor.

Non venefica. Vaporem quidem proponit Gale. cap. 2. lib. 2. de caus. sym. vbi vult, conuulsionem fieri à statu implente musculos, non nervos: Vapor autem ut plurimum est frigidus: ideoque producit conuulsionem satis leuem, quam Auicem vocat saltum: vulgo dicunt crampe. Minera est humor calidus, mordax, & perinde irritans expultricem: quam causam proposuit Galenus cap. ult. lib. 12. meth. dum inquit, conuulsionem fieri e tenui & erodente humore, afficiente

2. Humor
acris,
Graviss.

nervos, id est, ex humore bilioso. Qualitas materialis non venefica, est frigiditas vehemens, congelans nervum: & hæc frigiditas impertitur nervis à causa Interna, vel Externa. Ad internam causam respiciens Galenus ait, com. 27. lib. 4. de ratione vict. conuulsionem totius corporis fieri, ob copiosum sanguinem, venas replentem, ut spiritus non possit penetrare: unde sanguis, veluti in corpore mortuo congescit, & frigidus euadit, quæ frigiditas nervis impertitur, & conuulsionem efficit. Ad causam externam respiciens Galenus cap. 5. lib. 9. meth. ait, conuulsionem fieri ob frigidam positionem immodicam, & importunam. Notandum autem causam refrigerantem tripliciter concurrere posse, ad efficiendum spasmus. Primo, ut agens in nervos prohibet excretionem excrementorum: unde cum excrementa non vacuantur, fiat conuulsio e repletionem, de qua supra diximus:

Causa re-
frigerans,
quomodo
spasmus
efficiat.

Secundo, ut agens in nervos prohibet excretionem excrementorum: unde cum excrementa non vacuantur, fiat conuulsio e repletionem, de qua supra diximus: &

& huc referri debet, quod Galenus ait, com.aph.13.sect.6.frigas neruorum corpora reddere difficilia ad distandū, ideoque iteruos repleri. Secundo modo concurrir frigiditas, vt agit in roridam neruorum humiditatem, illam veluti congelando & inspissando: hinc, quoniam imminuitur rorida humiditas, fit conuulsio ē siccitate, quam tetigit Galenus cap. vlt. lib. 12. meth. Tertio modo concurrir frigiditas, quatenus ceu hostis agit in calidum neruorum insitum, vt nerui expultrix ad expellendum insurgat: hinc fit conuulsio ē sanguine frigidiorē, vel ē frigida potu, com. 27. lib. 4. de vict. cap. 8. & lib. 9. meth. & hæc est conuulsio, de qua nunc loquimur. Qualitas materialis venefica, produci potest, à causa Interna, vel Externa. Ab interna, vt à vermibus defunctis: sicut etiam venenum intus genitum, potest esse causa epilepsie, & perinde multo magis spasmi causa esse potest. Ab externa causa producit: vt si conuulsio fiat à morfu scorpion: quam speciem tetigit Galenus com. 1. sect. 5. aphorismorum, vbi inquit, spasmus fieri propter hellebori albi efficaciam, quæ humiditates ex neruis ad se trahit: hæc ergo vis veratri est venefica. Qualitas spiritalis, est qualitas dolorifica: & hinc oritur conuulsio, quæ fit ab ore ventriculi, cap. vlt. li. 12. meth. com. aph. 1. sect. 5. vt est conuulsio quæ fit ab albo veratro: non eo modo, quem iam proposuimus, sed dum vi hellebori excitatur vomitus, in quo os ventriculi veluti laceratur. Similis etiam conuulsio fieri potest, dum os ventriculi mordetur à materia mordaci: vt contingit illi adolescenti, qui æruginē euomit. Quamobrem colligendum ē com. aph. 1. sect. 4. veratrum multifariam concurrere ad efficiendum spasmus. Primum enim causa legitimi spasmi, ex inanitione, dum neruos euacuat. Deinde etiam est causa conuulsionis ex inanitione, dum vi sua in distributione vehementer neruos siccat. Tertio est causa conuulsionis citra inanitionem, per qualitatem veneficam, dum trahit tanta cum violentia, vt afficiat neruos, vt hi ad expellendum insurgant. Tandem veratrum concurrir ad spasmus efficiendum, per qualitatem dolorificam: dum videlicet agit in neruos, per medium os ventriculi superius.

Conuulsionis differentie non sumuntur à forma, nisi secundū Magis & Minus: vt motus est magis vel minus prauus. Ratione subiecti, mobile est Totū, vel Pars, cō. 27. l. 4. de vict. com. 34. l. lib. prognost. Cæterum, pro partium varietate,

4. Venenū.

5. Dolor.

Ex helle-
boro spasmus.

Differentia.

A subie-

cto.

conuulsio variis nominibus donatur. Verbi gratia, cum Galeno cap. 2. lib. 2. de sym. caus. si conuellantur musculi mandibulares, vocatur *trismus*, id est, inuita denq̃um concussio seu stridor: Si conuellantur oculorum musculi, dicitur Strabismus: si musculi oris dicitur spasmus cynicus: & cum Galeno cap. vlt. lib. de palp. si spinales musculi, mouentes caput, omnes conuellantur, conuulsio dicitur tetanus: si conuellantur musculi, mouentes caput ad anteriora, vocatur emprosthotonus: si mouentes ad posteriora, opisthotonus. Quoad causam efficientem: nerui functio læditur, vel læsa facultate, vel ob Errorem externum. Si læsa facultate, est spasmus legitimus: & hic vel è Repletione, vel ex Inanitione. Si è repletione: huius causa est Sanguis, Pituita, vel Melancholia. Si ex inanitione: imminuitur vel Nerui solida substantia, vel Humiditas torida. Si conuulsio fiat ob errorem externum: error externus est Substantia, vel Qualitas. Substantia, est Vapor, vel Minera: sed hæc minera est acris. Qualitas, est Materialis, vel Spiritualis. Sed oritur dubium: nam Hippocrates ubiq̃, tantum proponit conuulsionis duas species: vnam è repletione, alteram ex inanitione. Et Galenus cap. 3. lib. 8. *κ. ρ. η.* ait, se in conuulsione non inuenisse tres species: at in singultu se vidisse tres species. Contra, cap. vlt. lib. 12. meth. scribit aperte, dari spasmus, qui nec ex inanitione, nec è repletione oriatur. Responsio. Galenus lib. 8. *κ. ρ. η.* respicit ad legitimũ spasmus, & singultum: at lib. 12. meth. & alibi, respicit ad spasmus etiam nothum, qui fieri potest citra repletionem & inanitionem: & tunc neruus non concurret, vt organum facultatis animalis, sed vt organum facultatis expultricis: in spasmõ autem exquisito, qui fit ex inanitione & repletione, neruus concurret vt organum facultatis animalis. Verum alia in singultu est ratio: siue enim fiat ex inanitione, siue è repletione, siue citra has causas: semper ventriculus concurret vt organum facultatis naturalis: & propterea omnes tres singultus species, sunt exquisitæ: quia singultus exquisitus requirit subiectum, quod sit organum facultatis naturalis, non autem animalis, quemadmodum in spasmõ ex inanitione & repletionem.

Signa.

Spasmus in genere patet: sicut etiam differentia à forma, & subiecto. Quoad causam efficientem, si fiat conuulsio læsa facultate: cognoscitur, quia motus prauus est euidentior. Si fiat ob errorem externum, erit minus euidentis: præterea

cogno

cognoscitur è causis prægressis, de quibus suo loco. An autem spasmus fiat ex inanitione, vel repletione: facile cognoscitur, è cap. 6. lib. 3. loc. affect. si enim conuulsio fiat à labore, vigiliis, fame, febre ardente, phrenitide: iudicandum, quod fiat ex inanitione. Si contra, homo sit plenus, otiosus, suppressa sit aliqua euacuatio, & subsequatur conuulsio: iudicandum, quod fiat è repletione: præterea cum Galeno, aphor. 16. sect. 2. si conuulsio ilico fiat, iudicandum fieri è repletione: addit Auicennas, si pars conuulsa, velociter absumat humidum, quod ipsi applicatur, esse conuulsionem ex inanitione: si contra, è repletione: nisi causa spasmī è repletionē, sit phlegmone: huius enim vt humidum quod applicatur, facile exsiccat. Quibus autem signis cognoscantur causæ conuulsionis è repletionē: patet ex alibi dictis. In spasmo ex inanitione, cognoscere oportet, num inanitio pertineat ad solidam nerui substantiam, an ad roridam humiditatem. Si ergo, verbi gratia, præcessit vehemens frigus: iudicandum, inanitionem attingere ad humiditatem roridam: si prægressa sit causa vacuans, vel sensibiliter, vel insensibiliter: iudicandum inanitionem ad solidam neruorum substantiam spectare. At, si conuulsio fiat ab errore externo: an sit vapor, an materia acris, an qualitas vel frigida, vel venefica, vel dolorifica: patet è traditis in dolore capitis & potiss. in sermone de epilepsia.

Suppositis præsidis, quæ respiciunt neruorum proportionem, cum Galeno cap. vlt. lib. 12. meth. sumendæ sunt indicationes, à Forma, & à Causa efficiente. A forma, vt est retractio præter naturam, & perinde doloris causa: hæc indicat remedium, extendens membrum conuulsum. Quoad causam efficientem, hæc est morbus, vel error externus. Si fuerit morbus, siquidem fuerit conuulsio è repletionē, cuius causa sit inflammatio: quid indicet inflammatio, patet. Si morbus sit magnitudo, producta à melancholia, vel pituita: quid indicent hæc materiæ secundum speciem, secundum vitium, secundum causam generantem, etiam patet. Si conuulsio fiat ex inanitionē: si absumatur humiditas solidæ substantiæ, oritur indicatio humectandi. Si vitium pertineat ad roridam humiditatem, oritur indicatio calefaciendi, quia sit à frigore. Quoad errorem externum, siue sit vapor, siue minera, siue qualitas materialis, aut spiritalis: quid indicent, docuimus in sermone de epilepsia.

*Prognosti-
ca.*

*1. Afor-
ma.*

Conuulsio interdum est utilis, interdum periculosa, quan-
doq; mortalis. Quoad differentias à forma: prout motus est
magis deprauatus, prout retractio est intensior, quo diutius
durat: eo periculosior est conuulsio: quia est vehementia es-
sentiae. Quoad vehementiam dignitatis: vt plures afficiun-
tur partes, & quo viciniore sunt cerebro: eo conuulsio peri-
culosior: vnde tetanus periculosior est emprosthotono, &
opisthotono, quia plures muscoli in tetano occupantur:
vnde Galenus com. aphor. 6. sect. 3. ait, qui tetano capiun-
tur, quatuor diebus mori posse, nam malum est gemina-
tum, dum plures occupantur partes: quod si homo perdu-
ret ultra quartum, & non moriatur, signum est vehemen-
tiam essentiae esse minorem. Quod si in tetano addatur ve-
hementia facultatis, malum prorsus est lethale. Vehemen-
tiam autem facultatis indicat locus affectus: verbi gratia, si
conuulsio afficiat musculos, pinnae narium mouentes: si-
gnificatur vehementia facultatis, quia adest insignis imbe-
cillitas: si enim per nares feratur multus spiritus, vt fiat
conuulsio, mors est propinqua, comm. 60. lib. 2. de ratione
viciam conuulsio vehemens ratione essentiae, est coniun-
cta cum vehementia facultatis, cum virum imbecillitate.

*2. A causis
in genere.*

Quoad vehementiam ratione causae efficientissim genere;
qualibet causa, vt vehementior est secundum essentiam,
dignitatem, & facultatem: ita etiam statuendum est magis
periculosam esse conuulsionem. Vnde Paulus ait, si labia,
palpebrae, aut lingua contrahantur: conuulsionem esse ad-
modum periculosam: nam haec indicant vehementiam ra-
tione essentiae: vt materia morifica secundum essentiam sit
adeo potens, vt possit has partes, cerebro proximas, afficere:
inducant etiam vehementiam signatis, quatenus significant
causae originem esse in cerebro, vel in ore ventriculi. At si
seorsim perpenatur vehementia causae, cum spasmi: primum, si
conuulsio fiat ex repletionem: curari potest. vlt. l. 12. meth. siue
fiat haec conuulsio circa inflammationem, siue cum inflam-
matione, Nam si fiat circa inflammationem, è putrida, vel
melancholica: haec materiae vinci possunt: quandoque enim à
febre superueniunt: vnde febris superueniens conuulsioni est
salutaris. aph. 26. sect. 2. & aph. 37. sect. 4. vt febris habeat ra-
tionem signi, indicantis vehementiam non ad summum in-
signem. Sed & alias signum esse potest materiae morificae
magis vel minus impetum: vnde Galenus ait, comm. 34. lib. 3.

*Si febris
re, leuione.*

prognost.

p̄gnost. pueros facile à sp̄sino liberari. Si conuulsio fiat ex
 inflammatione: vinci potest, ē c. vlt. lib. de palp. nisi sit inflam-
 matio, quæ sequatur vulnus lethale: tunc enim quælibet ve-
 hementia adest. Quoad conuulsionem ex inanitione: si fiat *sp̄smus*
 quoniam absumitur solida nerui substantia: eum Galeno ca. *ab inani-*
 vlt. lib. de palp. est mortalis: nam absumitur substantia calidi *tionē.*
 innati, quæ seminalis est, vt breui tempore nequaquam pos-
 sit reparari: hinc Galenus ait, cap. vlt. li. 12. meth. si conuulsio
 fiat ē siccitate, esse insanabile: idum scilicet siccitas est per-
 fecta, id est, dum solida substantia siccatur, non secundū car-
 nem, adipem, vel humiditatem roridam, sed secundum sub-
 stantiam fibrosam, & membranofam, ca. 5 l. 7. meth. vt ante-
 quam fiat consumptio humiditatis fibrosæ & membranosæ,
 homo moriatur. Quod si non ad summum perducatur siccitas:
 desperandū non est prorsus, c. vlt. lib. 12. meth. nisi succe-
 dat hæc conuulsio vel febri, vel phrenitidi: quia tunc si mma
 est vehementia siccitatis. Concludere ergo licet, sp̄smum ē
 siccitate, difficillime curari, & vt plurimum incurabile esse:
 quemadmodum testatur Galenus apho. 16. sect. 2. & apho. 57.
 sect. 4. & apho. 70. sect. 3. & aph. 13. & 18. lect. 7. Si autem con-
 uulsio fiat ex imminutione roridæ humiditatis: curabilis est: *Sp̄smus*
 propterea quod humiditas congelata vincitur à caliditate. Et *ob errorem*
 propterea Galenus cap. vlt. lib. 12. meth. hunc sp̄simum cu- *externum.*
 rari posse ait. Si conuulsio fiat ob errorem externum: si
 quidem sit substantia, & primum si sit vapor: hæc conuul-
 sio, secundum Auicennam, curatur cito, hora vna: si scilicet
 flatus prodeat à pituita: at si vapor prodeat à materia vene-
 fica, conuulsio potest esse admodum periculosa. Si error sit
 materia mordax: conuulsio est curabilis, cap. vlt. lib. 12. meth.
 nam potest vacuari illa materia, qua vacuata cessat conuul-
 sio. Si error sit qualitas, & quidem materialis, non venefica,
 vt frigiditas: conuulsio est curabilis: & quandoque etiam
 salutaris, comm. 27. lib. 4. de viſt. nam in hac agitur cor-
 pus, & per agitationem incalescit, vt sanguinis vitium, id
 est, frigiditas tollatur. Si qualitas sit venefica: est conuulsio
 periculosa, quia summa est essentia: vehementia, vt colligi-
 tur ē com. 1. sect. 3. aphorismorum. Si qualitas sit dolorifica:
 pro varia vehementia causæ dolorificæ, varie prognostican-
 dum. Verbi gratia, si fiat conuulsio ab ore ventriculi, vt affi-
 citur, à bile, cum Galeno cap. vlt. lib. 12. meth. & apho. 1. sect.
 3. bile vacuata, cessat conuulsio. At conuulsio notha, quæ

interdum degenerat in exquisitam, vt est conuulsio, quæ fit ab helleboro, molestante os ventriculi, hæc est periculosa: sed euadit lethalis, vbi præter causam dolorificam subsequitur vacuatio insignis. Si fiat conuulsio è causâ dolorifica partis inflammata: propter vulnustantum Galeno aph. 2. lect. 5. hæc conuulsio, quamuis spuria, vt fit à dolore, est ferme lethalis. Vnde pro varia affectione partis primario affectu, vario modo est prognosticandum.

Curatio.

Vena sectio.

Si sanguis in spasmo peccet: vena secanda. cō. 28. lib. 4. de vict. Quare vena est secanda, si sanguis habeat rationem causæ principalis, vt in conuulsione ex inflammatione: Item in conuulsione, quæ fit à copioso, ac veluti congelato sanguine: Est etiam secanda vena, dum sanguis habet rationem causæ sine qua non, vt in conuulsione è pituita, quæ tamen conuulsio occupat corpus sanguine repletum. Vena ergo non est secanda in spasmo ex inanitione: nam sanguis potius deficit. Notandum autem circa quid agendum specificum in sanguinis euacuatione: si sanguis peccet ad s̄b j. tantum detrahendas esse 3 viij. propter dolorem enim & motum virtus dissoluitur. V s v s: *Quantum.* Causa virtutis, vacuandus est sanguis per plures vices. *Quando.* Statim vena est secanda: vana adest indicans, & virtus in principio non prohibet: quemadmodum procedente conuulsione prohibere posset: hinc Galenus comm. 28. lib. 4. de vict. venam tundit ante fomenta, quamuis auctor ille primo vtatur fomentis: Galenus tamen auctorem non sequitur, sed methodum: nouit enim sanguinem in spasmo magis posse copia, quam frigilitate: quare primum secat venam, deinde vitur calidis fomentis. Antequam autem secunda vice secet venam, vitur fomentis: nam tunc sanguis minus potest copia, quam frigilitate: cum prima vice sanguis facit imminutus. Cucurbitulæ scarificatæ probantur Aetio & Auicenna, quia vacuant: non scarificatæ non probantur, quia attrahunt, & non vacuant. Quoad vbi si sanguis in toto exluperet: cucurbitulæ applicatæ sunt dorso & cruribus: si redundet sanguis in parte determinata: vt varia est pars, ita variis locis cucurbitulæ sunt applicandæ. Aegineta, si cura erat contracta, applicabat postremis vertebra: si manus erant conuulsæ, applicabat septimæ vertebra: si conuulsio attinebat ad labia, vel palpebras, applicabat cucurbitulas occipiti, & primis duabus vertebra: si aderat tetanus, applicabat cornici secundum

Cucurbitulæ.

*Paulus ca.
19. cō. 20.
lib. 3.*

secundum

secundum utramque partem, & pectori qua carnosius est, & præcordiis, & regioni renum. Omitto in præsentia circa cheirurgiam, nerui incisionem, quam probat Galenus cap. i. lib. i. de motu musculi. nam hæc doctrina spectat ad sermionem de vulneribus.

*Aduers.
i. lib. 3. de
meth. med.*

Quoad medicamenta, multa supponentes: si cōuulsio fiat ex inanitione propriæ humiditatis: Rhasis, Paulus, Auicennas probant *aquam dulcem, oleum commune, lac, ut ex his fiat balneum.* Et si cōuulsio fiat à causa simul siccantē, & calfaciente: Auicennas miscet propositis, *oleum rosæ complet, aquam rosæ, ut alimentum detineatur, ratione lenis astrictiōis, & ut fiat aliqua refrigeratio:* & si causa sit vehementer calefaciens: Auicennas ascendit etiam *ad hordeum fractum sine cortice, nam cortex siccus: addis violas, nymphaeam, cucurbitas, melones, lactucam, & ex his parat balneum.* **V s v s.** Quomodo. Balneum debet esse actū vel temperatum, vel tepidum: nam calidum siccaret. *l. vi.* Medicamenta modo toti, modo parti applicanda: prout siccitas vel est in toto, vel in parte. Si autem cōuulsio fiat ex inanitione roridæ humiditatis: probantur calfacientia: ut est balneum à vino, vel ex aqua alterata cum calidis, de quibus alias. Si cōuulsio fiat è repletionē: & primum si fiat ab inflāmatione: curatur medicamentis, quibus

pharmacia.

A repletionē.

occurrere licet inflāmationi, de quibus suo loco. Si spasmus sit citra inflāmationem, occurrendum medicamentis, quæ in paralyti sunt præscripta, de quibus supra. Sed iuniores notent: primum circa vacuantia per meatus sensibiles: Auicennam probare vehementia, non mediocria, & causa vacuationis totius, & causa capitis: de quibus dictum in dolore capitis à pituita, & à melancholia. Quoad vacuantia per insensibiles meatus, Rhasis probat valentiora, quam in paralyti, id est, magis calefacientia, & tenuis substantiæ, de quibus etiam diximus. Secundum Aëtium probatur *seseli, id est, siliet montanum, cum aceto mulso, aut posca:* non enim est præter rationem, miscere acetum pro vehiculo: quam vis eo pro medicamento principali non debeamus uti. Quantum ad ea medicamenta, quæ applicantur: notandum, Auicennam mirifice commendare, si applicemus *renem irritum cum sua pinguedine, & ideo præbatur ren arietis, castratorum, capra, agni, hædi, vel etiam vituli, bovis, & potissimum tauri:* ren autem est detinendus donec exsicceetur, vel etiam forteat, & mox alius ren adinouendas. Addit Auicennas, membra cōuulsa inuol-

uenda esse *lana*, quæ madida humidaque oleo est seruanda. Præterea Auicennas probat aquam alteratâ copiose anetho, in qua decoquatur canis, aut vulpes, usque ad dissolutionem: & hoc decocto ager semel aut bis est profundendus. Hippocrates aph. 25. lect. 5. in hoc spasmo probat frigidam, si copiose effundatur, calefacit enim per accidens, quatenus huius vi calor concentratur & vitur. At secundum Auicennam, frigida non vtendum, nisi virtus sit robusta, secundum totum corpus, & secundum partem: vnde patiens erit iuuenis, carnosus, expers vlceris: præterea frigida locum habet, si absit ambiens, vi cuius calor insitus extra immodice moueatur: tunc enim ope frigida ab hoc motu liberatur, ideoque hæc materia in aere calido, non in frigido administranda: calidum enim innatum non potest ferre concentrationem & aeris, & frigiditatis aquæ. Addit Auicennas puerulis calidiora non esse admouenda: vt liceat hoc medicamento vti pro pueris: *℞. rad. lilij ʒ j. ꝑ. anisorum ʒ ss. croci ʒ ss. mellis quantum sufficit. Misce.* Iubet etiam Auicennas assiduo puerorum membra esse deponenda in aquam alteratam chamamelo, fanograce, meliloto. Et ex his olea etiam pro pueris possunt parari. Rhasis iubet corpora conuulsa esse inungenda oleo de cosso: & valentius ac diutius fricanda, quam in paralyti: nam materia magis est impacta. Si conuulsio fiat ob errorem externum: pro vario errore, varia medicamenta administranda, verbi gratia si error sit flatus, probantur discutientia flatus, de quibus in dolore capitis à flatu, & sic de reliquis.

Ab errore
externo.

Dietæ.

Quoad dietam: notandum in ipsismo ex inanitione, cum Rhasi & Græcis probari sorbitione ex alica, & farre, & herdeo, & lacte amygdalino, & potissimum ex aqua carnis destillatæ, vel agni, vel hædi. Et, si siccitas foueatur à caliditate, addatis lactucam, semina melonum, cucurbitam. Si non absit caliditas, potestis miscere cum aqua carnis vinum medicatum. Lactuca enim reddit aquam carnis refrigerantem: vinum, eam reddit calefacientem, & citius alentem: vnde patet, aquam carnis destillatam, si sola exhibeatur, esse cibum nec calefacientem, nec refrigerantem. Quoad potum: Si conuulsio sit à congelata rorida humiditate: probatur vinum. Si conuulsio sit à repletionem: Paulus probat victum tenuem, extenuantem. Vnde Auicennæ probatur panis cum melle, & aqua ciceris. Et, si virtus sit debilis, secundum Auicennam est exhibenda caro aucularum. Vnde obiter colligendum, carnem magis nutrire,

nutrire, quam nutriet panis. Potus cum Paulo sit *missa*: & cum Auicenna cōcedi etiam potest *vinum antiquum* in parua copia: at post totius & capitis euacuationem.

CAPVT XXVI.

De Spasmo Cynico.

SUCCEDIT vitium, quod componitur ē paralyſi & conuulſione: facileque cognitis ſimplicib. cognoſci poterit. Vocatur autem ſpasmus cynicus, tortura oris, conuulſio canina, riſus Sardonius. Per ſpasmus autem cynicum intelligimus vitium, in quo facies figuram naturalem non ſeruat. Generatur hoc malum dum capiti occurrit cauſa, vi cuius muſculi faciei ita lēduntur ſecundum motum, vt figura faciei vitioſa reddatur. Spasmus ergo cynicus eſt figura præter naturam faciei, dependens à motu præter naturam ſuorum muſculorum. Forma, eſt figura præter naturam: nam figura deformis euadit. Subiectum, eſt facies, id eſt, capitis pars anterior, à capillis ad mentum: vnde intelligimus non tantum os, ſed etiam maxillas, genas, oculos, frontem. Porro vitioſa figura attinet modo ad dextram partem, modo ad ſiniſtram: & modo ad omnes partes, modo ad aliquas: vnde os interdum eſt immutatum: vocatur tamen tortura oris, quia vt plurimum oris figura vitiat, & quia os præcipua eſt pars faciei.

Dependet autem oris tortura, à motu præter naturam muſculorum faciei. Ideoque ſtatuendum hoc vitium formaliter acceptum, eſſe ſymptoma: pender enim à motu præter naturam, ab actione læſa: hic quippe tortuoſa oris figura eſt ſymptoma, nimirum qualitas mutata, quæ, vt opus, ſequitur actionem læſam, id eſt, motum præter naturam muſculorum faciei. At figura vitioſa, ſi conſideretur vt morbus, non pender à læſa functione, ſed potius eſt cauſa læſæ functionis. Dum igitur Auicennas inquit, torturam oris eſſe morbum inſtrumentalem faciei: reſpexit ad cauſam effectricem principalem, qui eſt morbus in mala compositione: ſicut in paralyſi & ſpasmo. Quia autem nos tradimus definitionem per cauſam formalem: neceſſario dicimus, torturam oris eſſe figuram vitioſam faciei, dependentem à motu præter naturam muſculorum. Cæterum hoc loco per motum

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Subiectum.

Cauſa efficiens.

*Motus præ
ter naturam.
Musculi
faciei.*

motum præter naturam, intelligimus motum ablatum, si
vitiū fiat à paralyſi: motum autem corruptum, ſi à conuul-
ſione. Per musculos faciei: intelligimus musculos, qui mo-
uent maxillas inferiores, alas naſi, labia, & buccas, cap. 13.
lib. 9. de vſ. p. Quamvis autem horum musculorū maior pars
neruos ſuſcipiat à tertio pari cerebri: nihilominus propoſiti
musculi priuatim ita ſe habent: vt musculi oculorum neruos
ſumant à ſecundo pari cerebri: musculi maxillarum, alarum
naſi, & labiorum, à tertio pari cerebri: musculoſa autem lati-
tudo, à qua buccæ mouentur, maxima è parte ſuſcipit ner-
uos, à ſecundo pari ſpinæ, nonnullos etiam à tertio pari ſpi-
næ, & ſecundum regionem altiſſimam à quinto pari cere-
bri, cap. 7. lib. 9. de vſ. p. cap. 2. lib. 4. de loc. aſſ. & in lib. de ner-
uorum diſſectione.

*Cauſa mo-
tus præter
naturam.*

Motus autem horum musculorum præter naturam, ſit
propter cauſas vel paralyſis, vel conuulſionis: de quibus di-
ctum. At notandum, eſt cap. 2. li. 4. l. aſſ. & cap. 7. lib. de cauſ.
morb. ſi oris tortura fiat è paralyſi: musculos læſos eſſe in
parte non contracta, verbi gratia ſi ſint reſoluti dextræ partis
musculi, tunc non operantur: operantur autē musculi ſiniſtræ
partis, dum ſcilicet ad ſuam originem retrahuntur: dum au-
tem contracti ſunt, non diſtenduntur amplius, quoniam à
ſeipſis diſtendi non poſſunt, nec diſtendi poſſunt à musculis
dextræ partis, quia hi ſunt reſoluti: & ob id musculi partis
non læſæ retracti permanent: ſecumque partis læſæ muscu-
los contrahunt, & contractos ſeruant. Contra ſi fiat oris
tortura è conuulſione, musculi læſi ſunt in parte contracta,
verbi gratia ſi dextræ partis musculi conuellantur, muscu-
los ſiniſtræ partis non læſos ad ſe trahunt.

Secundo notandum eſt cap. 2. lib. 4. loc. aſſ. in hoc malo
musculos non ſurgi ſuo munere, quoniam noxa eſt vel in
musculis, vel extra musculos: ſi extra musculos, vel in ner-
uis, vel in eorum principiis: ſi in neruorum principiis, vel in
ſpinali medulla, ſecundum primas ceruicis vertebraſ: vel in
cerebro, ſed ſecundum dimidium cerebri.

Differentia.

A forma non ſignuntur differentia, niſi ſecundum Ma-
gis & Minus: prout figura eſt magis vel minus deformis.
Quoad ſubiectum: figura vitioſa pertinet, vel ad Dextram
faciei partem, vel ad Siniftram. Quoad cauſam efficientem,
ſumuntur differentia & à cauſa efficiente, & à ſede cauſæ ef-
ficientis. A cauſa efficiente: vt eſt vel Paralyſis, vel Conuulſio.

A ſede

A sedevt est vel Musculus, vel Nervus: & si nervus, vel secundum Progressum, vel secundum Principium: & si secundum principiu, vel secundum Spinam, vel secundum Cerebrum.

Tortura oris imminens, secundum Avicennam cognoscitur è faciei dolore, è stupore, è palpitatione. Præsens in genere non eget signis. Quoad differentias, quæ sumuntur à forma & subiecto, sunt manifestæ. Quoad causam efficientem, oportet cognoscere Causam, & Sedem causæ. Quantum ad causam: si fiat à paralyti: cognoscitur, quia paræ contorta rectificatur per retractionem: Si causa sit convulsio: reificatur per extensionem: ut in paralyti pars læsa non sit contracta, in spasmo sit contracta. Addit Avicennas torturam è paralyti, indicari è faciei motu imbecillo, è sensu obtuso, & ex eo, quod homo non sentit extensionem: & præterea cognoscitur, quia palpebra inferior delabitur. Si fiat è convulsione: cum Avicenna ut plurimum adest dolor, sensus non est obtusus, durities adest in musculis, cutis tenditur, & cutis magis elongatur à parte colli: & maiori cum difficultate fit reditus ad naturalem statum.

Signa.

Quoad sedem causæ: Si sedes sit musculus: figura vitiosa occupat solum partem faciei. Si autem sedes sit extra musculum: si sedes sit nervus, & quidem secundum progressum: noxa erit solum in facie: si secundum principiu: etiam noxa erit ultra faciem, verbi gratia si cerebrum sit affectum secundum dimidium: noxa erit secundum dimidium faciei, & dimidium totius corporis. Si sedes sit spinalis medulla: læsio erit secundum buccas, & partes infra spinam. Cæterum, si noxa sit secundum progressum nervorum: si attineat ad secundum par nervorum cerebri: indicatur à vitiosa figura oculi: si pertineat ad tertium par nervorum cerebri: indicatur è figura vitiosa, occupante dimidium faciei secundum omnes partes: si attineat ad quintum par: cognoscitur à levi noxa buccarum, si spectet ad secundum & tertium par spinæ, & quidem cervicis: cognoscitur ex insigni noxa buccarum.

Indicationes proponitæ sunt in paralyti & convulsione.

Progressi.

Malum hoc non est negligendum: nam minatur paralyti, sin etiam extra faciem, minatur epilepsiam, apoplexiam: quia causa morbifica lædit partes cerebro vicinas. Quoad differentias: Figura magis deformis, est periculosior: quia maior recessus à naturali statu. Ratione dignitatis: ut occupat plures partes, ita magis periculosa. Ratione causæ efficientis: cum fiat

fiat

fiat à paralyſi, vel ſpaſmo: hæc ſuperius ſunt propoſita. Auicennas addit: ſi oris tortura vltra 6. meſes producat, vix curari: nam mali cauſa eſt admodum vehemens ſecundum eſſentiam: perdurante enim oris tortura, materia euadit magis viſcida, craſſa, impaſta, & proinde maxime recedens à naturali ſtatu.

Cheirurgia.

Auicennas, Paulus, Aëtius, probant ligaturam, qua facies reducatur ad formam naturalem. Hoc autem intelligendum eſt de malo, ſi fiat è paralyſi, non autem ſi è ſpaſmo: nam in paralyſi pars eſt relaxata, in ſpaſmo contracta. Iidem venam ſecant, dum aſſunt ſanguinis notæ: & quidem ſub lingua. Cucurbitulas etiam ſcarificatas primis vertebriſ applicant. Hoc præceptum locum habet, ſi oris tortura fiat à paralyſi, aut à ſpaſmo è repletionem. Supponunt autem hi auctores, ſi ſanguis in toto redundet, primum cubiti venam eſſe aperitendam.

Pharmacia.

Quoad medicamenta: probantur vehementia, purgantia totum, ſi opus ſit, totumque ſit repletum: ratio eſt, quia hoc malum cito, quantum fieri poteſt, expugnandum eſt: ſi enim diu perdurat, non curatur. Notandum autem cum Auicenna non eſſe feſtinanter gargarismiſ vtendum: nam attrahunt ad partes affectas: vt his vt liceat poſt ſternutatoria. Quoad digerentia, Auicennas probat, *carum elixam animalium ſylueſtrium*, verbi gratia leporis, vulpis, lupi, cerni, apri, has Auicenna applicat parti affectæ, & ſedi mali, & vertebriſ colli. Rhafiſ probat *nucem moſchatam* in ore detentam, cauſa reſolutionis materiæ. Auicennas probat *maſticatorium ex acoro, pyrethro, nucem moſchatam*: monetque vt detineatur in parte affecta. Rhafiſ quotidie ante cibum vtebatur hoc gargarismo: *ꝑ ſinapi ʒ ij. melle ſb j ſſ. fiat decoctio ad conſumptionem. tercia: deinde addo ſyr. acetofi, vel oxym. ſimp. ʒ ij. Miſ. pro gargarismo.* Auicennas & Rhafiſ aërem probant obſcurum. Cibus conuenit, vt in paralyſi, & ſpaſmo. Pro potu, Auicennas probat *aquam mellis*. Quoad motum, iubet Auicennas vt patiens non moueatur, uſque ad quartum, vel ſeptimum: dum exercitio vti poteſt: nam ante corpus eſt euacuandum: dum autem corpus repletum eſt, per motum ad caput ſiuit materia. Tandem probatur, vt patiens intueatur ſpecula è chalybe, ſemperque ſtudeat faciem ad naturalem ſtatum perducere.

Dieta.

CAPVT XXVII.

De Catarrho.



HACTENVS de vitiis attinentibus ad cerebrum, quatenus est organum functionum animalium: iam dicendum de vitiis attinentibus ad cerebrum, vt est instrumentum functionis naturalis: propterea dicendum est de catarrho, multorum vitiorum fonte. Per catarrhum autem seu fluxionem, vel defillationem, intelligimus in genere omnem fluxum materię excrementitię a cerebro, extra cerebrum, ad quamcumque partem fluat, siue detineatur, siue egrediatur. Non enim hic sumimus catarrhum, quemadmodum sumpsit Galenus cap. 4. lib. 3. de sym. caus. pro catarrhi specie, in qua materia fluit in os: sed loquimur de catarrho in genere. Catarrhus ita acceptus generatur: cum cerebrũ præter naturam occutrit aliquid, vi cuius frustratur facultas naturalis cerebri, vt cerebri excrementum crassum morbificum euadat, & ita a cerebro egrediatur, vt corpus lædat. Catarrhus ergo est excrementum crassum, affigens corpus, procedens a frustratione alteratricis cerebri. Colligitur hæc definitio e cap. 2. lib. de organ. odor. cap. 9. lib. 6. de tuend. sanit. cap. 4. lib. 3. de sympt. caus. & ex Hippoc. lib. de glandibus.

Forma est excrementum crassum, affigens. Paulus ait; catarrhum esse descensum præter naturam humoris excrementitię capite in subiectas partes. Auicennas etiã statuit, catarrhum esse cursum materię a cerebro. His nos non aduersamur: etenim hi respexerunt ad explicationem vocis, ad definitionem notionalem, non ad essentialem: catarrhi enim vox significat fluxum. Porro a definitione notionali facile possumus essentialẽ colligere, secundum doctrinam pathologicam, quam tradidit Galenus cap. ult. lib. de differ. sympt. cap. 4. lib. 3. de caus. sympt. Cum enim vox catarrhi, significet fluxum præter naturã materię a capite: catarrhus necessario est quid præter naturam. Genus ergo catarrhi, vel est Causa, vel Morbus, vel Symptoma. Si symptoma: vel actio læsa, vel qualitas mutata, vel excrementum mutatum. Cum igitur in catarrho fluat materia præter naturam: patet catarrhi genus in definitione essentiali, esse excrementum mutatum. Recte igitur in finitione diximus, catarrhum

Transitio.

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Excrementum.

Crassum.

rum esse excrementum crassum, affligens. Diximus excrementum, ad differentiam alimenti. Diximus crassum: nam in qualibet coctione duo excrementa segregantur ab alimento: nempe tenue, & crassum: in cerebro, tenue excrementum est vapor, qui in sublimi elatus per calvaria futurat excernitur: crassum, est mucus pituitosus; materia illa mucosa, quae per membranam perforatam egreditur, & perducitur ad nares, & potissimum ad os. Excrementum in catarrho necessario est crassum: nam si quandoque tenue sit, semper tamen mistum est cum crasso. Diximus affligens: ad differentiam excrementi crassi non laedentis.

Affligens.

*Nata ex-
crementi
crassi ce-
rebr.*

*Species ex-
crementi
mucosi.*

*Vitium ex-
crementi.*

Hoc excrementum, quatenus habet vim affligendi & laedendi, parit febres catarrhales, intemperantias, malas compositiones, solutam unitatem. Intelligere ergo oportet huius excrementi speciem, & vitium. Quoad speciem: est substantia mucosa, vel Sincera, & vocatur mucus pituitosus: vel Permista: idque aut cum Sanguine, & dicitur mucus sanguinolentus, cruentus: aut cum Bile, & est mucus biliosus: aut cum Melancholia, & est mucus melancholicus. Quoad vitium: hoc excrementum, secundum Galenum cap. ult. lib. de diff. sympt. a naturali statu discedit, vel Tota substantia, vel Quantitate, vel Qualitate: & dum Galenus proponit excrementum vel praeter naturam excernitur, innuit vitium secundum Motum: ut proponit excrementum, quod praeter naturam detinetur, innuit vitium secundum Quietem: non ergo Galenus omittit vitium secundum ubi. Quoad vitium in substantia: est excrementum cerebri, quod est praeter naturam, non ratione loci, sed secundum substantiam a toto genere, verbi gratia excrementum putridum, veneficum, venereum. Quoad vitium in quantitate: excrementum vel Abundat, vel Deficit. Quoad qualitatem pertinere potest ad Primam, vel Secundam. Ad primam: ut excrementum est vel calidius, vel frigidius. Ad secundam: & vel ad modum substantiae, ut est crassum, aut tenue, aut viscidum: vel ad propria sensuum obiecta, nimirum ad Colorem, odorem, saporem. Ad Colorem, dum excrementum hoc mucosum ab albo recedit, ut est excrementum rubicundum, flavum, viride, nigrum. Ad odo-

*1. Substan-
tia vitii.*

2. Quantit.

3. Qualit.

4. Motus.

Terminus

a quo: ni-

mirum ce-

rebrum.

rem, dum male olet. Ad saporem, si est dulce, amarum, acre, salsum, acidum. Quoad motum: in hoc oportet perpendere terminum a quo, spatium, & terminum ad quem. Terminum a quo est cerebrum, cap. 9. lib. 6. de tuend. sanit. com. apho. 13. sect. 3.

sect.3. Oportet autem scire, qua ratione cerebrum habeat rationem termini à quo. Cum Galeno igitur cap.4. lib.3. de symp.cauf. oportet pendere excernendi modum, qui duplex est: fit enim vel per transmissionem, vel per attractionem. Transmissionis modus, attinet ad terminum à quo, & ad terminum ad quem; modus attractionis saltem ad terminum ad quem. Quantum igitur ad terminum à quo: cerebrum, ut à se propellit excrementum concurret dupliciter: primum, ut iusto euadit robustius, ut in hoc retentrix cedere cogatur: secundo, ut expultrix ab excremento impellitur. Robustior euadit expultrix: dum subito, vi externi frigoris, partes cerebri densantur, dum capite repleto, sublequitur aeris frigiditas, & ea vehemens, ut materia exprimat: infra: com. apho. 13. sect. 3. ut catharrus fiat grauior, si aer est frigidus & siccus, quam si frigidus & humilis: aer enim frigidus & siccus, in causa est, ut violenta magis fiat expressio. Impellitur autem expultrix ab excremento, dum peccat copia, vel qualitate, vel copia & qualitate simul: copiosum enim excrementum suo onere afficit expultricem: & si colliquetur, qualitate etiam afficit.

Spatium per quod, cum Hippocrate lib. de gland. est multiplex. Estque vel Secundum, vel Præter naturam. Si secundum naturam: spatium pertinet ad Nares, &c. Si præter naturam: est Amplum, vel Angustum: amplum, est Oesophagus. Tracheia: angustum attinet vel ad Vacuitates, seu inania inter membrum & membrum, vel ad Organa: & si ad organa, vel Naturæ, vel Animæ: naturæ organa, sunt Venæ & Arteriæ: animæ, sunt Spinalis medulla & Nerui.

Terminus ad quem, est Totum, vel Pars. Si totum, fit febris catarrhalis: Si pars, potest esse qualibet pars extra cerebrum. Et hæc pars attinet ad Artus, vel ad Vētres ad artus, verbi gratia dum fiunt dolores articulares catarrhales: ad ventres, & vel ad Abdomen, Thoracem, Caput. Ad abdomē: verbi gratia si fiat dolor colicus catarrhalis, vel fluxus alui catarrhalis, vel gonorrhoea catarrhalis. Ad thoracem, ut est tumor catarrhalis in pleura, in pulmone, ut dum materia destillat in pulmones, & tunc Galenus catarrhum nomine generis appellat destillationem, com. apho. 12. sect. 1. Si fluat materia ad caput, id est, ad partes capitis extra cerebrum: sunt vel ad Oculos, Nares, Aures, Os, aliasve capitis partes, verbi gratia si materia fluat ad oculos, fit epiphora catar-

rhalis: si fluat in nares, vocatur Coryza seu grauedo, cap. 4. lib. 3. de symp. caus. com. 49. lib. 2. prognost. si in os, nomine generis dicitur catarrhus: si in fauces, dicitur raucedo: si in gargareonem, dicitur *καρύδα*, seu acinus: si in glândulas oris, vocât *ακτιάδης* & *ακτιόδου*. Sed oportet intelligere: qua ratione hæc omnia dicantur terminus ad quem. Quod si ergo fluxio fiat per modum transmissionis: tunc pars est terminus ad quem, quatenus Suscipit: suscipit autem vitio temperiei, vel compositionis. Temperiei: dum hæc est vel Frigida, vel Humida, vel Frigida & Humida: compositionis vitio suscipit pars: dum composita est è vasis amplioribus, vel est confecta è substantia rariore. Si fluxio fiat per modum attractionis: tunc causa termini ad quem est Dolor, vel Calor, sed intensior quam in termino à quo. Quoad vitium ratione quietis: quies est præter naturam: nam mucus pituitosus secundum naturam in cerebro reperitur, quare extra cerebrum præter naturam, nisi tempore opportuno per nares, & potissimum per os egrediatur. Si ergo hoc excrementum in partem aliquam decumbat, & ibi quiescat: sane hæc quies est morbifica. Quamobrem, si excrementum effluat, est symptoma in genere excrementi mutati: dum autem quiescit in termino ad quem, euadit causa morbifica. Hæc de forma.

Subiectū.

Subiectum catarrhi est corpus: vt enim materia præter naturam quiescit in corpore, necessario lædit corpus, verbi gratia in febre catarrhali subiectum est totum corpus.

Causa efficiens.

Causa efficiens, est frustratio alteratricis cerebri ad differentiam frustrationis alteratricis aliarum partium. Intelligendum ergo qua ratione cerebri alteratrix frustretur. Gal. cap. 4. lib. 3. de symp. caus. ait: omnia symptomata prodire ex intemperie partium simularium, & instrumentorum morbis, præterea materiae quantitate, & qualitatē. Quod idem est, ac si dixisset, omnia symptomata fieri vel læsa facultate, vel ob errorem externum: quem admodum ait, cap. 1. lib. 3. de symp. caus. Sicuti ergo diarrhoea est passio, quæ fit è coctione læsa in ventriculo: ita catarrhus fit è mala coctione in cerebro. Et, sicuti ventriculi coctio læditur, vel læsa facultate, vel ob errorem externum: ita etiam statuendum de cerebri coctione. Galenus loc. cit. respiciens ad facultatem læsam labefactam, proponit dyscrasias: respiciens ad facultatem læsam impeditam, proponit morbos instrumentorum:

torum: respiciens tandem ad errorem externum, proponit
materiae quantitatem, & qualitatem. Hoc igitur loco expli-
candum, quæ intemperies sit catarrhi causa, quæ compo-
sio, quæ materiae quantitas, & qualitas.

Quoad intemperiem: catarrhus produci potest ab intem-
perie Calida, & à Frigida. Frequentius fit à frigida: unde ex-
quisitissimus catarrhus fit à frigidityte, nam cerebri tempe-
ries naturalis vergit ad frigiditatem, id est, ad remissum ca-
lorem. Vnde Galenus respiciens ad catarrhum qui frequen-
tius occurrit, id est, ad exquisitissimum, hunc inter frigida
vitia connumerat, c. ult. l. 2. de temp. c. 5. l. 1. de tuend. san. aph.
ult. sect. 3. Verum & à calida intemperie fit catarrhus, com-
aph. 12. sect. 3. unde Gale. c. 9. l. 6. de tuend. san. illos redarguit,
qui semper in omni catarrho capiti calida applicabant, cre-
dentes catarrhum tantum fieri ab intemperie frigida. Quan-
tum igitur ad intemperiem frigidam: cum Gal. aph. 12. sect. 3.
potest esse Remissa, vel Intensa. Remissa producit excre-
mentum pituitosum vel subdulce, vel insipidum: intensa,
acidum. Præterea intemperies frigida, potest esse coniuncta
modo cum humida, modo cum sicca. Intemperiem frigidam
& humidam proposuit Gale. c. ult. l. 2. de temp. frigidam &
siccam aph. ult. sect. 3. Frigiditas autem dupliciter concurrere
potest, ad producendum excrementum catarrhale: primum
ut agit in alimentum, & hoc non potest vincere: unde ge-
neratur excrementum pituitosum, satis copiosum: secundo
ut vapores excrementitios à corpore elatos nec resoluit
nec permittit ut egrediantur per suturas: unde condensan-
tur, & misti cum cerebri excremento crasso descendunt
quemadmodum innuit philosophus, circa finem lib. de som-
no & vig. & cap. 7. lib. 2. de part. animalium. Quoad intempe-
riem calidam: hæc potest esse calida, calida & humida, ca-
lida & sicca. Concurrit autem ut potiss. calida intemperies
generat excrementum cerebri salsum: & potiss. id produci-
tur ab intemperie calida & sicca. Oritur autem dubium: quia
Galenus in arte med. cap. de signis cerebri ait: cerebrum
calidum & siccum superfluitatibus carere: ideo intempe-
ries calida & sicca non est causa catarrhi. Responsio. Ga-
lenus loc. cit. respicit ad cerebrum constitutum iuxta la-
titudinem sanitatis: nunc autem loquimur de intempe-
rie morbosa, qua fit attractio copiosioris materiae. Hinc
Anicennas in curatione catarrhi quandoque vitium frigidis

I. Dysera-
sia.

Frigida.

Calida.

& humidis. Intemperies calida habet vim colliquandi, vt excrementum calidius & tenuius reddatur: præsertim sub mora solis, si patiens olfaciat aromata, quæ præsertim reddunt caput calidius, si patiens sit natura rarioris habitus, vel etiã si rariorem habitum assequatur vi balnei, vel exercitij, vel aliorum. Quoad comparationem: causa catarrhi est angustia, cap. 1. lib. 9. de vs. p. caput enim veluti tectum est, domui calidæ superpositum, vt recipiat excrementa, quæ si detineantur ob angustiam, sit catarrhus. Error externus, est quantitas & qualitas materiæ extra cerebrum genitæ. Vitium quidem est secundum copiam, dum capiti à iecore, vel à ventriculo impertitur impurum alimentum copiosius: vt, cum non regatur à cerebro, nec vincatur, euadat materia catarrhi. Qualitate peccat materia, vt est calida vel frigida. Calida, vt pituita falsa, biliosa: & huius generatio pendet à iecore calidiore, vel obstructo, vel non obstructo: item ex assumptis calidioribus: ad hæc è toto, febre correpto. Materia frigida præsertim est pituita, quæ est genita vitio vel ventriculi, vel propter assumpta frigida: potest etiam esse materia melancholica, sed raro, nam materia melancholica in exigua copia generatur, estque crassa, vt non ita facile caput petat. Vnde Auicennas dicit, secundum mentem Hippocratis, aph. 42. sect. 2. lib. 6. epid. catarrho obnoxios vt plurimum tumore lienis non affici: Galenus in com. rationem reddens, ait hoc propterea euenire, quia vno membro detento, reliqua sana seruantur. Addit Auicen. fortassis causam esse, quod qui est obnoxius catarrho, est particeps humorum tenuium: dum autem adest lienis tumor, humores sunt crassi, & vix fluxiles.

*Differen-
tia.*

Cum ergo catarrhus sit excrementum crassum lædens: Si excrementum perpendatur ratione speciei: catarrhus est Pituitosus, Sanguineus, Biliosus, vel Melancholicus. Ratione vitij: excrementum peccat secundum Substantiam, Quantitatem, Qualitatem, vel Vbi, Ratione subiecti, in catarrho læditur vel Totum, vel Pars, & si pars, hæc multiplex esse potest, ut diximus. Ratione efficientis: cerebri alteratrix frustratur vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læditur facultas, quoniam vel Labefactatur ob intemperiem: vel impeditur ob angustiam, Frustratur ob errorem: qui est materia peccans Copia, vel Qualitate: cuius multiplex est species & causa generans.

Signa.

Catarrhus in genere notus est è verbis patientis. Quoad
differe

differentias, & primū à forma: à specie: num sit pituita, sanguis, &c. si egrediatur excrementū. oculis conspicitur: si non egreditur, species cognosci poterit è traditis in sermo. de dol. cap. Quoad vitiū excrementi: & primum secundum substantiā: cognoscitur ex iniucundo sapore, & iniucundo odore, & sic catarrhus putridus cognoscitur: veneficus cognoscitur è signis veneni: venereus, è signis luis Venereę. Quoad vitium secundū quantitatem: maior quantitas cognoscitur è symptomatum maiori vehementia. Quoad vitium secundū qualitatem: & primum quoad qualitatem primam: calidus catarrhus cum Rhasi cognoscitur è pruritu narium, è pruritu palati, è sternutamento: & cum Auicenna, è sensu caliditatis: & præterea è colore excrementi rubicundo, citrino, viridi, & rubedine oculorū, è calidis nocentibus, & frigidis iuuantibus. Frigidus catarrhus ex oppositis cognoscitur. Quoad vitium penes secundas qualitates: an excrementū sit crassum, an viscidum, an tenue, an huius vel illius coloris, odoris, saporis: hæc omnes differentię notæ sunt medico per visum, & auditum è verbis patientis. Quoad vitiū secundum motum: ratione termini à quo: si capitis expultrix iusto sit robustior reddita: cognoscitur, si capiti repleto, causā externa, cum impetu refrigerans, occurrerit: Hæc causā si desideretur, iudicandū expultricem excitari à materia: copia autem & qualitas huius materiæ quibus signis cognoscantur, patet ex alibi traditis. Quoad spatium per quod, si materia fluat per nares, vel per os: patet. Si fluat per celophagum: indicatur ex inappetentia, è nausea, è vomitu, è læsa cōctione ventriculi, & è malis vētris inferioris. Si fluat materia per tracheā: cognoscitur è screatu, è tussi, & difficili respiratione. Si fluat materia per vacuitates, per inanīa spatia membrorū: patiente conqueretur de sensu materiæ descendenti, ac citra dolorem insignem, præterea è vitiis non nerubrum, sed partium carnosarum. Si fluat materia per nervos: cognoscitur è dolore, è neruorum vitiis, utpote è tremore, torpore, paralyssi, conuulsione. Si destillet materia per venas: cognoscitur è tumore inflammatorio partiū, è cachexia, ex hypofarca, è febre latica, id est, catarrhali, è lotio non spumoso, sed in quo apparet spuma, ut spuma habeat rationē contenti: nam dum materia fluat per venas, vertitur in vaporem, qui mistus cum materia humida, per motum & calorem, est in causa spumæ. Si materia fluat per arterias: cognoscitur è pulsu molli,

*Speciei.**Signa viti-
orum.**1. Substan-
tie.**2. Quanti-
tatis.**3. Quali-
tatis.**4. Motus,
signa.**Terminus
à quo.**Spatij si-
gna.*

*Terminus
ad quem.*

*5. Quies
signa.
Differentia
a subiecto,
& causa
effic.*

*Indicationes.
Forma.
Species.*

Vitium.

Motus.

inæquali: modo frequenti, modo raro: vt materia catarrhalis modo est frigida, modo calida: adhuc cognoscitur e motu prauo cordis: e leipothymia, e sydcope. Quoad terminū ad quem: an sit totum vel pars: patet e noxis vel totius, vel partibus. Vtrum autem terminus ad quem concurrat, vel vt suscipit, vel vt attrahit: non difficulter patebit: nam si manus, verbi gratia, antequam afficiatur tumore catarrhali, vel doleat, vel calidior sit reddita: patet manum esse terminum ad quem, vt attrahit: si hæc desiderentur: vt suscipit: præsertim si manus sit vel frigida, vel humida, vel obtineat vasa latiora, vel rarioris sit habitus. Quoad vitium secundum quietē: vt materia magis vel minus hæret, cognoscitur, vt magis vel minus resistit medicamenti. Quoad differentias a subiecto: an sit totum, vel pars: patet e traditis. Quoad causam efficientem: vtrum catarrhus fiat læsa facultate, aut ob errorem externum: cognoscitur inde, quod læsio facultatis indicatur e morbis capitis, de quibus suo loco. Error externus indicatur e signis, significantibus materiam: caput petentem, vel copiam, vel qualitate peccat: de quibus in dolore capitis diximus.

Præsidia cum Galeno, cap. 14. lib. 3. meth. sumuntur a formâ subiecti, & causa efficiente. Quoad formā: cum sit crassum excrementum, varium & specie, & viciis species indicat, præsidium determinat, verbi gratia, simplicia putrescat, oritur indicatiōem non simpliciter eradicandā, sed eradicandi putritiam. Quoad vitium excrementi: si tan halis perpendemus vitium, quod, vtile indicat. Ratione substantiæ indicatur eradicatio ratione quantitatis: immuniens: ratione qualitatis, per contrarium alterans. Ad hæc respiciens Avicenna, ait, æquabilem reddendam esse materiam. Quoad vitium ratione motus: perpendere oportet cum motum tum terminet motus. Motus vt est præter naturam, indicat remedium remouens hunc motum præter naturam: & huius gratia Avicenna proponit seditionem cursus: per quam non intelligit interceptionem, quia hæc non est præsidium, sed intelligit prohibitionem cursus in genere: nam interceptio est modus prohibitionis cursus, non remedium. Si perpendatur motus ratione terminorum: & prius, si vterque terminus perpendatur, & ratione cursus prohibetur: vt cum in catarrhe materia moueatur vel ad partem sinistram, vel ad partem dextram: indicatur remedium retrahens, vel ad partem

tem sinistram, vel dextram, siue hoc fiat per modum reuulsionis, derivationis vel interceptionis: Vnde Auicennas causa vtriusque termini, proponit motum materię ad aliam partem: nimirum, non tantum ad dextrum vel sinistram, sed etiam ad dextrum vel brachium, vel crus: vnde colligitur non superuacuum fuisse Auicennam. Si perpendatur motus ratione termini à quo in catarrho à capite fluit materia, vel sursum, vt quando cutis capitis tumore afficitur, vel deorsum: hinc indicatur retrahens ad superiora vel inferiora: Auicenna huius indicationis causa proponit motum materię ad aliam partem. Ratione termini ad quem, quatenus attrahit, ratione doloris: indicatur remedium doloris vel anodynum, vel sanans, vel vtrumque: quatenus attrahit ratione caliditatis: indicatur frigidum. Si terminus ad quem suscipiat, & quidem ob frigiditatem: indicatur calidum: si ob humiditatem, siccum: si ob laxitatem, condensans. Auicennas ad hæc præsidia respiciens, ratione termini ad quem, proponit antecessionem prohibitionis eius, quod timetur generari ex eo: nam dum occurrimus termino ad quem, antequam vel suscipiat, vel attrahat: hæc est prohibitio antecessionis eius, quod timetur generari è vitio termini ad quem. Quoad vitium ratione quietis: indicatur discutiens: & si materia quiescat, verbi gratia, in manu, indicatur remedium discutiens materiam in manu. Et hoc præsidium non proponitur ab Auicenna: quia dirigitur ad catarrhi effectum, de qua in propriis capitibus dicendum. Verbi gratia, si materia quiescat in pede, pertinet ad sermonem de podagra. Quoad subiectum, siue sit totum, siue sit pars: de his dicendum in sermone proprio, de vitiis totius, de vitis partium. Tandem, quoad causam efficientem: si sit morbus, siquidem sit intemperies: per contrariū oportet alterare: si angustia; materia angustans expugnanda. Si causa efficiens est error externus: pro varietate speciei, vitij, causę generantis, variant indicationes, de quibus in doct. cap.

*Terminus
à quo.*

*Terminus
ad quem.*

Quies

2. Subiect.

*3. Causa
efficientis.*

*Prognosti-
ca.*

*Prognosti-
ca differen-
tia.*

Catarrhus contemnendus non est: quia vt plurimum est admodum vehemens secundum essentiam, quia ferme omnium morborum est soboles: vnde Galenus ait, cap. 8. lib. 1. de tuend. sanis. vi catarrhi totum languere. Præterea additur vehementia dignitatis: cum cerebrum sit terminus à quo. Quidam tamen catarrhi species est utilis. Quantum igitur ad differentias à forma: si perpendatur vis excrementi,

Species ex- & primum secundum speciem: catarrhus est magis pericu-
crementi. lous, si attrabilarius, minus si biliosus, minus si sanguineus,
 minus si pituitosus: est enim minor recessus à naturali statu.

Vitii sub- Quoad vitium excrementi: si vitium sit secundum substan-
stantia. tiam: tunc insignis est vehementia secundum essentiam, & pro-
Quantita- pterea catarrhus admodum periculosus. Si vitium attineat
tu. ad quantitatem: ut excrementum in maiori copia hæret, ita
 catarrhus magis periculosus: & si caput doleat, signum est
 copiosæ materiæ: vnde Auicennas dicit, dolorem capitis,
 coniunctum cum catarrho, fluxionem augere: quia ratione
 doloris fit attractio: ideo si catarrhus est cum dolore capi-
 tis, magis est periculosus. Si vitium attineat ad qualitatem:
Qualita- catarrhus est periculosior, si excrementum sit calidum, cras-
tu. sum, viscidum, ingrati saporis, ingrati odoris, & ut magis re-
 cedit ab albo colore. Si vitium attineat ad vbi: ratione mo-
Terminus tus, ratione termini à quo: periculosior est catarrhus, ut ce-
à quo. rebrum maiori cum impetu expellit, comin. apho. 1. sect. 3.
Spatij. Ratione spatij, per quod: cæteris paribus, catarrhus minus
 est vehemens, si materia fluat per nares: vnde Hippocrates
 ait, aph. 4. sect. 2. li. 6. epid. vbi est Menis tumor, non esse gra-
 uedinem, & contrat quibus verbis Hippocratis non respicit
 ad catarrhum in genere, sed ad catarrhum in specie, in quo
 scilicet materia per nares purgatur: non enim proponit ca-
 tarrhum, sed grauedinem: & ob id (quod Galeni pace dixe-
 rim) non est reprehendendus Rufus & Sabinus, dicentes,
 cum sanguis per grauedinem expurgatur, nihil in lienem
 descendere. Si materia destillet per nares, non ita destitit in
 lienem: Hæc causa est priuata, non proflus contemnenda.
 Quamuis non sit reiicienda Galeni ratio, & communis &
 priuata: communis, quod raro duo membra corporis æque
 sint debilia, ideoq; materia morbifica decumbat solū in par-
 tem magis debilem: priuata, quod grauedo quæ sit a pituita,
 per nares egrediente, sit è pituita tenui, & aquosa: lienis au-
 tem tumor e materia crassa & melancholica. Sed ad rem.
 Catarrhus minus est vehemens, si materia fluat per nares:
 magis vehemens, si per os: periculosior, si per œsophagum:
 adhuc periculosior, si per tracheam, nam minatur phthisin: si
 fluat materia per vacuitates membrorum, minus periculosus
 est catarrhus: magis periculosus si per nervos: nec minus pe-
 riculosus, si per venas, nam minatur febres, atrophiam: pesti-
 mus est catarrhus, si materia fluat per arterias, causa enim
 cordis

cordis imminet syncope. Ratione termini ad quem primum scire oportet: ut terminus ad quem est præstantior, ita catarrhus esse magis periculosus: maxima enim dignitatis adest vehementia: unde Celsus ait, si nares habeant rationem termini ad quem, catarrhus est levis: si fauces, est peior: si pulmones, est pessimus: imminet enim tabes secundum Hippocratem lib. de gland. Minus periculosus, est catarrhus: si terminus ad quem attrahatur: magis periculosus: si suscipiat: & si suscipiat ob imbecillitatem nativam, est incurabilis, quemadmodum est podagra catarrhalis hæreditaria. Si perpendatur vitium ratione quietis: vnde excrementum catarrhale magis hæret, ita catarrhus magis est periculosus. Si respiciamus ad causam efficientem: magis periculosus est catarrhus, si fiat læsa facultate: & magis si fiat labefactata: & deterior, si

*Termini
ad quem.*

Quietis.

*Prognostici
ca efficiam
tis.*

labefactata sit ob intemperiem calidiorē, nam generatur excrementum magis vehemens secundum essentiam. Si sit frigida intemperies, & ea in habitu: catarrhus est incurabilis: unde Hippocrates ait, aph. 40. sect. 2. destillationes in valde senibus non superari, non concoqui. Si fiat ob errorem externum: pro vehementia materiæ, peccantis vel qualitate, vel copia: vario modo prognosticandum: insignis enim est vehemētia, si, verbi gratia, materia copiosa, & qualitate peccans extra cerebrum generetur, admodum læsa facultate aliculus visceris: verbi gratia, si fiat catarrhus affecto vetriculo intemperie in habitu, vix curari potest: & sic de reliquis.

Quoad materiam cheirurgicam: probatur venæ sectio, si sanguis vehementer peccet. In catarrho sanguis peccare non potest sub ratione causæ principalis, quia non fluit sincerus: sed ut causa adiuuans, vel ut causa sine qua non. Concurrit ut adiuuans: dum catarrho sanguis miscetur cum excremento cerebri: ut propterea statuendum sit hunc catarrhum esse calidum, ob sanguinis permissionem. Concurrere etiam potest sanguis, ut causa sine qua non, dum in toto abundat: veluti cum Mesue, dum corpus est calidum, & sanguineum, & catarrhus est calidus: dum enim corpus est calidum & sanguineum, catarrhus fit vel à pituita salsa, vel à pituita cum bile, vel à pituita cum sanguine: & quomodocumque fiat, semper catarrhus est calidus. Vena ergo tantum est secanda in catarrho calido, ut statuit Mesues, dum sanguis habet rationem causæ adiuuantis, vel sine qua non. Vnde Rhasis probat venæ sectionem in catarrho cum pruritu narium & palati:

*Curatio.
Vena jē-
tio.*

ad est, in catarrho calido. In frigido catarrho igitur non est vena secanda, quia sanguis non habet rationem causæ principalis, nec adiuuantis, nec sine qua non: dum enim catarrhus est frigidus, corpus est frigidum: quare partes obtinent sanguinem exiguum, ut propterea sanguis non possit habere rationem causæ sine qua non, sed potius habeat rationem materiæ remedij iuuantis: quemadmodum etiam febris, secundum Auic. habet rationem materiæ remedij in catarrho frigido. In frigido ergo catarrho venesectione nocet: primum enim vacuatur sanguis, & materia iuuans: deinde per accidens refrigeratur corpus. Porro in catarrho calido, vehemens sanguinis vitium indicatur: si afficiatur pars magni momenti, si febris sit annexa. Nec tantum secanda est vena, ubi corpus est sanguineum, sed etiam dum descendit ad oculos, ad fauces, ad pulmones: & præsertim si febris sit annexa: hæc enim significant vehemens sanguinis peccatū, dum catarrhus est calidus: si autem catarrhus sit frigidus, licet febris absit, vena non est secanda, quia febris est materia iuuans. Cum ergo in catarrho calido sit secanda vena, id notandum, ut non copiosius educatur sanguis, nec ea copia, qua peccat: unde venesectione parca erit, secundum Auic. & ratio est, quia in catarrho sanguis non peccat ut causa principalis: relinquenda igitur est aliqua sanguinis copia, ut virtus possit superare causam principalem, & possit etiam perferre medicamenta, quibus uti oportet ad causam principalem. Quoad usum venesectionis iduo circa Quando monebimus.

Usum venesectionis. Primum sciendum, quod Gale. c. 14. l. 5. meth. respiciat ad catarrhum falsum. Si ergo patiens sit sanguine refertus: in eo catarrho sanguis habet rationem causæ sine qua non, & vincit alia indicantia, præsertim si corpus sit robustum: & tunc vena est secanda. At si in catarrho falso, patiens est exigui sanguinis, sanguis non habet rationem causæ sine qua non: ideoque non statim in principio est secanda vena. Dum enim sanguis est exiguus, & copia adest vitiosorum succorum: sane virtus robusta esse nequit: Cum autem necessariū sit uti purgantibus, propter succos vitiosos, quibus purgantibus virtus redditur debilior: propterea secundū Gale. cibus reficiendus est ager: & si per hanc refectionem gignatur sanguis, ea copia, ut habeat rationem causæ sine qua non: ob id Gale. loc. cit. post purgationem vacuat sanguinem, sed reficit vires, & roborata virtute rursus purgat: deinde rursus reficit: & si

res suadet, id est, si per refectionem à cibis, sanguis est genitus, vt habeat rationem causæ sine qua non. rursus sanguinem mittit. Secundo, notandum cum Rhaf. secundam esse venam in catarrho, si post appositum pannulum calidum capiti, passio nec tollitur, nec imminuitur. Hic Rhafis respicit ad catarrhum calidum, in quo materia propellitur à capite refrigerato, à causa externa refrigerante: nam cognouit Rhafis, in principio capitis frigiditatem quandoque vincere sanguinem, quandoque à sanguine vinci. Vincit quidem capitis frigiditas sanguinem, si frigiditas sit remissa, vt cedat pannis calidis: nam à pannis calidis, breui tempore vsurpatis, non calefit caput, vt sanguis trahatur, sed solum frigiditas tollitur, & superata frigiditate, malum superatur, hoc est, expressio materiæ catarrhalis cessat. Frigiditas autem capitis vincitur à sanguine, si frigiditas sit ita impressa, vt pannis calidis non cedat: vnde cum Rhaf. passio nec adimitur, nec minuitur: ideoque necessarium est ea adhibere medicamenta, quæ magis calefaciant, quam panni calidi: & tunc si sanguis abundaret, traheretur in caput: cum ergo sanguis magis possit, quam capitis frigiditas, primum erit secunda vena. De cucurbitulis notandum circa vbi. Auicenna in destillatione ad pectus, nō applicat cucurbitulas dor-

Cucurbitula.

Cauteria.

712

catarrho,

catarrho, est materia remedij tum vacuantis, tum retrahentis, & hinc indicati à materia peccante copia & motu.

*Therma-
reia.*

Medicamenta respiciunt Totum corpus, Caput, & Partes quæ afficiuntur in catarrho. Medicamenta quæ respiciunt totum, & caput, proposuimus in dol. cap. At medicamenta respicientia partes, quæ in catarrho afficiuntur, sunt proponenda in propriis capitibus. Verbi gratia, si materia fluat ad pulmones: in vitulis pulmonum de his dicendum. Quare propter iuniores satis sit quædam notare, circa purgantia totum, circa alterantia caput, & circa intercipientia.

*1. Purgan-
tia totum.*

Quantum attinet ad totum: purgantia solum probantur, dum præsens est materia purganda: vnde Galenus com. 85. lib. 4. de vict. (dum auctor ille probat *helleborum* in catarrho) monet, non omnibus veratrum esse dandum, nec in omni catarrho: vt interdum soli capiti sit prouidendum, dum scilicet in toto materia non peccat.

*2. Alteran-
tia.*

Secundo notandum circa alterantia, & vna insensibiliter euacuantia: Alexandrum, cap. de sputo sanguin. redarguere Galenum, cap. 14. lib. 5. method. in catarrho salso applicatæ medicamentum coronali futuræ, confectum è *thapsia* & *fimo columbino*: at Alexander in catarrho calido non probat calida, sed frigida? Responso. Calefacientia sunt materiæ vacuantes, retrahentes, & calefacientes. Galenus his vititur, vt vacuantibus insensibiliter, & potissimum vt retrahant materiam: non autem vt calefaciant, id est, vititur his propter materiam morbosicâ, non propter dyscrasiam calidam: nam materia salsa peccat copia, & motu, vt petit pulmones: est ergo minuenda & sursum trahenda, quod consequimur beneficio *thapsia* & *fimi columbini*. Galenus ergo, non loquitur de alterantibus, quia respicit ad indicationes, quæ sumuntur à materia genita, non autem ad eas, quæ sumuntur à causa generante. Contra autem cap. 9. lib. 6. de tuend. sanit. Galen. respiciens non ad materiam, sed ad capitis intemperiem, in catarrho calido probat frigida: de quibus diximus in dol. cap.

*Stillicidiũ
frigidum.*

Tertio notandum in catarrho calido, circa modum administrandi materias refrigerantes: Aëtium probare *stillicidium frigidum* ab alto supra caput, dummodo æger non sit thoracis debilis. At Mesues & Auicennas admonent, in catarrho calido actum frigida, raro esse applicanda: cum enim modus agendi indicetur ab indicante, vt facile vel difficulter patitur: si accidat, capitis caliditatem esse intensam, vt non facile cedat,

cedat, probantur medicamenta actu frigida, diuimodo non sit prohibēs præsens. In catarrho igitur calido, materia morbifica in thoracē vel actu fluit, vel imminet ne fluat. Si actu fluat: prohibens præsens est materia, vt peccat secundū motum: & propterea prohibet medicamentum actu frigidum: nam huius vi augetur vitium materiæ in motu, siquidem materia actu fluens in pulmones, per medicamentum actu frigidum magis fluere. Si autē immineat, ne materia fluat: tunc materiæ motus non prohibet, quoniam non est præsens. Quare quod prohibet, cum necessario sit præsens, est thoracis imbecillitas. Et ob id Aëtius probat stillicidium actu frigidum: nisi thorax facile offendatur, id est, dum thorax ita est imbecillis, vt prompte suscipiat, nec expellat, id est, dum thorax est vel humidior, vel laxior.

Quarto notandum circa intercipientia. Secundum Auicennam & Galenum cap. 31. lib. 3. de aliment. non licet vti *pa- 3. Intercipientia.* pauere, dum materia iam destillauit in pectus: sed eo vti licet, antequam destillet: nam Quando agendum, indicatur ab indicante præsenti, vt vincit alia indicantia. Vnde materia fluens, indicat retrahens: materia fluxa indicat expectorans, euacuans. At fluxa materia magis potest quam fluens: nam materia in pulmones fluxa magis nocet, vt propterea vti liceat medicamento potius euacuante: medicamentum autem retrahens per modum interceptionis, *vt papauer,* materiam fluxam reddit magis rebellem euacuationi. Quare vtendum est materia intercipiente, antequam fluat. Cum ergo per somnum materia fluat, & vigiliæ tempore materia fluxa expurgetur: practici *diacordio & aliis intercipientib. post cenam vtuntur, hora autem vigiliarum, expectorantibus.* Sed de his in malis pulmonum.

Quoad Dietam: & primum quoad aërem: Auicennas suadet in omni catarrho cauendum esse ab aëre frigido, & præcipue postquam corpus aëri calido fuit expositum: quoniam materia morbifica vi aëris frigidi propellitur ad subiectas partes, vnde augetur catarrhus. Cibus copiosus in catarrho *Cibus.* improbatur: & hinc Auicennas imperat, vt ægri famem & sitim sustineant. Celsus, ad specialia magis descendens, admonet assucto cibo partem dimidiam esse adimendam: quod si patiens non obediat, vomitus erit instituendus: cibus etenim copiosus excrementum catarrhale auget. Et cum somni tempore à copioso alimento prodeant vapores copiosi in caput:

*Potus.**Somnus.*

put: cum Mesue probatur cœna parciore prandio: nisi sit pa-
 tiens, qui per 4. horas à cœna cubitum eat, & nisi patiens
 cōsueuerit vberius cœnare. Cur autem Galen. in consil. pro
 puero epileptico probet cœnam prandio largiorem: diximus
 in sermon. de epilepsia. Quoad potū: in catarrho calido Rha-
 sis prohibet *vinum*: calefacit enim & desert materiam in ca-
 put. Et si calori nexa sit humiditas, adhuc magis improba-
 tur *vinum*: nam caput vt calidum attrahit, vt humidum sus-
 cipit. At, si temperamentum sit calidum & siccum, Gale-
 nus cap. 11. lib. 1. de tuenda sanitate, *vinum* admittit: *vinum*
 enim habet vim humectandi, & attemperandi bilem, & per
 sorium, & per sudorem euacuandi. Sed, cum Galeno cap. 6.
 lib. 9. de plac. Hippocra. *vinum* erit in parua copia, & sub-
 dulce. In catarrho frigido, Auicennas non exhibet *vinum*,
 nisi aliquid vrgeat: & exhibet *vinum* mediocre, post matu-
 rationem catarrhi: nam *vinum* materiam desert in caput.
 Somnum & vigiliam, radicem esse curationis catarrhi, dicit
 Auicennas. Prodest igitur vt homo vigilet, quantum fieri
 potest: nec dormiat interdium, nec repleto ventriculo: decubi-
 tus non sit supinus. Quibus verbis Auicennas proponit,
 Quantum, Quomodo, & Quando. Quantum: cum somnus
 & vigilia sint materia, quæ administrantur causa virtutis
 coëctricis & expultricis: & cum in catarrho magis requira-
 tur expulsio, quam coëctio: (nam magis in catarrho ege-
 mus euacuatione, quam repletionem) propterea in catarrho
 necessarium est, vt vigilia somnum excedat: cum per som-
 num fiat coëctio & repletio, per vigiliam distributio & inani-
 tio: vt vigilia in catarrho sit materia iuuans, somnus sit cau-
 sa morbifica. Quoad modum: quamuis ratione virtutis co-
 quentis parum referat, an homo iaceat supinus vel pronus,
 vel ad latera, capite eleuato, vel depresso, tamen ratione ma-
 teriæ catarrhalis plurimum refert: Decubitus enim supinus
 prohibetur à materia, vt caput petit, nam renes incalescunt,
 incalescit vena cava, vt vapores copiosi petant caput: Proba-
 tur igitur decubitus ad latera. Quoad decubitum, vt sit ca-
 pite eleuato, vel depresso: scire oportet, quemadmodum
 materia fluens à capite in thoracem, prohibet decubitum
 capite eleuato, nam sic facile descendit materia: ita si mate-
 ria in pulmones fluxit, prohibetur decubitus capite depres-
 so: nam hoc decubitu fit difficilis respiratio, vt repletis bron-
 chiis homo non respiret, nisi recta ceruice, vt in orthopnoea.

Quoad

Quoad Quando agendum : primum probatur somnus nocturnus, nam virtus naturalis noctu concoquit, interdium distribuit, & ratione consuetudinis, & ratione aëris : ratione consuetudinis, nam vt homines consueuere noctu dormire, ita & concoquere : vt si mutetur consuetudo, virtus fatigetur : Ratione aëris, nam aër nocturnus magis fauet motui ad centrum, & ob id coctioni : contra diurnus magis fauet motui ad circumferentiam, & proinde distributioni. *Balneum.* Balneum aquæ dulcis Auicennas probat, in catarrho calido & frigido. Quoad vsum : & quidem Quando : monet, si catarrhus sit præsens, & sit frigidus, non probari balneum, ante maturacionem : in catarrho autem calido probari : nam materia crassa, viscida, frigida non cedit balneo : materia autem calida cedit. Si catarrhus imminet, Auicennas prohibet balneum, quia mouet materiam. Id autem seruandum in catarrho, dum vsurpatur balneum, vt homo sudet : non debet administrari, vt in febre hectica, sed oportet sudare : nam vi balnei, materia vitiosa euacuatur, & retrahitur ad ambitum totius : expedit etiam, vt corpus non sit admodum repletum, nam balneum obesset.

CAPVT XXVIII.

De Sternutamento.

Sternutamentum est vitium, quod attinet ad expultricem cerebri. Per sternutamentum autem intelligimus illud vitium, in quo est motus cum strepitu, cum motione capitis, vt potissimū materia expurgetur per nares. Generatur hoc malum, vt colligitur ē cap. 3. & 4. lib. 2. de caus. symp. dum causa vehementer, & cum violentia agit in nares, vt ad narium affectionem afficiatur cerebrum, vt cerebri expultrix cum impetu ad expellendum insurgat, vt vehementer concutiat. Verum, cum expulsio sit molienda per nares, seu per meatus non subsidentes : cum sola virtus expellere nequeat, nisi spiritus vehementer impellantur : in hac vehemēti impulsione, cum sit collisio, sit etiā sonitus, vt impellatur aër sed spiritus ope musculorū, vt propterea opus fuerit facultate motrice. Sternutamentū igitur est motus prauus cum sono cerebri, depēdēs ab eius expultrice, stimulata à naso, & adiuta à motrice capitis

*Nomen.**Generatio.**Definitio.*

Forma.

capitis & thoracis. cap. 1. 3. 4. 5. lib. 2. de caus. sympt. aphor. 39. sect. 6. apho. 51. sect. 7. Forma sternutamenti est motus prauus cum sono: est enim sternutamentum, motus violentus, aph. 39. sect. 6. & ob id pro genere habet motum prauum. cap. 7. lib. 2. de caus. sympto. Vnde, quamuis sternutamentum non videatur esse præter naturam: est tamen è genere symptomaticum, quoniam est motus violentus, & vehementioris impetus, quam sit tussis. cap. 3. 4. 5. lib. eiusdem. Nec obstat, quamuis sternutamentum interdum iuuat? nam & febris quandoque utilis est; præter naturam tamen existit. At in sternutamento hic motus instar tussis habet strepitum: vnde Galen. cap. 3. lib. 2. de caus. sympt. ait: sternutamentum genere conuenire cum tussi, ratione scilicet sonitus, vnde etiam Hippocrates aphor. 51. sect. 7. sonitum proponit. Subiectum est cerebrum: vnde Auicennas ait: sternutamentum esse motum proprium cerebri: motus hic, vt attinet ad caput, est passio: vt ad cerebrum, actio. Hinc Galenus ait, cap. 4. lib. 2. de caus. sympto. in sternutamento causam morbosicam naturam excitare ad actionem.

Causa efficiens.

Hic motus est actio expultricis cerebri: vnde gratia causæ efficientis, in definitione diximus: dependens à cerebri expultrice, stimulata à naso, adiuta à motrice capitis & thoracis. His verbis triplex continetur causa efficiens: prima spectans ad Cerebrum: secunda ad Nares: tertia ad Caput & thoracem. Efficiens causa, quæ pertinet ad cerebrum, est expultrice: nam sternutamentum, ad similitudinem singultus, fit ab expultrice, cap. 2. lib. 2. de caus. sympt. vnde & Auicennas dicit, sternutamentum esse motum cerebri, ad expellendum nocumentum. Quoad nares: sternutamentum fit, si nares irritantur. cap. 5. lib. 2. de caus. sympt. aph. 51. sect. 7. cap. 4. & 5. lib. 2. de caus. sympt. Primo quidem irritantur nares, secundo cerebrum: vt si sternutamentum fiat etiam à causa interna, id est, à materia existente in capite, opus sit, vt materia secundum aliquam sui partem in nares feratur: vnde in phreniticis non est sternutatio necessaria, quamuis in phreniticis caput sit repletum materia acri & mordacissima. Porro nares afficiuntur & stimulantur à causa interna, vel externa. Vnde cum Galeno aphor. 51. sect. 7. falsum est, omne sternutamentum fieri è capite, id est, à causa interna, cum etiã fiat ab externa, verbi gratia dum nares penius irritantur. Internam igitur causam proposuit Hippocr. aphor. 51. sect. 7. dum

Interna causa stimulans.

ait,

ait, sternutamentum fieri è capite, calfacto cerebro, aut humectato eo quod in capite est inani. Quæ dicta noluit intel-
ligere Galenus, & ideo redarguit Hippocr. Loquitur ergo
Hippoc. de sternutamento quod fit à causa interna, ad diffe-
rentiam eius, quod fit à causa externa. Vnde, sicuti sternuta- *Explicatio*
mentum à causa externa, fit citra vitium capitis, si saltem *aphor. 51.*
irritentur nares, verbi gratia pennis: ita sternutamentum, *sect. 7.*
procedens ab interna causa, fit à capite male affecto. Hippo-
crates ergo respiciens ad causam internam, proponit ster-
nutamentum à capite: & statuit fieri calefacto cerebro, aut
humectato eo quod in capite est inani Declaro. Cerebri cali-
ditas bifariam concurrere potest: primo, vt caput calidum
generat materiam mordacem, cuius portio, dum petit na-
res, fit irritatio ad sternutamentum: deinde concurret cali-
dum cerebrum, sicut in com. inquit Galenus, dum vi calidi-
tatis ita attenuatur humor, vt descendat in nares, siue hic
humor reperiatur in ventriculis, siue in spatio, quod cere-
brum ambit exterius. At, quoad sternutamentum vt fit inani
in cerebro humectato: Galenus contra Hippo. dicit, hoc esse
superfluum ad generationem sternutamenti: nam, ait Gale-
nus, si humor in capite abundet, non facit sternutamentum,
nisi in ventum conuertatur: vnde multi, inquit idem, repe-
riuntur homines, qui copiosum humorem per nares excer-
nunt, non tamen omnes sternutant, sed hi tantum quibus
mordax humiditas à capite fluit. Dicendum pro Hippocra-
te: dum Hippocrates proponit inane capitis humectatum:
intelligit repletionem illius spatij interni, à materia morda-
ci ac tenui, quæ genita est extra caput: ad differentiam ster-
nutamenti, quod fit à capite calefacto: hæc autem materia
est vel biliosa, vel salsa, genita in ventre inferiori, quæ petit
capitis inania, & hinc nares: vt inde fiat sternutamentum
citra capitis caliditatem. Sternutamenti ergo causa interna
est materia mordax, à caliditate capitis vel genita, vel atte-
nuata: & præterea alia è parte, causa interna est materia
acris, alibi genita, & in caput fluxa. Hinc facile colligitur in
sternutamento cerebri expultricem frustrari ob errorem *Externe*
externum, qui est materia mordax. Quoad causam externam, *causa irri-*
causa est primo agens in nares, vel soluens continuum, vt *tans.*
penna. aph. 51. sect. 7. & c. 5. l. 2. de caus. symp. vel simul etiam *3. Motrix*
calefaciens, vt aromata, quæ palata & naribus applicantur. *capitis, &*
Postremo in definitione diximus: adiuta à motrice capitis & *thoracis.*

thoracis. Hoc colligitur è cap. 4. lib. 2. de caus. sympt. vbi vult Galenus ad sternutamentum concitandum, caput concurrere, & per se, id est, per musculos capitis: & per nervos pectoris, ac proinde per musculos pectoris. Vnde Hippocrates aphor. 51. sect. 7. statuit, aërem sonantem non modo prodire è capite, sed etiam ab infra, & proinde è thorace. Quare, cum Auicenna concurrat motrix capitis, ad omne sternutamentum: & motrix thoracis ad perfectum sternutamentum.

Differētia.

A forma non sumuntur differentię, nisi secundum Magis & Minus: vt in sternutamento motus prauus cum sonitu, est vel magis, vel minus prauus. A subiecto non sumuntur differentię: quia semper est cerebrum. Quoad causam efficientē: pręcipuę differentię sumuntur à causa irritante expultricem cerebri: vt hæc causa varia est, secundum Speciem, secundum Affectum (non dico vitium) & secundum Causam generantem. Quoad speciem: causa est Interna, vel Externa. Interna, vel Vapor, vel Mordax minera. Externa, vel Soluens continuum, vel etiam Calefaciens. Quoad affectum: ita afficitur causa irritans, vt sit vel Salutaris, vel Morbifica (propterea, quatenus salutaris est, non consideramus vitium, sed affectum: quia enim est salutaris, nõ est vitiosa.) Salutaris est, dum agit tempestiue: morbifica, si intempestiue. Si tempestiue agat, non est sternutamentum prorsus præter naturam: vnde Galenus dicit, cap. vlt. de diff. sympt. sanguinis deiectionem, quamuis sit symptoma toto genere præter naturam, non tamen esse præter naturam, si tempestiue fiat. In sternutamento autem differentia est inter causas internas & externas: nam causa externa concurret, modo vt salutaris, modo vt morbifica: sed non vt affecta secundum propriam essentiam, verum saltem vt bene, vel male vsurpatur: si enim decenter vsurpetur, est materia remedij: sin minus, est causa morbifica, verbi gratia si quis, toto repleto, applicet naribus piper: piper erit causa externa, sed morbifica, quia male vsurpatur. At causa interna concurret, modo vt salutaris, modo vt morbifica, vt bene vel male afficitur: non ratione vsus, sicut causa externa, sed secundum propriam essentiam. Quoad causam producentem: producitur causa interna vel in capite, vel Extra caput: vt diximus.

Signa.

Sternutamentum in genere facile cognoscitur: sicut etiã differentię à forma. Quoad differentias causę efficientis: si causa sit externa, vel interna: cognoscitur ex ægro & assidētibus

tibus, verbi gratia si sit præsentia aromatum, facile dici potest, malum prodire ab externa causa. Vtrum autem interna causa sit vapor vel minera: constat è serm. de dol. cap. Sternutamentū si fiat, propterea, quod materia sit male disposita, cognoscitur: si verbi gratia sternutamentum fiat in principio catarrhi, si fiat toto corpore repleto, si patiens difficulter toleret. Si contra, indicium est materiæ bene affectæ, & tempestiue agentis. Vtrum autem materia genita sit in capite, vel extra: cognoscitur è traditis in serm. de dol. cap.

Forina in sternutamento vtile non indicat. Subiectum, id est, cerebrum, quid indicet, patet. Quoad causam efficientē: cum indicatio sumatur à causa interna: quid indicet species internæ causæ, siue sit vapor, siue minera: patet è traditis in dolore capitis. Quoad speciei affectum: si causa est bene affecta, vt irriter tempestiue: si perfecte agit, nil agendum: si imperfecte, adiuvanda. Cum autem imperfecte irritat & agit, quoniam remissa est caliditatis, indicat calidum, vt perfecte irriter. Si materia sit male affecta, vt irriter intempestiue: si hoc fiat ratione copię, minuenda materia: si ratione caliditatis, oportet refrigerare. Si fiat à capite calefacto, pariter oritur indicatio refrigerandi. Si fiat ab inani capitis repleto, oritur indicatio vacuandi: Et materia, quæ in caput fluit, est retrahenda: Et, si verbi gratia generetur in iecore calidiori, oritur indicatio refrigerandi iecur.

*Indicatio-
nes.*

Sternutamentum, vt signum, est bonum: significat enim virtutem robustam: vnde Auicennas ait, morti proximum non posse sternutare. propter virtutis imbecillitatem: vt, si homo è medicamenti sternutatoriis non sternutet, cum Auicenna non sit sperandum de salute. Quod si vero sternutamentum sumatur vt habet rationem causæ: modo est vtile, modo non vtile: vtile, dum materia est bene affecta, nam, secundum Auicennam caput humidius exsiccatur, superuacua expellit, capitis grauitatem sedat: iuuat etiam ad partum edendum, ad secundas excludendum. Non autem sternutamentum est vtile, si fiat intempestiue: vnde Auicennas dicit, malum esse in principio catarrhi, nam caput replet: nocet etiam sternutamentum febricitantibus, dum assiduū est, nam deiecit vires: non est etiam vtile, dum sanguinis fluxum per nares promouet: nocet quoque si in pectore materia cruda & copiosa resideat. Cæterum, quamuis noceat: possumus tamen salutem polliceri: nam possibile est caput

*Prognosti-
ca.*

euacuare, mordacem materiam attemperare, caput calefactum refrigerare, & caput ac totum euacuare.

Curatio.

Quoad materias: sufficiat proponere medicamenta, quæ vel cohibent sternutamentum intempestiuum: vel tempestiuum imminutum adiuuant. Quoad prohibentia, Auicennas probat oleum rosæ, oleum de salicibus. Caput fouet Auicennas aqua moderate calida. Probantur odoramenta à pomis, à rosis: nisi sit patiens, qui à proprietate rosas ferre non potest. Probantur denuo odoramenta à refrigerantibus, ut violis. Auicennas pro infantibus probat, succum fluentem à renibus integris assis: oportet autem sumere succum, antequam renes à toto coquantur: & potest sumi hic succus, à renibus vituli, agni, vel arietis.

Oribas. ca.

48. lib. de

cura. loc.

affect.

Paul. cap.

49. lib. 2.

Cap. 98. l. 6.

1.

Si sternutamentum fiat à flatu: cum Græcis probatur oleum nardinum: probatur medicamentum confectum ex aniso & nigella: nam hæc dissolunt flatus: vnde cessat sternutamentum. Addit Aetius, secundum Apollonij sententiam, optimum esse, ut cicoria penna in cubiculo detineantur: ut impossibile sit, pueros sternutare, his præsentibus: quod si verum est, à proprietate id efficiunt. Quoad medicamenta adiuuantia sternutamentum: Auicennas probat inter leuiora apium (&) aristolochiam: fortiora sunt, albus helleborus, piper, & alia proposita in dolore cap. Diarta his correspondere debet.

CAPVT XXIX.

De Affectione Hydrocephala.

Nomen.



ITEM hoc à cerebri excremento pendet. Per hydrocephalam affectionem, seu capitis hydrophem, intelligimus illud malum, in quo caput ita repletur excremento aquoso, ut in tumorem ar-

Generatio.

tollatur. Generatur hoc malum, quoniam excrementum aquosum, in capite existens, ob vasorum, vel anapedesin, vel anastomosin, vel diæresin, à vasis egreditur, & in capitis capacitatibus ita colligitur, ut tumorem pariat. Quare hydrocephala affectio est tumor capitis, procedens ab excremento aquoso. Colligitur hæc definitio ex Aëtio, cap. 1. lib. 6. Forma

Definitio.

Forma.

Subiectū.

Causa efficiens.

huius accidentis est tumor, & proinde magnitudo aucta: quæ si exigua sit, est symptoma: si ingens, morbus. Subiectum est caput: ad differentiam tumoris aliarum partium.

Excrementum aquosum est causa efficiens, sed continens

Ex vsu: nam hoc excremento posito ponitur tumor: & remoto, saltē quoad sensum remouetur. Porro intelligere oportet, excrementi aquosi speciem, vitium, & causam generantem. Quoad speciem: excrementum aquosum vel Sincrum est, vel Mistum cum alia materia. Sincrum est excrementum tenue chyloseos, quæ sit in ventriculo, quod excrementum in iecur distribuitur, & hinc in totum, & hinc in caput: cum hoc excrementum sit sanguinis vehiculum. Mistum cum alia materia, est excrementum serosum, mistum vel cum Cerebri excremento crasso, vel cum Sanguine (vt testatur Aëtius:) Proinde cum alia materia semper coniungitur excrementum serosum: nam si humor extra capitis vasa elabatur, multo magis serum egreditur, quia tenuius. Vitium pertinere potest ad Substantiam, Quantitatem, Qualitatem, & Vbi. Ad Substantiam: post collectionem materiæ semper ante collectionem nonnunquam: nam dum materia est collecta, necessario putrescit: antequam colligatur, esse potest non putrida: at quandoque ante collectionem, capite male affecto, potest esse putrida. Quoad quantitatem: peccat copia, quoniam est causa tumoris. Qualitas materiæ collectæ, semper est vitiosa, nimirum viscida & lenta: sed antequam colligatur, interdum potest esse vitiosa, interdum non: quemadmodum de vitio substantiæ diximus. Quoad vbi: secundum motum semper est vitij particeps, vt mouetur è vasis extra vasa. Secundum sedem semper est vitiosa, nam quiescit in morbifica sede, quæ sede est in capite, & quidem vel Extra cranium, vel Intra. Si extra cranium, quiescit in spatio, vel Inter cranium & pericranium, vel Inter pericranium & cutim: potest etiam attinere ad Alias partes, vt ad musculos temporales. Si materia intra cranium resideat: vel residet Inter cranium & membranas, vel Inter membranas & cerebrum: non tamen in ventriculis, quia fieret epilepsia, apoplexia, carus, aut quid simile. Quoad causam, & potissimum vitij præcipui, hoc est, secundum motum: cum Actio materia mouetur, quoniam in vasis contineri nequit, ob causam vel Obscuram, vel Euidentem. Ob obscuram, vt dum sit vasorum apertio, vel secundum tunicas, vel secundum orificia: si secundum tunicas, sit diapedesis, ob humiditatem, vel tenuitatem tunicarum vasorum: si secundum orificia, sit anastomosis, quæ producit a materia copiosa, vel acri, vel quæ cum impetu mouetur. Si causa sit euidentis,

1. *Species.*2. *Vitium.*

3. *Causa generans.*

est *draigens*, quæ sit à plaga, ab ictu: vt frequenter fieri solet in infantibus, dum obstetrices imperitæ manu duriori partum efficiunt attritionem & disruptionem. Quoad causam generantem: in hydrocephalo aliquo desideratur, verbi gratia dum sit à causa eidente: locum autem habet in hydrocephalo, in quo materia genita est, antequam vasa egrediantur. Et generatur vel Læsa facultate, vel ob errorem externum. Læsa facultate: ob intemperiem frigidam, vel cerebri, vel hepatis, vel ventriculi. Ob errorem externum: si excrementum aquosum sit copiosius, vel ob immodicum potum, vel ob cibos aquosiores.

Differètia.

Quoad differètiâ à forma. In hydrocephalo, tumor nonnunquam est Symptoma, nonnunquam Morbus. Subiectum semper est caput: sed magis secundum vnâ partem, quam secundum aliam. Ratione causæ efficientis, sumi possunt differèntiæ ab excremento aquoso, vt differt specie, vitio, causa generante: quemadmodum diximus.

Signa.

Malum hoc facillime cognoscitur: nam tumor persentitur in parte, in qua est collectio, & sentitur tumor mollis, cedens ad digitorum contactû, præcipue, vt Paulus monet, si tumor sit inter cranium & cutim: alias enim minus mollis persentitur ob partes interpositas. Facile etiam differèntiâ à forma cognoscuntur: num tumor sit magnus, vel parvus. Quoad subiectum: qua in parte tumor reperiatur, oculis conspicitur. Ratione causæ efficientis: excrementum potest esse sincerum vel mistum. Sincerum esse, & solum, cognoscitur: si caput nec sit intemperatum, nec à causa externa attritum vel percussum. Quod si indicia sint capitis frigidioris, humidioris: iudicandum, cum excremento seroso, mistum esse cerebri excrementum. Et, si à causa externa caput sit attritum, statuendum, cum seroso excremento sanguinem esse permistum. Facile etiam cognoscitur excrementi vitium. Si enim sit in substantia: cognoscitur è fœtore. Si in quantitate: è magnitudine tumoris: nam secundum Aëtium, interdû tam copiosa est materia, vt futuræ cranij tûpi videantur. Vitium in qualitate, cognoscitur è capitis intemperantia: intensum enim est vitium, si dyscrasia intensa. Vitium in motu cognoscitur è mali origine: si enim, verbi gratia, vitium repente sit abortum, signû est vehementis dyscrasie. Materia quiescens cognoscitur: nam vbi quiescit, ibi tumor sentitur: & vt materia magis quiescit circa extimas partes,

tes, ita etiā cum Paulo erit magis euidens, & magis mollia. At si materia sit collecta intra craniū: indicatur ē gravitate capitis, ē vertigine, ē sensibus obtusis, ē lacrymis: nec per sentitur tumor, nisi patiens sit infans, propter ossis mollitiem. Quoad cognitionē causæ vitij: si fuerit *diaporesis*, indicatur ē pregressa causa solvente continuū, vt etiā sit prægressus dolor. Si fuerit *diapedesis*, aut *anastomosis*, cognoscitur inde, quod causæ euidētes nō præcesserūt: & in *diapedesi* tumor est minor, quā in *anastomosi*, quia per tunicas rarefactas materia exigua egreditur, secus per aperta orificia. Ratione causæ generantis: vtrum species humoris genita sit, vel læsa facultate, vel ob errorē externū: cognoscitur ex alibi propositis.

Præsidia, quæ sunt ex vsu, sumuntur à causa tumoris, id est à specie materiæ, à vitio, à vitij causa, & à causa generante speciem. A specie: si materia aquosa: hæc euacuanda: si mista cum sanguine: etiam sanguis euacuandus. Quoad vitia: materia putrescens eradicanda: non putrida etiam eradicanda: nam cum sit extra sedem propriam, nisi eradicaretur, corrumperetur. Copia minuenda: tanta quanta peccat. Qualitatis vitio non est occurrendum: nam dum materia eradicatur, qualitas euanesceat. Quoad vitij causam: si fuerit *diapedesis*, vasorum tunicæ densandæ: si *anastomosis*, vasorum ora occludenda: si *diaporesis*, oritur indicatio vniendi. Quoad causam generantem speciem: vt morbus huius vel illius visceris est in causa generationis materiæ: ita huic morbo occurrendum.

In genere periculum ex hoc malo imminens decerni nequit. Potissimum periculum pendet à vehementia dignitatis, vt si materia quiescat in parte externa, malum vincatur: si intra cranium, cum Paulo est vitium incurabile: potiss. si materia colligatur intra meninges & cerebrum: nulla enim pene insignis vehementia desideratur. At cum Aëtio, si forte non coniungatur vehementia facultatis, licet curationem tentare, sed cum prædictione.

Quoad materias cheirurgicas: hæc probantur, dum materia ita copiosa est, vt resolui non possit, vt non cedat medicamentis. Quomodo autem ferro sit occurrendū, luculentiss. docet Aëtius. Si materia non sit tā copiosa, vt medicamentis cessurā videatur: Auic. probat *cochleas integras, quæ bulliant in decocto artemisia, stachados, calamintha ment. vel cucumeris asini, vel iberidis, vel ebuli: post cochleas ita decoctas, confusa*

cauda, capiti deorsum applicentur. Oportet autem ut detineantur, quousque sponte decidant.

CAPVT XXX.

*De Oculorum affectibus.**Transitio.*

*Enumeratio
affectuum
oculorum.*

D Oculorū mala iam nos conferemus: nam oculus, & secundum tunicas, & secundum nervos à cerebro oritur: & præterea gratia melioris vitæ cerebro præ reliquis sensoriis magis inseruit. Cum autem oculus sit organum, & pluribus similaribus partibus constatum: sane oculus obnoxius est morbis in intemperie, mala compositione, & soluta unitate. Hæc autem vitia ita se habent, ut nomen adipiscantur, prout pertinent ad causam læsæ visionis, vel ad læsam visionē. Quatenus spectant ad causam læsæ visionis: hæc vitia respiciunt oculum, vel secundum Partem, vel secundum Totum. Si secundum partem: attinent vel ad Vnam partem, vel ad Plures. Si ad vnam partem: spectant vel ad Tunicas, vel ad Angulos. Si ad tunicas: est vel Anata, vel Cornea, vel Rhagoeides seu vuca. Si malum attineat ad annatam: est Ophthalmia. Si ad corneā: dicendum de vesica, ulcere, ruptura, hypopyo. Si spectat ad rhagoeidem: agendum de mydriasi, de constrictione pupille, de lussione. Si malum pertineat ad plures tunicas: dicendum de sugillatione, de vngue, de albugine. Si malum pertineat ad angulos: dicendum de epiphora, de rhocade, de encanthide, de xgilope, de anchilope. Si malum attineat ad totum oculum: agendum est de atrophia, de prominentia oculi, de strabismo. Si respiciamus ad visionem læsam: huius causa agendum de læsa visione, & ablata, & imminuta, & corrupta: modo magis interdiu, modo magis noctu: vnde de nyctalope dicendum.

*De Ophthalmia.**Nomen.*

Galenus c. 2. l. 4. *αἰματ.* ait, lippitudines esse malum admodum frequens, quare de hoc modo diligenter dicendum. Dicitur ophthalmia à loco affecto, c. 2. li. 2. meth. Latini vocant lippitudinem, respicientes ad excrementa lacrymis similia. Per lippitudinem autem intelligimus tum notham, tum exquisitam: & exquisitam tum remissam, tum intensam. Sicut enim febris notha, febris tamen genere continetur, ita & de

& de lippitudine statuendum. Spuria lippitudo vocatur *ragas* seu conturbatio, seu vacillatio. Exquisita, sed remissa generis nomen retinet: exquisita magna, ut nigrum oculi ab albo cooperiatur, dicitur chemosis. Auicenna vardenegi. Generatur, dum materia morbifica ita agit. in tunicam annatam, ut eam in tumorem attollat. Lippitudo ergo est tumor tunice annate oculi, procedens à materia morbifica. Forma huius vitij est tumor: qui in lippitudine notha est symptoma: in exquisita est morbus compositus, cum esse possit inflammatio. At si inflammatio solum occupet annatam: ut est morbus compositus, est morbus, qui ex accidente visus actionem impedit: nam est morbus per se tunice annate, & per accidens totius oculi. c. 2. l. 1. de symp. caus. At si inflammatio non solum detineat annatam, sed ita increseat, ut nigrum oculi contegatur, quemadmodum in lippitudine, quæ vocatur chemosis: tunc est morbus, qui prima ratione visionis actionem impedit: nam est morbus compositus, & ita compositus, ut plures occupet instrumenti partes: ut propterea sit morbus primum totius instrumenti, à quo prima ratione perfecta actio celebratur. Subiectum est annata oculi, cap. 1. lib. 2. ad Glauco. cap. 2. lib. 4. c. 7. et.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Subiectum.

Causa efficiens est materia morbifica. Huius autem materię species, è c. vlt. l. 13. meth. potest esse tum Minera, tum Vapor, Minera esse potest Sanguis, Bilis, Melancholia, Pituita. Si tumor fiat à sanguine vel bile: est lippitudo exquisita exacte. Si à melancholia, vel à flatibus: est lippitudo exquisita, non exacte. Si fiat è pituita: hæc pituita est vel Non lacrymalis, vel Lacrymalis. Si non lacrymalis: sit lippitudo exquisita, sed non exacte: si lacrymalis, id est, illa pituita, quæ in lacrymas solet commutari: sit lippitudo spuria, quæ *ragas* dicitur. Vitium materię morbificę, potest attinere ad substantiam: si tumor fiat à materia putrida, à materia venerea. Ad copiam: nisi enim materia esset copiosa: tumorem non pareret. Vitium etiam pertinet ad qualitatem: ad caliditatem, si lippitudo fiat à materia acris ad frigiditatem, si fiat, vel à crassis humoribus, vel à flatibus. Spectat ad quietem: cum materia præter naturam quiescat in annata. Ad motum spectat: cum sit fluxus præter naturam. Huius motus terminus à quo, quandoque est Totum: quandoque Pars: & si pars, quandoque Venter, quandoque Iecur, quandoque Lien, nonnunquam Vterus, sed præsertim Cerebrum, cap. vlti. l. 13.

Causa efficiens.

meth. Spatiū, sunt vasa, id est, Venæ & Arteriæ, eæque Reconditæ, aut Evidentes. Addit Auic. materiam à cerebro descendere, per viam membranarum, vel Extra cranium, vel Intra. Terminus ad quē, est annata tunica: quæ Suscipit propter humiditatē, raritatē: Attrahit propter dolorē vel calorē. Causa generans tum minere, tū vaporis, patet ex alibi dictis.

Differentia.

Quoad differentias à forma. Tumor vel est *οφθαλμικος*, vt in ophthalmia spuria: vel Morbus, vt in exquisita. Ratione subiecti, afficitur annata, vel secundum Vnum oculum, aut Dextrum, aut Sinistrum: vel secundum Vtrumque. Et afficitur annata vel Sola, vnde est lippitudo: vel simul cū Vicinis partibus, vnde est chemosis. Ratione causæ efficientis, sumuntur differentiæ à Specie, vitio, & Causa generatē: vt diximus.

De arte signorum.

Antequam proponamus signa lippitudinis: primū in genere de signorum fontibus agemus. Aristot. ait c. 25. l. 2. rhet. enthymema fieri posse, tum ex aliis, tum quandoq; è signo. Enthymema constat è propositione & conclusione. Signū est propositio, c. 27. l. 2. priorum analyt. Forma ergo signi, id est, propositio, subiectum habet animam: propositio enim non est ens extra animam, sed in anima. Causa efficiēs propositionis, nō est sensus, vt apud empiricos, sed intellectus: est autem intellectus, qui sensibus etiam vtitur, quia nihil potest esse in intellectu, quin prius fuerit in sensu: vt necessario ad signi productionem concurrat intellectus, nō sine obiectis sensuum exteriorum. Intellectus autem non operatur citra utilitatem, sed concurrat ea ratione, vt id quod est ignotum, id est, signatum, cognoscatur à posteriori, nimirū, via demonstrationis, vel ab effectu, vel à causa, sed nō immediata & prima. Hæc, nimirum, causa & effectus, ita se habent ad signatum: vt si necessaria sint, signum dicatur *σημειον*, seu argumentum: si non sint necessaria, nomine generis signum nuncupetur. Signum ergo medicum est propositio, producta ab intellectu, non sine obiectis sensibilibus, ostendens à posteriori ignotum in arte medica. Hinc sequitur, quod omne signum petendum sit, ab eo quod vel præcedit, vel sequitur signatum: quare vel à Causa, vel ab Effectu. Causa est Interna, vel Externa. Interna est causa efficiens, per modum vel Productionis, vel Consecutionis. Causa interna per modum productionis, est vel præter naturam, vel secundū naturā. Præter naturā, vel species causæ morbificæ, id est, sanguinis, pituitæ, &c. & morbi quos fontes tenere.

Signū medicū, quid sit.

1. Causa

Hippoc. & Galen. aph. 12. sect. 1. Causa autem secundum naturam est vt ibidem proponit Galenus, temperatura, ætas, consuetudo: & huc etiam pertinet signum, propositum c. 8. art. med. quod sumitur ab his, quæ insunt, secundum essentia rationem, vt est temperies & compositio: signatum, eo in cap. est constitutio, cuius causa est intemperies & compositio: quod si bona sit temperies, bona compositio: sunt causæ bonæ constitutionis. Causa interna concurrens per modum consecutionis, tangitur à Gal. c. 14. l. 9. meth. & est corporis temperies, quæ fuit antequam homo febricitaret: vt ex hac temperie, per modum consecutionis, prodeat febris recessus in tali gradu. Causa autem externa est, v. g. aer calidior præcedens febrem: cibi biliosi, præcedentes febrē biliosam. Et hæc est causa externa præter naturam. Causa externa naturalis, est veluti constitutio parentum, ratione filij. Quoad effectum, cum Galen. c. 8. & 10. art. med. effectus produci potest ab agente vel Interno, vel Externo. Si producat ab agente interno, est effectus in corpore, cuius corporis signatum est cognoscendum. Effectus autē vel est Primarius, vel Secundarius. Primarius est, qui tempore postponitur signato, & à signato producit, vt v. g. est morbus frigidus ventriculi, si conferatur cum diminuta coctione, nam tempore præcedit, & est causa coctionis diminutæ: quemadmodum etiam macies in febribus hectica. Effectus autem secundarius est, quem tempore præcedit signatum, & signatum nō est ipsius causa. V. g. signatum sit temperies sanitatis instrumenti, signum erit magnitudo, erit figura: & hi effectus tempore posteriores sunt ipsa temperie, non tamen sunt effectus temperaturæ, sed formatricis. Hinc recte Gal. ait, c. 9. l. 1. de vl. p. effectus alteratricis sequi temperiem: formatricis autem effectus accidere temperaturæ, quia non sunt effectus producti. Effectus qui producit ab agente externo, proponitur c. 10. art. med. vbi dicitur, quod aliud sit præter omnia proposita, nimirum alteratio: (id est, effectus): quæ sit ab extrinsecus occurrentibus: reliqua autem proposita, erant effectus agentis interni: & hæc alteratio oritur à iuuantibus, à ledentibus: vt signum sit effectus, quatenus est alteratio causæ externæ. In vniuersum ergo signorum fontes rediguntur vel ad causam, vel ad effectum: siue signatum sit præteritū, siue præsens, siue futurum: siue signum sit pathognomonicum, siue absidens, siue mox apparens, siue alio modo occurrat.

2. Effectus.

Oculi sani Auicennas in crasi oculorum ab his fontibus signa petit.
temperati Nam, quoad effectum causæ internæ, signa petit ab excre-
ram, quæ mento, ab actione, à qualitate. Quoad actionem: signa su-
signa indi- mit ab actione propria & communi. Propria actio est visio:
cit, secun- si ergo bona sit visio, indicat oculi temperaturam fortem,
dum Aui- id est, in habitu, & æqualem, secundum omnes oculi partes.
cennam. Si debilis sit visio, indicat defectum, sed intra latitudinem
 sanitatis, in complexione, & compositione. Bona autē visio
 est, dum homo & procul, & prope videt, exacte, etiam obie-
 ctum minimum, nec à forti visibili læditur. Debilis contra.
 Actio communis, est animalis, vel naturalis. Animalis: vt est
 oculi motus, qui si facile fiat, indicat oculi temperiem cali-
 dam, aut siccam: si difficulter fiat motus, indicat frigidam
 & humidam. Actio naturalis manifestatur ex excrementis,
 vt è copiosis excrementis, verbi gratia, indicatur temperies
 humida. Quoad qualitatem: cum Auicenna, procedit, causa
 vel totius oculi, vel partium. Si causa totius oculi: respicere
 oportet ad qualitatem, vt est obiectum sensuum externo-
 rum, vel proprium, vel commune. Proprium, ratione tactus
 & visus. Ratione tactus è caliditate indicatur temperies ca-
 lida, è frigiditate frigida, è duritie sicca, e mollitie humi-
 da. Ratione visus, è colore rubicundo, citrino, indicatur tem-
 peries calida: è colore plumbeo, frigida. Quoad obiectum
 commune, pertinet ad figuram, ad magnitudinem. Figura
 bona, significat fortitudinē in creatione, & hinc tēperiem.
 Magnitudo proportionata, indicat bonam tēperiem. Si re-
 spiciamus ad qualitatem, ratione partium oculi: cum Aui-
 cenna, è venis magnis indicatur temperies calida: e venis
 plenīs, indicatur humida: è venis exiguis, indicatur frigida:
 è venis vacuis, indicatur sicca. Tandem, quoad effectum ra-
 tione causæ externæ: si alteratio facta à calidis, iuuat, indica-
 tur frigida intemperies, & contra. Vt hinc manifestum sit,
 oculi natiuam temperiem indicari cum Auicen. à necessario
 consequentibus, & nequaquam ab essentialiter inhærentib.
 Nam e c. 8. art. med. essentialiter inhærens, distinguitur à ne-
 cessario consequentib. vt signa, quæ secundum substantiæ
 rationem insunt, non sint vsurpanda in cognitione tempe-
 raturæ: nam signatum est temperatura, & temperatura est,
 quod secundum essentiæ rationem inest: Quare idem esset
 signum & signatum. Vt signa quæ insunt secundū substan-
 tiæ rationem, cum sint temperatura, & compositio, solum
 locum

locum habeant, dum signatum est constitutio, prodians est temperatura & compositione: siue constitutio attineat ad totum corpus, siue ad partem & instrumentum: siue constitutio sit bona, siue sit mala: & præterea, siue constitutio sit in latitudine sanitatis, siue extra latitudinem. Semper ergo signa tantum sumenda sunt à causa & effectu.

Iam loquemur de signis indicantib. lippitudinē. Ophthalmia ergo in genere indicatur è necessario consequentib. id est, actione, excremento, & qualitate. Actione: ut iudicatur è dolore: nam oculus ut exquisiti sensus facile dolet. Indicatur ex excremento, ut in lippitudine excrementum emanat ob raritatem tunicæ. Indicatur è qualitate, hoc est, è magnitudine aucta, quia adest tumor, è rubedine oculi, nam portio etiam exigua sanguinis, albam tunicam reddit rubicundam.

Quoad signa differentiarum, & primum ratione formæ: tumorem esse symptoma, & hinc esse *τῶν ἐξ ἑ*, id est, spuriam lippitudinem cognoscitur è symptomatum remissione, & è prægressis causis externis. Si contrariudicandum, tumorem esse morbum. Ratione subiecti, differentia patent: an nimium, subiectum sit vel vnus oculus, vel vterque: similiter etiam patet, an tumor cooperiat pupillam, id est, num sit chemosis. Differentia ratione causæ efficientis, sumuntur à

materiæ specie, vitio, & causa generante. Quoad speciem, cum sit sanguis, bilis, pituita, melancholia, flatus: Sanguis cognoscitur è dolore extensiuo, ex excrementis quæ plurima non egrediuntur tempore somni: præterea ex excrementis non admodum mordacibus, è rubedine admodum euidentis: (rubedo est signum ophthalmiæ in genere: magna rubedo est signum ophthalmiæ à sanguine:) præterea sanguis indicatur è pulsatione temporum, & è causis prægressis, vi quarum potest sanguis generari, de quibus in dol. cap. Bilem esse in causa ophthalmiæ, cognoscitur è dolore insigni: præterea è sensu mordacitatis, ut veluti oculus exulceretur, è sensu caliditatis: præterea è lacrymis tenuibus mordacibus, quandoque vlcérantibus, citrinis: adhuc è rubedine, sed mista cum flauitie. Pituita indicatur è sensu grauitatis, cum remisso calore, ex excrementis tepidis, vix mordentibus, nisi salsa sit pituita: è viscidis excrementis, ut fiat agglutinatio in somno: præterea è rubedine mista cum albedine. Melancholia indicatur è grauius dolore, sed remisso, citra sensum caliditatis, nisi sit atra bilis: ex excrementis crassis, ad nigrum vergentibus,

Signa lippitudinis in genere.

Signa differentiarum.

Forma. Subiecto.

Causa eff.

gentibus, è rubedine obscura, id est, declinante ad nigrum. Flatuosa materia cognoscitur è dolore extensiuo, sine grauitate, ex absentia lacrymarum, è rubore exiguo, quatenus vi doloris trahitur sanguis. Quoad cognitionem vitij: materia secundum substantiam peccans, & proinde putrida, cognoscitur è tumore calido inflammatorio, vt vehementia sint symptomata. Quantitas maior cognoscitur e maiori tumore: minor, è minori. Quoad qualitatem: quæ signa indicant bilem vel sanguinem, indicant caliditatem: quæ signa manifestant pituitam vel melancholiam, indicant frigiditatem: nisi pituita sit salsa, vel melancholia exusta. Quoad vitium secundum vbi: materia magis quiescens cognoscitur, si medicamentis non cedit. Vitium secundum motum, hac ratione cognoscitur: vt fluxus velocior indicetur à symptomatis, prout celeriter oboriuntur. Quoad terminum à quo: an sit totum, vel pars, cognoscitur è signis, indicantibus vitia vel totius, vel partis. Quoad spatium: si euidentis fuerit, cognoscitur è valorum externorum amplitudine, è pulsu, è frontis extensione, è rubedine, è tumore palpebrarum: si contra, iudicandum erit spatium esse reconditum. Quoad terminum ad quem: num oculus habeat rationem termini ad quem, vel vt suscipit, vel vt attrahit, euidentissime patet è superius traditis.

Indicatio- nes.

Cum lippitudo sit tumor annatæ oculi, procedens à materia morbifica: à tumore, vt est magnitudo aucta, non potest sumi indicatio utilis. Ratione subiecti, in omni oculo vitio, quod indicat, est calidum oculi innatum, vt est particeps spiritus animalis, residens in humore crystallino: & hoc calidum indicat alimentum, ea copia & qualitate, vt oculi calidum conseruetur. Sed præterea oculi proportio requirit remedium, fouens oculi proportionem. Ratione causæ efficientis, vt hæc est multiplex specie, vitio, & causa generante: ita variæ hauriri possunt indicationes: quæ omnes patent è superius traditis.

Prognosti- ca.

Lippitudo in genere est malū curabile, nisi error cōmittatur: cap. 2. lib. 4. x. r. 1. c. 2. lib. 3. meth. c. vlt. lib. 13. meth. At pro vehemētia differentiarū prognosticum variat. Vnde ratione formæ: lippitudo facilius tollitur, si tumor sit sympt. nam vehementia est remissa, & ratione essentia, & ratione dignitatis, quia non cooperitur pupilla. Si tumor sit morbus, difficilior tollitur, & præsertim si fuerit chemosis: nam adest

adeſt vehementia inſignis & eſſentia, & dignitatis, quando-
quidem & magnus eſt tumor, & pupillam regit. Ratione
cauſæ efficientis : prognosticum potiſſimum petendum ex
ſpecie, & vitio. Quoad ſpeciem: Si materia fuerit ſtatuſ: faci-
lius cedit, quam minera. Si perpendamus vitium : lippitudo
eſt difficiliſſimæ curationis, prout materia eſt magis putrida,
magis copioſa, calida, abraſens : quamvis materia etiam fri-
gidior & craſſior difficulter ſuperetur, obvehementiâ eſſen-
tiæ. Quoad vitium ſecundum Vbi: Hippocrates reſpiciens ad
motum, aphor. 17. ſect. 6. ait: lippientem alui profluuiſ corrip-
bonum : nam vitium in motu non eſt vehemens, cum ma-
teria moueatur ad aluum. Auicennas addit, reſpiciens ad
motum & quietem in regione meridionali, lippitudinem fa-
cile curari, propter raritatem pororum, & ſolutionem na-
turæ ipſorum ægrotantium : contra in regione frigida : Re-
gio videlicet ſignum eſt, vitij magis vel minus vehementis
ſecundum eſſentiam materiæ morbificæ : nam in calida re-
gione, materia morbifica non ita quieſcit, propter poros la-
tos: nec ita materia petit oculum, cum moueatur ad aluum:
Regio ergo calida, ceu cauſa latitudinis pororum, & lubri-
citatſ, eſt ſignum à cauſa ſumptum.

Quoad ſpatium, Galen. cap. vlt lib. 13. meth. ait: malum fa-
cilis adimi, ſi materia ſuat per ſpatia externa: hæc enim
minoris ſunt dignitatis. Vtrum autem euentus lippitudinis
ſuturus ſit cito vel tarde: Auicennas declarat, inquiens: lippi-
tudinem eſſe velocis motus, ſi lacrymæ magis currant, &
ſint mordaces : nam indicant velociorem motum materiæ.
Contra ſtatuendum ſi lacrymæ ægre ſuant : nam indicant
materiæ motum tardiozem. Et hæc de prognostico. Ad ma-
terias progrediemur.

Quoad cheirurgiam : Vena ſecunda eſt, dum ſanguinis
vitium eſt vehemens: quod vitium vehemens indicatur à
lippitudine vehementi. Hinc Rhafis iubet venam eſſe ſe-
candam, niſi lippitudo ſit levis. Eſt ergo vena potius ſe-
canda in exquisita lippitudine, quam in *rugâ*, ſeu leui
lippitudine : levis enim lippitudo deſignat ſanguinis vi-
tium debile. Porro, dum vehemens eſt ſanguinis vitium:
ſanguis habet rationem vel cauſæ principalis, vel adiuuan-
tis, vel ſine qua non. Sanguis quidem cauſæ principalis ha-
bet rationem, in lippitudine ſanguinea : adiuuantis in
bilioſa, ſi cum bile ſanguis eſt miſſus: habet rationem
cauſæ

*Euentus
ophthal-
mia.*

*Curatio.
Venæ ſectio.*

causæ siue qua non, in omni specie lippitudinis.

Cum autem in euacuatione respicere oporteat, ad speciem humorum: recte iubet Galenus in oculorum dolore, redundante sanguine, venam esse secandam: infestante malicia, id est, cacochymia, esse purgandum, comm. aphorism. 31. sect. 6. & cap. vlt. lib. 13. method. Rhasis, ad quid agendum specificum respiciens, addit: quo fortior lippitudo fuerit, eo plus sanguinis esse detrahendū: nam fortior lippitudo, est signum copiosioris sanguinis. Quoad vsum: Auicennas dicit, si lippitudo sit admodum vehemens, esse euacuandum sanguinem, usque ad timorem lippothymia: nam sanguinis euacuatio plurima, id est, vnica vice usurpata, sanat spatio vnus horæ: ratio Auicennæ est: dum enim vehemens est lippitudo, insignis est sanguinis actiuitas, à qua sumitur quantum agendum. Liceat etiam monere circa vbi: Aetium secare venas supernas, id est, cephalicam. Auicennas inquit, secandam esse cephalicam in omni specie lippitudinis. Rhasis addit, secandam esse cephalicam, à manu, vel brachio, partis oppositæ oculo infirmo: nam Vbi agendum indicatur à sanguine, vt in aliquo loco subsistit: in hoc malo sanguinis subsistentia capitur, vt sequitur sanguinē, qui vel sua copia affligit oculum, vel motu potest affligere. Si ergo perpendatur sanguinis subsistentia, vt copia sua oculum affligit: vena eiusdem lateris secanda: & si virtus robusta sit, secanda vena brachij: si non admodum robusta, secanda est vena manus. Si autem subsistentia sequatur sanguinem, vt suo motu potest oculum affligere: cum Rhasi vena oppositi lateris secanda: nam quo à longinquioribus sit euacuatio, eo reuulsio etiam est melior: vt liceat etiam quandoque venas infernas aperire.

Cucurbit.

Auicennas præter propositas materias cheirurgicas, probat etiam ventosam infra occiput: siquidem est materia strenue retrahens ab oculis.

Arterioto-
mia.

Dum fluit materia per arterias externas, Galenus probat sectionem arteriarum, cap. vlt. lib. 13. meth. Præterea probantur etiam frictions, & ligaturæ.

Frictiones.

Ligatura.

Cauterij.

Therma-
cia.

Auicennas iudat cauterium in sutura coronali, in lippitudine, quæ fit à catarrho contumaci.

Quoad medicamenta: in ophthalmia probantur, & Anodyna, propter dolorem, & Sanantia. Anodyna, quæ ratione iudicij sunt administranda: patent è sermone, de dolore capitis. Anodyna autem causa Receptionis, sunt Calida, vel Frigida.

Frigida. Medicamenta sanantia, respiciunt vel Materiã mor-
bificam, vel Oculi proportionem. Et si respiciunt materiam:
respiciunt materiam vel Extra oculum, vel In oculo. Et si
extra oculum: vel in Toto, vel in Capite. De his ergo medi-
camentis dicendum.

Anodyna frigida sunt, *succus lactuca, solani, pomorum man-
dragora: sed medicamentum etiam confici potest è seminibus & ca-
pitibus papaueris, item ex opio. Unde Rhasis probat collyrium vel
Sief album, quod præter cerussam, sarcocolam, tragacantham, reci-
pit etiam opium.* *Anodyna.* 1.

Monet autem Galenus cap. 1. lib. 3. meth. & cap. vlt. lib. 12.
metho. vt in grauissimis doloribus, non autem semper stu-
pescientibus vtamur, hoc est, opium recipiẽtibus: nam hæc
medicamenta nimis nocent oculis, vt quandoque visio ita
lædatur, vt nunquam redeat ad statum naturalem. Quare
collyrium ex opio probatur solum dum magna necessitas
vrget, hoc est, dum dolor est acerbissimus, & potissimum si
est vehemens ratione facultatis, id est, dum imminet syn-
cope, & hinc mors. Quamobrem Auicennas non in qualibet
lippitudine, sed in ea, quæ fit à materia tenui & corrodente,
medicamentum opiatum probatur: hac enim opiatum po-
tius est remedium sanans, quam anodynum: nam sanat ma-
teriam, id est, remouet vitium materiæ, vt dolor non reuer-
tatur, quoniam corrigit materiæ tenuitatem & acrimoniã:
vt non solum conferat mitigando dolorem, sed ita agendo
in materiam, vt materia morbifica non possit amplius fol-
uere continuum, causaque doloris esse. Improbantur ergo
medicamenta opiata, si dolor fiat à flatu. Verum, quoniam
medicamentum opiatum agit, non tantum in materiã mor-
bificam, sed etiam in oculi calidum innatum, & in tempe-
riem: ne his noxa accidat, secundum Auicennam probatur
cum medicamentis opiato, *aqua cum saccharo, aqua cum melle,*
vt oculus non lædatur: & Galenus huius rei gratia ascendit
ad collyrium è cinnamomo. Quoad rectam opiatorum admini-
strationem: & primum, quoad Quantum agendum: non pro-
batur magna dosis, verbi gratia, *℞ sief albi, cum opio ʒ ss, lactis*
muliebrii, aquæ saccharatæ ana ʒ ij. Misce. Quoad modum:
opiatum applicetur actu tepidum. Quoad Quando agendũ:
vsurpetur dum dolor vincit alia indicantia: quare raro.

Quoad vbi agendum: applicetur temporibus, fronti, pro-
pe oculos, &, urgente necessitate, intra oculum. Galenus

cap.vlt.lib.12.metho.proponens medicamentum ē castorio, & a succo papaueris, hoc medicamentum instillat in aures, ratio est:nam huius medicamenti vis perducitur non ad oculos, quia nullæ sunt viæ, sed ad cerebrū, vnde fit somnus: & tunc cerebrum propter somnum, vt organum facultatis iudicari, redditur ineptum ad iudicandum obiectum dolorificum, ad tempus, id est, tempore somni. Quoad anodyna non opitata, cum Galeno cap.vlt.lib.13.metho. probatur album onis: sed probare etiam licet quorum vitellos, ouum etiam integrum, concussim cum aqua rosacea. Probatur etiam pomum decoctum cum saccharo. Potissimum probatur cap.2.lib.4. κ.τ.δ.π. lac recentem expressum ex vberibus iuenculæ, & temperata, & bene nutrita. Probatur etiam farina hordei, cum oleo rosaceo, & luteis eorum. Alexander loco farine hordeaceæ, utebatur mica panis, cū rosaceo, & ovo. Sed notandum, oleum esse oculis inimicum: nam dum oleū est particeps excrementi serosi, non est expers mordacitatis: & ob id cum Galeno cap.18.lib.2.simpl.oportet vt oleum sit dulce, candidum, & hinc separatū a sero, a portione mordaci: sic enim non erit oculo infensum, & præsertim, si permistum adhibetur. Verum, cum lac opportunum sit medicamentum: notandum cum Auicenna non dimittendum esse lac instillatum in oculum longo tempore: sed remouendum, & omni hora renouandum. Hoc dictum pō pertinet ad methodum medendi, ratione primæ materiæ, id est, corporis humani: nam hoc fit, quoniam lac diu retentum in oculo corrumpitur: hoc ergo pender ē natura lactis, quatenus facile putrescit. Et hinc Auicennas addit, non esse necessariū, vt album oui renouetur: nam si per horam dimittatur, non nocet: oui ergo album hac in parte præstantius est lacte, quamuis lac magis abstergat. Et propterea hæc Auicennæ dicta non pertinent ad Quando agendum. Quoad modum anodynorum: anodynum debet esse emplasticum, in lippitudine ex inflammatione: & in vigore debet esse tepidum: in principio ad teporem aliquem accedere debet: & ratio est, quia in principio adest dolor, & materia per modum percussionis est retrahenda: in statu est quidem dolor, sed materia est vacuanda per resolutionem. Quoad anodynum, quod est calidum in primo, & tenuis substantiæ: cum Galeno cap.1.lib.4. κ.τ.δ.π. spongia, infusa in decocto meliloti, in decocto fannigraci. Et notandum ē cap.vlt.lib.13.metho. in vsu cuiuslibet anodyni, & cuiuslibet medicamenti ocularis, superio-

rem

rem oculi genam, blandissime attolendam: & mox medicamentum infundendum.

Medicamenta sanantia, respiciunt materiam, vel proportionem. Ratione materię, & primum existentis extra oculum: & primum in toto corpore: probantur lenientia, præparantia, purgantia, varia: pro varietate succorum: de quibus in dolore capitis. Id solum monere sufficiat: in lippitudine, non esse negligenda vacuantia totum corpus: nam oculorum dolores solvuntur epoto medicamento solvente, apho. 31. sect. 6. & præterea Hippoc. ait, apho. 17. sect. 6. lippientem, alui profluuium corripere bonum: quod naturę exemplum medicus imitari debet, secundum Galenum in comm. Quoad medicamenta ratione capitis: Auicennas probat euacuationem capitis, & per os, & per nares: probat autem medicamenta quę extrahunt partem materię, non totam, nec trahunt materiam ad oculum: vt probentur mitiora caput euacuantia, de quibus in dolore capitis.

Medicamenta ratione materię in oculo sunt duplicia: *Topica*, prout materia morbifica residet, vel *Extergentia*, Extra tunicam annatam, vel In annata. Si materia resideat extra annatam: cum Auicenna oportet oculos assidue mundificare à lacrymis, à lacte instillato, &c. huius gratia oculus abluendus est cum albo oui conquassato cum aqua hordei, vel sacchari, nec non roseæ. Addit Auicennas, contactum esse debere cum facilitate. Ratio est: primum enim mundus est seruandus oculus, nam materia morbifica hærens, dolorem intendit, & medicamentorum operationem prohibet sua præsentia: secundo, probatur tactus facilis, propter virtutem, quę dissoluitur ratione tactus difficilis, quo dolor excitatur, calor intenditur, & materia attrahitur. Ratione materię morbificę in annata: scire oportet, huius vitium attinere ad Copiam, vel ad Vbi. Si ad copiam: probantur medicamenta vacuantia, per modum percussione & resolutionis. Si peccatum sit secundum ubi: vt vitium attinet ad motum, probantur medicamenta retrahentia, per modum percussione & interceptionis. Si vitium spectet ad quietem, probantur medicamenta vacuantia per modum resolutionis. Quare proponemus medicamenta interceptientia, reprimentia & resoluentia.

Interceptientia cum Galeno cap. vlt. lib. 13. metho. proponuntur, dum materia fluit per vasa externa: cuiusmodi est tia.

medicamentum, quod conficitur è rosis, hypocistide, gallis immat. malicorio, sanguine draco. bolo. Armenia. sintalis, ana part. equal. & hoc medicamentum excipi potest succo coriandri, endiuia, vel aqua rosacea: ut, si materia sit frigidior, excipiat medicamentum intercapiens succo coriandri, vel vino astringente: & præterea si materia est frigida, addere licet crocum, salem, nucem cupressi: Si materia sit calida, excipiendum medicamentum intercapiens, aqua rosacea, vel etiam aqua plantaginis. Circa vsum sufficiat admonere cum Auicenna medicamentum hoc intercapiens, non esse applicandū oculis, sed vasis, per quæ materia fluit. Rhasis applicat fronti & palpebris. Diligenter cauendum, ne hoc medicamentum oculū ingrediatur, nocet enim nimia astringione. Reprimentia & resoluentia in hoc conueniunt, quod intra oculos sunt immittenda. Quoniam autem oculus promptissime patitur, ad differentiam aliarum partium, quæ inflammatione laborant: oportet hæc medicamenta aliquid peculiare obtinere: nimirum vt non sint acria, non amara, non salsa, non acida, neque aspera, cap. 2. lib. 4. x. 267. cap. vlt. lib. 13. metho. cap. 2. lib. 8. ad Glaucon. ne talia medicamenta violenter in oculos agendo noxam inferant. Probatum ergo medicamentum, quod sit expers mordacitatis, mediocriter crassum, lentum, læue, hoc est æquale: expers enim mordacitatis & æquale, agit citra violentiam: crassum vero & lentum, non solum citra violentiam agit, sed præterea etiam diu manet in oculo: vt per moram strenue agat in materiam morbosicam, nec frequenter medicus cogatur renouare medicamentum, & hinc palpebras genasque attollere. In ocularibus igitur medicamentis, mordacitas, & asperitas corrigenda. Mordacitas pendet, vel è caliditate, quemadmodum in medicamentis acribus, amaris, & falsis: vel è frigiditate, vt in acidis. Si pendeat è caliditate, medicamenta infundenda sunt bis & sæpius, in aqua rosacea, in aqua endiuia, in aqua rosacea, in lacte. Si mordacitas pendeat è frigiditate: corrigenda est decocto vel passularum, vel caricarum, vel sanigraci, vel meliloti: vel etiam cum vino subdulci. Quoad asperitatem: cum Auicenna medicamenta sunt conterenda, vt læuia & æqualia reddantur. Expedit etiā medicamenta diligenter abluere: vnde sanigracum abluendum est, vt puluis, si quis adest, beneficio ablutionis amoueat. Quod si ergo contingat, vt medicamentum in puluerem tenuissimum redactum, ab oculo non perferri queat: puluis etiam tenuissimus inclusus panno li-

Reprimen-
tia.

neo, immittatur indilutum, siue sit aqua rosacea, siue decoctum foenugraeci, vt medicamentum instilletur in oculum, per expressionem panni linei: ita enim citra omne incommodum ager. Sed medicamenta non tantum ante ipsorum usum corrigenda sunt, vt diximus: verum etiam in ipso usu & administratione. Quae autem corrigunt, praesertim sunt liquida, quibus collyria excipiuntur, *vt est aqua rosacea, albumeni, lac, &c.* Pro singulis collyrij drachmis, excipiens liquidum sit ab $\frac{3}{4}$ β . ad $\frac{3}{4}$ j. & si oculus sit exquisitior sensus, ascendatis etiam ad $\frac{3}{4}$ ij. Hinc Galenus cap. 2. lib. 4. *de ratione*. iubet, vt in medicamentis, in quibus valide astringentia dominantur, plurimum albuminis oui, cum paucissimo collyrio misceatur. Si astringens medicamentum non sit ita validum, si collyrium non sit ita astringens: est miscendum cum liquore in minori copia: ratio est: quo enim collyrium magis efficax est ad excitandum dolorem, eo corrigens indicat validius, & proinde in maiori copia, cum in hac sit maior virtus.

Cæterum, quoad reprimentia, cauendum est à vehementioribus, vt est *acacia, omphacium, balaust. galle immat. &c.* capite secundo, libro quarto, *de ratione*. hæc enim exasperant, densantque membra, & prohibent resolutionem materiae: & sic in causa sunt, vt dolor intendatur. Quod si tamen oculi aciem dispersam exacuere & vnire voluerimus, parum quid miscere oportet astringentium vehementium, quoniam oculi substantiam cogunt & astringunt. Dum ergo in lippitudine scopus est solum reprimendi: leuia saltem & mediocriter astringentia probantur, nequaquam vehementia. Hinc Auicennas in principio improbat vehementer stiptica, quia tunc temporis ocularia dirigenda sunt ad materiam copiosam & crassam, non ad vniendum aciem oculi dispersam, spiritusque animales dissipatos, aut ad calidum innatum crystallini vniendum: nam materia copiosa & crassa in principio magis potest ad prohibendum vehementer astringentia, quam oculi acies ad eadem indicant: contra procedente malo, dum materia morbifica minuitur, & acies oculi dispersa magis magisque dispergitur: tunc vehementer astringentibus uti possumus, nimirum post principium. Porro commodissima sunt mediocriter astringentia, secundum Galenum loc. cit. nisi in ophthalmia materia sit admodum crassa & frigida, siue humor sit, siue

vapor, vt reprimentibus non cedat, capite vltimo. libro de timotertio, metho. Galenus igitur loc. cit. probauit *rosarum folia, flores, succum, vt liceat vti aqua rosacea*, ascendit ad hypostisidem, ad pompholygem, *spodium, amyllum, plumbum vstum & lotum, cerussam lotam: & hac excipi possunt aqua pluviali, albo oui, aqua rosacea*. Quoad vsu: & primum quoad Quantum, hæc poterit esse formula: *℞. florum rosarum 3 j. insia lota, spodij loti, cerussa lota, amyli, tragacantha ana 3 j. contundantur & fiat collyrium: cuius vsu ratione quantitatis erit: ℞. præditi collyrij 3 ℥. aqua rosacea 3 vj. Misce.* Prima recepta pertinet ad artem componendorum medicamentorum: secunda ad methodum medendi, vt dirigitur ad Quantum agendum. Quoad modum: reprimentia actu frigida applicanda: at frigiditas non admodum erit intensa, nec oculus ligandus, alias reprimentia per oculi contactum calefiunt, & oculum recalfaciunt. Expediit ergo panno lineo tenui, madefacto in aqua rosacea, fovere oculum: ita enim reprimens efficacius ager. Quoad quando agendum: reprimentia sunt vsurpanda: dum materia morbosica reprimenda non superatur ab aliis indicantibus. Vincitur autem materia reprimenda, si materia replente & totum & caput. capite 1. libro 4. *κ. τ. α.* & sic recte non admittuntur vel reprimentia, vel anodyna, dum corpus est repletum, aph. 31. sect. 6. Non igitur licet vti collyriis reprimentibus, secundum Auicennam, nisi post tres dies. Materia autem reprimenda, dum facta est euacuatior & totius & capitis, vincit alia indicantia: quatenus videlicet materia vel fluit, vel, si fluxit, non est impacta: vnde inter initia solis reprimentibus vti licet: in augmento debent esse mista cum resoluentibus, capite 2. libro 4. *κ. τ. α.* verbi gratia. *℞. florum rosarum, spodij loti, cerussa lota, ana 3 j. sunt reprimentia: deinde adde. spica, croci, myrrha, thuris, ana 3 v. fiat collyrium siccum. ℞. huius collyrij 3 ij. vitellos ouarum num. ij. aqua rosacea 3 ℥. vini siptici 3 ij. Misce.* Et hoc medicamentum, vt recipit reprimentia in maiori dosi, quam resolutoria: ita magis probatur in initio incrementi, quam versus statum. Quod si malum magis accedit ad statum: resoluentium dosis est augenda. Vnde Galenus cap. vlt. lib. 13. metho. inter resoluentia probat fomentum, confectum ex aqua dulci, moderate calida: probat decoctum fenugraci: nam cum Galeno cap. 1. lib. 4. *κ. τ. α.* discutit moderate, calfacit sine morfu, quia succum habet viscidum, vt oui albumen. Probat etiam

*Resoluen-
tia.*

fomen

fomentum ē milio, ē chure, ē castorio, spica, croco, ē fellibus animalium, ē feniculo, ex euphrasia, & aliis, propositis à Galeno. Notandum autem hæc non esse excipienda aqua rosacea, nec albo ovi, sed lacte, quod virtute feri, sine morsu vim habet detergendi. Sed medicamenta resoluentia excipi possunt etiam luteis ovorum, aqua feniculi, euphrasia, ruta, & similium. Horum autem usus, quoad Quantum agendum, idem esse debet, qui fuit propositus de reprimentibus. Quomodo. Admoventur resoluentia, vel tepida, vel calida: nō autem frigida, ut reprimentia. Quando. Administranda sunt post vacationem totius & capitis: cap. vlt. lib. 13. metho. Auicennas, cum proposuisset vaporem esse administrandum cum tepidis medicamentis: addit, sufficere quandoque bis uti, aut semel; & quandoque esse necessariū, ut iteretur medicamentum, secundum fortitudinem & debilitatem lippitudinis: ratio est: nam indicans, vincens alia indicantia, quo diutius vincit, eo etiam diutius est vsurpandum medicamentum: at indicans diu vincit, dum fortis est lippitudo: Ergo in forti lippitudine repetendum est medicamentum.

Sequuntur medicamenta, quæ respiciunt id quod est secundum naturam in oculo. Hæc ergo vel respiciunt oculi proportionem, & probatur in ophthalmia, siue oculi à principio generationis, bene, siue male sint constituti: vel respiciunt calidum innatum, cum spiritu animali, & probantur in ophthalmia, quando oculi à principiis generationis obtinent calidum dissipabile, verbi gratia, dum sunt prominentes. Proportionem respiciunt secundum Mesuem, & Auicennam, nux moschata cum melle, myrobalani chebulæ, melle vel saccharo condita, mel, feniculum: unde Auicennas inquit, collyrium ex aqua feniculi omni hora esse mirabile: laudatur etiam cheledonias, euphrasia, verbenacæ recta, ruta, antimoniū, suria trita in aqua feniculi, in aqua maiorana: probatur etiam collyriū à granatis dulcibus & non dulcibus. Horum medicamentorum usus pater ē superius propositis: nā si his medicamentis utamur, ut reprimentibus, usus reprimentiū seruandus: si ut resoluentibus, usus resoluentium seruandus. Medicamēta, quæ

Ad dissipationem calidi innati oculi.

vt his astringentibus nec sinceris, nec copiosis vtamur, sed parum ex his miscere possumus. Quod si ergo contingat in oculo imbecillo non esse materiam: licet vti solo collyrio, è granatis acerbis, cum aqua rosacea: si autem adest materia morbifica, oportet quædam permiscere. Vfus patet e propositis: sufficiat quædam admonere circa modum, & quando. Quoad modum agendi: si hæc roborantia calidum innatum, misceantur cum resoluentibus, sunt administranda actu calida: si sincera, actu frigida: ratio est: quoniam, dum sinceris vtimur, non adest materia resoluens, quæ prohibeat. Expediit autem secundum Auicem. in cuiuslibet medicamenti vsu submergere oculum in medicamentum liquidum, & oculus tunc est aperiendus: probatur ergo vas vitreum, vel argenteum, confectum ad portionem magnitudinis oculi, quod vas est replendum liquore, & in hoc est detinendus oculus. Quoad quando agendum: Si hæc medicamenta vsurpentur multa cum medicamentis materia morbificæ, non licet his vti in principio: si autem solis vtamur: licet vti eo tempore, quo oculus est immunis à materia morbifica, nam non adest materia, quæ prohibeat.

Dietæ.

Aër non probatur lucidus, sed purus, expers fumi, vaporis acris, pulueris. Probatur cibus boni succi, qui non mittat vapores in caput, qui sit attenuans, vt dissipet & attenuet materiam: qui sit minuens, si absit materia morbifica: vnde Galenus probat cibi paritatem, id est, cibum minuentem, ca. 2. lib. 4. *α. τόν.* Hinc Auicennas improbat *caules, lentes, laci*: nam hi cibi euaporant in caput: improbantur *aromata, agrumina*, nam caput petunt. Improbantur calidiora in lippitudine ex inflammatione: vnde Rhasis in hac neque dulcia admittit, quia bileseunt. Auicennas etiam prohibet copiam salis, vt propterea sint vitandi cibi crassi, vt sunt *carnes salta, cibi qui conficiuntur è posse*. Cum probentur cibi attenuantes, possunt cibi conditi his quæ oculi proportionem respiciunt: vt sunt *nux moschata, emphragia, faniculum*: quibus vti possumus pro condimento & pro opsonio. Cibaria autem condiantur calidis, nisi caliditas corporis prohibeat: vt improbentur in lippitudine ex inflammatione. Tandem, cum probetur minuens victus: secundum Rhasin, est abstinedum à *carnibus*. Quoad potum: Rhasis improbat *vinum*, nam calefacit, & petit caput. *Aqua* etiam in magna copia improbatur, cap. 6. lib. 4. *α. τόν.* quia cibi vehiculum est, & materias in caput ducit.

Vinum

Vinum aliquando probatur: nam dolores oculorū soluantur vini potione, aph. 31. sect. 6. Proinde secundum Gale. in com. in oculi dolore vinum conuenit, dum in oculorum venulīs sanguis crassus continetur, sine corporis repletionē, nā hoc vinum materiam resoluit. Alias aqua detur. Somnus & vigilia erunt moderata. Ager super oculum infirmum non dormiat, nec capite eleuato: & puluinar non sit ē plumis, quia phlegmone augetur. Alius seruetur lubrica: namalui profusum in lippitudine bonum. Probatur etiam vacuatio excrementorum tertiz coctionis: vnde aph. 31. sect. 6. c. vlt. l. 13. meth. probatur balneū aquæ dulcis, at toto purgato, & cocta inflammatione: quare in declinatione. Quoad motum & quietem, ratione totius corporis, si respiciamus ad lippitudinem imminuentem: ē cap. 3. libro 3. de tuen. san. probatur frequens ambulatio, cursus mediocris, gestatio in vehiculo, probantur omnia citra fatigationem, & capite dorsoque non inclinatis. Si autem respiciamus, ad lippitudinem presentem, cum Gal. c. 2. l. 4. x. rōn. exercitio vti licet, post mitigationem doloris, & ante balneum: vt probeatur mediocris quædam ambulatio. Ratione motus oculi, cum Auicenna motus superfluous nocet: vt immoderatus risus, fletus, aspectus obiectorum paruorum, alborum, splendentium: nam oculi à luce offenduntur, quia spiritus dissipantur, cap. 3. l. 10. de vsu. p. Vnde Auicenn. suspendebat pannum nigrum ante oculos, in ægitudine, & viridem in dispositione sanitatis, vt spiritus seruarentur.

CAPVT XXXI

De Vesica, seu Pustula cornea.

Huius vitij de affectu annatz tunicz sequuntur corneæ: quorum primum Vesica est. Celsus malum hoc vocat pustulam: Græci phlyctenam. Auicennas vocat vesicas: nam cornea instar vesicæ extuberat, cū repleatur materia aquosa. Generatur hoc malum: quoniam materia serosa, petens oculos, replet corneam inter corticem & corticem, seu inter tunicam & tunicam, vt cornea in tumorem attollatur. Vt corneæ vesica, seu pustula, sit tumor corneæ, procedens à materia aquosa. Vnde forma huius vitij est tumor: Quare magnitudo aucta: quæ est modo symptoma, modo morbus. Est morbus, dum tumor perducitur ad corneam, vt cornea præest foramini

Nomen

ἀπό τῆς

φλύκταινης, id

est, bullire

seu bullas

facere.

Cap. 28. l. 5.

Celsus.

Definitio.

rhagoeidis. Nam cum Auicenna hic tumor nocet visui: idē est morbus. Subiectum est cornea. Auicennas dicebat, corneam replei secundum partem modo profundam, modo superficialiam. Causa efficiens fuit materia serosa: quæ procedit è cerebri excremento, mutata in aquosum. Huius excrementi vitium est in substantia: si materia aquosa putrescat. Est vitium semper in quanto: nam semper copia peccat, quia tumoris est causa. Vitium est in qualitate: cum quandoque hæc materia sit calida & acris. Est vitium secundum vbi, secundum motum: quia habet impetum in oculum. Secundum quietem: vt præter naturam inter tunicas corneæ quiescit. Causa generans patet ex alibi dictis.

Differētia.

Hinc facile ratione formæ colligitur, quod tumor sit vel Symptoma vel morbus. Ratione subiecti: cornea afficitur secundum tunicas vel Internas, vel Externas. Ratione causæ efficientis: materia est Putrida, vel Non putrida: vel Magis vel Minus copiosa: vel Acris, vel Acredinis expers: vel Magis vel Minus mouetur, vel Magis vel Min⁹ est impacta.

Signa.

Hoc vitium in genere vos cognoscetis ex extēsiōe corneæ: & præsertim extensionem hanc deprehendetis, si æger supinus iaceat (notate hoc) vt diligenter vterque oculus sit inspicendus. Differentias ratione formæ cognoscetis: Nam si tumor sit insignis, vt occupet corneam secundum regionem quæ antestat crystallino: facile est iudicare, tumorem esse morbum: sin minus, esse symptoma. Ratione subiecti: an cornea afficiatur secundum regionem attinentem ad crystallinum, oculis facile conspiciemus, sine signis aliis. Vtrum autem cornea afficiatur secundum tunicas externas, vel profundas: signa tradentes Aëtius & Auicennas, sic distinguunt: si materia sit inter tunicam primam & secundam, pustula apparet nigra: si inter tertiam & quartam, alba. Cuius discriminis alia ratio proponitur ab Auicenna, alia ab Aëtio. Auicennæ causa fuit: nam dum pustula pertinet ad superficiem, non prohibet visionem ab intuitu rhagoeidis: si autem pustula sit profunda, prohibet. Vnde cum superficialis pustula non prohibeat intuitum vuez, hæc vuez vt est nigricans, ita est in causa, vt pustula nigricans appareat. At pustula profunda, non prohibet intuitum rhagoeidis, vt firmetur visio in pustula: vnde pustula alba apparet: nam producitur à materia alba: si exquisita sit pustula seu vesica: nam spuria fieri potest à liquore, seu materia serosa, sanguini permista

permista. Secundum Aëtium vero, si pustula sit in superficie, nigra ea apparet: nam naturalis pustula color est niger: (quia respicit ad pustulam, quæ cum serositate sanguinem habet permistum.) At si profunda sit pustula, albicans apparet: nam habet superiacentem corneam albam. Quoniam vero interdum ob tunicae corneae erosionem vœa procidit, & superficialis pustulae speciem exhibet: monet idem auctor exactius hæc esse distinguenda: quoniam varia est curatio. Cognoscitur igitur pustula in superficie, nam undique est subnigra. Quod si prolapsa fuerit vœa: cognoscetis, quia non erit locus undique subniger, sicut in pustula, sed color erit inæqualis: nam circa fundum prolapsæ rhagoeidis, albedo apparebit, propter corneae albedinem. Ad hæc cognoscetis prolapsam vœam, è mutatione pupillæ, quæ parua sit, vel variatur secundum figuram: nam in prolapsu rhagoeidis, pupillæ figura rotunda non seruatur: quæ manet, si pustula fuerit superficialis. Ratione causæ efficientis: quæ sint signa speciei, vitij, causæ generantis: patet ex alibi dictis.

Quoad præsidia: materia in vesica collecta, tota vacuanda. *Præsidia.*

Quoad prognosticum: curatio est facilis: curatio est difficilis: & quandoque mutatur in vitium incurabile: quod discrimen pendet è vi differentiarum. Vnde ratione formæ: difficilioris erit curationis, si tumor sit morbus, propter vehementiam essentia & dignitatis. Adest vehementia essentia: nam ubi tumor est morbus, est maior recessus à naturali statu. Vehementia quoque est ratione dignitatis: nam dum tumor est morbus, respicit regionem crystallini. Pustula profundior, cum sit vehementior ratione dignitatis, cum Auicenna est deterior: & præsertim quia cum Aëtio periculum imminet, ne cornea in profundo rumpatur, & hinc vœa concidat, & effluant humores. Ratione causæ efficientis: periculosus est malum, si materia sit putrida, si copiosior, si acrior, si cum impetu oculos petat: Vt, si contingat eum esse impetum, ut rumpatur cornea, mutari solet in vitium incurabile, præsertim si fiat ruptio in partes internas.

Quoad materias: sufficiat proponere, quæ corneæ sunt adhibenda. Vnde quoad materiam cheirurgicam: dicebat Auicennas: si vesica sit magna, ferro curanda: nam vitium est vehemens: indicat ergo remedium vacuans vehemens: cuius materia est potius ferrum, quam medicamentum.

Curatio.
I.

Nam nisi cito euacuetur materia, periculum imminet disruptionis corneæ ad sedem profundam. Quoad medicamenta: probantur acria, si parua sit vesica: sint autem & medicamenta vehementer siccantia: vt conficiendum sit *collyrium* de terra Samia torrefacta, è tusia, è cadmia, antimonio, scoria aris, & his ablutis: & gummi addatur, & omnia terantur in aqua pluviali, & paretur *collyrium*, quod excipiatur aqua fanugraci. An imaduertatis Auicennam addere opium: quia componit medicamentum, quod diu est seruandum, vt propter fermentationem opium obesse nequeat: at si recenti sit vtendum: opium uon est miscendum. Propter iuniores & tusia, cadmia, scoria aris, lotarum, ana 3 β. gummi 3 j. terantur in aqua euphrasia, & fiat *collyrium*. & prædicti *collyrij* 3 β. aque fanugraci 3 vj. Misc. Sed notandum Aëtium probare etiam astringentia: quoniam non respicit ad vesicam exquisitam, sed ad tumorem aquosum, qui sit particeps inflammationis. Hoc verum esse, inde scitur, quia addit: mitigata inflammatione, opus esse vti myrrha, croco, nardo, & proinde discutientibus non astringentibus. Hoc debetis notare, ne in curatione erretis.

CAPVT XXXII.

De Vlcere cornea.

Nomen.
Generatio.



Definitio.

QUOD vlcus corneæ: huius nomen patet. Generatur dum corneæ occurrit causa morbosica, quæ in corneæ substantiam per modum vel abrasionis, vel simul etiam erosionis ita agit, vt corneæ substantia absumatur & vnitas soluatur. Huius vlcis definitio est: quod sit soluta vnitas, cum magnitudine imminuta corneæ, producta à causa mordaci. Colligitur hæc definitio è c. 2. l. 13. meth. c. 1. l. 4. meth. è c. 1. l. 6. meth. & è c. 1. l. 1. de loc. aff. Quoad formam: fuit soluta vnitas, cum imminuta substantia, vt vlcus sit affectus mistus è soluta vnitate, & magnitudine imminuta: ad differentiam simplicis vulneris. Subiectum fuit corneæ: quæ vlceratur, modo magis, modo minus: Et proinde modo in superficie, modo in profundo. Causa efficiens fuit causa mordax: quæ esse potest & interna & externa. Interna est succus mordax, tum secundum propriam naturam: vt bilis flaua, bilis atra, à qua producitur vlcus canerosum: tum ratione putredinis: vt quilibet succus, dum

dum putrescit. Addebat Auicennas, huiuscemodi materiam vel aliunde confluere: vel esse reliquias lippitudinis, vel pustulæ seu vesicæ. Causa autem externa sunt medicamenta acria: & cum Auicenna esse potest ictus, percussio.

Differentiæ diligenter propter iuniores sunt tradendæ: vt sciant capere differentias, non modo in vlcere corneæ, sed etiam in vlcere cuiuslibet partis. Sciendum igitur è cap. vlt. lib. 3. meth. differentias non esse capiendas à coniunctis: vt si quis dicat vlcus esse inflammationis, vel expers, vel particeps: nam ex his, ait Galenus, non constituuntur differentiæ. Et ratio est: quia quodlibet seorsim cōsistit, vlcus per se consistit, inflammatio per se consistit. Quare differentiæ capiendæ sunt, vel ab vlceris materia: & hæ sunt maxime propriæ: vel ab aliquo etiam sup̄t capiendæ, quod est extra vlcus, quod tamen habet rationem causæ sine qua non: & hæ sunt differentiæ, non tamen ita propriæ, vt priores. Vnde quoad proprias: capiuntur ab vlceris figura, & magnitudine. A figura: vt vlcus est vel Obliquum, vel Rectum, vel Retortum, vel Quolibet alio modo figuratum. A magnitudine etiam capiuntur differentiæ: & primum à longitudine, vt vlcus est vel Longum, vel Breue. A latitudine: vlcus est Latū, vel Arctum seu angustum. A profunditate seu altitudine: vlcus est Superficiale, vel Profundum: seu est Æquale, vel Inæquale. Si corneæ vlcus sit angustum & profundum: Græci vocant *βέθελον*, id est, fossulam: Auicennas vocat aulunum. Si vlcus sit latum & minus profundū: Paulus vocat *κοίλωμα*: ab Auicenna vocatur luluma, id est, vngula. Quoad differentias non proprias: capiuntur à tempore, à conspectu, generationis ratione, & locis in quibus. Declaro. A tempore, vlcus est Recens, vel Antiquum. Ab aspectu: est Euidens, aut Reconditum. A ratione generationis: vt facta est soluta vnitas, vel secundum Totum, vel secundum Partem. Quamuis hæc differentia pertineat potius ad vulnus. Si differentiæ capiantur à loco, à subiecto, hoc est, à cornea: cum Auicenna sunt quinque species vlceris, quarum tres attinēt ad superficiem, duæ ad profundum. Nec obstat, quamuis Auicennas proponat septem species: nam duæ pertinēt ad causam efficientem: non autem ad subiectum, de quo iam loquimur. Itaque quoad vlcus partium externarum: si pertineat ad primā tunicam corneæ, secundum nigrum oculi, vocatur alchag, si ad secundam membranā, dicitur Nubes, chateman: nam instar

Differentia.

*Paulus 9.
22. l. 3.*

instar nubis visionem turbat : si pertineat ad coronam , ubi est nigredo , dicitur vlcus coronale , Paulo dicitur argemor : si autem vlcus spectet ad profundiores partes , spectat ad tertiam tunicam , & dicitur luluma , id est , vngula , à Paulo *νεύλαμα* : vel ad quartam , & vocatur aulunum . Paulo *foffula* . Ratione autem causæ efficiētis , patet vlcus fieri à causa Externa , vel Interna . Et si interua : hæc differt vel specie , vel vitio , vel causa generāte . In præsentia duo notanda : primum causam morbificam , id est , materiam agere & ulcerando , & quandoque inducēdo intemperiem calidam . Secundo notandum : si vlcus fiat à materia exusta : si attineat vlcus ad superficiem , vocari ab Auicenna adustium lanosum : si attineat ad profundum , vocari adustium crustosum .

Signa.

Vlcus non difficulter cognoscitur , è dolore pulsante . Et si fuerit in cornea , ad differentiam vlcis tunicæ annatæ , conspicitur veluti punctum album : at si vlcus sit in tunica annatæ , punctum non albicans apparet , sed rubicundum : nam dum cornea vlcere afficitur , albedo apparet propter albedinem sanietis : & dum vi vlcis cornea priuatur diaphaneitate , album præse fert colorem : nam *διαφανής* , dum terminatur , album conspicitur . At si vlceretur tunica annata : vlcis sedes rubicunda conspicitur : nam hæc tunica est multis venis referta , vt fluat sanguis : qui quamuis exiguus sit , in minima copia , euidens tamen rubedo conspicitur , quoniam in albo corpore exigua rubedo est euidens . Sed præterea vlcus indicatur è prægressis causis vlcis . Facile etiam cognoscetis differentias , quæ capiuntur à forma . Nam quæ sit vlcis figura , quæ magnitudo : visui patet . Ratione subiecti : si cornea afficiatur secundum primam tunicam : indicatur ex asperitate , & læsa visione , quæ fieri videtur veluti per fumum . Si attineat ad secundam tunicam cognoscetis è læsa visione , in qua veluti per nubem intuitus fieri videtur . Si sit species coronalis vocata : cum Auicenna cognoscetis , quia pertinebit ad regionem pupillæ . Si fuerit in cornea : ex albedine . Si pertineat ad annatam , est permixta rubedo . Si pertineat ad profundum tunicæ : vix lumen possunt ferre .

Indicationes vlcis generales.

Sequitur pro curatione vlcis corneæ , vt de indicationibus agamus : circa quas hoc loco ita versabimur , vt inde quisque facile assequatur , quid agendum in omni vlcere . Itaque cum vlcus sit soluta vnitas , cū magnitudine imminuta partis viuētis , producta à materia corrodeute : ob id indicationes sunt

sunt hauriendæ, à rebus præter naturam. & à rebus secundum naturam. Quoad res præter naturam: cum Galen. l. 3. meth. c. ult. vlcus indicat agglutinationem, id est, unionem, ut vulneris labia coniungatur. At cum vlcus sit soluta vnitas, cum magnitudine imminuta, (in vlcere enim caro est imminuta:) carnis defectus indicat præsidium carnem generans. Et si imminuta sit substantia cutis: cutis defectus indicat præsidium, cutim generans, id est, cicatricem inducens. Ut in vlcere scopi tres sint: scilicet carnis generatio, agglutinatio, & cicatrificatio. Verum cum Galeno lib. 3. meth. intelligere est operæpretium, qua arte caro generetur, qua arte fiat agglutinatio, & cicatrificatio. Itaque sciendum cum Galeno c. 7. lib. 3. meth. impletionem cavitatis, id est, generationem carnis, agglutinationem & cicatrificationem, esse naturæ opera: medici vero officium esse, ut docetur cap. 6. lib. 3. meth. remouere impedimenta: nam secus non est possibile illos scopos assequi. Quantum igitur attinet ad impedimentū: hoc est vel Læsis facultatis, vel Error externus. Huius numeri hæc est ratio: quoniam malum & vitiosum opus procedit vel à læsa facultate, vel ab errore externo: ut cum hæc impedimenta habeant rationem causæ: ideo dictum fuerit à Galen. cap. 3. l. 4. meth. has indicationes esse præseruatorias, quia à causâ capiuntur. Habent autem hæc impedimenta: (ut admonet Galen. cap. 1. l. 4. meth.) vel rationem efficientis causæ, cuiusmodi sunt subiectæ carnis affectus: vel causæ sine qua non, quemadmodum est pilus, arena, & similia, quæ in vlceribus aliquando reperiuntur. Hæc ergo impedimenta cum attineant vel ad læsam facultatem, vel ad errorem externum: quod illa attinet, quæ spectant ad læsionem facultatis, ut iubet Gal. c. 7. l. 3. meth. si in parte vlcerata fuerit intemperies, indicat alterans per contrarium: Si morbus sit tumor, tumoris materia: (quia tumor non indicat: (vacuās poscit: & si caro excreta & aucta habeat rationē tumoris morbifici, est dissipanda. Quoad errorem externum: hic ut rationem habet impedimenti est Communis, vel Proprius. Communis est, qui respicit generationem carnis, agglutinationem, cicatrificationem. Proprius est, qui vnum tantum respicit e tribus prædictis. Quoad communem errorem, est Materia fluens & Causa morbifica, quæ alia est à constitutione partis, ab intemperie, à morbo: & residet hæc causa morbifica in parte vlcerata. Quoad materiam fluentem in partem

I. A rebus præter naturam.

Vlceris cura, quatenus à natura peragitur.

Impedimentorum sublatio.

Impedimenta ratione læsæ facultatis.

Impedimenta ratione erroris externi.

I. Ob materiā fluentem.

vlcera

ulceratam: ab hac varia indicantur præsidia: vt materia fluēs varia est secundum speciem, secundum vitium, secundū causam generantē. Propter iuniores: species sit materiæ fluentis, vel Sanguis, vel Alius humor: ab his humoribus determinatæ hauriuntur indicationes. Et pariter sunt hauriendæ indicationes à vitio secundum substantiam, qualitatem, quantitatem, & vbi, & præcipue secundum motum. Et similiter ratione causæ generantis, varia sunt haurienda præsidia: vt alterare oporteat modo iecur, modo vëtriculum, modo alia viscera, de quorum indicationibus in propriis capitib. Quoad errorem communem, vt est causa morbifica residēs in parte ulcerata: hæc multiplex esse potest, vt pilus, sordes, materia putrida, caro contusa, caro excrescens, sed non ad eam magnitudinem vt sit morbus, quia esset læsio facultatis: huius classis est dolor in parte ulcerata, & similia, quæ sui præsentia prohibent carnis generationem, agglutinationem, & cicatrizationem. Quæ sane causæ in genere indicant ablationem: in specie, indicant ablationem specificam: vt pilus, indicat, quod pilus sit auferendus. Quoad errorem proprium: primum si respiciat carnis generationem: cum Galen. cap. 3. lib. 3. metho. etiam præsentē proba facultate, & probo sanguine, cum ē necessitate generetur duplex excrementum, vtrumque habet rationem erroris proprii, ratione generationis: vnde excrementū tenue, vt humidum, indicat siccās: excrementum autem crassum, vt replet, indicat vacuans. At, cum euacuationem turbent medicamenta astringentia: minimè hæc in carnis generatione sunt administranda. Hinc Galenus magis ad specifica descendit cap. 3. lib. 3. meth. vbi probat præsidium siccans & detergens primi ordinis: nam remedium siccans vltra primum ordinem, vt sanguinem fluentem potest absumere, ita carnis generationem impedit: indicat igitur siccum, sed non vltra primum gradum. At Galenus admonēbat vlcus humidius indicare siccius: corporis autem temperiem, quo humidior fuerit, tanto medicamentum minus siccum postulare: vt si vlcus sit: pariter humidum in ægris diuersis, in sicciori temperamento opus sit sicciori medicamento, in temperamento humidiori, minus siccū. Cuius veritatis fundamentum desumitur ē cap. 1. lib. 5. meth. vbi docet, ea quæ sunt præter naturam, indicare contrarium: quæ secundum naturam, simile vt pars ulcerata siccior sit magis siccanda, minus sicca, minus siccanda. Ex his

constat,

2. Ob causam mor-
bificam, in
parte ulce-
rata.

3. Ob excre-
menta, quæ
in carnis
generatio-
ne preueni-
unt.

constat, in vtraque sanitatis intemperie probari siccum : & hoc siccum præsidium non indicari ab intemperie sanitatis, nam humida humidum indicat, non siccum: sed ab humido excremento indicari: permitti vero à temperie sicca, non ab humida, verbi gratia si ab excremento vlcæris humido indicatur siccum in primo gradu in tertia mansione : causa temperaturæ humidæ prohibetur : vt opus sit vti medicamento sicco in primo gradu, sed non in tertia mansione, verum in prima. Vnde cum Galeno cap. 3. lib. 3. metho. cura medicamentorum siccantium alia magis siccant, alia minus: qualem conueniat, iudicandum partim ex vlcærum diuersitate (vt sunt, vlcus vel minus vel magis humidum) partim ex acri temperatura: vt vlcæris excrementum concurrat vt indicans, acri temperies concurrat velut permittens, aut velut prohibens. Quoad errorem proprium ratione agglutinationis: cum Gale. cap. 1. lib. 5. metho. probatur magis siccans, quam in generatione carnis, & siccans citra determinationem, & leuiter astringens. Fundamentum est: quia hic error ad agglutinationem spectans, est duplex: alter est cum Galeno cap. 5. lib. 3. metho. sanguis fluens optimus: nam in agglutinatione oportet exsiccare quod affluit, etsi sit optimus sanguis. Alter autem error est carnis genitæ raritas: quæ indicat astringens: at cum minus possit raritas ad prohibendum agglutinationem, quam ad cicatrificationem: ob id, vt in agglutinatione probatur siccius medicamentum, quam in generatione carnis: ita in agglutinatione probatur minus astringens, quam in cicatrificatione. Vt in agglutinatione, descendendo ad remedia determinatissima, locum habeat præsidium siccum in secundo gradu, & astringens in primo. Quoad errorem respiciente cicatrificationem: pariter cum Galeno cap. 5. lib. 3. metho. intelligendum vlcus ad cicatricem perducitur generando cutem, quæ è subiecta carne creatur: cutem vero non posse exquisitam regenerari, quia seminalis est: ideoque generandum aliquid simile cuti: vnde cum cutis carne sit siccior & densior: ob id caro, vt humidior cute, indicat siccans: vt rarior, indicat astringens. Hæc igitur caro non modo indicat siccans & astringens, sed multo magis quam in agglutinatione: nam causa cicatrificationis siccandus est humor, qui etiam in carne continetur, vt hæc euadat densior. Quare in cicatrificatione indicatur remedium siccans in tertio, astringens in secundo. At si inuicem con-

4. Ob sanguinis boni affluxum, carnisque genitæ raritatem.

5. Ob carnis humiditatem, & raritatem.

ferantur siccantia, & causa cicatrificationis, & causa, non agglutinationis, sed consumptionis carnis excretæ: cum Gale. c. 6. l. 3. meth. sicciora probantur causa carnis excretæ, quam causa cicatrificationis. His ita explicatis, patet cur Gal. c. 3. l. 4. metho. secundum mentem Hippoc. lib. de vlc. dixerit, vlcus esse humidum, sanum autem siccum: nec vlcera madefacienda nisi vino, cum vltimus finis sit siccatio. Humidum enim est vlcus, hoc est, vlcus tandiu perseverat, quousque durat humiditas morbifica: & sanum est siccum, hoc est, dum morbifica humiditas est consumpta, quæ scilicet attinet ad generationem carnis, ad agglutinationem & cicatrificationem. Norandum quoque quod Galenus c. 3. l. 4. meth. dixit, vlcus, qua vlcus, mediocriter siccans indicare: vlcus enim qua vlcus, id est, quatenus est soluta vnitas, indicat agglutinaus, quod cum Galeno cap. 1. lib. 5. metho. est siccans in medio constitutum inter siccans ratione generationis carnis, & ratione cicatrificationis. Id autem quod in vlcere est secundum naturam: quamvis indicationes capi possint à temperatura & calido infuso partis ulceratæ: tamen potissimum capiuntur à calido innato. Ratio est: quoniam temperies conseruatur, nisi vsurpentur medicamenta destruentia temperaturam. At calidum innatum, cum assiduo dissipetur, indicat conseruans: & cum in calido innato seruanda sit quantitas, & hinc substantia & qualitas: ideo à calido indicatur calidū, quod Hippoc. aph. 22. sect. 5. calidum suppuratorium vocat, cuius beneficio conseruatur substantia & qualitas calidi innati. vnde pars vlceraata optimum generat pus, quod maximum est securitatis indicium, nam (vt ait Gale. in com. lib. cit.) nihil mali aduenire vlceri potest, si bonum pus generetur. Hoc autem calidum suppuratorium, oportet vt non modo sit calidum (nam calidum vt calidum secundum naturam simile indicat) sed præterea sufficit, vt sit calidum in primo gradu non vltra. Vnde Hippoc. proponit calidū, quod cutem emollit, dolorem sedat, tenuisq; est substantiæ: siquidē cum Hippo. & Gal. cutem extenuat, discentit, & vacuat. Sed oppositum videtur propositum esse à Gal. qui lib. 5. simpl. ait, suppuratorium esse viscidæ substantiæ, vt poros claudat, ne calor dissipetur. Itaq; pro resolutione: calidum suppuratorium, quod indicatur à calido, est duplex: vtrumq; moderate calidum, vt non excedat primum gradum: at alterū tenue, alterum viscidum. Id quod est tenuis substantiæ, cum Gal. aph. 22. sect. 5.

1. Indica-
tiones à re
bus secun-
dum natu-
rā in vl-
cerata par-
te.

sect. 5. prohibetur à fluxione & à putredine: nam fluxio auge-
tur à calido, maxime si hoc tenuis sit substantia: putredo
etiam à calido augetur. Vnde dicebat Hipp. loc. cit. calidum
suppuratoriū esse bonum, sed non in omni vlcere, quia nec
in putrido, nec in eo quod est cū fluxione. Præterea suppu-
ratorium tenuis substantia: prohibetur etiā à carne cōtusa:
nam (c. 5. l. 4. meth. & secundū Hipp. lib. de vlceribus) si caro
sit contusa, oportet celerrime suppurare: at hoc præstari nō
potest suppuratorio tenuis substantia:, sed opus est suppara-
torio viscido. Vnde i *αυστηρὲς* viscidū tantum in vlcere pro-
batur, si est cum carne contusa: quia hoc calidum est & hu-
midum: in vlcere autem semper oportet exsiccare, nisi caro
sit contusa: siquidē siccare oportet causa & generationis car-
nis, & glutinationis, & cicatrificationis: vt ppter ea recte Gal.
c. 7. l. 1. c. 7. dixerit, nullū humectās esse cōmodū vlceribus.
Sed statim quis quæret: cur calidū innatū conseruetur sup-
puratorio tenuis substantia:, nisi caro sit contusa. Dicendū,
causam esse, propterea quod calidū innatū adiutū à suppu-
ratorio tenui agit in bonū sanguinem, cuius portio mutatur
in substantia calidi insiti: vt propterea cōseruetur, nec egeat
viscido suppuratorio: At dum calidū insitū agit in carnē cō-
tusam, quoniā hæc vniuersa vertitur in pus, vt in hac actione
non reparetur substantia calidi innati: ideo dissiparetur &
hæc substantia, nisi suppuratorium esset viscidum. Et hæc de
indicationibus & vlceris corneæ, & omnium vlcerum.

Quoad prognosticum. Oculi vlcus est vitium non con-
temnendum: quia enim absimitur pars seminalis, non repa-
ratur exacte: ideoq; oboritur cicatrix, vt cornea amittat dia-
phaneitatem: hincq; lædatur visio. Sed pro varia vehemen-
tia differentiarum, vario modo est prognosticandū. Statuen-
dum igitur vlcus magnum esse magis periculosum: nam
adeft vehementia ratione essentia:. Rhases dicebat vlcus
corneæ, magis esse periculosum vlcere annata: : nam adeft
maior vehementia dignitatis. Si vlcus sit canerosum: est in-
curabile, vnde destruitur visio, in hoc enim vlcere nulla desi-
deratur vehementia. Et notandum cum Galeno ca. 2. lib. 1. de
symp. caus. in soluta vnitae corneæ, periculū cæcitatis im-
minere: quia humor albugineus effluit. Dicebat autem Ga-
lenus loc. cit. hoc euenire vt plurimum: & propterea testatur
puerum visum recuperasse. Recte intelligendus Galenus.
Nā loquitur de puero, qui fuit affectus vulnere, vnde de

Prognosti-
cum.

vlcere sit statuendum, in hoc enim est perditā portio cor-
neæ: vt nequaquam salutem pollicēri debeat.

Curatio.

1. Dum igitur curationem hoc vlcus admittit: quantum at-
tinet ad materias cheirurgicas, patet rationabiliter Rhafim,
& Auicennam probare phleboto. cucurbitulas, dum sanguis
peccat: neque improbantur fonticuli, dum vlcus fouetur ab
excremento fluente ad oculum. Topica: Galenus cap. 2. lib. 4.
α. τόπ. probat tuiam lotam, collyrium ē thure, myrrha, crocō, me-
sabolicis medicamentis lotis. Aninaduētere autem oportet: si
coniunctas sit dolor, addendum medicamentis propositis
oui candidum, succū mādragora. Rhafis utebatur Sief albo cū La-
ctē: si dolor aderat. Si ctingat vt vi vlceris rhagoeides procidat:
collyrio ē tuiā addere licet astringentia: vt liceat vti aqua rosacea,
sanguine drac. Unde Rhafis huc respiciens, probat collyrium, recipiē
Ribium: quod cum Galeno lib. 9. simpl. siccāt & astringit, & pro-
pterea cum Dioscoride vlcera mundificat & cicatriscit. Si eueniat
vt vlcus sit sordidum, Galenus loc. cit. addit collyrium ē vino,
croco, sale, cadmia, melle, & aliis propositis in ca. 7. Auicennas pro-
bat syrupum de melle, cum aqua fenugraci. At si oculus fuerit ex-
quisitoris sensus: mellis loco prestat vti saccharo, ad detergendum.
Ad efficiendum cicatricem, probatur sief propositum ā Rhafis.
Et si vlcus ægre ducatur ad cicatricem, potestis cum Gale-
no cap. 7. lib. 4. α. τόπ. vti hoc medicamento. R. aris vsti ʒij.
myrrha ʒj. piperis ʒij. misys assati ʒj. croci ʒβ. vini generosi
ʒij. vini passi cretici ʒj. β. arida terantur, & infundantur in vi-
no: & dum vinum erit imbibitum, oportet effundere passum: &
deinde medicamentum concutiendum in vase arēo: & lento igne
coquendum, ac seruandum in pixide arēa. Dixta patet.

CAPVT XXXIII.

De Ruptura corneæ.

Nomen.



RUPTURA corneæ, Rhexis, ρήξις, est illud
malum, in quo corneæ vnitas ita diuiditur, vt
vnea procidat. Vt si respiciamus ad solutā vni-
tatem corneæ, vocetur ruptio πῆξις: sin ad proci-
dentiam rhagoeidis, ρήξις παλειδύς πῆξις, & hoc ad
differentiam procidentiæ totius oculi. Generatur hoc ma-
lum, dum causa morbifica occurrens corneæ, ita soluit cor-
neæ vnitatem, vt rhagoeides non possit sedem suam ser-

uare.

uare, sed necessario procidat. Vt *πρόσθιος* sit situs præter naturam rhagoeidis, procedens à soluta vnitatis corneæ.

Cum Auicenna & Paulo forma huius vitij est situs præter naturam. Subiectum est rhagoeides: nam quia hæc procidens situm secundum naturam non seruat: circo huius mali est subiectum. Causa efficiens est soluta vnitatis corneæ. Soluitur autem vnitatis corneæ à causa Interna, vt à præcedenti vlcere: vel ab Externa, vt à percussione, à causa incidente corneam.

Definitio.

Quoad differentias: capiuntur à formâ & efficiente, non à subiecto: nam situs præter naturam subiectum semper est vnea: solutæ vnitatis subiectum semper est cornea. Differentiæ ratione formæ, è Paulo & Auicenna: Situs rhagoeidis est vel Magis, vel Minus vitiosus. Hinc si rhagoeidis procidat exigua portio, oritur illud vitium, quod vocant *μυοίφαλον*, id est, caput muscæ: Arabes vocant affectionem formicalem. Si procidat maior portio rhagoeidis, sit *σαφύλωμα*, id est vneatio: nam quod egreditur habet formam vneæ. Si portio plurima procidat, sit *μῆλον*, id est, malum. Et si accidat, vt vna cum vnea procidat etiam cornea, Auicennas vocat orbicularem affectionem. Ratione causæ efficientis: si malum fiat à soluta vnitatis corneæ: tunc vel Contrahitur callositas, vel Non contrahitur. Et si absit callositas sit *ἴλος*, id est, clauus. Præterea, malum est à causa Externa, vel Interna.

Differentia.

Signa. Hoc vitium in genere patet. Secundum differentias à forma: non est opus signis. Ratione causæ efficientis: si fuerit soluta vnitatis: an callum contraxerit, inde patet: quoniam secundum circumferentiâ rhagoeidis apparet albedo corneæ, quæ callum contraxit. Vtrum autem soluta vnitatis fiat à causa interna, vel externa: patet ex alibi dictis.

Signa.

Præsidia. Ratione situs præter naturam: rhagoeidis situs restituendus: & causa solutæ vnitatis, indicatur vnitio.

Indicatio.

Vitium hoc secundum Auicennam & Græcos non facile curatur: nam difficultas inde colligi potest, quia arduum est intropellere rhagoeidem, & corneæ solutam vnitatem remouere. At augetur difficultas, pro vi differentiarum. Ratione formæ est minus periculū in formicali: maius in staphylo mate: incurabile vitium est *μῆλον*, in hoc enim insignis est vehementia essentia. Ratione causæ efficientis: dum reliqua sunt paria, periculum intenditur, si solvatur vnitatis à causa ulcerante: vt minus sit periculum si solvatur à causa inci-

Prognostica.

dente: dum enim soluitur à causa ulcerante, est maior recessus, quia adest defectus secundum substantiam corneæ. Et si callus sit contractus, incurabile est malum: ob summam vehementiam essentia.

Cnyatio.

Quoad remedium in materia: Causa propterea clauialis, quæ non cedit medicamentis, probatur à Paulo, Aëtio, Celso, materia cheirurgica, ratione deformitatis minuendæ: vt confugiendum sit ad ferrum. Auicennas vero ait quosdam propter pulcritudinem eminentiam abscindere: ipse tamen iudicat rectius esse, vt ad ferrum non confugiamus, quoniam forte effunditur materia, & mutatur ad oculum sanum. Quare in hac controuersia id in praxi seruandum, vt si oculus sanus sit imbecillis, & exquisiti sensus, tutius sit à ferro recedere. Medicamenta probantur astringentia. Vnde Auicennas proponit *medicamenta confecta ex aqua, aceto, vino astringente: in quibus vel macerentur, vel bulliant rosa, vel folia oliuæ, polygoni, rubi. Licet etiam terere gallas immaturas, terram sigillæ, cerussam, & similia. Vnde etiam probatur succus foliorum oliuæ, succus virgæ pastoris, succus polygoni. Auicennas inter violentiora probat collyrium ex cineribus, quibus as purgatur: & similiter probat collyrium à croco, amylo, tragacantha, cum albo oni.* Et hoc notandum, si immineat inflammatio, medicamenta non esse excipienda *vino*: si vero dolor vrgeat, vel immineat, non esse excipienda *aceto*.

CAPVT XXXIIII.

De Paris collectione.

Nomen,
Aliud vi-
cium υπό-
πνον, de
quo paulo
post, ca. 38.
Definitio.

RE & collectionem puris, seu ὑπόπυον, cum Gale-
no cap. vlt. lib. 14. metho. intelligimus illud vitiū
in quo pus colligitur in oculo, & præsertim in-
ter corneam & crystallinum. Generatur hoc vi-
tium, dum tumoris materia in pus mutatur, vt oculus affi-
ciatur tumore sub cornea, vt lædatur visio. Quare Hypo-
pyon est tumor sub cornea, procedens à materia purulenta.
Forma est tumor. Subiectum est oculi regio, sub cornea: Et
cum Auicenna sedes potest esse duplex: propinqua, dum pu-
s colligitur inter corneam & rhagoeidem: profunda, dum
inter rhagoeidem & crystallinum pus colligitur. Causa effi-
ciens est materia purulenta: quæ procedit è tumore, qui de-
generat

generat in abscessum: siue sit tumor corneæ, siue rhagoeidis.

Differentiæ à forma. Tumor est Maior, vel Minor. A subiecto: materia purulenta residet, vel inter Corneam & rhagoeidem: vel inter Rhagoeidem & trystillinum. Ratione causæ efficientis dicendum, abscessum pertinere vel ad Corneam, vel ad Rhagoeidem.

Differentia

Malum hoc in genere patet. In conspectu etiam sunt differentiæ à forma sumptæ: nam oculis intuemur, an tumor magnus sit vel paruus. Ratione differentiarum à subiecto sumptarum: si pus resideat inter corneam & rhagoeidem: pus exactius conspicitur, & affectus oculus sano oculo eminentior apparet. Quantum attinet ad causam effectricem: num sit pus, ita cognoscetis: nam si caput, vel oculus concutitur, mouebitur materia purulenta: & præterea pus esse cognoscetis è præcedente abscessu.

Signa

Præidia. cap. vlt. lib. 14. metho. Pus vacuandum. At iuniores recte intelligant Galenum. Tribus modis fieri potest puris vacuatio: primum vt pus simul multum & totum vacuetur: secundo, vt paulatim euacuetur: tertio, vt transferatur seu transponatur in partem ignobilem. Vnde obiter colligatis, transponens non esse indicatum: sed modum euacuationis: ac propterea extra methodum.

*Indicatio-
nes*

Secundum Galenum cap. vlt. lib. 14. metho. vitium hoc est curabile: quoad puris euacuationem: Nam si forte coniungatur vlcus, aut inflammatio, confugiendum ad propria capita. At, vlcere & inflammatione absentibus: pus vacuari potest.

*Prognosti-
ca*

Materia cheirurgica loc. cit. est duplex. Altera: sectio corneæ circa iridem: de qua monet Aetius, acum oblique esse immittendam: & deinde post euacuationem puris oui candidum instillandum: mox integrum ouum cum vino mulso conuassatum, oculo imponendum. Altera materia cheirurgica est transpositio: oportet enim collocare agros in sella rectos, & caput concutere, vt pus descendat in partem ignobilem. Medicamenta loc. cit. improbantur valide siccantia: nam ea violantia cogunt materiam, vt euadat irresolubilis. Et è cap. 2. lib. 4. x. 767. vitanda sunt reprimentia, astringentia: quoniã pus vacuatur per modum resolutionis seu digestionis: vt probentur collyria è melle, myrrha, croco, fellibus, cum succo sanuigraci, fumaria, fomiculi & similia, de quibus dicendum in sermone de suffusione.

*Curatio.
Ca. 28. li. 7.*

*De Dilatatione pupillæ.**Nomen.*

ACTENVS de anatæ & corneæ tunicæ affectibus: sequuntur vitia magis spectantia ad rhagoeidem: vnde primo agendū de Mydriasi. Per hanc (quam Auic. vocat alintisar, Latini dilata-

tionem pupillæ) intelligimus vitium, in quo cum Paulo, Aëtio. Rhafi. rhagoeidis foramen ita amplificatur, vt citra mutationem coloris in pupilla lædatur visio. Generatur hoc malum, dum oculo occurrit causa morbosica: cuius vi foramen rhagoeidis præter naturam amplum euadit, vt visio lædatur. Mydriasis ergo. est amplitudo præter naturam foraminis rhagoeidis, producta à causa morbosica. Forma huius vitij, est amplitudo præter naturam, vt lædatur visio: vt hoc vitium formaliter sit conformatio morbosæ, vt pertinet ad orificia: & est conformatio in orificio quidem, sed ampliore non angustiore reddito. Hanc conformationem esse morbosam, testatur Galenus cap. 2. lib. 1. de symp. caus. & ratio in promptu est, nam dum pupilla amplior redditur, spatium non impletur spiritu animali, prout opus erat: vt hinc visio lædatur: Vt è sententia Græcorum & Arabum, patientes procul exacte non conspiciant, & obiecta iis minora quàm sunt appareant. Non exacte procul conspiciunt: quoniam vbi spiritus animalis est dispersus, radios procul non potest emit-tere. Cur autem obiecta minora appareant, hoc scire est difficile, & ob id multi multa dicunt. Sed breuitatis gratia, vt hæc veritas cognoscatur: primum scire oportet cur oculis etiam sanis existentibus, obiecta minora appareant? Causa igitur est, quoniam oculus secundum crystallinum, & spiritus animales, magis & secundum omnes partes afficitur ab obiecto proximo: vt obiectum proximum magnū, quantum est, iudicetur ab oculo. At, si remotum sit obiectū, nec strenue nec efficaciter, nec secundum omnes partes, partes agit in crystallinū & spiritus: vt, cum minus afficiatur crystallinus, minus afficiatur spiritus: obiectum distans ab oculo iudicetur minus. Idem ergo contingit oculo, dum foramen rhagoeidis amplius euadit: vt, cum spiritus animales dissipentur, non vniuntur, & ob id non afficiantur ab obiecto: quemadmodum cum vniuntur: quia tunc defectus est in receptione, est etiam defectus in iudicio: & propterea obiecta

*Definitio.**Forma.*

minora

minor apparent: Subiectū huius mali est vœa, vt est donata foramine. c. 2. l. 1. de sym. cau. Efficiēs causa morbifica est vel Natiua, vel Affcicitia. Natiua prodit ē prima formationes affcicitia post. Cuius causa est vel Interna, vel Externa. Si interna, est tensio rhagoeidis: tenditur autē vel Propria ratione, vel ex Accidente. Propria ratione: vt affcitur vel vt Similariis, vel vt Pars instrumēti. Si affcitur vt similariis pars, affcitur sicca intemperie, sed citra cōsumptionē albugineis humorem albugineus si minuatur, sit potius angustia pupillæ, nō dilatatio. Quod si rhagoeides vt pars instrumēti affcitur: tumore affcitur. Tēditur ex accidente: dū rhagoeides à subiectis humoribus ad vtrius similitudinem repletur. Causa externa est ictus. Notandū autem causam percutientem concurrere vel mediate, dum scilicet vi percussioneis rhagoeides copiosa materia repletur: immediate autem dum vi percussioneis tunica laceratur, vt foramē amplius euadat.

Differentiæ à forma capiuntur secundum Magis & Minus. A subiecto non sumuntur differentiæ: semper enim est vœa. Ratione causæ efficientis: dicendum produci à causa Interna, vel Externa: Natiua vel Affcicitia.

Hoc vitii in genere & ratione formæ patet: vt nō sit opus signis. Ratione causæ efficientis, causa externa patet. Interna & natiua inde patet, quoniā vitii fuit à principiis generationis. Affcicitia cognoscitur: nam tunica si tenditur propria ratione: præcedunt causæ siccantes, adest tumor: si hæc desiderentur: iudicandum rhagoeidem ex accidente tendi.

In genere hoc malū indicat remediū foramen angustans: Et si nō foueatur ab aliqua causa, nihil aliud agendum: vt in mydriasi natiua, & in ea quæ oritur ē lacerata rhagoeide. At si à causa foueatur, vt in mydriasi affcicitia à causa interna: si vœa tēdatur p̄pria ratione, si ratione siccitatis, oritur indicatio humedandi: si ratione tumoris, huius materia vacuanda. Si ex accidente tendatur, subiecti humores euacuandi.

In genere: causa visionis læsæ malum hoc non exigui est momenti. Vnde Gale. c. 2. l. 1. de sym. caus. ait, nullam amplitudinem, siue natiuam, siue affcicitiam esse bonam. Verum pro differentiarum ratione, vario modo prognosticandum: Ratione formæ: periculosius est malum, si foramen est amplius: vnde Auicennas ait, si dilatatio sequatur itidem, non remanere visui aliquid de quo sit curandum: nam summa est essentie vehementia. Ratione causæ efficientis: si malum

fiat ab interna causa, si hæc natiua sit: cum Auic. vitium est incurabile: nam vitia formatricis adeo sunt vehementia, vt nequeant expugnari. Si autem causa sit æsthetica, cum Aetio malum etiam ægre curabile est: nam rhagoeides, vt est corpus membranosum, semel tensum, ita induratur, vt non facile ad statum naturalem redeat. Et si tendatur vi siccitatis, cum Galeno c. 2. l. 1. de sym. cau. difficulter sanatur. Secus si fiat à tumore. Et addit Galenus, si tendatur ratione inflammationis, ratione scirrhi, ratione abscessus, peritum medicum non magno negotio hoc malum posse superare. Quod sane difficulter intelligi potest: vnde multi interpretes codicem deprauatū dixerunt. Ita igitur intelligendus Galenus: Rhagoeidis tumor bifariam accipi potest: primo modo vt tumor: vnde si est scirrhus, nequaquam facile curatur, imo curari nequit. Secundo modo tumor accipi potest, vt est in causa amplitudinis foraminis, & secundum hanc rationem non est difficile hoc malum expugnare, cum sat sit tumorem minuire: quo imminuto, licet non sit prorsus exstirpatus, tensio etiam minuitur, vt non lædatur visio. Si autem altera è parte tendatur vnea ex accidente: pro copia humoris repletis, vario modo prognosticandum: & ob id Rhasis dicebat: si post capitis dolorem foramen dilatetur vsque ad albedinē, parua est spes in cura, ob immodicam materie copiam, ob essentia vehementia. Si mydriasis fiat à causa extrinseca è percussione: cum Auicenna est incurabilis. Sed dubitari potest: nam Rhasis ait, si pupilla post percussione dilatetur, non esse timendum, eo quod sanari queat: præterea ipse quoque Auicennas curationem aggreditur. Dicendum pro resolutione: si è percussione vnea laceretur: malum est incurabile: Si autem contingat, vt vi percussione non laceretur, sed tumor saltem in ea excitetur, à quo dilatatio foraminis prodeat: curabile hoc est malum.

Curatio.

Materie. Sufficiens medicamenta proponere, causa vitij curabilis. Si ergo fiat vi siccitatis: cum Auicenna probatur humectantia: quemadmodum etiam probantur in sicciore crystallino: vnde de his eo in loco. Scire autem oportet optimum medicamentum esse lac iuuentula optime nutrita: in cuius penuria substituitur lac recens caprillum, vel etiam vaccinum: & lac imponatur vali, in quo detineatur oculus. Si malum fiat ratione tumoris: probantur, quæ fuere proposita in lippitudine. Si è materia replente fiat malum: probantur resolu-

uentia,

uentia. & tunicam rhagoeidem leuiter astringentia: vt iure Aëtius improbet vehementer refrigerantia & vehementer astringentia. Quare cum Auicenna & Aëtio, probatur aqua marina, posca aquosa, collyrium è turia, fellibus, &c. vt absumatur materia replens. Quantum attinet ad astringentia: Aëtius hæc vocat subastringentia, id est, leuiter astringentia: vt est collyrium è resis, croco, cortice iheris: & quod plurimum est, ascendit ad acaciam. Si malum fiat à causa percutiente, sed non lacerante, huius causa Auicennas probat emplastrum è farina fabarum excorticatarum, è farina hordeacea, cum aqua foliorum salicis, aut aqua indiuiæ, aut pauco vino, sed astringente. Et causa materiarum fluxus, dum materia non amplius fluit, Auicennas probat turris vel columbi sanguinem in oculum instillatum: & deinde ascendit ad collyria resoluentia è myrrha & fellibus, vt materiam dissipet.

CAPVT XXXVI.

De constrictione Pupillæ.

PER *φθίσις* seu tabem pupillæ, intelligimus illud *Nomen* malum, in quo præter naturam minuitur foramen rhagoeidis: vnde Auicennas vocat constrictionem pupillæ. Porro hæc tabes pupillæ distinguitur ab atrophia: nam atrophia attinet ad imminutionem, seu decrementum omnium partium oculi: at *φθίσις*, spectat ad imminutionem saltem foraminis, vt docet Galen. c. 5. l. 10. de vlt. part. Generatur malum hoc, dū occurrit causa morbifica, cuius vi rhagoeidis foramen præter naturam angustum redditur, vt lædatur visio. Pupillæ ergo constrictione est angustia præter naturam foraminis rhagoeidis, producta à causa morbifica. Forma huius vitij, est angustia præter naturam, vt lædatur visio. Vt hoc vitium formaliter sit conformatio morbosa, prout spectat ad orificium. Subiectum est vicia, vt prædita est foramine. Ratione causæ efficientis dictum fuit produci hoc malum à causa morbifica, quæ (c. 2. l. 1. de sym. cau.) est causa, cuius vi rhagoeides laxatur, non tenditur. Laxatur autem vel Propria ratione, vel ex Accidente. Propria ratione, vt tunica afficitur intemperie humida: ex accidente, dum concidit. Concidit autem dum humor albugineus deficit. Deficit autem humor albugineus, vel ob solutam vnitatem tunicarum, vel ob alimenti inopiam.

Differen

Differentia. Differentiæ à forma, sumuntur secundum magis & minus: vt foramen constringitur secundum Magis & Minus. A subiecto non sumuntur differentiæ: semper enim idem est. Ratione causæ efficientis dicendum, laxari rhagoeidem, vel Per se, vel ex Accidente.

Signa. Hoc malum in genere, & secundum differentias à forma non eget signis. Quoad differentias ratione efficientis: si vnea laxetur ob intemperiem humidam: indicatur è visione obtusa, vt patiens proxima exacte non conspiciat: indicatur etiam ex oculi humiditate: & è causis prægressis humectantibus. Si autem laxetur è defectu albuginei: cognoscetis, quia patiens melius videbit in obscuro, leu aere non ita lucido: & cum Paulo, obiecta maiora iudicabuntur, quam sint. Causa igitur visionis minus malæ in obscuro est, quoniam ob defectum albuginei, lumen promptius occurrit crystallino, qui humor: (c. 3. l. 10. de vl. part.) offenditur à luce. Obiecta autem maiora apparent: nam dum deficit albugineus, crystallinus superficiem planam prorsus non seruat, vt qualitatem aliquam assequatur, vt quemadmodum in speculo concauo res visæ maiores apparent, ita etiam hoc cõtingat in defectu albuginei. Vtrum autem albugineus deficiat, vi vel solutæ vnitatis, vel inopia alimenti, cognoscetis è prægresso vel vulnere, vel vlcere, vel ex alimenti defectu.

Indicationes. Præsidia capiuntur à materia efficiente: quæ si fuerit rhagoeidis humiditas, indicat siccans. Si fuerit albuginei defectus: indicat præsidium generans albugineum. Et si defectus foueatur à soluta vnitatis: patet quid indicet soluta vnitatis doctrina ulcerum.

Prognostica. Quoad prædictiones. c. 2. l. 1. de sym. caus. Angustia morifica est deterior dilatatione, ob defectum albuginei. At pro vi causæ efficientis augetur & minuitur in curatione difficultas. Vnde si malum fiat ob humiditatem: est minoris discriminis: si ob defectum albuginei, incurabile est malum: præsertim si defectus albuginei sit insignis: ægrius enim est humectare, quam siccare.

Curatio. Materiarum præsidiorum. Tantum proponemus topica. Si vitium sit ob rhagoeidis humiditatem: probantur siccantia: vt est collirium e iucia, felle, ruta, euphrasia, &c. Auic. hoc collirium maxime probabat: *℞. floris aru, ammoniaci an. ʒj. croci ʒß. aloes ʒiij. moschi. ʒß.* (Sed si ager erit pauper hic omittuntur:) excipiatur hoc medicamentum aqua feniculi, vel euphrasia.

Si malum prodeat è defectu albuginei: probatur humectantia, de quibus dicendum in sermone de sicciore crystallino. In presentia patere debet maxime probari *lac, & aquam dulcem*. Sed hæc admoueantur fronti & capiti: & quidem actu calida, ut caput attrahat alimentum à iecinore. Notandum autem Paulum oculis applicare medicamentum rarefaciēs, acre: Et ratio fuit: nam per rarefactionem suscipitur alimentum ab oculo: per acrimoniam attrahitur. Probabat igitur Paulus *medicamentum confectum ex ammoniaco, croco, arugine, tritum in aqua: ut propterea neque linctus oculi sit improbandus*. At his utendum cum prudentia, id est, usque ad oculi calorem, & leuem rubedinem: ultra enim, si quis progrediatur, alimentum attractu dissipabitur.

CAPVT XXXVII.

De Suffusione,



RER *ῥινορροια*, seu *ῥινορροια*, id est, suffusionem, seu aquam, vel cataractam, c. 6. l. 7. de plac. intelligimus illud malum, in quo foramen rhagoeidis obstruitur, ut oculi lumē cum externo aere, oculum ambiente, copulari nequeat. At cum suffusio sit vel Exquisita, vel Notha: in presentia exquisitam intelligimus, quoniam notha potest pertinere ad partes extra oculum. Verum ita loquemur de suffusione exquisita, ut nil desiderari possit, etiam causa nothæ. Generatur hoc malum, dum excrementum humorosum occupat oculum, ut rhagoeidis foramen ita obstruatur ut visio lædatur. Proinde suffusio legitima est obstructio foraminis rhagoeidis, procedens ab humore excrementitio. Forma est obstructio: ut etiam testatur Gal. c. 6. l. 7. plac. Et propterea Auicennas statuit suffusionem esse ægritudinem oppilatiuam. Sed notandum, Galen. c. 8. l. de diff. morb. statuere suffusionem esse morbum in numero: ubi respicit ad suffusionem completam, in qua materia morbifica est ita concreta, ut videatur veluti membrana, ut hinc particula addita videatur. At si capiatur suffusio, ut foramen redditur vitiosum: morbus est obstructio. Quare cum solum suffusio perfecta sit morbus in numero: quælibet autem suffusio siue perfecta siue imperfecta, sit morbus in via: huius ratione in finitione propoſita est obstructio. Subiectum est

Nomen.

Definitio.

Forma.

Subiectum.

est vnea, foramine prædita: vt Galenus loc. cit. fatetur.

Causa efficiens.

Spuria suffusio.

Causa efficiens est humor excrementitius: Auicennas vocat humiditatem extraneam: vt suffusio exquisita distinguitur à notha: notha enim fieri potest, vel à vapore, vel ab humore: & præterea ab humore non extraneo. Declaro: fit suffusio spuria à vapore, cum fiat à ventriculo, cum fiat à capite. A ventriculo c. 2. l. 4. de loc. aff. & c. 2. l. 1. de sym. caus. si enim vapor crudus à ventriculo sursum feratur, fiunt symptomata similia suffusioni, non exquisitæ suffusiones, sed spuria. A capite etiam suffusio fieri potest, quemadmodum Galen. dixit c. 2. l. 4. de loc. aff. dum inquit, in phrenitide succum biliosum in cerebro abundare, qui succus biliosus torrefit, & ex torrefacto hoc succo, prodit fumus, qui in oculos delatus symptomata suffusioni similia parit: vt propterea sit spuria suffusio. Præterea quoad suffusionem spuriam, vt fit ab humore: hæc etiam proponitur c. 2. l. 1. de sym. caus. Fit autem si humor albugineus ita vehementer crassescat, vt prohibeat visionem: veluti contingere solet in suffusione legitima: vt suffusio procedens à crassiore albugineo, sit spuria

Exquisita suffusio.

& minime deponenda. Cum autem legitima suffusio procedat ab humore extraneo: indagare oportet huius humoris extranei speciem, vitium, & causam generantem. Species est humor pituitosus: qui licet non semper sit albus, sed quandoque citrinus, quandoque niger: principalis tamen causa est pituita: vt pituita sit species humoris: bilis autem & melancholia dum concurrunt, rationem habent causæ adiuuantis. Quoad vitium: pertinet ad quantitatem: vnde dicebat Auicennas, materiam hanc excrementitiam ita copiosam esse, vt possit angustare totum foramen. Pertinet vitium ad qualitatem: vt materia est vel Tenuis, vel Crassa: vnde cum Paulo quandoque ita crassescit, vt membranam repræsentet. Sed præterea hæc materia vel est Fluxilis, vel Non fluxilis: vnde Galen. cap. vlt. l. 14. meth. dicebat, suffusionem fieri, quandoque ex humore seroso & fluxili, qui punctione euacuatur: (nō fit depositio, sed sensibilis euacuatio:) Ad hæc vitium esse solet in colore: vt materia est vel aërea, vel gypsea, vel citrina, vel nigricans, vel cineritij coloris, vel coloris albi, qui vergit vel ad colorem margaritarum, vel ad colorem aureum, vel ad glaucum, id est, viridem: quamuis suffusio sit vitium diuersum à glaucomate: vt statuit Galen. cap. 6. l. 10. de vsu partium. Vitium etiam attinet ad quietem,

dum

dum materia præter naturam quiescit : & cum Galeno c. 1. & 4. lib. 10. de usu part quiescit inter crystallinum & corneam, vt quiescat modo Inter albugineum & rhagoeidem, modo Inter rhagoeidem & corneam. Quoad vitium secundum motum : ratione materiæ fluxæ : dum materia est tenuis, & nondum firmata. Ratione non fluxæ materiæ : dum mouetur à termino à quo, ad terminum ad quem, per suum spatium. Terminus à quo, esse potest Extra oculum, & In oculo. Extra oculum : dum materia procedit vel à Toto, vel à Parte. In oculo, terminus à quo est oculus, secundum tunicas, vt tumor tunica degenerat in suffusionem. Spatium autem est, vt materia fluit per venas, per meatus etiam insensibiles : vt, dum lippitudo mutatur in suffusionem, nam materia mouetur per poros tunicarum. Terminus ad quem, patet è modo dictis de quiete. Quoad causam generantem : ratione agentis cum Auicenna esse potest ventriculus, & cerebrum : ratione materiæ ex qua victus pituitosus. Verum cum materia pituitosa non generetur concreta : concrescit quatenus diu manet in oculo, & potissimum (c. 2. l. 3. meth.) ex usu opiatorum.

Differentiæ ratione formæ. Obstructio est vel Integra, *Differentia*, vel Non integra. Ratione subiecti : semper est rhagoeides, secundum foramen suum. Ratione causæ efficientis : sunt capiendæ differentiæ à materia, vt differre potest, & Vitio, & Causa generante, vt modo dictum fuit.

Suffusio in genere cognoscitur è læsa visione : addebat *Signa*. Aëtius cum aliqua impuritate pupillæ. Suffusio autem exquisita, distincta cognoscitur à spuria : nam si à vapore notha fiat suffusio, & prodeat à ventriculo, cum Galeno cap. 2. lib. 4. de loc. aff. in primis vterque oculus æqualiter afficietur : contra in legitima. Secundo, si prodeat à ventriculo : si symptomata etiam per menses aliquot perdurent, pupilla tamen non conspicitur tenebricosa : contra in legitima. Præterea, si prodeat à ventriculo, symptomata visionis intermittunt : contra in legitima sunt perpetua. Insuper si fiat à ventriculo : si contingat, vt fiat perfecta concoctio in ventriculo, symptomata suffusionis non apparent : ac apparent, dum male habet ventriculus : vt ad augmentum & decrementum vitiourum ventriculi, augeantur & minuantur symptomata suffusionis : contra in legitima. Quoad spuriam suffusionem, vt prodita vapore capitis : cognoscetis *Cataracta spuria indicia*.
hanc

*Signa ex-
quisita suf-
fusionis.*

hanc ē signis phrenitidis. Quoad spuriam, vt procedit à cras-
sitie albuginei: hæc maxima cum difficultate distincta co-
gnoscitur: & necessaria est hæc cognitio: quia si sit notha, nō
licet deponere: in vanum cruciantur patientes. Cognosce-
tur igitur ē noxa æquali in visione: & ratio est, quia æquali-
ter vi crassi alimenti afficitur albugineus, non magis secun-
dum vnā partem, quam secundum aliam. Adhæc cum al-
bugineus non moueatur, & suffusionis exquisitæ materia
quandoque moueatur: dum afficitur albugineus, nec culices,
nec muscæ volitantes, apparent, quemadmodum in legiti-
ma. Quoad differentias: & primum ratione formæ, an ob-
structio sit integra, vel non: cognoscetis ē signis indicanti-
bus materiæ vitium secundum quietem: de quibus infra. Ra-
tione causæ efficientis, cum sit materia: si fuerit pituita, quæ
annexam habeat bilem, cognoscetis ē colore citrino: si an-
nexa sit melancholia, ē colore nigricante. Quoad vitium: co-
piofio rem materiam cognoscetis, ē vehementia symptoma-
tum: vnde turbulentia vehemens, indicat materiā copiosā.
Quoad qualitatis vitium: crassio rem esse cognoscetis, ē vi-
sione magis imminuta. Fluidam esse cognoscetis, si mouea-
tur ex oculi concussionē. Quoad colorem: color non eget
signo: ipse enim signum est, verbi gratia, color æreus signi-
ficat materiam fluidam: gypseus, materiā crassā non flu-
idam: citrinus, pituitam cum bile: nigricans, cum melancholia:
cineritius, pituitam priuatam aquositate: vergēs ad mar-
garitalem, pituitam quæ sit particeps diaphaneitatis, propter
portiones aqueas & aereas: vergens ad aureum, materiam
pituitosā, vt est particeps portionis igneæ, eiusque claræ:
vergens ad glaucum, portionem igneam, non ita purā.
Ratione quietis: cum Auicenna, si quiescat secundum totam
regionem pupillæ, denotabitur ē laesa visio, secundum to-
tum obiectum: si quiescat secundum partem, visus exacte
comprehendet, vel medietatem, vel partem obiecti, scilicet,
vt ait Auicenna, propter situm: vt, si materia resideat in pu-
pilla versus tempora, si patiens quid aspiciat ē regione tem-
porum, obiectum exacte non cōspiciet: si ē regione narium,
exacte intuebitur obiectum. Si vitium hæreat in media re-
gione pupillæ, obiectum perforatū apparebit. Vtrum enim
materia resideat, vel inter albugineum & rhagoeidem, vel
inter rhagoeidem & corneam: difficulter cognoscitur. At
iudicandum est, materiam residere inter rhagoeidem & cor-
neam:

neam: primum, si pupilla obtenebrata euentius conspicitur. Secundo, si à principio non apparuerunt culices volitantes. Contra, si colligatur materia intra albugineum & rhagoeidem: opposita apparebunt: & ratio est: quia dum materia residet inter corneam & rhagoeidem, non potest ita moueri, vt culices obseruari videantur: & quia materia magis proxima est oculis medicorum: ideo etiam obtenebratio pupillæ euentius conspicitur. Quoad vitium secundum motum: ratione materiae fluxæ, si moueatur materia, cognoscetis è visione obiectorum, quæ mobilia esse videntur. Ratione materiae non fluxæ: & primum ratione termini à quo: an sit totum vel pars, cognoscetis è propriis signis. Si autem sit oculus, cognoscetis è vicio præcedenti. Verbi gratia, si prægressa est lippitudo. Spatium autem & terminus ad quem, patet è multoties propositis: & similiter causa generans.

Quoad præsidia: cum Galeno cap. vlt. lib. 13. metho. causa contentiua ex vsu. est materia pituitosa: hæc igitur remouenda, vt non amplius obstruat. At cum plures sint vacuandi modi: nimirum vacuatio sensibilis, & insensibilis: & si insensibilis: per modum repercussionis, vel digestionis, vel transpositionis: in suffusione sensibilis vacuatio excluditur: nam suffusionis materia non est fluxilis, nisi fiat è seroso humore, quia in hoc conuenit vacuatio sensibilis. Excluditur repercussio: nam materia non cedit reprimentibus. Relinquitur ergo vacuatio per resolutionem & transpositionem. At cum materia resoluenda (quia frigida est crassa) non admittat resoluentia: ideo calefacienda & attenuanda: & ne impediatur transpositionem tenuitas, ideo est crassefacienda.

Suffusio modo facilius, modo difficilius superatur, pro differentiarum vehementia. Et potissimum, pro vehementia essentiae materiae morbificae secundum tenuitatem, crassitatem, & quietem. Nam dum materia est tenuis, potest euacuari: non autem crassa. Et ob id cap. vlt. lib. 4. meth. Galenus ait, Suffusionem incipientem digeri posse: vbi autem diu constiterit, non posse digeri: quia materia est crassior. Ceterum dum materia est crassa, & non cedit resoluentibus, vt vacuanda sit per modum transpositionis: scire oportet, quandoque transponi posse, quandoque non posse. Hoc pendet è vicio secundum crassitatem, & secundum quietem. Declaro: Quoad crassitatem: si patiens nec lumen cernat, quamuis

clauso altero oculo pupilla dilatetur, tum adest crassities, quæ non potest transponi. Quoad quietem: si materia quiescat inter albugineum & rhagoeidem potest transponi: si autem resideat inter rhagoeidem & corneam, non permittatis vt cheirurgi transponant, nec enim transponi potest.

Curatio.

Vena sectio.

Materia cheirurgica. Venæ sectio probatur causa sanguinis, vt hic concurrit tanquam causa sine qua non. Nam si materia suffusionis est resoluenda: calida applicanda, vnde sanguis attrahitur. Si materia est transponenda, dum materia transponenda est crassefacienda: tum improbat phlebotomia, hæc enim rarefacit, vt cum Auicenna noceat. At dum materia crassa est effecta, vt transponi possit, probatur venæ sectio, ne vi punctiōis sanguis affluat. Vfus sectionis

Sectio. venæ patet ex alibi propositis. Circa autem setaceum, quod applicatur infra occipitium, norandum: probari in suffusione incipiente, & dum institutum est deponere: nam vi setacei oculus liberatur à noua fluxione. Quantum attinet ad

Punctio.

punctiōem; ratione cuius sit depositio: hanc prohibet immoderata vel crassities, vel tenuitas item neruorum opticorum, & crystallini vitia, quorum vitiorum vi patiens neque lumen intueri potest, Quare dum sunt vitia in crystallino, & æger lumen intueri non potest: non est deponenda suffusio: nam quamuis materia optime deponatur, homo tamen visum non recuperat. Vnde hæc vitia prohibent punctiōem ex accidente.

Medicamenta ratione rationis.

Medicamenta Communia sunt & Propria. De communibus notandum: si institutum sit, materiam, suffusionis causam, insensibiliter vacuare: opus esse vt medicamentis euacuantibus totum, euacuantibus caput, & præparantibus, quæ omnia vim attenuandi habeant, vtamur: si autem institutum sit materiam præparare, non vt insensibiliter vacuetur, sed vt deponatur: oportet præparare cum calefacientibus, *verbi gratia cum decocto ex alica, meliloto, pineis, oryza, &c.* nisi visceris alicuius obstructio prohibeat. At si scopus sit materiam transponere: probantur medicamenta inhibentia inflammationem, quæ excitari posset propter punctiōem, à materia affluente: Vnde cum fluat materia, vt calida, vt tenuis: ideo probantur refrigerantia & euacuantia succos biliosos: quem in finem optimi practici exhibent potius cichoracea, quam enfragiam, potius rhabarbarum quam agaricum. Quoad medicamenta causa materię existentis in

oculo:

oculo si materia est vacuanda insensibiliter probantur calefacientia, & attenuantia, sed citra violentiam: Miscenda etiā emolliētia. Vnde cum hæc medicamenta & possint assumi, & possint applicari: quantum ad assumenda, probatur decoctum ē guaiaco, ē salsa, ē sassafras, ex enfragia, feniculo, verbenaca rella: & addatis radices althea (emolitionis gratia.) E quibus etiam medicamentis possunt pilule parari, exhibendo ante decoctum. Quoad applicanda: Galenus in fine lib. 4. x. rōn. probat selcum succo marrubij, & melle: probat myrrham & piper in aquali portione, cum melle. Probaturs succus feniculi, fel taurinum cum melle: applicatio item croci & piperis, in aquali dosi, cum felle taurino. Notandum vero differentias esse inter genera fellis: minus enim acre est fel piscium, magis acre vituli, deinde bonis, deinde tauri: ut acris sit fel animalium ē rapina viventium. Et propterea Rhasis conficit collyrium ē diuersis fellibus. Parari etiam possunt ex aromatibus. Quod si oculus permittat: potestis cum Rhasi ascendere ad collyrium ē sagapeno, euphorbio, colocynth. cum succo feniculi. Insuper ex his & similibus per distillationem parantur olea, quæ efficacissima sunt: & vos his uti debetis. At notandum Auicennam capite de cura visus debilis, cum calidioribus miscere stiptica, ut aquam rosa. quæ hoc in loco est materia remediij, indicati à calido innato, ut eius substantia dissipatur vi medicamentorum calidiorum, quæ & attrahunt, & possunt excitare dolorem. Omitto linctum oculi: & insufflationem in oculum: & alia: nam de his dicemus in sermone de albugine.

Quo autem ad medicamenta causa materię ut est deponenda: hæc est crassefacienda, ut possit deponi. Intrinsecus ergo probantur potius alimentalia, quæ præbent alimentum crassum: & oculo applicanda medicamenta confecta ē succo alica, oryza, ē pineis, cum decocto sanuigraci, cum aqua ros. & modico croci, causa penetrationis.

Dieta debet esse compar. Quare, si institutum sit materiam insensibiliter euacuare: dieta sit attenuans: vnde cibi condiantur aromatibus, feniculo: & puluis conficiatur ē feniculo, enfragia, cum saccharo & cinnamomo. Et patiens in prandio & in cœna, loco aromatum hoc puluere vtatur. Si autem materia sit crassefacienda, ut deponatur: probatur crassefaciens, & proinde paratus ē farre, alica, oryza, ē pedibus viculinis, ē casco recenti, ē pineis, ex omphacio, &c. Si autē pūctio sit

Medica-
menta ra-
tione ma-
teria in
oculo, va-
cūda in-
sensibili-
ter.
Interna.
Externa.

Incrassa-
tio mate-
ria, qua
deponi de-
bet,

visus ra-
tio.

vsurpanda: probantur cibi, prohibentes inflammationem: vt cibaria sint condienda refrigerantibus, sit abstinendum à vino, & præsertim per 5. vel 6. dies, post administratam punctionem.

CAPVT XXXVIII.

*De Sugillatione oculorum.**Nomen.*

VONIAM de affectibus oculorum egimus, qui potissimum spectant ad tunicam vel annatam, vel corneam, vel ~~magocidem~~: restat vt ea quoque persequamur vitia, quæ ad plures tunicas pertinent. Horum primum est Sugillatio, *ὀφθαλμική ὑπόσφαισις* seu *ὀφθαλμική αἱματὶς*, id est, suffusio sanguinis, quæ ab Avicenna vocatur Altarfati, ab aliis macula oculi. Per eam nos intelligimus malum, in quo cornea cum annata tunica ita afficitur, vt obiecta colorem ad rubeum vergentem præ se ferant. Generatur, dum venulis tum annatæ, tum corneæ occurrit causa, cuius vi sanguis egrediens, ita corneam tingit, vt rubicunda videatur.

Definitio.

Vnde sugillatio est color præter naturam corneæ, procedens à sanguine effuso è venulis tunicarum oculi. Forma est color præter naturam: nam visio læditur. Non proponitur in definitione, color rubeus: nam hic colligitur è causa efficiente, id est, sanguine: neque conuenit definitiones prolixas efficere. Forma ergo est symptoma attinens ad qualitatem visibilem, vt læditur visio ob errorem externum: præsertim quia sanguis non est causa tumoris, nisi sugillatio degeneret in lippitudinem. Subiectum est cornea: nam causa læsæ visionis est color corneæ, non annatæ.

Causa efficiens.

Causa efficiens est sanguis effusus è venulis tunicarum oculi. Vnde Galenus cap. 1. lib. 5. *κ. τόπ.* ait, sugillationem esse è genere effusionum: nam sanguis extra venas effunditur: Et Aetius proponit oculorum tunicas: nam vena pertinent etiam ad corneam, saltem secundum partem spectantem ad iridem. At cum sanguis egrediatur per anastomosen, diapedesin, & diarezin, secundum Avicennam, cum causa huius mali sit, vel Interna, vel Externa: quoad internam, est sanguis, qui pereat copia, vel caliditate. Si copia: sit effusio per *διάρρηξιν*, vena enim rumpitur: Si caliditate: sit effusio per *ἀνασφαισιν*: vnde Galenus loco cit. ait, raphanum mordendo

venarum

Venarum oscula aperire, vbi tangit anastomofin. Causa autem extrinseca, si concurrat, vt contunditur: fit effusio per diapêdesin: si vt rumpitur: per diæresin: & si immodice agat, ita vt immodice agitetur sanguis: per anastomofin.

Vnde ex his ratione formæ dicendum, colorem esse, vel *Differen-*
rubicundum, vel liuescentem, vel nigricantem: nam ilico *tie.*
post effusionem rubicundus apparet, mox concreescens liuescit, & tandem denigratur. Non capiuntur differentia à subiecto: nam semper est cornea. Quoad differentias ab efficiente causa est Interna, vel Externa.

Hoc malum in genere, & ratione differentiarum à forma patet. Ratione efficientis, an causa sit interna vel externa: audietis è patiente. Et si interna: signa sunt sanguinis vel copiosi, vel calidi, verbi gratia si copiosus sit sanguis, color erit exacte rubeus: si peccet caliditate, verget ad citrinum, & patiens sentiet caliditatem.

Præsidia porro considerantibus duo sunt perpendenda: *Indicatio-*
quorum alterum est. Sanguis effusus: alterum, Venarum vitia. *nes.*
Ratione sanguinis: cum sanguis effusus totus sit morbus: vacuandus. Ratione vitij venarum: indicatur remedium astringens: quod in diapêdesi debet esse densans: in anastomosi occludens orificia: in diæresi agglutinans.

Est autem de Galeni sententia loc. cit. hoc malum curabile: nam vaserum vitia sunt exigua: & sanguis effusus, antequam concreseat, facile vacuatur: secus si coeat & crassescat, magis enim à naturali recedit. *Prognostica.*

Vnde cum in curando liceat vti & discutiētibus & astringentibus: notandum circa Quando agendum, cum Galeno loc. cit. quantum ad astringētia, hæc probari dum adest præsentia indicantis astringens: & ob id Galenus in principio parum astringentium immiscebat, ne sanguis efflueret: *Curatio, per astringentia, & discutientia.*
Dum autem vena in suam naturam redierat, probabat Galenus sola discutientia. Discussientia autem cum sint & imbecillia & valentia: Galenus loc. cit. inter initia probabat imbecillia: fortia in antiqua sugillatione: nam in principio sanguis effusus facile dissoluitur, quia nondum in grumum est conuersus. Notandum vero circa validiora, ne hæc euadant causæ morbificæ, quoniam acriora possunt aperire orificia venarum, ita vt effundatur sanguis per anastomofin. His perceptis, facile intelligitur, cur Gal. cap. 1. lib. 5. n. 707. s. formæ oculum deest? sanugraci, & meliloti, deinde utatur collyrio è

rosis, & excipiat primum aqua, deinde decocto meliloti & sennæ graci: nam beneficio aqua inhibetur inflammatio: virtute autem meliloti & sennæ graci discutitur sanguis effluxus. Et superato vitio venarum, id est, astrictis venis, probat Galenus fomentum à solo sennæ graco: & probat spongiam insusam in melle: item collyrium à myrrha, cum decocto sennæ graci. Apparet igitur cur Galenus primum vtatur leuiter discutientibus cum astringentibus: mox sinteris discutientibus & validis. Et eandem veritatem cognoscens Galenus cap. 8. lib. 4. c. 16. probat sanguinem columborum insillatum à teneris pennis: nam leuiter discutit, & nonnihil astringit. Probat etiam inter initia oui album. Rhasis à colore persenerante probat oui album, cum vesaceo, inter iniuria. At postea Galenus accedit ad luteum seu vitellum oui, cum vino: ad melilotum cum vino: ad folia rosarum cum vino: quæ omnia leuiter discutunt & astringunt. Dum autem sugillatio producitur: ascendit Galenus ad thus, bitumen, comam hyssopi, natrum, myrrham, &c. Vnde Auicennas in contumacissima sugillatione ascendit ad medicamentum confectum ex una parte sinapis, & duabus saricarum. Antiqui enim confugiebant ad valentissima medicamenta, & sic curabant.

CAPVT XXXIX.

De Vngue oculi.

*Nota, πῶς
ov de qua
ra. 34. egi-
mus, etiam
vocari un-
guem: at
multū ab
hoc distat
afflictū.
Definitio.*

Forma.

Subiectū.



RE R αἰγούριος, seu vnguem, seu vngulam cum Auicenna, intelligimus malum, in quo tunica annata tegitur à substantia carnea, vt lædatur visio. Et quanuis ferme omnes satis leuiter in hoc malo explicando procedant: nos tamen hoc negotium accurate, sed breuiter perscrutabimur. Generatur, dum vegetali facultati, ad oculorum angulos attinenti, luxuriandi datur occasio: vt è sanguine generet carnem, & ita carnem augeat, vt non modo annatæ tunicæ adhæreat, verū etiam corneæ, vt è directo cornea respicit crystallinum, vt lædatur visio. Vnguis igitur est numerus præter naturam auctus oculi: procedens à carne adhærente tunicis oculorum externis. Forma huius vitij est numerus præter naturam auctus. Vnde Gal. in fine lib. 14. metho. iure dixit, pterygion visui officere: Sicuti etiam statuit c. 2. l. 1. de sym. cau. Vnde dicebat Auic. vngulam esse additionē coniunctiuæ. Subiectum est

est

est oculus: quoniam cum Gale. c. 2. l. 1. de symp. cau. in pterygio pupilla non ex accidente, sed primaria ratione obtinebratur, ut per se sit morbus totius oculi, ex accidente membranarum. Ut per pterygion intelligere oporteat morbosum, in quo auctus est numerus, ut attinet ad plures partes.

Causa efficiens est caro adhærens tunicis externis oculi. In primis hoc malum procedit à carne. Et à carne procedens, constat esse morbum in numero, sed non toto genere præter naturam: ad differentiam calculi, & ad similitudinem sexti digiti in manu, ut docuit Galenus in fine lib. 14. meth. At hæc substantia non est seminalis, sed sanguinea, nimirum substantia carnea, quæ potest esse particeps venarum, ut venæ sunt germina venarum annatæ tunicæ. Vnde, dum Paulus ait, pterygion esse neruosam excreſcentiâ: ita loquitur, quoniam illa caro est admodum similis substantiæ membranæ. Et ob id Rhafis ille doctissimus ait, in vngue esse substantiam panniculo similem. Vnde & Aëtius satis proprie loquens, inquit: pterygion fieri carne crescente. Et hinc malum hoc distinguitur à Sebel Arabum, de quo Græci non fuere locuti: & fortasse causa fuit, quia eodem modo curatur ut vnguis. Distinguitur igitur à Sebel: nam Sebel est morbus in numero, procedens à substantia venosa: (non carnosa) ut Rhafis dixerit, esse veluti panniculum, contextum è venis rubris, crassis, id est, repletis: ubi enim venæ sunt rubræ & crassæ, sunt repletæ. Auicennas ait has venas ita contextas, conspici etiam in superficie corneæ: nam aliter visio non læderetur. Incrementum autem venæ suscipiunt, quia tunicæ annatæ venæ extenduntur: nam cum hæ venæ sint tenues: emanat fumus visionem lædens: & secundum Auicennam prodit hic fumus è venis repletis, à materia fluente, per vasa, vel intra cranium, vel extra. Verum cum in pterygio mali causa præcipua sit substantia carnosa: duo sunt consideranda: scilicet agens, & materia è qua generatur caro. Agens est alteratrix, per vim auctricem, residentem in carne pingui, pertinente ad angulos oculorum, & frequentius ad interiores angulos: ut dixerit Aëtius raro prodire à paruis angulis, etsi interdum etiâ possit incipere, à palpebra & superna & inferna. Cæterum ut descendamus ad hic & nunc: ubicunque incipit agere alteratrix, residet in carne, ut alteratrix per auctricem, virtute tēperaturæ & calidi innati carnis, carnem augeat: ut cum Aëtio ita augeat, ut quandoque

Causa efficiens.

Sebel quid.

extendatur ad vsque nigrum oculi. Verum alteratrici facultati datur occasio, vt vltra terminum naturalem carnem extendat, cum Aëtio: quoniam vi vel lippitudinis, vel assidue fluxionis, caro affecuta est scabritiem, seu inæqualitatem: vnde dum natura seu alteratrix scabrosam carnem æqualem reddere nititur, augmentum morbosum parit. Quoad materiam è qua: principalis, est sanguis. Nam caro & pinguis, & non pinguis, è sanguine generatur. At cum sanguine misceri potest materia excrementitia: vt hinc pterygion generetur, modo durum, modo molle, variorum colorum: prout materia, alia à sanguine, concurrit, vt adiuuans, quia sanguis est principalis.

Differētia. Differētiæ potissimum à carne sunt desumendæ. Oportet igitur perpendere, cum Auicenna & Aëtio, causam Generantem carnem, & Carnem genitam. Causa generas pertinet ad Angulos, vel ad Palpebras, A carnis genitæ vitio capiuntur differētiæ. Si enim vitium attineat ad substantiam: dicendum carnem esse vel Putridam, vt est cancrosa: vel Non putridam. Quoad vitium ratione quantitatis: caro est Longa vel Breuis: Angusta, vel Lata: Tenuis vel Crassa: Sic enim omnes quantitatis dimensiones consideramus. Vitium in qualitate: caro est Dura vel Mollis: Alba, aut Rubescens, aut Citrina, aut Nigricans. Quietis vitium: caro est Magis vel Minus hærens.

Signa. Malum hoc est vsque adeo euidens, vt non egeat signis. Scire autem oportet cum Aëtio, pterygion cancrösium cognosci, è carne crassa, dura, euerfa, eminente, nigricante: & tempora per consensum afficiente.

Indicationes.

Porro cum Galeno cap. vlt. lib. 17. metho. caro hæc morbofa indicat remedium remouens carnem. At cum vacuationis modi sint plures, vt euacuatio esse possit vel Insensibilis, vel Sensibilis: si caro sit parua, & mollis: medicamentis insensibiliter vacuantibus occurrēdū. Si vero sit magna & dura: materia sensibilibiter vacuante est occurrēdum, id est, materia cheirurgica. Sed hoc est extra methodum: nam è medendi methodo indicatur remedium carnem adimens: è methodo medicamentorum scimus medicamenta posse adimere carnem exigua & mollem, non magnam & duram: è methodo materiæ cheirurgicæ docemur, ferrum carnem & magnam & duram posse vincere: è methodo pathologica addiscimus in carne esse eam vim, vt exigua & mollis cedat

cedat vacuationi insensibili: non autem magna & dura.

Hoc malum in genere, causa visionis, est vitium non despicendum: sed vario modo prognosticandū, pro vario carnis vitio. Quod si ergo caro sit putrida & canerosa: cum Aëtio malum est incurabile: Nam cancer habet radices, quæ non possunt euelli: vnde adest insignis vehemētia. Si autem caro sit copiosior: difficilius vincitur. Et cum Aëtio facilius curatur albicans: difficilius rubea vel citrinata: in quibus videlicet periculum imminet, ne à medicamentis fiat inflammatio: difficilius est curationis, si nigra: nam causa melan- choliæ est dura. Adhæc ut magis hæret, ita etiam difficilius curatur. Aëtius addebat, pterygion interdum vtile esse, dum scilicet suffusio est in principio, nam materia mutatur in vnguem: vnde aiebat Aëtius, pterygia, in quibus sunt principia suffusionis, non esse curanda.

*Prognost. 1
ca.*

De materia cheirurgica, ratione oculi Aëtius ita clare loquitur, ut non egeat explicatione. At post cheirurgiam, hoc est, post carnis detractiōem cum ferro, probantur medicamenta, quæ prohibent tunicam annatā palpebris adhærere: probantur quæ possunt prohibere inflammationem: & quæ portionem à ferro relictam extirpant. Vnde ad prohibendū coniunctionem cum palpebris: Aëtius probat *muriam acrem, aquam salitam, quæ infundit in oculum: Auicennas probat cyminum mastigatum cum sale: inbetque agrum frequenter oculos mouere, nisi dolor prohibeat.* Ad inflammationem arcendum, Auicennas applicat lanam ouo imbutam. Tandem ad carnem derelictam eradicandum, proponit *collyria acris, post tres dies: ne fiat inflammatio. Collyria acris quæ sint, alias audiistis. Et cum Galeno cap. 2. lib. 4. κ. τό π. ascendendum ad collyrium ex equali portione atramenti sutorij, id est, chalcantibi, & salis ammoniaci, & dimidia parte gummi, quæ excipienda aceto. Vos confugere potestis ad oleum ex chalcantho, sed correctum cum lacte.*

*Curatio,
post ma-
nualem
operatio-
nem.
Ca. 60. l. 7.*

CAPVT XL.

De Albugine.



RE albuginem, seu *αἰμάμα*, intelligimus albuginem exquisitam, ac proinde vitium in quo vi cicatricis, præsertim corneæ, læditur visio: & hoc malum etiam dicitur Cicatrix. Generatur dum post vlcus corneæ sit cicatrix, ut cornea & crassa & densa ita

Nomen.

cicatrificans abest: capienda igitur à præsenti, nimirum ab effectu causæ cicatrificantis: Effectus est exsiccatio corneæ, pororum densitas, corneæ crassities: quare oportet humectare, aperire, attenuare.

Vitium hoc vix prorsus auferri potest: siue sit exquisita albugo, siue notha. In tlla enim corneæ substantia est mutata in cicatricem, vt plurimum consequamur, si minuatur cicatrix, quò minimum visioni officiat. In notha, si è scirrhus sit, arduum est superare scirrhum: si à pituita imbibita, vinci quidem potest, si materia non sit vehementer impacta. Et addamus, si cornea afficiatur morphæa, nil aliud polliceri licet, quam coloris mutationem per tincturam. Cæterum ad exquisitam, quod attinet, prognosticum variat, pro viderentur differentiarum: dura enim peior est: si summa durities, incurabilis est: vnde Aëtius inquit, non opus esse cicatricem callosam curare: & Rhafis ait, in pueris albuginem esse mitiorem: quia in adultis est siccior: non autem quia in infantibus cornea possit regenerari, vt quidam scripserunt: nam idem ob hanc causam in adultis cicatricem non curari statuit, nisi tenuissima sit: vt curatio non pendeat è generatione corneæ. Præterea, albugo crassior est deterior: magis enim recedit à naturali statu. Vt, si albugo sit & dura & crassa, non liceat curam aggredi, secundum Aëtium. Item, profunda est peior: nam vehementior ratione dignitatis: nec medicamenta tam facile possum malum attingere. Cæterum ne frustra fiat descensus ad materias præsidiorum: perpendere etiam oportet mala, quæ simul lædunt cum albugine: vnde Aëtius inquit, si fuerit suffusio, aut glaucedo: vanum esse cicatricem absumere.

*Prognostici
ca.*

Medicamenta topica pertinent, vel ad artem curatricem, vel ad artem exornatoriam, veluti albuginem tingentia. Quæ prioris sunt generis, alia humectant cicatricem, vt facilius attenuetur: alia attenuant. At cum Aëtio excoriantia seu exulcerantia, vitanda: cicatrificant enim & cicatricem reddunt crassiozem. Vsurpanda igitur medicamenta, quæ probantur siue sit effusio, siue albugo, tum legitima, tum spuria. Hinc Rhafis probat vaporem aqua dulcis calide, vsque ad oculorum rubedinem. Vos vti poteritis hoc medicamento: R. foliorum malua, rad. alth. fanugraci seminis ana P. j. aqua tibiij. fiat decoctio, pro vapore. Deinde facta hac euaporatione, vtendū hoc medicamento: R. thuris igniti, & mox in decocto fanugraci

Curatio.

*Humectantia,
& attenuantia
cicatricem.*

exstincti

exsiccatis ꝓ i. croci ꝓ j. muscilaginis fanugraci ꝓ v. Misce pro collyrio. Eiusdem fere classis hoc est: ꝓ pompholygis lota ꝓ j. mirrha ꝓ ꝓ. croci ꝓ v. muscilaginis fanugraci ꝓ iij. Misc. Validius erit medicamentum si conficiatur i fellebus, & praesertim i felle galli antiqui, vel animalium i rapina viuientium: Et si correctione opus erit, addatis muscilaginem fanugraci. Efficax est medicamentum ab Auic. propositum. Verbi gratia, ꝓ alcyonij loti, sarcocolla lota, ana ꝓ ꝓ. sacchari candi ꝓ ij. fiat puluis, & excipiatur decocto fanugraci. Adhuc ꝓ succorum depuratorum feniculi, ruta, anagallidis, chelidonia mai. an. ꝓ ꝓ. rutia, sylvama aris, aloes ana ꝓ ꝓ. mellis ros. muscilag. fanugraci ana ꝓ j. Et si desideretis validius hoc medicamentum pro qualibet olynrij drachma addatis guttam olei destillati, vel i cinnamomo, vel i feniculo. Si plura desideretis, videatis Galenum c. 7. & vlt. l. 4. α. τ. ρ. Rhasis proponit vnum medicamentum, quod alia superat, vt vincat etiam cicatricem brutorum: ꝓ chelidonia, feniculi ana ꝓ x. aqua lb iij. fiat decoctio ad consumptionem trium partium, deinde cola: postea adde vitri non perfecti decocti, alcyonij stercoris stellionis, salis mineralis, sacchari albi ana ꝓ j. Ha species infundantur in praedicto decocto, mox siccantur: rursus infundantur, & rursus siccantur: vt postea in oculum possint immitti. Et notetis, quamuis i propositis medicamentis quaedam habeant vim astringendi, probantur tamen in albugine contumaci: nam astringentia ob crassam substantiam, sunt in causa, vt medicamenta diu persistant, & hinc magis agant. Et notetis, si forte sit albugo non exquisita, siue ex scirrho, siue i pituita imbibita, siue etiam sit incipiens suffusio: admirabile esse medicamentum, si perforetur arundo feniculi in horto a nodo ad nodum, & foramen repleatur sale minerali & saccharo, & deinde cera occludatur, & per noctem detineatur, & mane extrahatur liquor: vt liceat huius liquoris guttam in oculum immittere. Et si legitima sit albugo: addatis puluerem gallarum immaturarum ad saccharum & sale, in arundinem. Et si albugo sit notha: addatis euphragiam. Similiter probatur arundo ebuli: & fiet efficacius medicamentum: praesertim si foramen repleatur colocynthide. Probatur etiam liquor i pane salito, cum marathro & colocynthide: & vocant aquam panis. Postremo admirabile est hoc medicamentum: ꝓ frumenti viridis lb j ꝓ. seminum fenic. lb ꝓ. salis mineralis ꝓ ij. foliorum ruta, enfragia, fenic. chelidon. saluia, marrubij, cucumeris agrestis, salicis, ana M. ꝓ. sem. fanugraci, ruta, ana ꝓ ij. cinnamomi, caryophyllorum ana ꝓ j. ꝓ. croci ꝓ ij. colocynth.

34. Incidantur herba, contundantur semina, & infundantur in vino aromatico, ea quantitate, ut supernatet, & immittantur omnia in vas areum, foramine ocluso, & vas exponatur Soli per triginta dies, & frequenter misceatur: deinde fiat destillatio, & seruetur ad usum, Hæc gratia curationis.

Quoniam vero nonnunquam reperiuntur sceminae albugine detentæ: necessarium est confugere ad artem exornationis, ut albugo tingatur: accirco probatur caro mali punice dulcis, quæ conterenda est, & modica aqua instillanda in oculum: Et huiusmodi etiam aqua albugo est fricanda. Deinde accipiat succum hyoscyami, & illinat albuginem per 15. dies. Hoc enim est medicamentum, quod & tingit albuginem, & dissipare etiam potest.

*Albuginem
tingentia.*

CAPVT XLI.

De Epiphora.



EX PEDITIS vitiis attinentibus ad runcas: dicendum de malis angulorum. Sunt autem epiphora, rheas, encanthis, & ægilops. Epiphoram Auicennas vocat lacrymam, Celsus pituitæ cursum: per eam vero intelligimus malum, in quo assiduo pituita destillat in oculos, ut cum Auicen. & Rhasi, oculi aquosa humiditate perpetuo sint repleti: ut intelligere hic oporteat lacrymam morbosam, non voluntariam. Generatur, dum (cum sit species catarrhi:) cerebro occurrit causa præter naturam, vi cuius frustratur vis naturalis cerebri, ut à cerebro excrementum aquosum fluat præter naturam in oculos. Epiphora igitur est excrementum serosum, affligens oculum, procedens à frustratione alteratricis cerebri. Forma huius vitij est excrementum serosum affligens. Quod cognoscens Auicennas, dicebat, oculos in hoc malo semper humidos esse humiditate aquosa. Additum fuit affligens, id est, lædens oculos: nam modo hoc excrementum nocet angulis, modo visionem turbat: & hac ratione epiphora seu lacryma morbofa, distinguitur à lacryma voluntaria: in qua excrementum serosum, sed sincerum, & citra oculi noxam, per oculos egreditur. Verbi gratia, in mœstitia per modum compressionis: in lætitia per modum dilatationis: sicuti etiam vi iræ persecrantis. Vnde, ut epiphoræ forma pateat, explicare oportet

Nomen.

*Definitio.
Forma.*

sero si

*Excrementis
serosi cōsi-
deratio.*

serosi humoris speciem & vitium : nam causa generans pa-
tebit in causa efficiente. Quoad speciem igitur, est materia
serosa : quare excrementum tenue, quod generatur in ven-
triculo : & excrementum, quod defertur in caput, vt est ali-
menti vehiculum : & sicuti in caput defertur alimentum co-
piosum, ita etiam opus fuit copioso sero. Vnde in epiphora
excrementum serosum est materia principalis & necessaria.
Est materia principalis : quoniam cū serositatem misceri potest
materia non principalis, vt materia biliosa, pituitosa : sed in
exigua copia. Miscetur autem quandoque materia principa-
lis, at non necessario : dum cum serositatem miscetur excre-
mentum pituitosum, sed copiosum : vt materia principalis
in hac epiphora sit mistum cū sero & pituita : ac pituita, quam-
uis sit causa principalis, tamen non est causa necessaria : quo-
niam excrementū serosum locum habet in omni epiphora :
non autem pituita. Species igitur est vel Serum, vel serum
cum pituita Mistum. Quoad vitium, attinere potest ad Sub-
stantiam, Quantitatem, Qualitatē, & Vbi. Ad substantiam : si
materia putrescat, vt in epiphora salsa, in epiphora è lue ve-
nerea. Ad quantitatem vitium attinet : vt copia excedit. Ad
qualitatem : vt materia est vel calida, vel frigida, vel liquida,
compacta, viscida : salsa, acris, vel harum qualitatum expers.
Præterea esse potest albicans, vel flauescens. Quantum atti-
net ad quietem : quiescit vel non quiescit in oculo : & ideo
Auicennas ait, quandoque currere lacrymas. Quoad vitium
in motu : ratione termini, à quo, quamuis possit procedere
& à Toto, & à Parte : terminus tamen principalis est cere-
brum, & igitur ait Auicenn. principium epiphoræ esse ce-
rebrum. Cerebrum autem euadit terminus à quo : vt mate-
riam vel Non detinet, vel Expellit. Non detinet : dum vi
Frigiditatis exprimitur, dum vi Caliditatis colliquatur. Ex-
pellit autem, dum expultrix facultas, vi vel Copiæ vel Qua-
litis ad expellendum insurgit. Spatium in motu, potest es-
se Externum, dum materia fluit per venas extra cranium
potest esse spatium Internum, si fluat materia non per ner-
uos opticos, sed per vasa intra cranium. Terminus ad quem
est oculus, secundum angulos : vt vel suscipit, vel attrahit.
Suscipit ob imbecillitatem : quæ pendet ab intemperie, si
oculus sit humidior : pendet à mala compositione in via, si
oculi substantia sit rarior : pendet à morbo in numero, si ca-
ro lacrymalis desideretur. Quæ sane causa iam proposita,

ante

ante ortum sunt causæ imbecillitatis natiuæ: post ortū sunt
 causæ imbecillitatis accititiæ. Oculus autem attrahit, vi vel
 Doloris, vel Caloris. Subiectum est oculus: in epiphora enim
 læditur oculus. Vt autem iuniores addiscant terminos huius
 artis, sciant: si oculus consideretur, vt vel suscipit, vel attra-
 hit, habere rationem termini ad quem: si autem consideretur
 vt læditur, habere rationem non termini ad quem, sed sub-
 iecti: & propterea non sumus superflui in sermone nostro.
 Causa efficiens est frustratio alteratricis cerebri: principium
 epiphoræ secundum Auicennam est cerebrum. Qua ratione
 autem alteratrix frustretur: dictum est cap. 27. in serm. de
 catarrho.

Subiectū.

Causa ef-
ficiens.

Differentiæ à forma: Excrementum serosum est Since-
 rum, vel Mistum: vel Hoc, vel Illo modo peccans. A subie-
 cto: oculus læditur, vel secundum se Totus, vel secundum
 Angulos. A causa efficiente prodit malum à cerebro, vi vel
 Morbi, vel Errori externi, vt in catarrho.

Differentia.

Epiphora in genere patet. Ratione formæ: excrementi
 species, & excrementi vitia sunt notissima è traditis in sermo-
 ne de catharro. Ratione subiecti: vtrum oculus afficiatur,
 vel secundum se totus, vel secundum angulos, oculis facil-
 lime conspicietur. Ratione causæ efficientis repetenda erunt
 signa, è doctrina de catarrho.

Signa.

Multis suppositis, indicatis in sermone de catarrho, cum
 Galeno c. vlt. l. 13. meth. in epiphora excrementum secundum
 speciem indicat remedium determinatum, secundum vitium
 indicat contrarium. Et similiter ratione causæ efficientis: si
 fuerit intemperies capitis, indicat alterans contrarium: vt in
 sermone de catarrho dictum.

Indicatio-
nes.

Hoc vitium non prorsus est incurabile. Vnde Galenus ait:
 cap. vlt. lib. 13. meth. diurnas etiam fluxiones fuisse curatas,
 oculis dimissis. At pro vi differentiarum, epiphora est incu-
 rabilis, curabilis, facile vel difficulter. Vnde, si perpendan-
 tur differentiæ ratione formæ, ratione speciei: difficilius
 malum vincitur, si excrementum sit mistum ex seroso, &
 pituitoso, quia magis recedit à naturali statu. Si vitium per-
 pendamus: malum est magis perniciosum, si excrementum
 est putridum, copiosum, si viscidum, calidum, salsum, si hæ-
 ret: & peius etiam est, si caput concurrit vt terminus à
 quo, si materiam non detinet, veluti contingere solet, dum
 homo est mortis vicinus. Præterea est difficilioris curationis:
 si mate

Prognosti-
ca.

si materia fluat per vasa recondita: vt testatur Galenus cap. vlt. lib. 13. meth. Difficilius etiam curatur, si oculus suscipiat, quam si attrahat: & si suscipiat ob imbecillitatem natiuam, malum est incurabile: præsertim si imbecillitas pendeat è defectu carnis lacrymalis: nam hac deficiente, etiam post ortum, malum incurabile est. Ratione causæ efficientis: si contingat, vt cerebri intemperies sit in habitu, non debetis polliceri perfectam curationem.

Curatio.

Vena se-
ctio.

Materia. Notandum circa cheirurgiam, è cap. 8. libr. 4. x. *τὸν*. si augetur fluxio accedatque dolor, venam esse secandam. Sic Galenus intelligendus, quod venæsectio dirigatur ad sanguinem, quatenus vi doloris fluit, vt immineat inflammatio, ideo venæsectio à Galeno proposita est materia

Topica.

1. Inter-
ceptiva.

remedij reuulsorij: præsertim cum ibi loquatur de epiphora in corpore quod eget purgantibus, id est, cacochymo. Medicamenta Galenus loco citato applicat vel fronti & temporibus, vel oculis. Quoad priora, potissimum ea probantur, si materia fluat per vasa externæ: quoniam materiam morbosificam, per modum interceptionis retrahunt. In epiphora calida, licebit vti hoc medicamento: *℞. ros. rubrarum, myrtillorum ana ʒj. bol. Armen. sang. Dracon. ana. ʒij, hypocist. succi plantag. ana ʒijß. gallarum immat. ʒj. excipiantur oui albo: & penetrantis gratia, exiguo aceto. Et in hac epiphora calida non applicetis hoc medicamentum cum panno rubro, sed lineo panno, tenui, infuso in aqua rosacea. Et si epiphora sit frigida: probatur lana infusa in vino astringente: item hoc probatur medicamentum: *℞. Gallarum immat. nucum cupressi, sang. Draconis, ana ʒj. croc. i horten. ʒj. excipiantur vel tragacantha, vel resina: & panno laneo, prope oculos admoneantur. Medicamenta autem**

2. Ad-
stringentia, &
citra mor-
sum siccantia.

quæ ipsi oculo sunt applicanda: proponuntur à Galeno cap. 8. lib. 4. x. *τὸν*. Quare in epiphora calida, & in frigida, probantur adstringentia, præsertim inter initia: probantur siccantia, quoniam absumunt materiam, sed ea sint citra morsum: & interdum refrigerantia, si materia sit acris. Vnde in epiphora calida probatur pannus lineus tenuis, madefactus albo oui, vel aqua rosacea, vel vino granatorum. Si morsus urgeat, si impetus vrgeat: decoquantur melilotum, & capita papaueris in aqua rosacea. Et dum remissus est feruor, sed præseferat pruritus: Auicennas probat puluerem, prodeuntem è frictione mirobalanorum cum aqua ros. Si epiphora sit frigida, probatur tintia infusa in decocto meliloti, vel in vino passo, deinde in

aqua

aqua cupressi, & postea in aqua maiorana, vel prussij, præsertim feniculi, & eufragia: quibus addatis myrrham, crocum, aloem. Et potissimum probatur aqua virga aurea, in qua illius exstinguatur ignis. Et tandem in contumaci epiphora cum Galeno c.7. lib.4. *κ. τ. π.* R. cadmie ʒ j. fructus orice ʒ j. aris vsti & losi ʒ ij. myrrha ʒ β. acacia ʒ iij. gummi ʒ β. & seruetur ad usum. Et si hoc medicamentum diu, id est, ultra annum est seruandum, addatur ʒ j. opij.

CAPVT XLII.

De Rhoede.



RHOEAS vel Rhyas, cum quandoque oriatur vi epiphoræ: iam de ea dicendum est. Perrhoeadem autem quam Auicē. vocat diminutionem carnis lacrymis, intelligimus illud vitium, in quo deficit oculi caro, quæ cum Gale. cap.11. lib.10. de vſu part. residet in angulo maiore, vbi foramen est ad nares peruium, quod foramen hæc caruncula claudit, ne excrementa per oculorum angulos euacuentur: & hinc assiduo lacrymari videamur. Genefatur, dum occurrit oculo causa morhifica, vi cuius caruncula lacrymalis ita afficitur, vt eius substantia deficiat. Vt rhoeas sit quantitas deficiens anguli maioris, procedens à caruncula lacrymali, secundum quantitatem deficientem; Colligitur hæc finitio ex Auic. & Galeno c.16. lib.14. metho. med. Forma est quantitas deficiens: per quantitatem intelligimus Continuum & Discretam: continuum, dum sit imminutio carnis: discretam, dum prorsus deficit: vt primum vitium sit magnitudo imminuta: alterum numerus deficiens. Subiectum est oculus, secundum angulum maiorem. Causa efficiens, est caruncula lacrymalis, vt deficit secundum Quantitatem, vel secundum Partem, vel secundum se Totam. E sententia autem Græcorum & Arabum, hæc caruncula afficitur vel A primo ortu, vel Post: & si post, afficitur vel à causa Interna, vt à succis acribus, quemadmodum in epiphora: vel ab Externa, vt à medicamentis acrioribus, à ferro incidente, dum in cura pterygij vel ægilopis, errores à cheirurgis committuntur.

Nomen.

Definitio.

Forma.

Subiectum.

Causa efficiens.

Differentiæ à forma: vitium est in quantitate deficiente vel Continua, vel Discreta. A subiecto: malum est in oculo

Differentia.

vel Dextro, vel Sinistro, vel Vtroque. Ab efficiente: causa est vel Natiua, vel Afficitia.

Signa. Est autem Vitium hoc prorsus notum, & secundum genus, & secundum differentias: non ergo opus est signis.

Indicatio- Quoad praesidia: c. 16. l. 14. metho. Caro deperdita indicat
nes. praesidium, regenerans: imminuta, augens carnem.

Prognosti- Si caro prorsus sit deperdita, vitium est incurabile: nam
ca. haec caro est spermatica, nec potest regenerari. Si autem sit imminuta: curationem admittit: cum foramen ocludi possit. At notandum (vt distinguamur ab empiricis) cum haec caruncula sit nervosa & carnea, & proinde sit pars partim seminalis, partim sanguinea: secundum partem sanguineam incrementum eam admittere, non autem secundum partem seminalem: Quamuis liceat aliquantisper similem efficere carnem, vt praestet eundem usum, hoc est, vt foramen ocludat, perinde ac si similis generetur.

Curatio. Materia. Galenus cap. 6. lib. 14. metho. videtur proponere duplicis classis medicamenta: primum mediocriter astringentia: deinde ea quae glaucio parantur, & croco, & quae nardina vocantur, & vino confecta. Vnde dum portio sanguinea regeneratur, probantur mediocriter astringentia: dum genita est, vt reddatur similis carni nervosae ac seminali, probantur magis astringentia, vt collyria nardina, quae conficiuntur e gallis immaturis, & aliis valide astringentibus: hinc Paulus etiam probat alumen cum vino. Quare pro generatione carnis probatur vinum cum resis & exigua croci: pro carne genita, vt reddatur compacta, id est, similis seminali, probatur vinum astringens, cum gallis, aloë, & exiguo alumine. Vt in hoc malo primum sit vtendum agglutinantibus, mox cicatrisantibus. Vnde notetur differentiam esse inter generantia carnem in vlceribus, & inter generantia carnem lacrymalem: nam in vlcere probantur siccantia, detergentia, citra astrictionem, ne crassum excrementum cohibeatur: at in generatione carnis lacrymalis, cum debeat generari caro sanguinea, similis nervosae, opus est magis siccantibus, quam ea sunt quae conueniunt in generatione carnis in vlcere. Haec magis siccantia, ita absument excrementa, vt medicamenta astringentia nullam inferre noxam queant.

De Encanthide.



RHOEADI opponitur Encanthis: Auicēnas vocat additionē carnis lacrymalis. Per hanc intelligimus illud vitium, in quo caro lacrymalis suscipit incrementū, vt quandoq; palpebræ diduci nequeant. Generatur, dum alteratrici carnis occurrit causa, vi cuius alteratrix ē sanguine portionem carnis sanguineā maiorem reddit, quam deceat. Vt encanthis sit magnitudo aucta carnis lacrymalis, dependens à portione sanguinea aucta præter naturam. Forma huius vitij est magnitudo aucta: quæ quandoq; est morboſa, ſi cum Auicē. lædatur viſio. Subiectum proximum, eſt caro lacrymalis; hæc enim iuſto maior redditur. Remotum ſubiectum eſt oculus, ſecundum angulum maiorem, vt hic angulus ſedes eſt carnis. Vnde ſi lædatur viſio, ſtatui ſubiectum poteſt non modo angulus, verum etiam oculus. Cauſa efficiens eſt portio ſanguinea præter naturam aucta. Vnde cum caro augeatur ſecundum propriam ſubſtantiam ſanguineam, vt non gignatur noua caro, quæadmodum in prærigio; deo *πρεβύς* eſt morbus in numero: encanthis autem eſt morbus non in numero, ſed in magnitudine aucta. Cauſa autem eſt ſanguis fluens in maiori copia in venas, ſed citra violentiam. Nam ſi violenter flueret, fieret inflammatio, non encanthis. Fluit autem poſſiſſimum per modum tranſmiſſionis, vt hepar mittit ſanguinē copioſiorē: quamuis etiā concurrere poſſit attractio, ratione immoderatæ caliditatis ipſius oculi: vt euenire poteſt cauſa dulcis aquæ tepidæ, ſi huius uſus ſit immoderatus.

Differentiæ à forma. Magnitudo aucta eſt Morbus, vel Symptoma. A ſubiecto: afficitur angulus maior oculi Dextri, vel Sinistri, vel Vtriuſque. Ab efficiente: caro eſt aucta vel Magis, vel Minus.

Eſt autem hoc vitium omnino notum: nec ſignis eget.

Cum Paulo portio ſanguinea aucta, minuenda.

Curabile eſt hoc malum: nam caro adimi poteſt.

Materiæ. Auic. probat materiam incidentem, & cheirurgicam. At monet, vt non radicitus incidatur, ſed ſolum pars aucta: nam alias fieret rhoeas. Expediſt autem ad inciſionem confugere; ſi non exigua eſt carnis excreſcentia, nam oculus melius ſuſtinet inciſionem, quam medicamenta conſu-

Nomen.

Definitio.

Forma.

Subiectū.

Cauſa efficiens.

Differentia.

Signa.

Præſidia.

Prognostica.

Curatio.

I. Inciſio.

*a. Cathare-
tica medi-
camenta.*

mentia carnem frequenter applicata, quia excitant dolorē. Expedit autem post incisionem *oui album diligenter agitatum aqua ros. oculo applicare*, vt prohibeatur inflammatio. At quoad medicamenta, quæ loco ferri carnem absumunt, ad quæ est confugiendum, si patientes ferrum nolunt admittere, instat fœminarum: Paulus probat septrica, & caustica. Septrica sunt quæ exedunt, seu abradunt, vt proin carnem absumant: vt sunt c. 15. l. 5. simpl. *auripigmentum, quod arsenicum dicitur, sandaracha, dryopteris, pityocampe, aconitum*: quæ omnia sine dolore possunt carnem, sed tenellam ac mollem, eliquare. Si autem caro aucta sit durior: probantur caustica, quæ secundum loc. cit. Galeni, sunt calida, & crassæ substantiæ, vt ad similitudinem ignis pariant escharam, vt sunt *chalcitis, misy, melantheria, chalcanthum*: vt probetur oleum è *chalcantho*: sed rosacum correctum.

CAPVT XLIIII.

De Aegilope, & Anchilope.

Nomen.



RE a tumorem magni anguli, intelligimus vitium, quod vocat Auicennas apostema lacrymalium, qui tumor, pro vario statu, vocatur modo anchilops, modo ægilops. Auicennas interdum vocat Garab, quando tumor nimirum degenerat in fistulam, non semper Generatur, dum materia iuxta magnum angulum ita affligit, vt tumor oboriatur. Ægilops igitur est tuberculum iuxta magnum angulum oculi, procedens à materia morbifica. Forma est tuberculum, secundum Galenū. c. 2. l. 5. π.τόπ. Vnde Auicennas ait, quamuis quandoque emineat, quandoq; extra non appareat: intus tamen adesse tumorem. Subiectum attinet ad partem magno angulo proximam, secundum Aetium; & Gale. loc. cit. dicit, tuberculum residere inter os nasi, & magnum oculi angulum. Causa efficiens est materia morbifica: quæ est succus vel Alimentalis, vel Excrementitius. Alimentalis, vt sanguis: siue sit biliosus, siue pituitosus, siue melancholicus. Nec præter rationem: quia hoc malum quandoque est inflammatorium; & ob id Aetius dicit, incipiente inflammatione, repellentia probari; & Galenus ait, nonnunquam degenerare in abscessum. Potest ergo esse tumor inflammatorius seu tumor procedens à succo alimentario. Notetur cum Paulo abscessum capi bisariam:

Definitio.

Forma.

Subiectū.

Causa efficiens.

primus

primo, vt nondum in vlcus erupit, & vocatur tunc anchilops. Auicennas vocat akilus: secundo, vt iam eruptus est abfcessus, & dicitur ægilops. Causa etiam esse potest succus ca. 37. l. 3. excrementitius, quemadmodum colligere licet ex Aetio, dum materia colligitur in magno angulo oculi, humor scilicet lentus, melleus, aut pultaceus, plerumque tunica seu folliculo contentus: & hoc vitium etiam anchilops vocatur, quia est tumor non disruptus. Vnde colligere licet è Galeno cap. 12. lib. 14. metho. hunc tumorem prodeuntem à succo excrementitio, esse de genere vel meliceridis, cum pendet à succo melleo: vel de genere esse atheromatis, cum pendet ab humore pultaceo. Non proponit Aetius succum similem sæuo, à quo fit steatoma: nam dum proponit meliceridem & atheroma: insinuat etiam steatoma.

Differentiæ à forma: Tuberculum est Maius, vel Minus: Differentia. item vel Coniunctam habet solutam vnitatem, vt in ægilope: vel Non habet solutā vnitatem, vt in anchilope. A subiecto: pars afficitur secundum Superficiem, vel Profundū. A causa efficiēte materia, est vel Alimētalis, vel Excremētitia.

In genere vitium hoc, cum Auicenna est euidentis saltem Signa. tactui, si non visui: nam vt plurimum conspicitur eminetia, vel saltem percipitur in compressione, vt etiam in compressione fiat dolor. Quoad differentias ratione formæ, & subiecti: hæc patent. Ratione causæ efficientis cognoscere oportet, vtrum tumor sit vel inflammatorius, vel non inflammatorius. Si sit inflammatorius: cognoscitur è dolore, calore, colore mutato, & immobilitate: contra autem si non sit particeps inflammationis: vnde Auicennas ait: hunc tumorem, scilicet sine inflammatione, tactū moueri. Quoad tumorem non inflammatorium: cognoscetis esse meliceridem, è minori duritie: atheroma, è maiori duritie: & si summa sit durities, indicium est steatomatis.

Indicationes capiuntur à materia tumoris, & ab vlcere, si Præsidia. vlcus subsequatur. Quid materia tumoris, quidque vlcus indicet: suis locis intellexistis.

Vitium hoc è c. 2. l. 5. κ. 7. 0. π. est ægre curabile: est enim ve- Prognosti-
hemens ratione essentia & dignitatis: vt, si negligatur, con- ca.
iungatur etiam vehementia facultatis. Declaro: est vehemens secundum essentiam: nam tumoris materia satis à natura recedit: quamuis magis recedat in tumore non inflammatorio, vt maxime recedat in steatmate. Adhæc vehementia.

essentiæ perpenditur, dum id quod est præter naturam, non solum multiplex est, sed etiam contrarium. Nam, quæ sunt præter naturam, quo sunt plura, eo vehementius agunt aduersus naturam: Quare perpendere quæ sunt præter naturam ratione numeri, est considerare in prognostico vehementiam essentiæ. Præterea quæ sunt præter naturam, dum sunt contraria, vi medicamentorum euadunt vehementiora: nam si malum sit & calidum & frigidum, ut locum habeant contrariæ indicationes: curatio redditur difficilior: quia medicamenta calida augent morbum calidum, ac morbus calidus vel vehemens euadit, vel perseuerat secundum essentiæ. Vnde ut applicemus prognosticum nostro proposito: si præter tumorem fuerit vlcus, curatio redditur difficilior: quia quæ sunt præter naturam, sunt plura. In tumore inflammatorio adest contrarietas, quæ est causa difficilis curationis: quoniam quæ materiam discutiunt sunt calida, vnde augent inflammationem. Quoad vehementiam dignitatis, ea etiã in hoc malo adest, nam afficitur locus ita oculo vicinus, ut oculus ipse facile lædatur: qui est membrum nobile causa vitæ & commodioris & melioris: & ratio est, quia (ut ait Galenus hoc. cit.) medicamenta debent administrari liquida, quæ influunt in oculum, ut oculus lædatur. Adhuc oportet ut medicamenta hæreant, vnde est necessarium ligare oculum, vsque ad mali curationem: quam tot diebus perferre est impossibile. Qua de causa, ita referente Galeno, Apollonius in medicamenta non scripsit, & Archigenes potissimum vitur materia cheirurgica: quoniam materia cheirurgica non attingit oculum, quemadmodum medicamenta. Verum, ut in aliis affectibus, ita & hic prognosticum variat, ratione differentiarum. Ratione enim formæ: difficilioris est curationis, si cum magnitudine, sit coniuncta soluta vnitas: difficilioris etiam curationis est, si tumor occupet partes profundas. Ratione causæ efficientis si fuerit inflammatio, & immineat abscessus, & hinc vlcus: sit ut ægilops sit difficilioris curationis: vnde Auicenna ait, si ruptio fiat ad interiora, malum reddi magis difficile, ut immineat osiũ corruptio. Ut ex his colligere liceat, ægilopem difficilius curari, quam anchilopem. At si tumor non sit inflammatorius: quamuis tumoris materia non exulceret: tamen adeo recedit à naturali statu, ut non cedat vllis medicamentis, sed solum materiæ cheirurgicæ.

Curatio.
 Materia. Chæirurgica materia in ægilope & anchilo-
 pe probari potest. In ægilope: si absit corruptum: si malum in fi-
 stulam degenerarit: vnde Aetius probat cauterium ignitū.
 In anchilo-
 pe, Aetius probat superficiem esse secandam, vt
 folliculus continens materiam adimatur, cum nequaquam
 cedat medicamentis. Topica vsurpanda sunt, vel simul cum
 materia chæirurgica, vel sola. Quoad priora, Auicenn. dum ad-
 ministratur cauterium ignitum, oculo applicat spongiā, fri-
 gida infusam; nam inhibetur inflammatio. Addit Aetius lenticu-
 lam decoctam cum melle: & remota crusta probat alumen cum
 resina terbinthina. Et Paulus applicabat passulas, cum liquida te-
 rebinthina in modum emplastri. Et si quis desiderat cicatricem
 non indecoram, & præsertim dum scemina afficiuntur, po-
 test vt cum Auicenn. foliis ruscæ cum aqua granatorum: quæ è
 sententia Auicenn. conferunt à proprietate. Paulus addebat ad pul-
 cram cicatricem efficiendam, rutam satiuam cum lixiuio tritæ,
 & decoctam: lixiuium autem conficiatur è cinere & calce. Quoad
 topica, quæ sola administrantur: probantur in tumore inflā-
 matorio: vnde dum perducitur ad suppurationē, cum Auic.
 oportet vt pane permisto cum lacte muliebri. Et validius redde-
 tur medicamentum addito croco, cum aqua eruce, vel myrrha, cum
 felle vaccino. Et dum facta est disruptio, probatur crui farina,
 cum melle, aloë, myrrha. Atque Paulus probat cochleas tritas cum
 testis: & licet addere aloem & myrrham: quod medicamentum
 etiam suppurationem prohibere potest.

CAPVT XLV.

De Atrophia oculi.



Nomen.
 EXPLICATIS malis, quæ pertinent ad partes
 oculi: dicendum de vitiis ad totum oculum atti-
 nentibus. Quare de atrophia, prominētia oculi,
 de strabotitate. Itaq; per *ἀτροφία* intelligimus
 oculi malum, quod Auicennas vocat profunditatē pupillæ.
 Celsus vocat oculum imminutū. Et ob id intelligimus illud
 vitium, in quo totus oculus minor euadit, ad differentiam
 phthisis, in qua oculus minor euadit, solum secundum pu-
 pillam. Generatur, dum oculo occurrit causa, vicius oculus
 secundū omnes partes ita priuatur alimento, vt partes om-
 nes imminuatur. Vt *ἀτροφία* sit magnitudo imminuta præ-
 ter naturam totius oculi, procedens ab alimenti penuria.

Definitio.

Forma.

Forma est magnitudo imminuta præter naturam. Siquidem cum Aëtio oculus paulatim fit minor: vnde excavatur: Aliquando obscuriore euadit: Et præterea visum impedit: ita enim locutus est Aëtius: Quoniam vt oculus imminuitur: ita etiã cæatur: contra accidit, dum augetur. Præterea, vt spiritus animales deficient: ita & obscurus euadit oculus, & visio læditur: præsertim quia calidum innatum deficit, nec seruat temperies. Subiectum est totus oculus, ad differentiam

*Subiectū.**Causa efficiens.*

Philos. Causa efficiens est alimenti penuria. Cum Auicenna autem deficit alimentum, quoniam vel Absumitur, vel Non attrahitur ab oculo. Absumitur in febribus, & præsertim coniunctis cum vigiliis: item in vacationibus vehementibus in animi affectibus: & Aëtius etiam addebat, absumi in vehementi capitis dolore, dum cranium perforatur. Nam vi horum vitiorum, fit dissolutio sanguinis & spiritus. Alia autem e parte alimentum deficit, quia non attrahitur, ob frigus vehemens oculo occurrens.

Differentia.

Differentiæ à forma capiuntur secundum Magis & Minus. A subiecto non capiuntur: semper enim est idem. A causa efficiente alimentum deficit, quia vel Absumitur, vel Non attrahitur.

Signa.

Patet vitium in genere: & ratione differentiarum à forma. Ratione differentiarum causæ: facile est cognoscere, an alimentum deficiat, quia absumatur à febribus, & aliis causis propositis: vt etiam facile cognoscitur, si deficiat, quoniam non attrahitur: cognoscitur enim e frigiditate præcedente.

Indicationes.

Alimentum deficiens, indicat præsidium augens alimentum. Et si causa absit consumens, huic occurrendum. Et sic de reliquis.

Prognostica.

Malum ægre curatur: licet periculum pro vi differentiarum augeatur. Vnde malum est magis periculosum, si minor sit oculus. Et præterea augetur periculum, vt causæ sunt vehementiores.

Curatio.

Materiæ Aëtius probat spongiam ex aqua calida expressam. Probatur etiam lac tepidum infusum in oculum. Expedi etiam caput aqua calida perfundere, & prohibere colliria. Sed dubitatio est: quia Paulus applicato oculo medicamentum acre, confectum ex arugine: vt hoc sit collirium vehemens. Respondendum, Aëtium tradere curam solius *ἀρετοφίας*, vt proinde etiam cornea sit exsiccata: cuius ratione prorsus sit desistendum à colliriis. At Paulus in eodem capite loquitur & de

de atrophía, & præterea de phthisi: in qua cum cornea non sit exsiccata, ideo probat acríá, vt attrahatur alimentum: vt dictum est supra cap. 36. de phthisi oculi.

CAPVT XLVI.

De Expressione oculi.

ER *ἐκπίπτειν*, seu oculi expressionem, quam *Nomen.* Auicennas vocat exitum oculi, intelligimus illud malum, in quo ita exprimitur oculus, vt prominens appareat. Generatur, dum oculo occurrit causa, vi cuius septimus musculus residens in basi oculi, & circumdans neruum opticum, non potest oculum firmare: vnde procidit: & hinc extra propriam sedem permanet. *Exπίπτειν* igitur est situs præter naturam oculi, procedens à musculo, non potente oculum firmare. *Definitio.* Forma est situs præter naturam: nam sedem occupat externam. Et si lædatur visio, est morbus in situ: si non lædatur, est symptoma in qualitate mutata, id est, in magnitudine aucta, vt prominens oculus maior apparet oculo profundo. Subiectum est oculus. *Causa efficiens.* Causa efficiens est vitium pertinens ad musculum, vt non potest oculum firmare. Et cum Galeno cap. 3. lib. 10. de vsu. par. est septimus musculus: quamuis capite 2. libro quarto de loc. affect. hic musculus in tres etiam possit diuidi. At vtcunque dicamus: dum læditur hic musculus, oculus procidit. Dicebat autem Auicennas musculum affecti, vel Propria ratione, vel Ex accidenti. Propria ratione: dum paralyti afficitur, vt Galenus fatetur cap. 2. lib. 4. loc. affect. Ex accidenti: dum oculus vel ponderosior euadit, vel violentia aliqua exprimitur extra. Ponderosior euadit, è fluxione copiosa, vt voluit etiam Aetius. Vi autem exprimitur, secundum Aetium, in his qui strangulantur in certaminibus, in difficili partu: Auicennas addit vomitum violentum, vociferationem, &c. vi quorum omnium oculus exprimitur.

Differentiæ à forma: Situs est Morbus, vel Symptoma. *Differentia.* A subiecto non capiuntur differentiæ. Ab efficiente dicendum, musculum non firmare oculum vt læditur, vel Propria ratione, vel Ex accidente.

In genere malum patet. Quoad differentiás, ratione formæ: si Situs sit morbus: cognoscitur è læsa visione. *Sign.* Ratione

causæ efficiētis si musculus lædatur ratione propria: cognoscitur inde quod pupilla eandem seruat magnitudinem: nam oculus non repletur, nec sentitur à patiēte tensio vehemēs. Si ex accidente lædatur: si hoc fiat quia oculus euadit ponderosior: cognoscetis ex aucta pupilla. Si fiat ex causa exprimente: cognoscetis è causis prægressis, iam propositis.

Indicationes.

Præsidia capiuntur à forma; & à causa efficiente interna. Ratione formæ: indicatur præsidium redigens oculum in propriam sedem. Ab efficiente, si sit paralytis materiæ, hæc vacuanda: si sit materia vi oculum exprimens, & hæc vacuanda. Si est dolor in partu doloris præsidia haurienda:

Prognostica.

Vitium hoc vt plurimum curabile est. Ratione enim formæ cum Auicenna, si leuis sit egressio oculi: facilis erit curati contra, non leuis. Ratione causæ efficientis si fiat vi paralytis: cura est satis difficilis, vt è doctrinā de paralyfi intelligitur. Si fiat ob oculi repletionem, vel coarctationem: est vitium curabile, quamuis modo facilius, modo difficilius curetur, pro vehementia causarum intensiore & remissione.

Curatio.

Materiæ: Multis suppositis ac notis, Aetius & Paulus post totius euacuationem, probant, & rationabiliter, cucurbitā, quæ occipitio est applicanda, vt intro trahatur oculus. Topica duplicia sunt: & respiciunt vel causam situs, vel situm. Quæ respiciūt causam situs: calida & tenuis substantiæ sunt, vnde causa paralytis Auicennas probat odoramenta & suffumigia cognita & proposita in paralyfi: vt liceat vti *medicamento confecto è cinnamomo, pipere, caryophyllis, &c.* Et causa materiæ ponderantis, consimilibus est progrediendum, vt *medicamento confecto è fenis, anagall. ruta, &c.* Quæ situm respiciunt, cum Actio debent vim habere comprimendi. Et propterea Auicennas probat *collyrium è sumach: item emplastrum è farina fabacea, cum rosis, thure, &c. albo oui.*

CAPVT XLVII.

De Strabismo.

Nomen.



STRABISMVS. strabositas Auicennæ, malum est, in quo vtriusque oculi non potest esse vnus aspectus. Generatur, dum causa occurrit musculis oculum mouentibus, vt munere suo fungi nō possint, vt frustretur facultas visoria, & ita frustretur, vt non fiat

fit utriusque oculi vnus aspectus, sed visio inæqualis fiat. Scrabismus igitur est visio inæqualis oculorum, dependens à motu præter naturam muscutorum motiuorum. Forma est visio inæqualis: cum Paulo enim strabones secūdum rectum non intuentur quare inæquabiliter. Subiectum non est oculus, sed sunt ambo oculi, quoniam ad rectum intuitum concurrunt ambo oculi.

Definitio.

Causa efficiens est motus præter naturā muscutorū motiuorum: nam facultas non frustratur, nisi quia musculus occurrit causa præter naturā, ratione cuius fit, vt functio muscutorum lædatur, vt vel Minuatur, vel Auferatur, vel Corumpatur. In definitione autem propositi sunt muscoli, sed motiui, quoniam cum Gal. c. 8. lib. 10. de vls. par. vt septimus musculus firmat oculum, ita sex alij muscoli mouent oculum: vt propterea septimus musculus oculum firmās, ab hac finitione excludatur: præsertim quia dum septimus musculus paralyti afficitur, concidit oculus. Itaque cum malū pendeat à vicio muscutorum: cum Auicen. neruorū musculorū affectus est vel Natiuus, vel Ascititius. Si natiuus: huius causa oculi affecti motus imminuitur, ad differentiā nō læsi oculi: & hic affectus attinet ad imbecillitatem calidi natiui: nam cum Galeno, & Hippocr. aph. 43. sect. 7. mulier amphidexia non fit: quoniam in fœmina neruorum robur desideratur, nam in fœmina calidum innatum nec est ita robustum, nec similiarum partium ea est caliditas, vt in maribus. Vnde in præsentia à simili est dicendum, fieri posse, vt vnus oculi musculus imbecilliores, alterius validiores generentur: quare fit visio inæqualis. Affectus ascititius causam habet musculos vel paralyti, vel conuulsione correptos.

Causa efficiens.

Differentiæ à forma: Visio inæqualis est vel ad Vnam, vel ad Aliam partem. A subiecto non capiuntur differentiæ, quoniam visio inæqualis spectat ad vtrumque oculū. A causa efficiente affectus est Natiuus, vel Ascititius.

Differentia.

In genere, & ratione differentiarum à forma, malum patet. Differentiæ à causa efficiente. Si affectus sit natiuus: cognoscitur, quia à principio ortus visio fuit inæqualis: cōtra, si ascititius. Et si ascititius: vtrum causa sit paralyti, vel conuulsio: petendum est à propriis capitibus.

Præsidia.

Indicationes capiuntur à vicio muscutorū. Si ergo vitium sit natiuum: indicat præsidium efficiens calidum innatum robustum, id est, calefaciens & nutriens: Calefaciens ratione qualitatis

Signa.

causæ efficiētis si musculus lædatur ratione propria: cognoscitur inde quod pupilla eandem seruat magnitudinem: nam oculus non repletur, nec sentitur à patiēte tensio vehemēs. Si ex accidente lædatur: si hoc fiat quia oculus euadit ponderosior: cognoscetis ex aucta pupilla. Si fiat ex causa exprimente: cognoscetis è causis prægressis, iam propositis.

Indicationes.

Præsidia capiuntur à forma, & à causa efficiente interna. Ratione formæ: indicatur præsidium redigens oculum in propriam sedem. Ab efficiente, si sit paralyſis materiæ, hæc vacuanda: si sit materia vi oculum exprimens, & hæc vacuanda. Si est dolor in partu doloris præsidia haurienda.

Prognostica.

Vitium hoc vt plurimum curabile est. Ratione enim formæ cum Auicenna, si levis sit egressio oculi: facilis erit curari si contra, non levis. Ratione causæ efficientis si fiat vi paralyſis: cura est satis difficilis, vt è doctrina de paralyſi intelligitur. Si fiat ob oculi repletionem, vel coarctationem: est vitium curabile, quamuis modo facilius, modo difficilius curetur, pro vehementia causarum intensiore & remissione.

Curatio.

Materiæ: Multis suppositis ac notis, Aetius & Paulus post totius euacuationem, probant, & rationabiliter, cucurbitā, quæ occipitio est applicanda, vt intro trahatur oculus. Topica duplicia sunt: & respiciunt vel causam situs, vel situm. Quæ respiciūt causam situs: calida & tenuis substantiæ sunt, vnde causa paralyſis Auicennas probat odoramentā & suffumigia cognita & proposita in paralyſi: vt liceat vti *medicamento confecto è cinnamomo, pipere, caryophyllo, &c.* Et causa materiæ ponderantis, consimilibus est progrediendum, vt *medicamento confecto è fenice, anagall. rusa, &c.* Quæ situm respiciunt, cum Aetio debent vim habere comprimendi. Et propterea Auicennas probat *collirium è sumach: item emplastrum è farina fabacea, cum rosis, thure, & alho oni.*

CAPVT XLVII.

De Strabisino.

Nomen.



STRABISINVS, strabositas Auicennæ, maluria est, in quo vtriusque oculi non potest esse vnus aspectus. Generatur, dum causa occurrat musculis oculum mouentibus, vt munere suo fungi nō possint, vt frustretur facultas visoria, & ita frustretur, vt non fiat

fuit vtriusque oculi vnus aspectus, sed visio inæqualis fiat. Scitabimus igitur est visio inæqualis oculorum, dependens à motu præter naturam muscutorum motiuorum. Forma est visio inæqualis: cum Paulo enim strabones secūdum rectum non intuentur quare inæquabiliter. Subiectum non est oculus, sed sunt ambo oculi, quoniam ad rectum intuitum concurrunt ambo oculi.

Definita.

Causa efficiens est motus præter naturā muscutorū motiuorum: nam facultas non frustratur, nisi quia musculis occurrit causa præter naturā, ratione cuius sit, vt functio muscutorum lædatur, vt vel Minuatur, vel Auferatur, vel Corumpatur. In definitione autem propositi sunt musculi, sed motiui, quoniam cum Gal. c. 8. lib. 10. de v. par. vt septimus musculus firmat oculum, ita sex alij musculi mouent oculum: vt propterea septimus musculus oculum firmās, ab hac finitione excludatur: præsertim quia dum septimus musculus paralyfi afficitur, concidit oculus. Itaque cum malū pendeat à vicio muscutorum: cum Auicē. neruorū musculorū affectus est vel Natiuus, vel Affcitiuus. Si natiuus: huius causa oculi affecti motus imminuitur, ad differentiā nō læsi oculi: & hic affectus attinet ad imbecillitatem calidi patiuī: nam cum Galeno, & Hippocr. aph. 43. sect. 7. mulier amphidexia non fit: quoniam in fœmina neruorum robur desideratur, nam in fœmina calidum innatum nec est ita robustum, nec similarium partium ea est caliditas, vt in maribus. Vnde in præsentia à simili est dicendum, fieri posse, vt vnius oculi musculi imbecilliores, alterius validiores generentur: quare fit visio inæqualis. Affectus affcitiuus causam habet musculos vel paralyfi, vel conuulsione correptos.

Causa efficiens.

Differentiæ à forma: Visio inæqualis est vel ad Vnam, vel ad Aliam partem. A subiecto non capiuntur differentiæ, quoniam visio inæqualis spectat ad vtrumque oculū. A causa efficiente affectus est Natiuus, vel Affcitiuus.

Differentia.

In genere, & ratione differentiarum à forma, malum patet. Differentiæ à causa efficiente. Si affectus sit natiuus: cognoscitur, quia à principio ortus visio fuit inæqualis: cōtra, si affcitiuus. Et si affcitiuus: vtrum causa sit paralyfis, vel conuulsio: petendum est è propriis capitibus.

Præsidia.

Indicationes capiuntur à vicio muscutorū. Si ergo vitium sit natiuum: indicat præsidium efficiens calidum innatum robustum, id est, calefaciens & nutriens: Calefaciens ratione qualitatis

Signa.

qualitatis calidi innati: nutriendi ratione substantiæ calidi innati. Si affectitium sit vitium: locum habent indicationes paralyfis & conuulsionis.

Prognostica.

Cum Auicēna, si hoc vitium fuerit natiuum, est incurabile nisi sit admodum recens: quod intelligere non est admodum facile: nam quamuis recens sit affectus, cum tamen sit natiuus, non videtur curationem admittere. Sciendum igitur, licet vitium sit natiuum, si tamen sit admodum recens, non esse de salute desperandum. Nam sicut manus sinistra interdum per exercitationem fungi potest munere dextræ manus: ita imbecillitas natiua potest corrigi, vt malum tollatur. Si autem malum sit affectitium: idem est dicendum, quod in prognostico paralyseos & conuulsionis dictum fuit.

Curatio.

Materiæ. Si vitium est natiuum: æquandæ sunt cunæ, & ponenda candela accensa in parte opposita strabositati. Probat etiam Auicennas filum appensum rubrum, cum re rubra, vtpote cum corallis, in parte opposita: vt infans assiduò aspiciat eam partem. Nam hoc exercitium (vt ait Auic. qui omnia cognouit) confert in æquando oculos. Et vt intelligatis causam, hæc est: quoniam sicuti manus sinistra ope exercitij quodammodo euadit dextra, id est, huius obit munia: ita laboris seu exercitij virtute calidum innatum musculorum robur acquirit, vt hi musculi æque moueant, ac musculi alterius oculi. Vnde ad præseruandos infantes à strabositate iubet Paulus vt lucerna ponatur è regione oculorum, non ad latera, sed directo: sic enim musculi æqualiter agunt & se exercent: contra, si à latere ponatur. Si affectus sit affectitiuus, probantur medicamenta proposita in paralyfi & conuulsione.

CAPVT XLVIII.

De Læsâ visione.

Nomen.



AFFECTVS oculorum foris apparentes, qui causa sunt læsæ visionis, hucusque explicauimus: Sequitur, de visione læsa, citra morbum euiden-
tem. Quoad nomen igitur: per malum propositum intelligimus illud vitium, in quo læditur visio citra morbum oculi apparentem: hoc est, citra malam compositionem, tumores, solutam vnitatem, vlcus: vt non excludatur

datum vitiosus color, nam non est morbus. Vnde Paulus respiciens ad quandam speciem huius læsæ visionis, ait: visus obscuritas fit sine manifesto oculi affectu.

Generantur dum corpori, siue extra oculum, siue in oculo, occurrit causa, vi cuius citra euentem morbum frustratur facultas visiva, vt lædatur visio. Læsa igitur visio; est functio præter naturam oculi, dependens à frustratione visus citra morbum oculi euentem. Forma est functio præter naturam: vnde formaliter hoc vitium est symptoma, attinens ad actionem. Additum est præter naturam, in genere: vt ex hoc pateret, functionem omnibus modis posse lædi, id est, imminui, auferri, corrumpi. Subiectum est oculi: vt contrahatur functio præter naturam, vt sit functio oculi. Notetur; cum in oculo multiplex functio locum habere possit: contrahitur hæc functio virtute causæ efficientis: vbi dicitur, dependens à frustratione visus: vt necessarium sit colligere, hanc functionem esse visionem læsam. Nam visio est actio, quæ pertinet ad facultatem visoriam. Additum fuit: circa morbum euentem: ad differentiam læsæ visionis, cum morbis euentibus, de quibus supra actum est.

In præsentia igitur explicanda est causa, ob quam frustratur facultas visoria. Hanc causam vt intelligatis, legite Galenum c. 2. lib. 1. de sym. caus. & cap. 2. lib. 4. de loc. aff. Scien- dum ergo cum facultas animalis contrahatur, vt reddatur visoria in crystallino: sequi, frustrari hanc facultatem determinatâ, quoniam vel læditur vel occurrit Error externus. Quotiescûque læditur, ob morbû crystallini, quotiescunque frustratur, ob errorem: qui error est vitium ultra morbos crystallini, quodcunque sit illud vitium, siue morbus, siue non. Quoad morbum crystallini, id est, morbum non euentem: cum Galeno locis citatis potest esse quælibet Intemperies, & quædam Compositio. Declaro. Intemperies potest esse octuplex. Notandum, circa passiuas intemperantias: (id est, quæ attinent ad qualitates passiuas: ab his intemperantias produci glaucoma, seu glaucedinem, quam viriditatem Auicennas vocat. Et hoc loco sciant iuniores, per oculum glaucum intelligi oculum, dum euadit particeps coloris misti è viridi & albo, veluti est color maris, cæli, vnde etiam cæsius hic color dicitur. Color autem glaucus quandoque est expers, quandoque est particeps splendoris. Par-

Generatio.

Definitio.

Forma.

Subiectum.

Causa læsa visionis.

1. Morbus crystallini. Intemperies crystallini.

ticeps

ticeps est, verbi gratia, in oculis nocturæ, felis: vnde hoc vitium quandoque vocatur Glaucopis, ab oculis noctuarum. Huius vitii è Paulo, Aëtio, Auicenna, colligi possunt quinque species: prima attinet ad rhagoëidem, vt fit à natia humiditate copiosa: secunda fit à siccitate rhagoëidis, vt in senibus, in quibus multiplicatur quidem humiditas extranea, sed resoluitur innata: tertia est glauco, quæ fit è prægressa suffusione, humore iuxta pupillam concreto, quæ species ad differentiam glaucedinis rhagoëidis visum impedit: quarta est, dum humor crystallinus præ nimia humiditate glaucus euadit: quinta pertinet ad crystallinum, & est morbosa, & splendoris expers, & fit ab intemperie sicca crystallini. Quod si contingat oculum siccari propter penuriam humoris albuginei: cum patiens exactius videat in tenebris, quam interdiu, vitium vocatur Auicenna algiehar, à Græcis *αλγίη*. Ex his colligere licet glaucedinem produci etiam posse ab humiditate, & siccitate crystallini: quemadmodum ab Auicenna traditum est: nec præter rationem. Fundamentum igitur est: quoniam color viridis copiosiores partes habet opacas: contra color albus copiosiores habet diaphanas: at color glaucus vt mistus è viridi & albo, medio modo se habet. Nam propter copiosam humiditatem, portio diaphana euadit opaca, cum præ nimia humiditate non fiat dissolutio: vt hinc color euadat glaucus, & si albus color suscipiat aliquam viriditatem. Fit etiam color albus glaucus, ratione siccitatis, & dupliciter: primum, dum ratione siccitatis humiditas resoluitur, vt color viridis obscurus degeneret in glaucum, id est, in viridem clarum. Secundo hoc fieri potest, vt color albus degeneret in glaucum, id est, mistum ex albo & viridi, vt siccitatis, qua consumuntur partes diaphanæ, vt opacæ permaneant dominantes, quemadmodum contingit in glauco exquista. Quoad malam compositionem perpendere oportet crystallini Raritatem & Situm. Quoad raritatem, & eam morificam: hoc vitium Aëtius cap. 44. lib. 17. vocat oculi debilitatem. Verū hæc est immodica crystallini raritas potius natia. Quoad situm, cum Galeno cap. 12. lib. 10. de vsu part. locum habet, vt crystallinus sursum vel deorsum vergit: vt cum obiectum duplex appareat: propterea quod conorum axes in duplici firmantur plano, nam rhagoëidis pars, à qua desecit crystallinus, crystallinum fecat in

Raritas
crystallini.

Situs cry-
stallini.

cat in duas partes. Hic autem situs est vel morbosus, vel non morbosus. Situs non morbosus: (cap. 12. lib. 10. de usu part.) est, dum alterius oculi pupilla manu comprimitur. Morbosus, qui producit a causa morbifica. Et hic duplex esse potest: nimirum vel non ex usu, hoc est, non indicans utile, ut hunc situm logicum etiam appellare liceat: vel ex usu. Situs morbosus, sed non ex usu, proponitur cap. 2. lib. 4. de loc. aff. si nimirum hoc malum fiat a musculis: si quidem remoto vitio musculorum, crystallinus illico situm recuperat. Situs autem morbosus, & ex usu est: si fiat vel ob ictum oculi, vel ob immoderatam fluxionem. Quo autem ad errorem externum: hic vel In oculo est, vel Extra. Si in oculo pertinere potest ad Corneam, ad humorem albugineum, & ad Spiritus animales. Et cum pertinere possit ad corneam: omisis morbis evidentibus, de quibus dictum est, cum Galeno cap. 2. lib. de symp. caus. cornea affici potest Crassitie, Humiditate, Colore. Quoad crassitiem & humiditatem: si vi horum vitiorum afficiatur cornea: malum vocatur Caligo. Unde quoad crassitiem, cum Galeno c. 5. lib. 10. de usu part. hæc accidit senibus, in quibus in decrepita ætate cornea rugosa redditur, cornea euadit duplicata, rugis super rugas incidentibus. Humiditas locum habet, dum cornea afficitur humida intemperie. Coloris causa producitur *μαρμαρίσμος*, seu alucinatio. Auicenna vocat imaginationem. Unde, ut evidens reddatur doctrina *μαρμαρίσμος*: sciendum fieri & ob colorem corneæ vitiatum, & citra colorem corneæ. Ob colorem corneæ, ut in præsentia intelligimus: dum afficitur cornea ab humore, qui contingere potest, ut in ictero contingit, in quo radij transeuntes per corneam citrinam, sunt in causa, ut omnia obiecta citrina apparent. *Μαρμαρίσμος* autem fit citra vitium coloris corneæ, etiam cum Galeno cap. 2. lib. 1. de symp. caus. ob vitium coloris albuginei. Sed præterea & tertia *μαρμαρίσμος*, species additur: quæ est, dum oculis clausis in obscuro obiecta variorum colorum conspici videntur, Et præterea ut hoc intelligatur, scire oportet, colorem, ut est visus obiectum, dupliciter considerari posse: primo modo, ut color sit è mixture elementorum, dum terra concurret ut portio opaca: aqua & aer, ut portio diaphana: ignis, ut luminosa: Et hic color solum extra oculos conspicitur. Secundo modo fit colore varia mixture lucis & tenebrarum, & huiusmodi color etiam intra

II. Error
externus,
in oculo.

I. Cornea
crassities
est humi-
ditatis.

Color cor-
neæ.

oculum

2. *Albuginei hum-
oris vi-
tia.*

3. *Spiritus
vitia.*

Penuria.

2. *Ap-
20.*

*Secundu
vallegrum*

oculum generari potest, ac conspici : vt colligitur è context. 23. lib. 1. prognost. Galeni, quemadmodum euenire potest in phrenitide, in qua vapores torrefacti habent rationem tenebrarum : spiritus autem & crystallini splendor, habent rationem luminis. Hæc de cornea : Porro, vt è cap. 2. l. 1. de symp. causis colligitur, humoris albuginei vitium attinet ad Quantitatem & Qualitatem. Ad quantitatem: vt modo Augetur, modo Minuitur : sed horum vitiorum doctrina patet è traditis de Mydriasi, & de Constrictione pupillæ. Quoad qualitatem est albuginei Crassities & Color. Crassities perpendenda est, secundum gradū, situm & causam efficientem. Secundum gradum, vt humor albugineus est vel Magis vel Minus crassus si remissa sit crassities dicitur *αμβλυopia*, id est, visio obscura : si intensa, prodit *αμαλγμωσις*, id est, visus destructio. Quoad situm seu subiectum crassities: crassities pertinet ad albugineum, vel secundum Totum, vel secundum Partem : & si secundum partem, vel secundum Circumferentiam, vel secundum Centrum. Si crassities perpendatur ratione causæ efficientis, hæc crassities producit vel ex Alimento, vel ex Excremento : & si ab excremento, vel ab humore, vel à Vapore : & si ab humore, ab humore vel Magis vel Minus crasso : & si à vapore, peccante vel Copia, vel Motu. Color albuginei varius esse potest. Et hæc de vitiiis attinentibus ad humorem albugineum. Quantum attinet ad vitia spirituum: secundū Galenum c. 2. lib. 1. de sym. caus. cum ad visionem efficiendum opus sit spiritu animali copioso & puro: ideo vitium attinet ad Quantitatem & Qualitatem. Quoad quantitatem: deficit spiritus animalis, vel è Toto, vnde fit Cæcitas : vel secundum Partem, vnde Imminuitur visio. Verum vtrumque vitium fit ab eadem causa, genere differente solum secundum magis & minus: vt sufficiat dicere solum de causis priuationis spiritus. Oculus ergo animali spiritu priuatur, quoniam spiritus in oculum non fluit. Non influit, quoniam vel Retrahitur, vel eius fluxus Impeditur. Retrahitur scilicet in cerebrum, dum exiguus est spiritus, vt sufficiat & pro cerebro, & pro oculo. Sunt autem exigui spiritus, dum vel Resoluntur, vt in euacuationibus immodicis: vel Non generantur, vt in morituris, quemadmodum Galen. ait cap. 2. lib. 4. loc. aff. vnde & Hippocrates aph. 24. sect. 1. lib. 6. epid. obscuracionem in ægrotantibus malam esse ait. Si autem spiritus fluxus impediatur:

impediatur: hoc fit propter angustiam vel Ventriculorum cerebri, vel Opticorum. Ob angustiam ventriculorum cerebri, vt in caro, epilepsia, apoplexia: Opticorum autem vt in vertigine tenebricosa, & citra vertiginem: vbi, si angustia sit integra in opticis, fit ἀμαύρωσις, modernis gutta serena: si non sit integra, dicitur ἀμβλυωπία. Quoad vitium spiritus secundum qualitatem, cap. 2. lib. 1. de symp. est spiritus veluti nebulosus, humidus, turbidus. Causa est, immoderata humiditas, vel alimenti, vel cerebri: quamuis etiam concurrat intemperies frigida & sicca cerebri, ad generandum impuros spiritus, quemadmodum in decrepitis. Cæterum, vitium spiritus animalis est vel simplex, vel mistum: simplex est, dum spiritus solum vel est exiguus, vel humidus: mistum, dum spiritus simul est & exiguus & humidus. Quod si ergo spiritus sit exiguus & purus: cum Galeno, loc. cit. proxima homo exacte videt, remota neutiquā: & hoc vitium dicitur μωπία, lusciositas. Si autem spiritus sit simul copiosus & humidus: homo videt, non tamen exacte nec distincte, & peius videt in obscuro: vnde vocatur hoc vitium nyctalops, hoc est, nocturna cæcitas. Si spiritus sit simul exiguus & humidus: homo nec exacte, nec procul videt: vt accedat hoc vitium ad nocturnam cæcitatem, quoniam radij sunt & exigui, & impuri: vnde causa exiguitatis non procul diffunduntur: causa impuritatis homo non potest exacte videre. Quoad vitia capitis pertinent hæc vel ad Opticos, vel ad Cerebrum. Hæc vitia Galenus c. 2. lib. 1. de symp. cap. vocat morbos facultatis, quamuis habeant rationem erroris externi, si conferantur cum morbis crystallini. Verum quoad opticos: visio læditur aliqua e parte, ob immodicam humiditatem, cuius causa, spiritus impuritatem contrahere possunt: sed potissimum opticorum vitium, pertinet ad malam compositionem & solutam unitatem. Mala compositio, est angustia: quæ si integra sit, vitium vocatur ἀμαύρωσις, obscuratio: vnde Anic. ait, obscurationem esse obturationem nervi visui: si non sit integra angustia, vocatur amblyopia. Notandum vero opticorum angustiam attinere vel ad horum neruorum substantiam, vel ad meatum. Si ad substantiam: sit angustia, quæ est pororum densitas, & fieri potest modo à frigore, modo à materia implente poros, vt dictum est de paralyti, vt condenserentur pori, & meatus optici apertus permaneat, vt transeat spiritus animalis, non facultas, hæc enim non permeat per

*Impuritas
spirituum.*

3. Error
externus
extra ocul-
los.

foramen, sed per propriam neruorum substantiam. Si autem angustia spectat ad foramen optici: angustia est obstructio, quæ fit à pituita: potest quoque esse compressio, quæ fieri solet è compressione seu innixu adiacentium, siue è tumore vel inflammatorio, vel non inflammatorio, vt in doctrina paralyssis dictum est. Quoad solutam vnitatem, est euidentis, quando ob vulnera nerui optici inciduntur. Quoad cerebri vitia, esse potest intemperies, quæ est causa spiritus vel exigui, vel impuri: esse potest angustia, quæ prohibet transitum facultatis & spirituum, vt in caro, &c. in phrenitide etiam, vt monuit Galenus cap. 2. lib. 4. loc. affect. Quoad vitia infra caput: vitium pertinere potest, vel ad Totum corpus, vel ad aliquam Partem. Ad totum, veluti cum Auicenna in accessionibus febrium: ad partem, vt pote ad ventriculum: quando scilicet, oculis à ventriculo vapores impertiuntur, cap. 2. li. 1. de sympt. caus. & c. 2. l. 4. de loc. affect.

Differentia. Quoad differentias. A forma: visio est vel Imminuta, vel Ablata, vel Corrupta. A subiecto non capiuntur differentia. A causa efficiente causa est Morbus, vel Error externus: vt iam traditum est.

Signa.

Hoc vitium in genere & ratione formæ patet. At quantum ad causam efficientem attinet: cum esse possit vel morbus crystallini, vel error externus: Si fuerit in morbus crystallini, & primum, si intemperies: indicabitur è splendore immutato: & si intemperies sit calida, lædetur à calidis, iuuabitur à frigidis: contra, in frigida intemperie. Si dyscrasia sicca sit: cognoscetur ex oculi ariditate: si humida, è lippitudine superflua. Sed præterea dyscrasiam siccam & humidam cognoscimus è colore glauco. At si glauco fiat è siccitate: patientes vix ferunt lumen, ita vt melius videant in obscuro: contra, si glauco fiat ex humiditate. Quoad crystallini morbum, dum est mala compositio: si fuerit immoderata raritas: cum Aërio cognoscitur, quia patiens obiectum nec album, nec splendidum potest perferre: & præterea è leui occasione oculum claudit, & lacrymatur, & præsertim inter legendum. Situs autem vitiosus cognoscitur è læsa visione, in qua quodlibet obiectum apparet geminatum. Et si contingat, vt ictus non sit prægressus, nec signa sint epiphoræ: iudicandum, hoc malum prodire vitio musculorum. Quoad errorem externum: & primum, si pertineat ad corneam: cum vitium sit crassities, humiditas, color: crassities co-

gnosce

gnosceretur ex eo, quod cornea rugosa conspiceretur & inæqualis, quemadmodum in senibus: humiditas è læsa visione indicabitur, in qua homo veluti per nebulam seu fumum conspiciere videtur: color cognosceretur & è læsa visione, quia omnia obiecta colore infecta apparebunt: & præterea hic ipse color est potius signum, quam signatum, cum in oculos incurrat. Quoad vitium albuginei posthabito vitio in quantitate (de quo in sermone de mydriasi & constrictione pupillæ dictum est) cum attinet ad crassitiem, & colorem: crassities cum differat secundum gradum, secundum sedem, & causam efficientem: Quantum ad gradum attinet, crassities intensior indicabitur è visione magis læsa, & pupillæ obscuritate intensiore reddita. Quoad sedem: si crassities attineat ad totum albugineum: indicabitur è læsa visione, in qua æquale obiectum secundum omnes partes apparebit æquale: at si ad partem albuginei attineat: si contingat, ut crassities occupet albugineum secundum rectum, obiectum quod conspiceretur, linea recta refertum esse videbitur: si secundum obliquum, obliqua. Si contingat, ut crassities attineat ad circumferentiam: tunc obiecta plura simul non possunt conspici. Si autem crassities occupet centrum: omnia obiecta perforata in medio apparebunt. Quoad causam efficientem, si crassities fiat ex alimento: indicabitur ex æquali læsione, & prægresso alimento crassiore. Si fiat ex excremento: indicabitur ex inæquali læsione albuginei. Et si excrementum sit humorosum: indicabitur è læsa visione, in qua obiecta vitio stabili referta conspicientur: si è vapore: apparebunt culices, muscæ volitantes. Si vitium ad colorem attineat: color facile conspicitur, non tamen tam facile in albugineo, ac in cornea.

*Albuginei
vitia.*

1.

2.

3.

4.

Quoad vitia spiritus: si spiritus è toto deficiat, indicabitur è visione ablata: si secundum partem, ex imminuta: ut patiens remota non possit videre exacte. Et si deficiat, quoniam retrahitur: indicabitur ex immodicis vacuationibus, ex imbecillitate virium, cuiusmodi prope mortem esse solet. Si fluxus impediatur: cum possit impediiri ex angustia vel ventriculorum cerebri, vel opticorum: de his suo loco dicemus. Si ad qualitatem attineat vitium spirituum, cognosceretur è læsa visione, in qua homo non videt exacte, quamvis procul videat. Et si spiritus fuerit tum exiguus,

*Spiritus
vitia.*

tum impurus: indicabitur è læsa visione, in qua homo nec exacte, nec procul potest conspiciere.

*Opticorum
vitia.*

Quoad vitia neruorum opticorum: angustia cap. 2. lib. 4. loc. affect. cognoscitur è læsa visione, non apparente aliquo vitio in oculo: & si integra sit angustia, indicabitur ex ablata visione: si imminuta angustia, ex imminuta visione, vt homo procul non videat. Et si angustia attineat ad nerui substantiam, quod aliquando obseruauit: indicatur è visione ablata, in qua dilatatur pupilla vnius oculi, si alter claudatur. At si angustia ad foramen attineat, cum Galeno cap. 2. lib. 4. loc. affect. si angustia fuerit integra secundum vnum oculum, vt homo prorsus non videat, poterit tamen dilatari pupilla alterius oculi, sed non dilatabitur pupilla oculi læsi. Si oculus afficiatur inflammatione: cognoscitur è rubedine oculorum, è pulsatione, è calore: & si tumor non fuerit inflammatorius, è grauitate: Et si hæc non appareant, angustiam ex obstructione fieri coniectandum est: Et, si soluatur vnitus, è vulnere.

Indicationes.

Indicationes, hauriendæ pro curatione læsæ visionis, ferme innumeræ sunt: patent autem è superius propositis: nam, verbi gratia, si lædatur visio ob intemperiem crystallini, alterandum per contrarium, &c.

Prognostica.

Non est autem vitium hoc negligendum, causa vitæ & commodioris & melioris. Verum modo facile, modo difficulter, modo omnino non succurri potest. Ratione igitur formæ, dum omnia sunt paria: difficilior remouetur hoc malum, si ablata sit visio: Ratione causæ efficientis, si morbus sit intemperies, difficilioris curationis, si in habitu: Augetur difficultas, si intemperies declinet ad siccum, vt in glaucedine: & propterea dicit Galenus cap. 16. lib. 10. de vsu partiũ, glaucedinem potissimum parere cæcitatem. Paulus respiciens ad exactam curationem glaucedinis, ait, omnia glaucomata non curari: ratio esse potuit, quia si fiat glaucedo, glauca reddita rhagoeide, vel à principio generationis, vel in senili ætate: patet has duas species glaucedinis esse incurabiles: si fiat glaucedo ab humore congelato, hæc etiam species cum Actio est incurabilis; si oriatur ab humiditate natua crystallini, etiam incurabilis: non enim vinci potest copia humiditati crystallini: Si fuerit glaucedinis quinta illa species, quæ exquisita est, & sit ratione siccitatis: hæc etiam est incurabilis, nisi siccitas sit admodum debilis,

quem

quemadmodum Aetio in incipiente glaucedine : vt , si aliquantis per sit progressa , actum sit. Ita ergo intelligendus est Paulus. Si autem morbus crystallini sit raritas , potest remitti : vnde curationem Aetius aggreditur. Si vitium fuerit situs , vt si situs vitiosus fuerit : pro varia causa varie prognosticandum. Verbi gratia , si fiat musculorum vitio , vt sunt affecti vel paralyti , vel conuulsione : confugiendum ad propria capita : & sic de reliquis. Quoad errorem externum , si pertineat ad corneam : in genere , si corneae vitium sit magnum (cap. 2. libro primo sympt. caus.) visio in totum impeditur. Et , si rugosa sit reddita cornea , sicuti in senibus : vitium est incurabile. Si vitium sit humiditas : potest vinci. Vincitur etiam si vitium in colore sit positum : quia materia coloris potest euacuari. Quoad albugineum , si huius vitium fuerit crassities : varie prognosticandum , pro gradu & efficiente causa crassities. Quo enim maior crassities , eo cura difficilior : vt si auferatur visio , incurabile sit vitium. Adhuc si crassities fiat ex alimento crasso , vix curabilis : & si prorahatur , non potest vinci. Si vero fiat ex excremento : si fuerit humor , curatio est difficilis , & quandoque impossibilis , nimirum , si humor fuerit copiosius , crassus , viscidus , impactus. Si excrementum fuerit vapor , curabile vitium. Similiter si vitium in colore sit positum. Quamuis maior sit difficultas in vincendo colore albuginei , quam corneae : cum albugineus in loco sit profundiore. Quoad vitium spirituum : si spiritus deficient e retractione , quoniam spiritus non generantur : malum incurabile : nam homines mortui sunt proximi. Si autem spiritus deficient quia resoluuntur propter vacuationes immoderatas : prognosticum varium est , pro vehementia illarum euacuationum. Si spirituum transitus prohibeatur , vel ob angustiam opticorum , vel ventriculorum cerebri : propria capita consulenda. Si vitium pertineat ad qualitatem : si spiritus sit humidior , ob humiditatem vel cerebri , vel alimenti : curabile est vitium : nisi coniuncta sit siccitas ipsius cerebri , vt in aetate decrepita , quia malum tunc incurabile. Quoad vitia opticorum si vitium sit humiditas : curari potest. Si fuerit angustia , & haec ad substantiam neruorum pertineat : non est malum incurabile. Et similiter , si ad foramen optici , quod tamen vitium difficulter expugnatur , & incurabile est , nisi cito occurramus. Si vitium sit soluta vnitas , actum est. Quoad

vicia cerebri, totius corporis, ventriculi: horum viti-
orum prognostica e propriis capitibus sumenda.

Curatio.

Quoad materias: Primum causa crystallini notandum: Si fuerit intemperies calida: probari *oculorum ablutionem cum frigida, cum aqua rosarum.* Si fuerit dyscrasia frigida: *ablucendi sunt oculi aqua feniculi, euphrasia, vino vel sincera, vel medicato cum propolis.* Si humida fuerit intemperies: Rhasis probat *pulverem e terra tota & siccata: et abluit oculos aqua feniculi: addit etiam aromata, collyria e felibus, & similia, in doctrina suffusionis tradita.* Si intemperies sicca sit: Rhasis caput perfundit *frigida: naribus, auribus applicat humectantia, vt oleum amygd.* totumque corpus fouet *balneo aqua dulcis: iuuat lac oculo instillatum.* Quoad raritatem crystallini: huius causa Aetius cap. 44. praeter materias diuertentes, vt sunt frictiones, &c. probat, vt caput *frigida* perfundatur, & si opus est, applicentur oculis frigida astringentia, vt *aqua rosae cum sumach.* Quoad situm crystallini viciosum: materiae sunt petendae e traditis de paralyti, de conuulsione, de sugillatione, de epiphora. Quoad corneam: & primum ratione crassitie: oculus est fouendus *lacte, vino dulci, decocto fenugraeci, meliloti, feniculi viridis.* (propter siccitatem, quae in senili viget aetate.) Ratione humiditatis probantur, quae etiam conueniunt in humidiori crystallino. Ratione coloris vsurpantur discentientia, quae conueniunt in suffusione: vt est *vinum cum euphrasia.* Quoad vitium spirituum: ratione quantitatis, si deficient, quoniam vel non generantur, vel resoluuntur: occurrendum potius alimentis, vt *panem cum vino aromatico, aqua carnis, &c.* Si deficient spiritus, quoniam prohibetur transitus ob angustiam vel ventriculorum cerebri, vel opticorum: probantur paulo post sequentia. Ratione impuritatis laudantur quae generant purum sanguinem: quare sint *bona cibaria: et oculo applicetur vinum cum feniculo. &c.* Quoad vitia opticorum: ratione humiditatis, conducunt siccantia, quae etiam fuere probata in humidiori crystallino. Ratione angustiae opticorum: si malum sit a sanguine: cum Aetio vena secanda: & quam primum fieri potest occipitio cucurbitula applicanda: & si non sit larga sanguinis copia, primum est aperienda vena capitis: mox cucurbita occipiti est affigenda: & praeterea totum corpus purgandum: deinde cum Paulo vomitus cum violentia prouocandus: item sternutamentum vehemens excitandum: non alia de causa, nisi vt materia angustans

angustans commoueatur, nec figatur: quia actum est, ubi figitur. Vnde in praxi vos hortor ita progredi, ut eadem hora, *Ordo medici-
na acceditis*, iubeatis immitti acrem-clysterem: deinde si sanguis camento-
est copiosus, aperiantur cephalica: eadem die post vij. horas exhibea-
rum adhi-
bis pil. fatidas, vel cochias ad 3 ū ss. Deinde caput vacuetur: & se-
bendorum
cesur vena frontis: postea vena angulorum: applicetur cucurbita in gussa
occipitis: & ilico etiam usurpetur setaceum: & fiat vacuatio per serena.
is, per nares, confestim, validis medicamentis. Et deinde cum Paulo
v) Actio caput perfundendum aqua salsa aëtu calida. Licet etiam
ascendere ad sinapismum. Oculis foveatur spongia, infusa in aqua
marina ac salsa. Probantur etiam colliria, de quibus in doctrina
suffusionis & albuginis dictum est. Et præterea statim exhibeatur
decollum è guaiaco, id est, attenuans: & hoc exhibeatur, ut possibi-
lium patientes sudens secundum caput: quod non est faciendum in
reliquis malis oculorum. Quoad vitia cerebri, totius corporis,
& ventriculi: propria capita consulantur. Hæc igitur de læsa
visione, & de præcipuis oculorum malis dicta sufficiant.

CAPVT XLIX.

De Læsione auditu.

I O Q V I M V R hic de qualibet auditus læsione: *Nomen.*
siue deprauetur, siue imminuatur, siue aufera-
tur. Generatur hoc malum, quoties organo au-
ditus aliquid præter naturam occurrit, ut vel *Generatio.*
non fiat receptio speciei auditus, vel non fiat iudicium.
Nam ad auditum efficiendum necessarium est, ut è collisio-
ne corporum durorum ita percutiatur aër, ut excitetur so-
nus, qui postea per medium aërem debet agere in senso-
rium, & hoc mouere: ut, postquam mouerit sensorium, &
postquam fuerit acceptum à facultate auditrice, iudicetur.
Quare læsus auditus est functio præter naturam auris, *Definitio.*
dependens à frustratione auditus, capite 3. libro 4. loc. affect.
capite tertio lib. primo de caus. sympt. libro de organ. odo-
ratus, capite 1. libro 3. x. c. x. Forma est functio læsa: quæ vel *Forma.*
Corrupta est, ut in sibilo & tinnitu: vel Diminuta, ut in *Subiectum.*
sublurdie, & insurdastris: vel Ablata, ut in surditate. Sub-
iectum sunt aures: per quas intelligimus, & partem Prin-
cipalem, quæ est neruus, ortus è quinto pari neruo-
rum cerebri, (non secundum omnes sui partes, sed tantum

secundum illam portionem, quæ pertinet ad principium labyrinthi, quid est prope cerebrum, non prope aures externas, in qua parum nervus est dilatus: nervus ergo expansus, est præcipua pars aures, correspondens crystallino in oculo) & partes Non principales, v: est membrana, quæ est in principio tympani item ossa, quæ constituunt meatum auditorium osseum, & cartilago, & quæ conficitur meatus auditorius externus, qui cartilagineus dicitur. Non propono illa tria ossicula, quia ad rem nostram non pertinent: errant enim valde qui credunt, auditum læd ob vitia ossiculorum: ignorant quæ anatomem.

Causa efficiens.

Causa efficiens, est frustratio facultatis auditricis. Frustratur vel ob Morbos, vel ob Errores externos. Morbus est constitutio præter naturam alicuius organi: & quod est præter hanc constitutionem, habet rationem erroris externi.

I. Quibus morbus ledatur auditus.

Quantum ad morbos: hi possunt perpendi, vel ratione facultatis Communis, vel ratione facultatis Determinatæ. Quantum ad morbos, ratione quorum non potest facultas communis operari, sed frustratur: hi morbi pertinent vel ad Cerebrum, vel ad Nervum quinti paris: hic autem per nervum quinti paris, non intelligo nervum, secundum portionem expansam, quæ locus est facultatis determinatæ: iam enim loquor de facultate communi, quæ nondum est determinata, nondum est reddita auditoria: & ob id per nervum intelligo, ut incipit à cerebro, & ductum habet.

Morbi cerebri.

Quantum igitur ad cerebrum: potissimum cerebri morbus est in via, in angustia: ut in apoplexia, epilepsia, &c. in quibus affectibus homo non audit, ratione facultatis communis, quæ impeditur ob morbum cerebri. Interdum, sed raro, contingit ob morbum frigidum: sed oportet, ut intemperies admodum sit frigida: nam secus non erit in causa læsi auditus. Notandum, ob angustiam cerebri, ita lædi auditum, ut auferatur: ob intemperiem vero non auferri, sed tantum imminui.

Densitas nervi auditorij.

Quoad nervum, secundum partem iam propositam, huius morbus est densitas: quia hic non habet foramen, ut opticus, sed habet substantiam raram: ideoque si afficiatur secundum raritatem, fiatque nervus iusto densior, tunc læditur auditus. Densitas hæc, est Remissa, vel Insignis: Integra, vel Non. Si est integra: non potest permeare facultas: unde homines lædi evadunt, secundum illam aurē, quæ est e regione illius nervi: quoniam scilicet ob densitatem facultas

facultas animalis non distribuitur in neruum expansum. Si densitas non sit perfecta & integra: non prohibetur facultatis transitus, & proinde non aufertur auditus, sed tantum imminuitur: non ob vitium nerui expansi, quem supponimus esse bene constitutum, sed ob densitatem secundum progressum illius nerui. Animalis enim spiritus est organum motus, & sensus, & proinde etiam auditus: nam sine auxilio spiritus animalis, facultas nequaquam exactissime potest operari. Spiritus autem animalis, non ea ratione concurrat ad auditum (sicut plerique falso imaginantur) quemadmodum concurrat ad visum. Nam ad visionem efficiendam necesse est, ut spiritus animalis secundum propriam substantiam producat in oculos: unde nerui optici natura perforati sunt: ut in auditu, spiritus animalis non secundum propriam substantiam perducitur in aures: sed in cerebro existens prope principium quinti paris neruorum cerebri, solis instar suos emittit radios, qui viuificant facultatem auditricem. Unde, si neruus densior est redditus, sed non integre: difficulter, & in parua copia, huiusmodi radij, auribus impertiuntur, ideoque auditus fit imminutus. Causæ obstructionis cerebri, & densitatis nerui, sæpe sunt propositæ: sed potissima causa, est pituita. Sequuntur morbi, pertinentes ad facultatem determinatam: Supponendi autem hoc loco sunt morbi noti, totius auris: ut dyscrasie, tumores inflammatorii, & non inflammatorii, item solutæ unitates: quæ vitia, ut in qualibet parte, ita etiam in auribus locum habent. Dicemus ergo de morbis pertinentibus ad auris partes. Principalis pars est neruus expansus: cuius morbus potest esse intemperies, & potissimum frigida, facta à causis refrigerantibus: nam propter hanc frigiditatem, facultas non potest iudicare, ut par est: unde auditus imminuitur. Potest etiam esse morbus in mala compositione, in densitate, in tumore: unde species debite suscipi non potest, ideoque non fit receptio, & per consequens etiam iudicium non fit, quia iudicium necessario supponit receptionem. Si igitur densitas sit integra, aufertur auditus: si non integra imminuitur. Partes non principales sunt (myninga, membranula, ita à barbaris dicta) ossa, cartilagines: mitto tria ossicula, quia cum moueantur à musculo, hic potius est instrumentum naturæ,

Morbi totius auris.

Morbi nerui expansi.

quemadmodum etiam musculi abdominis: nec enim hæc ossicula conducunt, vt melius fiat actio, sed tantum ad tutelam, seu custodiam: vt in anatomicis demonstrabimus.

Morbi myningæ.

Quantum igitur ad myningam, huius morbi sunt in mala compositione, & potissimum est densitas præter naturam, quæ est in causa, vt species soni non possit distribui intra aures: vnde aboletur receptio, si densitas sit integra: imminuitur, si non integra. Oritur autem densitas, cum ob copiam humiditatis, seu pituitosi humoris: tum propter cicatricem, quæ interdum sequitur vlcera. Sequuntur ossa, quæ constituunt meatum auditorium intimum: hic meatus ea ratione afficitur, quatenus repletur humoribus, qui à cerebro ad aures fluunt. Cartilago, efformans meatum auditorium externum, afficitur: quoties hic meatus repletur, vel à materia interna, quæ à capite confluit: vel ab externa, quoties caro plus iusto excrescit post vlcus: potest etiam repleri à quocunque tumore: item repleri potest, vt ego vidi, si quis imprudenter immittat gossipium intra aures, & ibi detineat, vt per diuturnam retentionem, concurrente aliqua humiditate, ad summam duritiem perducatur.

Morbi meatus offei.

Morbi meatus carilaginei.

2. *Quomodo auditus lædatur ob errorem externum.*
1. *Ob humorem, vel vaporem.*

Præterea auditus lædatur, ob Humorem, ob Vaporem, ob Aerem externum, & ob Aerem seu calidum ingenitum. Quantum ob humorem, & ad vaporem: si contingat, vt meatus non angustetur: tunc huiusmodi humor, vel vapor, potest permisceri cum calido ingenito auris: è qua permissione calidum ingenitum necessario euadit impurum, vt imminuatur auditus, sed ob errorem externum. Insuper, vapor dum exitum quærit, solet esse in causa tinnitus & sibilis: non quatenus permixtus est calido ingenito (nam calidum innatum, seu complantatum, insertum in neruo expansum, est illud quod recipit speciem: sensibile autem positum supra sensorium, non causat sensationem) sed quatenus cum impetu mouetur in spatio, quod est inter neruum expansum, & fenestram tympani. Dum enim vapor hic quærit exitum, vel sponte, vel impulsus: mouetur cum impetu, à principio meatus, id est, à neruo expanso, ad finem meatus, id est, ad fenestram tympani: in hoc spatio non est aer ingenitus, sed externus: & propterea dum iste vapor cum impetu motum habet in illam fenestram: percutitur ab osse, ratione cuius percussione fit sonus, & sibilus. Dum igitur

humer

humor & vapor inuicem miscentur, in meatibus illis auditoriis, osseis: vapor quærit exitum circa illas osseas, quæ pertingunt ad aërem externum, id est, circa illas fenestras tympani, & proinde percutitur ab ossibus, unde sonus editur: cum enim hic locus aliqua è parte distet à neruo expanso, à præcipuo organo auditus, hinc fit, vt hic sonus, seu strepitus sentiat, quia tunc sensibile non est positum supra sensorium.

Aër etiam extrinsecus solet causa esse tinnitus & sibili. Nam vt fiat auditus, necesse est aërem externum ingredi aures, non per myringam, per meatum cartilagineum, sed per os, per nares, ad quas partes pertingunt meatus auditorij. Et hoc est, quod optime dixit Philosophus, meatus auditorios pertingere ad aërem externum, vt hunc suscipiant. Porro aër hic externus, necessario ingreditur aures, vt coniungatur cum calido innato nerui expansi: nam, sicuti in oculis cum calido innato crystallini coniungitur spiritus animalis: vnde visionis organum luminosum & igneum vocatur, & tenuissimum, dum sermo est de calido innato crystallini, non simpliciter de crystallino: eodem modo neruus expansus, habet situm calidum ingenitum, quod debet esse aëreum, vel aëris particeps: alias enim non posset affici, seu pati à sono, cuius subiectum est aër: vnde, vt hoc organum recipiat sonum, vt postea fiat iudicium: necessarium fuit, vt calidum ingenitum esset aëreum, non luminosum. Et, sicut calidum innatum oculi conseruatur beneficio spiritus animalis, qui defluit à cerebro: ita calidum ingenitum aurium, cum sit aëreum, & aër non producat in cerebro, sed sit aër iste externus: ideo necessarium fuit, vt meatus auditorij connexum haberent cum aëre, vt aërem susciperent. Verum, quia aër, ingrediens meatum auditorium, non potest commutari in aërem ingenitum, nisi beneficio facultatis alteratricis, existentis in neruo expanso: si contingat, vt neruus expansus sit intemperatus: tunc non potest aërem externum susceptum, mutare in substantiam calidi sui ingeniti: & hic aër, dum conuertj nequit in calidum ingenitum, non potest ibi quiescere, verum commouetur & agitur in meatu illo osseo, siue in labyrintho, siue in cochlea: ac proinde fit sonus, quia aër percutitur ab ossibus: percipitur autem hic sonus, seu strepitus, quia locus ille aliquantum remotus est neruo expanso. Talis autem

2. Ob aërem
externum.

fibilis

sibilus seu tinnitus est perpetuus, quia causa est perpetua: perseverat enim intemperies, & assiduo aer ingreditur. Intemperies hæc plerumque est frigida: sed interdum etiam calidior esse potest.

3. *Ob aerem innatum.* Denique læditur auditus ob vitiū aeris ingeniti. Hæc autem ratione auditus imminui, & obtusus fieri potest: non autem potest fieri sibilus. Fit autem auditus obtusus, dum aer hic ingenitus, siue calidum ingenitum redditur vitiosum & impurum: Sicuti enim puritas organi est causæ bonæ receptionis, & exacti iudicij: ita impuritas sensorij est causa obtusi & diminuti auditus. Cur autem ob calidum innatum vitiosum, non possit fieri sibilus, causa hæc est. Licet enim aer iste ingenitus moueatur: (nam calidum innatum mouetur) non tamen ita mouetur, vt deferat neruum expansum, vt mutet locum, & ideo dicitur complantatus aer: motus autem eius est, quoniam sursum & deorsum mouetur, in eadem tamen parte, in eodem neruo expanso: quod cum ita sit, non potest esse causa sibili: quia sensibile positum supra sensorium, non causat sensationem. Redditur autem impurum hoc calidum ingenitum, & ab extrinseco, scilicet ab impuro aëre: & ab Intrinseco, quoties alimentum impurum suggeritur neruo expanso.

Differentia. Differentiæ à forma: Auditus vel est Corruptus, vt est sibilus, vel Diminutus, vel Ablatus. A subiecto: afficitur auris vel Tota, vel secundum Partem, & si secundum partem vel Principalem, vel Non principalem. Ab efficiente: auditus læditur, vel ob Morbum, vel ob Errorem externum.

Signa.

Malum in genere patet, sicut & differentiæ à forma: quia æger conqueritur de auditu deprauato, imminuto, aut ablato. Quoad differentias à subiecto: facile cognoscitur an auris sit læsa, vel cerebrum: & quæ auris pars: nam si, verbi gratia affectus sit in meatu externo: obseruabitur angustia, caruncula, cum instrumento auriculari, nec potest tangi myringa.

Signa causa efficiens.
cerebri morbi.
nerui angustia.

Quoad causam efficientem: primum, si fiat malum ob morbum cerebri: cognoscetur è signis apoplexiæ, epilepsiæ: de quibus suo loco. Si morbus sit angustia, seu densitas, secundum quintum par neruorum: cognoscetur, quia non erunt signa apoplexiæ, epilepsiæ, & vitium subito inuadit. Et prout angustia vel est integra, vel non integra: pro eo auditus modo aufertur, modo imminuitur, sed citra sibilum:

sibilum : nam ob angustiam huius quinti paris , auditus non deprauatur Si morbus fuerit in neruo expanso: *Vitium nerui expansi.* cognoscetur, quia præter id quod non sunt signa vitiati cerebri, lætio tantum est in sensorio auditus, non autem in visu, olfactu, vel aliquo alio sensorio : præterea, extra nihil mali apparet. Et quia huiusmodi neruus expansus potest lædi, & ob intemperiem, & ob densitatem : intemperies cognoscetur, quia malum fit paulatim, angustia cognoscetur , quod cito fit hoc malum, & præsertim solet contingere , quoties cohibita est aliqua consueta cerebri euacuatio.

Morbi myringæ cognoscuntur : quia observatur fluxio *Myringæ morbi.* ad illam partem : præterea æger fuit expositus aëri frigidiori nudis auribus. Si vitium myringæ fiat ex vlcere: facile cognoscitur, quando post vlcus excitatur cicatrix adeo densa, vt auditus auferatur : quod etiam contingere potest ob alias causas, vt ob fluxionem. Quare maxima diligentia est opus, vt cognoscatur an auditus sit ablatuſ, ob morbum myringæ, vel potius nerui expansi; quod sic cognoscitur. Sumatur ferrum longitudine cubiti : & vna extremitas im- *N. B.* ponatur supra dentes, altera autem extremitas imponatur, verbi gratia supra chordas citharæ : & quispiam ferro commoueat chordas citharæ : tunc, si æger sentit sonum citharæ, surditas dependet à morbo myringæ : si non sentit, surditas dependet à morbo nerui expansi, vt prorsus extincta sit vis facultatis. Nam auditus fit, quoties sonus, excitatus à percussione aëris inter duo dura corpora, recipitur in aëre, tanquam in subiecto, & per medium aërem perducitur ad sensorium auditus, nimirum ad neruum expansum.

Dupliciter autem potest perducī : primum, per meatum cartilagineum, per aures externas, & tunc oportet speciem soni permeare per myringam : idenque si myringa densior est reddita, species permeare nequit, neque cum aëre interno in tympano vniri potest, ac proinde non fit auditus. Secundo species soni perducitur ad neruum expansum, non per aures externas, sed per os, in quo sunt meatus quidam, pertingentes ad meatus osseos auditorios, per quos, propter cōseruationē calidi ingeniti semper ingreditur aër, & sic fieri potest, vt sonus percipiatur. Quare si morbus sit in myringa non in neruo expanso: ferro dentib. patientis appposito, & percussa cithara: patiens sentiet strepitum & sonitum illum. *Meatum vitia.*

Sequuntur signa indicantia angustiam secundum meatus.

Si ergo

Si ergo angustia fuerit in meatu cartilagineo, seu externo: stylo seu specillo facile deprehendetur, & manus impedimentum sentiet. Secus enim si angustia sit secundum meatus osseos, seu internos. Porro hic meatus redditur angustus, vel secundum Labyrinthum, vel secundum Tympanum. Si angustia tantum sit secundum tympanum: ager per sentiet sonum, si dentibus ferrum apponatur: si labyrintho, non sentiet: nam species, siue ingrediantur per meatum cartilagineum, siue per os, necesse est, ut permeent per fenestram illam, quæ pertinet ad labyrinthum. Distinguitur etiam angustia hæc ab intemperie: quoniam hoc malum cito fit.

*Errorum
externorum
signa.*

Quoad signa errorum externorum: si humor sit causa, ut vel aer, vel vapor plus iusto moueatur, ut non habeat liberum motum ac transitum: cognoscetur, quod aderit sibilus & tinnitus, quo assilgente, agrotantes dicent, se per sentire strepitum veluti currentis aquæ: propterea quod ratione vaporis, ut habet permistum humorem, non potest fieri sonus exactus. Si error pertineat ad vaporem sincerum, ita ut nulla permista sit humiditas, quæ obliuiat meatus osseos, aderit sibilus, instar soni campanæ: quia concussio illa fit ab ossibus, non madefactis ab humore. Si causa læsi auditus est in aëre externo: cognoscitur e tinnitu: quia aër non potest regi à calido ingenito, ideoque percutitur ab ossibus, vnde fit sonitus: est autem hic tinnitus perpetuus, quia perpetuo aër ingreditur, agitur, concutitur. Denique vitium esse in calido ingenito, seu implantato: cognoscitur e diminuto auditu: nam dum hoc calidum, quod est organum facultatis, redditur impurum: necesse est, etiam auditum fieri impurum seu obtusum: nec aderunt signa indicantia intemperiem, vel cerebri, vel nervi, vel alterius partis, de quibus suo loco.

Indicationes.

Posthabitis indicationibus inutilibus: considerabimus tantum morbos qui ex usu sunt. Obstructio, angustia, sunt morbi logici, non ex usu, nihil enim indicant, sed causa tantum ipsorum indicat. Quare morbi, in præsentia, sunt morbi ex intemperie: & præsertim intemperies nervi expansi, qui præcipua est auris pars: quare si intemperies est calida, indicat frigidum: si frigida, calidum. Præterea id quod ex usu indicat, est humor, & vapor: quæ materiæ indicant euacuanda, & discutientia: vnde & alterare, & euacuare potissimum oportet.

Quoad

Quoad differentias formales : primo intuitu videtur peior affectio, dum auditus est ablatuſ : quod tamen non eſt dicendum. Nam quamuis, dum cætera ſunt paria, peior affectio eſt ablatuſ audituſ, quam corruptuſ, aut deprauatuſ : interdum tamen ſurditaſ remouetur, & audituſ recuperatur : tinnituſ autem extirpari nequit. Propterea perpendere oportet, & locuſ affectuſ, & cauſaſ efficienteſ. Quantum ad locuſ affectuſ : quo parteſ profundioſe ſunt offenſæ, cæteriſ paribuſ : eo curatio redditur difficilior : medicamenta enim efficaciuſ agunt in parteſ proximaſ, & externaſ, quam in remotuſ & intimaſ. Quantum ad cauſaſ efficienteſ : Si morbuſ occupet neruū, vt à cerebro fertur in meatuſ auditoriuſ : curatio eſt difficiliſ. Imo hoc malum magiſ eſt contumax, quam anguſtia opticorū : quia hic neruſ non afficitur anguſtia, ſed potiuſ denſitate, & permeat per meatuſ anguſtoſ oſſeoſ, vt neque viſ Diaboli illud poſſit perducī, dum malum eſt aliquantiſper progreſſum. Et hoc ideo moneo : ne ſuſcipiaſ curatiōem, ſi malum ſit in neruo expaſo, & ablatuſ ſit audituſ ob malum nerui expaſi, & vitium aliquouſque ſit progreſſum. Et maioreſt difficultaſ, ubi adeſt denſitaſ : cum difficiliuſ ſit, euacuare, quam alterare. Si malum pertineat ad myringam, & morbuſ ſit denſitaſ eſt cicatrice, vlcuſ ſubſequentē : tunc, ſi audituſ ſit ablatuſ, actum eſt : euident enim ſignuſ eſt, denſitatem nequaquam medicamentuſ ceſſuram : ſi imminutuſ tantum ſit audituſ, & malum recens, cicatrix illa non eſt uſque adeo denſa, & poſſumus aliquid polliceri. Si vero anguſtia ſit ſecunduſ meatuſ cartilagineuſ, malum tolli poteſt, & quandoque facile tollitur : quia eſt externuſ, vt meatuſ expurgare poſſimus. Maioreſt difficultaſ, ſi anguſtia ſit in tympano : attamen aliqua ſanationiſ ſpeſ relinquitur. Quod ſi anguſtia ſit in labyrintho, & malum ſit progreſſum, vt audituſ auferatur : impoſſibilis eſt curatio, quoniam nimis eſt recondituſ labyrinthuſ, & oſſeuſ quoque : proinde tunc non debetis curandoſ ſuſcipere ægrotanteſ. Quoad erroreſ externoſ : Si humor eſt cauſa læſi audituſ : ſpeſ reſtat, quia humor euacuari poteſt. Sic etiam ſi vapor ſit : diſcuti poteſt. Si aer ſit in cauſa, quia perpetuuſ eſt ſibiluſ, ſatiſ difficile eſt hoc malum tollere, quia prodiit, ob inſignem & confirmatam dyſcratiā nerui expaſi : proinde primo quoque tempore occurrenduſ, antequam malum inualeſcat.

*Curatio.
Chirurgia.*

De materia cheirurgica, non est quod multa dicamus. Nam si in corpore redundabit sanguis: erit euacuandus, quia habet rationem causæ sine qua non. Idem de cucurbitulis statuendum. Nec est præter rationem vti fonticulis: præsertim vt homines, quæ male habent secundum vnā aurem, præferuentur, ne etiam secundum alteram lædantur: vnde in auditu etiam ablato, in qua nulla est spes salutis, possumus vti fonticulis, vt illā sam aurem, sanā conseruemus. Ad eandem intentionem probatur setaceum: ideoque si inter initia ad setaceum deueniatur, potest aliqua sanationis spes esse. Vescicatoriis quoque & auersionem & deriuationem moliri possumus.

Pharmacia.

Quoad medicamenta, non proponemus ea, quæ respiciunt totum, vel caput: de his enim alias sæpe. Id solum notandum: in morbis frigidis aurium, opus esse vehementer purgantibus: vt sunt *pilule cochia*, *euphorb.* licet etiam ascendere ad antimonium: optimum est permiscere pilulas Arabicas. Ratione capitis: profunt masticatoria, & vehementissima sternutatoria: vt cum impetu excutiat materia, quæ per-

Localia.

tinet ad aures. Topica debent esse frigida, vel calida: frigida in intemperie calida, & contra: præterea ob discussionem humorum & vaporum calida conueniunt. Frigida sunt, *la-*

Frigida.

Euca, *viola*, *nenuphar*, & si calor sit intensus, *papauer*: his tamen semper miscenda sunt calefacientia, *anethum*, *thus*, *sauvagræcum*, *chamamelum*, &c. Nam hæc & vehiculæ sunt frigidorum, & præterea conseruant calidum innatum ipsius auris. Sed vitia sæpius sunt frigida, ideoque calefacientia locum habent: sæpe etiam euocandi sunt ac discutiendi vapores: & præterea licet vti, verbi gratia, *cepa*, *colta* sub ctenitibus, *allio*, *aromatibus*, *oleis destillatis*: nam auris sustinet vehementissima siccantia: & præterea licet etiam ascendere ad castorium, ad crocum, cum aceto scilicet, ad amygdalas amaras, aristol. rutam, iridem, ameos, cum *inc.* *daucum*, *cyclaminum*, *euphorbium*, tandem ad vtrumque veratrum, ad colocynthidem. Inter initia autem potissimum permisceri debent emollientia: vt est *radix althææ*, *rad. nucum*, *rad. agrestis*,

*Modus ad-
ministran-
di.*

ammoniacum, *adeps anseris*, *anguilla*. Quod si forsitan ob calidiora medicamenta excitetur inflammatio: imponatur *unguentum rosaceum*. Hæc medicamenta varie possunt administrari: potissimum in modum Vaporis, in modum Sacculi, in modum Tentæ. Vaporis specie sic vsurpentur: *R. colocynthidis*, *ss.*, *utrinque veratri* *ʒiij.*, *euphorb.* *ʒjss.*, *cinnamomi*, *caryophyll.*

Vapor.

Sacculus.

ana ℥ j. Contundenda contundantur, incidenda incidantur crasso modo, & infundantur in vino, verbi gratia, in vini lb ij. aqua ardens ℥ ss. Misce pro vapore. Vinum hoc calefiat in aliquo vase, & vapor admittatur per arundinem, cuius vna extremitas in vas, alterum in meatum cartilagineum auris laxa pertingat. Si homo bene habeat secundum alteram aurem, hæc ne recipiat vaporem munienda est, inadesfaciendo eam vino rubro, & aqua rosacea, mistis: ne fiat inflammatio, vel attractio: nam suffumigium posset aurem sanam calefacere. Sacculus: ꝑ colocynth. utriusque veratri, ana ℥ ss. cyclamini ℥ ij. cepa ℥ ss. fiat sacculus, & calidus applicetur. Prodest etiam mox applicare panem, recens à furno extractum: & præsertim si sit medicatus. confectus cum propriis medicamentis. Tenta etiam *Turunda.* remedium est efficacissimum: ꝑ colocynth. veratri albi ana ℥ j. euphorbii ℥ ss. fiat tenta, id est, turunda excepta, vel melle, vel succo cepa, vel succo raphani. Hic autem considerata patientis natura: nam si facile toleret, tenta confici potest cum succo cepa: sin minus: cum melle: si adhuc delicatior fuerit: cum carne cavi- carum. Sic enim medicamenti datur consistentia: & for- mantur instar turundæ: quæ modo maior, modo minor erit, pro ratione auris affectæ. Tenta detineatur per 2. 3. 4. vel etiam 5. dies: nam colocynthidis, quæ proprietate ducit pitui- tam, mora hac ita deducitur à potentia ad actum, vt fiat pi- tuitæ attractio: mora etiam diuturna: pituita attenuatur ac detergetur, vt attenuata ac deterfa, à proprietate colocyn- thidis mirifice attrahatur.

CAPUT L.

De lafo Olfactu.



N genere hic loquimur de lafo odoratus: siue de- *Nomen.*
 p. auetur, siue imminuatur, aut auferatur. Pro- *Generatio.*
 dicitur hoc malum, quoties in organo odoratus
 aliqua è parte fit recessus à naturali statu. Ideoq;
 tenendum, quomodo fiat olfactus secundum naturâ. Opor-
 tet igitur, vt ab obiecto corpore vapor procedat: qui nares
 ingreditur, si corpus odorabile proximum est: si vero remo-
 tum, tunc à corpore odorabili prodit vapor, qui in aëre exsi-
 stens speciem parit, vt species per medium aërem deferatur
 in nares. Sunt enim animalia, quæ per plura miliaria per-

sentiunt odores corporum; vbi dici nequit, vapores multiplicari per tantum spatium. Porro species petit nares, per foramina ossis ethmoideis, & per foramina membranæ cerebri, ac suscipitur in carunculis mamillaribus, in substantia vaporosa caruncularum mamillarum, quæ nihil aliud sunt, quam portiones ventriculorum anteriorum cerebri: quare in substantia vaporosa species suscipitur, & in legitima substantia illarum caruncularum fit iudicium. Hinc colligitur, lædi olfactum, quoties aliquid morbificum occurrit, vel naribus externis, vel ossibus, vel membranis, vel cerebro, secundum extremitates dictas: vt sic species vel non recipiatur, vel non iudicetur, vt decet. Quamobrem Læsus olfactus est functio præter naturam narium, dependens à frustratione olfactus, cap. 3. & 4. lib. 1. de caus. sympt. cap. vlt. lib. 3. loc. affect. cap. 3. lib. 3. κ. τὸ π. Forma, est functio præter naturam. Subiectum. Corrupta. Imminuta, vel Ablata. Subiectum sunt nares: per quas intelligimus quodlibet olfactus organum.

Definitio.

Forma.

Subiectum.

*Cerebri
morbi.*

*Organi ol-
factus mor-
bi.*

Causa efficiens frustrationis olfactus, est vel Læsa facultas, vel Error externus. Læditur facultas animalis: eaque vel Communis, vel Determinata. Communis læditur à morbis cerebri: scilicet Intemperie & Angustia, Intemperies potissimum est frigidior & humidior, maxime anteriorum cerebri ventriculorum. Angustia est, vt in apoplexia, epilepsia. Facultas determinata læditur morbo organi vel Principalis, vel Non principalis. Organum principale, sunt carunculae mamillares: quæ affici possunt, intemperie & angustia: nam insignis dyscrasia potest esse causa læsi olfactus, præsertim secundum iudicium: angustia autem est causa, vt lædatur olfactus, quia species vel non, vel vix suscipiuntur, ob malam compositionem. In his etiam carunculis, est morbus quidam nativus, nimirum vitiosa proportio illarum caruncularum, qua homines non possunt ferre odores iucundos, sed magis delectantur ingratis (sicut quidam ratione ventriculi abhorrent à caseo, vt vomant, si exhibeatur) & hic morbus est reconditus, nec curatur per indicationes. Morbus organi non principalis, est angustia in foraminibus membranæ, quæ instar cribri perforata est: item angustia in osse ethmoideis: præterea, angustia in externis naribus, quæ in catarrho, seu grauedine solet affligere: item in inflammatione: in cancro: in excresecientia carnis: in tumore carnosio, qui fit à succo crasso & viscido, qui, si intra pares detineatur, sarcoma dicitur,

tur, si exstat extra nares, polypus: tandem externarū narium morbus est vlcus, quod dicitur ozæna, in quo potissimum deprauatur olfactus. Error externus, cuius ratione facultas frustratur: primum potest esse vapor putridus, scaturiens à naribus, à cerebro, dentibus, gingiuis, ventriculo, & aliis partibus: vnde olfactus deprauatur, & iniucundus euadit (sicut etiam deprauatur actio sensus tactus, in dolore:) Error etiam externus, potest esse humor, non quocunque modo, sed impactus in principali organo, in carunculis mamillaribus: qui humor causa est actionis deprauatæ, vt foetida placeant: sicuti contingit in ventriculo, dum pica adest.

Error externus.

Differentiæ à forma patent: vt etiam à subiecto, nares enim afficiuntur. Quoad efficientem: olfactus læditur læsa facultate, vel ob Errorem externum. Et si læsa facultate, vel ob morbum Cerebri, vel Principalis organi, vel Membranæ, Olsis ethmoeidis, Narium externarum. Error externus, vel est Vapor putridus, vel Humor biliosus.

Differentiæ.

Malum in genere notum est: sicut etiam differentiæ formales: num scilicet olfactus sit imminutus, ablatus, vel corruptus. Locus in genere pater. Quoad differentias à causa efficiente: & primū, quoad morbū cerebri: hic cognoscitur, quia non tantum noxa est in olfactu, sed etiam in aliis sensibus. Morbus organi principalis cognoscitur: quia est læsio, in solo olfactu unita materia fluit per nares, quia nō est angustia in foraminibus, sed in carunculis mamillaribus: præterea nō adest raritas, quæ adest dum est angustia in spōgoeide. Quod si cognouimus noxā esse in organo principali: distinguendū, an sit intemperies, vel alius morbus. Si sit intemperies, sit paulatim: si obstructio, ilico: si inflammatio, dolor præcessit, inflammato enim organo hoc principali, fieri non potest, quin & membranæ cōpatiantur: si malū organi principalis sit proportio: cognoscitur, quia odor aliis indiuiduis iucundus, huic erit ingratus: & hoc semper fit, quia vitium est natium. Si malum fuerit in mēbranæ respiratio aliqua e parte est difficilis: quia illius mēbranæ foramina conferuntur ad respirationē: neque adest raritas, quia locus ille satis est reconditus. Si in ethmoeide sit angustia: non fluit materia per nares, respiratio læditur, adest raritas, & intra nares nihil mali cernitur. At si malū sit in externis, naribus: grauedinē oculis conspicietis: similiter si adest cancer, ozæna, vlcus. Quoad errorem externum: Vapor cognoscitur, quia olfactus est deprauatus,

2.

3.

4.

conqueritur patiens de ingrato odore. A qua autem parte producat vapor, cognoscitur è propriis signis. Humor est in causa, dum est impactus: vnde interdum omnia foetida apparent, interdum, quæ boni sunt odoris displicent, & magis placent iniucunda: at hoc non semper fit, quia hoc malum non est natium, nec proportio mala est, sed vitium est in errore externo, nimirum, in humore morbifico, qui aut est putridus, aut non. Si putridus, omnia foetida apparent: si non putridus, apparent alia symptomata.

*Indicatio-
nes.*

Indicationes sumuntur à causa efficiente. Morbi cerebri quid indicent, patet. Quoad morbos caruncularum mamillarum: intemperies indicat alterans per contrarium: angustia quid indicet, patet: proportio similiter patet. Angustia membranæ, & ethmoëidis, cum pendeat à crassa & viscida materia: indicat attenuans, detergens. Quoad morbos externarum narium: quid grauedo, aut inflammatio indicent, suo dictum loco. Si cancer est: nulla spes reliqua. Vbi polypus, sarcoma: indicatur attenuatio & discussio. Ozæna, seu vlcus foetidum, quid indicet, suo loco diximus. Quoad errorem: vapor indicat dissoluens: humor, attenuans, ac detergens, quia viscidus.

*Prognosti-
ca.*

Quoad differentias formales: cæteris paribus, malū difficilius curatur, si olfactus est ablati: facilius, si imminutus, aut corruptus. Quoad causam efficientem: morbi cerebri, an possint curari, nec ne, suo loco dictum. Quoad morbos organi principalis: intemperies in habitu, vix potest amoueri, & præsertim dum est causa ablati olfactus. Dum angustia est antiqua, curare impossibile est: nam si pendet à materia pertinaciter impacta in carunculis mamillaribus, locis abditis: non est possibile remouere materiam. Secus autem si antiqua non fuerit. Proportio, quia est vitium natium, tolli nequit: fieri tamen posset, vt symptomata illud remoueretur, manente morbo interim, si suppeteret materia præsidij admodum efficax: sæpe enim actus secundus remouetur, manente primo. Angustia membranarum & ossium, satis difficulter tollitur: vbi tamen malum est recens, non desperandum. Quoad morbos narium externarum: grauedo potest remoueri, sicut & inflammatio, polypus, sarcoma, ozæna: cancer tolli nequit. Quoad errorem externum: vapores ex-
cuti, humores dissolui facile possunt: sed maiori difficultate superantur humores.

Quoad

Quoad materias præfidiorum: non loquemur de remediis totius capitis, nec de morborū cerebri cura, neq; de intemperie. Si angustia fuerit: materias auxiliorum quæretis, in angustia opticatorum. Ratione proportionis, non suppetit materia similis: sed consulo, ut, nisi aliquid prohibeat, frequenter administretis *magnas antidotos*, per os. Et, si quid prohibeat, veluti iecoris caliditas, permisceatis aquam aliquam refrigerantem. Præterea licet uti iis, quæ sunt iucundi odoris. Si vitium fuerit in ethmoide: utendum propositis in angustia opticatorum. Possunt etiam intra nares imponi, *castoreum, succus cyclamini, colocynthis, veratrum utrumque: licet etiam ascendere ad euphorbium, elaterium*. Et permiscenda sunt iucunda, ut, *aromata, moschus, asa dulcis*. Vti his possumus in modum vaporis, & in modum liquoris: Diligentia autem adhibebit minister, qui in nares instillat succos, cum pulueribus: ne portio horum medicamentorum, quæ ingrata sunt, per foramina palati in os perveniat, ideoq; æger aquam ore detineat, ut, si medicamentum in os ingrediatur, non ita facile lædat. Quoad vitia narium externarum. Quantum ad gravedinem, medicamenta patent à catarrho in præsentia tantum loquemur de polypo, & ozænis. Quoad polypum, usurpanda est materia cheirurgica, potissimum gratia totius: deinde post totius expurgationem, tumor ille ferro absumendus, nisi canerosus sit polypus. Hoc malum enim vel non, vel difficulter & longo temporis spatio remouetur. Quoad medicamenta: Gale. c. 3. l. 3. simp. probat *nasturtium, album veratrum, lotionem cum vino odorato*. Hoc etiam in polypo & sarcomate, est efficax: & *aluminis scissi, myrrba, sandarachæ, ana ʒj, gallarum, atramenti sutorij vsti ʒss fiat pulvis, quæ imponatur super polypum*. Aliud: & *misys assati ʒj. pulveris sacchari ʒss. Misc. & applicetur*. Quando ægri nolunt admittere vehementia, Galenus probat medicamentum: è granatis recentibus contusis, ita ut moderate coquatur id quod exprimitur: deir de permittere oportet ut siccetur: postea redigatur in pulverem. & applicetur: potest excipi cum melle, ut medicamentum detineatur, quantum fieri potest. Si mollior sit polypus, fiat medicamentum è granatis austeris: si durus, ex acidis. Si his non cedat malum, deneniendum ad caustica. Si fuerit ozæna, quandoq; in ozæna est crusta, quæ primo est auferenda: vnde applicetur *adeps asseris, butyrum, unguentum rosaceum, oleum cum cera & adipe gallina: Maximo etiam prodest vapor aquæ calidæ moderate*.

Curatio.

Ad obstru-
tionem
ethmoidis.

Ad polypum.


Ad ozænam.

vt horum beneficio crusta reddatur mollis, & facile possit remoueri. Et cum facta fuerit emollitio, probatur sternutatio, quia tunc crusta expellitur. Crusta remota: oportet vlcera, quia sordida sunt, mundare. Si sordities est remissa: vti possumus saccharo, melle, pulu. rosarum, pulu. scabiosa, &c. nec improbatum unguentum de cerussa: praesertim si suspicio sit alicuius inflammationis. Si maior fuerit sordities: tunc confugiendum ad ea, quae magis siccant, & mundificant. Sed aduertendum: an haec vlcera ita sordida, sint corrosiua, nec ne? Si corrosiua fuerint, siccantibus vtendum, & astringentibus: vt est succus rubi cum alimine. Si sit corrosio vehemens: eschara est excitanda, deinde adimenda. Excitatur causticis. Quibus tollatur, diximus. Et si patiens est fortis: oportet escharam efficere cum ferro candente. Eschara ablata: vtendum mundificationibus, vt de ratro praesertim albo, nasturtio, calamintha cum melle, sulphure cum aceto: in vso est oleum sulphuris, & chalcantio: passim vti vnguento Aegyptiaco, & pastillis illis siccantibus, Androm., Pasionis, & Polydo. Quoad errorem externum: hic est Vapor, vel Humor. Si vapor sit extra nares: occurrendum illis partibus, a quibus promanet: vt si procedat ab ore, gingiuis, &c. his prospiciendum medicamentis propriis. Si vapor reperiatur in naribus: et evaporatio facta curetur discutientibus medicamentis, & quae sintul sunt iucundi odoris. Verbi gratia ex aniso, danto, feniculo, cum vino odorato: vapor enim in tali prodiens vino, reliquos vapores potest discutere. Quoad humores impactos in carunculis: mantillaribus: horum causa vtendum illis, quae habent vim attenuandi, quae sunt calida & tenuis substantiae: de quibus diximus in cura angustiae neruorum optico-rum.

CAPVT LI.

De narium Hemorrhagia.

Definitio.



Hemorrhagia critica, & symptomatice.

HEMORRHAGIA narium, est exiens mutatum sanguinolentum narium, cap. vlt. li. de diff. symp. cap. 2. li. 3. de caus. symp. tex. aliquot. lib. 3. prophet. Dicitur exiens sanguinolentum: ad differentiam aliorum mutatorum, quae per nares possunt egredi. Cum autem sanguis per nares non egrediatur secundum naturam: sit vt hoc exiens, toto genere sit praeter naturam. Quod si tamen fluxus narium sit criticus, & tempestiue fiat: non est toto genere praeter naturam, imo secundum naturam: at fluxus sympto-

sympto

Symptomaticus per nares, toto genere præter naturam est, & ratione materiæ fluentis, & ratione temporis. Dicitur, exiens mutatum narium: ad differentiam egredientis per alias vias. Sanguis autem, qui per cavitatem naris egreditur, interdum fluit à venis arteriisque cerebri, è quibus descendens egreditur: interdum à vasis narium fluit, quæ à palato prodeunt, & ad nares perreptant.

Porro hoc exiens mutatum est symptoma, quod insequitur aliud symptoma, & necessario sequitur actionem læsam, nimirum læsam retentionem: si enim in venis retineretur sanguis, non efflueret. Actio autem cum lædatur, vel læsa facultate, vel ob errorem externum: statuimus in hæmorrhagia narium, actionem lædi, non ob errorem externum, sed læsa facultate. Quoniam vero facultas vasorum læsa est: necessario morbus erit in vasis. Et hic morbus secundum Gal. est *Διήρσις*, *Διαιρήσις*, vel *Αντισμωσις*. *Διήρσις* est soluta vasorum unitas: quæ producitur vel ab Interna causa, ut à sanguine copioso, frangente venas, à sanguine calido & mordaci, à sanguine flatuoso & rumpente: vel à causa Externa, ut à contundente, ab incidente: unde post plagas fluxus sanguinis sequitur. *Διαιρήσις* est morbus non in soluta unitate, sed in mala compositione, & conformatione, nimirum, raritas secundum vasorum substantiam: dum enim tunicæ venarum & arteriarum, propriam servant densitatem, sanguis continetur: ubi autem iusto humidiores & rariores evadunt tunicæ, sanguis egreditur. Fit hic morbus à sanguine tenui & aquoso. *Αντισμωσις* est immodica apertio orificiorum vasorum: etque morbus in mala compositione, seu conformatione, nimirum, in via: ac producitur vel à causa Interna, ut à sanguine: vel copia, vel caliditate nimia expultricem irritante: unde facultas insurgens, tanto sanguine impetu propellit, ut vasorum orificia recludantur: vel à causa oritur Externa, quæ vim habet relaxandi, ut balneum aquæ dulcis.

Causa.

Cap. 2. li. 5.
meth.

Differentiæ à forma: Fluxus narium est Criticus, vel Symptomaticus. A loco: progreditur è vasis Cerebri, vel Narium: vasa, sunt Venæ, vel Arteriæ. A causa efficientes egreditur ob Diæresin, Diapedesin, Anastomosin.

Differentiæ.

In genere hæmorrhagia facile cognoscitur. Quoad differentias à forma: si fluxus est criticus: salutaris est: nam symptomatica, quæ ante fluxum homines exercebant, evanescunt, & fluxus facile fertur: ac si est symptomaticus: interdum

Signa.

fluxus ægre sustinetur, & pulsus euadit languidior. Differētiæ à loco: Si egreditur à venis narium, ægri molestiā quandam in naribus sentiunt: præterea hic fluxus facile cedit medicamentis, quia locus est proximus: adhuc causæ prægressæ, ostendunt potius nares, quam caput. Si egreditur è venis cerebri: fit contra: maxima enim cum difficultate coercetur fluxus, quia locus est reconditus: causæ morbificæ occupant potius caput, quam nares. Vtrum fluat à vena, an vero ab arteria, facile cognoscitur: si enim ab arteria: sanguis est admodum calidus, flauus, tenuis, & magno cum impetu egreditur: contra, si è vena: erit rubicundior, nigricans. Quoad causam efficientem: an sit soluta vnitas, raritas, apertio orificiorum: facile cognoscitur: vbi enim est raritas, multa copia non egreditur. Num sit reclusio orificiorum, an soluta vnitas, cognoscitur è prægressis causis, quas prius attulimus, quæ possunt vel continuum soluere, vel orificia aperire, de quibus etiā in doctrina de dolore capitis: vbi quoq; proposuimus causas, producētes sanguinem calidum, aut flatulentum, &c.

*Indicatio-
nes.*

Si fluxus est criticus, nequaquam est coercendus, nisi sit immodicus: tum enim eadem indicat, quæ symptomaticus. Hic ergo indicat, quod sit coercendus. Si fiat à soluta vnitate: poscit remedium vniens, glutinans: si à raritate, condensans: si ab immodica apertione, astringens. Sed causæ etiam vtile indicant, potissimum sanguis: qui, vt copiosus, indicat minuens, vt calidus, refrigerans: vt tenuis, crassificans, vt flatulentus, discutiens: vt impetum habet, reuellens. Vt autē à variis causis producit, varia indicat, verbi gratia si fiat à iecore calidiore, indicatur remedium refrigerans iecur, &c.

*Prognosti-
ca.*

Quoad prognostica: potissimum quoad fluxum symptomaticum, hic modo magis, modo minus periculosus est, & ratione loci, & ratione causæ efficientis: ratione loci: si procedat à vasis cerebri, periculosior est quam si à vasis narium: & si ab arteria, quam si à vena. Ratione causæ efficientis: facile sedatur, si fiat ob raritatem: non ita facile, si ob reclusionem: ægerrime, si ob solutam vnitatem. Vnde, quo sanguis fuerit copiosior, calidior, tenuior, maiori cum impetu agitatus: eo malum est contumacius.

Venæsectio.

Quoad materias cheirurgicas, probatur venæ sectio: sic enim minuitur sanguis, refrigeratur vniuersum corpus, & proinde nimius sanguinis feruor adimitur: & cum venæ sectio sit materia remedij reuulsorij, huius beneficio com-
pescimus

pescimus impetum sanguinis. De usu. Si summa est vehementia, expedit confertim sanguinem vacuare, usque ad animi deliquium: si minus, repetitis vicibus, usu ita poscente, sanguis detrahi potest. De loco: aperienda vena cubiti dextri, si sanguis egreditur è nare dextra: sinistri, si è nare sinistra. Galenus cucurbitulas applicat, è directo naris affectu, modo sinistro hypochondrio, modo dextro. Non dicemus de frictionibus, ligaturis dolorificis: quibus utendum, ceu materia reuellente.

Materiae medicinales multae possunt proponi. Lenientia, praeparantia, purgantia, alterantia, ex alibi traditis constant: nam si malum sit à sanguine feruente, qui generatur à iocinore calidiore: utemur *sero Lectis, aquis Beatae Virginis, aquis Veronensibus*, & similibus refrigerantibus. *Medicamentum ta generat.*

Sed ratione loci affecti probantur, quae habent vim refrigerandi, & constringendi. Quaedam etiam occulta iuuant qualitate: ut, succus stercoris recentis asini, intra nares impositus: pulvis cochlearum ustorum, cuius drachmis singulis, commiscetur singula uncia cretae, addaturque acetum rosaceum, & hoc medicamentum, fronti applicatum, mirifice iuuat. Laudantur etiam *iaspis*, & *mentha* de collo suspensa. Rhases probat basilicum cum caphura: licet enim ocimum proprietate occulta iunet, quia tamen calidum est, nocere potest, unde caphura ei miscetur: id quod in aliis etiam huius generis faciendum. Prodest pulvis è sanguine draconis, acacia, hypocistide, & aliis id genus, permixtis cum omphacio, cum succo cydoniorum, &c. quae possunt intra nares imponi. *Medicamentum ta specia-*

De potu. Abstinendum à vino: nisi virtus magis possit ad indicandum: quia vinum calfacit, & petit caput, unde fluxus narium augetur: Virtus tamen imbecilla, requirit propter spiritus, dum syncope imminet, aut leipothymia. Vinum ergo detur oligophorum, & in pauca quantitate, permixtum cum frigida: & actu propinquetur frigidum: sic enim succurremus virtuti languenti, nec fluxum sanguinis multum intendemus. *Num vinum conueniat.*

CAPVT LII.

De Affectibus dentium.

DENTES consideramus, vel quatenus Generantur, vel quatenus Geniti sunt. ca. 8. & 9. li. 3. v. r. x. *Dentium affectus.*

Dum oriuntur infantibus, difficulter & cum dolore producuntur: ideo agendum de difficili den-

zium ortu. Dum geniti sunt, aut Actu læduntur, aut Ne lædantur metus est. Si periculum læsionis imminet : huius ratione agendum de præseruatione dentium. Si actu dentes afficiuntur, vel Dolent, vel Perforantur, vel Mouentur, vel Perferre nihil queunt, vel Colore aliquo vitioso afficiuntur.

I. De dentitione, seu ortu dentium difficulti.

Causa.

Oritur hoc vitium ob crassitiem gingiuarum, & earum visciditatem. Ideo gingiæ sunt emolliendæ & extenuandæ: dolorque, qui acerbus esse solet, mitigandus.

Curatio.

Oboliendæ sunt gingiæ lacte asinino, vel canino, quod à proprietate iuuare creditur. Gale. lib. 3. c. 104. Præterea secundum Auic. prodest litus ex oleo liliorum, & amygdalarum dulcium, si nonnihil cyperi addatur, nimirum semiserupulus ad oleorum unciam. Virgente dolore, Auicennas ascendebat etiã ad succum solani. Verum non est vtendum hiisce valentioribus, nisi dolores sint maximi. Tutiora possunt cõparari auxilia ad dolorẽ simul & crassitiem: si gingiæ infantis obliantur butyro recenti, loto è decocto lactuca. Galenus remedium commendat appropriatum, corticem cochlea de collo suspensum: ego vero dentes eo tangi seu gingiuas maluerim.

II. De præseruandis à noxa dentibus.

Præseruandi sunt dentes, vt permaneant temperati, stabiles, & mundi. Vnde cauendum à masticatione durorum, vt ossium: à nimium vel frigidorum, vel calidorum contactus maxime cauendum, ne quis post vsum frigidorũ, ilico vtatur calidis, vel contra: cum natura non ferat has repentinas mutationes. Galenus pro præseruatione dentium probat, vt decoquantur radicem sithymali in vino, usque ad consumptionem vini dimidijs, & eo decocto semel in mense inungamus. A corrosione præseruantur, si perfricentur alumine & myrrha: quod si hoc medicamentum nimis videatur astringens, melle excipiatur, verbi gratia ℞. iam dictorum ʒ. β. mellis ʒ. β. Præterea Galenus, ad reddendum dentes nitidos, odoratosque, & ad præseruandum à dolore, & erosionẽ, à motu: dicit, bonum esse medicamentum ex hyssopo, tragacantha, & sphondylis: hæc tria, excipiantur melle & sale, cum pauco pipere puluerisatũ & refricentur dentes. Actius medicamentum proponit, cuius vsus per 7. dies à dolore præseruat dentes: ℞. succi racemorum vitis alba lb. j. β. corticum rad. mori ʒ. j. β. coquantur ad con-

sumptionem medietatis succi: & hoc medicamento abluantur dentes, ante prandium, & ante cenam, per dies septem continuos. Auicennas etiam fricabat dentes melle, saccharo, sale: tum ex vino abluere. Denique remedium hoc prophylacticum est facillimum: semper dentes à sumptu cibo sale fricentur, & ex vino abluantur.

III. De dolor dentium.

Dentes pulsante dolore afficiuntur, ut Galen. lib. 5. c. 10. c. proprio, ait: ad radicem enim dentium nervus inseritur, à tertio pari nervorum cerebri unde dentes in radice dolent, non in superiori parte, quod apparet, dum dentes lima abradimus citra dolorem. Pulsans fit dolor, ratione affectus inflammatorii: potest autem dens tali affectu corripui, quoniam augetur, ut recte Aëtius explicat. Dum enim nervus, denti insertus, proprium alimentum allicit, huiusque portionem in propriam substantiam convertit: quod tunc restat, & non potest in substantiam converti, residet in cavitatibus dentium: & quia est excrementum nervi utile, ideo non putrescit, sed augetur dens, & quia augetur, inflammatorio quasi affectu afficitur, & sic dolore pulsante. Porro dolor dentis, est tristis sensatio, dependens à solutione continui dentis. Excluditur hac definitione dolor gingivarum, & nervi: quamvis ex hoc loco, omnium horum dolorum curatio, manifesta esse queat.

Dolor dentium, dependet à soluta unitate interna. Soluitur unitas ab Intemperie, & Materia. Intemperies potest esse quaecunque, tum Simplex, tum Composita: frigiditate tamen potissimum dentes afficiuntur, quæ nervis, ossibus, dentibus inimica est, aphorism. 18. sectio. 5. Materia, solvens unitatem, est Corpulenta, vel Vaporosa. Corpulenta, est Excrementitia; & Alimentalis. Excrementitia potest esse materia quaecunque, & Putrida, & Non putrida, & interdum etiam Vermes prodeunt à materia putrida. Alimentalis materia, est excrementum illud utile nervi, quod dens veluti inflammatione afficitur: hæc tamen non est vera inflammatio. At gingivæ vere possunt inflammari, & dum inflammantur, affectio dicitur *πυλὴς*: quod si gingivarum etiam caro augeatur, huiusque ratione dolores fiant, affectio dicitur *πυρρὴς*. Materia vaporosa & flatulenta interdum urget in radice dentium: aliquando vapores à ventriculo prodeuntes, dentes percuti, & hi acidiores esse solent. Quantum ad externas causas,

De sensu dentium.

Definitio.

Causa efficiens odontalgia.

causas, solet fieri dolor dentium ex acidis, vt ex acido lacte, è sorbitionibus, & esculentis acidis, atque acerbis: quia hæc acerbæ tanquam comprimunt, & sic continuum soluant.

*Differētia
doloris den-
tium.*

Dolor dentium modo est grauius, modo constrictius, interdum exasperatiuus, quandoque mordicatiuus, aliquādo pulsus, nonnunquam stupidus, qui *apud* dicitur, estque dolor, dentibus proprius. Aliud enim est, si stupore dentes afficiantur, qui dolor stupefactiuius dicitur, non stupidus: sit autem hic dolor, ob causas refrigerantes, non soluentes continuum, sed tollentes sensum: item cum nervus dentis est obstructus, aufertur sensus, & non est dolor, sed stupor, qui via est ad paralyin: hic dolor stupefactiuius, vel est in dente, vel in nervo, vel in gingiuis: & nascitur à causa interna, vel externa.

*Signaculum
sorum.*

Signa generalia notissima sunt: æger enim de dentis dolore conqueritur. Quoad signa differentiarū à forma: nū dolor sit stupidus, vel mordicans: æger referet: Quoad differentias à loco affecto: oportet cognoscere, an sit dolor in gingiuis, vel in corpore dentis, vel in nervo substrato: si in gingiuis, adertunt signa inflammatae gingiuarum, color gingivarum erit mutatus, & dum gingiuarum digitis comprimuntur, dolor reddetur intensior: dolor medicamenti cedit, quia doloris causa est in superficie. Si vero dolor sit in nervo, vel in dente, contra fiet: nam compressis gingiuis, dolor non augebitur. Vtrum vero sit in dente, an nervo: distinguendum. Si in dente, dolor non ita profundus ab ægro percipietur: potest aliqua esse mutatio in dentis colore: patiens dicet, dolorem molestare tantum secundum longitudinem dentis. Si in nervo, dolor sentietur profundus, & non molestabit secundum longitudinem, sed distendetur potius secundum gingivas, sicut nervus extenditur, vnde potius secundum latitudinem dolor percipietur. Quoad cognitionem causarum efficientium, verum fiat à causa interna vel externa: ægri referent, num præcesserit causa externa, necne. Si causa sit externa, signa intemperiei, è doctrina de capitis dolore, petantur. Signa materiæ: vt sanguinis, dolor grauius, & sapor subdulcis: pituitæ, dolor extensius, & vel falsus, vel insipidus: melancholiæ, dolor obstructiuius, & sapor acidus: bilis, dolor mordax, & sapor amarus. Si oriatur à materia alimentali dentis: erit dolor pulsans, color dentis ad liuorem verget, non in superficie tantum, sed in toto dente.

dente, ideo oportet limula aliquantisper dentem conterere, quod fit sine dolore: quando vero color dentis in superficie mutatur, dum dentes sunt immundi, id non fit ratione alimentis, sed ob alias causas post tradenda.

Dolor indicat mitigantia dolorem. Causa, si intemperies: alteranda per contrarium. Si materia: tum, si hæc est impasta: erit discutienda, & eradicanda: si non impasta: reprimenda & reuellenda: habita tamen potius primo ratione.

Indicationes.

Dolor dentium intensissimus est, & maioris momenti, quam dolor capitis. lib. 1. x. r. quod verum est, ratione symptomatum: at ratione causarum, dolor capitis multo est periculosior, & multo maioris momenti, præcipue si est intra cranium: causa enim propior est cerebro, & multa mala minatur, cæcitatem, apoplexiam, epilepsiam, &c.

Prognostica.

Cheirurgia refertur vel ad sanguinem in corpore existentem, vel ad dentem. Sanguis enim quando doloris causa est: euacuandus venit: ut in dolore ac inflammatione gingivarum. Addit Rhasis in dolore per consensum, à parte sanguine repleta, venam esse secandam. Pro reuulsione secunda est vena cubiti. Hirudines admouere possumus venis gingivarum. Secundum Auicennam, cucurbitulam scarificatam applicare licet. Quantum ad cheirurgiam, quæ dirigitur ad dentem: ait Galenus, si dolor est in profundo, perforari posse dentem acu ignita: ubi tamen cauendum, ne reliqui dentes & gingivæ afficiantur: ideo pasta, vel cera dentes sunt oblinendi. Si cætera non conueniunt: dens extrahendus, si dolor est in dente, non in nervo, aut gingivis: debet autem extrahi, si est perforatus, vel mobilis: alias minime, quia febres & inflammationes fieri possunt.

Curatio.

Medicamenta quod attinet: pro euacuatione capitis, non utendum masticatoriis, sed apophlegmatismis, vacuantibus piritam. Galen. lib. 10. meth. iubet masticare staphisagiam: sed tamen masticatoria non conueniunt, quia non debemus euacuare caput per locum affectum: proinde Galenus in hoc masticatorio non utitur, pro capitis euacuatione materię, quæ dolorem in dente causat, quæ materię fluxa est: ea propter enim vult nos dolente dente uti debere masticatorio.

Apophlegmatismi, cuius gratia hic in usum veniant.

Localia, quædam respiciunt Dolorem, quædam Causas doloris. Dolor remouetur, interdum medicamentis citra extractionem dentis, interdum dens extrahitur medicamentis,

Topica.

1. Ad dolorem.

Anodyna.

de

de quibus suo loco. Medicamenta, quæ referuntur ad dolorem, sunt mitigantia dolorem: e quibus mitiora primum vsurpanda, vt decoctum violarum, decoctum seminum & florum lactuca, florum nymphaeæ, postea adscendendum ad valentiora, ad mandragoram, ad emulsionem seminum papaneris albi, ad solatrium, (quo semper sine delectu utebatur Archigenes, quamobrem recte à Galeno reprehenditur.) Et si dolor sit inter-
nus, ratione penetrationis, addatis aliquid aceti: si autem in gingiuis sit dolor, non utendum aceto, sed lacte, & præcipue asinino. Vsu poscente, si videlicet syncope ob dolorem immineat, opio utendum, vt quando dolor profundus est, sumatur opij ḡ j. acroci ḡ j. addatur modicum sape, & dolore sopito ilico os ablatur decocto saluie, rorismar. maioran. hyssopi: possunt etiam hac in vino decoqui, vt sic noxa, ab opio

2. Ad causam
doloris.
Gingiuarum
inflammas-
tio.

impressa, adimatur. In gingiuis existente dolore, ad causam tollendum leuioribus uti possumus: validioribus, si dolor sit in neruo & dente. Ad tollendum autem dolorem gingiuarum, progredimur eum reprimentibus & discutientibus. Reprimentia, si validiora sint, faciunt in gingiuis quid simile contusioni, quia intus comprimunt. Discutientia, si validiora sint, inducunt quid simile abrasioni, quia abradunt gingiuas. Proinde non validioribus, sed leuioribus in gingiuarum dolore utendum, quia gingiua est proxima. Hinc Galenus proponit oleum lentiscinum, quod fieri debet à suco expresso à fructibus lentisci. Oleum hac altitudine admoveatur, namque moderate reprimat & discutiat. Inter initia possumus miscere aliquid olei rosacei. Tum progrediemur cum decocto meliloti, postea fenugraci, malua, caricarum, præcipue pinguium, quibus in statu utendum: post addenda quæ magis discutimus, vt decoctum à malua, maiorana, rorismarino. Acetum vitetur in cura gingiuarum, secundum Aetium: aut sit paucum, non admodum acre, mistum cum aliis medicamentis. Si dolor esset in gingiuis, vt hæ fierent cruentæ, Galenus sumit duas partes aloes, unam aluminis, myrrhe tantundem, & hunc puluerem gingiuis adhibet: cessante autem fluxu sanguinis, gingiuas melle abluit.

Gingiuæ
sanguinolenta,

Aquæ dia-

Si dolor dentium sit stupidus: fricentur dentes portulaca, & hac masticeatur, nam cum ille dolor fiat ab acidis, exasperantibus, per dentorem portulaca tollitur. Si acida exasperantia sint friabilia, tum non possumus uti portulaca, verum oleo communi, butyro pinguedine aliqua, vt anatis: item lacte asinino, quod

optimum est, ob crassitatem : possumus etiam dentes sale fricare, & tepida post ablucere.

Dolore non existente stupido, si fiat ob caliditatem, Dolor è caliditate. occurreremus refrigerantibus, quæ fuere proposita : acetum est optimum, item decoctum violarum, lactuca, hordeo, acetosa, &c. Quidam tantum sentiunt calorem, ut ipsis dens comburi videatur, quos Aetius sic curavit: sumpsit niuem, miscuit eam melle & oleo rosato, atque tepidum hoc, non actu frigidum, dentibus admonuit. Ad eandem quoque intentionem, Auicenna imponit succos propositos : & caput inungit oleo rosacea & aceto, ut sic refrigerato capite, postea etiam dentes per consensum refrigerentur. In dyscrasia frigida, utendum contrariis, superius propositis : præcipue confert fomentum ex sale & milio. Aetius etiam abluit os cum decocto è pyrethro, è rore marino, è nigella, è calamintha montana, dictamno Critico, & aliis. Decoctio fiet in aceto : fieri etiam potest in vino, quod calefacit. Ut autem prohibeatur exulceratio, quam calida hæc facere possunt, Galenus utitur succo rosarum, & permiscet aliquid lactis, præcipue asinini. Auicennas probat, si dente dolente masticeetur pyrrhrium, lutenum oui assati, panis calidus statim atque è furno extrahitur, unde etiam huius panis evaporatione in dentes prodest. Conducunt fomenta ex sale & milio frictis, & orobis, quæ quidem extrinsecum applicabuntur. Galenus & Auicennas hoc medicamentum usurpant : Munis aliis dentibus cora, aut pasta, sumatur ramusculus schœnanthi, qui igniatur, item pyrethrum in oleo feruentissimo excalescitur, admotoque specillo tangatur dens : huius medicamenti, ut causa sit recondita, inuenerunt tamen.

Si dolor fiat à sicca intemperie, conferunt humectantia : Dolor è siccate. ut butyrum, adeps gallinaceus, quibus dentes inungantur : os coluatur lacte asinino, decocto malua, sanugreci, caricarum pingui. Astringentia ledunt : unde à medicamento è moris facto plurimos noxam percepisse Aetius scribit.

Si dolor causatur à materia, conueniunt Reprimentia & Discutientia. Reprimentia, ratione materiae nondum impactæ : ut decoctum è gallis immaturis, è rosis, è floribus malorum gradatrum, ex horum cortice, & hac decoquantur vel cum posca, vel cum vino astringente : prodest item diamorum. Discutientia respiciunt materiam iam impactam, suntque calida : quæ quidem in frigida dyscrasia proposuimus. Notandum

VERO,

vero, sit ne materia hæc corrupta, an vero alimentaria. Si corrupta & putrida, interdum generantur vermes: ideoque occurrendum suffumigio ex alio, porro, siordia, radice cucum. agr. colocynthide: magis confert uti suffumigio, quam his admotis os ablueri, quia admodum essent ingrata. Si materia est alimentalis, ut in dolore pulsante: Galenus probat nucleum persicorum, & permiscet cum myrrha, cum aristolochia, pulvere iris, & aliis, quæ siccando copiosum alimentum absumunt.

*Vfus pro-
positorum
medicamē-
torum.*

Hæc de remediis: pauca iam de vfu. In affectu frigido, medicamenta sunt adhibenda calida, in calido tepida: Utentur enim actu frigida: discutientia sunt calida, repercutientia tepida. Utendum his medicamentis & ante prandium, & ante cœnam, 4. horis post prandium, & quidem pluribus vicibus.

*Tumantia
per idioru-
negotia.*

Sunt quædam medicamenta, occulta proprietate agentia, ut cornu cervi vstum & tritum: dens canis mortui, si comburatur in furno, & vstus cum pasta misceatur: senecta serpentis, combusta, trita, cum melle permista, dentibusque adhibita: ranunculus admotus brachio è directo dentis dolentis, confert ratione remissionis: quia exulserat & vesicam excitat.

*Medica-
mēta dentē
extrahen-
tia.*

Postremo dentis dolor tollitur, medicamentis, quæ dentem extrahunt: unde Galenus pyrethrum per 40. dies macerat in aceto acerrimo: si morat ferre non queamus, pyrethrum aceto incoquatur acerrimo, ad consumptionem trium quintarum, ut si sumantur 3 x. decoquantur ad consumptionem 3 vj. supra dentem dolentem ponatur. Eodem modo vititur succo tishymali. Actui vermes terrestres ficas, combusti & aspergit: & deinde limula dentis aliquam portionem tollit: sed ego magis confiderem in pyrethro. Licet autem hæc medicamenta non è toto dentem euellant: in causa tamen sunt, ut facile dein extrahi queat. Dicta medicamentis respondere debet.

III I. De perforatione dentium.

Curatio.

Perforantur dentes à succo erodente. Vitium est manifestum. Indicantur vniuentia solutam continuitatem, & exstipantia illum succum vitiosum. Solutam quidem vnitatem tollere non possumus, at prohibere possumus ne maior fiat. Ergo quoad cheirurgiam, licet accipere ferrum ignitum, & in foramen dentis perforati immittere: quia sic vlcera- tio non procedit ulterius: prius tamen aliis dentibus prospiciemus.

ciemus, eos pasta vel cera muniendo: urgente necessitate demum ad hæc confugiendum. Deinde medicamenta debent esse discutientia, & astringentia.

V. De mobilitate dentium.

Mobilitas dentium oritur secundum Galenum, à causa *Cause.* Interna, vel Externa. Interna est defectus alimenti, ut in senibus, quod etiam fieri potest in conualescentibus, & in his qui inedia utuntur: deficiente enim alimento, dentes minuantur, & locelli sunt ampliores. Idem fit ob nimiam humiditatem nervi, qui substernitur radicibus dentium. Fit etiam ob succos & humores abradentes, ut in morbo Gallico. Item ob diminutionem gingivarum: vel quia abraduntur gingivæ, vel quia cruentæ sunt. Externa causa, est ictus, plaga, &c. Indicatio oritur reficiendi, si est defectus alimenti: siccandi, si nervus humidior: & sic de aliis causis: precipue tamen notandum, astringendas esse gingivas iis, quæ ad firmitatem dentium conducunt. Hæ indicationes omnes possunt absolute excepta in senibus alimenti refectione.

Quoad cheirurgiam: si dens movetur ratione ictus, sicque accadat, ut nimis promineat: limula tollitur prominentia: postea occurreretur astringentibus, & reprimentibus, *et rosæ, et malicorio.* Si causa mobilitatis sit interna, ut defectus alimenti in senibus & aliis ætatibus: conveniunt tum cibi, tum astringentia. Si nervus humidior: profunt siccantia: ut *pompolyx, pulvis ireas, myrrha, &c.* Si in causa sint succi vitiosi: conveniunt discutientia, proposita prius. Si fiat ob immunitas gingivas: in dolore gingivarum medicamenta tradimus. Circa victum notandum, ut homines comedant liquida, non mastificent, sed potius sorbeant: quia dentes mobiles difficulter mastificant.

Indicationes.

Prognostica.

Curatio.

V.I. De hebetudine dentium.

Hebetudo dentium, est affectio manifesta, ca. 8. lib. 5. a. 1. in ea nec frigida: nec calida homines ferre possunt. Fit interdum à calore, plurimum tamen à frigore, interdum ob exquisitum sensum: si postremum, nec calida, nec frigida ferre queunt: si frigus assit remissum, non possunt ferre frigida, quia frigida intemperies à frigidis læditur: si vero intentus sit vel calor, vel frigus, tunc patiens nec calida, nec frigida potest ferre. Et hoc experimento probatur: Sint enim

Cause & Signa.

duo, quorum alter habeat manum frigidissimam, alter frigidam tantum: uterque eodem modo, eodemque tempore, admoueat manum ignis: qui manum habet moderate frigidam, non sentiet dolorem, sed iuuabitur: at qui manum habet valde frigidam, sentiet maximum dolorem: nec enim ferre potest contrarium propter summam resistantiam manuum frigiditatis.

Indicationes.

Quoad curam, si fiat à calore, refrigerandum, si à frigore, calfaciendum: si ob sensum exquisitum, refrigerandum & crassesciendum: nam refrigerantia, sensum minuunt seu obtundunt: incrassantia tollunt tenuitatem, & raritatem dentis, quæ secundum causam est. Quod si exquisitus hic sensus insit à principiis generationis: difficulter tollitur.

Prognostica.

Medicamenta.

Galenus & Auicennas, in frigore videntur olea parata esse synapi: in calore videntur portulaca, capura. Sed notandi, in sensu exquisito, cum capura (&) succo lactuca miseri debere astringentia.

VII. De nigrore dentium.

Per nigrorem intelligimus colorem nigrum, non lividum, qui fit ob copiam alimenti in dolore pulsante. Nigredo dentium oritur ob succos vitiosos, qui in superficie hærent.

Tollitur, autem pulvere cornu ceruini, aristolochia, (&) ossium sepiæ: quo sæpe fricandi dentes: deinde lima abradingi: denique abluendi vino odorato. Ita (&) dentes redduntur nitidi, & oris halitus suauis.

CAPVT LIII.

De faucium affectu, qui Angina dicitur.

Nomen.



ANGINA hoc capite de exquisita angina: de qua etiam Galenus loquitur: cap. 3. lib. 4. de loc. affect. Ideoque considerabimus anginam, tanquam affectum inflammatorium. Ac proinde, si vel ad asperam arteriam, vel ad œsophagum descendat catarrhus, seu materia pituitosa: angina illud vitium statui non debet. Verumtamen de exquisita angina ita loquemur, ut, quid notha, seu spuria sit, inde quoque elucescat.

Generatio.

Ad generationem exquisitæ anginæ, necessarium est, ut sanguis in fauces confluat, & ita suscipiatur, ut meatus ad fauces pertinentes comprimantur, adeo ut hinc difficilis sit tum respiratio, tum deglutitio.

Definitio.

Quare angina exquisita, est compressio faucium, procedens

dens ab inflammatione, c. 3. l. 4. de loc. aff. com. 18. l. 3. prog. com. 20. l. 4. de vict. aph. 34. sect. 4. aph. 22. 16. sect. 3. aph. 33. sect. 2. l. 1. prophet. cap. 20. lib. 4. de caus. puls. com. 30. lib. 4. de rat. vict.

Forma est compressio, quæ est species angustia: nam angustia prædicatur de subsidentia, de coalescentia, de constitutione, de obstructione, & de compressione: quæ differentia hic explicanda non est, sed supponenda: proponitur à Galeno in l. de diff. morb. Loco igitur formæ statuimus compressionem: ratio patebit è causa efficiente. Quamvis hæc definitio non prorsus est formalis: nam in angina necessario læditur respiratio: ut angina formaliter potius sit symptoma, quam morbus, seu compressio. Nos autem curationis gratia tradidimus per morbum, per causam efficientem, sed non admodum remotam. Ideoque hæc definitio est causalis, non formalis.

Subiectum, sunt fauces: per quas intelligimus illam capitis partem, quæ constituta est è gula, & larynge, id est principio tracheæ arteriæ: siquidem in angina ut plurimum utraque pars afficitur, licet modo hæc magis, modo illa. Locus affe-
ctus.

Causa efficiens, est inflammatio: qua angina exquisita, à notha distinguitur: quemadmodum per subiectum, distinguitur angina ab inflammatione glandularum iuxta linguam. Per hanc etiam causam, distinguitur ab oedemate, & scirrho: qui tumores si quandoque fauces occupent, non est angina exquisita, sed notha. Præterea, ex hac causa illud etiã colligitur, angina angustiam esse compressionem, non obstructionem: nam dum inflammatione afficiuntur muscoli, spectantes ad fauces: est necessariũ, ut meatus ad fauces pertinentes angustentur: unde hæc angustia est compressio, quia fit ab inflammatione. Huc ergo respiciens Gal. com. 20. l. 4. de ratione vict. ait, anginam esse inflammationem, ut inflammatio sit anginae genus: nam indicatio ex usu, non sumitur ab angustia, vel compressione, sed ab inflammatione. Et hinc patet anginam, procedentem à luxatione vertebrarum colli, non esse legitimam: nisi forte ad luxationem vertebrarum subsequatur inflammatio. Porro, cum inflammatio sit tumor sanguineus: per sanguinem possumus intelligere, & biliosum, & pituitosum, & melancholicum. Exquisitissima tamen angina est, quæ fit à sanguine feruente & bilioso. Causa generans sanguinis biliosi, est hepar calidius, Causæ fluxionis sanguinis explicatæ sunt in phrenitide: fuit enim sanguis

quandoque per modum Attractionis, veluti si fauces plus iusto calefiant, aut dolore afficiantur: quandoque fit fluxio per Transmissionem, si fauces sint imbecilles, laxæ, aptæ ad suscipiendum.

Differentia.

A forma non sumuntur differentie, nisi secundum Magis & Minus: quia omnis angina exquisita est compressio. A subiecto sumuntur differentie, notatu dignæ, quæ maxime conferunt ad prognosticum, & curationem: de quibus Gale. loquitur, com. 18. lib. 3. progn. c. 3. l. 4. de loc. aff. aph. 34. sect. 4. Subiectum, sunt fauces: quæ pertinent ad guttur, & ad oesophagum seu gulam. Fauces ergo interdum magis sunt inflammatae secundum Guttur, interdum secundum Oesophagum. Si inflammatio magis afficit guttur: pertinet ad partes gutturis, vel Internas, vel Externas. Si ad internas, verbi gratia, quando afficiuntur illi muscoli, qui laryngem mouent, ad vocem efficiendam: fit Cynanche. Si inflammatio occupat potius externos gutturis musculos, fit Paracynanche, quæ via est ad cynanchen, quia inflammatio musculorum externorum, nisi diligens medicus prospiciat, progreditur ad musculos etiam internos. Si inflammatio magis afficiat gulam, inflammari possunt muscoli Interni, vel Externi. Si interni, dicitur Sinanche. Si externi, vocatur Parasynanche. Quoad causam efficientem, cum sit inflammatio: potest hæc inflammatio esse tumor vel Biliosus, vel Pituitosus, vel Melancholicus. Angina quidem, quæ fit à pituita, est notha: sed quæ fit à sanguine pituitoso, est exquisita, verum non exacte. Quomodo autem detur vitium, exacte vel non exacte exquisitum, in doctrina de febribus dicemus. Sumuntur etiam differentie, ut sanguis in angina efficienda fluit, per modum vel Attractionis, vel Transmissionis.

Signa.

Vitium hoc in genere facile cognoscitur: quia ægrotantes euidenter conqueruntur de angustia circa fauces, unde impeditur & deglutitio, & respiratio: præterea hæc angustia non est sine dolore. In oedemate, & proinde in angina notha, est angustia: sed sine dolore: quia hæc materia non habet illum imperum, ut soluat continuum. Sed in exquisita angina, quomodocunque sanguis fluat, siue per attractionem, siue per transmissionem, eoquit imperu, ut soluat continuum, & dolorem excitet: quia sanguinea materia est calida. Præterea in angina exquisita necessario est febris, & quidem continua: si autem sit notha, non necessario est febris.

Formales

Formales differentie facile cognoscuntur, num compressio sit insignis, vel remissa: prout scilicet acri magis, vel minus conqueruntur de angustia. Quoad differentias a subiecto: si sit cynanche, ubi scilicet affecti sunt musculi interni: cognoscitur, quia adest orthopnoea, non possunt spirare: nisi recta ceruice, quoniam difficilissima est respiratio: dolor est admodum acerbus: præterea in partibus externis non cernitur aliqua mutatio in colore, quia malum est intus. In paracynanche, dolor non est ita acerbus: nec respiratio ita difficilis, ut in cynanche: præterea circa ceruicem apparet aliquis tumor compressa ceruice, dolor exacerbat, quia inflammati sunt musculi externi. Synanche cognoscitur: quia adhuc minor est respirationis difficultas, quam in paracynanche: sed deglutitio maxime difficilis fiet, ut vix possit aqua permeare. In parasynanche deglutitio quidem erit difficilis: sed multo minori difficultate fiet respiratio: præterea rubedo apparebit in ceruice: persentietur dolor, loco contrectato, quia inflammatio extra vergit. Quoad causas efficientes: facile cognoscetur, an sit sanguis biliosus, an pituitosus, an melancholicus, è propriis signis: verbi gratia, si sit sanguis biliosus: dolor erit admodum intensus, sensus caliditatis vehementissimus, febris insignis, ardentissima, &c. Facile etiam cognoscetur, num fluat per modum attractionis, vel transmissionis: ut in doctrina de phrenitide diximus. Verbi gratia, si ante anginam prægressus est in ceruice dolor, vel aliquis calor: indicandum est, fluxam esse materiam, per modum attractionis: sin minus, per modum transmissionis.

Indicationes desumendæ ab his quæ sunt ex usu: quare *Indicationes.* pro vario sanguinis peccato, variæ hauriendæ sunt indicationes: verbi gratia, biliosus sanguis & calidus, indicat refrigerantia. Præterea in phrenitide diximus de reprimentibus & aliis. Nec hic repetenda sunt frustra.

Malum hoc periculo non caret: quia afficitur locus deglutitioni destinatus, & spiritui: præterea est annexa febris continua, quæ maxime calori innato aduersatur, ut omnes actiones naturales laedantur. Quare si mitior occurrat angina, non parum ea est facienda: quia nisi medicus diligenter progrediatur, lethalis euadere potest. Quoad differentias: varie prognosticandum. Quoad compressionem: quò compressio est vehementior, eo magis timere oportet. Similiter cynanche est pessimus affectus, et ante quartum interficiat.

Prognostica.

Com. aph.
11. sect. 1.

quandoque eodem die: secundum Galenum, com. 16. 17. 18. lib. 3. prognost. & vt dicam, quod sentio, ferine omnes moriuntur. Minus est periculum in parasygnâche, quia afficiuntur muscoli externi: vnde hæc ad septimum protrahitur: interim tamen & ipsa satis est periculosa. Synâche adhuc minus est periculosa, quam parasygnâche: quia respiratio minus læditur, licet in synâche maxime lædatur deglutitio, vt nec aqua permeare possit: at, sine cibo aliquantisper manere possunt homines, sine respiratione non possunt: & hoc eo magis, quod in angina maxima est respirationis necessitas, cum propter febrem augeatur necessitas euentandi calorem cordis. Omnium minime periculosa est parasygnâche: quia parum læditur respiratio & deglutitio: est quidem læsa deglutitio, sed non est ablata: nam potio potest permeare. Quoad causam efficientem: si fiat à sanguine melancholico, seu atrabilario: actum est. Si à sanguine pituitoso: potest quidem tolli, sed est diuturnior. Tandem, notandum: si in angina tanta sit respirandi difficultas, vt per os spuma erumpat: nunquam curationem esse aggrediendam, sed cito futuram mortem prædicendam: signum enim hoc lethale est. Hæc spuma eiusdem est naturæ, & easdem habet causas quas etiam habet spuma in apoplexia.

Chirurgia.

Venæsectio conuenit: quia sanguis habet rationem causæ principalis: nam inflammatio est affectus sanguineus: attamen, prout magis vel minus sanguinea est inflammatio, pro eo etiam sanguis in maiori vel minori quantitate est educendus. Celerrime autem in angina ad venæsectionem confugiendum, dummodo assunt permittentia: nam in hoc morbo sanguinis præsentiam consequitur insignis vehementia sanguinis: læditur enim respiratio: sine qua vita consistere nequit. Quoad vbi agendum: in angina sanguis reducere solet in toto, in capite, & in faucibus: quare ratione sanguinis in toto existentis, secanda est vena cubiti: & magis quidem cubiti, quam pedis: quia per venam cubiti non modo vacuatur sanguis in toto existens, sed aliqua etiam fit derivatio, à faucibus: vt expediat etiam secare venam magis proximam, scilicet cephalicam, quoniam etiam ad caput respicimus. Deinde propter sanguinem, subsistentem in capite, expedit secare venam capitis, & applicare hirudines post aures. Post aecedendum ad locos magis proximios, & aperiendam venam narium. Tandem aperiendam venam sub lingua. Non tamen

tamen in quolibet ægro ita procedendū: sed pro necessitate. Nam si per venæsectionem insigniter minuatur malum, non deberis cruciari ægrotantes: vbi autem malū est contumax, dicto modo procedendum. His administratis, si malum vergere videtur ad externas partes, adiuuanda est materia, & ceruici cucurbitulæ scarificatæ applicandæ: quando enim reliquæ sanguinis euacuationes sunt administratæ, maxime confert mouere sanguinem ad circumferentiam: vnde Gale. dixit, aph. 37. sect. 6. bonum esse, si tumor extra appareat: Et sic materia ad circumferentiam attrahenda. Ego in hoc casu nihil dico de sectione illius partis, quia his temporibus desideratur, qui sciant operari. De cucurbitulis, quibus vti licet loco venæsectionis, alias diximus.

Medicamenta respiciunt totum & fauces. Totum respicientia sunt, quæ vacuant humorem in corpore peccantem, siue sit pituita, siue bilis, siue melancholia. Et in hoc malo oportet festinare: quia summa est vehementia humoris, impetum ad fauces habentis: vnde læditur respiratio, & mors imminet. Mea igitur sententia, magis potest hæc materia, quatenus auget tumorem faucium, quam possit materia furiosa. Materia enim furiosa, eam ob causam vacuanda est ante coctionem: quia periculum est, ne perat partem principalem, & sic mortem inferat. Sic & in angina imminet mors, quia læditur respiratio. Quare in praxi obseruandum, vt electiue educentia, ilico post sanguinis euacuationem propinentur, non ante. Verum, quando synanche est cum synanche, id est, quando tumor detinet fauces, & secundum guttur, & secundum gulam, vt difficilis admodum sit respiratio & deglutitio: tunc non est dandum pharmacum, sed clysteribus acrioribus vtendū: verbi gratia in angina biliola hoc modo. *℞. decolli maluanum, centaurij minoris, &c. lb j. el. de succo ros. (nam scammonium recipit) ʒ iij. mellis ros. ʒ ij. ot. communis ʒ iij. salis communis ʒ ss. Mis. pro clymo.* Multo acrior debet esse clyster, si angina sit pituitosa. Si tantum synanche infestet, vt difficilissima quidē sit respiratio, sed deglutitio non sit ablata: detur pharmacū in potu, non in bolo, verbi gratia in angina biliola hoc modo. *℞. rhab. el. ʒ iij. fiat infusio in decocto fructuum, & facta diligenti expressione adde manna ops. ʒ iij. Mis. fiat potio breuis.* Post hanc potionem detur seri lactis caprini a lb j. ad lb ij. Potione quidem vacuatur bilis: vt autem vanatio fiat cura insignem caliditatem corporis, quia adest febris,

Pharmaceutica.

exhibetur serum lactis: Nec præter rationem est in tali angina, etiã sequenti die serum ad lb ij, vel iij. exhibere.

*Localia.
Reprimen-
tia.*

ut Quoad topica inter initia licet vti reprimentibus, ne inflammatione angeatur: & propterea succus mororum maxime præbatur, unde diamoron in vsu est. Et possumus succum mororum, vel etiam diamoron dissolvere cum aqua rosacea, plantaginis, cum aqua portulacæ. Deinde vero potestis addere nonnihil sapa, ut mitigetur vitæ dolor: postea nonnihil sacchari ad detensionem: & præterea potestis ascendere ad usum mellis. Et maxime solet conferre medicamentum illud è nucibus: & potestis inter initia miscere succum malorum granatorum, cydoniorum. Urgente necessitate, quando observatur insignis fluxus, non solum ad rhinopsosiorum, emphacium, sed etiam ad balanarium, malicorium, ad hypocistidem, nuciam ascendendum. Sed his non utendum sinceris permisceri debent glycyrrhiza, iuniba, passila, cariea, &c.

Notandum, in angina quandoque dolorem esse acerbissimum, cuius ratione maxima potest fieri attractio: propterea ad hunc mitigandum, medicamentum non tantum fieri debet è iunibis, sanigræco, passulis, sapa, &c. sed ascendendum etiam est ad serum lactis, & urgente necessitate, ad ipsum lac. Sed agrotantes hæc non deglutiant, verum in ore detineant, & exspuant. Addere etiam licet semina papaveris albi, quorum ʒ ss. miscendam sapa, vel etiam cum lacte. Et his potissimum vti licet in angina biliosa. Si autem sit pituitosa, locum non habent hæc vehementer repellentia: vtrum diamoro possumus addere decoctum è nucibus expressi. Et postea oportet sensim ascendere ad resolventia: quibus vti licet in quacunque angina.

*Resolven-
tia.*

Nam sicut Galenus, cap. 10. lib. 13. meth. in dissolutione materiæ iisdem utitur medicamentis, tam in phrenitide, quam in edthangosita nos in qualibet angina, iisdem vti possumus resolventibus. Quare ægri in ore detineant medicamentum, confectum è carickis, sanigræco, è mulsæ cum origano, cum hyssopo, thymo, calaminta montana, pulgrio, &c. his enim vti licet, præ resolutionis materia. Præterea extrinsecus ad cervicem medicamentis utendum, non quidem reprimentibus, nam interficeretur æger: sed hoc, vel simili, tuto inter initia vti possumus. R. flor. cassia nuper extr. ʒ ij. sapa ʒ ss. caricarum ʒ ij. et amygd. dul. ʒ j. Mis. & applicetur: dolorem enim mitigat citra vaporsionem. Ad idem propositum possumus applicare panem, decoctum cum lacte: & possumus addere oui vitellum: ita enim dolor mitigabitur. Procedente malo, oportet etiam ad discutien-

tia-ascendere:& si dolor vigeat, hoc modo medicamenta
miscere possumus: ℞. sape (ratione doloris) floris cassia nuper
extir. ana 3 ℥j. nidi hirundin. 3 vj. (ratione resolutionis: solet esse
admirabile medicamentum) Misc. fiat emplastrum, & applicetur.
Procedente malo, non contenti sitis solo nido hirundinis:
sed cum eo misceatis resolutentia, quæ fuere proposita, ut
sunt ruta, pulegium, &c. Maxime probatur cinis cochlearum, can-
crorum. Sumantur horum cinerum 3 ℥j. nidi hirundinis 3 vj. aceti,
vel mellis sciliceti 3 ℔. & cum oleo resolutius fiat medicamentum.
Probatur etiam ceratum sacrum, cerine, & similia resolutentia.
Vrgente necessitate, opus est confugere ad sinapismos, quibus mase-
ria enocetur ad partes externas.

Quoad victum. Cum ægri deglutire nequeunt, cannula
immittenda intra gulam, ut fiat cibarium deglutitio. Sed
quando adest inflammatio in illa parte: nimis irritatur. Pro-
pterea consulo, ut non, nisi maxima necessitas vigeat, ad
cannulam hanc confugiatis. Probo magis, ut paretur ali-
quod instrumentum, ad modum fistulæ, quod imponatur
prope œsophagum:& præterea adsit vesica, munda, repleta
potione nutriente, & hæc vesica sit appositæ fistulæ, ut in
clysmis fieri solet: post impetu quodam vesica compri-
matur, ut etiam cum impetu potio illa deducatur
ad œsophagum. Quosdam despe-
ratos, ob famem, fistulæ huius
beneficio restitu-
tos vidi.

Instrumē-
tum ad fa-
ciliorem
deglutitiō-
nem com-
paratum.

FINIS LIBRI PRIMI.

Bb 3



PRACTICÆ

MEDICINAE,

LIBER SECVNDVS.



DE THORACIS, ET PARTIVM
EO CONTENTARVM AFFECTIBVS.

CAPVT I.

De Tussi morbosa.

*Methodus
explican-
dorum af-
fectuum:
de qua &
supra, s. 7.
lib. 1.*

TN morbi tractandis ordine resolutiuo uti solemus: nam gratia finis versamur circa nomen, essentiam, species & signa: gratia autem principiorum, quibus finem assequi licet, agimus de indicationibus, prognostico, & de materiis præsidiorum: Quæcum ergo ad vitia attinet ventris medijs, seu thoracis: agemus de Tussi morbosa, de Asthmate, de Pleuritide, Empyemate; Peripneumonia, Sanguinis sputo, Phthisi, Palpitatione cordis, & Syncope.

Nomen.

Tussis, Græcis $\beta\epsilon\gamma\alpha$ dicitur. Estque alia Morbosa, quæ præcedit à causa aduersaria expultrice: alia Non morbosa, quæ fit concurrente sola voluntate, citra expultricis molestia. Nos in præsentia de morbosa dicemus: in qua euidenter admodum & efficaciter fit strepitus: ad differentiam illius accidentis, quod præcedit tussim, & $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\alpha\sigma$ dicitur: quod vitium respondet nausæ, quæ vomitus est $\alpha\epsilon\iota\delta\epsilon\mu\alpha\varsigma$ cap. 4. lib. 2. de caus. sympt. $\kappa\lambda\epsilon\psi\tau\alpha\varsigma$ enim est levis impetus tussendi, & differt à tussi secundum minus. Sic ergo de tussi loquemur, ut etiam pateat quid sit agendum circa $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\alpha\sigma$.

Sed

Sed priusquam tradatur definitio, cognoscendum est, primo, quæ sit morbi natura: secundo quomodo fiat tussis morboſa. Quoad primum vt ſciatur quænam ſit morbi eſſentia: oportet intel ligere, quonam modo fiat operatio ſecundum naturam, quomodo ratione morbi lædatur operatio. Quare dico, ad edendum operationem, poſſiſſimum tria; & ea quidem neceſſario, concurrere: vnum eſt, quod præcipuum locum ſibi vendicat, & præcipuus operationis eſt auctor, nimirum Facultas, quæ conſtituit, vt Qv o. Alterum eſt Suppoſitum, quod concurrit vt Qv o d: quo ſenſu Philoſophus dixit. non pupillam videre, non viſum, ſed oculum totum. Tertium eſt id, quod gratia operationis concurrit, vt e v m Qv o, id eſt, vt instrumentum, (non vt principale agens, quod eſt anima) vt instrumentum præcipuum (ad differentiam non præcipui) quod nihil aliud eſt, quam Conſtitutio, (ad differentiam calidi innati.) Hinc ſequitur, vt dum bene habent hæc tria, bona fiat operatio, neque ſit operatio læſa propter morbum: contra, vt actio euadat morboſa, neceſſe eſt, vt hæc tria male hæcant. Primum quidem quoad facultatem, neceſſarium eſt, ſi debeat lædi, vt fruſtretur: ita tamen vt hæc fruſtratio neceſſario pendeat à vitio & ſuppoſiti & instrumenti, ad differentiam fruſtrationis facultatis, dependentis ab errore externo, quia tunc non eſt morbus. Quare facultas fruſtratur & læditur, (quamvis proprie loquendo, facultas lædi nequeat, quia non ſuſcipit magis & minus) dum eius fruſtratio non dependet ab errore externo, ſed à vitio ſuppoſiti, & instrumenti, id eſt, conſtitutionis. Vt morbus, formaliter acceptus, ſit læſio facultatis ſeu impotētia facultatis ad agendum: & hac ratione formaliter omnis morbus eſt in ſecunda ſpecie qualitatis. Quoad ſuppoſitū, quod cōcurrit, vt Qv o d. neceſſariū eſt, vt male afficiatur: nā ſuppoſitū bene affectū, bene operatur, vbi eſt, intra limites ſanitatis. Quare, cū ſanitati opponatur agritudo, eſt neceſſariū, vt male ſit diſpoſitū. Ergo ratione ſuppoſiti, omnis morbus eſt diſpoſitio præter naturam. Et hoc modo omnis morbus eſt in prima ſpecie qualitatis. Quoad instrumentum, quomediante agit ſuppoſitum, aut ſuppoſiti facultas, cum hoc instrumentum ſit ſuppoſiti conſtitutio: ſicuti, dum conſtitutio eſt ſecundum naturam, bona eſt operatio: ita, dum eſt præter naturam læditur operatio. Quare ratione instrumenti præcipui omnis morbus eſt

De morbi
natura, in
genere.
Operatio-
nis tres
cauſæ.

Operatio
tribus læ-
ditur.

est constitutio præter naturam. Sed hoc loco notandum, constitutionem esse genus quoddam subalternum. Generis autem subalterni natura, cum seruetur in natura suorum analogorum, fit ut constitutio, quæ consistit in temperie, pertineat ad qualitatem, quæ in compositione, ad magnitudinem, ad numerum, & secundum hanc rationem constitutio dirigitur ad prædicamentum quantitatis. Sicut ergo omnis morbus, ratione facultatis & suppositi est in prædicamento qualitatis: ita ratione instrumenti, id est, constitutionis, modo est in qualitatis categoria, modo in alijs. Hinc fit, ut varie morbus definiri queat. Nā ratione facultatis, morbus est læsio facultatis: ratione suppositi, morbus est dispositio præter naturam: ratione instrumenti, morbus est constitutio præter naturam. Notandum autem hæc tria ita se habere, ut læsio facultatis, & dispositio præter naturam, pendeant à constitutione præter naturam, non contra: & propterea tantum constitutionem, nū læsionem facultatis, non dispositionem præter naturam esse morbum, ex usu indicem utile. Non tamen hoc est statuendum de omni constitutione præter naturam: nam obstructio, verbi gratia est constitutio præter naturam non tamen ex usu, quia sublata obstructionis causa, ilico obstructio tollitur. Et hoc significavit Gal. cap. 1. l. 1. de loc. aff. inquit, dari morbos usque adeo solutu faciles, ut quamprimum tollitur causa efficiens, ilico evanescat morbus. Hinc facile colligitur, constitutionem esse causam continentem (de qua tot nugæ proferunt multi) & læsionis facultatis, & dispositionis præter naturam. Quamobrem, necessario morbus fit, quoniam facultas læditur: læditur autem facultas, quia suppositum male disponitur: Suppositum autem male disponitur, seu afficitur, quoniam eius organum læditur, quoniam redditur præter naturam suppositi constitutio. Morbus ergo formaliter est læsio facultatis. At si definiatur effectiue, & primum non ex usu, id est, ut non indicet utile, est dispositio præter naturam. Quod si definiatur effectiue: sed ex usu, est constitutio præter naturam.

*Morbus
varie defi-
niri potest,
pro varia
considera-
tione læsio-
operatio-
nis.*

*Tomus
non cypri.*

*Generatus
fis.*

Quomodo porro efficiatur tussis, colligitur è Galeno c. 7. l. 4. meth. cap. 3. & 4. l. 2. de sympt. caus. Cum igitur tussis significet strepitum quendam, formatum in larynge ob aërem percussum à larynge, beneficio musculorum: scidum est, hunc non esse quemlibet aërem, sed eum, qui à pul-

mone in laryngem effertur, & cum violentia quadam impellitur: impellitur autem ab expultrice pulmonis, ut pulmo est destinatus & attractioni & emissioni aëris. Quare dum pulmo virtute sua expultrice aërem expellit, duo requiruntur: scilicet muscoli, & id quod irritat expultricem. Musculi quidem necessarij sunt, quia pulmo ad tussim efficiendam impellit aërem per arterias, per tracheiam, quæ cū sit cartilaginea non potest ita constringi, ut noxa per aërem vehementer commotum expellatur: ideoque hæc agitatio sine musculis fieri nequit. Sed oportet etiam adesse irritans, seu molestandus, quod agit in pulmones, præsertim secundum asperas arterias, & potissimum secundum asperarum arteriarum membranas, quatenus hæ membranz sunt sensus participes: Fit ergo tussis, quoniam aër, vi efflatus, impellitur à pulmonis expultrice, irritata, & adiuta à musculis.

Quare tussis formaliter ita definiri potest: quod sit vox, dependens à larynge, aërem vi efflatum percutiente. Nam *Definitio formalis.*

vox, ut sonus, est motus aëris percussi: ideoque sonus in larynge, est motus aëris, sed vi impulsivi, seu efflati. Quare forma in hac definitione, est vox, seu sonus, seu motus. Subiectum, est aer, vi efflatus. Causa efficiens, est larynx percutiens. Verum hæc formalis definitio potius pertinet ad philosophos, nec est ex usu, id est, non indicat utile. Propterea tussis effectiue ita est definienda: quod sit efflatio violenta, tracheæ pulmonis, dependens ab expultrice, adiuta à voluntate, & irritata, ut irritans expellatur. Porro causa finalis hic apponitur, quia, licet agamus de tussi morbosa præter naturam, accidit tamen interdum, ut hæc sit utilis. Idem enim statuit Galenus c. 3. lib. 5. loc. aff. ubi ait, tussim esse accidens naturale, non quod sit secundum naturam, sed quod sit symptoma spectans ad facultatem naturalem: nam per tussim expelluntur quæ sunt infesta: sicuti etiam expelluntur per sternutamentum, per singultum, per nauseam. Et huc etiam quadrat, quod cap. 17. lib. 2. simpl. dicitur, tussim esse passionem ingentem causa salutis, ut quæ guttur infestant, expellantur. Gratia ergo huius utilitatis proposuimus causam finalem. Cæterum, in finitione etiam diximus, tussim esse efflationem violentam. Sic cap. 3. lib. 2. de sympt. caus. tussis dicitur, exitus aëris incitatus: & cap. 4. lib. eiusd. dicitur vehementissima efflatio. Et com. 12. sect. 1. lib. 1. epid. dicitur, tussim fieri à spiritu concitato, vehementer impulsio. Sed

Definitio effectiua.
Finis.

Forma.

Subiectum

cum

cum efflatio sit symptoma, & quidem actio, necesse est, vt
 • pertineat ad aliquod membrum: quare in definitione dixi-
 mus, tracheiæ, seu asperæ arteriæ. Addimus, pulmonis: nam
 Galenus. cap. 5. lib. 2. de sympt. caus. ait, musculos vehe-
 menter se innicere pulmoni, vt multam, celerem, seu vehe-
 mentem moueant efflationem. Et c. 10. lib. 2. de crisi-
 bus dicitur, pleuram, quæ vicina est pulmoni, huic communicare
 affectionem, vt fiat tussis. Patet igitur tussim pertinere ad
 pulmones: non tamen ad quasuis eius partes, sed ad asperas
 arterias. Hinc Galenus aph. 46. sect. 6. dixit: si tubercula in
 pectore, in pulmone existentia, nihil emittunt, fieri diffici-
 lem respirationem: si autem hæc tubercula aliquid emittant
 ad asperas arterias, tunc fieri tussim. Et cap. 8. lib. 7. de vsu
 part. ait: si sanguis effundatur ex arteriis laxibus in asperas,
 fieri tussim. Hoc modo etiam alia Galeni loca intelligenda
 sunt. Dum enim c. vlt. lib. 4. loc. aff. dicit, in hepatis inflam-
 matione tussim fieri: sciendum, tussim excitari tunc, quan-
 do ab hepate caliditas, vel vapor impertitur pulmoni. Sic ca.
 5. lib. 4. loc. aff. dicitur, sanguinem, guttur irritantem causare
 tussim: scilicet quatenus per medium guttur pulmo affici-
 tur. His & Auicenas assentitur, inquiens, tussi expelli nocu-
 menta à pulmone: & addit, præter pulmonem alia etiam ef-
 se membra, sed communicata pulmoni, cum tussis fieri ne-
 queat, nisi vitium communicetur pulmoni: quare concludit,
 tussim fieri affecto pulmone, vel primario, vel per cõsensum.

*Causa. 1.
 expellens,
 seu mouen-
 tes.
 Facultates
 pultrix.*

Sequitur in definitione: dependens ab expultrice. Nam
 statuimus, in tussi efflationem illam violentam esse actio-
 nem facultatis expultricis. Vnde Galenus, com. vlt. l. 3. de
 iis, quæ inoffic. med. ait, tussim esse motum præter natu-
 ram facultatis naturalis, ad differentiam vitalis: & quidem,
 expultricis pulmonis, & pectoris. Addit cap. 4. l. 2. de causis
 sympt. hanc facultatem expultricem esse vnã e facultati-
 bus naturalibus. Et cap. 6. dicit, expultricem, ob vehemen-
 tem motum se concitare in tussi vehementer, ita vt tussis
 sit motus quidam expultricis, sed validus. Sic etiam Auicena
 ait, tussim esse e motibus, quibus natura expellit, quod con-
 tristat. Postea in definitione diximus: adiuta à voluntate.
 Nam Galenus c. 4. l. 2. de sympt. caus. statuit, musculos pecto-
 ris concurrere ad tussim, dum contrahunt pulmones. Et l.
 5. de loc. aff. ait: tussim excitari à validissima & celerissima tho-
 racis constrictione. Et c. 8. l. 4. de loc. aff. ait: siue vehementi

*Musculi po-
 thoracis.*

thoracis

thoracis constrictione tussim è statu dignam non fieri. Et com. 43. lib. 2. progn. ait, tussis causam principalem esse duplicem, vnam esse id. quod habet initium motionis, significans facultatem voluntarie motricem, quæ vna est è principalibus causis, siquidem per violentam thoracis constrictionem, spiritus foras pellitur, & secum materiam educit. Ergo prima causa è principalibus, est facultas mouens, non spiritus, vt male quidam in margine notant, qui profitentur Græcas literas, interim tamen Galenum tantum in superficie intelligunt. Notandum, quod Auicénas dicit, facultatem hanc motricem, spectare ad musculos pectoris, & ad septum transversum. De musculis pectus contrahentibus, difficultas non est: sed de septo. Hoc ergo, licet non contrahat pectus, sed tantum dilatat, attamen conducit ad tussim: quia dum fit dilatatio, attrahitur & inspiratur copiosus aer, per septum, qui sic copiosus attractus, mox per contractionem copiosus etiam excernitur, & sic in causa est, vt tussis vehemens fiat. Qua de re legatis etiam interpretes Auicennæ. Cæterum thoracis muscoli, alij sunt superiores, alij intercostales. E superioribus concurrunt quintus & sextus musculus. Ex intercostalibus, qui pertinent ad costas exquisitas, exteriores muscoli non concurrunt ad tussim, sed interiores: at exteriores, qui spectant ad costas nothas, auctores sunt contractionis, & proinde tussis. Addit Galenus cap. 15. l. de vl. part. musculos abdominis, qui & ipsi sunt auctores motus voluntarij. Præterea diximus, irrita: nam expultrix nõ sponte concurrat, sed irritata. Vnde Galenus c. 4. l. de sym. caus. ait, tussim esse motum facultatis naturalis, quæ cogitur à causa morbifica. Quod etiam proponit c. 3. & 6. l. eiusd. Et comment. 43. l. 2. progn. ait, principalem causam esse materię vitij, quod irritat expultricem. Postremo diximus: vt irritans expellatur. Hinc enim distinguitur morbosa tussis, à non morbosa. Vnde Galenus c. 4. lib. 2. de sym. caus. ait: in tussi propelli materiam, vias obstruentem: idemque ait, com. 3. sect. 5. lib. 6. epid. aph. 2. sect. 4. cap. 7. lib. 2. simpl. medicament. Porro causa irritans, secundum Auicennam, est Interna, vel Externa. Interna est vel Coniuncta, id est, immediata, vel Antecedens, id est, mediata. Coniuncta causa, secundum Auicennam est effectus causæ corporeæ, id est, effectus materię morbificæ: qui effectus, vel est Intemperies, vel Solutio unitatis, vel Cõpositio morbosa. Intemperies, est

Num dia-
phragma
ad tussim
faciat.

Quinã mu-
sculi ad
tussim cõ-
currant,

2. Causa ir-
ritantes.

Dyscrasia.

est calida, vel frigida, vel humida, vel sicca, vel sine materia, vel cum materia, & potest esse cum qualibet materia sanguinea, biliosa, pituitosa, & melancholica. Hic Auicennas non proponit materiam purulentam: quia cognouit, propositas materias posse in pus mutari. Deinde notandum, quod Auicennas statuatur, intemperiem humidam sine materia, causam tussis esse posse. Licet enim non soluat continuum, quia tamen morbosa est, & proinde infensa potest causa esse, non quidem doloris, quia nondum fit solutio unitatis, sed alicuius tristici sensationis: quemadmodum etiam contingit, ut ratione grauitatis, materię aggrauantis, fiat sensus grauitatis, non dolor, quia materia aggrauat & contristat, citra solutionem unitatis. Eodem etiam modo, humida intemperies sine materia, quatenus noxa est, potest esse causa tristici sensationis, ut expultrix insurgat ad expellendum, sed citra solutionem unitatis. Postremo notandum, per intemperiem, esse intelligendum intemperiem inæqualem, ut proponit Galenus cap. 4. lib. 2. de sympt. caus. & cap. 8. lib. 4. loc. aff. Ut plurimum autem causa tussis, est intemperies frigida: unde Galenus ait, cap. 13. lib. 5. meth. tussim fieri, refrigeratis instrumentis spiritus: & recte quidem, nam cap. 4. l. 2. de sympt. caus. ait, si soli muscoli afficiantur, non fieri tussim, sed eam effectiorem, quæ dicitur *αίγρες*. Sed notandum, si tussis fiat ab intemperie sine materia, eam vocari tussim siccam, seu aridam, sicut etiam nuncupat Galenus com. 12. sect. 1. l. 2. epid. & aph. 54. sect. 4. Dicitur autem tussis sicca, quia nullum adest sputum, nulla expuitur materia. Et hæc de intemperie.

Soluta unitas. Præterea Auicennas inter causas proximas recenset solutam unionem, quam vocat resolutionem singularis, ut contingit in phthisi: & hæc soluta unitas est materię mordacis de qua agitur in doctrina de phthisi. Tadem inter causas proximas, proponitur mala compositio: ad quam respiciens Auicennas, dicit, tussim fieri propter Apostema, id est, tumores, & Oppilationes, quæ omnia sunt vitia in mala compositione. Unde etiam Galenus comment. 24. sectio. 2. lib. 6. epid. ait, tussim malignam fieri ex humore, defluente à capite, ex ulcere viscerum spirabilium, ex abscessibus, ex empyemate, & frequenter ex obstructione & asperitate, quæ asperitas pertinet ad malam compositionem. Cum igitur frequenter tussis fiat propter obstructionem, seu asperitatem: hinc Galenus obstructionem potissimum proposuit, c. 7. lib. 4. meth. & cap.

& cap. 4. lib. 1. de symp. caus. dum ait, per tussim expelli eas materias, quæ vias obstruunt. Asperitatem proponit Gale. cap. 4. lib. 2. de symp. caus. cap. 7. lib. de morborum different. com. 12. sect. 1. lib. 1. epid. apho. 54. sect. 4. Hæc de causa intrinseca proxima.

Quoad causas antecedentes: Auicennas proponit Repletionem, & Antecessionē causarum corporearum, ad causas coniunctas. Per repletionem intelligit materiam in corpore existentē, non in thorace, nam hæc esset proxima materia; materia autem corpus replens, multiplex esse potest: nimirum pituitosa, melancholica, & quælibet materia. Per antecessionem corporearum causarum, intelligit causas, & Generantes materias, & Tribuentes impetum ipsi materiæ. Causæ generantes sunt, verbi gratia, calidius hepar, ut generat bilem: sic enim caliditas hepatis est causa præcedens causas corporeas, generans causas corporeas. Sic ratione frigiditatis capitis, generatur materia pituitosa, quæ causa est tussis: unde Galenus ait, senes tussi corripit, qui caput habent frigidum. apho. ult. sect. 3. cap. 2. lib. 2. de temperamen. Causæ autem antecedentes, non generantes, sed impetum, seu motum tribuentes, sunt causæ quæ efficiunt, ut materia fluat in thoracem, vel à Toto corpore, vel ab aliqua Parte, ut plurimum enim procedit à capite. Porro hic fluxus fit, vel per Transmissionem, vel per Attractionem. Causæ impetum tribuentes per transmissionem, pendent, & à parte Transmittente, & à Suscipiente. A transmittente, quatenus est robusta: à suscipiente, ut est imbecillis, frigida, humida, laxa. Fluxus autem fit per attractionem, quoties pars quæ attrahit, nimirum pectus, vel Dolore vel Calore afficitur. Hæc de causis internis.

Antecedentes causa.

Quoad externas, seu primitivas: hæc, secundum Auicennā Externæ laedunt, vel in Complexione, vel in Formis: in complexione, quatenus alterant: in formis, quoties sunt in causa malæ compositionis, seu angustia. Ut plurimum autem tussis fit propter aerem ambientem: propterea Hippocrates, com. 24. sect. 2. lib. 6. epid. ait: tussim aridam, & parum irritantem fieri ex aere: ut, si homines loquantur, aut os hiet, tunc potissimum fiat tussis: quando autem non loquantur, non fiat tussis: nam ore aperto, aer frigidus attrahitur, qui molestans causa est tussis. Sic etiam Gale. apho. 15. sect. 3. ait, dominante vento frigido, tussim fieri. Sed fit etiam tussis ex alia causa

Externa causa.

refrigante, nimirum è niue & glacie, quæ pectori sunt inimica, apho. 24. sect. 5. Et addit Gale. cap. 9. lib. 10. meth. quandoque medicamentum frigidum, thoraci admotum, tussim excitare. Auicennas addit fumum, puluerem, cibos acidos, ponticos, portionem cibi vel potus, quæ tempore masticationis, aut potationis, ob hominum negligentiam, dum simul loqui & edere volunt, descendit in tracheiam. Et hæc de definitionis explicatione.

Differentia.

Sequuntur differentia: & primum à forma: cum enim tussis sit efflatio, hæc efflatio Magis vel Minus est vehemens. Subiectum est pulmo: qui afficitur secundum asperas arterias, easque vel Omnes, vel Aliquas: & si secundum aliquas, vel secundum Dextram partem, vel secundum Sinistram. Ratione causæ efficientis, cum ea sit facultas expultrix, vt irritatur ab aliqua causa morbigica: dicendum, hanc causam esse Internam, vel Externam: internam, esse Proximam, vel Remotam: externam, vel Necessario, vel Non necessario occurrentem. Non facimus mentionem istarum differentiarum tussis, quibus dicitur Arida, vel Humida: nam hæc sunt differentia: accidentales, quæ non pendent à definitione. Arida est tussis, in qua nihil expuitur, com. 17. sect. 2. lib. 6. epid. & com. 12. sect. 1. lib. 1. epid. quod sit, vel quia non adest materia: vel quia materia quæ adest, excerni non potest, propter visciditatem, crassitiam, aut tenuitatem.

Signa.

1. Tussis in genere facile cognoscitur, è strepitu illo evidenti. Quoad differentias, primo desumptas à forma: vt tussis est efflatio vel magis, vel minus violenta: hæc facile cognoscitur, ex ægri relatione, qui magis minúsve violentam esse tussim ait. Quoad differentias à subiecto: si pulmo secundum asperas arterias omnes afficiatur, tussis est admodum acerbæ, & omnis decubitus est molestus: si autem lædatur pulmo secundum partem, tunc percipitur noxa in parte dextra vel sinistra, & patientes cōqueruntur magis de vna parte, quam de alia. Quoad causam efficientem tussis: num sit interna, vel externa, referet patiens: qui etiam poterit narrare, quænam sit causa: verbi gratia, quod tussi fuerit correptus, post admotum thoraci medicamentum frigidum. Si vero patiens affirmet, nullam esse prægressam causam externam: colligitur, tussim produci à causa interna. Et hæc est immediata, vel mediata, Immediata est intemperies, mala compositio, soluta vnitas. Intemperies esse cognoscitur, quando nullum m adest

adest signum, vel malæ compositionis, vel solutæ unitatis; de quibus signis in suis capitibus. Si igitur nullū sit signum aliorum morborum, & indicium sit intemperiei: cognoscitur dyscrasiam esse sine materia, si tussis prorsus sit arida: nam licet interdum etiam in dyscrasia cum materia nihil excerni queat, vt & tunc arida sit tussis: nihilominus hæc tussis non est prorsus arida, sed dum perseverat, necessarium est, vt aliqua portio materiæ amittat visciditatem aut crassitiam, & sic aliquid excernatur. Et cum intemperies possit esse calida, frigida, humida, & sicca: calida, cognoscitur è sensu caloris in thorace seu pectore: item è siti, non qualibet, sed quæ frigida inspiratione sedatur, non expiratione (omnis quidem sitis pertinet ad os ventriculi: sed causa principalis sitis, interdum est in ore ventriculi, & tunc sedatur potione: interdum residet in pulmone, intemperie calida afflicto, qua communicatur orī ventriculi, unde etiam sitis fit, quæ inspiratione aeris frigidi sedatur: & hæc est illa sitis pulmonis, quæ calidam intemperiem pulmonum indicat.) indicatur etiam è rubedine faciei: dum enim pulmo est iusto calidior, fit euaporatio in faciem: præterea indicatur è pulsu magno, dilatantur enim arteriæ, dum pulmones sunt calidiores & latiores, unde magni pulsus: indicatur denique è causis prægressis, verbi gratia, si prægressæ sunt causæ calefacientes: sed cognoscitur etiam è iuuantibus, quia calida nocent, frigida iuuant. Frigida intemperies ex oppositis facile cognosci poterit: quia oppositorū eadem doctrina. Signa ergo erunt, quod homines non sentient caliditatem in pectore: nec sitis erit intensa: nam ratione tussis commouentur pulmones, & agitati incalescunt, vt fiat quidem sitis, sed admodum exigua. Reliqua signa patent, &c. Sicca intemperies inde cognoscitur, quod augeat motu, fame, & aliis causis siccantibus. Humida cognoscitur è causis oppositis, & præsertim si prægressæ sint causæ humectantes. Compositæ intemperies è signis complicatis cognoscuntur. Quoad cognitionem materiæ: morbifica materia indicatur è sputo: nam si fuerit dyscrasia sine materia, nullum est sputum. Species autem materiæ, cognoscitur è sputo determinato. Verbi gratia, si per tussim excernatur pituitosa materia, iudicabitis tussim originem ducere à pituita. Quoad malam compositionem, hæc est, asperitas, obstructio, tumor. Asperitas cognoscitur è tussu sine sputo: præterea è causis prægressis, quæ habent vim exasperandi

de quibus suo loco dictum. Obstructio cognoscitur è difficultate spirandi: præterea è prægressis causis, quæ obstruere possunt, verbi gratia, è victu crassefaciente. Tumor cognoscitur è propriis capitibus: verbi gratia, si fiat tussis ob tumorem pleuræ, è capite proprio cognoscetur. Soluta vnitatis ut sit cognoscenda, petatur è cap. de phthisi. Quoad causas internas mediatas: hæ sunt vel repletio, vel antecessio causarum, &c. Repletio cognoscitur è propriis signis, indicantibus plenitudinem: de quibus in proprio capite. Quoad antecessionem causarum, hæ sunt vel generantes, vel tribuentes imperum. Generantes cognoscuntur è suis signis: de quibus in propriis locis. Verbi gratia, si gignatur pituita à cerebro frigidiore, erunt signa cerebri frigidi. Quoad causas tribuentes impetum: cum hic impetus, seu fluxus fiat vel per transmissionem, vel attractionem: cognoscitur fieri per attractionem, ubi in thorace erit dolor, vel calor. Si hæc non adsunt: indicium est materiam fluere per modum transmissionis.

Indicationes.

[Quoad indicationes, cum tussis sit efflatio violenta pulmonis, dependens ab expultrice irritata: Efflatio seu causa formalis non indicat, non est ex usu: quia dependet à causa efficiente. Subiectum est pulmo, qui secundum suam proportionem requirit simile, quod pneumaticum dicere liceat. Effectrix causa est expultrix irritata. Causa igitur expultricem irritans, cum sit interna, vel externa: interna, proxima, vel remota: proxima, morbus, & primum morbus in intemperie: oritur ergo indicatio alterandi per contrarium, &c, si intemperies habeat materiam morbificam annexam, materia suas habet indicationes: prout ea materia est mistum præter naturam, lædens pulmones, quemadmodum in methodo medendi fusius declarauimus. Præterea morbus, ut immediata causa: est mala compositio: nimirum asperitas, quæ indicat læuigans: item obstructio, quæ ipsa non indicat vtile: sed obstructionis causa, siue materia: quæ copiosa, indicat imminuens, crassa attenuans, viscida detergens. Morbus etiam est tumor, ratione malæ compositionis. De remotis indicationibus, in propriis agemus capitibus. Verbi gratia, de Pleuritide. Quoad solutam unitatem: de huius indicationibus dicendum capite de Phthisi. Causa interna non proxima, est repletio, vel antecessio causæ. Repletio indicat vacuans: idque varium, pro repletionis diuersitate. Verbi gratia, si repletio sit sanguinea, indicat sanguinem vacuans, &c.

&c. Quoad antecessionem causarum: hæ causæ sunt vel generantes, vel tribuentes impetum. Causæ generantes contrarium indicant: exempli gratia, si causa seu materia tussis generetur à frigidiori cerebro, oritur indicatio calefaciendi. Si sint causæ tribuentes impetum: verbi gratia, si tussis fiat per modum transmissionis, cum pulmo recipiat ob imbecillitatem, humiditatem, laxitatem, oritur indicatio densandi, &c. Si per modum attractionis: si ratione caloris, oportet refrigerare: dolores lenire. Si denique causa sit extrinseca: non indicat, nisi sit præsens, & intra corpus: & prout ea causa varia est, pro eo varia indicat, exempli gratia, si tracheiâ ingrediatur mica panis, est vacuanda, &c.

In genere autem hic nihil prædici potest: modo enim *Prognostica.* tussis periculosa, modo non. Ratione differentiarum formalium: ut efflatio in tussi est magis vel minus violenta: ita magis vel minus intenditur periculum: unde Auicennas ait, tussim vehementem, perducere ad sputum sanguinis. Quoad differentias à subiecto: prout pulmo secundum plures partes est male affectus: pro eo periculum augetur. Quoad differentias à causa efficiente: pro malignitate, vi ac potentia causæ irritantis, augetur periculum. Vnde Galenus, commen. 18. sectio. 3. lib. 6. epid. ait, periculosam esse tussim, si humor à capite destillans, fuerit tenuis, acris: siue fiat excretio, siue non: si enim non fiat, putrescit materia, & pulmones erodit: si autem fiat excretio materiæ tenuis & acris, fit tussis admodum violenta, vi cuius caput repletur, & rursus materia destillat, facitque ut vas aliquod frangatur. Contra vero tussis periculosa non est, si fiat ex intemperie, ex asperitate, è qualitate ambientis. Et hinc cap. 9. lib. 10. meth. Galenus ait, si tussis fiat è medicamento refrigerante, thoraci appposito: si auferatur medicamentum frigidum: tussim sedari. Et cap. 4. lib. 2. de sym. caus. ait: hanc tussim tolli per spiritus cohibitionem facile, nisi forte valida sit intemperies. Non tamen prorsus despicienda tussis, quæ fit ex intemperie: nam cum Galeno capite 13, libro 3. metho. adolescens quidam, ob frigiditatem, sanguinem exspuit ad dimidiam heminam.

Materiæ cheirurgicæ, respiciunt vel sanguinem, ut Venæsectione: vel quamlibet materiam, ut Fonticuli. Cum ergo tussis fiat à varia causa, quælibet materia potest administrari: de quibus in propriis capitibus: verbi gratia, si tussis fiat

vi pleuritidis, de venæsectione in eo loco diligenter loquimur. De fonticulis, si fiat è destillatione, egimus supra, cap. 27. lib. 1. de catarrho. Circa sanguinem id monuisse sat sit: venam in omni morbo secandam esse, si sanguis peccet, vel ut causa principalis, vel sine qua non, idque tum habere locum, si sanguinis peccatum sit vehemens, secundum formam, qualitatem, vel motum: vbi tamen necessarium etiam est, ut vires permittant.

*Medicamenta.
Intercipientia.*

Medicamenta respiciunt Totum, vel Partem affectam, scilicet thoracem. Quæ totum respiciunt, pertinent ad discursum generalem. Medicamenta thoracis sunt, Intercipientia, Vacuantia, Alterantia. De intercipientibus Galenus cap. 4. lib. 7. 2. τότ. Talia sunt sacchar. viol. bolus Arm. santali, cydonia, tragacantha, corallia, terra Samia, balauſtia, hypocistis, amyllum, hyolecamus albus, succus acacia, succus symphyti, plantaginis, papauer, Galenus etiam opium addit: quod fermentatum esse oporteret, sed nemo vestrum propinet. Hæc medicamenta intercipientia probantur in tussi à materia calida: cuiusmodi est biliosa materia, item pituitosa salsa: præterea si tussis materia sit tenuis. At si materia sit frigida, propolisit adiciantur myrrha, mastiche, thus. Notandum circa papauer, quod etiam probatur cap. 31. lib. 1. de alim. ex eo confici Diacodeion, de quo cap. 2. lib. 7. 2. τότ. Capita scilicet papaueris maserantur ex aqua per diem naturalem: lento igne coquuntur donec fluiscant: deinde succus exprimitur: post additur mellis dimidium, & decoquitur ad mellis Artici consistentiam. Sed aduertendum aquam debere esse puram: non destillatam, qua fluxerit per canalim plumbeum, posset enim esse causa dysenteria: Potestis etiam loco mellis accipere saccharum, & medicamentum conficere in forma solida, in rotulis. Interdum loco mellis sapa sumi potest: præsertim si fluxus sit violentus. Huius medicamenti beneficio somnus conciliatur, & materia fluens intercipitur. Quoad rectam eius adimistrationem. dosis sit moderata, duo cochlearia satis magnæque dosis augeri vel minui potest, pro copia & qualitate destillationis, & ratione corporis patientis: nam frigidioribus, senibus, & hyeme, dosis sit minor: calidioribus, maior. Quia ergo quantum agendum sumitur ab actione indicantis: ideo Galenus respicit ad actiuitatem materię indicantis, cuius summa actio, tanquam à signo significatur à copia & qualitate materię. Ibide Galenus, respiciens ad permittentem virtutem, proponit temperaturam, ætatem, anni tempus: dum enim, verbi gra-

*Algu-
deur.*

lia, materia est copiosior, calidior, tenuior: est maioris actiuitatis, quæ significatur à copia, qualitate: & hæc indicat quantum agendum. Virtus autem robusta permittit: quæ signis hisprehenditur, nimirum temperatura calida, ætate florente, ambiente calido. Quod si horum opposita affuerint, medicamentum in minori dosi administrandum, quia est minor actiuitas, & virtus inbecillior. Quoad modum, possumus vti in forma mollis electarij, seu opiatae, & in rotulis: pro patientis placito. Quoad quando agendum: Auicennas in cap. de catarrho monet: intercipientis medicamentum non esse exhibendum, quando materia est in pectore: nam; cum quando agendum indicetur à præsentia indicantis, quamuis absit indicans, materia sc. fluens: attamen si contingat vt materia sit fluxa in pectus, hæc materia prohibet intercipientis. Errant igitur medici, qui assiduo intercipientibus vtuntur. Quoad vbi agendum, cum materia habeat consistentiam in ore, medicamenta ori sunt applicanda.

Sequuntur ea, quæ vacuant materiam in pectore conten- *Expell-*
tam: *Syr. de pyrasio, oxymelitis scillit. ana ʒ j. piperis albi ʒ x. pi-*
mentum, penidiorum ana ʒ β. Misce fiat eclogma. Hæc medicamen- *rantia.*
ta necessaria sunt, quia alias materia in pectore consistens sensibilibiter euacuari nequit, cap. 32. lib. 3. de offic. med. Explicanda autem horum medicamentorum facultas. Tussim excitant mordentia & pingua. cap. 16. lib. 2. simpl. nam tussis fit, dum in gutture, seu principio tracheiæ est inæqualitas: (per viam enim æqualem aer sine tussi fertur) quam viæ inæqualitatem mordacia inducunt exasperando, pingua illinendo & replendo. cap. 17. lib. 2. simpl. Inter leuiter mordacia numeratur *melicratum, oxymeli:* melicratum probatur in materia crassa: oxymeli in viscida, quia hoc maiorem habet vim deterforiam, com. 2. lib. 3. de ratione viæ. (Hippocrates com. 10. lib. 3. de ratione viæ. ait, melicratum pulmonem molli- *Obiectio*
re, sputum mediocriter educere, tussim mitigare, habere vim atten- *solvitur.*
nuandi: quamuis plus quam mediocriter sputum viscidum faciat: at si melicratum sputum faceret viscidum, obesset? Galenus ait, Hippocratem per emphasin locutum esse: cum enim melicratum non valenter attenuet: si contingat materiam esse admodum crassam & viscidam, cum hanc nequeat vincere & attenuare, re- linquit viscidam, non facit viscidam.) Sed ad rem: in crassa materia probatur melicratum, in viscida oxymeli. Ratio peti- tur è com. 2. lib. 3. de viæ. acut. vbi Galenus dicit, humores

per tussim vacuandos debere esse consistentes moderate: tenuiores enim & fluidiores effugiunt aerem, & ab eo impelli non possunt: viscidiores autem nimis hærent: & crassiores iusto non cedunt. Quare crassiores sunt attenuandi, medicamentis moderate humidis, vt melicrato, quod moderate attenuat. Viscidiores humores expectorandi sunt: id quod fit, non iis quæ humida tantum sunt, sed insuper etiam deterforiis, vt ex oxymeli. Idem testatur Galenus cap. 8. li. 4. loc. affect. Hinc Auicennas probat *syrupum de hyssopo, ubi opus est abstersione*. Et Galenus cap. 1. lib. 7. κ. ρ. ε. hæc medicamenta in tres classes diuidit: alia enim læuigant asperitates, & illita inæqualitatem promouent, sicque tussis sunt causa: vt, quæ conficiuntur è passio, è gummis, tragacantha, glycyrrhiza, amylo, pineis, penidiis, syrupo violaceo, saccharo candito, &c. Alia contraria his sunt, nimirum mordacia: quæ probantur, si materia euacuanda sit copiosa, crassa, viscida: alia conficiuntur è piperis, cassia lignea, cinnamomo, galbano, resina terebinth. unde Galenus cap. 8. lib. 2. de acid. ex his conficitur medicamentum, quod vocat *Athanasiam, effluacissimum*: hoc modo. R. piperis albi ḡ xl. cassia menasari, agarici, scordij, dauci Cretici, petroselini ana ḡ β. croci, myrrhe, ana ḡ j. cinamomi, cassia lignea, flo. iunci odorati ana ḡ i β. mellis, quantum sufficit. Dosis, anellana. Tertio sunt alia medicamenta media, quæ leuiter, citra acrimoniam, detergent: & probantur in tussi, quæ fit à materia non admodum copiosa, nec viscida. Fiunt è succo ptisana, ex amygdalis dulcibus, fabis elixis, &c. cuiusmodi etiam potest esse buglossa, est enim calida & humida, coctaque cum melicrato conuenit in tussi cum asperitate, lib. 6. simpl. cap. de buglossa. Huius classis etiam est *cara dactylonum*. Hæc & similia maxime conueniunt in tussi ex asperitate, quæ scilicet habent aliquam humiditatem, & non mordent, cap. 95. art. med. Iam formulam proponemus: R. piperis albi ḡ x. syrupi de prassio, oxymelitis scillitici ana ḡ j. penid. pinearum ana ḡ β. Mis. pro lambitino. Ratio est: quia cito, tunc, iuuanda. curandum. Vt cito curetur, materia morbifica opponenda sunt contraria: Supponentes ergo materiam euacuandam esse pituitosam, frigidam, crassam, viscidam: proponimus piper, quod calefacit & attenuat: item syrupum de prassio, cum oxymelite scill. quæ calefaciunt, attenuant, detergent. Hec tria, quia sunt materia contrarie indicanti, constituunt basin huius medicamenti. Ut autem cura sit euacuatio, oportet permiscere penidia, pineas, quæ obtundunt reliquarum acrimoniam, quæ alias guttur abradi posset.

*Medicamenta basis sunt in maiori copia: nec enim oportet è toto vim basis vincere, sed salum contemperare. Tandem, ut euacuatio fiat cum facilitate & incunditate: medicamentum hoc est confectum è dulcibus & incundis pineis & penidis. Sed notandum, in tussi à pituita frigida, crassa, & viscida, non semper propositum medicamentum idem esse administrandum, & eodem modo: sed vario modo esse componendum. Quare diligenter aduertendum, quæ sit actiuitas materiæ euacuandæ, & partium, in quas medicamentum inducitur. Quo enim materia fuerit frigidior, copiosior, crassior, viscidior: eo maiorem materiæ actionem significat: & propterea basin è summa dosi medicamentorum conficere debemus. Quoad partem: pars est os & guttur: os, quo magis abhorret ab amaris, eo maior dosis esse debet dulcium, nisi forte patiens habeat aluum fluidum, infestetur vermibus, &c. tunc enim à dulcibus abstinendum. Quoad guttur: si fuerit aridius, & siccis laxum, ut possit exulcerari: minuenda est dosis acrium medicamentorum. *Vsus reinedij huius:* Si materiæ euacuandæ summa fuerit actiuitas, verbi gratia summa dosis erit ʒj. *Quoad modum:* si materia vacuanda fuerit admodum contumax, insignis resistantiæ, difficilis passionis: deberis exhibere medicamentum minus fluidum: si contra, magis fluidum, vnde lambitium cum diluto permisceri potest. *Tempus est,* vbi adest materia, & nihil prohibet, id est, vbi totum est vacuatum, & ventriculus non est repletus.*

Tandem *κατ' ιδίον* *ὑπερκαταρ* hoc in affectu nonnulla prodelle creduntur, quod occulta quadam vi pulmones mirifice roborent: huius generis est fere omnis pulmo, præcipue tamen vulpis. Hinc laudatur eclegma è vulpis pulmone. Et quidam è pulmonibus vulpis, vituli, & castrati, additis salvia, hyssopo, capillis Veneris, radicibus ari & glycyrrhizæ, &c. liquorem vitreis organis eliciunt: huiusque ʒ iij. cum saccharo crystallino albo propinant.

Pneumonica.

CAPVT II.

De Respiratione deprauata.



DEPRAVATA respiratio pertinet ad vitia pulmonis: & intelligimus respirationem crebriorem. Hæc autem est motus deprauatus pulmonis, dependens ab angustia bronchiorum. Pro in-

Nomen.

Definitio.

tellectu huius definitionis quædam de respiratione secundum naturam dicemus.

*Respiratio
secundum
naturam.*

Respiratio secundum naturam, est motus eleuationis & depressionis pulmonum, procedens à thorace, causa vitæ. Vnde Galenus cap. 3. lib. 7. de administra. anatom. dicit, respirationis secundum naturam principalia organa esse tria: scilicet pulmonem, thoracem, & cor: pulmo est organum principale, vt dilatatur & comprimitur, vt afficitur & patitur, non vt agit: ergo in respiratione inter membra quæ afficiuntur, pulmo principalem tenet locum. Thorax, est principium seu organum respirationis, in ratione agentis: habetque se thorax ad respirationem, vt oculus ad visionem: sicuti enim visio est præcipua oculi actio, ita respiratio est præcipua functio thoracis. Ergo thorax est præcipuum organum in ratione agentis, vt agit per musculos, & potissimum per septum transversum: vt iure voluntaria sit respiratio, quæ ita ad thoracem pertinet, sicut ambulatio ad crura, cap. 9. lib. 1. de difficili respiratio. Cor etiam præcipuum est organum respirationis, non quod afficiatur, nec in ratione agentis, sed in ratione finis: nam respiratio propterea fit, vt cordis calor refrigeratione & ventilatione seruetur. capite 9. libro septimo, de vsu part. Cum igitur in respiratione pulmo principaliter afficiatur: thorax principaliter agat: & cor sit organum, seu membrum, propter quod pulmo afficitur à thorace: Sequitur, quod crebra respiratio morbosa præter naturam, sit motus præter naturam pulmonis, dependens ab angustia bronchiorum. Formalis causa est motus præuus, corruptus, præter naturam: qui motus est affectio, ratione pulmonis: actio autem ratione thoracis. Subiectum est pulmo, qui in respiratione naturali recte afficitur, recte comprimitur & dilatatur: in respiratione autem præter naturam, male afficitur:

Forma.

Subiectū.

Causa efficiens.

Coalescentia.

Effetrix causa est angustia bronchiorum pulmonis: cap. 10. lib. 1. de difficili respirat. (respiratio crebra, quæ per cursum fieri solet, non est præter naturam, sed quæ fit ob angustiam bronchiorum.) Porro angustia est genus quoddam, quod prædicatur de Coalescentia, Subsidentia, Compressione, Constipatione, & Obstructione. capite 7. libro de differ. morb. & de caus. morb. Coalescentia ab hoc negotio excluditur, quia sequitur vlcus partium: dum autem pulmones exulcerantur, moriuntur potius homines, sitque

potius

potius phthisis, quam vitium de quo iam loquimur. Subsidentia potissimum fit à causis astringentibus & refrigerantibus: causæ autem hæ refrigerantes & astringentes, rationabiliter potius sunt excludendæ, quia asperæ pulmonis arteriæ, cum donatæ sint substantia dura, cartilaginea, non possunt subsidere, vel per astringentia, vel per refrigerantia. Subsidentia autem, vt monet Auicennas, quandoque sed raro fieri potest ob ariditatem, arefactionem. Auicennas etiam proponit respiratioem morbosam fieri posse à causa refrigerante: sed non ea ratione, quod ob frigiditatem bronchia subsideant: verum quia ob hanc generatur & colligitur materia pituitosa, crassa, quæ postea difficilem redit respiratioem. Compressio hic locum habet, quæ fit à materia, quæ est extra bronchia, videlicet circa vertebra thoracis, vt contingere solet in gibbositate, commen. aphor. 46. sectio. 6. itē à materia existēte in pulmone, sed extra asperas arterias, vtpote si materia repleat pulmonis arterias non asperas, sed leues. c. 11. l. 1. de diff. resp. qualis respiratio morbose corripuit Medicum illum Antipatrum, cap. vlt. lib. 4. loc. aff. Hæc materia, compressionis causa, esse potest & Vapor, & Minera: Vapor, copiosus & crassus: Minera, potissimum pituita: item tuberculum, tumor, qui in thorace existens comprimit bronchia. Constipatio etiam locum habet, & proponitur, cap. 11. lib. 1. de diff. resp. producitur à tuberculo crudo existente intra bronchia: nam si extra, fit compressio. Obstructio etiam causa esse potest crebrioris respirationis: fit à materia copiosa, vel crassa, vel viscida: potestque esse Vapor & Minera, verbi gratia pituita, quæ sit in illa bronchia, non extra, lib. 4. de rat. vict. Et hæc ea est species difficilis respirationis, quæ vt plurimum accidit. Hæc autem materia vel in pulmone generatur, ob intemperiem pulmonum, præsertim frigidam, vel quandoque gulæ, com. 26. sect. 3. aphor. interdum à capite fluit, vel ab alijs etiam partibus, vel à toto: & hæc fluxio fit vel transmissa, vel attracta. Transmissa, & proinde recepta ob imbecillitatem pulmonum, ob frigiditatem, humiditatem, laxitatem: quemadmodum attrahi solet, vel ratione doloris, vel caloris.

Motus hic deprauatus differentias admittit secundum Magis & Minus prout est magis vel minus frequens. Si enim est minus frequens, minus densus, vocatur Difficilis anhelatio seu respiratio: si magis densus, dicitur Asthma, & omnes asthmatici

*Subsidentia**Compressio**Constipatio**Obstructio**Differentia*

asthmatici nuncupantur, com. aphor. 46. sect. 6. si maxime sit frequens, vocatur Orthopncea, com. Tr. lib. 4. de rat. vict. quia ægrotantes non possunt respirare, nisi recta cervice. Ratione subiecti, id est, bronchiorum, vel afficiuntur Omnia pulmonis bronchia, vel Quædam: & si quædam, vel Dextra, vel Sinistra. Ratione causæ efficientis, hoc malum fit ab angustia, quæ est Subsidentia, Compressio, Constipatio, vel Obstructio.

Signa.

In genere frequens respiratio facile cognoscitur: distinguendum tamen est e. c. 4. & 7. lib. 4. de loc. aff. nū fiat ratione ardoris, vel imbecillitatis, vel potius ratione angustia. Si ob ardorem: cognoscitur, quia respiratio est maior & frequentior, cum caliditate: apparet thoracis calor & faciei rubedo: quia dum pulmones incalescunt, & thorax feruet, fit euaporatio in caput, ut facies rubeat. Si ob imbecillitatem: non adsunt signa ardoris, desiderantur signa angustia: narium pinnae evidentissime contrahuntur, & thorax collabitur. Si ob angustiam: cognoscitur, quia totus thorax, celeriter & frequenter dilatatur, nec adsunt imbecillitatis signa. Et ex his facile cognoscuntur differentia formales, an respiratio sit magis vel minus frequens: nam si fuerit difficilima respiratio, coguntur sedere, quando scilicet est orthopncea: quod non contingit, ubi est valde frequens. Subiectum etiam, seu locus affectus facile cognoscitur: nam si affecta sint omnia bronchia, læuissima est læsio: si non omnia, mitior est affectio. Vtrum affecta sint bronchia dextra, vel sinistra: cognoscitur e vario decubitu, prout magis patiuntur si in vno latere decumbant, quam in altero, ut de tussi diximus. Quoad causam efficientem: si fuerit Subsidentia: indicatur e pulsu duro: præterea adest situs, lingua est aspera, prægressæ sunt causæ exsiccantes. Compressio cognoscitur, quia difficilior erit inspiratio, quam expiratio: quia compressio fit à materia extra meatus. Cum autem compressio fiat à materia, cognoscere etiam oportet, quæ sit hæc materia, & quis locus materia. Materia potest esse vapor vel minera. Si vapor, non aderit sensus grauitatis: contra, si minera. Quoad locum, in quo detinetur materia, compressionis causa: si materia resideat in læuibus arteriis, atque ita fiat compressio asperarum arteriarum, secundum Galenum cap. vltim. lib. 4. loc. affect. cognoscitur ex inæqualitate pulsus, contra, si fuerit extra læues arterias. Quoad constipationem

tionem, quæ producitur à tuberculo, cognoscitur, quia difficilis est respiratio, sed citra stertorem, quia non adest materia, quæ petat laryngem, quæ sit in causa, vt non fiat sonus acutus: sed potius sit difficilis respiratio, citra hunc stertorem: difficilis hæc respiratio fit sensim, quoniam tuberculum paullatim generatur: estque difficilis illa respiratio assidua, quia semper est præsens tuberculi materia. Obstructio cognoscitur, quia est difficilis respiratio, sed cum stertore: nam materia sui humiditate (vt de voce diximus) est in causa, vt aër pertingens ad laryngem non efficiat vocem sonoram, sed potius cum stertore & inæqualitate: præterea cognoscitur, quia fit subito, & definit difficilis respiratio per excretionem materiæ. Quæ autem materia sit, cognoscitur à propriis signis: verbi gratia si sit pituita, excernetur pituita: si pus, hoc excernetur.

Præsidia sumuntur ab essentia indicantis: ideoque confugiendum ad cap. 6. libr. 7. x. τόν. Forma nihil vtile indicat. *Indicatio- nes.* Subiectum est pulmo, qui requirit potius, quam indicat: quia eius proportio latet. Quoad causam efficientem: angustia nō est ex vlu: species etiam angustiae non sunt ex vlu, quia licet morbi sint, remota tamen causa ilico euanescent, libro primo, de loc. affect. Quare causae angustiae sunt ex vlu. Subsidentiae ergo causa, cum sit siccitas, indicat humidum. Compressionis causa, si fuerit vapor, indicat discutiens, siue vacuos per insensibiles meatus: si minera, hæc varias habet indicationes, pro vario peccato: vt, verbi gratia si vacuanda, detergenda, attenuanda: respiciendo ad copiam, crassitiam, visciditatem. Stipationis causa, nimirum tuberculum crudum, est concoquendum, attenuandum, materia vacuanda, vt loco cit. Galenus docet. Si obstructio sit: cum huius causa sit materia copiosa, crassa, vel viscida: patet quid indicet hæc materia.

Malum in genere graue est, quia respicit vitam: cum *Trognostica.* adempta respiratione fere de vita actum sit. Quoad differentias formales: maius est periculum, quo respiratio difficilior: vnde orthopnoea periculosior est asthma, cæteris paribus. Quoad differentias à subiecto, grauius est malum, si totus pulmo afficiatur. Quoad differentias à causa efficiente: si fuerit subsidentia, malum est periculosissimum: quia partem impense exsiccatam humectare difficile est. Compressio, si fiat è vapore, minus periculosa: si è minera, vt pituita,

pituita, difficilius superatur. Si fuerit causa tuberculum, adhuc est peius: unde Hippocrates aphorism. 46. sectio. 6. dicit: qui gibbi ex asthma sunt ante pubertatem, moriuntur: nam tubercula augentur, & thorax angustatur: unde sequitur suffocatio. Quo ergo tubercula maiora, eo maius periculum. Idem de constipatione dicendum: difficilis enim respiratio à constipatione orta, admodum periculosa est, quia fit è tuberculo. Cæterum, tuberculum minus durum, est magis periculosum: propterea quod deducitur ad suppurationem, unde fit phthisis. Quoad obstructionem: si fiat è vapore, vitium minus periculosum: si è pituita, magis periculosum: si è pulsu, ut in empyemate, malum periculosissimum. Postremo maximè augetur periculum, si vires sint imbecilliores, quales esse solent potissimum in senio extremo, com. aphor. 40. sect. 2.

*Curatio ex
tra acces-
sionem.
Vena sectio.*

Materiæ referuntur ad Totum, ad Pectus, & ad Paroxysmum. Ad totum refertur potissimum materia cheirurgica. Ergo, quoad venæ sectionem: si urgeat necessitas, secundum Paulum vena secetur, & sanguinis detrahatur, quantum vires permittunt. Fiat autem hoc antequam medicamenta thoraci applicentur ratione pituitæ: alias sanguis in thoracem attrahetur. Auicennas dicit in asthma è vapore fumoso, & ab humore in sinistro cordis ventriculo, conferre sectionem basilicæ venæ sinistri brachij. Hic respicit Auicennas ad feruentem sanguinem, in sinistro cordis ventriculo: quia in hoc magis feruet. Quod si alia sanguinis sit subsistentia: ut si asthma foueatur à suppressione hæmorrhoidum: hæc aperiendæ, non basilica. Præterea in asthma te inueterato, quod aliis remediis non cedit probatur vstio, secundum collum, pectus, dorsum (nisi enim ad vstionem deueniatur, moriuntur) circa medium vertebrarum, & circa medium costatum. Sint autem vstiones mediocriter latæ: & mediæ inter superficiem & profundum: sinendumque ut vlcera vstione excitata diu fluant. Aetius ita administrat: Quoad quantitatem: vstiones sint satis latæ, mediocriter profundæ, pro actiuitate materiæ: ideoque cum materia sit insignis actiuitatis, vstio non debet esse angusta, sed lata. Quoad modum: fieri debent ferro, modo magis, modo minus candente, prout maior vel minor est materiæ resistentia. Quoad tempus: oportet his uti, dum adest præsentia indicantis, quod nimirum tunc temporis maximè

*vstio, ad
materiam,
qua perti-
neciter
bronchiis
adhaeret.*

Cap. 37. l. 8.

possit

possit & urgeat. Ad vstiones igitur conueniendum, si materia morbifica non cedit alijs remedijs: & oportet vlcuscula diu fluere, & diu esse præsentiā, prout materia morbifica sua præsentiā magis perseuerat. Quoad vbi: vstiones sunt efficiendæ in collo & thorace: ibi enim materia habet substantiam, & per illam regionem est ductus asperæ arteriæ. Sunt autem efficiendæ vstiones in spatijs intermedijs vertebrarum & costarum: nam ossa prohibent exitum materiæ. Quod si materia fluens, quæ hoc malum fouet, procedat à capite: non est imitandus Aetius: sed vstio faciendā in sutura coronali: quia materia non fluxa, sed fluens, & etiam fluxura ibi iam habet substantiam, & vacuatur vstione in capite excitata. Ita si malum foueatur à materia, quæ procedat à toto: tunc vstiones & brachijs, & cruribus adhibendæ.

*vstio in
sutura
coronali*

Medicamenta, quæ totum respiciunt, requirunt discursum generalem, siue sint lenientia, siue præparatiua, siue purgantia. Id notandum: in hoc malo fortissima medicamenta conuenire, quia peccatum materiæ est vehementissimum, & materia diu perseuerat. Hinc Paulus validissimis purgat, & continuam satis instituit purgationem: & probat etiam *calocynchidē*: Rhafis *elaterium* (non mirum est quod iam pauci curantur: quia saltem damus parum agarici.) *Ela-* *Pharma-*
teria totum
respiciens,
Cathartica
valentissima.
ma.
terium ergo non tantum in hydropē dandum, sed etiam in asthma & orthopnœa, cum fiunt à crassa materia. Galenus etiam cap. ult. libr. 7, x. τόμ. probat vehementissima. Possumus ita præscribere, cum Galeno. *℞. sinapis ʒj. salis communis ʒss. elaterij ʒ xv. terantur cum aqua, & fiant pastilli: alter-*
nis diebus exhibeantur. Conficit autem Galenus octo pastillos: ut
in quolibet pastillo sint ʒij. elaterij, nec tamen integro dug.
Vi autem curata sit curatio, ante horum pastillorum administra-
tionem præmissi debent clysteres: & post pastillos, mulsæ ʒvj. ex-
hiberi debent. Communiter practicanes nostro tempore, exhibeat pilulas singulis triginta diebus, sed neminem curant. Galeni ergo imitatione, si malum contumax sit, suadeo, ut si non alternis diebus, salutem singulis quatuor vel quinque diebus exhibeatis vnum propositorum pastillorum. Nam ratione *sinapis* attenuatur pituita: ratione *salis* fit dispersio viscida pituitæ: ratione *elaterij* euacuatur. *Mul-*
sa autem *superbibitur*, ut huius beneficio *elaterium* citius desce-
ndat, habet etenim vim quamdam veneficam, & natura
nostra

nostra aduersam, cum in parua copia sumptum valenter purgetur: ideoque diu in corpore morari non debet. Sic Auicennas, hac ductus ratione, post colocynthidem exhibet mulsam: exhibet autem colocynthidem, modo in maiori copia, modo in minori, prout est maior actiuitas pituitæ: si dat in minori quantitate exhibet mulsam $\frac{3}{4}$ lb. & post tres horas, ab exhibita colocynthide, quia exigua colocynthis non potest ita obesse: si dat in maiori quantitate, exhibet mulsam copiosam, nimirum lb. β . & citius, id est, non post tres horas, sed post horam, ne copiosior colocynthis diu in corpore manens, obfit. Hic colocynthis est indicans, relata ad multā: (alias colocynthis, ut materia remedij, est indicatū, seu requisitum a pituita) indicatum autem est detergens: quia enim colocynthis viscidam habet naturam, quæ facile hæret, ob id iudicat detergens, cuius materia est mulla. Quoad vsum: *quantum*, sumitur ab actione colocynthidis, ideo copiosior colocynthis, cum sit maiori actiuitatis, maiorem dosim mulsæ indicat: *quando*, sumitur a præsentia indicantis, sed vehementis: copiosior ergo colocynthis, quia magis virget, & magis est velox, ergo etiam citius mulla exhibenda, ut non sint expectandæ tres horæ, sed liceat propinare in parua copia statim post exhibitam colocynthidem.

*Discutien-
tis vaporē*

Sequuntur medicamenta quæ respiciunt materiam morbosam, in pectore contentam: quæ est Vapor, vel Minera. Si vapor: uti possumus oleo de spica, laurino, rutaceo, anethino, chamamelino: item maioranā, aniso, cymino: probantur etiam diascymnum, magna antidoti. *V s v s.* Quoad *Quantum*, $\frac{1}{2}$ ol. de spica, rutacei, anethini, chamamelini ana $\frac{3}{4}$ β . pulu. anisorum, cymini, fenic. ana $\frac{3}{4}$ β . tera lota vino aromatico. $\frac{1}{2}$ β . Misce ad ignem, fiat linimentum. Modus varius esse potest: ut inunctio, fomentum, emplastrum, ceratum, sacculus: pro passione seu resistantia materiæ morbificæ: Si enim vapor discutendus fuerit frigidus admodum crassus, potius vtendum emplastris, vel ceratis, quam simplici inunctione. Tempus: post totius euacuationem: materia enim totum replens, habet rationem prohibentis.

*Pituitam
educantia.*

Si minera causa est asthmatis: videndum num sit Pituita, vel Tumor similis abscessui. Si ergo fuerit pituita: (ut plerunque): crassa & viscida, è c. vlt. l. γ . κ . τ ϕ ν . probantur attenuantia & detergentia, sed citra insignem caliditatem: fugienda frigida astringentia, nam prohibent potius dissolutionem pituitæ.

cuitz. Auicennas etiam improbat diuretica fortia : nam hæc extrahunt subtile : & propterea opus est aliqua humiditate, vt pituita crassa educatur : quale est decoctum fenigraci, cum ficubus, melle copioso. & passulis : loco mellis vti licet saccharo, vel penidii, granis pini, dactylis, liquiritia, &c. quæ sunt permiscenda cum acerbis detergentibus. Tale ergo cum Galeno erit medicamentum : R. succi scilla cruda, mellis ana ʒ ij. fiat decoctio, addo pruna, ad expectorandum materiam : detur ʒ j. Vel tale fiat : R. passul. abietis actis, fenigraci loti ana ʒ ʒ. aquæ ʒ ij. fiat decoctio, donec passule, & fenigracum dissoluantur : deinde addo aniserum, sulphuris vini ana ʒ j. ammoniaci, castorei, melanthii ana ij. aqua diluantur, & fiant cataplasia, & exhibeantur cum ʒ vj. mulsa calida, vini mellis. Vel tale paretur : R. sulphuris vini, seminis rute sylvest. ana ʒ j. aristolochia rotunda, absinthij, ammoniaci, abrotani, ana ʒ ʒ. terantur cum aceto, & fiant pastilli, à ʒ j. ad ʒ j ʒ. Galenus dat tres pastillos, pondere ʒ j. & mane, & sero. Non fit tempore hoc non fit : ideo non curamus. Enula probatur lib. 6. simpl. cap. propr. primo decoquitur sub cineribus, deinde cum melle fit lambituum. Dioscorides maxime probat in passione botryon. & est valde efficax, ad dissipandum materiam in thorace contentam. Auicennas probat ius galli decrepiti, de quo diligenter loquitur Mesuensis : ius galli medicamentis conuenientibus implendum. Quoad medicamenta ad mouenda : R. caricas num. vj. farina lotij, mellis ana ʒ j. cera ʒ ʒ. At isto ad ignem, applicetur thoraci. Quod si materia sit summæ resistentiæ : medicamentis eo modo utendum, vt maxime penetrant : id quod sit specie vaporis, fumi, suffumigij, hoc modo : R. styracis, abrotani, terebinthina, sandarachæ, sinapis, cardamomi, ana part. æq. cum aqua, fiant pastilli : & Auicennas excipit adipe vaccino : molliens se, miscens cum acerbis & detergentibus.

24.

iur. Galli

Quoad tuberculum, cuius ratione sit asthma, seu difficultis respiratio : probat Gale. attenuantia & siccantia, lib. 7. c. 10. vt sunt macis, nux moschata, piper, caryophylli, cinamom. Zingiber : possumus addere galliam moschatam, & excipere syrupo de corticibus citri. Extra applicandum medicamentum, ad siccandum tuberculum. Verbi gratia, R. resina pini sicca ʒ j. iridis ʒ j ʒ. salis arag. ammoniaci, ana ʒ j. rad. ouentis, siliæ, centaurei min. ana ʒ ij. olei communis, aceti ana ʒ ij. Alia cum aceto dissoluantur, herba conuoluantur, & cribro excutiantur, liquabilia liquentur, colentur, omnibusque vniis, fiat emplastrum.

Subsiden-

Si asthma fiat propter subsidentiam : non utendum est

tia.

attenuantibus, vel detergentibus, sed contrariis, nimirum humectantibus: quorum materia est *lac asinum*, secundum *Auicennam*: item *caprinum*: licet etiam *uti penidius cum lacte*, *hordaeo*, *amygdalis*, *dactylis pinguibus*, &c.

Appropriata.

Præterea in hoc malo probantur quæ à proprietate possunt prodesse, & sunt ea, quæ respiciunt proportionem pulmonis, ut *pulmo vulpis*, *pulmo erinacei* *szluestris*: *siccatorum dosis est 3 ij. unde probatur loboch de pulmone vulpis.*

Dieta.

ij.

Variat dicta pro causarum varietate: vbi gratia, in asthma à subfidentia, victus debet esse humectans: si fiat à obstructione, attenuas. Vinum sit medicatū, à *botry* potissimū, ut *Paulus* probat: item à *guaiaco*, & *peccoralibus medicamentis* suo loco præpositis. Poterit vinum hoc tempore *vindemia parari.*

Curatio in paroxysmo.

Hæc extrâ paroxysmū agenda sunt. Quod si essetis præfentes tempore paroxysmi: iubeatis, ut ager sedeat bronchiis dilatatis, & pectus sit nudum sine indumentis, aer frigidus, vel per se, vel ventilatus flabellis: quia cum exiguus aer eo tempore inspiretur, oportet id supplere frigiditate, alias ager suffocaretur. Eo tempore pectori applicanda sunt laxantia temperata, ut *oleum amygd. decoctum malua*, *pinguedines gallinae, suis, vituli*, &c. Probantur etiam diuersiones, cum frictionibus, ligaturis, balanis, & si possibile est cum clysmis acrioribus. *Paulus* cognoscens summam vim huius paroxysmi, dat in potu 3 *ij. apthronitri, cum mulse* lb *ss.* quia imminet suffocatio. *Auicennas* exhibet *Antaurium masu*, & *compndii*: postremo, urgente necessitate, exhibet 3 *ss. salis*, quia mors imminet, & 3 *ij. nasturiij, cum mulse* 3 *v.* Si vsus postulare videatur, his uti potestis: sic enim vacuatur & dissoluitur materia pituitosa, quæ est causa paroxysmi. Et hoc tempore, nimirum, in paroxysmo victus debet esse tenuissimus. Hæc de respiratione difficili.

CAPVT III.

De dolore Thoracis.

Nomen.
Subiectū.

R

ROFONIMVS dolorem thoracis, respicientes ad pleuritidem & exquisitam & notham. Dolor ergo thoracis est sensatio corrupta organi tactus thoracis, dependens à solutione unitatis. Ad dolorem efficiendum necessariū est, ut qualitas tangibilis vel prima,

prima, vel secunda, occurrat corpori sensitivo, vt violentia quadam agat, & sic continuum soluat: quæ solutio est obiectum sensus (non proprium, sed commune, id est, motus, productus à qualitate tangibili) improporcionatum: vnde ita agit, vt producatur sentatio violenta, & corrupta, non imminuta, vel ablata: & hinc obiectum hoc improporcionatū, impertitur sensui communi: qui hoc obiectum improporcionatum iudicat & cognoscit vt iniucundum: & vt iniucundum offertur sensitivo appetitui, vt fugam arripiat, fiatq; dolor, qui voluptati est contrarius.

Forma ergo doloris thoracis, est sentatio corrupta. Ideoq; *Forma.* hoc vitium non est morbus, non causa morbi, sed symptoma: nimirum actio corrupta. Medicus confundit actionem & passionem: quia est artifex sensitivus: idemq; motus etiam apud Philosophos, dicitur actio, ratione agentis: passio, ratione patientis. Est autem hæc actio corrupta, non quidem quod aliter fiat, quam debeat, sed quia fit cum violentia: nam obiectum dolorificum, quatenus vt dolorificum sentitur, non est deceptio, sed quia fit cum violentia. Notandum autem sensationem tristem, seu depravatam, esse causam formalem secundum Medicos, non proprie: si enim proprie loqui velimus, est affectio præter naturam, quæ tanquam ab efficiente efficitur à sensatione corrupta: nam, quod afficitur, est appetitus sensitivus, & sensorium externum. Appetitus hoc modo afficitur: obiectum commune, tanquam improporcionatum offertur: vnde Philosophus text. 10. lib. 2. de anima, dicit, vbi dolor & voluptas, ibi appetitus: quod accepit ab Hippoc. aph. 7. sect. 2. vbi inquit: *ὁ πόσος καὶ ὁ πόσος τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς ψυχῆς ἐστὶν ὁ πόσος τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς ψυχῆς.* Ecce dolor refertur in sensum internum. Quare, secundum Philosophos, doloris forma est affectio sensus interni: apud medicos autem sensatos, forma doloris statui potest sentatio corrupta sensorij externi: quatenus in sensorium externum referuntur præsidia, de quibus non philosophus, sed medicus loquitur, vt docet Gale. cap. 7. lib. 12. meth.

Subiectum doloris, est organum tactus thoracis: per *Subiectū.* organum autem tactus intelligimus partem quæ ita afficitur & cruciatur à qualitatibus tangibilibus, vt afficiatur sensus communis. Quare hoc sensorium externum tactus, necessario est pars nervosa, cap. 6. lib. 3. de plac. c. 5. l. 7. de plac. cap. 9. lib. 3. de vsu part. Vt autem dolorem hunc ab aliis doloribus

distinguiamus: addimus, thoracis: per thoracem intelligimus partes neruofas thoracis, membranas, musculos: excluduntur cum Auicenna, cor, pulmones, ossa. Porro partes illæ neruofæ sunt organum tactus, solum ratione receptionis, non ratione iudicij: nec enim caro, nec cutis, nec nerui sentiunt, ratione iudicij.

Causa efficiens omnis doloris.

Efficiens causa est solutio vnitatis. Hac dolor à grauitate distinguitur, quæ tristis sensus est, sed fit à materia copiosa, ponderosa, citra solutionem vnitatis, l. 2. l. aff. Per solutionem autem vnitatis intelligimus inotum quendam violentum, aliquid quod est in fieri, & proinde obiectum commune, & quod per se est sensibile, quod tamen (ad proprii sensibilis differentiam) non agit sine proprio, non sine qualitate tangibili. Et hæc solutio vnitatis, vt colligitur è com. 34. lib. 3. de fract. est realis, ita tamen vt sit modo euidens, modo ratione contemplabilis: verbi gratia, in vulnere, est euidens vnitatis solutio: in inflammatione, si ratione sanguinis soluaturs vnitatis, fieri potest vt illa soluta vnitatis non sit euidens, ad sensum, sed tamen realis, ac ratione contemplabilis. Notandum autem nullam solutionem vnitatis esse morbum: quia morbus est in facto esse, solutio vnitatis in fieri. Hinc Gal. c. 2. lib. de diff. morb. inquit: si membrum sit inflammatum, citra exulcerationem, non esse morbum in soluta vnitatis. Porro solutionis vnitatis causa est qualitas tangibilis, & Prima, & Secunda. Quoad primam qualitatem, est intemperies inæqualis, intemperies in fieri, non in facto esse: & potest esse omnis intemperies, tam Simplex, quam Composita, humida tantum excepta: ratio est, quia humida non potest soluere continuum. Qualitas secunda tangibilis, proponitur à Gal. cap. 7. lib. 12. metho. eaque rumpendo, frangendo, incidendo, vel erodendo vnitatem soluit: quare hæc secunda qualitas est quiddam durum, graue, crassum, & reque: ruptio fit à graui & crasso: contusio, à duro & graui: incisio à tenui, sed citra caliditatem: erosio, à tenui cum caliditate. Quare solutio vnitatis fit à qualitate tangibili, quatenus ea est causa vel Interna, vel Externa. Nam quoad primam qualitatem, interna est Continens, vel Contentum. Continens: vt intemperies partis, vnde intemperies vnius partis agit in aliam partem, & eius vnitatem soluit. Potest esse contentum: vt materia seu humor in corpore existens, qui alterando soluit continuum, verbi gratia, sanguis, calefaciendo.

Externa

Externa autem causa, quæ pariter alterando agit: vt, verbi gratia, si dolor fiat ratione medicamenti calidioris applicati. Similiter secunda qualitas tangibilis, potest esse causa Interna & Externa. Interna, vel Vapor, vel Minera: vt vel contundendo, vel rumpendo, vel frangendo, vel abradendo potest continuum soluere: quod etiam efficere potest distendendo, sicuti potissimum contingit in pleuritide. Et hæc de causis solutæ vnitatis, internis, & externis.

Iam tractabimus causas doloris Pleuritici, è cap. 15. lib. de constit. art. cap. 10. lib. 2. de crisi bus, com. aph. 33. sect. 6. cap. 9. lib. 2. de loc. aff. Pleuritidis ergo causa est sanguis: quia omnis inflammatio necessario est affectus sanguineus. At hic sanguis multiplex esse potest: nimir. succus sanguineus, calidus & humidus, biliosus, pituitosus, & melancholicus. Potissimum tamen in pleuritide est sanguis tenuis & biliosus: quia pleura eam obinet densitatem, vt difficulter suscipiat sanguinem crassum, pituitosum, melancholicum. Causæ generantes sanguinem patent: verbi gratia, iecur calidius, generat sanguinem biliosum. Item causæ, sanguini genito impetum tribuentes, patent: harum enim vi sanguis, qui causa est pleuritidis, vel attrahitur, vel suscipitur: attrahitur, ratione doloris, & caloris: vnde interdum contingit inter initia doloris esse in pleura, qui nondum sit pleuritis, seu inflammatio: sed postea, dolore perseverante, sit attractio sanguinis, & hinc inflammatio. Suscipitur sanguis ob imbecillitatem pleuræ, ob laxitatem, vt in iis sit, qui singulis annis pleuritide corripiti solent. Hæc de definitione.

Causa pleuritidis.

Quoad differentias formales, multiplex potest esse species, prout tristis sensatio varia esse potest: vt in dolore capitis ostendimus. In pleuritide tristis sensatio potissimum est pungitiua, quia membrana afficitur. Quoad subiectum: hoc est Membrana, vel Musculus: membrana, Interna, vel Externa, musculus, vel Diaphragma, vel Intercostales: & hi vel Interiores, vel Exteriores. Quoad causam efficientem: dolor lateris prodit à qualitate tangibili vel Prima, vel Secunda: Interna vel Externa.

Differentia.

In genere dolor facile cognoscitur, patiens enim de dolore circa pleuram conqueritur. Differentias à forma manifestat etiam patiens: dum conqueritur de dolore pungitiuo, vel de alio. Quoad differentias à subiecto: cognoscendum, an crucietur thorax, vel secunda totum, vel secundum partem:

Signa.

& si secundum partem, num secundum dextram, sinistram, anteriore, posteriorem, superiore, inferiore: quod patiens declarabit. Membrana affecta esse cognoscuntur, è dolore pungitiuo: musculi è dolore laxatiuo, & si dolor erit inflammatorius, etiam è dolore pulsante. Deinde cognoscere oportet: quænam membrana sit affecta: quis musculus læsus. Membranae autem sunt Externæ, vt periostrium, quod est extra pleuram, & costas intus & extra ambit: dicitur autem externa membrana, quia supra pleuram est: alia membrana sunt Internæ, vt pleura, & mediastinum. Periostrium affectum esse cognoscitur: quando æger, dum decumbit in dolentem partem, magis cruciatur, verbi gratia, si conqueratur de dolore in dextra parte, decumbens super dextram partem magis dolebit: quia per hunc decubitum comprimitur periostrium. Practici vulgares errant, dum statuunt, si æger super parte affecta decumbens peius habet, dolorem esse in parte externa ipsius pleurae: nam hæc membrana est satis tenuis: vt, si inflammetur secundum partem internam, necessario, etiã pars externa efficiatur: quare Galen. per externam pleuram intelligit periostrium, non veram pleuram. Et sic læsum esse periostrium cognoscitur. Cum autem periostrium circumdet costas, secundum partem internam & externam: cognoscitur inflammationem esse potissimum secundum partem externam, quando digitorum pressu dolor exacerbatur. Quod si pleura sit læsa: cognoscitur, quia decubitus super latus dolens minus est molestus: contra, per decubitum in latere opposito pleura extenditur, & tena dolet acerbius. Mediastinum læsum esse cognoscitur: quia dolor affligit per medium pectus, vsque ad infimam partem thoracis: si vero succingens costas membrana afficiatur: dolor potius est ad latera. Quoad musculos: si afficiatur Septum: dolor erit circa nothas costas & augebitur in spiratione, cui diaphragma destinatum est. Si reliqui muscoli afficiantur, facile cognoscetur: dolor enim augebitur ad compressionem thoracis, modo magis, modo minus, prout musculi intercostales vel interiores, vel exteriores, afficiuntur, verbi gratia, si exteriores afficiuntur, per leuè compressionem exacerbatur dolor. Quoad causas efficientes: cognoscendum, an fiat solutio unitatis, vel à qualitate, vel à materia: & si à qualitate, num à prima, vel secunda. Quoad primam: cognoscitur, quia dolor est stabilis, non errans, sine gravitate. Et hæc prima qualitas, cum multiplex esse possit:

possit: si fuerit caliditas: cognoscitur è dolore insigni, cum sensu caliditatis: causæ præcesserunt: calida nocent: frigida iuuant. Si frigiditas, cognoscitur ex oppositis. Si siccitas: cognoscitur è dolore remisso, citra sensum vel caliditatis: vel frigiditatis: causæ exsiccantes sunt prægressæ: exsiccantia nocent, humida iuuant. Quoad materiam, vel secundam qualitatem tangibilem: hæc materia potest esse Vapor, vel Minera. Si vapor: cognoscitur è dolore errante: Si flatus existat satis crassus, ut dolor sit summus: patebit è dolore, qui erit citra omnem grauitatem: & cognoscitur præterea à iuuantibus, quia iuuant discutientia. Si est minera: dolor est stabilis, & cum grauitate. Præterea, cum minera esse possit vel cum, vel sine putredine: si non est putrida, non aderit febris: si putrida, contra: tumque illa erunt signa pleuritidis, de quibus Galenus cap. 15. de const. art. c. 10. l. 2. de crisi. c. 8. l. 4. de caus. puls. nimirum dolor pungens, difficilis respiratio, tussis, pulsus ferratus, febris continua. Dolor quidem est pungens: eo quod membrana est inflammata. Respiratio est difficilis, frequens, crebra: nam ob materiam, inflammationis causam, non potest dilatari pleura, unde hic defectus frequentia suppletur, ideoque est difficultas, nam frequentia intenditur, quia augetur necessitas, ratione febris. Adest tussis: quia pulmo compatitur. Pulsus est durus: quia pleura afficitur, quæ est corpus densum: & pulsus euadit ferratus, quia pleura ob sui resistentiam inæqualiter à materia obsidetur: est velox & frequens, ob caliditatem febrilem. Febris est continua: nam fuligines assiduo cor percutunt, à pleura inflammata. Quænam autem sit materia pleuritidis, cognoscitur ex Auicenna & Galeno, com. aph. 33. sect. 6. nam si sputum sit rubicundum causa est sanguis: si flauum, bilis: si nigrans, melancholia: si albicans, pituita. Sed quoniam in pleuritide, frequenter materia à capite destillat, sputum albicans non potest humorem detegere: ideo aduertendum, num iuncta sit destillatio. Sic etiã sputum nigricans interdum non est signum melancholiz, sed pleuritidis lethalis: præsertim si inter initia præcessit sputum rubicundum, flauum: quod postea nigricans sequitur. Si pleuritis sit sicca, sine sputo: cognoscitur materia, è signis, indicantibus dominium, vel sanguinis, vel alterius humoris in toto corpore.

Præsidia sumuntur à forma, subiecto, & causa efficiente. *Indicatio.* Forma est tristis sensatio: quæ sumitur ratione iudicij & re- nes.

ceptionis. Si ratione iudicij; indicatur remedium mentem ad alia aduertens: nam fortibus detenti imaginationibus, delata sub oculos non vident: digladiatores interdum vulperantur, vt non sentiant, quia imaginationem alio habent conuersam. Receptio non pertinet ad mentem, seu sensum interiorem, sed ad organum; huius ratione indicatur anodynum; quod triplex proponitur, cap. 18. lib. 5. simpl. diggerens, suppurans, & stupefaciens. Hæc tria sunt indicata: ergo necessario tria indicantia: quia vnum non nisi vnum indicat. In tristi ergo sensatione, quæ non ad iudicium, sed ad receptionem refertur, consideramus vel ipsam receptionem, vel opus quod necessario sequitur receptionem. Si consideramus vel ipsam receptionem, ad hanc concurrunt facultas & organum: si enim, verbi gratia, manus percutiatur, non posset excitari dolor, vel receptio dolorifica, nisi facultas à cerebro ad manum transmitteretur. Concurrunt ergo ad receptionem facultas & organum. Facultas nihil indicat, quia non patitur. Organum, quia patitur, indicat. Porro organum producitur à facultate generatrice: (vt in anatomicis docuimus:) quæ agit per potentiam vel alteratricem, vel formatricem. Quoad alteratricem; organum ad recipiendum aptum efficitur ab alteratrice calidum. Hæc ergo temperatura calida, quæ in tristi sensatione habet rationem causæ morbificæ, indicat contrarium, nimirum frigidum narcoticum: calidum quippe organum, indicat frigidum. Galen. inquit, hoc impropriissime esse anodynum: aduersatur enim temperaturæ, seu calido innato, id est, illis quæ secundum naturam se habent. Deinde generatrix per potentiam formatricem, organum sensus tactus facit rarum: vbi enim nervi sunt molliores, sensus est magis exquisitus, vt in orificio superiori ventriculi: quia vbi maior raritas, ibi spiritus animalis promptius mittit suos radios, quorum beneficio facultas sensitiva est magis apta ad recipiendum. Organum ergo, vt rarum, habet rationem causæ morbificæ, in tristi sensatione: ideoque indicat emplasticum, vel suppurans, quatenus hoc densare potest. Et hoc proprie est anodynum; est enim moderate calidum, nec aduersatur calido innato: non tamen est propriissime anodynum, quia, licet densans non aduersetur organo, vt est particeps calidi innati; aduersatur tamen organo in eo quod hoc debet esse rarum; nam densitate organi raritas imminuitur, vt radij spirituum animalium

Animalium non ita prompte transmittantur. Tertio & ultimo, si consideretur tristis sensatio, & quidem receptio, ratione operis; indicatur leuiter digerens, quod calidum est in primo, & tenuis substantiæ. Hoc opus est materia, quæ dolore sequitur, seu quæ à dolore attrahitur: non materia quæ præcedit dolorem (hæc enim est causa efficiens:) sed quæ ante dolorem non fuit, & opus est tristis sensationis: in dolore enim dum facultas expultrix ad expellendum insurgit: tunc concurrit in partem dolentem aliquid sanguinis & spiritus, ut pars dolens aliquo modo repleatur: ut docet Galenus cap. 3. lib. 13. methodi. Et hæc materia, quæ sequitur dolorem & receptionem, est illa quæ indicat digerens. Hoc indicatum, secundum Galenum, est propriissime anodynum: cum enim sit calidum, non aduersatur temperaturæ organi, seu calido innato: & cum sit tenuis substantiæ, non aduersatur raritati. Quare tristis sensatio indicat Aduertens mentem ad alia, Frigidum, Densans, moderate Discutiens. Subiectum, seu thorax quid indicet, patet: & forsitan pleuritis potest requirere secundum sui proportionem remedium pleuriticum, quod quidam pro secreto habent. Quoad causam efficientem: solutio unitatis non indicat vtile: qualitas autem tangibilis indicat, ut est causa solutionis unitatis, & proinde doloris. Prima qualitas, indicat alterans per contrarium, verbi gratia, caliditas refrigerans. Secunda qualitas, est materia, nimirum Vapor, vel Minera: vapor indicat discutiens; minera sensibilibiter euacuans, verbi gratia sanguinea sanguinem vacuans. Cæterum, cum hæc materiæ sint mistum præter naturam, lædens hominem secundum thoracem: hinc variæ sumuntur indicationes. Cum enim sit mistum præter naturam; peccare potest secundum formam, qualitatem, & quantitatem. Vitium secundum formam potest esse duplex: vel enim materia est putrida, & indicat eradicans; vel non est putrida, habet tamen formam & naturam aduersariam corpori nostro, ut materia venefica, virulentia Gallica; & hæc non indicat, quia non est nota essentia, sed requirit alexipharmacum. Peccatum secundum quantitatem indicat minuens. Secundum qualitatem vitium, indicat alterans per contrarium, calidum indicat frigidum. Peccatum secundum qualitatem motiuam, indicat reuulsorium, derivatorium, reprimens. Peccatum in quiete, indicat discutiens. Si sumatur materia, ut lædit, si vehementer lædit, indicat

remedium vehemens seu validum; vt lædit thōracem, indicat remedium vacuans per tussim.

Prognostica.

In genere de periculo nihil statui potest: quidā enim dolor est periculosus, quidam vacat periculo. Quoad differentias igitur formales, vt tritis sentatio est magis, vel minus vehemens; ita etiam intenditur discriminem. Quoad differentias ē subiecto, cæteris paribus: dolor magis est periculosus, si occupat partes internas. Quoad differentias à causa efficiēte: sufficiat vim materiæ perpendere: nam si verbi gratia fiat dolor in thorace, vel ē vulnere, vel ē contusione: non pertinet ad vos, sed ad cheirurgos de pronostico loqui. Materia potest esse vapor, vel minera: cæteris paribus; dolor magis est periculosus, quoniam facilius vapor expugnari potest. Quoad mineram, de ea saltem materia loquimur, quæ potest esse causa pleuritidis: & cum fiat pleuritis à sanguine: oportet sanguinis vim, seu vehementiam perpendere. Sanguis ergo, causa pleuritidis, est mistum præter naturam, pleuram lædens. Quatenus sanguis est mistum, oportet considerare, an sanguis sit purus, an potius biliosus, pituitosus, melancholicus, cap. 15. libr. de constit. art. & cap. 10. libr. 12. de crisis. Si sanguis sit vel purus, vel biliosus: pleuritis erit minus periculosa: si melancholicus, summe periculosa: non ita si pituitosus, quamuis sit diuturnior, quam si in causa sit sanguis biliosus, aut purus. Si perpendamus vim sanguinis, vt est præter naturam: peccatum est secundum formam, quantitatem, qualitatem. Quoad peccatum secundum formam: si sanguis fuerit summæ actiuitatis, est pleuritis periculosa, verbi gratia sanguis in pleuritide est summæ actiuitatis, dum pleuriticus laborat morbo Gallico: iccirco summum est prædicendum periculum. Quod si sanguis, qui causa est pleuritidis, sit summe putridus: pariter pleuritis est admodum periculosa, & ferme lethalis. Quoad vitium in quantitate: quo sanguis copiosior, eo malum magis periculosum. Quoad qualitatem, sanguis calidior, & tenuis, citius potest vinci: at viscidior, crassior, tardius. Quoad peccatum sanguinis in quiete: quo magis patti adhæret sanguinis, eo periculosior pleuritis, soletque in empyema degenerare. Quoad motum materiæ: pleuritis periculosior, si motio fiat per modum transiusionis, quam per modum attractionis. Vnde Hippocrates aphor. 11. sect. 7. à pleuritide peripneumonia, malum: nam dum materia mouetur intro, ad pulmones, malum

malum: si extra, est potius bonum. Si denique consideremus sanguinem, ut lædit: quo vehementius lædit, eo periculosior pleuritis. Hinc Gal. cap. 5. lib. 4. de præfag. e. puls. dicit: si pulsus sit maxime durus, euidenter serratus, paruus, creberrimus, lethalis est pleuritis: quia hi motus nobis significant vehementissimam læsionem sanguinis. Si perpendamus sanguinem, ut lædit pleuram: si verbi gratia lædat pleuram secundum partem sinistram, est pleuritis deterior, propter sinistrum cordis ventriculum.

Quoad materias, primum de cheirurgicis loquemur. Dicit autem Auicena. inflammationi thoracis cõmuniter conuenire venæ sectionem. At vero Hippocr. com. 11. libr. 2. de rat. vict. acut. ait, dolore ascendente esse secandã venam: descendente esse vtendum pharmaco. Hoc loco ergo duplex est indicatum: scilicet remediũ vehemens, vacuans sanguinem, cuius materia est venæ sectio: & remedium vehemẽs, vacuans humorem aliũ à sanguine, cuius materia est niger helteborus, peplus. Si duplex indicatũ, ergo duplex indicans, alterũ, sanguis: alterum, succus non sanguineus. Hippoc. autem ad hæc duo indicantia respicere, inde probari potest: quia loco citato non loquitur de omni pleuritide, sed de ea quæ fit à sanguine, mĩsto cum alio succo: nam à principio illius secũdi lib. de rat. vict. vsque ad 11. & 12. contextum, loquitur de illa pleuritide, in qua licet fomẽta tentare, quibus dolor sedetur: & si fomentis dolor non minui, sed intendi videatur, confugit ad venæ sectionẽ, & ad pharmacum. Quod si pleuritis, de qua loquitur Hipp. esset pleuritis à solo sanguine facta, citra permissionẽ: non institueret curã tentatiuã: nec anim ita fuit ignarus, vt non cognosceret affectũ exquisitẽ sanguineũ. Pater igitur, ratione huius curæ tentatiuæ, proponere Hippoc. eam pleuritidẽ, quæ fit à sanguine, permisto cum alio succo: ideo duplex indicans, sanguis, & succus ab hoc diuersus. Cur autem Hippoc. dolore ascendẽte sanguinem vacuat: descendente purgat? Respicit ad citã celere inq; doloris remotionẽ: agit enim de insigni dolore, quem fomentis mitigare non potuit, imo qui inde auctus est. In remouẽdo hoc dolore, respicit ad essentiam indicantis: quæ petenda est à motu materiæ peccantis, prout scilicet inclinationem & impetũ habet sursum, vel deorsum. Quare in pleuritide, quæ fit à sanguine, permisto cum aliis succis, si dolor vehemens sit, qui fomentis non cedat: mitigandus est euacuatione materiæ

*Curatio.
Venæ sectio
dolore as-
cendente:
pharmacũ
descendẽte.*

fluxu:

flux: quod fit, dolore ascendente per venæ sectionem, descendente per pharmacum. Permittens supposuit Hippocrates: at Galenus vt interpret, id proponit: Si enim febris sit vehemens, quamuis minus vtile sit dolore descendente venam secare, est tamen tutius: magis quidē vtile est pharmaco vti, quia pharmaco euacuatur materia, quæ est causa doloris, non item per venæ sectionem, scilicet dolore descendente: tutius tamen est secare venā, quando febris est intensas: tunc enim virtus non potest sustinere caliditatem pharmaci, & febris. Et hæc de illo Hippocratis loco.

Si sputum sanguineū, num secanda vena. Vallisius aliter interpretatur, in suis commentariis.

Licet autem pleuritis sit inflammatio, & affectus sanguineus, sanguinis vacationem indicans: non tamen semper secanda est vena, quamuis virtus sit robusta, exempli gratia in pleuritide cum sputo sanguinolento: vnde Hipp. circa finē sect. 3. li. 6. epid. non mittit sanguinē in pleuritide, in qua sanguis exspuitur: Gal. rationem affert, quia Inflammatio est mitis. Quidam hac decepti auctoritate, nunquam secant venā, si sputum sit sanguineum. Sed nos ad methodum & fundamenta reuocātes omnia, distinguere debemus, dum sanguis exspuitur; num sanguinis peccatum sit vehemens, necne. Si non est vehemens, mitis est inflammatio: qualis ea fuit, quæ ab Hippoc. proponitur: dum scilicet sanguis qui fluit, egreditur, non retinetur, ideoque sensibiliber dolor imminuitur: è quibus mitis cognoscitur inflammatio: ideoque tunc non est secanda vena: quia sanguis in hac miti inflammatione à materia euacuatur per trāsīm. Si peccatū sanguinis sit vehemens, inflammatio nō est mitis: dum scilicet æger exspuit sanguinē, sed in parua copia, & dolor non minuitur, sed intenditur potius: quia scilicet maior est portio sanguinis fluentis, quam eius qui excernitur: proinde vena secanda, cum vitium sanguinis sit vehemens. Patet an in pleuritide venā secare liceat.

Circa quid agendum specificum: notandum, vacuari debere sanguinem ad lbj. si ad lbj. peccat. Sed hoc est peculiare in pleuritide, sanguinem statui peccātem, qui non modo fluit, verum etiam fluxit: nam sanguis fluxus est in causa doloris, quam per venæ sectionem volumus imminuere: vnde merito Hippocrates tom. 10. libro 2. de vict. ratio. permittit egredi sanguinem, vsque ad eius mutationem: quia hæc nobis significat mutari sanguinem etiam fluxum, qui actu causat dolorem. Vfus venæ sectionis. *Quantum agendum.* sumitur ab actione sanguinis. Si ergo summa sit sanguinis actio

actio, verbi gratia, si dolor sit vehementissimus, ratione copiosi sanguinis: vnica vice & confertim sanguis vacuandus. Supponere autem oportet virtutem robustam: si enim debilis sit: vel repetenda venæ sectio, vel cucurbitulis scarificatis complere oportet. *Modus agendi* desumitur à passione sanguinis, vt facilius, vel difficilius egreditur. Quare in pleuritide à sanguine bilioso, foramen faciendum est angustum: amplum, si fiat à sanguine melancholico: medio modo, si à pituitoso, vel puro. *Quoad quando agendum:* oportet intelligere, quæ vena sit primum secanda, & quo tempore vena secanda. Cum autem quando agendum, sumatur à præsentia indicantis, & absentia prohibentis: statim ab initio, quamprimum indicantis sanguinis præsentia adest, & nihil prohibet, vena tundenda. Nec obstat, quod Hippocrates venam Anaxioni die octauo aperuit: nam, vt Galenus notat, à principio non fuit vocatus, alias etiam à principio venam secuisset: quia indicans adest, & nihil prohibet, præsertim virtus inter initia non prohibet, quia fortis est.

Dubitatur num liceat venam secare post fomenta, mitigantia dolorem? Nam Hippocrates lib. a. de vict. rat. inter initia inquit, dolorem lateris tentandum esse fomentis sordare, quæ auctoritas male itellecta, multis est exitio. Si enim summo mane ad pleuricum accedatis, nec venam aperiat, sed applicetis fomenta: fieri potest, vt maior copia sanguinis attrahatur: at postea circa vesperam, propter inuasionem febris, non licet venam secare, & sequentem tamen diem exspectare est lethale, quia nimium augetur inflammatio. Loquitur ergo Hippocrates de vera pleuritide: non de dolore qui fit à flatu: nam præter id, quod signis Hippocrates flatu cognoscere potuit, si flatu non cedat fomentis, quo modo Hippocrates esset arbitratus eum cessurum venæ sectioni: Loquitur ergo de pleuritide, & dolore inflammatorio, de pleuritide exquisita, quæ fit à sanguine: in qua, si non iuuent fomenta, iuuet remedium sanguinem vacuans. Non autem loquitur Hippocr. de qualibet pleuritide sanguinea: nec enim in omni sanguinea progredi possumus cura tentatiua. Quod si ergo pleuritis fiat à sanguine, sed exiguo & in parua copia: nec manifestum sit, an in corpore sit copiosa materia, ob humorum retrocessum: licet tentare fomentis, num doloris causa dissolui queat: & cum in corpore

*Nū fomē-
tis ante ve-
næ sectionē
vis liceat.*

non

non subsit humor, non sit attractio nouæ materiæ. ideoque remouetur pleuritis, & curatur affectus inflammatorius circa venæ sectionē: neque enim vena secanda est, nisi sanguis affectus sit vitio vehementi. Sed si contingat, vt in hac cura tentatiua, post applicatum fomentum non leniatur dolor, sed intendatur: cum hæc intentio significet corporis repletionem, & vitium sanguinis vehemens: tunc vena secanda est, mōnente Hippocrate. Quod si offeratur corpus quadratum, plethoricum, quod pleuritide laboret: fomentis locus non est, sed ante fomenta vena est secanda. Aliud etiam oritur dubium: quia Auicennas quarta, primi, cap. 20. de phlebotomia dicit: cum euacuare volueris, prius seda dolorem: ergo videtur primum dolor fomentis sedandus, deinde vena secanda. Galenus com. aph. 23. sect. 1. dicit: in vehementissimis doloribus, maximum esse remedium ad leipothymiam vsque vacuare. Galenus igitur statim euacuat, nec prius fomentis vultur. Quare confugiemus ad methodum, pro lite hac dirimenda. Versamur circa quando agendum, quod sumitur à præsentia indicantis, & absentia prohibentis: ita vt magis possit indicans, quam prohibens. Hic ergo perpēdere debemus vehementiam doloris, qui sedari debet, & vehementiam sanguinis, qui euacuari debet: & si magis possit dolor, prius fomentis vtendum: si magis sanguis, vena ilico secanda. Quod si igitur vena aperienda sit remota à loco dolente: primum dolor sedari debet, post tundenda vena: quia magis potest dolor, quam sanguis ille remotus, qui dolorē vel nullo modo, vel tarde auferre potest: ideoque sententia Auicenn. hæc est. Cum à longinquo vacuare voles, prius dolorem seda. At si vena secanda est proxima: magis potest sanguis, quam dolor: & per venam proximam apertam vacuatur sanguis, qui actu causat dolorem: ideo in doloribus vehementissimis Galenus, respiciens ad venā proximam, ante fomenta venam secabat. Ergo, si sanguinis assit vehemētia, semper ante fomenta vena est diuidenda.

*Que vena
aperienda:
& si plu-
res, quo
ordine.*

Quoniam vero plures interdum venæ sunt secandæ: videndum quæ primo, quæ secundo incidenda. Auicennas in thoracis inflammatione, primum secat saphenam oppositam lateris: deinde venam brachij oppositam: tertio venam brachij eiusdem lateris. Hic ergo proponitur & Vbi, & Quando agendum. Quoad *vbi agendum*: respicit Auicennas ad triplicem subsistentiam sanguinis: ideo enim tres venas secat.

Nam

Nam si materia fluxa, quæ consistentiam habet in pectore, sit exigua: sufficit interdum secare tantum saphenam, ut euacuetur in toto materia existens, & ad locum distantem fiat reuulsio. Si autē maior sit copia materiæ fluxæ, oportet secare venam eiusdem lateris. Tres denique venas secat Auicennas, quādo triplex est sanguinis subsistētia: accidit enim interdum, ut corpus vniuersum sanguine sit repletum: quare cum sanguis habeat subsistentiam circa partes infernas, infra iecur: merito probatur sectio saphenæ: & cum sanguis etiā habeat subsistentiā supra iecur, secundū partem & dextram, & sinistram, recte secatur vena vtriusque brachij. Hæc ergo ratio est, cur triplex tundēda vena. Quoad *quando agendum*: Auicenn. primo secat saphenā, deinde venam brachij oppositi, tertio eiusdem lateris: non quod semper ita sit agendū sed tum, quando adest præsentia indicantiū, & nihil prohibet. Si ergo materia fluxa, pleuritidis causa, sit exigua: quæ autē fluit, & fluxura est, sit copiosa: tunc adest præsentia sanguinis indicantis: sed magis potest materia fluxura, quam fluxa, quia dolor est exiguus, qui nobis patefacit, nō esse admodum vehementē vim sanguinis fluxi. Quia ergo quando agendū, indicatur à præsentia eius cuius vis est vehemētiore: materiæ autē fluxuræ, non fluxæ, hoc in casu, vis est vehemētiore: ideo Auic. secare debuit alias venas, quam eiusdem lateris. Cæterum, dum perpendimus materiam fluxuram: hæc vacuari potest per venam brachij oppositi, & per saphenam. Auicenn. saphenam secat: quia magis potest materia, quæ est circa artus in febribus: quo magis enim à longinquis attrahes, tanto magis reuelles: efficacior enim reuulsio, quæ sit à longinquiribus partibus: ideoque interdum sufficit remouere sanguinis impetum, per solam sectam saphenam. Non ergo voluit Auicenn. semper tres venas esse secandas, quia & vna interdum sufficit, aliquando duæ, &c. Si enim dolor sit exiguus, & corpus repletum satis: primo saphena scindenda: à cuius sectione dolor vel minuitur, vel non. Si minuitur: indicare possumus, per saphenæ sectionem, sufficientem factam esse reuulsionem, ut alia venæ sectione opus nō sit. At si dolor perseueret: cogimur secare venam oppositi lateris, ut ab alio latere fiat reuulsio: nam existente perseueratiā doloris, sed exigui, magis potest vehementia sanguinis fluxuri, quā fluxi, quia dolor exiguus: quare secūdo loco vena brachij oppositi secanda. Et si ab huius sectione dolor euanescit, nec

nec vehementia intenditur, nihil aliud agendum. Quod si perseveret, tertiam venam aperire cogimur. Nec huic sententiae Gal. aduersatur: licet dicat, sectionem venae ab opposito latere, vel nihil, vel tarde iuuare. Cum enim Gal. agat de quando agendum; respicit ad presentiam vehementis indicantis. Ideoque si dolor sit vehemens, qui, verbi gratia fomentis non cedat, sed augeatur, vel etiam ante fomenta vehemens sit dolor: hic significat, sanguinem fluxum esse vehementem, maximeque posse ad indicandum: ideo quamprimum vena eiusdem lateris aperienda, quia per saphenam, vel oppositum latus, sanguis fluxus non ita potest euacuari: & cum sanguis fluxus sit in causa doloris vehementis, cum non euacuetur per venae sectionem oppositi lateris, remanet dolor; quare remedium nullum: & dolor permanet diutius, quam par sit; quare tardum remedium. Cum autem ad curandum medici plerumque vocentur, quando malum quodammodo progressum est, & dolor est vehemens: certe tunc vena eiusdem lateris aperienda est.

*Cucurbitulae
in scarificatione
case.*

Quoad Cucurbitulas scarificatas, quandoque conueniunt loco sectionis venae, eum virtus debilis est, quae venae sectionem tolerare nequit: vel, etiam si vires mediocres sint, si tamen vniuersum sanguinem peccatum per venam sectione educere non licet, post venae sectionem id supplendum est cucurbitulis scarificatis. Quoad locum: Aetius applicat thoraci. Vbi notandum: quatenus cucurbitulae sunt vicariae venae sectionis, eas nequaquam applicandas esse loco affecto (sicut etiam de venae sectione diximus) sed eo modo administrandas, ut fiat reuulsio, & deriuatio, quae est mistum quiddam ex euacuatione, & reuulsione. Idcirco cucurbitulae, venae sectionis loco adhibita, applicari debent vel infra thoracem, vel in brachiis: nequaquam dorso, loco affecto. Quatenus autem cucurbitulae propria ratione considerantur, ut auxilium topicum: respiciunt materiam fluxam, & euacuationem non totius corporis, sed repletionis determinatam: & quia hic sanguis fluxus subsistentiam habet in thorace: pro euacuatione determinata cum Aetio cucurbitulae applicandae sunt thoraci. Vt imur cucurbitulis loco venae sectionis in principio: contra, cucurbitulis gratia repletionis determinatae, non utimur inter initia, sed post euacuationem totius.

Anodyna.

Medicamenta in pleuritide respiciunt Dolorem, vel Pleuram, vel Causam efficientem. Dolorem respiciunt anodyna: quae

quæ vel propriissimè ita dicuntur, vel propriè, vel impro-
 prie. Propriissimè anodyna sunt, quæ moderate discutiant, *Discutien-*
 calida sunt in primo, & tenuium partium: vt *oleum anethi-*
num, chamamelinum, fenugracum. Quoad vsum: *℞. ol. anethi-*
ni, chamamel. ana ℥ ℥. pulv. tenuiss. anethi ʒ j. Misce. Applicetur
 moderate calidum, nam materia morbilis id indicat, quæ
 calido cedit, frigido non cedit: erit autem moderate cali-
 dum, quia affectus inflammatorius valde calidum prohibet.
 Utendum hoc medicamento, quando dolor est vehemens,
 & nihil prohibet: prohibet autem materia replens totum:
 quare prius aut vena secanda, aut saltem alius mollienda,
 antequam hæc medicamenta applicentur. Locus patet: si
 enim pleuritis sit in dextro latere: illa subsistentia indicat
 parti dextræ esse adhibendum anodynum. Sequuntur ano- *Desantia.*
 dyna propriè ita dicta, nimirum densantia, quæ humida sunt,
 vt *masa, althæa, lac, butyrum, amygd. dulces, aqua temperata mo-*
derate caliditas, hydraurum, farina triticea, panis triticeus me-
diocriter coctus, adeps pullinarius, suillus. Hippocrates fomentis
 ante venæ sectionem utitur, vt inde cognoscat, an materia
 copiosa subsit in corpore. Nos autem loquimur de fomentis,
 quibus post venæ sectionem vti licet, ratione doloris vehe-
 mentis, quæ sunt humectantia densantia, emplastica, suppu-
 rantia (applicentur vt libet.) Quoad vsum. *℞. panis triticeus,*
decoctus in lacte ʒ ij. Utere. Præterea. ℞. malv. alth. ana. Misce. ℞. aqua
℥b. q. fiat decoctio ad consumpt. tertia partis, pro fomento. Possimus
eodem modo pinguedines applicare. Quoad modum: his tepidis
 utendum, & fomentis & inunctionibus. Sumantur vesicæ, &
 dimidia parte repleantur propositis medicamentis. Admira-
 bile est, si hæc medicamenta parentur cum omento: verbi
 gratia. *℞. omentum vel castrati, vel vituli, vel suæ, calefiat mode-*
rately cum oleo amygd. dulc. cum oleo sesamino, & similibus. Tem-
 pus patet, nimirum post venæ sectionem, & postquam cor-
 pus bene expurgatum est. Quoad ubi: his anodynis densan-
 tibus non tantum utendum applicando, sed etiam exhiben-
 do. Nam ubi agendum indicatur à subsistentia indicantis. Si
 ergo pleuritis sit interna, intra costas: medicamenta appli-
 cata, non ita facile possunt permeare, dolor est acerbus, qui
 non cessit venæ sectioni, cuius insignis doloris ratione vi-
 rium lapsus imminet, & membranarum corruptio: ideo co-
 gimur iudicare, sanguinis subsistentiam esse in parte inter-
 na: & tunc hæc anodyna (quod pauci sciunt) exhibenda sunt.

*Frigida,
seu opiata.*

Consulo igitur, ut urgente necessitate, exhibeatis *ol. amygd. dulc. recens expressi* ʒ v ij. Ne enim ratione olei inflammatio interna augeatur: permiscenda est bona quantitas aqua hordei: sic enim dolor mitigatur, nec fervor intenditur. Et tutius est his uti, quam illis medicamentis, quæ sunt frigida, & improprie anodyna dicuntur. Galenus tho. 33. lib. 1. de rat. vict. opiata in pleuritide improbat: nec enim sanant, sed sensum tollunt, & sunt in causa, ut respiratio admodum difficilis evadat. Avicennas in dolore admodum intenso, qui dirigentibus non cedit, vitur frigidis, potissimum si vigilæ infestant: exhibet semina papaveris albi, cum saccharo, quod deterget hoc modo. *R. emuls. sem. papa. ʒ iij. sacchari ʒ j. addantur duo vel tria cochlearia prisana hordeacea colata.* Medicamenta hæc non exhibeantur actu frigida, quia virtus prohibet causa respirationis: licet frigida magis obtunderent doloris causam. Quoad quando: exhibeantur si est dolor vehementissimus, qui vigillarum sit causa. Quoad ubi: hæc extra applicari non debent; maxime enim læderetur respiratio: sed intro per os tantum danda sunt.

*2. Appro-
priata.*

Sequuntur medicamenta, subiectum, seu pleuram respicientia: talia sunt dens apri, flores rubri papaveris, quorum magna copia est tempore messis: ego non raro sum usus, dolor enim sedatur, & pleura roboratur, ut materiam expellat morbificam. Quoad usum: *R. dens apri ʒ i flor. papav. rubri ʒ ij. addantur syr. de liquirit. vel de capill. Ven. ʒ β. Misc.* Quoad modum, potest esse lambitium, vel electarium. Efficax hoc est electarium: *R. pulv. dens apri ʒ β. sem. rubri papav. ʒ j β. conservæ flor. malvarum ʒ j β. cum syrupo viol. fiat electarium, cuius dosis a ʒ j. ad ʒ β. exhibeatur per unam, vel duas horas ante omnem cibum. Saepe detur: quia mitigatur dolor, euacuatur materia, fouetur pleura proportio.*

*3.
Causam re-
spicientia.*

*Quando
purgandū
in pleuri-
tide.*

Quoad materiam medicinale, quæ causam efficientem respicit potissimum in pleuritide: hæc medicamenta referuntur ad materiam, vel existentem in Toto, vel in Thorace. Quæ totum respiciunt, postulant discursum generalem. Vnum notandum, circa quando purgandum. Hippocrates dolore descendente, inter initia pharmacum propinat, ut peplum, helleborum. Vult ergo in principio esse exhibendum: sicut enim dolore ascendente vena secunda est inter initia: ita descendente, purgandum inter initia, nisi febris prohibeat. Dolore quidem ascendente pharmacum solvens in declinatione propinandum: nam in principio secatur vena, in de

in declinatione autem cum materia sit concocta, nec assit cruditas, nec febris vehemens, adest indicans, & nihil prohibet. At si dolor descendat, pharmacum modo in principio, modo in declinatione exhibendum: prout adest indicans, & non adest prohibens. Si igitur in principio assit indicans, & non assit prohibens: tunc in principio solvens erit exhibendum. Non adest prohibens, si febris sit remissa: tunc enim magis potest materia morbifica ad indicandum, quam febris ad prohibendum. Idcirco Galenus ait: si febris sit vehemens, non esse purgandum: si non sit vehemens, etiam exhibendam esse colocynthidem. Sed dubitatur, quomodo, dolore descendente, in principio, materia quæ, adhuc cruda est, magis possit ad indicandum, quam vel febris, vel materiz cruditas, ad prohibendum? Non potest responderi, materiam illam turgere: ea enim turget & furiosa dicitur, quæ huc illuc agitur, ut ignoretur in quod viscus ruere possit, metusque sit, ne petat partem aliquam principem: at materia in pleuritide habet raptum ad partem ignobilem, & ad partem quam medicus cognoscit. Quare dicendum, hanc materiam morificam esse crudam, & habere impetum deorsum, ad partem inferiorem pleuræ: hancque materiam, ut habet impetum deorsum in pleuram, magis posse ad indicandum pharmacum, quam cruditas ad prohibendum. Ratio est, quia Hippocrates loquitur de pleuritide, in qua est dolor vehemens: non de omni, sed in qua dolor fomentis non cedit. Dum igitur augetur dolor ob impetum materiz: occurrendum est, ne ob materiz impetum, maxima exciteretur inflammatio. At fomentis occurrere non possumus. Ergo solvente pharmaco materia hæc euacuanda: ideo materia magis indicat, quam cruditas prohibeat, quamque febris remissa prohibeat: præsertim quia hæc materia, quatenus impetum habet deorsum, facile redditur obediens pharmaco deorsum trahenti. Si febris sit intensa, Avicennas noctu purgat: nos vel die, vel noctu, prout adest indicans, & abest prohibens. Si enim pleuriticus noctu peius habeat, interdum purgamus: quia morbi vehementia noctu prohibet. Avicennas autem ita loquitur, ut significet, dolore descendente, cum summa vehementia materiz, impetum deorsum habentis statim inter initia pharmacum esse exhibendum, ita ut etiam noctu demus, si circa vesperâ vocemur, diem sequentem non expectantes. Quod si

autem febris fuerit vehemens, secundum Galenum vena secanda, etiam dolore descendente: & eodem die vti possumus medicamento inferius vacuante, sed leniente: Verbi gratia, mane secetis venam, circa vesperam exhibeatis leniens.

*Discussien-
tis vapo-
rem.*

*Repellen-
tia mate-
riam fluen-
tem.*

Quoad materiam fluentem, in thorace contentam: si sit Vapor, non est verus dolor pleuriticus: & tunc vti licet *anetho, chamamelo, feniculo, cumino, dauco, aniso, petroselino, aromatis, & aliis*, quæ sua caliditate nō nocent, quia affectus non est inflammatorius. Si autem materia fluens fuerit Minera: repellentibus & astringentibus parce vtendum, cap. 17. lib. 11. meth. impediunt enim thoracis dilatationem. Sufficit ergo oleum rosaceum potius completum, quam omphacinum, cum aceto. Et, si materia sis biliosa, addatur oleum violaceum, vel potius aqua violarum: si pituitosa, oleum chamamelinum, mastichinum. Vtus sit pro discrimine indicantium, verbi gratia, si materia sit biliosa, & proinde huius sit maior actio quam pituitæ: potestis oleum rosatum completum in maiori quantitate præscribere, quam in pleuritide à sanguine pituitoso. Quoad modum: cum Galeno cap. 15. lib. 1. ad Glaucon. in calida fluxione vtendum est oxyrrhodino, actu frigido: in frigida, tepido: quod in genere de inflammatione dictum, in pleuritide locum non habet, nunquam enim in hac actu frigidum esse debet medicamentum, quamuis in fluxione biliosa minus calidum esse debeat. Quoad quando: vtendum his medicamentis, dum adest præsentia indicantis: nimirum in principio, dum materia fluit, & non est impacta. Oporteret autem abesse prohibens. Prohibet in principio materia existens in toto & thorace. In toto, dum est admodum copiosa: quare in primis vena secanda, antequam vtamur reprimentibus. Per materiam in thorace existentem, intelligo materiam, quæ est in aliquo viscere thoracis, & mouetur in thorace existens, vel à corde, vel à pulmone ad pleuram: verbi gratia, quando peripneumonia mutatur in pleuritidem: in hoc casu reprimentibus æger necaretur, quia impetus est à parte nobili ad ignobilem: & reprimentia præterea prohibentur à virtute debili cordis, pulmonis, quatenus hæc viscera propter imbecillitatem facile suscipiunt. Quamobrem, si adest tussis, quæ tamen non sit ratione pleuritidis: si adest peripneumonia: si homines sunt obnoxii palpitationi cordis: significatur harum partium imbecillitas: ideoque tunc nullo pacto reprimentibus vtendum. Quoad vbi: patet, quod parti dolenti

dolenti sint adhibenda medicamenta.

Si materia iam fluxa sit, at nondum impacta: si fuerit san- *Expecto-*
guis, præsertim feruens ac biliosus: exhiberi debent, *rantia.* *Syrupus*
violaceus, iuiubinus, de capillis Vener. item iuiuba, sebesten, amy-
lum, saccharum candum, amygdala, semina frigida maiora & mi-
nora. Si sanguis non sit ita feruens, his adiungemus *Syrupum*
acetosum simplicem. Si sanguis sit pituitosus: addemus *oxymeli*
simplex, Syrupum liquiritia, Syrupum de farsara, loch de pino, loch
de pulmone vulpis: & parabimus eclegma è melle, è mulsæ: nam
ratione sanguinis pituitosi opus est detergentibus. Si san-
guis fuerit melancholicus: aduertendum, an sanguis ille sit
exustus, nec ne. Si exustus fuerit: addatis *Syrupum de pomis*
simpl. Syrupum violatum, mucilagines seminis altheæ, maluarum:
addatis passulas, caricas. Si non fuerit exustus: satis erit, vti me-
dicamentis, quibus etiam vtimur ratione pituitæ, id est at-
tenuantibus, ratione crassitie. Hæc igitur sunt medica-
menta, quibus vtimur pro euacuanda materia, in thorace &
pectore existente. De *Vsa.* Dosis augetur vel minuitur, pro
varia ratione indicantis: nimirum pro copia, caliditate, cras-
sitie, tenuitate, visciditate. Ratione ergo bilis, quæ calida ac
tenuis est, & proinde summæ actionis, ita præscribemus:
R. Syrupum violatum 3 j ß. sacchari candi violacei 3 ß. emuls.
semn. melon. cucurb. ana 3 iij. Mis. fiat lambitium. Si sanguis fue- *Cum aceto*
rit pituitosus, crassus, viscidus: ita præscribatur: *R. oxymeli. paratorii*
simpl. 3 j ß. Syrupi de farsara 3 ß. penidiorm 3 iij. Mis. & fiat usus vite-
lambitium. Quoad modum: lambitium potest esse magis *tur ubi ner*
vel minus liquidum. Minus liquidum conuenit, dum ma- *nosum ge-*
ior est resistentia, difficilior passio: vt si sanguis sit pituito- *nus imbe-*
sus & melancholicus: contra, si biliosus. Quoad quando *ckum est,*
agendum: his medicamentis vtendum, dum adest indicans, *in pueris,*
& nihil prohibet. Indicans adest, dum materia morbifica *macilentis,*
egreditur pleuram: hoc enim tempore materia mouetur *hystericiis,*
in pulmones, & per tussim ope eclegmatum excernitur: *&c.*
non debet manere in thorace, quia orietur empyema:
lambitiui igitur vtendum, quando materia egreditur pleu-
ram: ergo quamprimum: nam in pleuritide inflammatio-
nis materia etiam inter initia reludat, sicut in ophthal-
mia. Quare inter initia eclegmatis vtendum, nisi absit
prohibens. Prohibet autem primum materia existens in
toto. Male igitur quidam practici in prima vilitatione

præscribunt lambitua (sunt quasi fœmina, ita Medici) nam materia in toto existens prohibet: eclegma exhibitum est in causa tussis; tussi autem agitantur pulmones, thorax, & pleuræ: ideoque si corpus sit repletum: maius sit nocumentum, ratione attractionis nouæ materiæ, quam iuuentis. Quare & post venæsectionem, & post leniens, lambitua denum præscribi debent: potestque & sanguis vacuari, & leniens exhiberi. eo leni die: nec enim cunctandum. Prohibetur etiam lambituum, à materia, quæ euidenter replet ventriculum, & præsertim à materia cibali. Hinc boni præfici lambitua exhibent ante cibum: & minimum per duas horas post cibum. Vbi agendum, patet: materiæ enim substantia indicat, medicamentum per os esse exhibendum.

*Resolutio.
materia
impactam.*

Tandem opus est medicamentis, quæ mineram seu materiam impactam vacuent: non potest autem vacuari, nisi mutetur in vaporem. Quare hæc medicamenta debent esse calida, tenuis substantiæ: hæc sunt initia, mediocria, vehementia: quibus vtendum, prout materia postulabit. Inter initia recensere licet, quæ proponuntur ab Hippocrate & Galeno, l. 2. de rat. vict. nim. *spongia madefacta in aqua calida, furfures, melleum, althæa, chamæmelum, sanumgracum.* Mediocre medicamentum, secundum Hippocratem, & Galenum, loc. cit. confici potest *ex orobo: item ex anetho, hyssopo, origano.* Vehementius medicamentum conficitur *ex sale, dictamno cretico, balcraio, iberide & sinapi.* Quoad quantum agendum: ita præscribi potest: *R. furfurum M. ss. orobi, mellei, ana ℥j. Misce fiat sacculus & applicetur.* Quoad modum: hæc medicamenta actu calida administrantur, modo magis, modo minus, pro resistentia. Forma potest esse inunctio, fomentum, ceratum, sacculus, vesica. Quoad quando agendum: his vtendum, dum adest materia impacta, nec aliquid prohibeat. Prohibet autem materia existens in toto: licet enim ab initio quædam fiat resolutio, & medicamentum iuuare videatur, postea tamen nocet, quia pars laxior redditur, & fluxio augetur: quare totum ante omnia euacuandum, c. 2. l. 2. ad Glaucon. Præterea prohibet materia in thorace seu pectore existens, sed nondum impacta: hæc ergo linctuum ope primum vacuanda est: deinde accedendum ad materiam impactam. Vbi agendum patet: possumus enim resoluentibus vti & intus, & extra. Intus ea administrari debent, quæ sunt iucunda: nam virtus oris & palati prohibet iniucunda.

Diatæ.

Dieta, pro causæ varietate variat. In biliosa pleuritide victus magis debet esse refrigerans, quam in pituitosa. Victus autem in hoc affectu inflammatorio non erit plenus, nam interficerentur ægri: sed tenuis: Dabitur ergo *ptisana colata*, & parata potius sine carne. Licet exhibere panem, vel in aqua, vel in iure dilutissimo. Licet exhibere mulsam, & eam potius aquosam. Nam beneficio huius victus: materia ex accidenti euacuatur: & virtus robusta solet permittere. De usu ciborum. Quoad quantum agendum: pro actione materiæ morbificæ, & actione virtutis, oportet augere, & imminuere quantitatem. In pleuritide summa est actio materiæ, si copiosa est materia; quo ergo materia copiosior, eo minus cibi alimentalis exhibendum. Virtutis autem actio summa est, si debilis est virtus: etenim virtus robusta est despicienda quare virtute robusta existente, cibus admodum exiguus est exhibendus. Quoad modum: sit liquidior cibus, si maior resistentia materiæ. Quoad quando agendum: Hippocrates t. 44. l. 1. de rat. vict. proponit ptisanam, melicratum, & aquam, victum scilicet admodum tenuem, vsque ad nonum diem. Male ergo faciunt, qui illico deueniunt ad cibum plenum. Addit Galenus com. 23. l. 1. de rat. vict. si os madefiat, & sputum à pulmone prodeat; bonum esse, sorbitionem exhibere, & sorbitionis quantitatem augere. Et in com. 25. ait; quod, quo plus expurgatur materiæ; eo plus cibi sit offerendum, vsque ad iudicationem. Et com. 22. dicit: antequam appareat sputum, sorbitionem esse exhibendam exiguam. Et com. 25. dicit: mane sorbitionem esse exhibendam: vespere autem cibum: sorbitio est victus magis tenuis; cibus, minus tenuis. Hæc ad methodum reuocanda. Dum est sputum, dum os madefit; virtus magis potest ad indicandum alimentum, quam materia morbifica ad prohibendum. Contra dum non est sputum; materia morbifica magis potest ad prohibendum alimentum, quam virtus ad indicandum. Ratio: dum enim sputum adest, fit euacuatio materiæ morbificæ: & eo tempore, præter id, quod minuitur materia morbifica, sputum etiam vacuatur per tussim, vt pulmones laborent: vbi autem labor, ibi non prodest fames. Præterea Galenus in cœna exhibet cibum minus tenuem: non quod hoc semper obseruandum sit: sed quod eo tempore consuetudo esset, vt liberalius cœnarent, quam pranderent. Respiciat ergo Galenus ad consuetudinem; quæ non est indicans;

Potus. sed signum manifestans nobis virtutem, quæ magis eotem-
pore cibum potest regere. Quoad potum: Hippocrates com.
40. l. 3. de rat. vict. improbat aquam crudam, quia non permeat.
Coquenda igitur, & alteranda attenuantibus, aceto hordeo, & si-
milibus. Admittitur etiam vinum aquosum exiguum. Et com. 2.
atque 4. l. 3. de rat. vict. videtur probare vinum dulcem, sed non
admodum crassum. Hinc quidam satis sunt in vino præbendo
audaces. Igitur quoad vsum, & quando agendum: aqua est
exibenda tempore cibi, vt sit cibi vehiculum: & virtus non
prohibet, plerunque in declinatione Vinum etiam exhiben-
dum tempore cibi, vt vehiculum: prohibet autem inflamma-
tio: quare quandiu illa adest, non debet vinum exhiberi,
com. 2. l. 3. de rat. vict. com. 2. l. 1. eiusd. magis enim nutrit vna
potio mellis, quam duæ potiones vini aquosi. Quare præ-
sente febre: & existente inflammatione, non debet vinum
dari, sed potio iam proposita.

CAPVT. IIII.

De Empyemate.

Nomen.*Definitio.*

Empyema intelligimus illud vitium, in quo
thorax repletur materia purulenta, cap. 2. l. 2.
meth. cap. 8. lib. 5. meth. c. 9. l. 4. de caus. puls. com.
aph. 17. sect. 6. Generatur hoc malum, quoniam
pus præter naturam replet cavitatem thoracis. Empyema
ergo est constipatio cavitatis thoracis, prodiens à pure. For-
ma huius vitij est constipatio: quare angustia determinata,
id est distincta ab obstructione, & reliquis angustiarum specie-
bus. Subiectū est thorax, vt obtinet cavitatem: nā si perpe-
datur thorax nō secundum cavitatem, sed potius quantitatem:
empyema potest statui morbus in magnitudine aucta.

Causa.

Causa efficiens est materia purulenta: ad differentiam hu-
moris & aquositatis. Discurremus ergo circa pus: de quo Ga-
lenus agit, c. 3. 6. 8. & 9. l. 5. simp. & com. aph. 47. sectio. 2. & c.
5. l. 4. meth. & c. 16. l. 11. meth. Per pus intelligimus conten-
tum, non continens: & proinde multum à toto genere præ-
ter naturam: est enim opus prorsus inutile & superuacaneū:
vt ratione agentis aliqua e parte sit naturale, quatenus ad
huius generationem concurrat, non modo calor præter
naturam, sed etiam calor naturalis. Est autē pus opus, quod
sequitur thoracis vel expulsionem, vel coctionem: Expul-
sionem.

sionem, dum aliunde fluit, & non generatur in thorace: cum videlicet, propter copiam, & propterea ob errorem externum expulsio læditur, vt expultrix non possit expellere: sicut contingit post anginam, post peripneumoniam, post pleuritidem: quando hæc inflammationes ad suppurationem deducuntur. Pus sequitur coctionem: quoties generatur in cavitare thoracis. Vnde empyema, non semper sequitur inflammationem: sed quandoque generatur materia purulenta in cavitare thoracis, vt in destillatione à capite, vt colligitur è Galeno & Hippocrate, aph. 30. & 38. sect. 7. in qua coctione & generatione puris, quandoque læditur facultas, ob thoracis intemperiem, productam à materia destillante: sed quandoque id fit, & potissimum ob errorem externum. Error externus est materia destillans: quæ, cum sit excrementitia, non potest verti in alimentum, sed mutatur in pus, quod tamen non legitimum est, sed spurium: quemadmodum exquisitum est pus, quod prodit à loco inflammato.

Quoad differentias à forma: constipatio est Maior vel Minor. Quoad subiectum: thorax repletur, vel secundum Omnem cavitatem: vel secundum Partem, eamque Dextram, vel Sinistram. Quoad causam efficientem: pus generatur vel Extra, vel Intra cavitatem.

Signa Galenus tradit c. 7. & 8 l. 4. de loc. aff. & l. 2. prognost. com. 60. & seqq. In genere empyema cognoscitur è sensu grauitatis, in profundo thoracis: è fluctuatione: è difficili respiratione, & cum aliquo fœtore: à tussi, quæ primo est sicca, mox cum materia purulenta: è macie: & si progreditur, subsequitur hæctica febris: à pure enim putridi vapores eleuantur qui cor petunt, eiusque solidam substantiam ponunt in calefacto esse. Quoad signa differentiarum à forma: cognoscitur maior & minor constipatio, è vehementia & remissione symptomatum. Quoad differentias à subiecto: si pus, verbi gratia, sit in cavitare dextra, patiens melius decumbet ipsa dextra parte. Et, cum Auenenna, si applicabitis linteum madefactum thoraci, secundum vtramque partem, & dextram, & sinistram: citius id exsiccabitur secundum partem, in qua est materia purulenta. Quoad differentias à causa efficiente: Si empyema succedit anginæ, peripneumonix, pleuritidi: facile cognoscitur pus esse legitimum, & extra genitum: si autem succedat destillationi, oppositum statuendum.

A forma non sumuntur indicationes ex vñu. A subiecto nes.

non sumitur indicatio, nisi vt roborentur thoracis viscera. A causa efficiente, id est à pure sumuntur indicationes : quatenus est mistum à toto genere præter naturam lædens thoracem. Vt mistum præter naturam : oritur indicatio eradicandi, quia à toto genere est præter naturam. Si viscidum : oritur indicatio detergendi : si acre : attemperandi. Vt lædit vehementer : indicat remedium vehemens : ad quam vehementiam respiciens Galenus, dicit interdum narcoticis esse opus. Vt lædit thoracem : indicatur remedium tussiculare, id est, vacuans per tussim.

Prognostica.

Vitium in genere periculosum est : dum enim materia à toto genere præter naturam in cauitate thoracis adest : nisi euacuetur spatio 40. dierum, actum est. Quoad differentias formales : malum est periculosius, si conspitiatio est maior. Quoad subiectum : malum periculosius est, si tota cauitas afficiatur, quam si secundum partem fiat repletio : si repleta est sinistra cauitas, periculosius est vitium, ratione sinistri ventriculi cordis. Quoad causam efficientem : malum est periculosius, vt pus est magis putridum, vt est copiosius, vt acrius & viscidius. Hinc Hippoc. aph. 44. sect. 7. dicit : si effluat pus album, ægros periculum euadere. Adhæc malum est peius, vt pus magis hæret : vt vehementius lædit : vt extra thoracem generatur. Si empyema succedat angina, peripneumonix, pleuritidi : peius est, quam si sequatur destillationem.

Venæsectio.

Quoad prælidiorum materias : patent e pleuritide : notanda quædam proponemus, circa sectionem venæ, & sectionem thoracis. Auicennas venam secat. Galenus autem cap. 7. l. 4. de loc. affect. eos qui empyemate laborant, vires habere imbecilliores : quare non videtur adesse virtus permittens venæ sectionem : Pro resolutione sciendum : si empyema fiat e destillatione, virtutem posse esse robustam. Deinde si fiat empyema ex inflammatione, id bifariam accidere potest : primum, si fiat ruptio inflammationis ante maturationem, antequam sanguis e toto in pus conuertatur : & tunc adhuc est sanguis, & propterea sanguis est euacuandus : & virtus potest esse robusta, quia malum non est admodum progressum, cum sanguis nondum sit in pus conuersus. Et de hoc empyemate loquitur Auicennas : ideoque dicit : si apostema rumpatur ante maturationem, erumpit sanguis : quare necessaria est venæ sectio. Sed si ruptio fiat post maturationem, tunc non adest sanguis, sed pus : ergo non est san-

est sanguis vacuandus: & virtus tunc est debilis. Et ad hoc *Thoracis*
 empyema respicit Galenus. Sectio thoracis est materia ve- *perforatio*
 hementis remediij, vacuantis pus. Vnde Auicennas ait: si ma-
 teria purulenta sit copiosa, vt non possit 40. diebus euacua-
 ri, thoracem esse perforandum. Et Galenus com. aph. 27.
 sect. 6. probat thoracis vstionem, perforationem, dum est pus
 plurimum, vt euacuari non posse videatur. Dum ergo pus
 affectum est vicio vehementi, neque debilibus auxiliis ce-
 dit, oportet ad vstionem confugere: nisi enim fiat euacuatio
 spatio 40. dierum, nulla est spes salutis. Quoad vsum: &
 primo, quoad *quantum agendum*: si fuerit summa actio pu-
 ris: confertim pus est euacuandum: sed quia virtus est de-
 bilis, sentim id, & pluribus vicibus, præstare oportet, vnde
 Hippocrates cognoscens virium infirmitatem, dicit: qui
 suppurati sunt, siue vrantur, siue secentur, si pus vniuer-
 sum fluxerit, omnes moriuntur. aphor. 27. sect. 6. Quoad *mo-*
dum: si vehemens puris est resistentia: licet vti ferro cadente:
 & si virtus sit debilis, foramen non sit admodum amplum:
 amplius, si non ita debilis. Quoad *quando agendum*: sectio vel
 vstio instituenda, quando adest præsentia indicantis, id est,
 quando non potest pus expurgari spatio 40. dierum. Quoad
vbi agendum: pro varia subsistentia thorax aperiri debet, mo-
 do in dextra, modo in sinistra parte. At ossa prohibent: cir-
 co perforatio est facienda inter costas. Virtus etiam medul-
 læ spinalis & viscerum prohibet: vnde perforatio facienda
 est, inferne sursum numerando, in costis legitimis, inter ter-
 tiam & quartam, vel quartam & quintam, ratione visce-
 rum: præterea perforatio debet esse remota à spinali me-
 dulla, per tres digitos, citra extremitatem costarum. Hæc
 de cheirurgia.

Medicamentâ cōmunia supponimus. Ergo proponemus *Expurgā-*
 tantum medicamenta respicientia pus in thorace existens. *sia pus ē*
 Pus ante 40. diem est vacuandū: ne cogamur ad perforatio- *canitate*
 nem confugere. Animaduertendū igitur, num pus mouea- *thoracis.*
 tur, vel quiescat. Si moneatur quandoque mouetur ad vnā
 partē, quādoque ad aliam. Si moueatur, verbi gratia ad aluū:
 exhibeatur *manna*, *mel violatū solut.* *tandē agaricus*: probantur
 etiam *clysmi ē melle rosac.* & *ptisana*: *mel enim rosaceum detergit,*
ptisana detergit, & *acrimoniā puris attemperat, ne intestina abra-*
dantur. Si ad renes impetū habeat: exhibenda diuretica, *re-*
sorach, *petrosel.* *asparagi,* *feniculum,* & *alia diuretica valentia:*
quibus

quibus mitiora permiscantur, ratione acrimonia puris, ut sunt Syrup. de capsul. Ven. semina frigida. Si pus impetum habeat simul & ad renes, & ad aluum: maxime probatur ius galli, mediocriter antiqui, cum melle rosato, ut fiat euacuatio per aluum, & cum diureticis, ut fiat euacuatio per renes. Si ad pulmones impetum habeat: oportet uti loch de pulmone vulpis, oxymeliit simpl. & scillitico, potest aliquid manna addi: & ratione acrimonia puris aliquid syrupi violati, nonnihil liquiritia. Si motum habeat ad cutim: post perforationem maxime probatur mulsæ, modo magis, modo minus diluta, pro visciditate & acrimonia puris. Si denique conquiescat materia purulenta, id est, non habeat impetum: applicari debent althæa, ol. alb. cerine, emplastrum sacrum, & similia, quæ possunt materiam impactam assenuare & dissoluere. Quod si ob puris acrimoniâ dolor sit intensissimus, Auicennæ stupefacientibus utitur, sed cum moderatione, ne respiratio reddatur difficilis. Possumus ergo uti seminibus pap. albi, non ultra ʒ iij vel iij. idque in dolore vehementi.

Narcotica.

Diata.

Diætæ ad proportionem respondebit. Quare si pus impetum habeat ad aluum: cum cibus betæ miscenda, & alia lubricantia, possumus etiam cibariis addere mel, caricæ, passulas, ut aluus fiat lubrica. Si ad renes impetum habeat: cibus permiscenda semina melonum, petroselinum. Et sic de aliis. Potus similiter præstituendus: & nisi sit febris, vinum exhibere licet.

CAPVT V.

De Peripneumonia.

Nomen.



Definitio.

Eripneumonia pene ut pleuritis curatur: quare de ea pauca. Intelligimus autem inflammationem pulmonis, c. 2. l. 2. ad Glauc. Generatur hoc vitium, quia sanguis fluit in pulmones, & ita agit in pulmones, ut calefiant, & tumeant. Peripneumonia ergo est tumor calidus pulmonis, procedens à sanguine. Forma est tumor calidus: unde pulmones in peripneumonia afficiuntur duplici morbo: in aucta magnitudine, quia est tumor: & in intemperie, quia est tumor calidus. Subiectum est pulmo: non pleura, ut in pleuritide. Causa efficiens est sanguis, quia affectus est inflammatorius, cap. 2. lib. 4. de presap. puls. c. 9. lib. 2. loc. aff. Ut plurimum peripneumonia fit à sanguine pituitoso, quamuis possit etiam alius esse sanguis: sicut pleuritis

pleuritis promptius fit à sanguine bilioso, c. 10. lib. 2. de crisi. cap. 12. lib. 4. de caus. puls. pulmo enim laxus est, & bilem susceptam non facile detinere potest: pituitam autem utpote viscidā facilius. Cæterū, cum sanguis peripneumoniæ causa, sit mistum præter naturam, lædens pulmones: quatenus est mistum, potest esse quilibet sanguis, sed præcipue pituitosus. Quatenus præter naturam: peccatum sanguinis esse potest secundum formam, si sit putridus: secundum quantitatem, si copia peccat: secundum qualitatem & primam, & secundam, tum alteratricem, tum motricem: sicut declarauimus in pleuritide. Vt autem hic sanguis lædit: lædit potius vehementer. Vt lædit pulmones: eos vel Totos, vel secundum Partem lædit.

Quoad differentias à forma: ut peripneumonia est tumor *Differentia.* calidus, differentia est secundum Magis, vel Minus. A subiecto: pulmo Totus, vel secundum Partem afficitur. Ab efficiente: sanguis est Purus, vel Permixtus: Item, sanguis vel Attrahitur à pulmone, vel Transmittitur in pulmonem, & vel à Toto, vel à Parte.

In genere peripneumonia indicatur è respiratione, dolore, tussi, pulsu vitioso, febre assidua, & colore maxillarum *Signa.* mutato c. 9. lib. 2. loc. affect. c. 7. lib. 4. de loc. aff. c. 2. lib. 4. præfag. è puls. cap. 12. lib. 4. de caus. pulsum. Respiratio difficilior est, quam in pleuritide: nam maior est necessitas euentandi caloris. Dolor, ad differentiam pleuritidis, est grauatiuus, & satis remissus, non cum sensu punctionis. Ideo estote diligentes, nam interdum medici vocant peripneumoniam, pleuritidem obscuram, & interdum putant esse flatum: unde ægri vinum bibunt, & moriuntur: sicut accidit Fallopio. Tussis molestior est, quam in pleuritide: quia primario afficitur pulmo: in pleuritide per consensum. Pulsus est mollis, velox, creber, inæqualis: qui quandoque magnus videtur, nam vehementer percutitur arteria: sed est tamen languidus, quia vis seu facultas frangitur. Facies denique est rubicunda, ob euaporationem sanguinis in caput. Quoad differentias à forma: symptomata vehementiora, indicant affectionem vehementiorem. Quoad differentias à subiecto: si afficiatur totus pulmo: dolor ille grauatiuus, omnes partes thoracis occupabit. Quoad differentias à causa efficiente, quis nam sit sanguis peccans, cognoscetur è traditis in pleuritide.

Indicatio

Quoad præsidia, secundum Auic. & Rhafim, eadē est curā *nes.*
peripneu

peripneumoniz & pleuritidis : vt differētia tantū sit ratione subiecti. Hic ergo indicatio oritur corroborandi pulmones.

Prognostica.

Malum autem hoc maxime est periculosum : cum enim sanguis vehementer lædat & summa sit actiuitatis, ac resistētiæ: si contingat virtutem esse debilem : vitium prorsus est lethale. solis Sacerdotibus relinquendum. cap. 5. libr. 10. meth. Quoad differentias formales : vt tumor est maior, ita peius vitium. A subiecto: maximum periculum, si totus pulmo afficiatur. Ab efficiente : vehementia sanguinis ponderanda, vt in pleuritide : vbi notandum, peripneumoniam à sanguine bilioso, quæ raro fit, esse periculosissimam : solet enim interdū fieri, ob bilis copiam, & crassitiem, & ob pulmonis imbecillitatem: quæ pessima sunt.

Curatio.

1

Quoad materiam cheirurgicam: Rhasis in principio basilicam secat: deinde curat malum: vt pleuritidem. Vnica enim basilica in peripneumonia est secanda, & quidem statim: nam sanguis est affectus vitio vehementi, & vehementer lædit pulmones: præterea virtus in peripneumonia, quāuis robusta, cito tamen succumbit: cōtra, in pleuritide. Quoad quando: adest indicans, sanguis vehementer lædens, & imminet virtutis lapsus: ergo quamprimum vena secanda.

2

Quoad vbi: sanguis subsistentiam habet circa pulmones : ergo basilica aperienda. Medicamenta conueniunt, quæ in pleuritide: differentia est secundum magis & minus : nam sanguis magis lædit in peripneumonia, quam in pleuritide : quare omnia sunt vehementiora. Præterea discrimen est in loc. affect. in pleuritide læditur pleura: in peripneumonia, pulmo. Ideoque medicamentis miscenda sunt, quæ pulmonē respiciunt, vt sunt *pulmonaria*, *pulmo vulpis puluerisatus*. Reliqua petenda è cap. de pleur. & de tussi. Idem de diætâ iudicium : præcipue in peripneumonia à vino abstinendum, magis enim nocet, quam in pleuritide, quia est inflāmatio visceris intimioris, quodd malum suam affectionem cordi communicat.

3

CAPVT VI.

De Sputo sanguinis.



SPVTVM sanguinolentum, est malum frequēs, quod multos iugulat ob Medicorum inertiam: ideo de hoc malo diligenter tractabimus. Potest autem dupliciter sumi sputum sanguinolentum:

non

non principaliter, cum succedit inflammationi, verbi gratia, quando in pleuritide sputum cruentū eicitur, & de hoc non loquimur. Secundo igitur modo per sputum sanguinolētum intelligimus sanguinem, per os egredientem, & immediate prodeuntem ē vasis sanguinem detinentibus: ad differētiā sputi cruenti non principalis, quod sit, dum sanguis non immediate ē vasis exit, sed ē capacitate membri. Generatur malum hoc, dum causā aliqua præter naturam occurrit vasis sanguinem continentibus, ita ea afficiens, vt facultas retentrix vasorum non possit sanguinem retinere, vnde per os egreditur.

Generatio

Hoc ergo sputum cruentum, est exiens sanguis oris, procedens à læsa retentione vasorum sanguinem continētum. Forma est exiens sanguis, cap. vlt. de diff. sympt. cap. vlt. lib. 3. de sympto. caus. cap. 2. lib. 3. meth. Est exiens mutatum: non morbus, non causa, sed symptoma: non actio læsa, non qualitas, sed exiens: & cum exiens mutatum possit esse varium, hic est sanguinolentum: vbi per sanguinem intelligimus & venalem, & arterialem, ad differentiam alterius materiæ, quæ potest egredi. Subiectum, per quod egreditur, est os: ad differentiam sanguinis egredientis per nares, vel per alias partes. Hoc exiens à toto genere est præter naturam, ratione loci, quia sanguis per os egreditur: ad differentiam sanguinis per vterum exeuntis, is enim locus à natura destinatus est sanguini exeunti, ideoque illa excretio non est præter naturam ratione loci. Non tamen sputum sanguineum toto genere præter naturam est, omnibus modis, & simpliciter: quia interdum egreditur sanguis non putridus: interdum critice per os egreditur: dicitur ergo toto genere præter naturam, ratione loci.

Definitio.

Subiectū.

Causa efficiens, est læsa retentrix vasorū sanguinis. Quare duo explicanda: primo, quæ nam sit causa læsæ retentionis: secundo, quæ sit causa ob quam vasa, sanguinem detinentia, afficiantur. Causa ergo læsæ retentionis est id, à quo pendet exiens hoc mutatum: quod cū sit symptoma secundum necessaria dependet à primo (primum symptoma, est actio læsa qua immediate morbum sequitur: secundum est sum qualitas mutata, tum exiens: quæ è primo dependet.) Primum symptoma est actio: quæ multiplex esse potest: attractio, retentio, concessio, expulsio. In definitione proposuimus retentionem, non alias actiones: nā hæc vasa à natura genita sunt

Causa efficiens.

ad san

ad sanguinem detinendum; ideoque si contingat vt horum
 vasorum lædatur retentio, egreditur sanguis. Læditur autem
 retentio, non ob errorem externum, sed læsa retentrice, eo
 modo, quo facultas lædi potest, id est, quatenus vas, sangui-
 nem continens, quod est sedes facultatis retentricis, afficitur
 aliquo morbo: Nam in sputo sanguineo, necesse est vas affici
 aliquo morbo. Hic morbus quandoque est mala compositio,
 nonnunquam soluta vnitas. Mala compositio est duplex: pri-
 mum Anastomosis, id est, apertio immodica præter naturam
 orificiorum vasorum: qui morbus pertinet ad conformatio-
 nem, vt consistit in meatu. Anastomoseos huius causa inter-
 na, est sanguis copiosus & calidior, qui sui copia & caliditate
 quandoque præter naturam orificia vasorum aperit. Externa
 causa esse potest balneum aquæ dulcis, item aloë, &c. Alter
 morbus pertinens ad malam compositionem, est Diapedesis,
 id est raritas præter naturam meatuum, qui pertinent ad tu-
 nicas vasorum. Huius morbi causa potissimum esse solet
 sanguis tenuior, serosior. Hi duo morbi sunt malæ compo-
 sitionis, vt expresse Galenus in lib. de diff. morb. asserit. Inter-
 rim tamen Galenus cap. 1. lib. 3. meth. videtur anastomosein &
 diapedesein referre ad solutam vnitatem: vbi sciendum, hos
 ipsos morbos non quidem esse in soluta vnitatem, sed posse
 esse causas solutæ vnitatis: hæc enim fieri potest, ex immo-
 dica apertione, & raritate: cum non infrequens sit, vnum
 morbum sequi alium. Tandem est alius morbus, soluta vni-
 tas: à Galeno loc. cit. dicitur *διαρρηξις*, id est, dissolutio. Huius
 solutæ vnitatis causa interna, potest esse sanguis copiosus
 & flatulentus, qui facit solutam vnitatem non quamlibet,
 sed ruptionem: fieri item potest soluta vnitas à sanguine
 aciei qui abradendo efficit solutam vnitatem: vnde hæc soluta
 vnitas non est simplex, sed necessario habet aliquid permi-
 stum, scilicet deperditionem substantiæ partis: & hæc causa
 potissimum est pituita salsa. Causa extrinseca, potest esse
 quælibet primitiua, quæ cum impetu agit: siue sit, verbi
 gratia pondus onerosum, siue vox immoderata, vel quælibet
 alia externa causa, quæ aut contundendo, aut incidendo, po-
 test vasorum vnitatem soluere. Per vasa autem continentia
 sanguinem, intelligimus vasa pertinentia à pulmone, ad
 guttur, ad os, caput, ad ventriculum, ad hepar, ad lienem, ad
 vterum. Anastomosi magis obnoxia sunt vasa calidiora &
 humidiora, quæ promptissime afficiuntur & referantur.

Diapedesi

Anastomosis.

Diapedesis.

Diarrhexis.

Diapedesi obnoxia sunt tenuiora. Quoad digestiōem: si vasa tuerint tenuia & mollia, promptissime abraduntur, & franguntur à causa extrinseca: si crassa & dura facilius dissoluantur ab interna causa, verbi gratia sanguine replente, flatulento, nam vasa dura quia non possunt extendi, rumpuntur.

Quatenus sanguis exiens est mistum: potest esse Sincerus *Differētia* sanguis, vel Permistus cum aliis humoribus. Vt autem est præter naturam, secundum formam vel est Putridus, vel Non: secundum quantitatem, Magis vel Minus copiosus: secundum qualitatem. Primam quidem, calidus est vel frigidus: secundum qualitatem? Secundam: est huius vel illius coloris, odoris, saporis &c. Præterea perpendere oportet motum: vbi respiciendum ad modum, & ad terminum à quo. Ad modum, vt egreditur Critice, vel Symptomatice: item, cum Spuitione, cum Screatu, cum Tussi, cum Vomitu. Quoad terminum à quo: differentiarum oriuntur, vt prodit sanguis à Vena, vel ab arteria: & vel pulmonis, pectoris, gutturis, oris, capitis, ventriculi, iecoris, lienis, vteri. Quoad differentias à causa symptomatis: fit exitus sanguinis, vel ob Malam compositionem, vel ob Solutam vnitatem: si ob malam compositionem, vel Anastomosin, vel Diapedesin: si ob solutam vnitatem, vel Simplicem, vel cum Deperditione partis, vt quando fit ex abrasione.

In genere vitium hoc est manifestum. Quoad differentias symptomatis huius, vt est mistum: num sanguis per os egrediens sincerus sit, an permistus cum alia materia: oculis conspicitur. Quatenus autem est præter naturam, & primo secundum formam: an sanguis sit putridus, nec ne: odor indicat, & sapor: de quo conqueretur ægrotans. Quoad vitium secundum qualitates primas & secundas: sanguinis sputum in genere seipsum manifestat, an calidum, crassum, magis vel minus rubicundum, huius vel illius odoris: quæ vel ex ægri relatione, vel aspectu, manifesta fiunt, verbi gratia si calidum erit, ægrotus dicet, se persentire sensum caliditatis: crassities & color oculis cognoscuntur. Quoad modum sanguinis egredientis: cognoscendum, an exeat vel per simplicem exspuitionem, vel per screatum, vel per tussim, vel per vomitum. An vero exeat per viam crisis, vel non: cognoscitur è tolerantia ægri: nam si exiens est criticum, ægri facile tolerant: & si quandoque contingat in febribus putridis, in ardentibus, signa erunt coctionis: si contra, erit sym-

*Aqua par
te sanguis
prodeat.*

ptomaticum exiens. Circa terminum à quo? cognoscendum, an egrediatur à vena, vel arteria, capite secundo, libro de atra bil. si ab arteria prodeat, sanguis est admodum calidus, satis tenuis, potius flauus, quam rubicundus, & saltu quodam impetuoso exit: contra, si à vena. Deinde etiam cognoscendum, à qua parte sanguis prodeat. Si ergo egreditur è pulmonum vasis, non nisi per tussim excerni potest: nullus dolor erit, quia pulmo sensu caret, & præsertim eo sensu, ob quem dolor oboriri potest. Si à pectore prodeat, egreditur quidem cum tussi, sed potest esse dolor, quia pectus seu thorax non caret sensu tactus. Potest etiam fieri, ut prodeat à capite, & tussi excernatur, sine dolore: hinc si contingat, ut sanguis in capite existens, descendat in pulmones, & hinc per tussim, ac sine dolore per os egrediatur: aderunt signa capitis male affecti. Si autem prodeat à pulmone, non assunt signa malarum aliarum partium. Et præterea accidere potest, ut simul cum sanguine egrediatur pulmonis substantia: & tunc sanguis procul dubio à pulmone prodit: sed hoc rarissimum est. Oportet autem diligenter obseruare, quæ per tussim excernuntur: nam interdum pituita crassa & viscida tussi eiicitur, habens sanguinem permixtum: ut aliqui interdum suspicentur, substantiam illam albicantem esse substantiam pulmonis: at hoc falsissimum est: nam in pulmonis substantia non est visciditas. Præterea, cum hoc sit rarissimum, cognoscitur sanguis prodire à pulmone, quoties est spumosus: nam à capite spumans esse non potest. Sed dubitatur, cur non sanguis etiam à capite in pectus descendens, spumosus fiat: nam spuma fit è materia humida & vaporosa, concurrente, vel calore, vel motu, vel vtrisque. Si ergo sanguis à capite in pectus destillet: adest materia humida, scilicet sanguinea, & materia vaporosa, scilicet aer, qui assiduo inspiratur, & expiratur: adest etiam motus, nam sanguis à capite in pectus descendit, & à pectore in os ascendit, ideoque adest motus: in eo etiam loco calor est: præterea dum sanguis tussi expellitur, necessario generatur spuma. Sed respondendum: spumofum sanguinem, differre à sanguine cum spuma. Sanguis spumofus est, qui secundum omnes sui partes & internas, & externas, est refertus spuma; & hic solum à pulmone prodit. Sed si spuma sit in sanguinis superficie, hic à capite procedit, & potius dicitur cum spuma, quam spumofus. Quare sanguinem

nem sputo reiectum, diligenter virgulto agitatum lustrare debetis. Si à pectore prodeat sanguis, non est spumofus, ob rationem dictam: non copiosus, non admodum feruens: at qui à pulmone, est feruens: præterea sanguis erit nigricans (qualis à pulmone non prodit) & quandoque grumofus, quia egreditur venas pectoris, & per moram aliquantulam grumescit: possunt etiam apparere noxæ circa thoracem, verbi gratia si prægressa sit aliqua causa percutiens thoracem, & subsecutum sit sputum sanguinolentum. Si prodeat à gutture: egreditur cum screatu: adest quoque tussis, sed exigua. Si ab ore: egreditur simplici exspuitione. Si à capite, frequens est screatus, titillatio quædam est in gutture: sanguis est cum spuma, non spumofus: Aetius addit, præcedere dolorem capitis, grauitatem & calorem capitis, vertiginem, ebrietatem, plagam capitis. Si prodeat à ventriculo, sanguis est exiguus, nam paruæ sunt ventriculi venæ: egreditur cum vomitu: mixtus est cum pituita, nam hæc in ventriculo generatur. Si prodit à iecore, vel liene, cum vomitu excernitur, quia primum petit ventriculum, sed est copiosus: & quidem, si è liene, nigricans est, possuntque adesse lienis vitia: contra, si à iecore. Si prodeat ab utero, varius est sanguis, prout varia est materia illa menstrualis: assunt indicia affecti vteri: est tempus, quo alias fluere menses consueuerunt, iam tamen suppressi sunt, vnde tale sputum succedit. Quoad signa causarum: anastomosis cognoscitur, quia egreditur sine dolore: præcesserunt, vel assunt causæ, quæ possunt anastomosin efficere, verbi gratia si sanguis in corpore sit copiosus, calidus: si prægressus vsus immoderatus balnei aquæ dulcis. Diapedesis cognoscitur, quia est sine dolore, & sanguis necessario exiguus, tenuis, serofus. Diæresis cognoscitur, quia dolor esse potest præsens, qui fit, non ratione corporis proprii vel venæ, vel arteriæ, (vt in methodo anatomica docuimus) sed propter partes vicinas, & potissimum propter externas membranas, quæ neruosa sunt: cognoscitur etiam, quia per initia sanguis exiguus egreditur: at quia diæresis in dies augeatur, copiosior etiam tum exit sanguis, & confertim, cum impetu. Si forte diæresis producat à causa abradente, verbi gratia si causa abradens sit salsa pituita, adest catarrhus salus à capite in pectus, cui succedit sputum sanguinolentum: tunc enim suspitio esse potest, diæresin à causa abradente.

*Causarum
signa.*

esse excitatam. Si fiat diæresis à causa frangente, ab incidente, pungente, & similibus, citra abrasionem: iudicandum diæresin esse simplicem, non cum deperditione substantiæ.

*Indicatio-
nes.*

Cum autem exiens sanguinolentum oris, procedat à læsa retentione: ob id oculi dirigendi sunt ad Sanguinem, & ad læsam Retentionem: cap. 5. 13. 14. lib. 5. meth. cap. 4. li. 7. x. 167. Sanguis pro vario peccato varia indicat: copiosus, immutationem: calidus, refrigerationem: tenuis, incrassationem: ratione motus, oportet reuellere, intercipere. Et cum sanguis vehementer lædat, opus est vehementi remedio. Retentio, vel retentrix læsa, nihil ex usu indicat. Anastomosis autem indicat astringentia: diapedesis, condesantia: diæresis, vniuentia, & agglutinantia: quandoque autem dum scilicet in diæresi adest etiam deperditio substantiæ partis, quando fit propter abrasionem, tunc præter vniens, opus est etiam sarco- tico, regenerante quod est deperditum.

*Prognosi-
ca.*

Cæterum sanguis per os egrediens, qualiscunque fuerit, malus: aphor. 25. sect. 4. Auicennas ait, non omne sputum sanguinis esse timorolum, sed quoddam esse cum sanitate: vbi scilicet intelligit sputum cruentum non principale, quod apparet in inflammationibus: in pleuritide enim, verbi gratia si adest sputum sanguineum, est potius bonum, & significat ruptionem apostematum. Galenus autem loquitur de sputo sanguinis principali: de quo & nos agimus. Hoc in genere non vacat periculo: quod tamen pro vi differentiarum variat. Nam quoad sanguinem, malum est periculosius, si sanguis sit putridus, copiosus, calidus, tenuis, flauus,

*Huius medi-
cine ita oc-
currat, ne
subsequa-
tur inflam-
matio.*

læsus, spumolus, cum tussi. Ratione loci: vitium est periculosius, si ab arteria, quam si à vena, cap. 7. lib. 5. meth. Periculosum est hoc malum, si à pulmone: nam si subsequatur inflammatio, in totum ægrotantes non possunt sanari, cap. 14. lib. 5. metho. Minus periculosum, si ex aliis partibus: unde Hippocrates aphor. 17. sect. 7. ait, qui euomunt sanguinem, sed sine febre, malum est non admodum periculosum. Diapedesis minus periculosa: magis anastomosis: maxime diæresis, & potissimum, si fiat ex erosione. Præterea Galenus cap. 14. libro quinto metho. ait: incisionem & fractionem posse curari: at si fiat diæresis à causa abradente, impossibile esse, vt in totum sanetur: vt fusius explicabimus in sermone de phthisi.

Curatio.

Venaesectio.

Quoad materiam cheirurgicam: venaesectio conuenit, quia

quia adest indicans, nimirum sanguinis peccatum vehemens: non tamen semper omnibus modis, sed quandoque copia, interdum solo motu seu impetu, ad vasa vel huius vel illius partis. Interdum autem virtus prohibet, vt in muliere illa Romana, quæ per quatrimum ieiunarat, cap. 13. lib. 5. metho. Si igitur permittat virtus, semper vena aperienda. *Ufus.* Auicennas in plethora aperit saphenam, postea basilicam. Sanguis enim in illa repletionem habet substantiam supra & infra iecur. Quoad *quando agendum*: primum tundit saphenam: nam in sputo sanguinis opus est reuellere, & reuulsio potentior est, ad magis longinqua facta: propterea vena remota primum aperitur, deinde proxima. Addit Auicennas in sputo sanguinis è catarrho non valde bilioso, opus esse statim phlebotomate. Hic proponitur quid agendum, & quando. Quid agendum: dum ait, esse venam secandam, in sputo sanguinis non valde bilioso, ad differentiam valde biliosi: nam in catarrho valde bilioso, non est secunda vena, sed oportet purgare: iuxta Hippocratis sententiam: si talia purgantur, qualia, &c. Quoad *quando*: dicit, statim: nam adest indicans: vnde si nihil prohibeat, quamprimum est secunda vena. Addit Auicennas, in sputo sanguinis à pulmone: secandam esse basilicam partis solutæ vnitatis: & phlebotomiam fieri debere subtilem, ac interpolatam tribus horis, pro conseruatione virtutis. Hinc etiam Galenus, cap. 8. lib. 5. meth. in sputo sanguinis à fractura vasorum pulmonis, quamprimum incidit venam internam, & bis, terve vacuat, causa reuulsio- nis: posteriori etiam die venam secat, si fortis fuerit virtus. Et his verbis colligitur quantum agendum, quando, & vbi. Quoad *quantum agendum*: Auicennas proponit phlebotomiam subtilem, per quam non intelligit foramen paruum, hoc enim à tenuitate & crassitie sanguinis indicatur: sed intelligit venæ sectionem talem, in qua, licet sanguis copia peccet, verbi gratia, ad lb ij. tamen non educitur vna vice ad lb ij. sed in parua copia, & vicibus pluribus. Causa huius præcepti est: quia in sputo sanguinis, necessario semper sanguis peccat secundum motum, & interdum secundum copiam. Ergo semper indicatur remedium reuulsorium: & interdum vacuans. Sanguis ratione copix magis potest: ratione motus, minus: nam sanguis copiosus & præsens actu operatur: ratione motus operatur tantum sanguis proximus vasi affecto, non remotus. Cum ergo non ita vigeat

sanguinis vehementia, ratione motus: iccirco Auicēnas sanguinē educit in parua copia, & vicibus supplet. Protinus autem secatur venam, quia sanguis vehementer peccat; & adest præsētia sanguinis vehementer peccantis. Si contingat, vt præsueveret hoc vitium vehemens: etiam sequenti die adest præsētia, ideoque vena tunc etiam aperienda. Quoad *vbi*: vena cubiti interna, eiusdem lateris aperienda: prout vas pulmonis afficitur secundum partem dextram, vel sinistram. Hinc Galenus com. aphor. 32. sect. 5. in vomitu sanguinis ob suppressionem mensium, secatur saphenam: quia respicit ad substantiam, quæ sequitur essentiam indicantis, id est, impetum sanguinis. Quoad reliquam materiam cheirurgicam, Galenus in fine libr. 1. ad Glauc. si sanguis à liene prodeat, cucurbitulam magnam sinistro hypochondrio adhibet, si à iecore, dextro.

*Cucurbitu-
la magna.*

*Medicamē-
ta, ratione
totius.
Expurgā-
tia mate-
riā acrem.*

Galenus cap. 14. lib. 5. meth. in spūto sanguinis imminente, è catarrho, quamprimum probat medicamentum ex aloe, è scammonio, è colocynthide, ex agarico, è bdellio, & gummi Arabico: vt plura excrementa possint euacuari. Sed cum aloe aperiat venarum orificia: ego nescio, an in spūto sanguinis liceat vti tali remedio. Et augetur difficultas, quia Galenus hæc medicamenta quamprimum exhibet, etiam ante coctionem: non tantum aloem, sed etiam colocynthidem, medicamenta vehementissima. Sed methodus Galenum tuetur: non enim de spūto sanguinis præsenti loquitur: sed de imminente, non è qualibet causa, non ex anastomasi, non è copia sanguinis, sed è catarrho, in quo ob materiam acrem imminet spūtum sanguinolentum ex abrasione: materia enim catarrhalis est acris, peccat in qualitate: ergo non imminet apertio, sed abrasio. Proinde medicamentum ex aloe confici potest, quia nō est apertio actu, sed est periculum abrasionis. Ob eandem causam ante coctionē exhibet medicamentum electiue purgans, in principio, cruda adhuc existēte materia: ad est enim indicans, quod magis potest quam prohibens. Indicans est succus vitiosus, qui potest esse in causa abrasionis, & spūti cruenti, & tunc malum esset insanabile: ergo materia, quæ potest esse in causa mali insanabilis, vehemens est, & multum potest: & quidem magis quam furiosa: nam furiosa huc & illud mouetur, vt periculum sit: ne petat partem principalem, quam si petat, actum est: interdum autem non petit partem principalem, quod si sit, non est periculum mortis.

mortis. Sed materia hæc catarrhalis, quories excitat sputum sanguinis, excitat vitiū necessario mortale. Cū igitur materia furiosa magis possit ad indicandum, quam eius cruditas ad prohibendum: multo magis coctio negligenda est in sputo sanguinis e mordacibus succis, præsertim dum imminet ablatio. Quamobrem in sputo sanguinis præsentī, & imminenti, quamprimum, non expectata concoctione, pharmacum soluens est propinandum: quia materia catarrhalis, quæ abradit, vel abradere potest, magis potest ad indicandum, quam cruditas ad prohibendum.

Sequuntur medicamenta magis determinata. Hæc respiciunt, vel materiam catarrhalem, vel sanguinem. Materia catarrhalis perpenditur, vel ut fluit, vel ut fluxit. Si fluit, cum Galeno cap. 13. lib. 5. meth. oportet uti theriaca, sed recentis, verbi gratia, quatuor mensium: quod si recentis copia non sit, usamur Mithridatio recentis: si nec hoc præsto sit, utamur requie Nicolai, Philonio Rom. quæ tamen duo non debent ita recentia esse, sed vnius anni. His enim utimur ratione materię fluentis; & iam supponimus totum esse vacuatum. Dum igitur corpore vacuatio materia adhuc fluit; oportet intercipere, crassefacere; medicamentis propositis. Si ob defectum theriacæ & Mithridatij, cogamur uti Philonio, non sincero uti debemus, sed permiscebimus saccharum rosaceum, ut maior sit dosi sacchari ros. Quod si tantus non sit impetus materię fluentis: possumus uti saccharo rosaceo, vel eiusdem anni, vel etiam antiquo; cum bolo Armeno. V s v s Quoad quantum agendum, ita præscribatur: ℞. theriaca recentis ʒj. fiant boli. Vel: ℞. Philony Rom. saltem vnius anni. ʒj. sacchari rosati xij. Misce. Sequens magis tutum est, frequentius potest exhiberi: ℞. sacchari antiqui rosati ʒj. boli Arm. ʒj. Misce: exhibeatur hoc duabus vicibus. Quidam imprudentes Medici describunt electaria adeo crassa & dura, ut sint instar lapidis: & hi à pharmacopoliis detidentur. Ideo si ob summam materię iudicantis actionem, cogamur uti bolo Armena in magna copia, & permisceatur saccharum rosaceum: debemus etiam addere aliquod medicamentum liquidius, ut electarium possit deuorari. Si igitur scopus sit incrassandi, ut materia fluentis intercipiatur: permisceri possumus syrupum de rosis siccis, vel syrupum myrtinum. Porro Galenus theriacam, gratia interceptionis, exhibet post clysteres acutos: quia materia in toto existens prohibet: quare prius vacuanda: & cum non semper

Intercipienda, & in crassantia materiam catarrhalem fluentem.

medicamenta per os exhiberi queant, sed admittendi clysteres acuti: & post clysmos: vti oportet intercipientibus. Præterea Galenus exhibet theriacam (quod etiam in reliquis intercipientibus obseruandum) non modo post acres clysteres, sed etiam post ligaturas artuum: remellabat enim materiam ad partes longinquas viliores. Post capiti *sternum columbinum* applicabat, volēs imprimis diuertere materiam, quæ est in capite, & ab hoc fluxura erat. Non autem oportet statim confugere ad theriacam: ideo Galenus exhibebat theriacam, quando ægrotantes debēbant dormire: ratio est, quia tempore somni adest materia descendens: ergo est præsens fluens: neque adest prohibens, quia iam erat facta euacuatio, refluxio. Hæc de materia vt fluit.

*Euacuātia
materiam
catarrhali
fluxum.*

Si respiciamus ad materiam, fluxam in pulmones: hæc vel est materia catarrhalis, vel sanguis. Si materia catarrhalis sit fluxa, oportet vti *melle cocto, saccharo, melle rosaceo aliqua è parte cocto*: quia hæc euacuant, & detergunt, & mitia sunt: nam in sputo sanguinis periculosum est, ne vehementer expectorantia intendant anastomosin, diapedesin, diæresin: quare non *visimur melle crudo, sed cocto & rosaceo*. Aliquando materia catarrhalis satis est contumax, vt cogamur confugere ad valentiora, ad *sympum de farsara, de hyssopo, ad loch de pulmone vulpis*: de quibus in sermone de tussi. V s v s: quando agendum. Galenus cap. 13. l. 5. meth. post secundum diem vti-
tur mitioribus, & valentioribus quinto die, nam primis diebus adest præsentia indicantis: secundo die adest indicans, scilicet materia iam fluxa, sed adest etiam prohibens, id est, morbus vasis, scilicet anastomosis, diapedesis, & diæresis: qui morbi egent quiete, cum per motum, & per tussim augeantur: ideoque non oportet tam cito ad vehementiora accedere, & tutius est mitioribus illis vti.

*Sanguinem
fluxum &
concretum
dissoluentia,
& euacuā
ita.*

Quod si materia fluxa, sit sanguis fluxus: si forte sit principium concretionis in principio, secundum Auicennam, exhibendum est *acetum cum aqua, id est, posca*. Si forte tussis exacerbetur, ab aceto abstinendum, aut non nisi exiguo vtendum. Vnde Galenus, cap. 8. l. 5. meth. post sextam venam, tribus vicibus, post ligaturas, post frictions, ratione sanguinis fluxu dat poscam dilutam, id est, aquam copiosam, cum aceto exiguo: & exhibet tepidam, bis & ter, ternis horis. Hic quid agendum, capitur à sanguine concreto & fluxo: qui indicat dissoluentius materia est posca diluta. Quoniā

vero

vero hæc excitat tussim, quæ vasis morbum, nimirum anastomosis, diapedesis, & diæresis, augere potest: ideo si tussis molester, cum Auicenna prorsus est abstinendum ab acetis: & loco poscæ tutius est uti mulsæ. Quoad modum: Galenus dat poscæ tepidam, non calidam, non frigidam: sanguis enim grumosus sua passione & resistantia, indicat medicamentum actu calidum, quia frigidum non dissoluit: cum autem caliditas intensa prohibeatur à morbo vasis (calidum enim auget anastomosis, diapedesis, diæresis) igitur Galenus usus est poscæ tepida. Quoad quando agendum: Galenus vitur in principio: quia tum adest indicans, sanguis grumosus: sed quia prohibet materiæ copia: ideo prius euacuat, imminuit: & quia prohibet materiæ impetus: ideo primum reuellit, & postea vitur poscæ. Non autem vitur poscæ assiduo, sed vicibus interpolatis: quia assiduum usum prohibet morbus vasis: nam tussis augetur.

Iam vero morborum medicamenta sunt tractanda. Aperitio flagitat astringentia: fractio, agglutinantia: erosio, agglutinantia, & renutrientia. Inter astringentia debilia numerantur, rosa, terra sigillata, manna thuris, cortex vithuris, cortex pini, fructus spinae Aegyptiacæ, lapis hamatites. Vehementiora sunt: balaustrum, hypocistis, rhusopsoniorum, omphacium, galle immature, malicorium, præstantissimum conficitur medicamentum ex hyoscyamo. Vehiculum aptum eligendum est, his medicamentis astringentibus, cap. 4. l. 7. x. τὸν. Si ergo sanguis prodeat ab hepate, permisceatur agrimonia, pentaphyllum, filix mas. Si à liene: ceterach, tamariscus. Si à capite: betonica. Si à pectore, ammi, anisum, spica, sarfara, saccharo & melle etiam vitur licet. Nec propterea mirandum, quod Galenus cum astringentibus miscet ammi, anilum, spicam, quæ vim habent aperienti: vitur enim his gratia vehiculi. Notandum: si materias vehiculorum in substantia permiscemus, ut anisum, spicam, &c. pro ʒj. astringentium, sufficere ʒij. vehiculi, ut seruetur duodecupla proportio. *usus.* Quoad quantum: è dictis formulas concinnare facillimum est. Modus ex alibi traditus patet. Notetis circa quando agendum: prius occurrendum esse copię & motui sanguis, cap. 6. libr. 5. ineth. nec illico astringendum, sed post reuulsionem & euacuationem totius. Idem dicendum de agglutinantibus: præter enim astringentia, addenda sunt emplastica. viscida: vnde probatur *consolida tragacantha, plantago, albumen oui.* *usus.* Cir-

*Astringē-
tia.*

*Aggluti-
nantia.*

ca quando, monet Galenus cap. 8. l. 5. meth. his vtendum esse post totius euacuationem. Cæterum, si malum sit ex erosione. Auicennas probat vsum *thuris, myrti, sanguinem Dracon-plantaginem, semen portulacæ*. Galenus cap. 6. lib. 5. meth. ait: si erosio sit exigua, exhibendos pastillos *Andronis, Polydæ, pastillos è charta combusta: qui habent vinum absumendi materiam fluxam, & purulentam*. cap. 2. libro 3. n. vñ. & conficiuntur è vehementissimis medicamentis, tum ex aliis, tum è *chalcansho*. Vnde aliqui habent pro secreto in sputo sanguinis, oleum destillatum è *chalcansho*, cuius guttam 5. aut summum guttas 9. exhibens, cum aqua *plantaginis*. Si ergo ex erosione sanguis paullatim exit, statuit Galenus hos pastillos esse exhibendos. Si autè sanguinis fluxus sit profusior & copiosus, oportet vti vehementer astringentibus: deinde his astringentibus oportet permiscere dictos pastillos: & tandem oportet exhibere solos pastillos, sed dissolutos cum succo, vel decocto rubo, è *myrtho, è lentisco, è cotoneo, è messilia*. Et ante horum administrationem imprimis tori est præuidendum. Sic ergo Galenus versatur circa quando agendum: primo occurrit toti: deinde exhibet solæ astringentia, post miscet pastillos, denique solos dat pastillos. Quando agendum, sumitur à præsentia indicantis vehementioris: iccirco Galenus inter initia toti prospicit: adest enim indicans, sanguis replens totum, fluens in locum affectum: opus est ergo remedio & minuente sanguinem, & reuellente. Et hoc est venæsectio; qua primum vtendum est, quoniam magis potest sanguis, quam reliqua indicantia, quam morbi vasorum: quia licet non semper habeat rationem causæ principalis, habet tamen rationem causæ sine qua non. Præterea, si inuicem conferamus pastillos, & medicamenta astringentia: si sanguis paullatim fluat, oportet prius vti pastillis, quam astringentibus. Sermo enim hic est, de sputo sanguinis ex erosione, vbi est soluta vnitas, cum deperditione substantiæ partis. Ratione deperditæ substantiæ, oportet vti medicamento exsiccante, absumente purulentam materiam, quæ generatur in abrasione, quæ impedit nutritionem, incarnationem: indicatur ergo siccans, cuius materia est pastillus. Subito deuenit Galenus ad pastillos ita vehementes: quia vbi malum progreditur, actum est. Medici nostri his nunquam vtuntur: dant saccharum rosatum, bolum Armen. aquam rosarum: & omnes ægri moriuntur: quoniam nisi fiat

exsiccata

exlicatio ex integro, non est impossibile tolli solutam vnitatem. Vrger igitur maxime purulenta materia, quæ siccans indicat: propterea solis pastillis utebatur Galenus. Soluta vnitas, indicat vnies, seu astringens vehementer. Si igitur sanguis fluat paulatim: magis potest quod indicat siccans, quam quod indicat astringens: quia vbi sanguis paulatim fluit, soluta vnitas est exigua: quare non multum potest: magis igitur potest quod indicat siccans: Sufficit ergo solis vti pastillis. At si sanguis in magna copia fluat, & vitium producat ex erosione (de quo iam loquimur:) primo oportet vti solis astringentibus, quoniam magis potest soluta vnitas, quam purulenta materia: soluta enim vnitas magna est, cuius signū est magna sanguinis perfusio, ideo maximum imminet periculum: & proinde nisi illico occurramus vehementer astringentibus, tanta potest fieri perfusio sanguinis, vt homo illico moriatur. Vbi imminet mors, ibi indicans est vehemens. Ideo Galenus primo vtitur solis astringentibus: secundo vtitur vehementer astringentibus & pastillis: quia vtrumque indicans est æque vehemens, est præsens vtrumque: nam eo tempore æqualiter potest materia abradens, & soluta vnitas: ideo cum astringentibus permiscetur pastilli siccantes. Tandem vtitur solis pastillis: quia eo tempore ita imminuta est soluta vnitas, virtute astringentium, vt occurrendum saltem sit materiæ abradenti, propterea vtitur solis pastillis, non despiciens tamen solutam vnitatem: Excipit enim pastillos aliquo succo astringente, Verbi gratia: *℞. pastilli ʒj. succi plantaginis, vel rosarum, vel similis ʒss.* Circa quando agendum, notandum in astringentibus (si ea conferamus, non cum siccantibus, sed cum astringentibus:) esse incipiendum ab imbecillioribus, cap. 15. lib. 5. meth. vbi scilicet periculum vitæ non imminet: a vehementioribus contra, si imminet vitæ periculum: tum enim malum est vehemens: potest esse in causa mortis, vel phthisis, quare statim vtendum validioribus. At si non adest hoc discrimen, præsens quidem est id, quod indicat astringens: sed hoc indicans non est ita vehemens: quare neque licet vti vehementi medicamento.

Dixit erit refrigerens, crassefaciens. Potio, secundum Aui. *Viſum.*
cennam, sit aqua pluvialis, cum bolo, cum rosis: aqua chalybeata:
hæc enim stiptica sunt. Vinū non conuenit. At si leiporhymia

& syncope oriantur, probatur *vinum*, sed quod profit ratione virtutis: non noceat, ratione rerum præter naturam: quare sit pauciferum, in copia exigua, chalybeatum, actu frigidum: ita enim consulemus viribus, fluenti sanguini, & morbis vasorum.

CAPVT VII.

De Phthisi.

Nomen.



ER Phthisin intelligimus non omnem tabem, seu omnem corporis cōsumptionem, sed illam tantū maciem, cuius causa est vlcus pulmonis. com. aph. 10. sect. 3. com. aph. 8. sect. 4. commen. aph. 16. sect. 7. Sed ita de phthisi loquemur: vt appareat etiam

Generatio.

cognitio & cura, cuiuslibet maciei. Generatur hoc malum, dum causa morbifica occurrit pulmoni, & ita in eum agit, vt pulmo afficiatur vlcere, & vt vi vlceris generetur sanies, materia purulenta: à qua necessario emanat vapor saniosus & putridus, qui ita in cor agit, vt solida cordis substantia afficiatur morbo calido, vt hinc calor influens à corde in totum, euadat igneus & præter naturam, totique corpori communicetur, vt totum corpus corripiatur hectica febre, & hinc è necessitate subsequatur macies.

Definitio.

Phthisis ergo est magnitudo imminuta, cum caliditate & siccitate totius, producta ab vlcere pulmonis, cap. 1. lib. 2. de prælag. è puls. cap. 9. lib. 6. de tuend. san. lib. 5. meth. medendi, com. 17. sect. 1. lib. 1. epid. cum aph. 16. sect. 3. com. aph. 9. sect. 5. com. aphor. 16. sect. 7.

Forma.

Forma est magnitudo imminuta, cum caliditate & siccitate. Magnitudo imminuta, primum est symptoma, deinde morbus: dum enim in corpore fit macies, imminuitur magnitudo, & inter initia habet tantum rationem symptomatis, quia propter hanc nondū læditur actio: sed malo procedente, ita imminuitur, vt non sit amplius symptoma, sed morbus, actionem lædens. Diximus, cum caliditate & siccitate: vbi intelligimus morbum, non symptoma. Galenus nūcupat febrem paruum, id est, febrem hecticam. Distinguitur ergo hæc tabes ab illa macie, quæ fit è senio: à macie, quæ fit ob intemperiem frigidā & siccam. Hic etiam necessario sequitur: cum totum afficiatur hac febre hectica: facultatem
natura

naturalem labefactari, ob morbum calidū & siccū partium similarium: unde, cum hæc alteratrix non possit cōcoquere alimentum, non nutritur corpus: & præterea substantia genita absorbitur à caliditate & siccitate. Quia igitur bona substantia non regeneratur, & genita absorbitur, siue sit pinguedo siue caro: necessario sequitur macies. Subiectum est totum corpus: ad differentiam matiei alicuius partis.

Causa efficiens est vlcus pulmonis: hinc enim phthisis hæc distinguitur à quacunque alia tabe. Vlcus autem pulmonis potest esse in causa maciei totius quia ab huius sanie prodit fuligo, quæ ita afficit cor in calefaciendo, vt fiat febris, vt caro genita absorbitur, nec alia generari possit.

Cum autem vlcus (cap. 1. lib. 4. meth.) sit soluta vnitas, cum magnitudine imminuta partis vlcerae: causa eius non potest esse quæcunque, sed materia abradens. cap. 1. libro 1. de loc. affect. Hæc materia vim habet abradendi, vel

Propria ratione, vel ex Accidente: propria ratione, cum sua natura potest abradere, citra putredinem; vt bilis, quæ mordax est, item pituita salsa: ex accidenti potest abradere materia, ratione putredinis, unde materia acris euadit, nimium, quilibet humor putrescens. Quando igitur Galenus dicit, vlcus fieri vel propter cacochymiam, vel propter putredinem: per cacochymiam insinuat materiam propria ratione abradentem: per corruptelam autem seu putredinem, materiam ex accidenti abradentem. Sed notandum cum Galeno comment. 17. sectio. prima, libro primo, epid. materiam quæ potest esse in causa vlcus pulmonis, vel Aliunde fluere, vel Non. Aliunde non fluit, verbi gratia, dum vas pulmonis rumpitur, & sanguis in pulmone putrescit, qui postea putridus exulcerat: idem fieri potest, si vlcus fiat è peripneumonia. Aliunde fluit verbi gratia si fluat ex inflammatione vicinarum partium: & potissimum hoc fit, dum materia destillat à capite, com. aphor. 13. sect. 3. Præcipue hoc malum nascitur ab anno 18. ad 35. quia in hac ætate, & multi errores in victu committuntur, & vasa promptè possunt abradi, com. apho. 29. sect. 3. Quæ vero sint causæ generantes has materias catarrhales, à capite prodeuntes, latè diximus cap. de catarrho.

Quoad formam: cum sit magnitudo imminuta cum febre: secundum Magis & Minus est differentia. Quoad subiectum: pulmo abraditur, vel secundum Vasa, vel secundum Substantiam:

Causa efficiens.

Causa vlcus pulmonis.

Materia exulcerans, vel aliunde fluit, vel non.

Differentia.

Substantiam:& vel secundum Dextrā, vel Sinistram partem. Quoad causam efficientem materia abradit vel Propria ratione, vel ob Putredinem. Item, prodit vel Ex affecto pulmone: vel Aliunde fluit.

*Signa in
genere.*

Malum hoc non difficulter cognoscitur. cap. 5. lib. 1. loc. aff. cap. vlt. lib. 4. de loc. aff. cap. 11. libr. 4. de caus. puls. Nam quoad actionē læsam, adest tussis vehemens: pulmonis enim exulceratio est malum insigne, maxime irritatur expultrix. Tussis est sine dolore: quia in pulmone, non est tantus sensus, ut dolor possit oboriri:& si aliquis reperitur sensus, id fit potius ratione membranarum. Præterea hoc malum, quoad actionem læsam, cognoscitur è pulsu febrili & hæctico: est autem pulsus hæcticus, sed cum quadam mollitie, quæ mollities non obseruatur in febre hæctica, vbi pulmo nō est exulceratus: mollities enim pulmonis est in causa. Cognoscitur etiam è reiectis, seu exeuntibus: nam materia purulenta tussis excernitur: quod sputum purulentū, in aquam proiectum, descendit: & prunis impositum foetet: ideoque percontandi etiam sunt assidentes, num sentiant ægri expuitionem foetidam, præter consuetudinem. Interdum accidit, ut sputum descendat, & foeteat, nec tamen sit pus: fieri enim potest, ut à capite pituita destillet in pulmones, & putrescat: quæ ratione putredinis, foetet: & quia grauis est, potest descendere. Vnde memini videre me nonnunquam sputum male olens, & fundum petens, sine febre, ac proinde sine vlcere & phthisi: vidi etiam tale sputum cum febre, sed sine phthisi: nam ægri sanitati sunt restituti. Quare diligenter ligno aliquo explorandum, num sit pus, vel pituita, nam pituita est viscida, quæ non facile continuitatem è toto deperdit, quia non est lentum, ut pituita. Cognoscitur etiam phthisis ratione qualitatris mutatae: nam calor in toto est mordax, præsertim in thorace: quia adest febris hæctica, & sones est in thorace. Cognoscitur etiam è macie. Vbi vlcus est in pulmone, semper perseverat macies, & indies augetur. Si igitur interdum appareat macies, quæ aliquo modo minuat, & regeneretur aliquo modo caro: non est phthisis: vbi enim phthisis, ibi vlcus pulmonis, & proinde febris, & macies. Hoc dico, quoniam interdum destillationes in pectus delapsæ, præsertim in iuuenibus, suppurantur, seu deducuntur ad quandam consistentiam, puri similem: vnde ratione putredinis fiunt febres, sequitur macies, citra phthisin. Cognoscitur etiam è colore plumbeo

plumbeo citta faciem: præterquam quod à cibo facies rubicunda euadit: cum enim totum corpus male habeat, non generatur bonum nutrimentum, vnde color plumbeus: sed à cibo, cum fiat euaporatio in caput, hinc fit rubedo in facie, circa genas, quia à pulmone in faciem mittuntur vapores.

Differentiæ à forma facile cognoscuntur: an scilicet magnitudo sit magis vel minus imminuta: an caliditas in toto, sit magis vel minus intensa. Hæc cognoscuntur ex intensione, & remissione symptomatum. Quoad differentias à subiecto: si vlcus sit secundum propriam pulmonis substantiam: cognoscitur, quia quandoque exspuentur carunculae, cum tussis, nimirum propria substantia pulmonum: & vel non egreditur sanguis, vel admodum paucus. At si malum sit secundum vasa: si afficiatur tracheia, exiguus etiam erit sanguis: sed apparebunt reiecta bronchia, scilicet portio aliqua membranae. Si vlcus fiat secundum venas, vel arterias: egredietur sanguis in magna quantitate. Quoad differentias à subiecto: prout afficitur pulmo secundum partem dextram, vel sinistram: erunt querelæ circa illam partem. Quoad differentias à causa efficiente: Si materia abradat propria ratione: cognoscitur, quia sputum est salum, amarum: sin minus, signum est: materiam abradere non propria ratione, sed ex accidente. Num autem materia prodeat ex ipso pulmone, an aliunde fluat, ita cognoscitur. Si enim verbi gratia præcedat fractura vasis in pulmone, vel si fiat à peripneumonia: cognoscitur, non esse fluxionem ex aliis partibus. Si vero aliunde fluat, cognoscitur: quia vel succedit inflammationi vicinarum partium, vel destillationi.

Cum phthisis sit magnitudo imminuta, cum febre, producta ab vlcere pulmonis: indicatio sumi debet, à magnitudine imminuta: à febre, ab vlcere, & à pulmone. Magnitudo imminuta, indicat auctionem: esse scilicet regenerandam substantiam deperditam in toto. Ratione febris, oportet refrigerare, & humectare. Vlcus, vt est soluta vnitas, indicat agglutinans (cicatrizans locum habet in vlcerebus externis, in quibus cutis est deperdita; ideo oportet substantiam carneam conuerti in cutem: quod non est faciendum in internis.) Quatenus autem in vlcere deperdita est substantia, indicatur regenerans id quod deperditum est. Porro non medicamentum, sed natura, agglutinat, & regenerat: medicamenta solum auferunt impedimenta, quæ obstant facultati, quominus

Signa differentiarum.

Indicationes.

minus possit, vel regenerare carnem, vel agglutinare. Talia autem impedimenta in phthisi sunt, tum morbus, vi cuius facultas naturalis læditur: tum aliquis error externus. Quare indicationes sumendæ sunt à morbo, & errore externo. Quoad morbum: cum in phthisi necessario sit febris, quæ est morbus totius: igitur est etiam morbus calidus pulmonis: præsertim quia in ulcere etiam gignitur sanies calida, cuius etiam causa incalescunt pulmones. Quare pulmonis intemperies calida, utpote quæ causâ est, quo minus recte facultas agere possit: indicat refrigerans. Error externus potest esse communis, & proprius. Communis dicitur, qui pertinet tum ad renutritionem, tum ad agglutinationem. Et hic nihil aliud est, quam succus peccans & extra pulmonem, & fluxus etiam, verbi gratia falsa pituita. Hic succus, prout varie peccat, pro eo variæ sunt indicationes: de quibus sæpe alias. Error externus proprius respicit vel solam renutritionem, vel agglutinationem. Si respiciat tantum renutritionem, indicat succans, detergens: propter duplex excrementum, tenue, humidumque quod siccas poscit, & crassum, quod indicat detergens. Si respiciat agglutinationem, indicans est humiditas alimentalis, seu naturalis, quæ non conseruationem, sed destructionem potius indicat: quia habet rationem causæ morbificæ, sine qua non. Hæc humiditas alimentalis, in præsentia potest esse duplex: apposita & non apposita. Apposita indicat secans, ut absumatur & dissipetur: non apposita indicat repellens. In agglutinatione igitur etiam absumendæ sunt materiæ alimentales: secus enim nunquam fieri potest agglutinatio, propter impedimentum. Pulmo denique requirit, quæ sibi sunt familiaria.

Prognostica.

His scopis satisfacere, tum difficile est, tum vero impossibile. cap. 5. lib. 4. de loc. affect. cap. 11. 14. lib. 5. meth. Nam si indicationes inter se conferantur: febris indicat humectans, ulcus siccas. Præterea si seorsum indicationes perpēdamus: causa febris, satis difficile est scopos explere: nam est morbus in habitu: licet enim hectica febris inter initia sit in habitudine, prompte tamen in habitum degenerat. Augetur difficultas in remotione febris, quia fouetur ab ulcere: quo non sublato, febris tolli nequit. Præterea summa est difficultas in regeneratione, & agglutinatione, tum ob pulmonis morbum, tum ob errorem externum. Ob morbum pulmonis, quia oporteret morbum pulmonis calidam auferre.

ferre. Quoad errorem externum: si respiciamus ad communem regenerationi & agglutinationi: non admodum difficile est sanguinem euacuare: maior difficultas est in remotione cacoehymix: & hanc ob causam insanabile est vlcus, quod fit ex erosione vitiosi succi. Difficultas etiam est ratione erroris externi proprii, causa regenerationis materiae deperditæ: nam deficit materia alimentalis, deficit materia seminalis. Præterea necessario excrementa abundant: quia in regeneratione carnis, necessario duplex generatur excrementum, quod cum per tussim debeat euacuari, lacerantur pulmones, & illo motu etiam inflammantur. Si respiciamus ad errorem externum proprium, causa agglutinationis: licet humiditas alimentalis, & apposita, & non apposita possit absumi: nihilominus non potest esse agglutinatio stabilis: quia cavitas in vlcere pulmonis non potest repleri: ergo post agglutinationem relinquitur fistula callosa, quæ eo facilius disrumpitur, quo cavitas amplior relicta est. Ex his colligitur, quamprimum esse agglutinandum: nam ab initio cavitas minor est: ideoque non tam facile disrumpitur: hominesque diutius possunt vivere.

Fontibus, secundum Avicennam, vena aperiri potest. Fonticulis etiam uti licet, in fluxu à capite: nam dum vlcus pulmonis fouetur à destillatione à capite, indicatur fonticulus, remedium reuellens: nec adest prohibens: præsertim quando vlcus est exiguum, malū racens: præmitti tamen prius debet euacuatio totius. Alexāder ait, in vlcere antiquo, & in phthisi progressa, nō esse fonticulis & cauteriis ægros afflictos magis cruciandos. Si malum sit admodum vehemens: cauterium affigendum est in sutura coronali, ut fiat reuulsio. Et si destillatio foueatur ab infernis partibus, à iecore: cauteria etiā in cruribus excitentur. Non sunt hæc differenda, ut multi iam solent: postea enim nihil tale est faciendum. In copiosa destillatione, non tantum dictis partibus cauteria affigenda: sed etiam infra occipitium. Quamprimum igitur occurrendum: postea enim ubi affectus est calidus in pulmone, & imminuta est fluxio: cauterium occludi potest.

Medicamenta respiciunt totum, febrem, regenerationem eius quod deperditum est in vlcere pulmonis, agglutinationem, & proinde excitationem calli, tandem ipsos pulmones. Quæ totum respiciunt, valde sunt necessaria: hoc tempore non recte administrantur, propterea pauci curantur. Fui his

*Curatio.
Cauteris-
gia.*

*Pharmacia.
I. Toti, ut
prospiciendum.*

diebus Venetiis, & ægro præscripti ʒ j. *oxymellis*, & ʒ j. *mellis rosati*, vt detergeretur pituita in ventriculo exsistens, quæ erat in causa multarum noxarum. Pharmacopola errore misit ʒ x. & æger accepit ʒ viij β. medicamento ex oxymelite simpli. & rosato. Id medicamentum vehementer agens in pituitam, aliquam molestiam excitauit: sed postea ita descendit in intestina pituita, & ita fuit excreta, vt omnia symptomata mitigarentur. Quare oportet medicos esse audaces nonnunquam. Auicennas etiam in phthisi causa totius exhibet *pitulas cochylas*: communes practici non exhibent, & male faciunt. Fluxioni enim statim occurrendum est: nam bene sperandum, vbi non magna cauitas est in vlcere: fit autem magna, vbi malum producitur: id quod fit ob materiam in pulmones influentem. Quare hæc materia est euacuanda. Post vnam igitur alui lenitionem, post duos vel tres syropos, quamprimum cum Auicenna exhibendæ sunt cochylæ, vt totum expurgetur, & caput euacuetur: & sic Fluxioni occurratur. Quod de cochylis dico: idem intelligendum de alijs soluentibus fortibus: nam vitium succi peccantis est vehemens, & habet rationem causæ sine qua non: ergo validum purgans dabitur, potissimum quia virtus permittit quæ id procedente malo prohibet. Nam inter initia, licet sit febris hectica, est in habitudine, non in habitu: & dum est in habitudine, virtus in febre hectica adhuc nihil est perpeffa. cap. 9. lib. 1. de diffe. feb.

2. Ad fe-
brim.
Lac.

Febris poscit refrigerantia: de quibus alibi. Notandum circa vsum *lactis*, ad refrigerationem, & humectationem. Lac ab Auicenna in phthisi probatur: nam ratione *huius* potest humectare, æquare succos acres, & etiam substantifice humectare: ratione *seri*, deterget: ratione *partis caseosa* agglutinat. Tempore quo agglutinare volumus, lac non est exhibendum: sua enim humiditate prohibet calli generationem, & facit vt non ita absorberi queant humiditates alimentales. Quare licet vti lacte: sed ante tempus agglutinationis, ad deterfionem. Et quo magis progreditur materia: lac exhibendum, quod minus deterget, minus humectat: quale esset *lac astringens, chalybeatum*. Sed de lacte fusius, agemus in doctrina de febribus hecticis. cap. 28. lib. 6.

3. Mundi-
ficatio
vltim.

Medicamenta carnem regenerantia, sunt ea quæ vlcus mundificant: nec enim caro generari potest, nisi fiat mundificatio.

ficatio. Quia igitur duplex gignitur excrementum: Auicennas probat mulsam, aquam cum saccharo: & si absit copia puris, utitur etiam expectorantibus, ut syrupo de hyssopo, de liquiritia: de quibus capite de tussi.

Causa agglutinationis, Auicennas probat saccharum rosa-
 tum unius anni, cum bolo Armena, cum terra Lemnia, cum pul-
 mone vulpis. Licet etiam ad validiora ascendere: ad theriacam,
 Mithridatium, diacriminum, ut absumatur humiditas alimen-
 talis: licet absit febris hectica. Sic præscribi potest: R. terra
 Lemn. ʒ ij. amyli, boli Armen. ʒ. rub. ana ʒ β. carabe. gran. myrri,
 ana ʒ vj. cancrorum adustum, sem. portulacæ, ana ʒ xv. corall.
 rub. tragacantha, spodyj, semin. granat. siluest. ana ʒ v. succi rescic-
 cati feniculi, succi liquirit. ana ʒ viij. cum succo portulacæ. ℞ aqua
 ros. fiant pastilli: dosis ʒ j. per multos dies. Medicamentum hoc
 agglutinat, inducit callum: quia non modo potest humidi-
 tates excrementitias absumere, sed etiam alimentales. Hu-
 ius fere generis quædam proponuntur à Galeno cap. 2. lib. 7.
 Pro vehiculo mel potest misceri: quo medicamenta ad vlcus
 pulmonis deducuntur. cap. 7. lib. 4. metho. Ex his colligitur
 ascendendum esse ad vehementer siccantia, quia alias non
 inducitur callus. Quare ad pastillos Andronios in phthisi con-
 fugiendum. Hodie non vtuntur: ideo homines non curantur.
 Quidam empeirici, curant phthisicos ad tempus, his medica-
 mentis callum inducentes, qui non ita cito rumpitur, si exi-
 gua est cavititas, & si cito occurritur. Aliqui habent pro se-
 creto (& ego suadeo ut exhibeatis, in initio ad guttas ij. vel
 tres) oleum è chalcantro, cum aqua rosæ. vel cum succo plantagi-
 nis, & modico saccharo, ratione penetrationis. Vñ. Quoad quan-
 tum agendum: Auicennas exhibet saccharum rosatum in ma-
 gna copia, quia summa est actio indicantis. Quoad quando:
 Auicennas exhibet saccharum ros. omni hora, semper enim
 adest præsentia indicantis: quare etiam tempore cibi, & ante,
 & post cibum, ut cibum sit agglutinans. Hoc obseruandum
 omnino est: licet hodie non obseruetur. Quoad tempus: ad
 fortiora quamprimum est confugiendum: vnde si in phthisi
 exhibendum sit oleum è vitriolo, & saccharum rosaceum: pri-
 mo oleum è vitriolo exhibendum: nam inter initia adest præ-
 sentia indicantis vehementissimi, quia in dies augetur ma-
 cies: præterea inter initia virtus non ita prohibet, sicut pro-
 cedente malo: nam tandem hectica in habitudine, transferretur

4. Agglu-
 tinantia.

in habitum, macies indies intenditur: vt virtus siccantia medicamenta & fortiora, melius permittat inter initia.

s. Appropria pul- Causa pulmonis profunt, *pulmo vulpis, cancri combusti, pulmonaria, cornu ceruus.* Hæc virtutem & proportionem pulmonis seruant, & quædam etiam, vt ceruinum cornu, vim exsiccandi habent.

Dieta.

Victus siccans esse debet. cap. 5. lib. 5. meth. cap. 2. li. 7. κ. τ. ο. π. nec semper oportet vti benedicta illa prisana. Aer ergo sit exsiccans, siue natura, siue arte: & dum per inspirationem attrahitur, habeat vim siccandi pulmones ulceratos. Similiter cibi sunt parandi cum siccantibus. Quoad potum: Auicennas non prohibet *vinum album paucaferum, in principio*, id est, antequam succedat vel febris, vel inflammatio. Nam in sputo sanguinis, quod minatur pulmonis vlcus, antequam fiat febris, & potissimum in habitu, antequam fiat inflammatio, licet vinum exhibere. At dum febris, vel inflammatio est excitata: Auicennas probat potius *aquam pluuialem, aquam astringentem*. Tempore igitur agglutinationis nequaquam vti licet vino: quia tum adest febris. Et optimum est etiam inter initia abstinere à vino. Et forte Auicennas inter initia *vinum exhibet album & tenue, ut mundificet pectus, ratione tenuitatis vini: præterea, ut vires robustas reddat*: nam malo procedente, prorsus à vino desistendum: ideo, vt virtus diuturnitati morbi possit sufficere, ab initio vinum propinat. Sic enim Hippocrates iubet, inter initia magis consulendum viribus, diæta & potu quam in statu. Et hoc potissimum in vlcere pulmonis faciendum: in hoc enim febris subsequitur, & euadit in habitu, vt è toto vinum prohibeatur. Quare potius vtendum *aqua chalybeata, aqua correcta cum succo granatæ, cum rho opson, cum myrtis*: vt exsiccantur humiditates alimentales & fiat agglutinatio & callus: callus enim quamprimum id fieri potest, excitari debet, eoque omne fere est dirigendum consilium.

CAPVT VIII.

De Cordis Palpitatione.



CORDIS propria & præcipua functio est, generare calorem naturalem: est enim cor fons vitæ, & proinde causa illius caloris, qui est nexus animæ cum corpore: ad hanc caloris generationem necessarius est cordis motus, qui cum in palpitatione depræuetur,

uetur, medicus hunc studio summo conseruare conabitur. Huius vitij natura recte intellecta: patebit etiam, quid in aliis cordis vitiis sit agendū: nam ad hoc malum procreandum concurrunt dyscrasie & materie morbigice, quæ ad alia etiam cordis vitia solent momentum asserre. Palpitationem cordis, Auicennas cordis tremorem vocat: vbi tremor non proprie accipitur: nam proprie spectat ad instrumentum, motui voluntario destinatum. Intelligimus autem omnem cordis motum deprauatum: ad differentiam imminuti, vt sit in leiporhythmia: & ad differentiam ablati, saltē quoad sensum, vt in syncope. Licet autem de motu deprauato agamus: hinc tamen etiam patebit, quis sit motus imminutus & ablati, quomodo etiam his occurrendum. Fit hoc malum, dum causa morbigica cordi occurrens, ita agit, vt vis pulsfica, destinata motui cordis, ita frustretur, vt cor motu prauo afficiatur, & præter naturæ leges eleuetur, ac deprimatur. Cordis ergo palpitatione est motus prauus cordis, dependens à frustratione facultatis pulsficæ: seu, est eleuatio & depressio praua cordis, dependens à frustratione motricis cordis. Forma est motus prauus: ad differentiam imminuti, & ablati ad sensum. Sed cum in legitima cordis palpitatione, motus sit tardus & rarus: videri potius imminutus posset, quam deprauatus: Responso: licet motus tunc sit tardus & rarus: nihilominus cor magis dilatatur, quā pro naturæ lege: & hæc violenta dilatatio est in causa motus deprauati: sic etiā præter naturam deprimitur magis, quam sit opus. Cum igitur sit excessus & violentia in eleuatione ac depressione: ideo motus hic est deprauatus. Verum, quia sermo est, non solum de legitima palpitatione, sed etiam de notha, id est, de quolibet prauo cordis motu: hic motus bifariam contingit. Primum, vt cor mouetur instar vtrius, dum oleo, vel alia materia replentur & inaniuntur: & hic motus cordi occurrens, est motus cordis prauus, sed à toto genere præter naturam. Alio modo præter naturam cor potest moueri, ad similitudinem follium fabrorum, dum replentur quatenus attrahunt: & hic motus est quidem præter naturam, sed non toto genere. Subiectum est cor: ad differentiam palpitationis aliarum partium. Cor autem subiectum idoneum est palpitationis, quia habet cavitates, & meatus.

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Causa efficiens.

Causa efficiens, est frustratio facultatis pulsficæ. Hac par-

ticula cordis palpitatio differt à motu prauo vñoltario, qui in conuulsionibus oriri solet. Facultas pulsfica, non est motrix voluntaria, sed naturalis, quæ vitam respicit, non meliorem vitam: & quidem est facultas naturalis tum attractrix, tum expultrix. Hæc duplex facultas in palpitatione frustratur. In legitima quidẽ palpitacione, in qua cor mouetur instar vtrium, attractrix cordis ita frustratur, vt nullo modo concurrat: sicut etiam in conuulsione legitima facultas animalis non concurrat: ideoque legitima palpitatio est motus solius morbi, nimirum rei præter naturam: nec enim attractrix concurrat: quemadmodum etiam dum vtres replentur, non concurrat attractio vtrium. At in palpitacione notha, in qua cor inouetur ad similitudinem folium: attractrix quidẽ frustratur, quia nõ operatur vt decet, sed tamen ipsa concurrat, licet præter naturam, sicuti dum replentur folles materia attracta. Quare spuria palpitatio non est motus solius morbi. Expultrix concurrat in legitima & notha palpitacione. Nam in legitima palpitacione, dum secundum sui cauitates instar vtriũ repletur à materia morbifica: nisi cordis facultas expultrix ad expellendum concurreret, sane animal moreretur. Quare palpitatio cordis ratione attractionis, est motus solius morbi, in legitima palpitacione: nequaquam autem ratione expultricis. Quamobrem in qualibet palpitacione expultrix concurrat. Sed notandum, attractricem alio modo frustrari, quam frustratur expultrix. Attractrix frustratur ob errorem externum in legitima palpitacione: in notha interdũ ob morbum. In legitima, attractrix semper frustratur ob errorem externum, non ob morbum: nam quoties fit palpitatio ad similitudinẽ vtrium, citra morbum concurrat materia replens morbifica. At in notha palpitacione cõcurrit morbus qui potest esse intemperies, mala compositio, soluta vnitas. Intemperies potest esse calida (loquimur de notha palpitacione) potest esse inflammatio, erysipelas: ratione quorum morborum ita afficitur cor, vt moueatur motu præter naturam, qui motus non est tardus, nec rarus, sicut in legitima palpitacione, sed frequens, velox, com. aphor. 85. sectio. 4. & vocatur *xapdusis*, morbus cordis. Præterea potest esse mala compositio, tumor, angustia. Tumor potest esse calidus, frigidus. Calidus non potest ad augmentum perducì, sine morte patientis. Angustia etiam locum habet: vnde Aui-cennas dicit, fieri tumorem, quia clauditur cursus sanguinis,

vel

Vel Spiritus: vnde necessario vis pulsfifica cor præter naturam eleuare nititur. Est etiam soluta vnitas, sicut solet contingere in cordis vulnere. Sed monet Galenus cap. 2. libr. 5. de loc. affect. si contingat vulnus in cordis substantia, fieri motum cordis prauum, si autem in cavitatibus, non fieri motum cordis, sed hominēs ilico moti. Postremo, præter morbos, est error externus: qui potest esse Humor quilibet, cor occupans (in notha palpitatione: potest esse Vapor quilibet, excepto crasso: quia palpitatio quæ sit à vapore crasso, est legitima. Concurrunt etiam causæ externæ, vt causa venefica, animi accidentia immoderata: in animi enim motibus cor palpitatur, sed est palpitatio obscura. cap. 3. libr. 6. de plac. c. 1. l. 8. de plac. cap. 10. l. 4. de diff. puls. Causa efficiens palpitationem legitimam, nihil est aliud quam flatus, seu materia flatulenta frigida: quæ materia generatur ab agente frigido, ab intemperie frigida, siue sit in corde, siue extra cor. Vnde Galenus cap. 5. l. de palpit. respiciens ad legitimam palpitationem, inquit: omnem palpitationem esse effectum frigiditatis. Hinc quidam male inferunt, palpitationem esse symptoma, quod pendeat à morbo frigido: nam palpitatio pendet à flatu, qui generatur à frigido.

Quoad Formam: cum palpitatio sit motus prauus, compositus ex eleuatione & depressione: est similis eleuationi & depressioni, vel Vtrium, vel Follium fabrorum. Quoad subiectum: Cor afficitur, vel secundum Cavitates, seu ventriculos, vel secundum Vasa, id est, venas & arterias: item, afficitur vel secundum Dextram, vel Sinistram partem. Quoad causam efficientem: in palpitatione est vel Morbus, vel Causa: morbus est intemperies, tumor, angustia, vulnus, soluta vnitas. Causa est Interna, vel Externa: interna est Humor, vel Vapor: externæ, possunt esse venena, animi accidentia: ita tamen, vt legitima palpitatio (quemadmodum diximus) fiat tantum è flatu copioso, frigido, crasso.

Palpitatio in genere cognoscitur, si tangamus patientem & secundum carpum, & secundum pectus. In carpo cognoscitur è vehemēti pulsus mutatione: in pectore, quia motus erit præter naturam. Aduertendum autem hunc motum esse internum: non in partibus externis: quia tunc potius est aneurisma, id est motus pertinēs ad arterias extra cor. Quoad differentiās formales: Si motus sit similis motui vtriū (vt in legitima palpitatione, quæ rarissima est, & curationē

Differentia

*Signa.*¹

ferme non admittit) est motus tardus, & rarus. Si motus sit similis motui follium fabrorum, ut in palpitatione notha: motus est velox & frequens. Quoad differentias à subiecto: num malum sit in dextra, vel sinistra parte: &, an afficiantur vasa cordis, an potius ventriculi; hoc cognoscere est admodum difficile, & fortasse impossibile: &, si aliqua coniectura hoc licet assequi, hæc est: si contingat, malum esse circa ventriculos, difficilima est tolerantia. Sed non multum refert hoc cognoscere. Quoad causam efficientem. Intemperies calida cognoscitur è motu frequenti, veloci, è calida spiratione, è siti, è causis etiam prægressis, quæ poterant calefacere. Tumor cognoscitur: quia motus est latis magnus, frequens, velox, inæqualis, inordinatus, respiratio difficilima, adest febris, leipothymia, syncope: & antequam tumor inflammationis deducatur ad augmentum, homo moritur; ut moriatur, antequam pulsus fiat durus. Angustia pariter cognoscitur è motu veloci, frequenti, respiratione difficili, prægressæ sunt causæ obstruentes. Vulnus seipsum manifestat. Causa externa cognoscitur, è relatione astantium: si, verbi gratia, prægressæ sunt animi accidentia immoderata: si suspicio est de veneno. Contra, si hæc non præcellerunt, causa erit interna. Si fuerit humor, quicumque sit, semper pulsus est frequens, & velox. Quis autem sit humor, è propriis capitibus discendum, è signorum arte. Si vapor calidus & tenuis, est motus frequens, & velox: Si frigidus & crassus, ut in palpitatione legitima: motus est tardus & rarus.

*Indicatio-
nes.*

A forma, seu prauo motu, non sumitur utilis indicatio. A subiecto corde, sumitur indicatio vitalis. Cor, proportionatū aliquid requirit per suam proportionem. Adhuc per suum calidum innatum indicat ut conseruetur, ratione quantitatis alimentū; ratione qualitatis, calidum simile. Quoad causam efficiētē: morbus calidus, indicat frigidū. Tumor & angustia, nō indicāt vtile: materia autem quæ actu facit tumore & angustiam, indicat sui euacuationem. Soluta veritas, dimittenda sacerdotibus. Humor & vapor, pro vitij varietate, varia indicant. Causa externa non indicat: vel indicat sui eradicationē. v.g. venenum extra corpus genitum, habet rationem causæ externæ, intra corpus autem assumtū, subit naturā causæ internæ. Quid autē exactē venenum indicet, suo loco dicitur: inf. nim. c. 4. l. 7. Iā supponatur, veneni curationē nos cōsequi posse, non tantum experiētia, sed etiam inethodo & ratione.

Palpi

Palpitatio in genere despicienda non est : quia permutari potest ad syncopen, & ad mortē. Vehemens autē hoc vitium est ratione dignitatis, quia læditur motus cordis. Sed periculū variat, pro vi differentiarum. Nam quoad differentias formales: Si motus sit instar vtrium, palpitatione est periculosissima. Vnde Gal. c. 2. l. 5. de loc. aff. ait : Qui sæpe & breui intervallo fuere correpti palpitatione: omnes ante senectutē moriuntur. Loquitur hic Gal. de palpitatione legitima, quæ vehemens est ratione causæ, & ratione virtutis: nō ratione morbi, quia legitima fit tantum ob errorem externum. Causa est status copiosus, frigidus, crassus, occupās cavitates cordis. Est ergo in hac causa vehemētia dignitatis: quia occupat cor: est vehementia essentia; quia status copiosus, frigidus, crassus, ideoque longo tempore durans: adest vehementia facultatis, quia in legitima palpitatione malum non perfertur à facultate, vnde subsequitur pulsus debilis, leipothymia, interdum syncope (*morbis mali moris, seu malignus, habet vehemētiā facultatis, non quartā & novā quandā vehemētiā.*) Quare cum in palpitatione legitima status vehementia sit insignis: & virtus etiam ita debilis, vt non possit non admittere status: merito Gal. dixit, hos ante senectutem mori. Quoad subiectum: cæteris paribus, palpitatio magis est periculosa, dum cor offenditur secundum sinistrā partē, quam dextram: est enim maior vehementia ratione facultatis: item palpitatio periculosior, si cor læditur secundum cavitatem, quam si secundum venas, vel arterias. Quoad causam efficiētem: Si palpitatio fiat à cordis caliditate in habitu: vix adimī potest: in habitudine est maior spes salutis, ratione vehemētiæ facultatis. Si tumor sit in causa: vitium mortale, c. 2. l. 5. loc. aff. quia adest vehementia triplex, & virtus est debilis. Si angustia sit causa: malum difficulter tollitur, non tamen est mortale. Si vulnus: actum est. Quoad materiā: si materia est in causa illius motus, qui fit instar vtrium; curationem perfectam non admittit, vt homines à toto possint liberari: quia hæc materia, id est, status copiosus, frigidus, crassus, habet triplicem vehemētiā. Si causa sit venenum, siue extra, siue intra corpus genitum: vix tolli vitium potest, quia habet triplicem vehemētiā. Si fiat ratione timoris, iræ, &c. curari potest, quia non adest summa illa vehementia.

Quoad materiam cheirurgicam: proponemus tantum motatu digniora. Venzsectio probatur, redundāte sanguine,

c. 5. l. de palp. loquitur autem ibi Galenus de palpitacione legitima, à flatu copioso, frigido, crasso: in qua peccat sanguis, non vt causa principalis, sed vt sine qua non: si ergo sanguis tunc redundet, vacuandus: alias flatus discutientibus vti non poterimus, quia cor calidis illis potius replebitur, quam euacuabitur. Auicennas, si palpitatio fiat à sanguine melancholico, venam secatur: quia sanguis in vitio hoc vehementissimo, habet rationem causæ principalis, vel sine qua non. *vsus.* Auicennas ilico secatur venam: nam adest præsentia vehementis indicantis, & nihil prohibet: & hoc faciendum est, actu etiam existente palpitacione: nam interdum durat accessio, & perducit ad leipothymiam, ad syncopem, ad mortem: vt necessarium sit exonerare naturam, præsertim quia virtus non prohibet: nec enim resoluitur virtus, sed potius suffocatur. In præseruatione, tempus veris eligendum, cap. 2. l. 5. loc. aff. tunc enim adest sanguinis abundantia, & tunc imminet, ne materia repat in cor: virtusque tunc est robusta. Vbi agendum patet. De cucurbitulis, hirudinibus, cauteriis, gratia præseruationis, sæpe alias diximus.

Pharmacia.

Cor alterantia.

Medicamenta totum respicientia, aliunde patent. Iam alterantia saltem proponemus: quorum nonnulla sunt temperata, quædam frigida, alia calidiora. Auicennas inter temperata cordialia recenset, *aurum, argentum, buglossum, hyacinthum, quinquifolium, adiantum.* Inter frigida numerat, *actum, acidum citri, margaritas, corallia, carabe, caphuram, santalos, rosas, spodium, terram sigillatam, poma, violas.* Inter calida proponit *doronicum, Zedoariam, moschum odoratum, ambram, sericum crudum, crocum, been virumque, caryophyllos, lignum aloes, melissam, cardamomum, cubebas, folia & semina citri, folium, enulam, calamintham montanam, dictamnium Creticum, aromatis.* Galenus maxime commendat castorium, cap. 2. l. 5. loc. aff. cap. 5. l. de palp. Possumus nos addere, magnas antidotos, *dianibram, diamoschum, galliam moschatam, electarium calidum latificans Rhasis.* Addis Galenus loc. cit. *pyrethrum, euphorbium, sulphur, thermas nitrosas, & salvas.* In omnibus malis cordis, secundum Auicennam, fugienda sunt vehementer calefacientia, vehementer refrigerantia, & vehementer astringentia: nam à calidioribus virtutis substantia dissoluitur: à frigidioribus, qualitas refrigeratur: astringentia cohibent excrementa, quæ in nutrimenti confectioe generantur: nec enim faciunt vt nimis concentretur calor, quemadmodum plu-

rumi

rimi dicunt, quia virtus nihil aliud in se claudit, quam bonam quantitatem & qualitatem sui subiecti, suæ substantiæ: ita ut astringens non immediatè respiciat virtutem. Porro addit Auicennas: in cordis intemperie frigida, audaçter vtilicere calidis: in calida autem non ita audaçter frigidis vtendum: quia hæc opitulantur quidem ramo, id est, corpori cordis, dyscrasia calida laboranti: sed officium radici, id est, calido innato, quod est vinculum corporis cum anima: quia enim hoc est primum, quod post conceptionem gignitur (vt in tractatu nostro de fœtus formatione ostēdimus) ideo radix iure dicitur. Quare non video, cur quidam temperiem cordis à calido innato non distinguunt. Nam in frigida cordis intemperie, calidis occurrimus, quibus non cogimur frigida miscere: quia calida hæc medicamenta citra frigidorum permissionem non nocent cordi, quia hoc est redditum frigidus: neque nocent calido innato, quia est quasi simile quiddam. At in calida intemperie, frigidis occurrimus: quibus tamen calida etiam miscere cogimur, propter calidum innatum: & præterea etiam gratia vehiculi.

Vsus medicamentorum, patet ex alibi dictis. Propter iuniores, si palpitatio fiat à causa potissimum frigida: *℞. cinna-mom. agallochi, serici crudi, calamintha mont. ana ʒ ij. (hæc sunt infra basis) moschi, ambra, gallie moschata, ana ʒ v. (pro adiuvante: quamvis etiam possint rationem basis habere) diambos ʒ ij. cum syrupo de corticibus citri, fiat electarium. Dosis à ʒ ij. ad ʒj.* Posset addi aliquid leuiter astringens, vt est *pulvis mastiches*: nam dum viscus frigidum calefacere tantum volumus, possumus calidis vti sine astringentibus: ac si volumus frigidam materiam euacuare, crassam & copiosam materiam diffilare: omnibus modis astringentia permiscenda sunt. Quare in cordis palpitatione, si institutum est cor frigidum calefacere: possumus ab astringentibus abstinere: nam vbi adest intemperies frigida, non imminet dissipatio. At si propositum nostrum est materiam morbificam dissolvere: admiscenda sunt moderate astringentia, quod obseruatur in tumoribus ventriculi, iecoris, & similium partium: licet enim virtus ipsa indicet solum, ratione quantitatis & qualitatis: dum tamen calidis vtimur, ad materiam morbificam dissoluendum, periculum est ne etiam dissoluatur substantia calidi innati: propterea in hoc casu astringentia permiscemus.

De virium dissolutione; id est, de Leipothymia, & Syncope.

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Subiectū.

Causa efficiens.

RE virium dissolutionem intelligimus & leipothymiam, seu animi deliquium, & syncopen. comment. aph. 41. sectio. 2. & c. 14. lib. 1. ad Glauc. Generatur hoc malum, dum corpori aliquid præter naturam occurrit, vi cuius summa cum violentia spiritus vitalis in corde aggrauatur, vnde cordis virtus imminuitur, & debilitatur. Vinum ergo dissolutio est virtus debilis cordis, dependens à frustratione motricis cordis. Forma est virtus debilis, id est, motus præter naturam, non deprauatus, sed debilis, id est, nonnihil imminutus, nonnihil etiam ablatum quoad sensum: quia si omnino tolleretur, non esset virium dissolutio, sed mors: est igitur virtus debilis. Subiectum est cor: quod læditur & secundum attractionem, & secundum expulsionem.

Efficiens causa est frustratio motricis. cap. 5. 6. 7. lib. 11. meth. cap. 14. lib. 1. ad Glauc. cap. 2. lib. 5. loc. affect. comment. 48. lib. 2. de rat. vict. Quidam volunt, palpitationem pertinere ad vim pulsificam, seu motricem cordis: syncopen ad facultatem cordis vitalem. At hæc ridicula sunt: nam in syncope quicquid cernit, minui & auferri pulsus: quæ sane spectant ad vim pulsificam, ad vim motricem cordis: hæc vis pulsifica, est attractrix, & expultrix. Vitalis autem facultas nihil aliud est, quam alteratrix facultas cordis: sicut enim coctrix, seu alteratrix ventriculi vocatur *χολώτις*: coctrix iecoris, *αίμωλοποιήτις* id est, sanguificatrix: ita coctrix, seu alteratrix cordis vocatur vitalis. Cæterum, frustratur facultas motrix cordis ob errorem externum (non læditur, sed frustratur.) Quamuis enim in syncope cor afficiatur morbo: hic morbus tamen non est læsio huius facultatis, sed aliarum. Error autem hic externus nihil aliud est, quam vitalis spiritus præter naturam cum violentia aggregatus in corde. Hinc Auicennas dicit, syncopen fieri propter congregationem caloris & spiritus in corde: ut reliquæ corporis partes sint orbæ & spiritui, ut mortuæ videantur. Ergo error externus est causa morbi: ca, nimirum, spiritus vitalis summa cum violentia in corde aggregatus. Et hoc contingit huc

huic spiritui, quia lædatur retentio cordis. Lædatur autem retentio cordis, vel Propria ratione, vel ex Accidenti. Propria ratione, quando lædatur retentio citra expulsionem: ex accidenti, quando lædatur propter expulsionem. Si retentio lædatur citra expulsionem: spiritus aggregatur propter causam resoluentem: dum enim causa resoluens agit, nisi id quod residuum est, in corde aggregaretur, illico moretur animal. Si retentio lædatur vitio expulsionis: tunc aggregatur spiritus propter causam non resoluentem, sed contrariam, id est, suffocantem. Quare virium dissolutio fit vel per Resolutionem, vel per Suffocationem. Resolutio fit, dum lædatur retentio, citra vitium expulsionis. Hæc retentio lædatur, vel læsa facultate, vel ob Errorem externum. Lædatur facultas retentrix ob morbum cordis (hic tamen morbus non est in causa immediata) & quidem ob morbum in via ampliore, non angustiore: cuius causa esse potest immoderata caliditas, coniuncta cum humiditate. Error autem externus, est spiritus vitalis exiguus: item eiusdem tenuitas immoderata: iusto enim tenuior facile resoluitur. Porro spiritus exiguus est per Se, aut per Accidens. Per se est exiguus, cum non generatur copiosus. Non autem generatur copiosus, vel Læsa alteratrice, vel ob Errorem externum. Lædatur alteratrix, seu coëtrix, vel vitalis facultas ob morbum, & potissimum ob intemperiem frigidam & siccam: & hic morbus est causa syncopes mediata, quia generat exiguum spiritum, qui facile resoluitur. Error externus est succus crudus, qui non est aptus, ut mutetur in copiosum spiritum vitalem, quamvis cor optime sit temperatum. Huius ordinis etiam est inedia: nam etsi optime cor sit constitutum: in inedia tamen non potest copiosus spiritus vitalis generari. Per accidens autem spiritus est exiguus, quando generatur quidem, sed non detinetur in corpore: quod fit ob calorem insignem, immoderatas vigilias, inanitiones, motus immoderatos, &c. his enim spiritus, etiam in magna copia generatus, minuitur & euacuatur.

*Resolutio
spirituum.*

Deinde fit dissolutio virium per Suffocationem: unde vel Lædatur facultas, vel occurrit aliquis Error externus. Lædatur ob morbum in via, in angustia: quæ fieri potest à materia copiosa, vel causa Interna, vel Externa. Causa interna, est succus prauus, corruptus: qualis esse solet, in suppressione mensium, puerperij: potest etiam succus esse veneficus.

*Suffocatio.
spirituum.
& caloris.*

vt in febribus pestilentibus, in retentione seminis. Causa externa est aer prauus, pestilens: cibi similes: potiones: & animi pathemata, vt timor.

*Differen-
tia.*

Quoad formam: motus debilis, vel Imminutus est, vt in leipophymia: vel Ablatus, id est, insigniter debilitatus, aut ad sensum saltem ablati, vt in syncope. Quoad subiectum: læditur cor, secundum partem Dextram, vel Sinistram. Quoad causam efficientem: hæc est Resoluens, vel Suffocans: quarum differentia: e dictis parent.

Signa.

In genere hoc malum cognoscitur, quia pulsus euadit paruus, debilis, secundum omnes dimensiones: ad differentiam pulsus læsi in palpitatione. Deinde cognoscitur e facie pallore suffusa, quia spiritus, & cum spiritu sanguis reuocatur ad cor: vnde ob eandem causam externa frigent. Cognoscitur etiam e sudore, & humiditate rorida, ac præsertim circa frontem, quia aliqua e parte comparitur cerebrum: erumpit autem illa humiditas rorida: quia partes, calore destitutæ, nequeunt substantificam humiditatem detinere: & frigida erumpit hæc humiditas rorida: quia exit per poros cutis frigida: frigida autem est cutis ob reuocationem caloris.

Differentia: formales, facile parent: nam si fuerit syncope: omnia symptomata sunt vehementiora, quam in leipophymia: præterea syncope indicatur ex amissione vocis, nec possunt loqui: quod non contingit in leipophymia. Aegri autem dum ad se redeunt, recordantur casus: ad differentiam epilepticorum, qui non recordantur: quia in syncope magis læditur cor: in epilepsia magis cerebrum.

Differentia: a subiecto ita cognoscuntur: si enim symptomata magis vrgent secundum partem sinistram: indicium est potius cor affici secundum partem sinistram: & contra. Quoad differentias a causa efficiente: facile resoluentes causæ a suffocantibus distingui possunt. Verbi gratia, si homo afficiatur macie, si præcedat insignis vacuatio, immoderatus corporis motus, lætitia effusa, cibi parcitas, inedia: fieri solet virium dissolutio a causa resolvente. Si contra cohibetur aliqua euacuatio solita, homo plus iusto comedat & bibat, timore corruptus sit: statuendum, virium dissolutionem fieri a causa suffocante.

Vitales indicationes sumuntur a subiecto, & causa efficiente. A subiecto, vt dictum est cap. de palp. cordis. A causa efficien

efficiente: Si sit causa resoluens: si immoderata apertio, indicat occludens, astringens: Si immodica euacuatio, quæ fit ob immodicum impetum materiæ: motus ille cohibendus, & quandoque etiam reuellendus: est enim reuellendus causa curationis: nam si, verbi gratia, fiat syncope, ob immoderatum sudorem, secundum totum corpus licet astringere, non licet reuellere: at si fiat syncope à resolutione, ob fluxum sanguinis narium, licet reuellere ad infernas partes. Si vero resolutio fiat, quia non gignuntur spiritus, ob intemperiem cordis frigidam: indicatur calefaciens: & sic de reliquis. Quod si cum frigiditate est coniuncta siccitas: simul humectandum. Si malum fiat à causa suffocante: obstructio non indicat: materia autem obstructionis, copiosa, crassa, viscida, indicat minuens, attenuans, detergens. Si malum fiat non propter morbum, sed ob errorem externum; hic error pertinet ad causam externam, vel internam. Externa non indicat. Interna causa est materia, quæ potest esse toto genere præter naturam, ideoque eradicanda: potest esse copiosa, unde minuenda.

Vitium hoc periculosissimum, via est ad mortem: afficitur enim pars quæ gratia vitæ præcipuum locum obtinet. *Trognosi- ca.* Quoad differentias: Syncope periculosior est quam leiporhythmia. Periculosius etiam malum, si pars sinistra afficitur. Quoad causam effectricem: cæteris paribus, periculosius malum, si fit à causa resolvente, quam suffocante. Dixi, cæteris paribus: nam si suffocatio fiat à causa pestilente, venefica: certe malum est quasi lethale.

Præseruatio spectat ad hunc, vel illum morbum: ideoque hac dimissa, de curatione mali præsentis agemus. Quæritur autem primum, an actu existente syncope, vena sit secunda, nec ne? Hoc videtur colligi posse à Gal. com. 24. 82. III. l. 4. de rat. vict. probatur enim venæ sectio in pulsus carentia. Et ratio est: quia in syncope triplex est sanguinis peccatum insigne, indicans venæ sectionem, scilicet in forma, in quantitate, & motu. In forma, quando sanguis ita prauus redditur, ut non sit aptus ad nutriendum: cum sit putrefactus, cum sit in via ad putredinem: & iccirco euacuandus est. Peccatum in quantitate est, cum sanguis probus peccat secundum copiam, ut in habitu athletico, quæadmodum Hippocrates dicit aph. 3. sect. 1. & cū hoc vitium sit vehemens, egemus materia vacante vehementi. Tertium peccatum est ratione motus: quia

*Curatio.
Phlebotomia.*

quia fieri potest, vt sanguis probus copia non excedat, nec signa absint plenitudinis: sed peccet tamen secundum motum, vt immineat aliqua inflammatio: verbi gratia si aliquis, probum habens sanguinem, nec copia excedentem, cadat ab alto, vel percutiatur: ratione illius ictus fieri potest, vt sanguis motum præter naturam acquirat, cui motui, tanquam vitio occurrendum sit euacuando simul & reuellendo. In syncope igitur locum habere potest triplex hoc peccatum: potest enim syncope fieri sanguine prauo & inepto nutritioni: potest fieri à sanguine copiosiori, vt in plethora: potest fieri à sanguine peccante secundum motum, verbi gratia dum fit suppressio mensium, vt hic sanguis impetum ad cor habeat: item, si fiat syncope ex immoderato fluxu sanguinis narium, nam & tunc sanguis in motu peccat. His positis, dicimus, *in syncope actu existente, non esse secandam venam: nisi peccatum sanguinis sit secundum copiam.* Quare vena secari potest, si vitium sanguinis sit simul in quâto & forma: itē si simul in quanto & motu: at si in forma tantum, vel in motu tantum: venam aperire maxima esto religio. Fundamentum sumitur è vi indicantis sanguinis, & è vi virtutis. Nam ad venæ sectionem non tantū indicans, sed etiam virtus robusta permittens requiritur. Si ergo in syncope actu existēte consideremus vim sanguinis indicantis: certe summa eius vis est, quando vel sola copia peccat, vel simul cū copia & in forma, & in motu: imminet enim præsentaneum suffocationis periculum, ob immodicam copiam: sicut etiam ignis ab immodica lignorum copia suffocatur. Præterea adest etiam permittens, id est, virtus: quando scilicet patiens non est priuatus carne, & virtus robusta est secundum solida, secundum carnosum genus. Dubium igitur tantum est de virtute secundum spiritus. Virtus igitur secundum spiritus dupliciter potest esse debilis: vel quia resoluitur, & hæc imbecillitas prohibet venæ sectionem, vel quia suffocatur, quæ non prohibet venæ sectionem, sed permittit: nisi enim illico copia tollatur, derepente suffocantur spiritus, & æger moritur. Ideo Galenus locis citatis, in pulsus carentia lecat venam. *Vfus.* Quoad *quantum*: non confertim euacuandum, in multa copia: virtus enim permittit quidem venæ sectionem, non tamen concedit vacationem copiosam. Quoad *tempus*: vena secanda est, actu existente syncope, quia adest præsentia indicantis sanguinis, & virtutis permittentis.

mittentis. Quoad ubi vena varia est secanda, pro varia subsistentia sanguinis, verbi gratia si corpus sit plethoricum, vt sanguis in toto existat: cum sanguinis fons sit hepar, licet basilicam aperire. Si fiat syncope e suppressione mensium, puerperij, & sanguis sit copiosior, aperienda est vena inferna: quia est materia & vacuans sanguinem, & simul impetum sanguinis reuellens. Peccatum sanguinis in solo motu, *Ligatura,* coerceri potest ligaturis, cucurbitulis: Sic etiam peccatum *frictionis.* sanguinis in sola forma, aliis praesidiis tolli potest. Frictiones, ligaturae, euulsio pilorum capitis & barbae, possunt cum utilitate administrari, in syncope a suffocatione. Si autem e resolutione fiat syncope: licet interdum etiam vti ligaturis & frictionibus, non indifferenter, sed secundum partes remotas contrarias, verbi gratia si fiat syncope ob immoderatum fluxum alui, oportet fricare & ligare brachia: si ob narium haemorrhagiam, crura liganda sunt, & fricanda.

Quoad medicamenta, quibus egemus actu existente syncope. Si fiat e resolutione, oportet vti frigidis: vt sunt aqua frigida, rosacea, acetum, &c. quae fronti, & faciei applicanda. Si fiat syncope e suffocatione, calidis vtendum: vnde expedit fricare partes, & palatum etiam mibridatica confellione, & theriaca, aliisque non modo calidis, sed etiam ingratis, & inuicundis, vt virtus suffocata expergiscatur. Conducit etiam magnopere nasturtium, nigella, diasinapi, &c. quae intra nares immittenda, vt excitetur sternutamentum, vi cuius virtus suffocata excitetur. Notandum: si in syncope, forte e suffocatione, haec sternutamenta administrentur, & homo non sternutet, (non existente vitio in naribus, vel carunculis mamillaribus) actum esse: ideoque discedat medicus.

Quoad dietam: aer probatur purus, vt materia alimenti *virtus.* spiritus: probatur etiam aer, vt materia remedij. Et in syncope e resolutione probatur aer frigidus. In syncope autem e suffocatione, non probatur aer calidus, sed potius moderate frigidus, cap. 14. lib. 1. ad Glauco. ratio est: quamuis enim virtus suffocetur, & fiat concentratio spirituum: attamen probari aer calidus non potest, quia in syncope e suffocatione adest magna necessitas euentandi calorem, ne suffocetur: ideo potius opus est inspiratione aeris frigidi: quod etiam obseruatur in asthma, in difficili respiratione: quamuis haec fiant a materia frigida & pituitosa, aere tamen

egemus frigido, propter necessitatem euentandi caloris,
 Quoad cibum. Non possunt masticare. Si ergo fuerit syn-
 cope è resolutione: probatur potio ex aqua carnis, è capi destil-
 lato: & ad celorem penetrationem, cum aqua carnis etiam vinum
 miscendum: unde probatur vinum aromaticum. His tamen non
 in omni syncope vtendum: nam si fuerit è suffocatione, &
 præsertim è copioso sanguine: à vino abstinendum. Nec
 obstat Galeni dictum, cap. 4. §. lib. 12. meth, omnibus, qui actu
 detinentur syncope, vinum esse exhibendum: non enim ab-
 solute intelligit omnes, sed omnes de quibus ibi loqui-
 tur: loquitur autem ibi de syncope, quæ non sit à
 copioso sanguine, sed à succis biliosis, pituito-
 sis: & proinde idem Galenus c. 14. li. 1.
 ad Glaucum non omnibus
 vinum exhi-
 bet.

FINIS LIBRI SECVNDI,





P R A C T I C Æ
M E D I C I N A E,
L I B E R T E R T I V S.



D E P A R T I V M I M O V E N T R E
C O N T E N T A R V M A F F E C T I B V S.

C A P V T I.

*De Lesa deglutitione: qua Oesophagi
est affectio.*

INSTRUMENTA corporis humani per-
tinent vel ad Ventres, vel ad Artus. Si ad
ventres: vel ad Caput, vel Thoracem, vel
Abdomen. Cum igitur hactenus capitis &
thoracis affectus præcipuos mediocri dili-
gentia finis prosecuti: deinceps mala ad
A B D O M E N spectantia proponere institui-
mus.

Transitio.

Sciendum vero abdomen causa tum vitæ, tum commo-
dioris vitæ in se continere Hepar: & huius causa Ventricu-
lum, Intestina, Vesicam felleam, Lienem, Renes, Vesicam
urinariam: gratia autem speciei Genitalia vocata organa,
tam virilia in maribus, quam in feminis muliebria. Nos
igitur circa omnium harum partium vitia digrediemur: nec
circa diligentiam; siquidem in quolibet vitio versabimur
circa nomen, definitionem, differentias, signa, præsidia, pro-
gnosticum, & præsidiorum materias: & assiduo conabimur
doctrinam historicam euitare, & scientificam amplecti: ma-

*Quid agi-
dum hoc li-
bro, & quo
ordine.*

xiime vero dum sermo sit de præsidiorum materiis: nostrum institutum erit, non simpliciter tradere receptas, (quod pertinet ad empiricos) sed tradere artem, formulas leu receptas præscribendi. Verum, quanquam abdominis pars præcipua sit iecur, nihilominus nos primum de ventriculi malis dicemus: & ratio est, propterea quod ventriculus est instrumentum, cui primo quæ assumuntur occurrunt: primum enim virtus ventriculi aliquantisper vincens cibaria & potiones, in causa est, vt quæ ingeruntur, deinceps apprimè vincantur ab hepate. Cæterum hoc loco per ventriculum intelligimus totum viscus, duabus constans partibus: nimirum meatu quem transeunt, quæ assumuntur: deinde vtre in quem suscipiuntur: iccirco ne vitium in defectu à nobis committatur: per ventriculum intelligemus non modo suscipientem partem, nempe ventriculi corpus, quod ventriculum vocant: sed etiam partem quæ eorum quæ ingeruntur est ductus, quam partem œsophagum vocare consueverunt. Quamobrem agendum nobis erit de vitiis tum Oesophagi, tum Corporis ventriculi: & primum œsophagi: quia quod assumitur, primum œsophagū, postea ventriculū adit.

*Affectus
œsophagi.*

Quantum igitur ad vitia œsophagi: secundum Auicennam membrum hoc obnoxium est cuilibet vitiortum generi: siquidem intemperie, mala compositione, & soluta vnitate corripitur. At cum omnia hæc mala, vt insinuarè videtur Auicennas, consentientia esse videantur, prout vni officiunt deglutitioni, propter quam œsophagus est creatus: ob id de læsa deglutitione sermo instituendus: nam læsæ deglutitionis doctrina recte concepta, nihil quod ad œsophagi mala intelligendum necessarium vel vtile esse videtur, desiderari poterit. Quoad nomen *ἔρπος* relinquo

Nomen.

Grammaticis: per læsam autem deglutitionem intelligimus illud vitium, in quo homo præter leges naturæ, cum aliquid per os ingeritur, ita afficitur, vt quod assumitur, nequaquam secundum naturæ statuta ab ore in ventriculum descendere valeat: vt propterea læsam deglutitionem audire, oporteat genericam. Huius mali, vt definitio promptius elucescat, primum (vt moris nostri est) læsæ deglutitionis ge-

Generatio.

*Vt fiat de-
glutitio se-
cundū na-
turam.*

neratio explicanda: & facilioris doctrinæ gratia quomodo deglutitio secundum naturam celebretur, ostendendum. Sciendum ergo cum Galeno cap. 8. lib. 4. de vsu part. cap. 11. lib. 5. de vsu part. cap. 5. lib. 6. de vsu part. & cap. 8. lib. 3. de fa-

cult.

cult. naturalibus, & cap. 5. lib. 5. de loc. affect. à quo accepit Auicennas prima, primi, cap. ult. & lib. 3. fen. 13. cap. 1. ad deglutitionem secundum naturam celebrandum, necessario concurrere facultatem, tum naturalem, tum voluntarie motricem. Quoad naturalem: scire oportet, esse attractricem & expultricem. Quantum ad attractricem: potissimum spectat ad oesophagum, aliquo autem modo ad ventriculum. Ad oesophagum attinet: vt per rectas fibras, in oesophagi tunica interna insertas, cibum ad oesophagi initium expressum, in partes penitiores attrahit. Spectat etiam ad ventriculum: vt per rectas fibras sit attractio. Hinc fit, deglutitionem optimam expleri, si appetentia ciborum deglutitionem præcedat: nam dum vigilat appetentia ventriculi, non dormit attractrix: vt propterea deglutitio ægre perficiatur, nisi appetitus præeat: quod euenit in assumptione vel ciborum, vel medicamentorum iniucundorum. Quoad autem expultricem: est hæc oesophagi facultas, quæ ope fibrarum transversarum, tunicae externæ adhaerentium, cibos in oesophagum attractos, in ventriculum protrudit. Quoad facultatem motricem: duplex est: altera laryngem sursum trahit: reliqua autem cibum ad oesophagi initium exprimit. Facultas autem motrix, quæ laryngem sursum pellit, attinere potest ad hyocididis ossis musculos, qui laryngem sursum in tantum eleuant, quantum gula deorsum trahitur. Expedit autem laryngem ascendere: nam secus, cum larynx tota sit cartilaginea, cibi descensum inhiheret. Nec vero sursum larynx eleuata eandem sedem seruat: verum (cap. 8. lib. 3. de facultate natural.) completa deglutitione, luculenter descendere cernitur. Id autem assequitur per rectas fibras, insertas, internæ tunicae ventriculi: quæ sane tunica, cum intus inuestiat tum gulam, tum os, tum præterea intrinsecus secundum summitatem arteriæ seu laryngis extendatur sit, vt dum gula à ventriculo deorsum trahitur, simul etiam summa arteria trahatur, & proinde larynx descendat. Motrix autem quæ cibum ad oesophagi initium exprimit, attinet ad faucium musculos: qui dum ad suum principium trahuntur, cibum in oesophagum depellunt. His sic constitutis, patet, cibum assumptum descendere & tractu & pulsu. Vt cum Auicen. deglutitio secundum naturam bifariam perpendi possit: altero modo, vt incipit deglutitio, altero vt perficitur. Vt incipit, fit ope attractricis oesophagi, & virtute musculorum: vt autem perficitur, fit

virtute expultricis œsophagi, & virtute attractricis oris vetriculi. Hæc Gal. cognoscens, iure c. s. l. s. de loc. aff. dicit, gulæ duplicem esse vsum: nam in deglutitione gula concurret dupliciter primum instar viæ, vt deglutitionis auctor est facultas tum musculorum, tum ventriculi: concurret deinde in ratione organo operantis, vt deglutitionis est opifex gulæ facultas, siue attractrix, siue expultrix. His explicatis facile colligitur, deglutitionem naturæ leges egredi, dum aliquid occurrat præter naturam, turbans vel gulam, vel vicinos musculos, vel ventriculū, vt gula, quemadmodum decet, vel non attrahat, vel non expellat. Et si musculorum vicinorum motus lædatur, vel vetriculi attractio infestetur: dubio procul quoque deglutitio præter naturam oboritur. Quare deglutitio læsa est functio præter naturam gulæ dependens à frustratione facultatis deglutricis. Definitum est accidens præter naturam: necesse est ergo vt pateat eius essentia per formam, subiectum, & causam efficientem. Quoad formam: dixi esse functionem præter naturam: vt deglutitio morbosa distingueretur à naturali: Et, vt præter naturam: proponitur forma generica, complectens deglutitionem Ablatam, Imminutam, & Corruptam. Subiectum est gula: vt distinguatur hæc functio præter naturam, à functione præter naturam cuiuslibet alterius instrumenti.

Causa efficiens. Causa efficiens est frustratio facultatis deglutricis: vt distinguatur definitum à functione gulæ frustrata, vt nutritur. Vnde explicare oportet, quā ob causam facultas deglutrix frustratur. Sciendum, frustrationē hanc pendere vel ē læsione facultatis, vel ab Errore externo. Quoad læsionē facultatis: locū hæc habet, dum gula afficitur morbo, vi cuius deglutrix facultas vel Labefactatur, vel Impeditur, vel Vtrūque patitur. Error autem externus, attinet ad omnem gulæ noxā, quæ est extra constitutionem gulæ, id est, extra interiorem, extra malā compositionē, extra solutā unitatē. Id ergo omne, quod est extra constitutionē, habet rationem erroris externi, siue sit vicinarū partium morbus, siue nullus sit morbus partium. Declaro cum Gal. & Auic. c. proprio. Primum ergo quoad læsionē facultatis: vt morbus est multiplex, ita multiplex est facultatis læsio. Hinc cum morbus esse possit, tum simplicis, tum mixtæ potentix: si sit simplicis potentix, facultas vel labefactatur, vel impeditur. Si autem sit morbus mixtæ potentix, simul facultas & labefactatur & impeditur.

Quoad

Quoad morbum simplicis potentiz, vi cuius facultas solum labefactatur: est verbi gratia intemperies quælibet secundū Auic. potissimum tamen intemperies frigida, humida, sicca, vt contingit in febribus: etenim si interna gulæ tunica corripitur intemperie, labefactatur facultas attractrix: si externa, labefactatur expultrix: si vtraque tunica morbo corripitur, etiam vtraque facultas labefactatur. Quoad morbum simplicis potētiz, vi cuius facultas impeditur: est morbus in Mala cōpositione, & in Soluta vnitatē: propter malam cōpositionem, via seu ductus angustatur: propter solutā vnitatē via redditur inæqualis. Mala cōpositio est angustia, hoc est, Obstructio, Cōstipatio, Coalescentia, & compressio. Obstructio fit à materia simpliciter replētē oesophagū: quæ materia multiplex esse potest, vt materia destillans à capite, itē secundū Auic. vermes numerosi: vnde obstructionis materia concurrir, quatenus peccat, vel copia, vel crassitie, vel visciditate & lētoze. Cōstipatio fit dū nascitur caro, post vlceris oesophagi, quando ad agglutinationē perducitur: tunc. n. caro ita potest cōcrescere, vt constipetur oesophagus. c. 2. l. 3. de symp. caus. Coalescentia fit, cum post vlceris oesophagi agglutinationē, citra carnis excrescētia, angustus redditur oesophagus, cuius angustiz causa immedata, non est caro, vt in cōstipatione, sed cicatrix. Compressionis causa est, quod extrinsecus comprimit gulam: siue sit tumor partium vicinarum, vel nō inflammatorius, vel inflammatorius, vt in angina: siue etiam cum Auicenna sit vicinarum vertebrarum luxatio ad interiora. Soluta vnitās, est vlceris: de causis autem vlceris, dicemus in sermone de vlcere ventriculi. Quoad morbum mixtæ potentiz, qui deglutricem facultatem tum labefactat, tum impedit: hic morbus est gulæ tumor, siue frigidus, siue calidus: per intemperiem enim morbosam labefactatur facultas: per magnitudinem auctam impeditur. Hæc de morbis. Quoad errorem externum: hic potest esse causa Externa, vel interna. Causa interna, cum Auicenna, est vitium partium vel Vicinarum, vel Non vicinarum. Vitium partium vicinarum, attinet vel ad Musculos vicinos, vel ad Ventriculum. Ad musculos, vt afficiuntur vel Paralyfi, vel Conuulsione, vel Tumore. (Sed duo hic notanda primo. Si hæc mala dirigantur ad deglutitionem, vt prodit à facultate animali, esse vitia, propter quæ leditur facultas animalis: Si autē dirigantur ad deglutitionē, vt prodit à facultate naturali, hæc causas esse errores externos,

Errores
externos.

non morbos. Secundo notandum: si muscoli afficiantur tumore, & vi huius tumoris solum laedatur motus muscularum, esse vitium, quod attinet ad errorem externum: at si vi tumoris, non modo laedatur motus muscularum, verum etiam gula angustetur & comprimatur: tunc etiam laedi facultatem, & proinde habere rationem morbi. Porro error externus spectat ad ventriculum, si citra noxam oesophagi ventriculus afficiatur inappetentia, ut non attrahat cibum. Ad partes non vicinas spectat error, dum laeditur deglutitio ob debilitatem virtutis: ut in fine morborum acutorum contingit: in his enim omnium partium calor languet. Error externus, prout spectat ad causas externas, est vitium in his quæ ingeruntur: sed dum ingeruntur crassiora male masticata, & dum confertim ingeruntur.

Differētia. Differētiæ à forma: Deglutitio vel Aufertur, vel Male fit: si male fit, Iuvinuitur, aut Deprauat. Differētiæ à subiecto: Afficitur gula, secundum partem Internam, vel Externam: secundum Supernam, vel Internam. Differētiæ à causa efficiente: Deglutitio læditur, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum: horum subdiuisio è traditis patet.

Signa. Deglutitio in genere, & secundum differētiās à forma, non eget signis: æger enim cōqueritur de deglutione, & de hac vel ablata, vel imminuta, vel corrupta quæ corrupta deglutitio fit vel cū dolore, vel cū prauo motu. Quoad differētiās, ratione subiecti: Si gula sit affecta secundum partem Supernam, tumor quandoque oculis conspicitur: & ilico assumpto cibo deglutionis impedimentum sentitur. Si pars interna sit affecta: cibi aliquantisper libere descendunt, sed mox in transitu iter turbatur. Vtrum autem gula afficiatur secundum tunicam externam, vel internam, patebit è cognitione

Diff. à causa effici. differētiarum, quæ sumuntur à causa efficiente. Quoad differētiās à causa efficiente: hæc est morbus, aut error externus. Si morbus, & primum si sit intemperies: ex eo deprehenditur, quia cibus difficulter descendit, sine sensu angustię. Et si ob intemperię labefactetur attraxitrix: cognoscetur inde, quod cibus tum liquidus, tum solidus descendet, sed ægre. Si labefactetur expultrix: cognoscetur, quod cibus liquidus descendet, non autem solidus. Si dyscrasia ad calidum declinet, indicabitur è sensu caliditatis, & causis calidis prægressis: contra, si ad frigidum. Si verget ad humidum, cognoscetur ex oris humiditate, è priuatione sitis, è prægressis causis humectantibus: contra, si ad siccum. Si morbus sit angustia:

angustia: indicabitur è cibo, ægre descendente, sed cum *Angustia:*
sensu angustie. Et si angustia fuerit obstructio, indicabitur
à difficili & inæquali deglutitione, siue dolore: vtrum autem
obstructionis causa sit vel materia destillans, vel verinis: co-
gnoscetur è propriis capitibus. Si angustia sit constipatio: in-
dicabitur è difficili & inæquali deglutitione citra dolorem,
citra sitim, citra febrem: & præterea vlcus est prægressum.
Si causa sit coalescentia: indicatur è signis vlcera (coalescen-
tia enim vlcus sequitur) sed minor erit difficultas in deglu-
titione, quam dum sit à tumore carnosio: quoniam à cicatri-
ce producitur exigua angustia. Et si angustia sit compressio,
si fiat à tumore partium vicinarum, signa erunt tumoris, vt
in angina: si sit vertebrarum luxatio: indicabitur è prægres-
sa causa luxationis, & intendetur deglutitionis noxa in su-
pino decubitu. Si causa sit vlcus: indicabitur è dolore, qui *Vlcus.*
tempore deglutitionis intendetur: item è siti, è puris excre-
tione, è prægressis causis vlcera. Si causa sit tumor
glulæ: indicabitur è difficili & inæquali deglutitione: & si tu-
mor fuerit frigidus, non aderit sensus caliditatis, non fe-
bris, non sitis, non dolor: Si tumor sit calidus, contra. Se-
quitur cognitio erroris externi. Hic est causa interna, vel
externa. Si interna: & primum si vitium sit secundum mus-
culos oris hyæidis: cibus protruditur ope musculorum fau-
cium, & quidem intra œsophagum: sed cibus solidus vix de-
scendit, cum prohibeatur à tracheie substantia chartilaginea,
quæ sursum non attollitur, propter vitium musculorum
hyæidis. Si vitium sit secundum musculos faucium, indica-
tur inde, quod cibus non truditur intra gulam, vnde vel non
descendit, vel vix descendit. Et si musculi afficiantur paralyti:
deglutitur solum cibus liquidus; idque fit, vel quoniam mus-
culi hyæidis laryngem sursum non trahunt, vel quoniam mus-
culi faucium cibum deorsum non pellunt. Si vero musculi
afficiantur conuulsione: & quidem si faucium musculi con-
uellantur, vt vi retrahantur ad suum principium: fiet vt cibi in
gulam impellantur, nobisque inuitis cibi descendant: Si mus-
culi hyæidis conuellantur: sursum trahunt laryngem, & hinc
sursum pellunt cibum, & præsertim cibum liquidum: solidus
enim cibus pondere suo descendit, nec ita facile cedit motui
conuulsivo, quemadmodum liquidus. Si error attineat ad
ventriculum, indicabitur ex appetentia. Si error spectet
ad partes remotas: indicabitur è morbis qui vires dissipare

*Tumoris.**Erroris ex-
terni si-
gna.*

*quando
muscoli
afficiuntur
paralyti
cibus liquidus
deglutitur*

potuerunt. Si tandem error attineat ad causas externas, æger & assidentes referre potuerunt.

Indicationes.

Præsidia sumuntur ab essentia indicantis: essentia autem deglutitionis posita est forma, subiecto, & causa efficiens: sufficit tamen præsidia ex usu locum capere à causa efficiente. Si igitur fiat deglutitio læsa facultate: & primum, si morbus sit intemperies: indicat alterans per contrarium: magis autem particularia, in sermone de intemperie ventriculi persequemur. Si morbus sit angustia, indicatio capitur à causa continente ex usu, non ab angustia. Si igitur angustia sit obstructio: materia, obstructionis erit vacuanda: si angustia sit constipatio: caro excreta absumenda: Si angustia sit coalescentia: cicatrix atterenda, siue consumenda: Si angustia sit cōpressio, & quidem si compressionis causa sit tumor: materia tumoris vacuanda. (non consideramus in tumore magnitudinem auctam, quia est morbus non ex usu.) Si compressio fiat ob vertebrarum luxationem: situs vertebris restituendus. Si morbus sit vel vlcus, vel tumor: indicationes tradentur in sermonibus de vlcere ventriculi, & de tumore ventriculi. Si deglutitio lædatur ob errorem externum: hic est causa interna vel externa. Si interna, & si attineat ad musculos, siue afficiantur paralyti, siue convulsionem, siue tumores: indicationes petantur è propriis capitibus. Si error ad ventriculū attineat: huius indicationes explicabūtur in serm. de læsa appetentia. Si error attineat ad partes remotas, id est, ad cor, & ad cerebrū: de his suis dicemus locis. Tandem, si error sit causa externa: ab hac nō sumitur indicatio.

Prognostici.

Vitium præsens negligendum non est, cum citra deglutitionem homo diu vivere nequeat. At vis differentiarum varia est, ita varium minatur periculum. Si ergo reliqua sunt paria: ratione formæ deglutitio est periculosior, si sit ablata. Ratione, causæ efficientis, pro varia vehementia, vario modo prognosticandum: non tamen proponemus hic vehementiam causæ efficientis: cum illa prognostica plurimorum vitiorum, opportunius locis propriis explicentur. Breuiter tamen sciendum: si mali causa sit intemperies, curari posse: at ægrius si dyscrasia sit in habitu, & si sit sicca: nam maior est recessus. Si morbus sit angustia, nulla est angustia, quæ ob vehementiam essentia: deterior sit, quam compressio à luxatione vertebrarum: vnde Auicennas huius curam, ceu deplo-
ratæ, non proponit. Materia obstructionis, constipationis, &

propo

propositorum tumorum, saltem secundum aliquam partem vinci potest, quod dico propter tumorem carnosum constipantem, & potiss. propter cicatricem, quæ est causa coalescentiæ. Si vehementia dignitatis perpendatur: ut causa cruciat magis prope ventriculum, malum est magis periculosum. Si denique causa efficiens sit error: pro diuersa vehemētia erroris varie prognosticandū: quod ē propositis facile colligi potest.

Circa materias præsidiorum breues erimus: ē propriis enim capitibus peti possunt. Quoad materiam igitur cheirurgicam: si deglutitio auferatur, & malum medicamenti non cedat, oportet candelam ceream in gulam immittere: & huius beneficio plerique sanitati sunt restituti. Aëtius ait, si malum fiat ē paralyti, cucurbitulas mento esse affigendas.

*Curatio.
Cheirurgia.*

Quoad medicamenta, quinque sunt notanda: tria quidem sunt communia: quartum respicit intemperiem humidam: quintum inflammationem. I. Exhibenda sunt medicamenta crassa & viscida: & si opus est attenuacione ac deterfione, miscenda sunt crassa & viscida, ut diutius hæreant: & operentur: operatio enim fit in tempore, & per cōtactum, v. g. dum causa deglutitionis, quæ producit a materia viscida, utimur melle, vel saccharo: miscere oportet farinam amyli, album oni, tragacantham, quæ basin corrigunt, sicut albuminis oni visciditas sacchari vim fluidam corrigis, interim tamen saccharum minus detergere facit. Quod si medicamenta, quæ cum detergentibus & attenuantibus miscerentur, habent etiam vim deterfioriam: non corrigunt tantum, sed etiā adiuuant basin. Sed hæc non pertinent ad methodum medendi, verum ad methodum simplicium & compositorū: ad methodum quidem simplicium, dum dicimus crassa & viscida esse eligenda: ad compositorum methodū, ubi de medicamentorum mistione agimus. Et hoc primum est documentū, quod Auic. proponit in c. de cura vlcerum gulle. II. documentū: Medicamenta ea arte sunt administranda, ut paullatim bibantur, hic enim agendi modus indicatur a resistentia indicantis: gulæ vitium nō cedit medicamenti, nisi ab his tangatur: propterea sensum oportet medicamentū descendere. Resistentiæ autem signum hic est pars affecta, nimirum gula, secundum suam compositionē: ideoque compositio est signum. III. medicamenta sunt applicanda super dorsum inter duas spatulas: nā ubi agendum indicatur a subsistentia vitij: subsistit autē in gula, quæ post tracheā descendit inter duas spatulas: & hinc gulæ situs, est signum subsistentiæ,

Pharmaceutica.

1. Cornu

2. Canon.

*3. Canon,
c. 17. lib. 3.
meth. med.*

à qua

à qua Vbi agendum indicatur. Si ergo accidat, vt in deglutitione musculi paralyti afficiantur, cum Aetio acia, id est,

4. Canon: resoluentia applicanda sunt parti iuxta consillas. IIII. Si deglutitio fiat ob humiditatem: probantur medicamenta stiptica & calefacientia: hæc vt seruent calidum innatum, quod

ad humi-
ditatem. ab humore obruitur: illa vt siccent: qualia stiptica sunt rosa, balauftia, &c. calida sunt, anisum, been utrumque, spica, myrrha, &c. Quandoque cum stipticis frigidis miscenda sunt calida fortia, quæ non tantum respiciunt calidum innatum, sed corrigunt stiptica, ne frigiditate noceant. In hac miscella Auicennas maxime probat anisum, quem puro esse succum odora-

5. Canon: tum laseris, vulgo benZoin dicitur. V. Dum gula inflammatione afficitur: probantur medicamenta tum applicanda, tum assumenda. Applicanda sunt medicamenta dorso inter

ad phleg-
mem. spatulas; & primum reprimentia composita ex odoriferis, & fructibus propositis. in curatione apostematum ventriculi cuiusmodi est medicamentum hoc: *ol. rosati completi 3j, olei xydoniorum 3ß. (hæc constituunt basin) aceto 2ij. (penetratione basin adiuvat:) cere lora in aqua rosar. 2jß. (disturnioremora facit vt medicamentum in agendo sit efficacius)* Misce, & fiat linimentum. Deinde Auicennas accedit ad medicamenta reprimentia, & digerentia. Vnde reprimentibus iam propositis addit ammoniacum, bdellium, ficus, adides, vt fiat digestio. Tertio neglectis reprimentibus, ascendit ad resoluentia: vnde conficit medicamentum e granis Lauri, & pyrethro: ex iride, aristolechia, & similibus digerentibus. Tandem si inflammatio gulæ, ad suppurationem mutetur (quod declarabimus in sermone de tumore ventriculi.) probat Auicennas medicamentum confectum e sinapi, e gummi, e ruta sylvestri: & ascendere licet ad nimum columbinum, vt abscessus disrumpatur. Quoad ea quæ assumuntur, propter inflammationem: probat Auicennas medicamentum confectum e lente: e spodio, e mucilagine phyllij, e semine portulacæ, & aqua cucurbitæ: quod medicamentum reprimendi vni-
2 babat. Deinde his reprimentibus addit resoluentia, vt sunt in aqua feniculi, ficus, dactyli, lac amygdalinum. Post reprimentibus dimissis, probat farinam orobi & ciceris. Tandem si ruptione opus sit (nisi enim abscessus disrumpatur, homo moritur) laudat serbissionem confectam e radice lilij caelestis, ex amygdalis amaris, & prasio, additque ficus, cum exiguo sinapi: vt hac medicamento fiat ruptio, & homo deglutire queat. Dicta his proportionibus respondebit de qua tamen in ventriculi dyscratiis.

CAPVT II.

De differentiis affectuum ventriculi: & primum de Dyscrasia.

ACTENVS de cesophagi malis: nunc dicendum de vitiis Corporis ventriculi. Plura autem sunt ventriculi vitia: tum quia ventriculus est instrumentū, e pluribus partibus similaribus compositum: tum quia est instrumentum functionū & animæ, & naturæ, non tantum communium, sed etiam propriarum. Si sumatur ventriculus, vt est organum e partibus similaribus compositum: vitia eius sunt morbi, & à morbis nomen assumunt: si vero consideretur ventriculus, vt est organum functionum: vitia eius sunt symptomata, & à symptomatis nomen accipiunt. Dicendum igitur nobis est, & de Morbis, & de Symptomatis. Quorum omnium numerus arte est eliciendus, hoc modo. Ventriculus primum consideratur vt instrumentum, e similaribus compositum. Similarium partium morbus est Intemperies. Si ventriculus sumatur, vt est quid dissimulare & compositum: eius vitium est Mala compositio, potiss. in magnitudine vel imminuta, vt Paruitas ventriculi: vel aucta, vt Tumor ventriculi. Vitia autem ventriculi partibus similaribus & dissimilaribus communia sunt Vlcera. Hæc de morbis. Symptomata respiciunt ventriculum, vt est plurium functionum organum. Functiones sunt Communes & Propriæ. Communis functio potiss. attinet ad tactum: vnde dicendum de Doloze, seu Cardialgia. Propriæ actiones ventriculi, sunt Attractio, Alteratio, Expulsio, Retentio: hæ actiones dicuntur propriæ, quatenus referuntur ad cibum & potum, in quæ agit ventriculus, vt fiat chylus: quatenus autem hæ actiones respiciunt alimētum, quo ventriculus alitur, sunt potius functiones communes, sicut ipsa nutritio est communis actio. Quamuis autem institutum nostrum sit versari circa has actiones, quatenus propriæ sunt: ita tamen digrediemur, vt nihil desiderari possit circa communes functiones. Quantum igitur ad attractionem: hæc postulat naturalem appetentiam, nam appetentia præter naturam nocet attractioni: ideo dicendum de Appetentia laxa. Et cum appetentia obiectū sit duplex, nempe Cibus, & Potus: gratia cibi, dicemus de Fame morbosa: gratia potus, de Siti morbosa.

Ratione

*Ventriculi
affectuum
enumeratio.*

Morbi ventriculi.

Symptomata ventriculi.

Ratione famis morbosæ, patere poterit essentia & curatio, Diminutæ appetentiæ, Fastidij ciborum, Destructionis appetitus, Famis vaccinæ, Appetitus canini, & Picæ, seu malaciæ. Eodemque modo de qualibet siti morbosa dicendum. Quoad alterationem, quæ secunda est ventriculi actio: huius causa dicendum de Concoctione ventriculi morbosa. Quoad expulsionem: loquemur de Singultu, de Vomitu, de Cholera. Quoad retentionem esset dicendum de Lienteria & Coeliaca: de quibus tamen commodius in malis intestinorum, ubi de alui fluxu loquemur.

Vitia igitur ventriculi quæ explicabimus, hæc sunt: dyscrasia, paruitas, tumor, vlcus, cardialgia, fames, sitis, læsa chylificatio, singultus, vomitus, & cholera.

*De intemperie ventriculi: & primum de
Definitione & Causis,*

- Nomen.** PER intemperiem, malam complexionem, *duo quædam* intelligimus morbosam intemperiem, ad differentiam intemperiei sanitatis. Galen. ca. 2. l. 4. meth, morbosam hanc intemperiem vocat imbecillitatem. Generatur hæc intemperies (vt insinuat Galenus c. 3. l. 7. meth.) dum ventriculo causa alterans occurrit, ita agens in ventriculi temperamentum, vt hoc degeneret in intemperiem, atque ita recedat à naturali statu, vt ventriculi actio lædatur. Proinde ventriculi intemperies morbosa, est morbus partium similarium ventriculi, procedens à causa alterante. Forma est morbus, genus proximum intemperiei: per quam formam definitum distinguitur, & à temperie, & ab intemperie sanitatis: quia dicimus intemperiem de qua loquimur esse morbum.
- Subiectū.** Subiectum sunt partes similes ventriculi: quo subiecto definitum distinguitur à mala compositione, quæ & ipsa morbus est, sed non partium similarium, verum dissimilarium. Addimus: Ventriculi: vt definitum distinguatur ab intemperie aliarum partium similarium.
- Causa efficiens.** Causa efficiens, est causa alterans: qua definitum distinguitur ab ulcere ventriculi: quod licet sit morbus partium similarium ventriculi, non tamen sit à causa alterante, sed à causa solvente continuum. Ratio huius causæ efficientis hæc est: quod complexionalis qualitas, è mutua actione & passione primarum qualitatum emergit: vt complexio vnicæ sit qualitas secunda, in qua tamen viget potentia modo vnius

nius qualitate, modo duarum. Cum ergo intemperies fiat
 è mutatione naturalis temperamentis: à causa alterante eam
 fieri necesse est. c. 3. l. 7. meth. Galenus c. 8. l. 2. de fac. natural.
 ait, intemperiem non esse morbum, sed causam primorum
 morborum: crasis enim est præcipuum organum facultatis
 naturalis, in primis corporibus, id est, in partibus similaribus:
 quæ si vitiosa reddatur, & in intemperiem mutetur, oritur
 læsio facultatis partium similarium, cuius læsionis causa con-
 tentiva est intemperies: nam actio læsa, immediate pendet à
 læsione facultatis, & hæc proxime pendet ab intemperie
 morbosa. Porro causa hæc alterans multiplex est, secundum
 speciem, secundum Vitium, & secundum Causam genera-
 tem. Quoad speciem: causa alterans est Interna, vel Exter-
 na. Interna est Contingens, vel Contentum. Contingens est
 membrum vicinum ventriculo: vt omentum, hepar, lien: si
 enim vi lienis ita refrigeretur hepar, vt oboriatur hydrops:
 mirum esse non debet, si etiam à membris vicinis ventri-
 culus possit alterari. Contentum potest esse quilibet Hu-
 mor, & Flatus, c. 11. l. 7. meth. Externa causa occurrit Ne-
 cessario, vel Non necessario. Necesario: vt sex res non na-
 turales, potissimum cibus & potus, quæ integris facultati-
 bus in ventriculum agunt. Non necessario occurrunt medi-
 camenta Assumpta & Applicata. Quoad vitia specierum: li-
 cet varia sint, necessario tamen in proposito morbo attinent
 ad qualitatem primam. Materia enim morbifica ventricu-
 lum reddit intemperatum, quatenus vim habet calefacien-
 di, refrigerandi, humectandi, siccandi, vel coniunctim hæc fa-
 ciendi. c. 11. l. 7. meth. Horum autem vitiorum discrimen de-
 pendet tum è vario vitio humorum, tum è diuersitate ip-
 sius ventriculi, id est, è varia dispositione ventriculi. Declaro:
 E vitio materiæ: nam si, verbi gratia, humor sit pituita, pi-
 tuita est frigida & humida: quod si tamen fiat, vt pituita
 plurimum excedat per frigidum, parum per humidum: erit
 in causa frigida intemperiei, non humida: at si vehementer
 excedat, & secundum frigiditatem, & secundum humidita-
 tem: causa erit dyscrasie compositæ, nimirum, frigida & hu-
 mida. Quoad dispositionem ventriculi, hæc quoque concur-
 rit: nam si ventriculus sit calidus & humidus secundum na-
 turam: vi pituitæ frigida & humida, fieri potest sola intem-
 peries humida: in habentibus enim symbolū facilis est tran-
 situs: vnde cum ventriculi tunicæ obtineant exigam calidi-
 tatem,

*Species.**Vitia.*

*Causa gene-
rans.*

tatem, & assiduo in venterculo generetur succus pituitosus, fieri potest vt ventriculus facilius & frequentius corripatur intemperie frigida & humida. Causa generans, perpendenda est potiss. ratione contenti, id est humoris, siue materiz. Contentum generatur in ventriculo, vel Extra ventriculum: nam pituita non tantum in ventriculo generatur, sed etiam in capite, e quo destillare potest in ventriculum. Sed præterea generatur humor in iecore. Cignitur humor, vel laxa facultate, vel ob errorē externū. Sed de humorū generatione alias.

*Calida dys-
crasia cau-
sa.*

Iam proponemus causas magis speciales, intemperiei Calidæ, Frigidæ, Siccæ, Humidæ. Quantum ad causas intemperiei calidæ: secundum Gal. cap. 2. l. de caus. morb. hæ sunt vel Internæ, vt materia biliosa, materia putrida, materia sanguinea: vel Externæ, vt calidi cibi, potio calida, medicamenta ca-

*Frigida in-
temperiei
causa.*

lida, & exhibita, & applicata. Quoad causas intemperiei frigidæ: secundum c. 3. l. de caus. morb. interna causa potest esse Cōtinens, & Contentū. Continens concutrit, vel Immediate, per Medium: Immediate, vt pars vicina frigida reddita, nimirum iecur, lien, omentum, diaphragma, abdominis muscoli: additur etiam ventriculi siccitas, cap. 7. lib. 7. meth. quia dum siccitas perdurat, succedit frigiditas: nam deficiente nutrimento, quod sit e succo calido, rationabile est partem reddi frigidam. Causa continens, mediate concurrens, est hepar, non vt frigidum, sed vt calidum: quia, vt calidum, consumit pinguedinem, & potissimum omenti, vt hinc ventriculus refrigeretur. Causa interna, vt habet rationem contenti, est materia melancholica, materia pituitosa, materia flatulenta: nam hæ materiz sua frigiditate, reddere possunt ventriculum frigidum. Externa causa esse potest, frigidus cibus, frigidus potus, frigida medicamenta, & potissimum solent esse opiata admodum frigida. Quoad intemperiem sic-

*Sicca in-
temperiei
causa.*

cam, vt huius causæ intelligantur, oportet scire, quot humiditates pertineant ad partem viuentem, non enim oritur intemperies sicca, nisi humiditas absumatur. Sciendum ergo e cap. 5. & 6. l. 7. meth. c. 11. l. 10. meth. in parte viuente quinque esse humiditates: prima continetur in venis & arteriis exilibus partis viuentis: & hæc humiditas est sanguis veluti dealbatus, qui dum vasa egreditur, mutatur in alias humiditates: Reliquæ autem humiditates extra vasa continentur: quarum vna est elementalıs, tres autem sunt vitæ seu animæ. Elementalıs humiditas est causa, vt mistum vnitatem seruet: hæc enim

enim humiditate deficiente, mistum in cinerem dissoluitur. Tres reliquæ humiditates sunt, quarum ope partes vitæ fruuntur: quod præstandum, concurrunt vel mediate, vel immediate. Mediate concurrit humiditas, quæ continetur extra vasa, in animalis partibus, ad similitudinem roris dispersa: vnde humiditas torrida dicitur: hæc generatur ex humiditate vascula egrediente: & in alias mutatur humiditates, ope quarum partes immediate vitæ fruuntur. Humiditas autem quæ immediate vitam respicit, est duplex: quia & partes viuentes sunt duplices, aliæ sanguineæ, vt partes carnosæ & pingues: aliæ spermaticæ, vt partes nervosæ, fibrosæ, membranæ, &c. sic etiam altera humiditas est Sanguinea, altera Seminalis: vtræque conseruatur ope humiditatis roridæ: & quidem e portione puriore, humiditas seminalis. Et quoniam hæc humiditates potissimum pertinent ad substantiam calidi insiti partium sanguinearum & spermaticarum, propterea diximus eas vitam immediate seruari. Quamuis igitur quælibet pars viuens quinque obtineat humiditates: nihilominus intemperies sicca tantum est triplex: nimirum, dum absorbitur humiditas rorida, sanguinea, seminalis. Elementarius enim permanet etiam post mortem: quoniam sola putredine, vel combustionem dissipatur. Humiditas etiam vasorum exilium excluditur: nam vascula non sunt de essentia partis, sed sunt organa communia: vnde hanc humiditatem ab aliis diuersam esse, Galenus scripsit, cap. 6. lib. 7. meth. Siccus ergo est morbus, si absorbitur humiditas rorida: siccior, si sanguinea: ad summum siccus, si seminalis. Huc Galenus respiciens, cap. 11. lib. 10. meth. inquit: causam siccantem primum agere in roridam humiditatem, secundo in sanguineam, tertio in seminalem. Porro iam explicanda est causa consumens has humiditates. Dicimus ergo cum Galeno cap. 4. lib. de morbis caus. & cap. 6. lib. 7. metho, morbum siccum oboriri, dum sanguis deficit: vnde causa absorbens sanguinem, est causa siccans. Hæc causa est Interna, vel Externa. Interna, est Continens & Contentum. Continens, verbi gratia hepar, dum calore suo immodico sanguinem consumit. Contentum, verbi gratia materia biliola, materia melancholica, dum vi siccitatis, & bilis etiam vi caliditatis, dissoluunt humiditatem, sicut melancholia frigore suo eandem potest exprimere: melancholia item exusta, calida instar bilis, calore humiditatem dissipat. Causa externa est diæta sic-

*Humida
intemperie
causa.*

cans: vt cibi conditi aromatibus, cibi saliti, agræmina, (id est, æpæ, porrum, &c.) vinum generosum antiquum, paucitas cibi & potus. Huius classis est euacuatio, præsertim per vomitum. Adhæc, motus corporis & animi immoderatus. Item, medicamenta purgantia, aquæ thermæles: denique omnia medicamenta calefacientia & exsiccantia. Quoad intemperiem humidam: primum scire oportet, quot modis morbus humidus oboriatur. Fit ergo morbus humidus, ob humiditatum exsuperantiam: sicut ob harum penuriam, siccitas. Exsuperantia alia est secundum Quantitatem, alia secundum Qualitatem. Secundum quantitatem, dum humiditatis substantia augetur secundum copiam. Secundum qualitatem, dum humiditatis substantia humidior redditur. Vnde, si contingat alimentalem humiditatem deficere secundum copiam, & excedere secundum humiditatem: patiens erit affectus morbo & sicco, & humido: sicco, vt humiditas deficit: humido, vt humiditas qualitate humidior afficitur: & sic idem membrum, secundum eandem partem & eodem tempore, corripi potest morbo & sicco, & humido: Nec tamen eodem tempore assunt contraria: nam, cum morbus siccus fiat è penuria alimenti, huic opponitur copia: at morbus humidus, sit à materia humidior, vnde penurix opponitur abundantia, non humiditas: ideoque, si morbus humidus fiat à copia alimenti, hic non potest coniungi cum morbo sicco: quia copix opponitur inopia & penuria. Ex his patet, humidum esse morbum, dum & humiditatis substantia redditur copiosa, & dum redditur humidior. Causa humiditatis copiosioris, è cap. 5. lib. de caus. morb. est sanguis, copia peccans. Causæ sanguinis copiosioris mediatæ sunt, à quibus sanguis potest multiplicari. Causa porro, quæ substantiam humiditatis reddit humidior, vel èst Interna, vt pituita humidior, sanguis humidior, qui præsertim in hydropse hypofarca vigere solet: vel Externa, vt cibi humidiores, fructus, potus aquæ, medicamenta humectantia. Hæc de causis dyscrasix simplicis: è quibus etiã cõpositæ possunt intelligi.

De Differentiis.

*Differen-
tia à for-
ma.*

Iam de differentiis agemus. Forma intemperiei est, quod lædat operationem: vnde perpendi debet, Vis lædendi, & Terminus, ad quem nisi perueniat intemperies, non læditur actio. Formales ergo differentix sumi debent, & à vi seu

facul

facultate, & à termino. Facultas sumitur, vel vt Agit, & agendo est in causa, vt læsa facultate lædatur actio: vel vt Imprimatur vis, in parte similari. Si primo modo vis capiatur tunc, si vis est simplex, etiam intemperies est Simplex: si composita, Composita. Simplex intemperies, est Calida, Frigida, Humida, vel Sicca, Composita intemperies, perpenditur secundum vires Diuersas, aut Contrarias. Si secundum diuersas: est intemperies, vel calida & humida, vel calida & sicca: vel frigida & humida, vel frigida & sicca. Si perpendatur secundum vires contrarias: tunc intemperies est vel calida & frigida, vel humida & sicca. Notandum autem est, primum de intemperie calida & frigida, quod sit inæqualis, cum non omnes particule in hac intemperie æqualiter afficiantur, è cap. 1. lib. de inæquali intemperie: sæpe enim ventriculus, verbi gratia secundum os superius afficitur intemperie calida, ob vapores biliosos: at secundum fundum, frigida, ob pituitam: vnde intemperies hæc composita, frigida & calida, ad diuersas pertinet instrumenti partes. Secundo notandum circa intemperiem compositam, humidam & siccam: eam attine re posse ad eandem particulam eiusdem instrumenti, quoniam non producit à contrariis causis, cum morbus siccus fiat ob penuriam humiditatum: humidus autem ob præsentiam agentis qualitate humida. Hæc, si facultas sumitur, vt Agit. Si vero sumatur, vt vis intemperiei Imprimatur in parte similari: patet cum Galeno ca. 5. lib. de caus. morb. partes alterari, vel solis qualitatibus, vel affluente materia: vnde intemperies dicitur, vel Cum materia, vel Sine materia. Si sumantur differentie à termino intemperiei: hic terminus est vel Absolutus, vel Respectiuus. Si sit absolutus: intemperies est vel in Habitudine, vel in Habitu. Quæ est in habitudine, potest esse inæqualis: quæ in habitu, æqualis. Si terminus sit respectiuus: perpenditur, quatenus refertur ad terminum temperamenti naturalis: vnde dyscrasia à naturali crasi recedit, vel per Vnum, vel per Plures gradus. Sed ambigitur hoc loco, de diuisione dyscrasie in materiale & immateriale. Hæ enim differentie quibusdam videntur essentielles. è cap. 5. lib. de diff. morb. in quo Gal. tradit morborum differentias essentielles. Aliis autem hæ differentie non videntur essentielles: nam Gal. c. vlt. l. 3. meth. iubet, non esse sumendas differentias ab his, quæ per se consistere possunt: quia sunt potius affectus compositi, vt vlcus

2.

*Contra M^o
charl^o Ga-
nassetium,
cap. 10. lib.
de rebus
præternat.*

cum inflammatione: vnde non essent differentie vlcere essentialia, aliud esse cum inflammatione, aliud sine inflammatione. Eodem modo & intemperies, & materia, seorsim consistere posse videntur, verbi gratia si sit frigida intemperies, cum materia pituitosa, fieri potest, vt remoueatur materia pituitosa, & remaneat intemperies. R&pondeamus: differentias prædictas esse essentielles, pertinentes ad morbum partium similarium: nam in parte similaria, à Gal. cap. 3. lib. de morb. diff. duæ constituuntur differentie morborum: quatenus scilicet pars afficitur intemperie vel cum materia, vel sine materia: vbi Gale. è proposito loquitur de differentiis essentialibus. Sic etiam cap. 12. l. eiusdem loquens Gale. de compositis morbis partium similarium, proponit 4. dyscrasias compositas sine materia, & totidem cum materia. Quod si pars similis afficiatur intemperie, cum tumore, asitq; pituita, sic tamen vt pars corripiatur intemperie, non ratione pituitæ, sed sine materia: præterea si alia sit intemperies, cum materia, siue tumore, ita tamen, vt non producat huius ratione morbus (potest enim magnitudo quædam esse non morbosa, cap. 12. l. de diff. morb.) certe maximum erit discrimen, inter dyscrasiam hanc cum materia, & illam sine materia. Sed obiectionibus etiam propositis satisfaciemus. Sciendum igitur, materiam fluentem dupliciter posse accipi: primo modo, vt materiæ qualitas alia est ab intemperie: verbi gratia si intemperies sit frigida & humida, materia autem calida & sicca: & hoc modo materia non est de essentia intemperiei. Secundo modo accipi potest materia, vt est eiusdem qualitatis cum intemperie, verbi gratia dyscrasia frigida & humida, cum pituita frigida & humida: & hoc modo materia potest esse de essentia dyscrasie. Notandum autem hoc loco est, quomodo materia sit de essentia intemperiei: maxime, cum morbus sit accidens, materia autem substantia: non scilicet quod sit forma, quia morbi forma est accidens: sed quod gerat vicem formæ, quatenus est causa contentiua ex usu. Licet autem hæc materia sit causa contentiua ex usu: non tamen ea posita, vel remota, ponitur etiam vel remouetur intemperies: potest enim pituita in dyscrasia cum materia remoueri, manente intemperie frigida & humida. Sed materia dicitur causa contentiua, quatenus concurrat ad constitutionem speciei morbi: ad similitudinem sanguinis in inflammatione, & bilis in febre biliola: nam, vt absente sanguine, inflam

inflammationis species desideratur: & non præsente materia biliosa, species biliosæ febris non adest, sic non præsente materia, aboletur species intemperiei cum materia: Et proinde materia in coniungitur cum intemperie, ut utrumque per se consistere nequeat. Recte ergo à nobis statutum est, citatam differentiam essentialem esse: ut species hæc, nimirum intemperies cum materia, distinguatur ab alia specie, nimirum ab intemperie sine materia. Quoad differentias ratione subiecti: & primum quoad intemperiem sine materia: dicendum, ventriculum affici, vel secundum Totum, vel secundum Partem. Si secundum partem, vel Supernam, vel Infernam. Causa autem materiei dicendum, ventriculum lædi à materia, ut residet vel in Cavitate, vel in Tunicis ventriculi. Quoad differentias ratione causæ efficientis: è superioribus facile colligi potest, quoad speciem, causam esse Internam, vel Externam: quoad Internam, habere rationem, vel Continentis, vel Contenti: quoad Externam, occurrere vel Necessario, vel Non necessario. Quoad vitium: positum est in qualitate Simplici, vel Composita. Quoad causam generantem, præsertim attinentem ad contentum: dicendum, quod hoc generetur vel In ventriculo, vel Extra: & hoc vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum.

De Signis.

Nunc ut cognosci debeat intemperies, tradendum. Intemperies igitur in genere, ut est intemperies ventriculi: cognoscitur cum Auicenna, si concoctio non sit bona: nec tamen in ventriculo fuerit tumor, vel vlcus, neq; corruptio in cibo: tunc enim dyscrasia ventriculum esse correptum, iudicare oportet. Vnde Gal. ait, ventriculum esse intemperatum, si male concoquit, cap. ult. lib. 2. de temper. Quoad signa differentiarum, & primo earum quæ sumuntur à forma: quatenus. 1. intemperies est Simplex, vel Composita. 2. ut est sine, vel cum materia. 3. ut est in habitudine, vel habitu. 4. ut est vel in primo gradu, vel in alio. Num sit dyscrasia simplex, vel composita: cognoscitur è signis simplicibus, vel compositis: verbi gratia cum Galeno cap. 8. lib. 7. metho. si noceant tantum calida, indicatur intemperies calida tantum: si etiam austera noceant, indicatur etiam sicca intemperies. Sufficiet ergo proponere signa dyscrasiæ simplicis. Igitur quoad Calidam intemperiem: cum Auicenna cognoscitur ex effectu, & causa. Ab effectu, ut producit ab agente

Differentia à subiecto.

Differentia ab efficiente.

Signa intemperiei in genere.

Signa differentiarum à forma.

Signa calida intemperiei.

interno, vel externo. Ab interno: & primum indicatur ab actione, hoc est, è siti, è fame imminuta, è sensu caliditatis, è prava cibi concoctione, nisi prorsus deiiciatur virtus. Notandum coctionem pravam non esse signum propria ratione, sed virtute exeuntium: vt prava coctio secundum hanc rationem sit signatum, exiens autem signum. Dum ergo prava sit coctio, exeuntia sunt signa intemperiei calida, si egrediatur ructus nidorulentus, cap. 1. libr. 3. de caus. sympt. si salua lutoſa, id est, lenta & viscida, nam calore absumuntur partes, quæ sunt fluxiles, non viscidæ: præterea, si qualitas mutata, id est, si caliditas ad tactum appareat, circa ventriculi regionem: item, si assit extuberantia venarum, nam sanguis in venis abundat, quia cum prauus generatur, ob intemperiem calidiorẽ, natura ab eo abhorrens ipsum non attrahit. Indicatur etiam calida intemperies, ab effectu agentis externi, dum scilicet frigida iuuant, calida nocent. Indicatur etiam à causa: vt prægressa est causa calefaciens, verbi gratia ex assumptis aromatibus, & similibus.

Frigida signa.

Frigida intemperies è contrariis indicatur: nimirum è siti imminuta, è fame intensa, è sensu frigiditatis, è coctione vel ablata, vel imminuta, vel corrupta: quomodo autem cognoscatur læsa coctio, dicemus in sermone de læsa coctione ventriculi: corrupta à frigida dyscrasia coctio, sè cap. 1. libr. 3. de caus. sympt. indicatur è ructu acido, non nidorulento, præsertim, si cibi ingerantur, vel frigidi, vel temperati: indicatur etiam è tepore ad tactum: item, ex alteratione noxia frigiditum: re prægressa causa refrigerante.

Sicca signa.

Intemperies sicca; indicatur è siti, è fame cibi liquidi & elixi, non allati: dyscrasia enim morboſa differt à non morboſa, quod hæc similia, illa contraria appetat: cap. 63. art. med. Indicatur etiã è sensu tensionis, quem ægrotantes referent: indicabitur è coctione imminuta: vbi enim siccitas sibi deficit calidum innatum: indicabitur è magnitudine abdominis imminuta: ex alteratione siccantium moleſta, & alteratione humectantium iucunda: tandem è prægressa causa exsiccante.

Humida si

Humida intemperies cognoscitur è siti imminuta, è fame exigua, & è fame cibi siccioris, siue alſi. Sed si excessus sit in humiditate secundum quantitatem: (morbus enim humidus duplex à nobis supra est propositus) indicatur ex appetentia imminuta, sed citra nauleam: Signa vix aderunt coctionis

lætitie: quia est excessus secundum quantitatem: indicabitur etiam à magnitudine abdominis aucta, sed citra tumorem: indicabitur ex alteratione molesta cibi copiosi, quia morbus pendet à copia: indicabitur ex utilitate pauci cibi: & è præcedenti victu copioso. Si in morbo humido excessus sit secundum qualitatem: indicabitur è nausea, è saliva copiosa, è mollitie abdominis, è carnis magnitudine immutata: præterea ex alteratione noxia humectantium, & prægressis causis humectantibus.

Hæc de signis intemperiei simplicis: & proinde etiâ cõposite.

Secundo loco cognoscendum est: num sit intemperies Cum materia, vel Sine materia. Dyscrasia sine materia est iudicanda secundum Auicennam, si desiderentur signa materię morbificę: cum materia, si absint. De signis autem indicantibus materias, mox suo loco agemus.

Tertio cognoscere oportet, num intemperies sit in habitu, vel habitudine. Intemperies in habitu cognoscitur, si symptomata sint vniformia, si alteratio vix sit sensibilis. Intemperies autem in habitudine, cognoscitur è symptomatibus quæ modo intenduntur, modo remittuntur: non enim sunt vniformia, & patiens dum iuuatur, euidenter iuuamentum perferunt.

Quarto oportet cognoscere, nũ intemperies sit in primo gradu, vel in aliis gradibus. Si ergo symptomata sint remissiora, indicant malũ esse in primo gradu: si intensiora, in aliis gradibus, verbi gratia è siti aliqua è parte aucta, indicatur dyscrasia calida in primo gradu, ex intensiori autem siti, indicabitur intemperies calida intensior, in secundo gradu, &c.

Quoad differentias à subiecto: primum, an intemperies lædat ventriculi partem supernam, vel infernam: cognoscitur è symptomatibus determinatis, verbi gratia è læsa appetentia, indicatur intemperies in parte superna, vt etiam è singultu: contra è symptomatibus attinentibus ad læsam cõtionem, indicatur dyscrasia secundum partem infernã. Et quia intemperies quandoque est coniuncta cum materia: an materia lædat ventriculum, vel secundum cavitatem, vel secundum tunicas, ita cognoscetur: si enim lædatur secundum cavitatem, indicabitur è fluctuatione, è nausea, ad quam sequitur vel vomitus, vel alui deiectio. Si materia lædat secundum tunicas: indicabitur è nausea, sed cui non succedat vomitus: & præterea indicari potest è singultu.

Num intemperies sit Cũ, an Sine materia.

Num intemperies sit in habitu, vel habitudine.

Signa graduum intemperiei.

Signa differentiarũ à subiecto.

*Signa differentiarum
à causa efficiente.*

Quoad differentias ratione causæ efficiētis: sufficit versari circa cognitionem speciei unam cæterorum cognita pertinet potius ad propria capita. Igitur quoad speciem: an sit causa interna, vel externa: cognoscitur è relatione ægrorum & assidentium. Interna potest esse Continens, vel Contentum. Quoad continens: an sit iecur, lien, omētum, diaphragma, musculari abdominis: cognoscetur è propriis capitibus. Si causa interna sit contentum: est vel sanguis, vel bilis, vel melancolia, vel pituita, vel vapor. Sanguis indicatur è præcedente appetētia, quæ mox est imminuta: præterea à sputo dulci, è vomitu sanguinis, è mixta caliditate, e magnitudine abdominis, è venis sanguine repletis, è tolerantia vacuationis sanguinis, è causis aptis ad generationē sanguinis, vt sunt temperatura calida & humida, ætas adulescentiæ: præterea indicatur è victu sanguineo, id est, ex aere verno, è cibis boni & copiosi succi, è simili potu, è somno, è vacuatione sanguinis suppressa, è quiete & animi & corporis non admodum excedente. Bilis indicatur è siti, è sputo amaro, è vomitu bilioso, & reliquis excretionibus biliosis: præterea è mordaci caliditate, ilico erumpente, ex abdominis gracilitate, è tolerantia vacuationis bilis, & è causis bilis, vt sunt, calidum & siccum iecur, iuuentus, parentes biliosi: indicatur etiam è vacuatione biliosa cohibita, & præterea è motu immoderato corporis & animi, & proinde ex ira. Melancholia indicatur è fante intēsa, è sputo acido, & reliquis excretionibus melancholicis, & proinde nigricantibus: indicatur etiam è frigidityte secundum abdomen, è gracilitate, è tolerantia vacuationis melancholiæ: è prægressis melancholiæ causis, ex iisdem quoque præsentibus, vt iecur calidum & siccum, quod causa est generationis: nam vt detineatur melancholia, in causa est obstructio & tumor lienis: indicatur etiam ex ætate consistente, ex aere autumnali, è cibis melancholicis, è vīno nigro crasso, è vigiliis, e vacuatione melancholiæ intermissa, è mœrore & timore. Pituita indicatur è siti imminuta, nisi salsa sit pituita: indicatur præterea ex inappetentiæ sputo pituitoso, & reliquis & excretionibus pituitæ: itē ex abdominis tepore & mollitie, è tolerantia vacuationis pituitæ: è causis, vt temperatura frigida ventriculi, temperatura frigida cerebri: itē è senio, e parentibus pituitosis, ex aere frigido & humido, è cibis pituitosis, è simili potu, è somno, ex impedita, seu intermissa pituitæ euacuatione: ex im-

*Sanguinis
signa.*

Signa bilis.

*Melancholia
signa.*

*Pituita
signa.*

modica

modis quiete corporis & animi. Flatus, seu vapor indicatur *Flatus si-*
 è sensu, tensionis citra gravitatem, è dolore errante, è fla- *gna.*
 ribus erumpentibus, ex abdominis tepore, magnitudine, du-
 ritie, sed non permanente, nam flatus erumpit; præterea ex
 vili flatuum eruptione, ex aere frigido, è cibis flatulentis, è
 potu flatulento, è flatuum eruptione cohibita.

De Præsidis, seu Indicationibus.

- His cognitis, ad præsidia accedendum: quæ sumuntur ab *Indicatio-*
 essentia illius, in quod diriguntur præsidia. Essentia autem *nes.*
 huius mali in eo consistit, quod sit morbus partium simi-
 larium ventriculi, productus à causa alterante. Præsidia er-
 go desumenda erunt, ab intemperie morbosa, à partibus si-
 milaribus ventriculi, & à causa alterante. Morbus, seu for- *A forma,*
 ma huius affectus, nimirum intemperies: indicat alterans per *seu intem-*
 contrarium, capite 1. libro 8. & τὸ π. capite 4. libro 2. method. *perie.*
 cap. 3. lib. 7. method. At contrahitur morbus per differentias.
 Differentiæ primum sumuntur à forma: & quidem vel à po-
 tentia, vel à termino dyscrasie. Si à potentia: vel ut Agit, *x.*
 vel ut Imprimitur. Quatenus agit intemperies: si simplex sit,
 indicat alterans contrarium simplex: si composita, compositum.
 Notandum circa siccam intemperiem, è cap. 6. libr. 7.
 meth. siccitatem curari, si meatus contracti dilatentur: ac
 quod in vicinas particulas est compulsum, retrahatur: & si-
 milaris partis propria humiditas, nutrimento humectante
 refarciatur. Hæc verba dupliciter possunt intelligi: primo,
 ut hæc sint indicata: ut scilicet meatus contractus, indicet
 remedium dilatans: ut humiditas alimentalis, compulsa in
 vicinas particulas, indicet retrahens: ut alimentum simi-
 laris particulæ deficiens, indicet reparans alimentum. Hæc
 expositio mihi non satisfacit: tum quia per numerum tot
 indicationum prolixior redditur methodus medendi: tum
 potissimum quoniam remedia & dilatantia & retrahentia,
 non sunt remedia specifica, contenta sub generico hume-
 ctante: qui enim veram profitentur methodum, oportet ut
 progrediantur à generico ad specificum: ita ut specificum
 contineatur sub generico: Secundo ergo modo explicandus
 mihi videtur Galenus: nempe à morbo sicco indicari hume-
 ctans: modos autem humectationis pertinere non ad metho-
 dum medendi, sed ad materias: quæ plures esse possunt:
 cum aliæ materia: partem exsiccata[m] humectent dilatando,

2. alia retrahendo, alia replendo. Sumitur etiam indicatio ab intemperie, quatenus imprimitur in parte similari. Et tunc intemperies, vel est Sine materia, vel Cum materia. Si sine materia: indicatur solum alterans per contrarium. Si cum materia, indicatur remedium per contrarium alterans, sed coniunctum cum remedio remouente materiam: ut remedium genericum sit per contrarium alterans: sub quo continetur duplex remedium minus genericum, videlicet, vel solum alterans, vel simul remouens materiam. Remedium solum alterans, non admittit subdiuisionem. Circa remedium alterans simul & remouens materiam, duo sunt notanda: primum, hoc esse indicatum curatorum: quia etiam remedium genericum est curatorium: cum sumatur à materia, à qua constituitur species intemperiei cum materia. Secundo notandum, varium esse hoc remedium, & pro varia specie; & pro vario vitio materiæ. Si enim verbi gratia intemperies sit frigida, cum materia pituitosa: indicat remedium calefaciens, coniunctum cum remedio remouente materiā pituitosam. Ita pro varietate vitij materiæ, indicatur alterans, coniunctum cum remedio, verbi gratia pituitam copiosam vacuante, frigidam calefaciente, viscidam detergente, &c. Si differentiæ sumantur à termino; & primum à termino absoluto: dyscrasia est vel in habitu, vel in habitudine. Si in habitudine, indicat remedium per contrarium alterans, breuiori tempore. Si in habitu: indicat remedium per contrarium alterans, longiori tempore, cum in diuturniore morbo efficacior facta sit alteratio. Verbi gratia, si dyscrasia sit frigida in primo gradu, sed in habitudine: indicat calidum in primo; sed breuiori tempore calefaciens. Si differentiæ sumantur à termino respectiuo: intemperies est in gradu primo, vel in aliis gradibus: & proinde iudicatur alterans per contrarium, in primo, vel in aliis gradibus.

*Indic. à
subiecto.*

Quoad indicationes à subiecto: præsidia sumi debent à partibus similibus ventriculi. Et hæc præsidia sunt vitalia, quia diriguntur ad custodiam vitæ ventriculi. Cum autem ventriculi vita, sit operatio animæ ventriculi: & facultas animæ ita contrahatur, ut euadat *χλωρὴν*, id est, mutatrix cibi in chylum: & hæc facultas contrahatur beneficio proportionis partium similium ventriculi: tandemque hæc facultas contracta agat, mediantibus instrumentis, nempe

confu

Constitutione & calido innato: ideo præsidia sunt desumenda, à proportionē, à constitutione, & à calido insito. Proportio ventriculi, quia recondita est, non indicat, sed requirit remedium simili proportionē donatum, quod stomachicum vocari potest. Constitutio, est crasis, compositio, & vnitas. Crasis indicat similia, in omni vicio ventriculi: nisi intemperies sit morbosa, de qua nunc loquimur: tunc enim non sumitur indicatio, quia crasis non adest: omnis autem indicatio sumitur à præsentī. A compositione & vnitatē, in intemperie non sumuntur indicationes: si enim partis viuētis seruetur quantitas & qualitas: seruetur etiam compositio & vnitas. Calidum insitum, indicat præsidium, quod seruet substantiā & qualitatem calidi insiti: vnde indicat præsidium, tum alimentale, ratione substantiæ: tum moderatē calidū ratione qualitatis conseruandæ. Hæc de præsidiis, quæ sumuntur à parte, nimirum à ventriculo. Non fecimus mentionē astringentiū, & eorū quæ sensum ventriculi exquisitum obrundunt. Nam quantum ad astringentia, hæc nū indicantur à ventriculo: licet enim Gal. in morbis partiū principū, dū indicatio est laxandi & digirendi, misceat astringentia: hæc tamen non pertinent ad methodum medendi, sed ad methodum componendi: laxantia enim medicamenta, quæ indicantur à materia euacuanda, quoniam dissipant calidum insitum, ideo astringentibus sunt corrigenda. Proinde astringens est indicatum non à ventriculo, sed à medicamento relaxante. Quoad ea, quæ obrundunt sensum exquisitum: id quod indicat, & prohibet, non est sensus exquisitus, sed calidum insitum, cuius substantia dissipatur violentia doloris, maxime si pars sit sensus exquisiti. Sicut ergo calidum insitum, indicat suæ substantiæ conseruationem, ita etiam prohibet omnia, quæ eandem substantiam possunt dissipare, vt sunt medicamenta strenue detergentia, & medicamenta dolorifica. Quod autem hæc possint calidum innatum dissoluere nos cognoscimus è sensu exquisito: qui signi, non indicantis habet rationem.

Causa efficiens multiplex est, secundum speciem, vitium, & causam generantem. Secundum speciem, causa est Externa, vel Interna. Ab externa nulla sumitur indicatio. Ab interna, sumitur indicatio determinata: verbi gratia, si malum fiat à vitio frigido: indicatur calidum. Sed si species sit pituita: indicatur remedium calefaciens pituitam: & sic de cæteris. Quoad vitium: hoc in malo præsentī potissimum pertinet

I.

II.

III.

Astringentia, à quo indicantur.

Obtundentia vlt. & modici.

Indicatio à causa eff.

pertinet ad primam qualitatem: vt si, verbi gratia causa alterans sit refrigerans, oriatur indicatio calefaciendi. Cæterum, si vitium, & præsertim ratione contenti, annexum est, cum alio vitio: alia etiam prodeunt præsidia: Vnde, si, v. g. materia putrescat, est eradicanda: si copiosa, minuenda: si crassa, attenuanda: si tenuis, crassesciendi: si viscida, detergenda: si præter naturam moueatur, retrahenda. Notandum circa peccatum in quiete: Si seruanda esset contrarietas, quies indicaret præsidium mouens. At mea sententia, vitium in quiete non est indicans ex visu: tum, quod quies est motus priuatio: tum quod quies pendet è materiæ copia, frigiditate, crassitie, & visciditate, quæ vitia in causa sunt materiæ quiescentis, vt impediatur expultrix, quo minus materiam expellere, & hinc mouere valeat. Vtiles ergo indicationes sumuntur è copia, frigiditate, crassitie, & visciditate: non autem è quiete. Tandem ratione causæ generantis, perpendenda est causa contenti: nam pro varia causa, varij sunt scopi hauriendi: v. g. si bilis generetur ab hepate calidiore, hepar refrigerandum est: & sic de reliquis.

De Prasagijs.

Prognostica in genere.

VENTRICULI intemperies in genere, malum est non exigui momenti: nam omnis vehementia dignitatis adest. Dignitatis autem vehementia est duplex: vna ratione præcipui organi facultatis operantis: altera, ratione loci, in quo celebratur functio. Vtraque est in ventriculi discrasia. Nam vehementiam ratione organi proponit Gal. c. 12. l. 7. meth. dum asserit, morbum in intemperie esse digniorem, quoniam & materiæ dignitas est alia à temperie, & temperies est dignior alijs instrumentis, nimirum, compositione & vnitatem. Vehementiam ratione loci tangit Gal. c. vlt. l. 7. meth. dum dicit, ventriculi opus omnibus particulis esse pernecessarium, ad portionem iecoris.

A forma. Intemperies simpliciter.

Discrimen tamen pendet à vi differentiarum, ratione Formæ, & ratione Causæ efficientis. Forma est simplex, vel composita: sine materia, vel cum materia: in habitu, vel habitudine: in hoc vel in illo gradu: respicitque ventriculum: ratione vel loci, vel proportionis. Primum, si capiatur vt Simplex: est Calida, frigida, humida, vel sicca. Gal. c. 5. l. 7. meth. confert dyserasias: primum actiuas cum passiuas: deinde actiuas inuicem: tertio passiuas inuicem. Sumit autem hoc

in

in loco Galenus prognosticum à vehemētia essentia intemperiei, ratione resistentia, quatenus cōtraria est, non virtuti, sed materiae praesidiorum (omne enim vitium opponitur inimico suo, nimirum virtuti, & materiae praesidiorum) unde hoc in loco dyscrasia vehemens statuitur, quae vehementer opponitur materiae praesidiorum, & huic vehementer resistit: minus autem vehemens dyscrasia, quae facilius cedit medicamentis. Primū ergo Gal. cōfert actiuas cum passiuas: statuens, facilius & breuiori tēpore curari actiuas, longiori passiuas: morbi. n. calidi & frigidi, corriguntur qualitatibus quae maximae sunt actiuitatis: calida frigido: & contra morbi autem humidi & sicci, corriguntur à materia debili, & magis materiali, id est, exiguae actiuitatis. Proinde secundū vehemētiā essentiae, morbi calidi & frigidi sunt remissiores: humidi & sicci, intensiores, id est, vehemētiore. Secundo Gal. inuicem confert actiuas, intemperie, nimir. calidam & frigidam; quae conueniunt, quo nā pari quodāmodo tempore remouentur: quia vehementia, relata ad materias praesidiorum, par esse videtur cum medicamentum tam calidum, quā frigidum, sit insignis actiuitatis: vt ferme eodem tempore frigidum medicamentum corrigit morbum calidum: & medicamentum calidum, morbum frigidum. Addit autem Galen. *quodāmodo*, quia calor efficacior est ad agendū, quam frigus: non tamen multo est efficacior: maxime, quia membrū morbo frigido affectum densius euadit, nec ita admittit medicamentū calidum. Addit Galen. intemperiem calidam & frigidam discrepare in eo, quod tutius sit calefacere, quam refrigerare. Tertio Gal. inuicem confert passiuas, nim. dyscrasiam humidā & siccam: quae differunt, quod sicca longiori tempore vincitur & remouetur: humida breuiori: quia in morbo humido vehemētia essentiae, relata ad materias, est remissior: in morbo secco intensior: humidus quippe morbus refertur in materiā siccam, quae sola materia potest humiditatem consumere: ac morbus siccus opponitur materiae humectanti, quae ē c. 7. l. 7. meth. non sola humectare potest, sed necessariū est concurrere partē sicco morbo affectam, vt materiā humectantem alliciat, attrahat, apponat, agglutinet, & assimilet: quae functiones admodum aegre fiunt. Addit Gal. dyscrasiam humidā & siccam, in eo conuenire, quod aequae tutum est, humectare, & siccare. Ceterū, cum Gal. adiūgit: tutius esse occurrere calidis, quam frigidis: & aequae tutum esse morbum humidum, & morbum siccum

siccum vincere: notandum, hæc non pertinere ad artem prognosticā, sed ad materierum doctrinam, qua docemur medicamenta calida tutius agere in morbum frigidum, quam frigida agant in morbum calidum: vnde securitas in calefaciendo & refrigerando est impar: nisi enim corpora vicina parti læsæ valida sint, timor est ne à refrigerantibus lædantur quam noxam calidum medicamentum non infert. Præterea è doctrina materierum discimus, in vsu siccantium & humectantium medicamentorum, parem esse securitatem, quia utraque sunt exiguae actiuitatis: vt propterea mēbrum, parti læsæ vicinum non lædatur. Hinc, cum intemperies humida, vincatur à materia sicca, quæ sola agit ad differentiam humectantis: & citra periculum, ad differentiam frigidipropterea Galen. statuit c. 9. l. 7. meth. intemperiem humidam omnium facillime curari. Hæc de prognostico, ratione dyscrasie simplicis. Quoad dyscrasiam compositam: hæc ægrius curatur, quam simplex: nam in composita: vehementia essentie est intensior, quia malum est geminatum: magis enim possunt duo inimici, quam vnus. At si inuicem comparētur dyscrasie compositæ: omnium grauissima est frigida & sicca, & iccirco ad corrigendum difficilima, è c. 7. lib. 7. meth. quibus verbis Gal. respicit ad vehementiam essentie: collatam & ad vires, & ad materias: ad vires, dum ait, omnium esse grauissimam: nam vita & virtus in calido & humido consistunt, quibus morbus frigidus & siccus è diametro repugnat: respicit Galen. ad materias, dum addit, morbum frigidum & siccum ad corrigendum esse difficilimum: ratio patet: nam, cum opus sit materia tum calefaciente, tum humectante medicamentum vehementer calefaciens, etiam siccet, vt siccando noceat: medicamentum autem humectans, siccitatem non corrigit, nisi (vt audiistis) beneficio eius quod nutritur, id quod debile est, cum sit frigidum & siccum. Cæterum, si compositio in intemperiebus attineat ad qualitates contrarias: verbi gratia, dum adest morbus calidus & frigidus, humidus & siccus: viget vehementia essentie, relata ad vires & materias: ad vires, nam malum duplicatum est: ad materias, nam quæ materia corrigit vnā dyscrasiam, auget contrariam. Si consideremus intemperiem sine materia & Cum materia: difficilior curatur intemperies cum materia: nam duo sunt inimici. Quod si materia cum intemperie coniuncta similis sit, facilius curatur, & contra: c. 10. l. 6. de tuen. valiquod prognosticum pendet è

*Intemper.
composita.*

*Intemper.
cum & si-
ne mate-
ria.*

vehe

vehementia essentia, relatæ ad materias: nam si inuicē consentiant intemperies & materia, idem medicamentū vtrumque corrigit: secus, si dissentiant. v. g. si materia sit frigida in calido ventriculo. In hac autem discrepantia materia & dyscrasie, peius est succum frigidum esse in ventriculo calido: quam succum calidum in ventriculo frigido: nam medicamentum vacuans etiam calefacit, vt ventriculi frigiditatem corrigit, caliditatem augeat. Porro, intemperies in habitu, *Intemper.* difficilius est curationis, quam quæ in habitudine: sumpto *gradus, & inlex.* scilicet fundamento à vehementia essentia, relatæ non ad vires, sed ad materias: nam intemperies tam in habitu, quam in habitudine, potest esse calida in primo, in eadem parte, & potest esse causa leipothymia: vt vtriusque dyscrasie æqualis sit vehementia, & essentia, & dignitatis, & facultatis. Discrimen in eo est, quod morbus in habitu minus cedit medicamentis: & hæc est vehementia essentia relatæ ad materias. Si intemperies sit in hoc vel illo gradu: difficilius est curationis, quæ per plures gradus recessit: nam vehementia essentia ad vires relatæ, est intensior: vnde cum Galeno, loco citato, intemperies sicca in ultimo gradu est incurabilis: ad quem si nondum peruenerit, curari potest.

*Graduum
considera-
tio.*

Tandem, intemperies respicit ventriculum ratione loci, *Prognosti-* vel proportionis. Ratione situs, vel loci: ventriculus turbari *ca differē-* potest, secundum partem supernam vel infernam. Et qui- *tia a sub-* dem, malum magis est periculosum, si afficiat ventriculum *secto.* secundum partem supernam c. 6. l. 3. de loc. aff. Sed dubitatio oritur: nam ventriculus videtur obtinere vim digniorem & præstantiorem secundum partem infernam: quia præcipua ventriculi actio, nim. concoctio in fundo ventriculi perficitur? Statuendum igitur ventriculi dyscrasiam esse vehementiorem ratione dignitatis, in fundo ventriculi: at intemperiem partis superioris magis esse periculosam, propter vehementiam facultatis: nam ob *causam* oris ventriculi, facile cordis facultas collabitur, vt fiat syncope. Vnde obiter notandum, vehementiam dignitatis, superari à vehementia facultatis. Intenditur quoque periculum, dum os supernum afficitur, quatenus obtinet compositionem, secundum quam ipsius vitia cor in cōsensum trahunt, ratione situs vicinis & cerebrum quoque per nervos, vt augeatur dignitatis vehementia. Quoad intemperiem, vt respicit ventriculum, ratione proportionis: difficilis redditur curatio, si pro-
portio

portio ventriculi est imbecillissima: nam duplex est malum, verbi gratia, si quis habeat proportionem, ut non admittat vacuantia, quibus tamen opus est, propter intemperiem cum materia: sane difficilior redditur curatio. Hæc de prognostico differentiarum à Forma.

Prognostica differentiarum à causa efficiente.

Sequuntur prognostica differentiarum à causa efficiente. Quia vero prognosticum est sumendum à vehementia eorum, in quæ præsidiorum materię diriguntur: ob id capiendum est prognosticum à vehementia causarum efficientiũ: non omnium, sed præsentium & internarum. Causa interna est Continens, vel Contentum: à quorum vehementia petendum prognosticum. Quoad speciem igitur causę efficientis: dum cætera sunt paria, difficilius occurrere possumus continentibus quam contentis: nam continentia non possunt eradicari, quamvis periculum intendatur: contenta possunt eradicari, & promptius flatus. Notandum quod vehementia, quæ sumitur à specie causę efficientis, statui possit vehementia & dignitatis, & essentię: sed diuersa ratione: dignitatis quidem: si inuicem conferantur continentia & contenta: nam continentia sunt digniora: & inter contenta, humores sunt digniores, flatus ignobiliores. Hæc vehementia proponitur à Galeno c. 12. l. 7. meth. nam dum comparat succos vitiosos, & ventriculi intemperiem: dicit intemperiem esse vehementiorem dignitate, quia scilicet etiam temperies dignior est succis: quare & vitiosa continentia sunt digniora contentis: nam continentia vitę munia obeunt, & obtinent organum actionis præcipuum, nempe temperiem: humores autem non viuunt, ideo sunt ignobiliores: & licet ad actionem conferant: hoc tamen fit secundario, quatenus in ratione obiecti concurrunt. Flatus nec viuunt, nec habent rationem obiecti: ideo ignobiliores. Quod si inuicem conferamus Continentia & Contenta: continentia sunt digniora, & proinde in causâ difficilioris curationis, quo dignior functioni sunt destinata: quare maior dignitatis vehementia attinet ad iecur, minor ad lienem, adhuc minor ad omentum. Quoad contenta: maior est dignitas succi alimentalis, minor excrementitij, adhuc minor vaporis. Hæc de vehementia dignitatis ratione speciei. Additur vehementia essentię, quatenus refertur non ad vires, sed ad præsidiorum materias. Et hanc insinuauit Galenus c. 5. l. 7. meth. ut supra citauimus. Quoad prognosticum ratione vitij speciei: patet pro

pro varia vehementia vicij, vario modo esse prognosticandum: vt, si vehementi sit in summo, malum sit incurabile: verbi gratia, si frigidioris ventriculi causa sit omenti frigiditas in summo, & in habitu: malum est incurabile: & præsertim si hæc frigiditas attineat ad hepar. Idem statuendum est de causa generante, verbi gratia, si frigiditas ventriculi prodeat à pituita, quæ generatur à capite, affecto summa frigiditate, & in habitu: malum est incurabile: & sic de reliquis.

De materia Cheirurgica.

Quoad materias: & primum Cheirurgicas: suppositis fonticulis, & aliis, de quibus alias dictum, breuiter de venæ sectione loquemur. Itaque in ventriculi intemperie vena est secanda, dum sanguis est præsens, & vitio insigni affectus: in ratione causæ vel principalis, vel adiuuantis, vel sine qua nō: & dum virtus robusta permittit: secus nequaquam. Cum autem dyscrasia sit cum materia, vel sine materia: si sit sine materia, vena secari potest in intemperie calida, frigida, humidum non in sicca. Ratio est: Quantum enim ad calidam intemperiem, Auicennas cap. 18. inquit, stomachum igneum, posse esse in causa generationis sanguinis vitiosi, vt à membris non alliciat, unde venæ replentur: hic ergo sanguis vitiosus per venæ sectionem est euacuandus. Notandum, sanguinem in calida intemperie sine materia, non posse esse causam principalem, vel adiuuantem: est enim intemperies sine materia: vt sanguis nec sit causa principalis, nec adiuuans: maxime, quia residet in locis, admodum remotis à ventriculo. Sed neque habet rationem causæ sine qua non: nam cum sanguis resideat in venis remotis à ventriculo, & extremis, vt venæ tumidæ conspiciantur, si vsurpentur causa calidioris ventriculi medicamenta refrigerantia, non est periculum, vt sanguis fluat in ventriculum: & ideo curatio per sanguinem non impeditur. Cum ergo in calida intemperie sine materia, sanguis, nec habeat rationem causæ principalis, nec adiuuantis, nec sine qua non: dubitatur, qua ratione vena secetur? Pro resolutione dicendum: sanguinem euacuari, quoniam habet rationem causæ principalis, sed non vt refertur ad intemperiem ventriculi, verum vt est, vel esse potest causa & principalis & adiuuans aliorum morborum: vt pote, dum præsentia sua est in causa, vt corpus non nutriatur, immineatque febribus putrida: nam sanguis vitiosus

Curatio.
Phlebotomia.

Traß. I.
sem. 13. li. 3.

facile putrefcit. Quoad intemperiem frigidam, in hac potest
secari vena, quia sanguis peccare potest in ratione causæ si-
ne qua non: nam in intemperie frigida, dum medicamenta
calida applicantur ventriculo, sanguis in corpore abundans
fluere potest in ventriculum, ut fiat tumor: & hoc monuit
Gale. cap. 11. lib. 7. metho. At notandum sanguinem redun-
dare, si ventriculi intemperies fuerit remissa, & in habitu-
dine: nam si intensa sit, vel in habitu, non generatur chylus,
qui possit in copiosum sanguinem mutari. Vnde Avicennas
cap. 19. loquens de signis complexionis frigida ventriculi,
inquit: Si corpus egeat phlebotomia, à qua non sit excusatio,
hanc nocere: his verbis insinuavit, si homo frigidiores ob-
tinens ventriculum egeat phlebotomia, videlicet ratione
alterius affectionis, verbi gratia, si angina afficiatur, ut non
sit excusatio à phlebotomia, hæc nocet, ratione frigiditatis
ventriculi, quia malum intenditur, cum venæ sectio ex
accidente refrigeret. Quoad humidam intemperiem, &
fiat è copiosa humiditate probatur venæ sectio: nam san-
guis redundans, mutatur in copiosam humiditatem: unde
sanguis habet rationem causæ principalis, estque detrahen-
dus, ut imminuatur humiditas. Si humiditas fiat è qualitate:
non secanda vena, quia non habet rationem causæ sine qua
non: nam dum utimur siccis & astringentibus, fluxio non
imminet. *In siccâ intemperie*, quia sanguis deficit: patet in hac
venam non esse secandam. Et tandem, quoad intemperiem
cum materia: si materia sit sanguinea: vena secanda, quia
tunc sanguis habet rationem causæ principalis. Si autem
materia alia sit à sanguine: vena secari potest, si sanguis ha-
beat rationem causæ adiuuantis, vel sine qua non; ratione
intemperiei, vel si habeat rationem causæ principalis, meri-
to alterius morbi, ut supra dictum. *Vsu* patet ex alibi dictis
præsertim, quia in sermone de tumore ventriculi, maxime
inflammatorio, de recta administratione venæ sectionis
loquemur.

De Medicamentis.

*Pharma-
ceia.*

De materia Cheirurgica hætenus: iam de Medicinali.
Materia medicinalis dirigitur vel ad Materiam morbosificam,
vel ad Intemperiem, vel ad Proportionem ventriculi. Medi-
camenta quæ respiciunt materiam, diriguntur ad intempe-
riem, vel in Genere, vel in Specie. Per intemperie in genere,
intelli

intelligimus intemperiem, & sine materia, & cum materia: per intemperiem in specie, intelligimus intemperiem cum materia. Medicamenta, quæ diriguntur ad materiam morificam intemperiei in genere, respiciunt materiam, quæ vel Cedit medicamentis, vel Non cedit. Si primo modo: sunt medicamenta Vacuantia sensibilibus: quæ, si dirigantur ad primas superfluitates, vocantur *Lenientia*: si ad cacoehymiam, dicuntur *Purgantia*. Si medicamenta secundo modo referantur ad materiam, quæ non cedat vacuantibus, dicuntur *Præparantia*, quæ præparant materiam, ut cedat vacuantibus. Medicamenta, quæ respiciunt materiam morificam intemperiei in specie, id est, materiam impactam, qua constituitur species intemperiei: hæc vocantur *Resolventia*, id est, vacuantia insensibilibus. Quoad medicamenta, quæ diriguntur ad intemperiem: sunt medicamenta *Alterantia per contrarium*. Medicamenta denique respicientia proportionem, sunt *Alterantia per similia*, id est, stomachica medicamenta. Patet ergo, qua ratione dicendum sit de medicamentis Lenientibus, præparantibus, purgantibus, resolventibus, alterantibus per contrarium, & stomachicis.

Quoad Lenienda: omisis Vomitoriis & Clystims, de quibus alio egimus loco magis opportuno, num. cap. 7. lib. 1. & cap. 17. 19. lib. 6. dicemus de lenientibus, quæ per os exhibentur causa primarum superfluitatum. Superfluitates sunt Frigidæ, vel Calidæ. Si frigidæ, id est, pituitosæ: animaduertere oportet, num materia illa pituitosa, detineatur in ventriculo calidiore, vel frigidiore. cap. 10. li. 6. de tuen. san. Si in ventriculo calido sit pituita, siue sit tenuis, siue crassa, siue viscida: siue in cavitare resideat, siue aliquantisper sit impacta, ut licet *castia*, *syrupo rosæ*, *solut. manna*, *melle violaceo* (sol. &c) ut plurimum ascendere licet ad mel. ros. solut. Sed, cum hæc materia reperiatur in ventriculo calido: oportet hæc medicamenta dissolvere cum decocto endivia, acetosa. Verbi gratia R. flor. castia recens extr. ʒ i ss. manna el. ʒ ij. cum saccharo fiat bolus. Notandum, nos cum castia non miscere semina anisorum, quæ calida sunt, quoniam supponimus ventriculum esse calidum. Si malles portionem: R. mellis rosæ. sol. ʒ ij. mellis viol. sol. ʒ iij. decocti acetosa parum fiat potio brevis. Hic basis est mel viol. sol. quia opus est euacuare pituitam: sed quia pituita reperitur in ventriculo calido: ideo vimur melle, sed violaceo: &c quoniam mel violaceum, non est usque adeo potens, præsertim dum pituita est viscida: ideo in

1. Lenientia.

Pituita in ventriculo calido,

*Hierapi-
era.*

*Pituita in
ventriculo
frigido.*

*Alucina-
tio quorun-
dam.*

*Bilis in
ventriculo
calido.*

*Bilis in fri-
gido ven-
triculo.*

ratione adiuuantis medicamento addimus, mel ros. solutivum, quod efficacius est melle violaceo solutiuo. Verum, cum in utroque medicamento reperitur mel, quod calore suo ventriculo calidiori posset obesse: ideo in ratione corrigentis basin, nos dissolvimus hoc medicamentum cum decocto refrigerante. Cæterum notare oportet circa hieram, eam in calidiori ventriculo obesse: quamvis, dum adest pituita admodum copiosa, admodum crassa & viscida, tunicisque adhærens, exhiberi queat: sed vel cum castia, ut calor remittatur: vel post hieram illico propinandum aliquod decoctum refrigerans, ut aqua hordeacea, aut serum lactis ad ℥ vi. vel viij. hæc enim non tantum refrigerant, sed etiam abstergunt. Si pituita reperitur in ventriculo frigidiori: & quidem si tenuis sit pituita: probatur manna, cum melle ros. sol. verbi gratia ℞. mellis ros. sol. ℥ iij. manna el. ℥ ij. cum decocto mentha, fiat potio brevis. Si pituita sit crassa, viscida, si in cavitate: licet exhibere mel. ros. sol. sed licet etiam dare hieram, quæ materiam crassam attenuat fluxilemque reddit. In portione medicamentum præscribetur sine hiera, propter amaritudinem, hoc modo. ℞. mellis ros. sol. ℥ v. oxymelit. simpl. ℥ j. ss. cum decocto betonica, fiat potio brevis. Si placeat exhibere hieram, & mel. ros. sol. id fiet hoc modo. ℞. specierum hieræ ℥ iij. cum melle ros. sol. fiant boli. Deinde, ℞. mellis ros. sol. ℥ iij. decocti anisorum parum, fiat potio brevis. Primum exhibebitur bolus, deinde potio. Si materia pituitosa sit impacta, ut non cedat hieræ. sed medicamentis egeat præparantibus, quæ diutius morantur in ventriculo, quam euacuantia: huiusmodi non est hiera, si exhibeatur ut medicamentum leniens. Sunt practici nonnulli, qui nunquam hieram exhibent, nisi prius aliquod attenuans propinent: in quo recte faciunt, dum materia pituitosa in tunicis residet, & impacta est: tunc enim non illico est exhibenda hiera in ratione lenientis: errant vero dum idem observant, materia residente in cavitate: nam hieræ facultas est, attenuare & educere pituitam, in cavitate residentem.

Si superfluitas sit biliola: Et primum, si in ventriculo calidiori sit bilis tenuis: utemur manna, syrupo ros. sol. syrupo viol. sol. tamarindis, cum decocto refrigerante, verbi gratia ℞. syrupo viol. sol. manna el. ana ℥ ij. decocti hordei, cum ℥ iij. pulpa tamarindorum, parum: fiat potio brevis. Si biliola superfluitas sit crassa, probatur castia: nam bilis cedit castiæ, dum modo residet in cavitate ventriculi: si enim in tunicis sit firmata, postulat præparantia, de quibus suo loco. Si bilis sit in ventriculo frigidiori:

gidiorilicet vti manna, syrupo ros. sol. dissoluis in decocto calefaciente, vt betonica: possumus etiam vti medicamentis à Gale. cap. 10. lib. 6. de tuen. valitud. cap. 11. lib. 7. meth. med. propositis inimirum *mussa, in qua coctum sit absinthium*: hoc enim medicamentum succum biliosum tenuem in ventriculo contentum, deorsum propellit. Si bilis fuerit crassior: probatur *hiera*, quæ crassam bilem, tunicis adhærentem, attenuat: nam bilis facilius cedit, quam pituita: præterea hiera est medicamentum euacuans, & frigidum ventriculum calefaciens: vt iure dixerit Auicen. non esse vtilius medicamentum in ventriculi morbis, qui à materia prodeunt, quam est hiera. Adiditque Auicen. *hieram cum decocto absinthij esse vltimum medicamentum*. Quibus verbis respicit ad vacationem bilis: nam è cap. 10. lib. 6. de tuen. san. si pituita in ventriculo detineatur, absinthij potio est aduersissima, quia absinthium astrictione sua pituitam ventriculo magis affigit. Cum ergo hiera adeo *Hiera compositio, & dosis.* nobile sit medicamentum, quædam circa eam notanda: Componitur hiera ex aloë, cinnamomo, xylobalsamo, asaro, spica, eroco, & mastiche: secundum Gal. c. 11. l. 7. meth. cap. 10. lib. 6. de tuen. san. cap. 1. li. 2. x. τόπ. Conficitur quidem ex aloë lota, si volumus magis roborare, & minus euacuare: vel ex aloë non lota, si minus roborare, magis purgare volumus: nam per lotionem portiones tenues vacuantes absumentur, & partes terrestres remanent. Sed cum hiera sit medicamentum, non astringens, sed sensibiliter euacuans: sit præterea calefaciēs, attenuans, & hinc insensibiliter euacuans: scire oportet, cum basis huius medicamenti sit aloë: si institutum est magis sensibiliter euacuare, oportet vt medicamentum conficiatur è basi in multa dosi: si contra, in minori dosi: maior dosis erit aloës 3 cxx. reliquorum 3 vj. minor dosis erit, aloës 3 lxxx. reliquorum 3 vj. Et si contingat, vt patiens dolori capitis sit obnoxius: dosis croci est minuenda. Sicut ergo discrimen est in cōpositione huius medicamenti, ita est diuersitas in dosi: vnde Gale. cap. 11. lib. 7. meth. statuit hieræ summam dosin esse 3. β. minimam 3 j. At cap. 1. lib. 2. x. τόπ. statuit summam dosin hieræ esse 3. j. minimam 3 β. Ratio est: nam dum animus est vacuare sensibiliter: opus est medicamento in maiori dosi: & sic intelligendus est Galenus cap. 11. lib. 7. metho. dum autem calefacere volumus & attenuare: oportet medicamentum exhibere in minore dosi: nam medicamentum alterans, vt possit attenuare & alterare materiam,

est necessarium, vt diutius in ventriculo permaneat, & propterea in minori copia exhibendum: nam si in magna offeratur, cito impetum habebit ad aluū, præsertim si basis medicamenti sit in magna copia, verbi gratia si hiera cōponatur ex aloes & cxx. non potest diu in ventriculo permanere, ad differentiam hieræ, vt cōponitur ē & lxxx. aloes. Cum ergo in præsentia sermo sit de hiera, vt de medicamento leniente: oportet vt componatur ex aloē vel non lota, vel vix lota: & oportet vt recipiat aloes & cxx. & dosis sit à ʒj. vsque ad ʒss.

*viuifica-
tio.*

Vsus lenientium quamuis pateat ex alibi dictis, notandum tamen circa quantum agendum, cum indicetur à prima superfluitate, ratione actiuitatis: si superfluitas fuerit pituitosa, & copiosa, & admodū frigida, & proinde summæ actiuitatis: ad summā dosin oportet ascendere. Quoad modum agendi, cum sumatur à superfluitate, vt resistit: vt verbi gratia superfluitas si pituita frigida, crassa, viscida, & hinc contumax: oportet exhibere medicamentum leniens in forma solida, nam diutius moratur in ventriculo, & hinc magis agit. Potissimum probatur leniens solidum, si amarum fuerit: nam medicamentū amarum liquidū, non ita permittit virtus oris. Circa Quando agendum, cum capiatur ab indicante præsentī, vincēte alia indicantia: quia hoc sæpe euenit, ideo sæpe leniens exhibendum. Vbi agendum, sumitur à substantia superfluitatis in ventriculo: vnde leniens per os est exhibendum.

*2. Prepara-
vantia.*

*Frigida
materia
prepara-
tio.*

Quoad præparantia: hæc, cum Gal. c. 11. l. 7. meth. c. 10. l. 6 de tuen. san. probantur causa materiæ existentis vel in Ventriculo, vel in Reliquo corpore. Si resideat in ventriculo, & materia sit crassa, viscida, tunicis impacta, non cedit medicamentis, nisi attenuetur & detergeatur. Illa materia est Frigida, vel Calida. Quoad frigidā: & primum si resideat in ventriculo calidiore, probantur attenuantia & detergētia, sed citra calorem, vt oxymel simplex: & si ventriculi caliditas sit intensior, probatur syrupus acetosus simplex: si caliditas sit remissior, licet vti syrupo de betonica, melle ros. Sed hæc sunt triuialia: magis recōdita sunt proponenda, quibus nō citra utilitatem vsi sumus. Vnde si materia sit frigida in calido ventriculo: R. pulu. quinquæfolij, rad. filicis maris, pulu. liquiritia, capillorum Ven. specierum diarhod. Abb. an. ʒss. sacchari optimi ʒij. cum aqua acetosa fiant rotula. Dosis huius medicamenti sit à ʒj. ad ʒss. & est efficax medicamentum ad attenuandum materiam, citra caliditate ventriculi, & magis agit quā syrapi. Si ventriculus sit frigidior,

idior, cum Galloc. cit. probatur diatriopiper, diacalamintha: licet etiam uti oxymelite scillicito, melle scillicito: sunt enim medicamenta satis efficacia, ad pituitā attenuandam & detergendam, in ventriculo frigido. Eicet etiam uti hoc medicamento: R. pulu. saluie, maioran, calamintha mont. cinamomi, macis an. ʒss. sacchari optimi ʒiiij. cum aqua cinamomi, fiant rotule: erisque medicamentum iucundum & efficacissimum, dosis à ʒj. ad ʒss. Probantur etiam medicamenta, quæ vacuāt insensibiliter: de quib. infra. Quod si materia sit Calida: & primū si ventriculus etiam sit calidior: utemur Symplo acetoso simplici, de succo acetoso, de acido citri bene maturi: & magis proderit medicamentum ex his succis confectum, si conficiatur sine saccharo, vel cum exiguo admodum saccharo: nā dulcia in mēbro calidiorē bilescunt: unde probatur succus acetosus cū succo acido citri, & exiguo aceto. Et si operetur medicamentū non ita fluidū, licet addere puluerē: verbi gratia R. pulueris foliorū acetose, radicis quinque folij an. ʒj. cū succo acetoso vel citri, fiant pilula v. & exhibeantur. Si materia sit biliosa, & hereat in vētriculo frigidiorē: probatur oxymeli, cū Symplo acetoso simplici: licet etiā simul propositos pulueres exhibere, cū oxymelē simplici. At si materia morbifica sit extra ventriculum: cum generetur, in iecinore: de hac suo loco dicendum.

Calida materia
seria præparatio.

Quoad vsum præparantium: admonebimus quædam circa Quomodo, & Quando agendum. Modus sumitur ab indicante, prout facile vel difficulter patitur à contrārio. Si ergo materia morbifica ægre pariat: medicamentum vsurpandum secundū talem modum, ut efficaciter agat: at eo efficacius agit, quo diutius moratur: id quod assequitur per formā solidam: Proinde præparantia (quod pertinet ad methodum componendi medicamenta) debent esse potius solidioris consistentiæ, ut pilulæ, boli, rotulæ, si materia præparanda sit crassior ac viscidior, siue in ventriculo sit, siue vltra. Quoniā autem solidum, nō potest agere in materiam remotā: ideo indicat adiuuans, id est, deducens in locum distantem: unde cum solidis medicamentis miscenda sunt liquida, tanquam vehiculum. Hac ratione practici præparant materiam in vētriculo existentem, exhibendo medicamenta, sine dilutis: quibus optimi practici vtuntur, dum materia est vltra ventriculum. Quoad Quando agendum: hoc sumitur ab indicante præsentē, vincente alia indicantia. Cum igitur in ventriculo frigido referto pituita, longo tempore perseverat indicans: ob id diu, & proinde quotidie medicamentis uti licet, si vir-

Ratio vti
di.

tus permittat. Permittit autem virtus frequētem vsum, medicamentorum calidorum, citra iniucunditatem agentium: vt est diatrion pipet. diacalaminthes, quibus quotidie vti possumus: contra, hiera, propter amaritudinem, non possumus assiduo vti, c. 10. l. 6. de tuen. san. Non tamen nimis raro hiera vti debemus, sed frequenter, dum in ventriculo frigido & humido materia est impacta: præsertim si hiera componatur ē 3 lxxx. aloes, non autem ē 3 cxx. Præcipiendum ergo est pharmacopœis, vt habeant species hieræ duobus modis compositas. Dum enim præparare volumus: efficacissima est hiera ē 3 lxxx. si eius 3 ij. vel 3 j. sumatur, & cum saccharo, vel melle bolus conficiatur, & frequenter exhibeatur. Medicamentum enim hoc præparans erit saluberrimum.

3. Purgantia.

Iam quoque agendum est de purgantibus, quæ respiciunt cacochymiam, id est, prauos succos in corpore existentes: de quibus egimus cap. 7. lib. 1. & cap. 19. libr. 6. vnde circa vsum horum medicamentorum in præsentia tria monere satis fuerit. Primo studendum, vt mitiora purgantia exhibeantur: vitenturque *confecta* ē scammonio, bellchoro, & colocynthide: nisi forsitan cum intemperie ventriculi sit cōiunctum aliquod vitium summi momenti. v. g. apoplexia, aut epilepsia: quæ cogunt nos ad vehementiora confugere: id quod tutius facere possumus, si intemperies sit frigida & humida. Nisi igitur cogat malum maioris momenti, non licet ascendere *ultra*

2. *agaricum, rhabarb. senam, polypodium, epithymum.* Secundo notandum, cum soluentibus esse miscenda medicamenta stomachica, quæ proportionem ventriculi fouent, de quibus suo loco. Hæc autem potissimum probantur, si non tantum corrigant soluentia, sed etiam intemperiem. verbi gratia: si in morbo calidiore ventriculi, cum soluentibus miscemus *acerosam, acidum citri, violarum*: in frigida autem intemperie licet miscere *saluiam, mentham, aromata, vinum aromaticum*. v. g. in calidiori intemperie recipe *rhabarb. el. 3 j. infundatur in sufficiens decocto acetosa, & endiuia: & facta diligenti expressione, adde Syrupi violacei, solida manna el. ana 3j. Misce, & fiat potio brevis, qua expurgabitur biliosa materia, citra detrimentum ventriculi calidioris. Si ventriculus sit frigidior, & velimus exhibere rhabarbarum, ita præscribendum: R. *rhabarb. el. 3 j. vini aromatici 3j. fiat infusio in sufficiens quantitate decocti salvia & mentha: & facta diligenti expressione, adde mellis rosati solutissimi, manna el. ana 3j. Misce & fiat potio brevis.* Tercio notandum,*

tandum, vt non ascendamus ad summam dosin: propter virtutem imbecillam in ventriculo, quoniam hic intemperie 3- laborat.

Sequuntur medicamenta resoluensia, quibus vtimur propter materiam impactam in ventriculo. Hæc medicamenta sunt calida, & tenuis substantiæ: nimirum *aromaticum, salvia, calamintha montana, eryngium, ammi, feniculum, botrys, maiorana, oxymeli scillit. mel scilliticum*, sed possumus etiam scillam conficere cum saccharo, loco mellis, cum corpora sunt delicatiora: vti etiam licet sale theriacali, nam vehementer discutit: vti licet radice anihora, magnis antidosis, sed antiquis: præterea vti possumus diatronpip, diacamalintha, diagalanga: licet etiam ascendere ad confectiorem anacardinam: efficacissimum etiam medicamentum est hiera, confecta cum 3 lxxx. aloes, non cum 3 cxx. Item vti possumus gnaiseo, sassafras, qua & Indica sassafrasia dicitur, salsa, china. Sed notandum, cum hæc medicamenta calefaciant & siccant, differetiam esse secundum magis & minus: nam in ventriculo frigidiore, referto pituita, probantur valentiora: si autem ventriculus afficiatur intemperie calida, causa bilis, debilioribus vti oportet. Verbi gratia, si ventriculus sit frigidus, & pituita repletus, possumus exhibere sassafras cum vino: Auicennas ascendit etiam ad rubrificantia. In calidiore ventriculo, propter bilem, vti licet china, sine vino: & cum carne, nisi coniuncta sit siccitas. Sed de resoluentibus vberius loquemur in sermone de tumore ventriculi. At hoc loco intelligere oportet, an cum resoluentibus sint miscenda astringentia? Auicennas cap. 24. in cura generali malorum ventriculi, inquit: non euacues medicamenta resoluensia à stipticis & astringentibus, vt conseruetur virtus. Cum resoluentibus ergo miscet astringentia. At idem Auicēnas c. 33. inquit: Si humor sit frigidus & humidus, oportet vti resoluentibus, nec miscenda sunt stiptica: error enim is est maximus, siue sint cibi, siue medicamenta. Pro resolutione scire oportet, sermonē esse de vacuātibus vētriculum, vel Sensibiliter vel Insensibiliter. Medicamenta quæ sensibilibiter euacuant, sunt calida sicca, & impetu quodam agunt: vnde necessario dissolueretur substantia calidi inuati, nisi miscerentur astringentia. Medicamenta autem insensibiliter euacuansia, sunt, quæ diriguntur ad humorem imbibitum in tunicis: hic humor, vel est particeps caliditatis, vt bilis: vel siccitatis, vt melācholia: vel expers est & caloris & siccitatis,

4.
Resoluen-
tia.

Stiptica
quādo sint
miscēda re-
soluentibus.

vt pituita, quæ generatur in ventriculo frigidiore. Si humor particeps fuerit caliditatis, cum absumatur substantia calidi innati, à caliditate humoris: propterea cum resoluentibus sunt miscenda astringentia: quia calidum innatum sustinere non potest dissipationem, quæ fit & ab humore calido, & à medicamento calido. Si humor fuerit particeps siccitatis, vt melancholia: cum vi siccitatis absumatur calidum innatum, ob id miscenda etiam sunt astringentia cum resoluentibus: quia calidum innatum dissiparetur & ab humore sicco, & à calido medicamento. Si humor impactus sit particeps frigiditatis & humiditatis: cum à frigido humore non dissipetur substantia calidi innati, sed potius vi humiditatis suffocetur, & vi frigiditatis remittatur calor insiti calidi: ob id medicamenta resoluentia non sunt corrigenda astringentibus: vnde Auicennas, si humor est frigidus & humidus, non miscet astringentia. Non ergo perpetuo improbantur astringentia, sed vbi resoluenda est pituita.

*5.
Alteran-
tia per cō-
trarium.
Calida in-
temperies.*

Dicendum modo de Alterantibus per contrarium. Si ergo simplex sit intemperies: & primum, si intemperies calida, probatur medicamentum confectum è rosis, violis, cichorio, endivia, soncho, acetosi, hordeo, acido citri, cydoniis, lactuca, aceto, capphura. Si insignis sit calor: ascendamus ad papauer, ad aquam frigidam. Sed notandum, cum frigidis calida esse miscenda, ita tamen vt frigida sint copiosiora. Vnde medicamenta exhibeantur in conseruis: iubeatis vt nō imponatur saccharum in quantitate consueta, sed in minori: ideoque saccharum rosaceum ita præscribendum, vt conficiatur cum minori copia sacchari, propterea quod dulcia bilefcunt. Si autem medicamenta hæc frigida applicentur, cū frigidis oportet miscere mastichem, quamuis intemperies sit calida: verbi gratia, *℞. olei violati ℥j. succi lactuce ℥ss. olei mastichini ℥ss. cera lora in aceto ℥jss. Misce & fiat linimentum.* Calida cum frigidis miscenda sunt: quia frigida profunt quidem, vt tollunt morbum calidum, sed nocent vt minuunt caliditatem calidi innati. Notandum circa vsum istorum medicamentorum Auicennam in capite de cura intemperiei calidioris dixisse: cum emplastras stomachum frigidis medicamentis, caue ne septum attingas: vnde expedit medicamentum applicare inferius, circa umbilicum. Et si contingat vt medicamentum sit iusto frigidius, adhuc magis nocebit. Desumpsit hoc à Galeno c. 8. libr. 7. meth. vbi scribitur, frigida præcordis applicata, æstium

æstum ventriculi remittere, sed lædi respirationem, propter diaphragma. Huic ergo nocumento oportet calidis occurrere: nam ratione caliditatis ventriculi opus est frigidis: sed ratione respirationis opus est calidis: & ideo monet Galenus, ut post usum calidorum redeamus ad frigida, quæ tamen non præcordiis, sed versus umbilicum sunt applicanda. Et ob id cum Galeno cap. 8. libro 7. meth. in insigni caliditate, si vicina corpora ventriculo non sint robusta, tutius est progredi mitioribus, & iis longiori tempore. Quod etiam obseruandum est in his quæ assumuntur: si enim in intemperie calidior ventriculi velimus exhibere aquam frigidam: animadvertere oportet, num æger sit robustus vel imbecillis secundum gulam: si enim sit imbecillis, nequaquam frigida est exhibenda: ut monuit Galenus loco citato.

Quoad intemperiem frigidam: cum probentur medica- *Frigida*
 menta calidiora, duo circa hæc sunt notanda. Primum, ut non *intempe-*
 sint vehementer calefacientia: hæc enim, quatenus habent *ries.*
 vim exsiccandi, possunt obesse, & morbum siccum induce- *1. Canon.*
 re: loquimur enim hic de intemperie frigida simplici, & sup-
 ponimus temperiem in passivis qualitatibus. Quare in frigi-
 da intemperie simplici, probatur *conserua* è betonica, *conserua*
 è salvia, è rore marino: probatur aromaticum rosatum: probantur
 aquæ *Muscinenfes*; D. Petri: non probantur aquæ *Aponenses*, quia
 iusto sunt calidiores, & siccant. Probatur etiam oleum *mastichi-*
num, *chamamelinum*, cum parva quantitate olei de *spica*.
 Auicennas, cognoscens in hac intemperie calidiora posse no-
 cere siccando, miscet *adipem gallinæ*, ut medicamentorum vim
 siccantem corrigat. Quare & vos si uti volueritis calidioribus,
 poteritis administrare cum omento, vel vituli, vel castrati.
 Probare etiam possumus *Zingiber*, sed conditum cum saccharo: li-
 cet etiam exhibere *diatrion piper*, sed cum vino: nam mel, sac-
 charum, vinum, substantiis humectant: ut propterea etiam
 probetur *piper*, sed cum cibus, qui noxam siccitatis tollit. Exhi-
 bere etiam licet calidiora, sed cum iure ob eandem causam. Se- *2. Canon.*
 cundo notandum est, ut medicus cum calefacientibus mi-
 sceat astringentia, ne dissoluatur substantia calidi innati.
 Ob id Auicennas probat, ut cum decocto *spica* misceatur ali-
 quid *mastiches*: nam beneficio *mastiches* prohibemus dis-
 solutionem calidi insiti. Potest igitur probari huiusmodi
 medicamentum: R. olei *nardini* ℥j. cera ℥ss. Cera autem liquetur
 in olio *nardino*. & postquam medicamentum hoc est refrigeratum,
 addo

adde mastiches ʒij. Misce. Basis est oleū nardinum, ut habet vim calefaciendi: cera habet rationem adiunāti, quatenus est in causa, ut diutius permaneat medicamentū, & magis efficaciter agat: additur mastiche, ut habet rationem corrigentis: corrigit enim oleū nardinū, ne dissoluat substantiam calidi innati. Sed præterea hoc locum habet. R. olei de spica lb. iij. mastichini lb. j. olei amigd. dulc. lb. ss. vini generosi lb. j. scamanti, spica, nucis moschata, macis ana ʒij. mastiches ʒj. mentha viridis M. ss. malvarum p. j. Contunderenda contundantur crasso modo: & fiat infusio per diem naturalem. & fiat decoctio in duplici vase, ad consumptionem vini: deinde colentur pro stillicidio. Possumus etiam uti hoc oleo, maximo cum fructu, in ratione fomenti, cum omento: optimum enim est medicamentum, cum sit compositum e calidis, & e corrigentibus: nimirum humectantibus & astringentibus. Quoad usum horum medicamentorum: sufficit quippiam monere circa ubi agendum: id est, circa ea, quæ extrinsecus admoventur. Sciendum igitur discrimen esse inter calida & frigida: nam frigida prohibentur à virtute: id est, à septo transverso, seu à calido insito septi: calida autem non prohibentur: unde Galenus cap. 5. lib. 7. meth. dixit, tutius esse calefacere quam refrigerare. Cæterum si contingat, ut pars vicina sit calido morbo affecta: tutius est applicare calida versus vmbilicum, & regionem sinistram: quia in dextra regione caliditas iecoris potest prohibere.

*Causio in
applican-
dis calidis.*

*Humida
dyscrasia.*

Quoad humidam intemperiem: huius causa probantur medicamenta siccantia: sed citra caliditatem & frigiditatem: quia hic agimus de dyscrasia tantum humida: ideoque si medicamenta exsiccantia sint frigida, oportet ea calidis corrigere: & si calida, frigidis corrigenda. Probatur ergo medicamentum confectum ex resiccantibus calidis & frigidis inuicem mistis: inde enim resultat medicamentum siccans, citra calorem & frigus. Usurpari potest medicamentum, quod conficitur e rosis, corallis, santalis, e bolo Arm. ex omphacio, quinquefolio, sumach. Hæc sunt siccantia frigida. Calida sunt, nux cupressi, mastiche, agrimon. beton. Ex his confectum medicamentum, siccabit citra caliditatem & frigiditatem. Notandum, cum propofitis medicamentis alia sint astringentia, ut rose, corallium, omphacium &c. alia apperientia, ut quinque folium, betonica, agrimonia: si contingat, ut alius sit lubrica, nec patiens sit correptus aliqua obstructione: probari astringentia: si autem alius sit stiptica, & patiens sit correptus obstru-
ctione

ctiōne aliqua vel obnoxius sit obstructiōni: præferri appetentia. Vnde Paulus c. 37. lib. 3. probat in hac intemperie acetum scylliticum, *in oleina sale cōditum*. Quoad vsum medicamentorum et applicantur, notare oportet, si ad caliditatem vergant siccantia, vel etiam sint temperata in actiuis, & sint non astringentia: ventriculo possunt applicari, vt etiam septum attingant. At si medicamenta exsiccantia sint frigidiora, vel astringentia, non debent septo applicari: nam læditur respiratio. Vbi agendum indicatur quidem ab intemperie humida, vt lædit ventriculum: sed prohibetur à virtute septi: quæ tamen septi virtus non prohibet astringentia, ratione quantitatis, vel qualitatis: nec septi virtus indicat quod est contrarium astringenti: vnde fit, vt non liceat adstringentia applicare, quia euadunt causæ morbificæ, quatenus lædunt respirationem.

Cautio.

Si intemperies sit sicca, & simplex: remissa est: nam in temperies sicca intensa, coniunctam habet aliam qualitatem. Probantur igitur causa sicca dyscrasie *materia alimentales*, de quibus suo loco: nam intemperies sicca, fit à penuria alimenti. Notandum tamen, non esse contemnenda medicamenta humectantia: quamuis enim hæc non repleant, vt alimenta: meatus tamen contractos dilatant, & alimentum impulsum in vicinas partes reuellunt: quemadmodum est malua, albaea, borago, buglossa, poma, passula dulces, adeps vituli, gallina, omenta, lac, aqua dulcis, vinum dulce. Quæ medicamenta, extra vsurpata, humectant, non solum dilatando meatus contractos, sed etiam retrahendo alimentum. Sed præterea quæ assumuntur in ratione alimenti, replent. v. g. poma, borago, buglossa, amygdala, lac, vinum. Sed notandum, vt iis quæ applicantur, misceantur adstringentia: proposita enim inedicamenta, vt habent vim laxandi, ita calidi innati substantiam dissipant: vt valde profit addere mastichen. Quare in sicco ventriculo hoc medicamentum possumus præscribere *℞. ol. amygd. dulo. ℔. iiij. ol. mastichen. ℔. j. vini dulcis, non generosi, ℔. j. foliorum malu. borag. buglossa, ana P. ℥. passularum dulcium 3 j. mastiches 3 iij. Mis. pro siccilicidie, contusis continendis. Hoc oleo poteris etiam omentum calefacere, & applicare.*

Sicca in-
temperies.

Hactenus de medicamentis, quæ alterant simplicem intemperiem: sequuntur ea, quæ dyscrasiam compositam alterant. Et primum, si intemperies fuerit calida & humida: notandum

Cal. &
hum. dys-
crasia.

notandum ē cap. 9. l. 7. meth. humiditatem vinci à caliditate: ideoque, cū caliditas attrahat, & ventriculus humidior suscipiat, imminere inflammationē. Quare si intēperies calida sit intensa, probatur potio frigida: nam quamvis etiam frigida humectet: tamen relicta humiditas non minatur insignem noxam, & facile cedit siccantibus. Ceterum probatur etiā mistum medicamentum, confectum ē refrigerātibus & siccantibus, quæ medicamēta, quia seorsim sunt proposita, in morbo tum calido, tum humido: ideo iam non repetenda sunt.

*Cal. & sic-
ca dysera-
sia.*

Quoad intemperiem calidam & siccam: cum Galeo cap. 8. & 9. l. 7. meth. & cum Auicenn. respicere oportet ad gradum caliditatis & siccitatis, vt pateat, num liceat vti vehementer refrigerātibus, potissimum aqua frigida. Vnde quoad intemperiem calidam: si fuerit remissa, non vltra primum gradum: probantur moderate frigida, non autem probatur frigida potus. Si contra caliditas sit intensa, in secundo vel tertio gradu, probatur potus frigida, nisi virtus prohibeat. Virtutis autem statum patefacit siccitas: hæc enim si remissa sit, significat virtutem, tolerantem frigida potum: vnde Auicennas ait, hominem quandoque sanari integre potu frigida, dum non est siccitas superflua. Quod si intensa sit siccitas, denotat, quod virtus frigidam perferre nequeat: vnde Galenus cap. 9. l. 7. meth. ait, dum cum siccitate est coniunctus calor, refrigerantia non esse adeo secura: nam vbi siccitas in ventriculo intensa est, totum etiam corpus siccum redditur: tunc igitur aqua copiosa, vi sua permeat in partes, in quibus penuria est torida humiditatis, carnis, adipis: ideoque ea violentia tangit calidum insitum, vt hoc necessario secundum caliditatem patiatur: quod non evenit, si coniuncta sit humiditas. Cæterum, si nō vti liceat aqua frigida: cum Galeno vti oportet minus frigidis, vt tutius, quamvis longiori tempore, homo sanitati restituatur: vnde probatur medicamentum confectum ē violis, lactuca, amygdalis, pomis, floribus malvarum &c. Ventriculi igitur hoc medicamentum applicari poterit: Recipe ol. violacei lb. iij. olei amygd. dulc. rosacei completi ana lb. j. vini dulcis, aqua vel communis, vel rosacea, ana lb. β. foliorū lactuca, malvarum, violarum ana p. l. mastiches zij. Mis. & fiat infusio &c. & pro stillicidio, & pro fomēto, cum omēto. Probatur etiam omentum in hac intemperie, madefactum lacte. Quoniam autem sermo est de siccitate, in qua totum corpus siccatur: probatur etiam balneum cum inunctione: balneum conficitur

ritur ex aqua dulci, moderate calida, ut non excitet sudorē: inunctio conficitur ex oleo amygdalino, & exiguo tum oleo violaceo, tum vino subdolei. Ratio horū medicamentorum hæc est: propositum nobis est, corpus siccātū substantifice humectare, id quod fit ope alimentib: balneum & inunctio, non quidē sunt alimenta: sed tamen ita cōcurrunt, ut corpus alimento in iecinore genito, repleatur: non enim posset totum corpus alimento repleri, nisi attraheret alimentū, susciperet, apponeret, agglutineret, & assimilarer. Balneū igitur meatus, siccitate cōtractos, dilatat, ut libere alimentum fluat: id quod balneū præstat moderata sua caliditate & humiditate: præterea balnei caliditate attrahitur alimentū, & hinc retrahitur, quod in vicinas partes vi siccitatis est cōpulsum: insuper calore balnei fouetur qualitas id est caliditas calidi innati, ut fiat assimilatio: denique propter humiditatem balnei, alimentum suscipitur. Inunctio, quatenus conficitur ex oleo id est è lenta materia: facit ut alimentum attractum non euaporet, sed detineatur, apponatur, agglutinetur: quatenus autem conficitur ex oleo amygd. & e vino: calefaciendo conseruat calidum insitum ut fiat assimilatio. Additur autem oleum violaceum exiguum: nam huius virtute alimentum detinetur: & in præsentia sermo est de morbo calido: ut oleum violaceum frigidityte sua profit: si enim siccitati non sit annexa caliditas, sed frigiditytas: expedit abstinere ab oleo violaceo.

Quoad intemperiem frigidam & humidam: probātur vehementer calefacientia: ut fuerunt resoluētia, proposita causa puitæ. v. g. aromata, guaiacum, sassafras, vinum generosum, angelica odorata &c. In præsentia addere licet Aponenses aquas, quia sermo est, de intemperie frigida & humida. Probantur etiam olea destillata ex aniso, feniculo, aromatibus: cū quibus oleis destillatu possumus conficere rotulas: pro ℥j sacchari, sufficit ut imponātur gutta ij. vel iij. olei destillati. Cum autem hoc vitii sit admodū frequens, proponā optimū stillicidiū, quod, meo iudicio, lōge est efficacius, quā stillicidiū aquarū Aponensium. ℞. ol. de spica ℔ ij. de absinthio ℔ ij. olei de casto ℔ ij. vini vel cyprij, vel ad summum generosi ℔ ij. aqua vite ℥ iij. cinamomi, macis, nucis moschata, Zingiberis, caryophyllorum ana ℥ j. ꝑ. sassafras ℥ j. mentha, maiorana, origani, melissa, calamintha mont. ana. ꝑ. ꝑ. seminis feniculi, cymini, anisorum, dauci, ammios, anna ℥ ij. ꝑ. Mis. pro stillicidio. Licet etiam hoc oleo vesicæ bubulæ semi replere, & applicare ventriculo. Licet quoque hoc oleo decoquere ouorum vitellos,

*Frigid. &
hum. dys-
crasia.*

visellos, & applicare ventriculo. Vnde etiam laudatur peratum ex aromatibus, & cera loca in aqua vite.

*Frig. & sic
ca dysera-
sia.*

Verum si dyscrasia frigida non fuerit coniuncta cum humiditate, sed cum siccitate: si frigiditas sit remissa: probatur conserua e floribus maluarum, e floribus borag. bugloss. & addatis quinta parte conserua beton. vel sextam partem conserua e floribus rosis marini. Et foueatur ventriculus extra eodem fomento, quod fuit propositum in sicco ventriculo: sed in presentia, quia coniuncta est frigiditas, vinum debet esse magis copiosum, & magis vinosum: & similiter oleum mastichinum: & praterea addere potestis melissam viridem. Quod si contingat, ut aer sit frigidior, cum Galeno cap. 7. l. 7. meth. oportet uti lana medicamento hoc imbuta: nam aer frigidus in ratione caussæ, est signum frigiditatis magis contumacis. Et quia totum exsiccat, oportet balneum nonnihil calidius esse, quam in simplici siccitate: addaturque malua, flores chamameli. Fiat inunctio secundum totum cum oleo amygdalino, chamamelino, & cum vino non ita exiguo, ut in simplici siccitate. Si annexa sit intensa frigiditas: probatur conserua e melissa, cum melle. Et extra, augenda est dosi mastiches, vini, & melissa viridis. Quamuis autem aer non sit frigidior, licet tamen uti lana medicamento proposito imbuta: licet etiam uti omento. Balneum calidius esse oportet: ita tamen ut non prouocetur sudor. In inunctione augeatur copia vini, & olei chamamelini. Galenus c. 7. meth. lib. 7. in dyscrasia sicca cum intensa frigiditate, peculiare proponit medicamentum, pax enim arida, liquanda cum oleo amygdalino exiguo: & hoc medicamentum alio calidum usurpandum.

*Cal. &
frid. dy-
scrasia.*

In calida simul & frigida intemperie: intra oportet administrare temperata: nam & calida & frigida obessent. Conficiendum ergo medicamentum e borag. bugloss. endiu. cichorio, violis, rosas, quibus addantur betonica, absinthium, salvia, exiguum cinamomum. Hæc medicamenta exacte sunt miscenda, ut resultet mistum temperatum: id quod consequimur per decoctionem, & potiss. per fermentationem, id est si diu permista maneant, antequam administrantur: & sub radiis solaribus detineantur, vel in hypocausto. Formula hæc erit. R. conseruarum borag. cichor. rosacea, e betonica, rosemarino, ana 3 j. pulueris cinamomi 3 j. cum syrupo de acido citri, & de corticibus citri fiat electarium: cuius dosis a ʒij. ad ʒj. Medicamenta quæ extra administrantur, fundo debent applicari, versus umbilicum: debent etiam supra admoueri, in fine pectoris.

Verum

Verum oportet vt diuerſa ſint medicamenta: calida enim ea parte ventriculo ſunt applicanda, vbi viget intemperies frigida, & frigida, vbi viget calida intemperies. Si intemperies calida derineat os ventriculi, & ſeptum ſit imbecillum: eſſent quidem medicamenta frigida ſupra, id eſt circa finem pectoris applicanda: non tamen id licet, propter ſepti imbecillitatem: ideoque præcipiendum ægro, vt in ore detineat frigida medicamenta, quale eſt, aqua hordei, cum emulſione ſeminum melonum: nam ob continuitatem tunicæ, hæc frigiditas cōmunicatur ori ventriculi, & non læditur diaphragma.

In humida & ſicca ſimul intemperie: propter ſiccitatem probantur *alimenta*, de quibus cito ageinus: propter humidam dyſeraſiam, probantur ſiccantia, ſuperius propoſita, in intemperie ſiccæ: ne tamen his morbus ſiccus augeatur, vbi gratia exhibendus eſt *pulvis quinquefolij, cum iure, ſaccharo, vel melle*: nam quinquefolium, vt exſiccans, occurrit morbo humido: medicamentum autem illud, quatenus eſt alimentale, ratione iuris, ſacchari, vel mellis, occurrit morbo ſicco. Et hæc dicta ſint de alterantibus per contrarium.

*Humida
& ſicca
dyſeraſia.*

Proponenda denique ſunt ſtomachica, id eſt quæ ſouent proportionem ventriculi. Auicennas ergo probat *pelles in-
triſſeas ventris gallinæ*: quamuis parui faciat hoc medicamentum Gale. lib. ii. ſimp. eſt tamen medicamentum quod obefſe non poteſt. Probat etiam Auicennas *corallium in poſo*, ad 3 ſ. & propterea etiam *corallium de collo ſuſpendi*. Notandum autem cum Gal. cap. 24. lib. 5. ſimpl. medicamenta à proprietate operantia, non iuuare in omni morbo illius partis, ſed interdum qualitate euidenti nocere poſſe: proinde qualitates illæ noxiæ corrigi debent. Ita in ventriculo frigido & ſicco: ſi exhibeatur corallium: quod & ipſum frigidum ſiccumque exiſtit: nocebit, niſi à medicamento calido atque humido corrigatur. Meſues probat *chebulas & emblicas: ſed cum myrobalani ſint frigida & ſicca: in morbo frigido & ſicco vel non debent adminiſtrari: vel corrigi debet melle aut ſaccharo, quæ ſunt materia calefacientes & alimentales*. Præcipuum locum inter medicamenta à proprietate conferentia, obtinent *magna antidoti, quæ componuntur è multis medicamentis ſtomachicis: verum quoniam euidenter calefaciunt & ſiccant, in morbo calido & ſicco nocent: in frigido & humido omnibus reliquis ſunt anteponendæ: vnde in tali morbo quidam pro ſecreto habent: ꝑ. mina aromatica 3 j. theriaca antiqua 3 j. vini*

*Stomachi-
ca ſeu ap-
propriata.*

aromatici cum mensha preparati 3 j β. Misc. Hæc de medicamentis.

De victus ratione.

- Dieta.** Restat tandem, vt de materia etiam diætetica loquamur. De aëre egimus in malis capitis & thotacis. In cibo & potu, primum cōmunia quædam afferemus: deinde in specie de diætâ in intemperie & sine materia, & cum materia, loquemur. Communia quædam Auicennas proponit, de quantitate & qualitate. Quoad quantitatem, ait: ciborum inmodicam copiam esse inimicam ventriculo: & hinc corpus hominis gulosi non augetur, quia cibus iusto copiosior digeri nequit. Quoad qualitatem, & primo reconditam: inquit Auicennas, quæ displicent esse fugienda, quoniam sunt noxia ventriculo, & ipsius proportioni aduersantur. Quoad qualitatem euidentem: ait ea quæ stiptica non sunt, ventriculo nocere, vt lac, medulla, cerebellum, acetosa, grana pini: hæc enim habent vim laxandi, quamuis grana pini etiam propter crassitiam & visciditatem noceant, cum sint difficilis coctionis: valeant igitur qui tam libenter concedunt nucleos pineos. Laxantia autem nocent, quia dissoluunt calidum innatum ventriculi, quo tamen maxime est opus, ad chylum elaborandum. In sicco tamen ventriculo, in quo meatus contracti sunt, tuto vsurpantur quæ meatus contractos laxant vt lac: nec enim dissolutionis calidi innati metus est.
- Copia ciborum vitanda.**
- Natura aduersa stemq; relaxantia, fugienda.**
- Dieta in discrasia sine materia.**
- Frigida temper.**
- Calida.**
- Humida.**
- Sed ad magis specialia descendemus. Quoad intemperiem sine materia & primo frigidam: probatur cibus facilis coctionis & facilis distributionis, & exigui excrementi. Cibus condiendus est calidis & iucundis: nim. aromatibus, rosmarino, salvia, feniculo, petroselino, melissa, mentha, &c. Pro potu sit vinum quod accedat ad vinosum, non recens: & sit vel sincerum vel medicatum cum absinthio, salvia, gnaiaco, &c. Si patiens non bibat vinum, probatur aqua, sed iam prædictis calidis alterata. Potus non exhibebitur vehementer actu frigidus: quia intemperies frigida est. In Calida intemperie probantur cibi conditi bordeo, cucurbita, emulsione seminum melonum, lactuca, soncho, endinia, &c. Potus sit aqua aut vinum pauciferum. Potio euidenter actu frigida concedi potest. In Humida intemperie probatur cibus ex auiculis montanis, & perdicebus, curturi-bus, pulis gallinaceis, sed assis. Condiantur cibi aceto, sale, carisandro, aromatibus, sed in parua copia, ne oriatur morbus calidus.

dur. In Sicca dyscrasia, Galenus cap. 6. lib. 7. metho. probat *Sicca.*
lac humanum, non improbat asinum. At ne acefcat in ventri-
culo, misceatur mel vel saccharum, sed in parua copia: dum in
actiuus non est excessus. Sed de lacte opportunius infra cap.
28. lib. 6. de febre hectica. Addit Galenus, si æger non dele-
ctetur lacte, posse exhiberi cremorem psisana, vel aluæ. Proba-
tur etiam vsus recentium ororum. Item panis purus, non surfuraceus,
coctus in furno, vt equaliter coquatur: fermentatus, vt facili-
ter coquatur in ventriculo & distribuatur. Probat etiam panis
salinus in sicco ventriculo, vt distribuatur, & sic occurrat siccitati
totius corporis. Hinc sale condiendi sunt cibi visceri, vt coctlea, re-
stidines, aluæ: non autem psisana, & reliqua cibaria, quæ facile
distribuntur. Et in praxi notandum est, vt dum siccitas in
ventriculo tantum existit, totum vero corpus nondum est
resiccitatum: vt à sale abstineamus, nec demus panem salinum:
quia hic tantum probatur ratione siccitatis totius corpo-
ris. Probat etiam Galenus pisces saxatiles, decoctos cum iure al-
bidum, id est aqua, oleo exiguo, porro & anetho: ratio est, vt velox fiat
distributio. Notandum tamen, si patiens non egeat anetho,
ab hoc abstinendum esse, nam si Galenus abstinet à lacte,
dum æger non delectatur lacte, multo magis debemus nos
abstinere ab anetho. Probat etiam Galenus alas & testes gal-
linæ, qui ad uberiorem humectationem lacte sint nutriti.
Probantur carnes molles: nam duriores sunt difficilis coctionis
& distributionis: vnde non probatur suilla caro, quamuis ma-
xime nutriat, quoniam facultas non potest coquere. In sic-
co ventriculo prodest, vt ter in die naturali homo cibetur.
Potus non debet esse vinum adstringens: nam omnia austera
sunt contraria siccitati, cap. 6. lib. 7. metho. quia humiditatem
alimentalem absument, imbibunt, & exprimunt in sinum
ventriculi, trudentque ad vicina membra. Idem tamen Ga-
lenus eodem in loco, probat vinum adstringens: Dicendum
pro resolutione: in sicco ventriculo probari vinum aquo-
sum, quod pauci caloris particeps mitius agit in calidum in-
natum, nec hoc dissoluit, sed secundum substantiam & qua-
litatem cōseruat: quod ab aqua fieri nequit, vnde non aqua,
sed vinum aquosum probatur. Cum autem hoc vinum sit
tennis substantiæ, sicut facile descendit in ventriculum, ita
etiam facile rursus egrederetur, cibumque, cuius est vehi-
culum, incoctum secum duceret: oportet ergo leuiter esse
adstringens, vt cibus in ventriculo detentus concoquatur.

*Galenus
cōciliatur.*

Neque ob leuem adstrictionem siccitatis imminet periculum: quia hoc vinum non ita est adstringens, vt humiditates alimentales ebeat, absumat, vel exprimat in cavitatem ventriculi, partesve vicinas: quemadmodum est vinum austerrum, de quo loquitur Galenus in principio capitis. Vinum generosum, cum admodum sit calidum, ferit vires imbecilles: nam calidum innatum, quod in ventriculo sicco non fouetur ab humiditate alimentali, quæ resiccata est, facile à vino meraco dissoluitur. Quare in sicco ventriculo licet vti *vino aquoso adstringente sed leniter*: atque ita nulla est discordia in dictis Galeni.

*Dyscrasia
composit.
Calida hu-
mida.*

Hæc de cibo & potu, ratione simplicis dyscrasie. Quoad intemperiem compositam: in calida & humida intemperie, cibi sunt condiendi frigidis & siccantibus, quæ non debent esse adstringentia, si patiens secundum abdomen afficiatur obstructionibus, vel sit obnoxius obstructionibus: ideoque cibi tunc condiendi *endiuii*: soncho, aceto, succo citri, limonis: sed isti fructus sint optime maturi, ne adstringant: licet etiam condire succo aurantij non acerbi. At si obstructionis non sit metus, condiantur cibi adstringentibus: vt granatis acerbis, omphacio, mina ædoniorum simplici, succo citri, limonis, sed hi fructus sint immaturi: licet etiam cibos condire aurantiis acerbis, cerasis acerbis. Notandum tamen, vt adstringentia moderate usurpentur ne fiat obstructio. Potus sit *vinum pauciferum*, modo magis, modo minus adstringens. Probatum etiam *aqua similiter alterata*. Quoad intemperiem Calidam & siccam: è Galeno cap. 6. 7. & 8. lib. 7. meth. si siccitati iunctus sit calor remissus, probatur *lac*, vt in intemperie sicca tantum: discriminen solum est, vt ratione caliditatis annexæ *mel*, quod *lacti miscetur*, minus autem, vt gustu vix percipiatur: vel *tutius loco mellis saccharo vti possumus*, vbi gratia in lactis. *℥ss. imponere possumus sacchari ʒij. vel insapij violacei ʒss.* Quoad reliquos cibos, probantur iam propositi, in intemperie sicca tantum, relictis tamen condimentis calidis. Potus erit *vinum*, sed magis *aquosum*, quam in intemperie sicca tantum. Portio non sit admodum actu frigida, nisi aer sit calidior, qui feruore suo morbum calidum magis ad patiendum difficilem reddat. Si cum siccitate coniunctus sit calor intensus, licet sitis vrgeat, *lac* tamē, quia siticulosus est noxium (aph. 64. sect. 5.) in hac dyscrasia non proponitur à Gal. c. 8. l. 7. meth. nisi caliditas refrigerantur: *lac* enim ob feruorem ventriculi insignem corrumpitur.

Cibi

Cibi ergo probantur confecti ex hordeo, lactuca, melonibus, cucurbita, anguria, &c. Potus sit vel vinum, sed admodum aquosum, vel aqua sine simplex, sive hordeacea: optimus potus, si fiat à destillato iure longo pulli, cum succo angurie: qui potus maxime conuenit, in ventriculo admodum calido & sicco. Quoad intemperiem Frigidam & siccam: in hac quoque animaduertere oportet, num siccitati annexa sit frigiditas remissa, vel intensa. Si remissa: probatur lac cum melle copiosiore, quam intemperie sicca tantum, verbi gratia in lactis ℥ ℥. miscero possumus mellis 3 j. usque ad 3 ij. Cibi condiendi sunt melle & saccharo copiosiore. Probantur etiā cibi magis actu calidi. Potus sit vinum minus aquosum, & plurimum annorum, quam in dyscrasia sicca tantum. Si cum siccitate coniuncta sit frigiditas intensa, cum lacte mel adhuc copiosius miscbitur: ut liceat etiam mel solum exhibere: si enim decoctum sit & despumatum, ferme totum mutatur in alimentum. Cibi condiendi melle & saccharo, in magna copia, ut cibi magis calefaciant. Potus sit vinum calidius, magis generosum & antiquum, quam in sicca intemperie tantum. Si patiens vinum non bibat: detur ius cum melle vel saccharo, vel etiam mulsæ detur sed meracior, cum aliqua portione cinamomi. In Frigida & humida intemperie, probantur cibi, qui fuere propositi in intemperie frigida. Condiendi sunt cibi calidioribus, ut aromatibus & aliis. Idem de potu dicendum. Quoad intemperiem Calidam & frigidam: sicut medicamenta reperiata probauimus: ita etiam victus temperatus probatur. Cibi ergo condiendi sunt, condimentis tum calidis tum frigidis: nam ita cibus erit temperatus. Vinum sit mediocre, non vinosum, nec aquosum: vel etiam uti licet aqua, seu iure, quæ tamen debent alterari hordeo & cinamomo. Quoad intemperiem Humidam & siccam: probantur materiae alimentales, quemadmodum fuere propositæ, in intemperie sicca tantum. At ratione humiditatis abstinendum ab humidioribus. Probantur igitur auicula montana, columba struthales. Cibi sint assii: conditi exiguo aceto. Potus sit vinum medicatum, cum quinquifolio, vel capillo Veneris, in quibus est aliqua vis siccandi.

Frig. sicca.

Frig. humida.

Calida frigida.

Humida sicca.

In intemperie cum materia, varia ratio victus est, pro vario vitio ipsius materiae, secundum quantitatem & qualitatem. Ratione quantitatis: probatur victus minuens, cuius beneficio materia morbifica insensibiliter euacuatur. Vnde cibus dabitur in exigua copia, nisi quid prohibeat: prohibet autem virtus, si sc. materia morbifica non nisi longo tempore absumi

Dyscrasia cum materia.

potest: veluti si pituita sit copiosa, crassa, viscida, frigida. Vitium in qualitate materiæ, est primū in prima qualitate: vt si materia morbifica sit calidior, probetur victus frigidior: de quo in temperie calida diximus: si contra materia sit frigidior, probetur cibus calidus. Et sic de reliquis. Si vitium sit in qualitate secunda: si materia adhæreat, quoniam est crassa & viscida: probatur victus attenuans (victus tenuis dirigitur ad quantitatem materiæ: victus attenuans, ad qualitatem secundam) nimirum calidus & tenuis substantiæ: at varius, pro discrimine materiæ, & pro statu virtutis. Si ergo materia fuerit crassior: probatur victus magis attenuans, vt in dyscrasia frigida & humida, cum materia pituitosa: quem victum permittit & materiæ frigiditas & virtus. Si permittentia non assint, mitioribus est occurrendum: non autem permittit intemperies calida: nam calidum à calido augetur: nec permittit virtus in sicco morbo: quæ enim sunt calida, & tenuis substantiæ, dissoluunt calidum innatum: quod est exiguum in sicca intemperie. Tunc ergo cibi condiendi sunt attenuantibus citra caliditatem, vt *quinquefolio, feniculo & iridi, radicibus petroselinæ, non seminibus: & ab aromatibus est desistendum.* Hæc de cibo & potu.

*Alii bene-
ficiū.
Vomitū.*

Reliqua patent. Sufficit cum Auicenna notare, quoad inanitionem, vt alius seruetur lubrica, vt homo fugiat Venereum. Quoad motum, vt caueat patiens secundum ventriculum à vomitu laborioso: nam per motum hunc violentum, dissoluitur substantia calidi insiti.

CAPVT III.

De paruitate ventriculi.

Transitio.



Explicatis vitiis pertinentibus ad ventriculum, vt ventriculus est constitutus è partibus similari-
bus: modo agemus de vitiis attinentibus ad vē-
triculū, vt est instrumentum, & quid dissimulare.

Hæc vitia sunt Paruitas & Tumor. Primū igitur de paruitate dicemus, propterea quod est vitium natiuū. Per paruitatem ventriculi intelligimus vitium in respectu ad reliqua membra, ad totum corpus: non enim intelligimus paruitatem simpliciter, sed in respectu ad alia membra, vt si vē-
triculo sit paruus, iecur autem magnum, totum corpus ma-
gnum. Hoc vitium generatur, dum parentibus occurrit ali-
quod noxium, vi cuius emittitur semen ita deficiens, vt ge-
neretur

Nomen.

neretur calidum insitum ita vitiosum, vt facultas generatrix ita frustretur: vt procreetur ventriculus plus quam decet minor. Est igitur ventriculi paruitas magnitudo imminuta ventriculi, producta à frustratione generatricis. Forma est magnitudo imminuta: quæ, vt est magis vel minus imminuta, & proinde vt magis vel minus proportionem caret, ad magnitudinem reliquorum organorum: ita magnitudo hæc imminuta locum sibi vendicat modo symptomatis, modo marbisymptomatis, in qualitate mutata, id est, in magnitudine diminuta, quæ cum parum deficiat à proportionem reliquorum instrumentorum non est causa læsæ actionis: non igitur morbus est, sed symptoma. Paruitas autem ventriculi habet rationem morbi, dum multum recedit à magnitudine reliquorum instrumentorum, ita vt lædatur actio, & per consequens sit morbus. Subiectum est ventriculus, ad differentiam paruitatis aliorum instrumentorum.

Causa efficiens, est frustratio facultatis generatricis: vt hæc paruitas natiua, de qua loquimur, distingueretur à paruitate acquisita, quæ euenire posset in macie ventriculi. Et propterea intelligendum, quæ ratione frustretur generatrix: quod difficilimum est. Quare sciendum, è traditis à nobis in doctrina de formatione fœtus: frustrari generatricem, vt residet in vtero, id est, in calido primigenio existente in vtero: vt vitium attineat ad calidum insitum non autem ad vterum, sicuti quidam credunt. Si enim eueniat vt vterus sit paruus: in causa erit parui tum ventriculi, tum reliquorum instrumentorum: in præsentia autem est sermo de paruitate solius ventriculi. Vnde veritas satis recondita elucescat, cõfugiendum ad Galenum, cap. xi. lib. de arte med. vbi statuit, paruum caput necessario esse malum: caput autem magnum, esse modo bonum, in modo malum: bonum, si producat ab insita virtute robusta, quæ copiosam & optimam materiam efformare possit, vt caput sit tum magnum, tum bene formatum: caput autem magnum est malum, si prodeat non à robore facultatis, sed solum à copia materiæ: tuncque producit caput magnum, sed nõ concinne formatum. Ex his verbis colligendum, virtutem procreantem instrumenta, esse insitam: & modo robustam, modo imbecillam: & præterea agere virtutem procreantem instrumenta in materiam modo bonam, modo malam. Vnde hoc loco duo sunt intelligenda: primum, quid sit hæc insita virtus, vt etiam constet, quod sit

Definitio:

Causa efficiens.

Frustratio generatricis vitio calidi insiti seminalis, & materni sanguinis.

eius subiectum: deinde, quidnam intelligere oporteat per materiam vel bonam vel malam, è qua organa formantur. Et hæc duo breuiter explicabimus. Quoad primum, per insitam virtutem intelligimus facultatem generatricem à parentibus tributam: cuius subiectum fuit semen eiaculatum: deinde subiectum fuit semen cum sanguine, in calidum primigenium conuersum: vt propterea facultas generatrix resideat in calido primigenio. Ad quod respiciens Galenus in com. aduersus Lycum, ait, animalia sortiri primam generationem è calido innato. Proponit primam generationem, ad differentiam secundæ: si quidem animalia in secunda generatione sortiuntur partes solidas & viuentes: in prima autem generatione calidum insitum. Amplius cum facultas generatrix resideat in calido insito: est modo robusta, modo debilis: nō propria ratione, quia nō suscipit magis & minus: sed hoc fit, prout calidum primigeniū est, modo robustū, modo debile: vt calidum insitum secundum quantitatem & qualitatem quandoque bene habeat, quandoque male: vnde si contingat vt calidum insitum sit copiosum & bene temperatum: est sedes & organum generatricis robustæ: si contra debilis virtutis. Cæterum, cum calidum insitum generetur è parentum semine: vt varium emittitur semē, ita fit varium calidum insitum. Sciendum autē varium profundū semen, nō modo pro discrimine parentum, vt parētes probum vel improbum semen tribuunt, in diuersis congressibus, verum etiā discriminē esse in semine, quod vnico congressu emittitur. Nam in eodem coitu præstantius est semen, quod primo effunditur, quia magis est in testibus elaboratū & est magis spiritu vitali plenum: ideoque in tertia & posterioribus eiaculationibus emittitur semē minus elaboratum: & in superfluo coitu emittitur etiā semen cruentum, crudum & incoctū. Quare si eueniat, vt seminis portio melior attineat ad hepar, minus proba ad ventriculū, fiet, vt foetus melius formetur secundū hepar, quā secundum ventriculum: vt hinc ventriculus fieri possit paruus. Verū quoque sciendū, semen eiaculatum esse, quoddam mistum è spiritu vitali, & humore. humorem autē probum prodire à parente qui optimum sanguinem generat & qui testes habet robustos: spiritum probū emanare, tū ab optimo corde, tum ab aliis partib. Iccirco necesse est semen in quantitate & qualitate esse optimum: ita tamen vt semen capiat quantitatem ab humore, qualitatem à spiritu. Vitalis autem

autem spiritus à corde prodiens primum reliquis impertitur partibus . mox ab his prodecens , progreditur in humiditatem seminalem tempore coitus : quo fit , vt cum ad generatricem attineat simile generare , si contingat , vt spiritus prodeant à parente donato magnis oculis , fœtus similis producat : & similiter si prodeat à ventriculo paruo , fiat ventriculus paruus.

Quare constitutum sit , per calidum insitum esse intelligendum calidum primigenium : per insitam vero virtutem , à Galeno propositam , intelligere oportere facultatem generatricem : cuius subiectum est calidum : quod si bene habet secundum quãtatem & qualitatem , est sedes virtutis robustæ : si contra , debilis : tandem materiam è qua , esse sanguinem maternum : Hinc liquet , si virtus sit robusta in calido insito : & sanguis maternus bene habeat secundum quantitatem , & secundum qualitatem : produci optima instrumenta : si autem contingat , vt vitium sit in virtute insita , hoc est , è parte calidi insiti , & probitas in sanguine materno : vt dum pater est male constitutus , mulier autem probe habet : tunc organa procreantur vitiosa , & præsertim male figurata & intemperata : etenim imbecilla virtus , ratione calidi insiti vitiosa , materiam etiam optimam vincere non potest . Si autem vitium sit in sanguine , nõ in virtute : si sanguis deficiat : organa creabuntur exigua sed bene figurata : Si autem sanguis abundet : producentur organa magna , ac male figurata . Si sanguis vitiosus sit ratione qualitatis : generantur organa intemperata . Si denique vitium sit & in virtute , & in sanguine : si sanguis deficiat : organa producentur exigua , & male figurata : Si abundet sanguis : organa creabuntur tum magna , tum monstrosa . Ex his igitur colligendum , vētriculum iusto minorem creari , si calidum insitū sit particeps facultatis generatricis impertitæ à spiritu , prodeunte à parente , donato paruo ventriculo . Interim tamen non semper pater paruus obtinet vētriculum : sed sit etiam paruus ventriculus , si calidum insitū , vt attinet ad ventriculum , sit imbecillū : vt quamuis sanguis maternus sit copiosus ; exiguus tamen à calido imbecillo atrahatur . Quod si absolute sanguis maternus deficiat : paruitas oritur nõ modo secundū ventriculum , sed etiā secundum omnes partes . Ex his colligere licet , imminutā magnitudinem naturā accidere vētriculo , dū frustratur facultas generatrix vitio vel calidi innati , vel vitio simul Sanguinis materni .

Differētia.

Cæterum ventriculi paruitas modo Magis, modo Minus est disproportionata. Proditque hoc vitium, quoad differētiā, à causa efficiente, vel solum à Calido infuso: vel & à Calido infuso, & à sanguine materno.

Signa.

Galenus cap. 71. art. med. admonet quandoque ventriculum esse adeo eminentem, id est, vergentem ad exteriora, vt tangentes facile magnitudinem & paruitatem ventriculi agnoscant: vt propterea parvus ventriculus ita constitutus non egeat signis. Si autem ventriculus situm obtineat profundiorē: cum Auicenna ventriculi paruitas indicatur ē difficili tolerantia cibi copiosi, vt patientes repleantur ante saturitatem cibi.

Præsidia.

Quoad indicationes: attinēt hæc ad præseruationem: nam paruitas ventriculi est effectus generatricis, ē materno sanguine: quorum nullum est præsens: indicatio autem sumitur à presenti. Quare in præsentia scopi debent esse præseruatorij: vt homo præseruetur à malis, quæ vi paruitatis ventriculi occurrere possint. At cum hæc mala prodeant à vitiis, attinentibus ad opera, id est, à vitiosis operibus parui ventriculi: sciendum hoc opus esse vel alimentare, vel excrementitium. Opus alimentare est chylus quantitate deficiēs, qui non sufficit pro alendo corpore: vnde *atropia* imminet. Quare huiusmodi opus ita deficiens, indicat remedium, producens chylum copiosum, vt sufficiat pro corporis nutritione. Opus excrementitium est prima superfluitas, quæ, vt noxia, indicat remedium expellens, seu euacuans.

Prognostica.

Licet nulla sit spes ampliandi ventriculum: quia desideratur tum agens tum materia e qua: non tamen est impossibile scopos præseruatorios explere. Verum facilius est, primas superfluitates vacuare: minus facile, procurare: vt chylus generetur ita copiosus, vt sufficiat pro totius corporis nutritione, difficultas autem varia offertur, pro ratione paruitatis ventriculi, & temperamenti, & totius corporis. Nam difficultas magis magisque augetur, quo ventriculus erit minor, in respectu ad totum corpus: nam opus est copioso alimento, quod ventriculus parvus non potest coquere. Difficultas augetur, si annectatur intemperies: nam ventriculus dyscratus adhuc agrius concoquit. Et difficultas etiam intenditur, si totum corpus fuerit calidum & siccum: hoc est, absumens copiosum alimentum: & si etiam totum corpus fuerit rari habitus, nam fit dissolutio.

Quoad

Quoad materias præsidiorum, & primum cheirurgicas: *Curatio.*
in defectu chyli deficit sanguis: quare non secunda vena. Ac
ratione excrementi, & præsertim, si alius non sit lubrica,
probantur fonticuli.

Quoad medicamenta: probantur lenientia proposita in *Dietâ.*
ferme de intemper. ventriculi, & roborantia. Auicēnas probat
vomitum bis in mense, si homo facile euomat. Quare oportet
leuioribus vomitoriis vtique *oxymelise simpl. in iure tepido.*

Quoad dietam: cum Auic. probantur cibi copiosi aliment-
ti, & exigui excrementi. Sed hi cibi debent esse copia exigui,
propter ventriculi paruitatem: sed pluribus exhiberi debet
vicibus in die: nam causa nutritionis opus est copioso ali-
mento: quod ventriculus nequit capere, cum sit paruus: ideo
pluribus vicibus cibi euchymi, & multum nutrientes sunt
offerendi.

CAPVT IIII.

De tumore ventriculi.

VENTRICVLVS cum non modo corripitur
magnitudine imminuta, verum etiam aucta: &
magnitudo aucta possit esse & natiua, & ascitici-
tia: de natiua non est dicendum: præsertim cum
huius natura pateat è superius propositis, & præterea ma-
gnus ventriculus sit in causa potius boni quam mali ope-
ris. Propterea dicendum est de magnitudine aucta ascitici-
tia, quæ vocatur Tumor: qui cum sit malum & frequens,
& periculosum: ideo diligenter de eo dicendum. Et qui-
dem in præsentia diligentiores erimus: ita in tumoribus
aliarum partium breuissimi erimus. Quoad nomē: cum Ga- *Nomen.*
leno, libro de tumor. præter naturam, capite I. scire oportet,
tumorem bifariam accipi posse: primum, vt attinet ad
quantitatem primam: deinde vt spectat ad quantitatem non
primam. Declaro. Per primam quantitatem intelligimus
tumorem prodeuntem à materia, sola peccante copia, vt
hæc materia, verbi gratia, est bona vel caro, vel pinguedo:
per non primam quantitatem intelligere oportet vitium,
seu tumorem, qui spectat ad materiam, peccantem non
modo secundum quantitatem, verum etiam secundum
qualitatem: vt verbi gratia est tumor qui fit à bile co-
piosa, vnde fit à bile & copiosa, & calida, siccaque:
atque proinde à materia, & copia, & qualitate peccante.

In præsentia igitur per tumorem intelligimus spectantem ad quantitatem non primam. Vt institutum sit, dicere de ventriculo non carnosiore, non obesiore: sed correpto inflammatione, erysipelate, œdemate, scirrho, cancro, carbunculo, abscessu, & inflatione. Et fortasse quædam intelligetis, rara, & à nobis diligenter meditata. Verum cum timor sic acceptus cum Galeno, possit esse tum morbus, tum symptoma: in præsentia per tumorem intelligimus morbosum. Adhæc cum vi tumoris morborum lædatur actio ventriculi, & ut ventriculus est instrumentum, & ut obtinet partes similes: nunc principaliter sermo erit de tumore ventriculi, ut est instrumentum: secundo vero, ut ventriculus obtinet partes similes. Verbi gratia: cum inflammatio sit morbus in compositione & intemperie: principaliter respiciamus ad inflammationem, ut est morbus in compositione.

Generatio. Tumor igitur hunc in modum acceptus, sic generatur: dum nimirum ventriculo occurrit materia peccans, & copia, & qualitate, ut ventriculus & augeatur, & alteretur, atque ad eam perducatur magnitudinem & intemperiem, ut ratione utriusque lædatur actio. Quare ventriculi tumor est magnitudo aucta cum intemperie, lædens operationem ventriculi, procedens à materia, copia, & qualitate peccante.

Definitio.

Forma. In qua definitione forma est magnitudo aucta cum intemperie, lædens operationes: nam tumor morbosus, est morbus compositus è magnitudine aucta & intemperie: unde proponitur à nobis tum magnitudo, tum intemperies eo excessu, ut lædatur actio: & propterea magnitudo aucta sit morbus, & intemperies sit morbus. Vnde Galenus capite primo libro tertio de caus. symptom. ait: ventriculi actionem lædi ob morbos partium dissimilium, hoc est, ob inflammationem, ob erysipelas, & hinc ob magnitudinem auctam, seu tumorem: quo loci Galenus proponit ventriculum, ut est quid dissimulare. Idem Galenus respiciens ad intemperiem capit. 2. libro de tumor. præter natur. statuit, in inflammatione partem non modo augeri secundum quantitatem, sed etiam alterari secundum qualitatem. Quare tumor erit morbus, in mala compositione, & in intemperie: siquidem dum humor peccat & copia, & qualitate: ita qualitate alterat, ut citius noceat qualitate, quam copia: verbi gratia, si sanguis fluat in ventriculum: primum est causa morbi in intemperie: secundo est causa morbi in

mala compositione : & propterea dicit Galen. cap. 12. lib. de diff. morb. inflammationem necessario esse morbum in intemperie, non necessario in mala compositione. Subiectum est ventriculus : vt distinguatur tumor , de quo iam loquimur, à tumore aliorum instrumentorum. Et cum ventriculus vix afficiatur tumore secundum se totum: dicitur subiectum tumoris secundum sedem vel Internam, vel Externam: vel Dextram, vel Sinistram, vel Infernam, vel Super-nam. Quamuis intemperies, ad differentiam magnitudinis aucta, vt plurimum totum ventriculum afficiat.

Causa autem tumoris est materia, copia & qualitate pec-
cans: ad differentiam tumoris, qui produci potest vel à car-
ne, vel à pinguedine: quæ materiæ, sola copia peccant. *Causa efficiens.*
In hac materia perpendi debet Species, Vitium, & Causa *I. Species.*
generans. Quoad Speciem: est Vapor, vel Minera. Vaporis *Causa efficiens.*
ratione fit tumor, quem Auicennas vocat inflationem, po-
testque etiam dici tympanites ventriculi. Paulus vocat fla-
tum ventriculi, Aetius nominat inflationem. Minera, est
Sanguis, Bilis, Pituita, Melancholia, & Pus: Quoad materiam *Sanguis.*
sanguineam: esse potest vel Sanguis, vel Ichor sanguinis.
Si fuerit sanguis: fit tumor, qui vocatur inflammatio, in qua
inflammatione capit. 2. lib. de tum. præternatur. sanguis non
modo fluit, sed fluxus detinetur, & sic tumorem procreat:
& ob id Galenus ait, cap. 12. lib. 2. crif. sanguinem in loco im-
pactum, putrescere, & hinc creare inflammationem. Si au-
tem fuerit ichor sanguinis, fit tumor, qui dicitur erysipelas. *Ichor. san-
guinis.*
Concurrit autem sanguinis ichor, modo Sincerus, modo
Mistus cum flaua bile: vnde Galenus respiciens ad Sincrum
sanguinis ichorem. cap. 1. lib. 2. ad Glauc. dicit, è sanguine
feruescente & tenuissimo, fieri erysipelas: vbi per sangui-
nem tenuissimum intelligit ichorem sanguinis, qui etiam
rubra bilis dicitur. Respiciens autem Galenus ad ichorem
sanguineum, mistum cum bile flaua, cap. 10. lib. de tum. præ-
ter nat. inquit, erysipelas fieri à bile, mista cum sanguine: vbi
per sanguinem necessario intelligit ichorem: nam bilis mi-
sta cū humore sanguineo, causat non erysipelas, sed erysipe-
las phlegmonodes. Biliosa vero materia est, quæ causat ery-
sipelas, c. 1. lib. 14. meth. aph. 2. sect. 1. & cap. 5. lib. 2. de diff. feb. *Bilis fla-
ua.*
Notandum autem cum erysipelas sit vel Internum, vel Ex-
ternum: Internum fieri posse à bile, tum sincera, tum mi-
sta: externum autem solum produci posse à bile flaua mi-
sta,

- fla, vel cum ichore sanguinis, vel cum serofitate, vt fit bilis, quam vocant pallidam. Confirmatur hoc Galeni testimonio.
- vbi supra.* Nam primum respiciens ad internum erysipelas cap. 7. lib. 3. lat. statuit phrenitidem, & hinc erysipelas internum fieri non solum à pallida bile, verum etiam à flaua. Et com. 10. libr. 1. prorhet. voluit fieri phrenitidem à bile etiam æruginosa: etenim, si phrenitis sit ab atra bile, multo magis fieri potest à bile æruginosa. Quod vero attinet ad erysipelas externum, Galenus cap. 10. libr. de tum. præter nat. inquit, erysipelas fieri à bile mista, vel cum sanguine, vel cum aquosa sanie: vt si bilis sit sincera, non mista, cum Galeno loco citato, sit causa vlceris, non tumoris. Quare cum in præsentia sit sermo de tumore ventriculi, & proinde de tumore interno: statuendum fuerit, bilem concurrere posse & sinceram & mistam: Si sincera sit bilis, est flaua bilis, vel etiam supra flauam, sed infra atram: mista bilis est, vel cum ichore sanguinis, vel cum serofitate. Hæc de materia biliosa.
- Tumida.* Quoad materiam pituitosam: Galenus ad hanc respiciens, cap. 10. lib. de tum. præter naturam, statuit, vi pituitæ procreari posse tumorem duplicem, hoc est, œdema, & scirrhum. Hi autem tumores inuicem conueniunt, vt sunt pituitosi: differunt autem pro vario vitio pituitæ: infra discriminis causa patebit, cum de vitio speciei loquemur nunc enim versamur circa speciem materiæ, non circa vitium. Quoad melancholiam: ab hac fit scirrhus, cancer, carbunculus: qui tumores, cum prodeant è vario melancholice vitio, de hoc suo loco dicemus. Quoad materiam purulentam: hæc est in causa abscessus. Hæ ergo sunt species materiæ, à qua producuntur tumores. Vnde, si species sint simplices, tumores fiunt simplices & exquisiti: si autem species inuicem misceantur, fiunt tumores misti & notii, verbi gratia si tumor fiat à solo sanguine, fit inflammatio, si misceatur cum sanguine bilis, fit inflammatio erysipelatodes: si pituita sit inflammatio œdematosa, vel etiam scirrhusa, si melancholia, fit inflammatio scirrhusa, cancerosa, vel etiam particeps carbunculi. Hæc de specie materiæ morbificæ.
2. *Vitium*
causa su-
moris.
Substantia
vitium. Quantum ad vitium speciei: hoc est in substantia, quantitate, qualitate, & vbi. Quoad *substantiam*: cum hoc vitium positum sit in putredine: locum habet in inflammatione, in erysipelate, in cancro, carbunculo, & abscessu: nam in inflammatione,

matione, vt dicitur cap. 2. l. de tum. præter nat. sanguis in loco perspiratione priuato ita detinetur, vt putrescat: quare est peccatum in substantia: in erysipelate etiam bilis ita putrescit, vt sit in causa putridæ febris: idem est dicendum de cancro, & de carbunculo: quamuis materia morifica minus putrescat in cancro non exulcerato, magis in exulcerato cancro, adhuc magis in carbunculo: in abscessu etiam paret, pus esse materiam putridam id est peccantem secundum formam. Vt colligere liceat, tumorem flatulentum, œdema & scirrhum non prodire à materia putrida, nisi sit falsa pituita, quæ potest esse putrida: sed tunc sit œdema nothum, vt sit veluti erysipelas nothum: quemadmodum & casus nothus sit è pituita falsa. Quoad vitium secundum *quantitatem*: hoc vitium est commune omni speciei: nam tumor est magnitudo lædens operationes, quare fit à copiosa materia. Quoad vitium secundum *qualitatem*: hoc vitium perpendendum est & in genere, & in specie. Si in genere: in nulla specie materiæ desideratur: & ratio est: quoniam ventriculi tumor annexam habet intemperiem. Si sermo fiat de vitio secundum qualitatem in specie: varium est vitium, pro varietate speciei: vnde quoad *flatum*: vitium est secundum frigiditatem & crassitiem: si enim vapor sit calidus vel tenuis, non potest colligi ea copia, vt sit causa tumoris: vnde inflatio est tumor cum morbo frigido. Quoad *materiam sanguineam*: cum sit vel sanguis, vel sanguinis ichor: si fuerit sanguis: vitium positi est in caliditate & humiditate: verum, cū Gal. c. 2. l. de tum. præter nat. calidior euadit sanguis: vt propterea è c. 12. de morbo. diff. inflammatio sit morbus calidus & humidus. Si autem materia sanguinea sit ichor: vitium statui debet, in insigni caliditate & tenuitate, vt accedat ad naturam bilis: vt propterea non modo calefaciat, sed etiam siccat. Hinc Galenus c. 1. l. 2. ad Glauc. ait, è sanguine efferuescente & tenuiss. fieri erysipelas, quod est tumor calidus & siccus. Quoad *bilem*: huius vitium positi est in calore & siccitate vt propterea tumor biliosus sit tumor calidus & siccus. Quoad *pituitam*: esse potest salsedinis vel expers, vel pariceps. Si sit expers salsedinis: est pituita frigida, humida: nōdo tenuis modo crassa. Vnde cum Galeno c. 1. l. de tum. præter naturam si tenuis sit pituita, sit œdema: si crassa, sit scirrhus. Hinc œdema est tumor frigidus & humidus, scirrhus autē est tumor frigidus & humidus, sed quia accedit a sicci,

Quant. vitium Quod litatis vitium.

1

2

3) 1

vt colligitur è c. 7. & 9. l. 5. simpl. Si pituita sit salsa: vitium cõ-
 sit in calido & sicco: vt propterea fiat tumor calidus & sic-
 cus. Quoad *melancholiam*: cum Galeno c. 2. l. de tum. præter
 naturam & c. 4. l. de atrabile: si melancholia sit expers exu-
 stionis, quæ vocatur nigra bilis: ab hac fit tumor scirrhusus,
 frigidus, siccus, & durus. Verum, cum durities multiplex es-
 se possit: operæ pretiũ est vt intelligatur, quot modis tumor
 durus produci possit. Sciendum igitur cum Galeno c. 4. l. 5.
 simpl. duritiem fieri, dum corpus vel siccescit, vel concre-
 cit, vel nimium repletur: vt causæ ad duritiem concurrentes
 esse possint vel simplices, vel coniunctæ. Quoad siccitatem:
 siccatur corpus validis exercitiis, sole ardente, inedia, febre
 ardente: & siccari etiam potest corpus à siccantibus medica-
 mentis, citra refrigerationem. Quoad concretionem, seu cõ-
 gelationem, congelatur corpus à vehementi frigore. Frigo-
 ris autẽ causa multiplex esse potest, vna à foris incidentibus,
 vt est aer, aqua frigida, medicamenta refrigerantia, quibus
 quandoque aliqui medici abutuntur in erysipellate: secunda
 causa est dyscrasia frigida partis: tertia est humor fluens fri-
 gidus. Quoad repletionem, corpus repletur à copioso humore.
 Quod si causæ duritiei inuicem coniungantur, mista sit du-
 rities, v. g. durities fit per exsiccationem & congelationem,
 si quis laboret in frigore: est enim causa siccans, & causa
 refrigerans: durities autem fit per repletionem & congela-
 tionem, si tumor fiat ab influxu materiæ frigida: nam à
 materia fluente, ratione copiae, fit repletio: ratione frigidita-
 tis fit congelatio. Si fiat durities per siccationem, congela-
 tionem, & repletionem, est tumor, qui producitur à materia
 copiosa, frigida, & sicca, sicut contingit in scirrho. Si vero
 materia melancholica sit particeps exustionis: vocatur atra-
 bilis: & huius vitium positum est in calore, siccitate & cras-
 sitie: vnde fit tumor qui annexum habet morbum calidum &
 siccum. Cæterum admonet Galenus cap. 13. l. de tum. p. nat. si
 contingat, vt hæc materia, seu atrabilis, non ferueat, tumo-
 rem fieri cancrum. Additque cap. 8. si non ferueat, & sit
 minus acris: vel calida, fieri cancrum non exulceratum: si
 acior euadat, produci cancrum exulceratum: & si effeues-
 cat fieri carbunculum. Si autem materia fuerit *purulenta*:
 fit abscessus: & cum omne pus sit calidum, abscessus est
 tumor, qui habet coniunctum morbum calidum. Si vitium
 prepedatur secundum *vbi*: quoad quietem: semper materia
 præter

*Motus &
 quietis vi-
 tia.*

præter naturam quiescit. Quoad motum: hoc vitium locum habet in tumore, quando materia generatur extra ventriculum: quod vitium desideratur in tumore flatulento, si flatus generetur in ventriculo: desideratur etiam in tumore pituitoso, si pituita generetur in ventriculo: præterea & in abscessu hoc vitium desideratur, si pus generetur in ventriculo: etenim si pus gignatur extra ventriculum, & fluat in ventriculum, abscessus non producitur, sed alia mala oriuntur. Et propterea cum motus sit perpendendus in tumore, qui producitur à materia, quæ extra ventriculum generatur: in motu cum sint quatuor, mobile, terminus à quo spatium per quod, & terminus ad quem. Quoad mobile: patet quodnam sit, ex iis quæ de specie diximus. Terminus à quo, potest esse modo totum corpus, modo pars. Totum, si materia in toto corpore colligatur: siue sit sanguis, siue alius humor. Potest esse pars verbi gratia iecur, ratione sanguinis & bilis, & si fuerit melancholia, lien, iecur: si pituita, cerebrū. Siue autem sit totum siue pars corporis: vtrumq; concurrit in ratione termini à quo, vt ventriculum superet, penes transmissionē: & terminus à quo superetur à ventriculo, penes attractionem. Spatium per quod, sunt vasa, & potiss. venæ. Terminus ad quem, est ventriculus: vt vel attrahit, vel suscipit. Attrahit vi caloris vel doloris: suscipit ob intemperiem vel frigidā, vel humidam, vel frigidam & humidā: suscipit etiam ob raritatem: vt ventriculus ob mollitiem & raritatem facile suscipiat: vbi notandum, raritatem esse vitium natium, intemperie esse vitium, tum natium, tum accititium. Hæc de vitio speciei.

Causa generans materiam morbificam, dirigitur ad flatum, sanguinem, bilem, pituitam, melancholiā, & pus. Quoad

3. Causa generans materiam tumoris.

I.

flatum; cum Aetio, Paulo, Auicenna, cum flatus pro sui generatione requirat materiam è qua, & agens: vitium attinere potest, modo ad agens, modo ad materiam è qua, modo ad vtrumque. Ad agens: dum ventriculi caliditas spectat vel ad calidum innatum imbecillum, vel ad intemperiem ventriculi: vt quamuis cibus non offeratur flatulentus, tamen ob imbecillitatem caliditatis ventriculi, vertatur in flatum. Attinet autem vitium ad materiam, dum ventriculus repletur vel humore pituitoso, vel similibus cibus, id est, vt ait Auic. si cibus sit in quo viget humiditas extranea: etenim, dum etiā est calidus ventriculus, non potest extraneam illam humiditatem resolvere, & propterea in flatum mutatur. Vnde si

ventriculus sit refertus materia flatulenta: si in hanc agat
 frigidus ventriculus, cum Paulo & Aetio ita agit, vt nullum
 vaporem efficiat, ob imbecillitatem: nam frigidus ventricu-
 lus nec potest attenuare, nec consumere, nec cibum dissol-
 uere. Si autem in materiã flatulentam agat ventriculus non
 frigidus, sed vehemēter calidus: generatur flatus nebulosus,
 verum in pauca quãtitate, vt per vnum vel alterum auctum
 euacuetur. Quare flatus generatur ē materia flatulenta, ab
 insigni caliditate: at nō est ita copiosus, vt possit esse in causa
 tumoris. Cæterum cum Auicen. inflatio fieri etiam potest à
 materia melancholica: sed tunc est tumor flatulentus con-
 iunctus cum siccitate. Pertinet deniq; vitium simul ad agēs,
 & ad materiam ē quæ dum calor est debilis, & materia est fla-
 tulenta. Quoad *materiam sanguineam*: cum esse possit, vel san-
 guis, vel ichor sanguinis: quoad sanguinem: patet, copiosum
 sanguinem generari ex alimento bono, & copiosi succi, à
 iecore calido & humido. Quoad ichorem: huius materia ē
 qua, est sanguis: agens calor intensior partis, in qua reperitur
 sanguis. Et ob id scribit Galeus cap. 2. lib. de tum. præter na-
 tur. sanie tenuiorem sanguinis, id est ichorem sanguinis,
 in inflammatione, generari ē sanguine vi caliditatis inflam-
 matorie, & proinde intensæ. Quoad *bilis*: patet eam gene-
 rari ē cibis biliosis, ab hepate calido & sicco. Quoad *pituitam*:
 & primum non salſam: hæc generatur ē materia frigida &
 humida, id est ē portione cibi frigida & humida: à frigido
 ventriculo, atque etiam à cerebro. At si pituita sit salſa, cum
 sit calida: sciendum, quod generetur ab agente tum putredi-
 nali, tum non putredinali. Et ob id sciendum cum Philoso-
 pho, causam immediatam salſedinis esse vaporem calidum
 exustum, mistum cum matēria aquea. Hic vapor calidus ne-
 cessario generatur à causa calefaciente: at causa hæc est pu-
 tredinalis, dum verbi gratia pituita ob putredinem sit salſa:
 namque calor putrefaciens, agens in pituitam, producit va-
 pore exustum: qui vt permiscetur cum portione aquea, est
 in causa salſedinis. Calor autem est non putredinalis, veluti
 cum pituita sit salſa, ob mitionem salſæ serosæ humiditatis,
 quæ serosa humiditas reddita est salſa, quia à calore insigni,
 portio serosæ humiditatis est cōuersa in vaporem exustum,
 qui mistus cum aquosa humiditate hanc salſam reddit: vt si
 deinde hæc humiditas serosa salſa, misceatur cum pituita nō
 salſa: pituita hæc euadit salſa: veluti, si misceatur aqua salita.
 cum

cum iure dulci, ius euadit salsum. Quoad *melancholiam*, ex alibi dictis patet generari à caliditate hepatis: quamuis atrabilis generetur à caliditate intēfiori. Quoad *materiam purulentam* cum Gal. com. vlt. l. i. progno. huius generationis gratia supponere oportet, requiri materiam è qua, & agens. Materia è qua, est sanguis dispersus per exiguas partes in loco inflammato: vt cum hic sanguis sit extra venas: non mutetur in substantiam partis: vnde est materia, è qua generatur pus: quare est materia prorsus nec benigna, nec maligna. Agens est calor partis inflammata: & est particeps gradus tum caloris naturalis tum caloris præter naturam: vt beneficio gradus naturalis, sanguis coquatur: vi autem gradus caloris præter naturam, putrescat: vt pus sit quiddam mistum, è sanguine partim concocto, partim putrefacto. Hinc pus optimum obtinet partes concoctas plurimas, putrefactas paucas: contra autem se habet, pus pessimum: sicuti mediocre pus, medio modo. Vnde cum portio concocta sit albicans, ad similitudinem partis, sit æqualis, sit læuis: portio autem putrefacta sit foetida: facile colligere licet, optimum pus esse candidum, æquale, læue, & minime foetidum, seu exigui foetoris, vt fiat ab ingenito calido, sed non plane vincente, propter calorem putredinalem, & materiam non prorsus benignam.

Si tumor ventriculi perpendatur secundum formam: cum sit magnitudo aucta, cum intemperie, lædens operationes: cum magnitudo aucta sit morbus, lædens operationes: differentia est secundum Magis & Minus. At tumor, vt habet iunctam intemperiem, diuisioni subiicitur: nam intemperies vel est Frigida, vt in tumore flatulento: vel Calida & humida, vt in inflammatione: vel Calida & sicca, vt in erysipelate, in cancro, in carbunculo: vel Frigida & humida, vt in œdemate: vel Frigida & sicca, vt in scirrho, vel Calida, vt in abscessu. Hi autem tumores ita se habent, vt detineant ventriculum vel secundum Totum, vel secundum Partem: & si secundum partem, vel Internam, vel Externam: Dextram vel Sinistram: Supernam, vel Infernam: Posteriolem, vel Anteriorem. Tandem ita se habet hic tumor, vt ratione efficientis secundum speciem fiat, vel à Vapore, vel à Minera. Si à minera, à materia vel Sanguinea, vel Biliofa, vel Pituitosa, vel Melancholica, vel Purulenta. Et ratione vitijs materiae: dicendum, ratione substantiæ: materiam vel

5.

6.

Differentia.

1.

2.

3.

esse Putridam, vel Non putridam, Ratione quantitatis, in copia Maiori, vel Minori. Ratione qualitatis primæ, materiam esse Calidam, vel Frigidam: & si calida fuerit, esse vel Calidam & humidam, vel Calidam & siccam: & si fuerit frigida, esse vel Frigidam & humidam, vel Frigidam & siccam. Ratione secundæ qualitatis, statuendum, esse vel Crassam vel Tenuem. Ratione quietis, dicendum, Magis vel Minus quiescere. Ratione motus: vt mouetur à termino à quo: mouetur vel à Toto, vel à Parte: ratione termini ad quem: vt ventriculus vel Attrahit, vel Suscipit. Et postremo, ratione causæ generantis, dicendum: vt materia morbifica est varia, ita diuersam esse causam generantem, prout vitium dependet è Parte vel Materiæ, vel Agentis, vel Vtriusque.

Signa.

1. Differentia à forma.

Facilime sensus tensionis manifestat ventriculi tumorem in genere: quamuis vix percipiatur in œdemate. Verū cum tumor possit esse modo maior, modo minor: cognoscetis, è vehementia & remissione symptomatum. Verbi gratia, si remissa sint symptomata, tumor indicatur parvus. Vtrum autem cum magnitudine morbosa sit coniunctus morbus vel calidus, vel frigidus, vel etiam alius morbus: cognoscitur potissimum è cognitione differentiarum, quæ capiuntur à causa efficiente: verbi gratia, dum cognoscimus tumorem fieri à sanguine: patet etiam cum magnitudine coniunctum esse morbum calidum & humidum.

2. Differentia à subiecto

Verum si afficiatur totus ventriculus: sensus vel dolorificus, vel gravitatis, cruciabit secundum omnes partes: vt, quomodocumque decumbat æger, noxam percipiat. At si tumor fuerit in parte, & quidem interna: cognoscitur è dolore, si asperior euadet, dum cibus ingeritur, & dum cibus concoquitur. Ratio est: quia dum cibus assumitur, per fibras rectas attrahitur, vt eo tempore tunica interna agitur: cum ergo dolor per quietem mitescat, per motum exacerbetur: & cum laboret tunica interna ventriculi in descensu cibi, ideo hoc tempore dolor intenditur. Et similiter dum cibus concoquitur, cum cibus internam tunicam tangat, sua copia, & quandoque etiam qualitate est in causa, vt tumor validius soluat continuum. Si autem afficiatur ventriculus secundum partem externam: cognoscitur, si post cibi concoctionem dolor augetur: & ratio est: quia post cibi concoctionem cibus ventriculum egreditur, vnde descendit in intestina, in mesenterium, vt in his partibus aliquantisper cibus

concoctus detineatur: unde dum cibus egreditur ventriculū, cum expellatur per fibras transuersas, quæ sunt insertæ in tunica externa: dolor in hoc egressu augetur: dum autem cibus in intestinis detinetur, & in mesenterio, similiter intenditur dolor; quia cibus ventriculū secundum tunicam externam comprimit: sed præterea & vapor, si acris sit, si post cibum concoctum petat ventriculū, est etiam in causa, ut dolor augeatur. Si autem tumor occupet ventriculū secundum partem dextram, vel sinistram: cognoscitur facillime è sede doloris. Similiter, si afficiatur ventriculus, secundum partem infernam vel supernam. Et, cæteris paribus, si tumor est in parte superna, dolor est acerbior: quia pars superior est exquisitioris sensus. Præterea cum affici possit ventriculus, secundum partem anteriorem, vel posteriorem: tumorem esse in parte anteriore, tactu deprehendi potest, ut figais non sit opus: si tumor sit in parte posteriori: si malum in posteriori parte pertineat potius ad externam tunicam, cognoscitur, quia æger peius habet, dum supinus decumbit: si autem tumor in parte posteriori spectet potius ad internas partes, cognoscitur, quia æger peius habet, dum pronus decumbit, quia molestior est ille decubitus, per quam pars affecta magis comprimitur.

Quoad differentias, quæ sumuntur à causa efficiente; oportet cognoscere, causæ morbificæ speciem, vitiū & causam generantem. Quoad speciem, cum sit materia flatulenta, sanguinea, biliosa, pituitosa, melancholica, & purulenta: Flatulenta indicatur è dolore extensiuo, citra sensum grauitatis: & præterea tangenti apparet ventriculus instar tympani: ventriculus item calidus ad tactum non deprehenditur: nec febris necessario subsequitur: adhuc iuuant, quæ discutunt flatus: & causæ sunt prægressæ, à quibus possunt flatus generari. Vtrum autem materia sit, vel sanguinea, vel biliosa, vel pituitosa, vel melancholica: cognoscitur è signis, de quibus diximus in sermone de intemperie ventriculi: cum materia. Sequuntur signa indicantia materiam purulentam, ut sunt, prægressa inflammatio, in qua, cum symptomata remitti deberent, intenduntur potius: quoniam scilicet sanguis non resoluitur, sed mutatur in pus: in puris autem generatione dolores & febres, & proinde symptomata augentur. Quoad vitij cognitionem: & primum vitij in substantia: Si materia, verbi gratia, est putrida: indicatur è febre, & reliquis

3. Differentia à causa effe.

Speciei signa.

Vitij signa.

cognoscitur ex aliqua cohibita euacuatione, ope cuius totum prius euacuabatur, verbi gratia, si aliquis sit consuetus vacuare sanguinem per nares, & supprimatur hæc vacuatio, & subsequatur inflammatio: statuendum est moueri à toto. Pars autem in ratione termini à quo, indicabitur è signis indicantibus huius vel illius partis vitium, verbi gratia, si tumor oriatur post capitis grauitatem, post suppressam capitis vacuationem, vel per os, vel per nares iudicandum est, terminum à quo esse cerebrum: & sic de reliquis. Quoad causam generantem: cum causa concurrens ad generationem, sit materia è qua, & sit agens: Si vitium attineat ad materiam è qua: indicabitur è victu præcedenti: verbi gratia, è cibus prægressis flatulentis, indicatur tumorem flatulentum generari à materia è qua. Si vitium pertineat ad agens: cognoscitur à mala dispositione alicuius partis: verbi gratia, si ventriculi tumor sequatur frigiditatem & humiditatem cerebri, facile poteritis iudicare, vitium non pertinere ad materiam è qua, sed ad agens, id est, ad intemperiem frigidam & humidam cerebri. Quod si contingat vt fiat tumor: posteaquam prægressus est victus malus, & sint signa imbecillitatis alicuius partis: dubio procul statuendum, vitium attingere non modo ad materiam è qua, sed etiam ad agens. Et quod dictum est de cerebro, deque ventriculo: dicendum est de qualibet alia parte. gr. si sint signa calidioris iecinoris, & sit, verbi gratia, erysipelas: facile iudicare poteritis, causam generantem attingere ad iecur, ad hoc determinatum agens. Quod si patiens, præter iecoris caliditatem sit vsus cibus biliosus: etiam leui negotio cognoscetis, vitium ratione generantis, pertinere ad vtrumque.

Signa causa generantis.

Præsidia non sumuntur à forma, quatenus hæc constituitur in magnitudine aucta, quæ non indicat vtile: Sed intemperies indicat per contrarium alterans. Quoad subiectum: cum sit ventriculus: quid indicet: & quid requirat, proposui in sermone de intemperie ventriculi. Materia autem morbifica indicat. Si enim perpendatur species, nihil aliud indicat, quam remedium determinatum: verbi gratia, si materia sit sanguis, & ratione quantitatis opus sit euacuare, ratione caliditatis, refrigerare, habetis remedium vacuans, remedium refrigerans: sed neutrum est determinatum: euadit autem determinatum ratione speciei: quia ratione sanguinis, remedium vacuans determinatur ad

*Indicatio 1.
nos.*

*1.
2.
3.*

*Indicatio 2.
specie.*

*Indicatio-
nes à vitio.*

sanguinem: refrigerans determinatur ad sanguinem. Quoad
materiae morbificae vitium: si ad substantiam spectes: indicat
eradicens: huiusmodi est materia *sterculenta*, putrida, & pu-
rulenta. Si vitium in quantitate: oritur indicatio minuendi.
Modi autem minutionis plures esse possunt: fit enim minu-
tio sensibiliter, vel insensibiliter. Insensibilis minutio fit per
modum repercussionis, resolutionis, vel exsiccationis: quem-
admodum locum habet in oedemate, teste Galeno cap. 3. lib.
2. ad Glauco. Si vitium pertineat ad qualitatem: hoc vitium
perpendendum est secundum qualitatem primam, vel se-
cundam. Quoad qualitatem primam: oportet per contra-
rium alterare: verbi gratia in tumore à statu, oportet cale-
facere: in inflammatione refrigerare: in oedemate ac scir-
rho calefacere. Quoad secundum qualitatem: materia cras-
sa attenuanda, tenuis, si fluxa est, non debet incrassari. Quae-
ri autem potest, quid statuendum sit de duritie, & de indica-
tionibus ratione scirrhi? Sciendum igitur cum Galeno cap.
4. libr. simpl. cum tumor durus fiat à materia dura, propter
ea indicari praesidium emolliens: sed cum hoc praesidium
emolliens sit nimis genericum: ideo subdit Galenus, cum
vna non sit indurantium essentia, sed triplex, ob id non
vnicam esse medelam. Cum autem indurantium triplex
natura in eo posita sit, quod materia morbifica peccat copia,
frigidityte, & siccitate: ideo oportet causa tumoris duris e-
uacuare, calefacere, humectare: vt haec sint praesidia emol-
lientia. Quamuis Galenus dicat loc. à medicis proprie voca-
ri praesidium emolliens, quod dirigitur ad duritiem, quae
fit à frigidityte: & si fiat durities à siccitate, nuncupari hu-
mectans: si à copia, vacuans: non autem emolliens. Sed de
nominibus nihil erimus solliciti. Ad rem. In scirrho ratione
materiae durae, oportet emollire: quare euacuare, caleface-
re, humectare. Quoad vitium, attinens ad vbi: hoc perti-
net ad quietem, & motum. Ratione quietis, nihil ex visu
indicari potest. Quoad motum: indicatur remedium retrahens
ad partes alias, à ventriculo. Quoad causam genera-
tem: variae sunt hauriendae indicationes, vt varia esse po-
test causa generans: verbi gratia si causa generans sit im-
moderata iecoris caliditas, oritur indicatio refrigerandi, &c.
Ceterum quaedam monebimus circa causam generantem
purulentam materiam, in abscessibus. Haec ergo postulat
praesidium in inflammatione, si metuitur ne haec degeneret in
abscessum

*Indicatio-
nes à cau-
sa generā-
te.*

*De prae-
sidio absces-
sum: &
vnde sup-
purantia
inducuntur.*

abscessum: nā si fiat inflammatio, quæ citra abscessum possit terminari: non est cogitandū de præsidio respiciente causam generantē pus. Si igitur inflammatio in pus & in abscessum mutetur: studendum est vix ut sanguis in bonum pus mutetur. Licet enim suppuratio non sit vera concoctio: propterea quod pus etiā optimum, nec indiuiduū, nec speciē seruat: est tamen puris generatio maturitas quædam putrescentis sanguinis, & hinc quoque concoctio, sed metaphorica: in qua portio benigna requiritur sanguinis, quantum fieri potest, & requiritur etiam calor naturalis. Cum igitur expediat, ut pus generetur, sed bonum, quantum fieri potest: ideo ad duo respicere oportet: nimirum ad sanguinem, ut habeat rationē materię: & ad calorem naturalem, ut habet rationem agentis. Quoad sanguinem, cum à benignitate recedat, ut putrescat: & quanto magis putrescit, tanto magis recedat à naturali statu: ideo ne putrescat, oritur indicatio refrigerandi & siccandi: cum putredo vigeat, vi caliditatis & humiditatis. Cæterum, cum sanguis putrescens quandoque ad frigidum vergere possit: ideo oritur indicatio calefaciendi. Si contingat, ut sit crassior: oritur indicatio attenuandi: si tenuior: incrassandi, ut bonum generetur pus. Quoad agens: cū sit calor naturalis, qui turbatur & offenditur in suppuratioe à calore extraneo: ideo in puris generatione indicationes sunt capiendæ, à calore tum extraneo, tum naturali. Vnde ratione caloris extranei, oritur indicatio refrigerandi: ratione autem caloris naturalis, hic seruandus est, secundum substantiam, seu quantitatem & qualitatem. Et cum caloris naturalis substantia sit vaporosa, qualitas sit caliditas: ratione substantię indicatur præsidium vaporosum: ratione caliditatis indicatur præsidium calidum, in eodem caliditatis gradu, in quo est pars, in qua debet fieri suppuratio. Et quia hæc dicta sunt magni momenti: non fuerit præter rationem, vtrumque dictum probare Galeni testimonio. Et primum, quoad præsidium vaporosum: hoc insinuauit Galenus, cap. 4. lib. 5. simpl. (*ubi mirari subit, quomodo hæc Galeni loca intelligant, qui statim non esse differentiam inter calidum insitum, & temperiem.*) Galenus ait, cataplasma est triticea farina confectum in natura temperata calorem non alterare, sed tantum in substantiam agere: vnde cap. 5. subdit, catellos, ventriculo impositos, calorem secundum substantiam & copiam augere, non secundum qualitatem: ut cap. 7. concludat, medicamentum pus

mouens, ad differentiam emollientis, quantitatem potius quam qualitatem augere: & propterea medicamentum pus mouens, quantitate potius quam qualitate agere. Et fundamentum est: nam calidum innatum secundum substantiam assiduo dissipatur: permanet autem idem caliditatis gradus, nisi aliquod extrinsecus occurrat: unde pus mouens, cum sit calidum in eodem gradu, in quo est calor: caloris qualitas non mutatur: & cum idem seruetur caliditatis gradus, calor naturalis secundum qualitatem non patitur. Hinc medicamentum pus mouens, quamuis tenuitate sua calefaciat: non dicitur tamen agere, quia non mutat caliditatem caloris naturalis, sed eam seruat. Verum cum pus mouens sit calidum & humidum, & proinde obtineat substantiam quæ prompte euaporat: ideo medicamentum suppurans habet substantiam vaporosam similem substantiæ calidi innati: ut propterea substantia calidi innati augeatur à vapore, seu à substantia vaporosa, prodeunte à suppurantibus. Proinde cum calidum mutetur secundum substantiam, & augeatur beneficio suppurantium: secundum hanc rationem patitur calidum innatum secundum substantiam, id est, secundum quantitatem: ideoque sicut calidum innatum secundum substantiam absumitur, ita operæ pretium est ut reparetur. Et, cum hæc sit vis medicamenti suppurantis, ut augeat caloris quantitatem, non qualitatem: iure Gal. dixit, suppurans agere non qualitate, sed quantitate. Ex his igitur colligi potest, satis differre suppuratorium ab emolliente. Sed Gal. c. 2. l. 3. simpl. ait, pus mouens esse calidum & humidum: & hac ratione fieri, ut corporis humiditas secundum substantiam consumatur, ut astringione sit opus & concludit Galenus, medicamenta suppurantia, nec substantiam absumere, nec augere. Propterea, cum è Galeno suppurantia modo augeant substantiam calidi innati, modo imminuant, modo nec augeant, nec imminuant: ideo ut intelligatis Galenum, sciendum, humiditatem in corpore existentem bifariam considerari posse: altero modo, ut pertinet ad partes similes, siue sit humiditas torida, siue sit humiditas appolita: deinde consideratur humiditas, ut pertinet non ad partes viuentes, sed ad calidum insitum. (Calidum insitum aliud est à temperamento: crasis enim pertinet ad partes similes, seu viuentes: calidum innatum est quid extra partes viuentes: ideoque calidum insitum obinet humiditatem, quæ est alia à humiditate partium viuentium.) His cognitis

satisfacientes difficultati, dicimus: si primo modo sumatur humiditas, ut pertinet ad partes similes: hæc non augetur à suppurantibus: Si autem secundo modo sumatur humiditas, scilicet ut attinet ad calidum innatum: secundum hanc rationem pus mouens potest augere substantiam calidi innati: & ita est intelligendus Galenus cap. 5. Hæc solutio est Galeni cap. 4. lib. 5. simplic. ubi ait, pus mouens naturales partis humiditates, nec augere, nec minuere: sed augere naturalis caloris humiditatem, non partis. Hactenus igitur locuti sumus de præsidio vaporoso. Quoad præsidium calefaciens: indicatur hoc à calido insito: quod ut seruetur, suppurans postulat in eodem caliditatis gradu, in quo est calidum innatum. Hæc veritas confirmatur Galeni testimonio: ait enim cap. 2. lib. 5. simpl. pus mouens esse ita calidum & humidum, ut caliditatem producat similem corpori. Et addit cap. 5. pus mouens, obtinere crasin æqualem: ut vim habeat potius conseruandi, quam alterandi partes, in quibus fit suppuratio: ut in suppuratione augeatur humiditas, & calor conseruetur. Ceterum animaduertere oportet, non adesse materiam, quæ possit & substantiam augere, atque etiam calorem conseruare, nisi omnia absint, quæ adiumentum præstent: ut si verbi gratia sanguis, qui debet mutari in pus, iusto sit humidior, & caro sit contusa. Propterea in phlegmone, dum animus est pus generare: ratione sanguinis, si contingat ut sit vitiosus, per contrarium corrigendus, calor extraneus remittendus, & refrigerandus: opus etiam est augere substantiam caloris naturalis, & seruare temperiem. Sed dubitatio oritur: si quidem quispiam suspicari posset, nos fuisse diminutos. Nam Galenus cap. 8. lib. 5. simpl. ait, medicamentum suppuratorium opus esse, ut sit emplasticum, viscidum: & rationem reddit, inquit: cum pori nostri corporis debeant occludi, ut halituosus spiritus includatur: opus esse, ut pus mouens sit viscidum. Nihil autem nos de visciditate diximus? Responso facilis est: etenim verum est, ad suppurationem celebrandum opus esse præsidio, donato caliditate simili, cum caliditate corporis, & vaporosa substantia, & præterea opus esse, ut sit emplasticum. Verum hoc præsidium ita se habet, ut ea ratione qua proponitur calidum, dirigatur in qualitatem caloris, id est, indicatur à qualitate caloris: ut vaporosum, dirigatur in substantiam caloris, id est, indicatur à substantia caloris. At viscidum, non dirigatur in calidum innatum:

quia

quia si dirigeretur, doctrina nostra fuisset diminuta: dirigetur ergo in medicamentum pus mouens, quod est calidum, humidum, vaporosum: & propterea, ut est tenue, cum huius causa vim habeat nocendi, eget correctione, & proinde mixture viscidum medicamenti: nisi contingat, ut medicamentum pus mouens sit etiam viscidum, quemadmodum est triticea farina: at si verbi gratia usurpetur aqua dulcis: optimum est permiscere oleum, ut corrigatur aquae tenuitas: & medicamentum fiat calidum: vaporosum, & emplasticum. Verum cum hæc doctrina pertineat ad methodum medicamentorum: ideo de præsidio hoc plastico rationabiliter in sermone de indicationibus nihil à nobis dictum fuit.

Prognostica in genere.

Tumor ventriculi est malum insignis momenti: nam necessario adest vehementia & essentiae, & dignitatis. Essentiae quidem adest vehementia: nam dum tumor lædit operationes, ut non habeat rationem symptomatis, sed morbidum procul est magnus recessus à naturali statu: quare insignis vehementia essentiae. Et præterea intenditur vehementia essentiae: quoniam in ventriculi tumore, de quo loquimur, quæ sunt præter naturam, sunt plura: siquidem annexa est intemperies: est enim morbus in magnitudine aucta, cum intemperie. Dignitatis adest vehementia: nam afficitur ventriculus, qui ducere potest in consensum præcipua viscera: & cum Gal. c. 17. lib. 11. meth. instar hepatis alimentum concoquit pro toto corpore: ut in tumore tum iecoris, tum ventriculi, opus sit tenuiori cibo quam in aliis tumoribus. Vnde Gal. c. 5. l. 10. meth. loquens de ventriculi inflammatione, ait: vitium esse mortiferum, his patientibus, qui imbecillas obtinent vires: nam inflammatio prohibet alimentum, quo tamē eget virtus debilis. Adhæc vehementia dignitatis intenditur, cum hoc vitium spectet ad intemperiem: quoniam cum Gal. c. 12. l. 7. meth. etiam temperies dignitatem sibi vehementem vendicat. Concludendum ergo tumorem ventriculi non exigui esse momenti. Sed pro vi differentiæ periculum intenditur.

Prognostica à forma.

Quoad differentias ratione formæ, cum sit magnitudo aucta cum intemperie: quoad vehemētiā essentiae, ratione magnitudinis auctæ: ut magnitudo est vel magis, vel minus aucta, ita intenditur & minuitur periculum. Ratione autē intemperiei: quid possit intemperies, diximus in serm. de intemperie ventriculi. Quoad vehemētiā dignitatis: est summa vehementia, si afficiatur totus ventriculus: remissior

Subiectio.

vehemen

vehementia, si afficiatur secundum partem. Et quoad partem, est remissior dignitatis vehementia, si afficiatur ventriculus secundum partem externam. Quoad internam: remissior est vehementia dignitatis, si afficiatur ventriculus secundum partem internam, nam minus imminet vehementia facultatis. Quoad differentias quæ sumuntur ab efficiente, primû *A causa efficiente.* varia est vis, pro varietate speciei, pro discrimine vitij, pro diversitate causæ generantis. Declaro, sed posthabita vehementia dignitatis: idem enim dicendum esset, quod modo est propositum. Quoad speciem: cum sit flatus, sanguis, bilis, pituita, melancholia, & pus: notandum, flatum magis recedere à naturali statu, quam recedat sanguis: minus tamen periculosum esse tumorem flatulentum, quam sit tumor inflammatorius: ratio est, quia licet vehementia essentia sit intensior in flatu, quam in sanguine, vt hæc materia secundum speciem perpenduntur: tamen si invicem cõferantur penes vitia, cum sanguinis vitium sit vehementius vitio flatus, propterea statuendum, tumorem flatulentum esse minus periculosum. Quoad mineram: malum est mitius, si fiat à sanguine, quam si fiat vel ab ichore sanguinis, vel à bile, siue flava, siue atra. Vt, si seruetur paritas, minoris discriminis sit inflammatio, quam erysipelas, cancer, carbunculus: nam horum tumorum materia magis recedunt, quam recedat sanguis. Si autem materia sit vel pituitosa, vel melancholica: sunt materia quæ secundum speciem magis recedunt à natura, quam sanguis: natura enim posita est in calido & humido, qualis est sanguis: pituita autem est frigida & humida: melancholia frigida & sicca: interim tamen inflammatio est magis periculosa œdema & scirrhus: nam sanguis est maioris actiuitatis, vt immineat vehementia facultatis. Quare vehementia essentia, prodiens à materia specifica, prout recedit à naturali statu: & præterea vehementia facultatis, prodiens à causa specifica: ita se habent, vt necessarium sit statuere, maius esse discrimen, dum adest maior actiuitas: & hinc fit, œdema & scirrhus, cum pendeant à specie magis recedente à naturali statu, sed exigua actiuitatis, tumores esse minus periculosos, quamvis longiori tempore possint expugnari. Si invicem conferantur pituita & melancholia, statuendum est, melancholiam magis recedere à natura, nec minoris esse actiuitatis: & proinde scirrhus esse magis periculosum œdema.

Tandem

*Prognosti-
ca viij.*

Tandem si materia sit purulenta: huius vehementia, si dirigatur ad speciem, est satis insignis: siquidem pus etiam optimum est à toto genere præter naturam, & propterea minatur vehementiam facultatis: nec præter rationem, quoniam est malum, quod sequitur inflammationem, vi cuius facultas reddita est debilis: & præterea non est materia purulenta exiguae actiuitatis, cum producat vlcus. Quod si perpendatur materia vitium, & primo secundum substantiam: si materia sit putrida, malum est magis periculosum, nam magis recedit à natura: & propterea quo putredo est insignior, eo etiam tumor est periculosior. Idcirco recte statui potest, inflammationem, erysipelas, cancerum, carbunculum, abscessum, esse vitia admodum periculosa: atque prout hæc mala pendent à materia insigniter putrescente, sit etiam ut magis hi tumores periculosi euadant: quoniam vehementia insigni essentia additur vehementia facultatis. Secundum quantitatem vitium quo maius est, ita etiam augetur periculum: vnde Galenus cap. 9. lib. de tumor. præter naturam dicit: dum magna est inflammatio, imminere gangrænam, & hinc sphacelum, & mortem: ratio est, quoniam in gangræna membrum corrumpitur solum secundum partem, in sphacelo secundum totum. Notandum autem oriri hæc incommoda, cum Galeno cap. 9. libr. 1. ad Glaucon. propterea quod gangræna sit è magna inflammatione, & hinc è copioso admodum sanguine, vnde sanguis ita abundat, ut arteria ex angustia loci non possint attolli: quo fit ut adimatur transpiratio: adepta autem transpiratione calor in situs suffocatur, & materia inflammationis malignior euadit, hincque vis impertitur cordi, & sequitur mors.

Si prognosticum capiatur à materia, ut peccat secundum qualitatem: primum, quoad caliditatem & frigiditatem, statuendum est, vitium esse magis periculosum secundum caliditatem, quam secundum frigiditatem: ratio est: nam ubi viget caliditas, est contrarietas inter indicationes: quæ contrarietas non adest, dum materia peccat frigiditate: & propterea dum viget caliditas, vehementia essentia est insignior. Hoc confirmatur: nam dum materia caliditate peccat, resoluentia materiam, ut calida, caliditatem inteodunt in tumore autem frigido, resoluentia, quatenus calida, frigiditatem remittunt. Et si inuicem conferantur tumores calidi: quo materia erit calidior, malum erit magis periculosum:

losum : vnde erysipelas est malum magis periculosum, quam inflammatio : quoniam in erysipelate caliditas est intensior. Idem est statuendum de materia frigida, Quoad materiam, vt est vel crassa, vel tenuis : crassa est periculosior : vnde scirrhus est vitium periculosius, quam œdema : & propterea carbunculus, cum producat a materia & vehementer calida, & crassa : ob id hominem citius interficit, quam cancer. Quoad vitium secundum quietem : sicuti materia magis quiescit, ita vitium est magis periculosum : vnde status facilius superatur, difficilior tumor œdematosus, adhuc difficilior tumor scirrhus : quoniam in scirrho materia pertinacissime quiescit. Quoad motum : pro varietate & termini a quo, & termini ad quem, varie prognosticandum. Ergo, si moueatur materia a termino a quo principali, vt a cerebro, & eo ipso vehementer affecto : & ventriculus in ratione termini ad quem, potius suscipiat, quam attrahat : malum erit periculosius : si contra, minus periculosum. Quoad causam generantem : si vitium attineat solum ad materiam & quia tumor facile superari potest. Excipitur autem abscessus. Hac enim ratione in tumore flatulento, si fiat a cibis flatulentis in erysipelate, si bilis fiat a cibis biliosis : bona est salutis spes : at si in abscessu sanguis sit vehementer putrefactus : tunc, quamuis vitium sit solum ratione materiae, tamen vitium est periculosum : quoniam a sanguine vehementer putrefacto generatur pus, quod pessimum est : & propterea vehementia adest secundum essentiam. Quoad agens : cum sit dyscrasia partis, & praeterea sit etiam partis calor naturalis dubio procul periculosior est tumor, si intemperies est admodum intensa, & calor naturalis imbecillis : siquidem adest admodum insignis vehementia essentiae : contra statuendum, si intemperies sit remissior : si calor naturalis minus imbecillis.

*Prognostica
ca se gene-
rantis.*

Ratione euentus : quomodo futurus sit ad bonum, vel malum, diximus : ytrum autem cito vel tarde sit futurus : huius cognitio desumitur a materia, & intemperie. Quoad materiam : sicuti materia modo velocius, modo tardius mouetur : ita etiam indicat de euentu. Quare in tumore frigido tardus euentus, quoniam materia tarde mouetur : quemadmodum in œdema, in scirrho, ad differentiam inflammationis, & erysipelatis. Quoad intemperiem : prout intemperies

*Euentus
qualis &
quādo spe-
randus.*

est

est maioris resistentiæ: ita est causa tardioris euentus: quem admodum est intemperies in habitu ad differentiam intemperiei in habitudine.

De Curatione.

*Cheirurgia
Sanguinis
vacuatio.*

Quoad materiam cheirurgicam: hæc dirigi potest, vel ad Sanguinem, vel ad Alias materias. Si dirigatur ad sanguinem: patet probari venæ sectionem, hirudines, cucurbitulas, quotiescunque vitium est in sanguine. Quare cum in tumore calido vix fieri possit, vt non peccet sanguis: ideo in tumoribus calidis, propositas materias vlurpabimus. Excipitur tumor calidus purulentus. Nam cum hic tumor purulentus, id est, abscessus, sequatur inflammationem: & rationi consonum sit, venam fuisse sectam, causa inflammationis: & vires esse debiles: non præter rationem est desistendum à vacuantibus sanguinem in abscessu. Cæterum, quoad tumores frigidos, id est, inflammationem, œdema, & scirrhum: in his cum generetur chylus pituitosus, vi cuius fit, sanguinem potius deficere: propterea in tumoribus frigidis non est sanguis vacuandus. Hæc de cheirurgia, vt respicit sanguinem; vsus ex alibi propositis patet.

*Aliorum
humorum
vacuatio.
Pus vt e-
ducendum.*

Quoad cheirurgiam, vt respicit alias materias à sanguine: materia hæc morbificæ vel Fluunt, vel sunt Fluxæ. Si Fluant: probantur fonticuli, & potissimum in tumoribus frigidis. Si autem materiæ sint Fluxæ: materia cheirurgica probatur in abscessu, & in tumore flatulento. Declaro: quoad abscessum, quandoque ad ferrum confugiendum: non tamen in omni abscessu. Vnde Galenus ait, cap. 5. lib. 13. meth. Si pus notabile in suppurante particula sit contentum, non expedit, quod nonnulli faciunt, protinus incidere: sed digerentibus est procedendum. At si contingat puris copiam non posse superari à medicamentis, oportet secare: nam oportet pus egredi, quod digestionem non cedit. Dicit autem Galenus loco citato secandum esse, vbi pus notatur editissimum: nam ibi cutis est tenuissima: & probat Galenus sectionem non magnam, quæ myrti folia imitetur: in qua incisione, cum longitudo sit maior latitudine, obiter admonet Galen. in abscessu inguinum longitudinem per transversum esse ducendam, non autem per membri rectitudinem. E quibus verbis colligendum: primum, cum pus vacuari possit, & insensibiliter, & sensibiliter: tutius esse insensibiliter euacuare.

Verum,

Verum, si puris copia vrgeat, necessarium esse sensibilibiter euacuare. Secundo colligendum: cum materia quæ euacuatur sensibilibiter, sit tum medicamentis, tum materia cheirurgica sensibilibiter vacuanda: quoad medicamentâ, deinceps proponenda, hæc probantur, dum abscessus attinet ad partem internam. Quoad ferrum: ad hoc confugiendum, dum abscessus extra vergit: incisioque utilis est eo loci, ubi pus est magis immitens: ibi enim tenuior cutis est. His verbis Gal. respicit ad *ubi agendum*, ratione ferri: nam cum ubi agendum indicetur à subsistentia secundum regionem ventriculi: quemadmodum sectio ratione materiæ morbificæ opportunior est in regione attinente ad ventriculum: expedit tamen causa virtutis, non indifferenter secare, sed incidere partem, cuius sectionem melius sustinet virtus: hæc autem pars est tenuior quam cognoscimus ex eminentia puris. Præterea notandû, cum Galenus dixit, probari sectionem ad similitudinem foriorum myrti: proponere Galenum sectionis *modum*, qui est extra methodum medendi, & attinet ad doctrinam materiæ cheirurgicæ. Et ideo extra methodum medendi datur non tantum methodus medicamentorum, & alimentorum, sed etiam materiæ cheirurgicæ. Ratione flatulenti tumoris: si dolor vrgeat, (cap. 6. lib. 2. ad Glau.) magna cucurbitula, cum copiosa flamma applicanda, ubi est status,

*Flatuum
vacuatio.*

Non loquar de communibus medicamentis: de his enim dixi in cephalalgia, & dyscrasia ventriculi: & quæ desiderantur, proponuntur in doctrina de febribus. In præsentia autem oportet respicere ad medicamenta, quæ diriguntur ad materiam tumoris. Et in genere ratione cuiusque materiæ debent esse medicamenta euacuantia: causa abscessus etiam pus mouentia. Et præterea si perpendamus medicamenta causa abscessus: sunt vacuantia insensibilibiter: dum materiam vel intro pellunt, vel foras euacuant, vel siccando absumunt. De his ergo dicendum: ut constet in quibus tumoribus hæc medicamenta sint vsurpanda: & quæ magis in vno, quam in alio. Reprimentia dimittenda sunt in tumore flatulento, in œdemate, in scirrho, in abscessu: nam horum tumorum materiz, reprimentibus non cedunt, sed vi reprimentium magis contumaces euadunt. Probantur autem in inflammatione, in erysipelate, cancro, carbunculo. Verum in tumore calidiore reprimentia sunt magis efficacia. Atque in omni tumore notandum, e cap. 20. lib. 13. metho. dum medicamenta

*Pharmacia: ad
materiam
tumoris.*

*I. Reprimentia.
Cautio, de
reprimentibus vi-
triosis
& acerbis.*

exhibentur, *abstinendum esse à chalcantio, misy, sorty, &c.* quibus vis corrumpens est mista. Exhibet autem Galenus c.6.l. 5. metho. nam in sputo sanguinis ex erosione probat pastillos Andronios, qui conficiuntur è chalcantio. Sciendum chalcantium, & alia id genus medicamenta, bifariam accipi posse: vel ut astringunt, vel ut siccant. Si capiantur ea ratione, qua astringunt, & habent vim reprimendi: non sunt medicamenta hæc è chalcantio exhibenda: ratio est, quia non caremus medicamentis aliis, quæ sunt amica naturæ, quæ reprimere & ipsa valeant ad similitudinem chalcantii: verbi gratia, balauustum, hypocistis, quæ non minus astringunt, quam chalcantium, & propterea non debemus uti chalcantio, cum alia sint medicamenta tutiora, æque astringentia. Si sumantur vitriolata, ut habent vim siccandi: his medicamentis quandoque uti cogimur: dum scilicet celerrime est exsiccandum, quemadmodum in profusione sanguinis, è materia erodente: nam si ilico occurramus, nisi quamprimum materia illa abradens absumatur & exsicceetur, nulla relinquitur salutis spes: & potissimum medicamento è chalcantio uti cogimur: quoniam desiderantur alia medicamenta amica, quæ ita siccant, quemadmodum pastilli è chalcantio confecti. Sed ad rem redeamus: cum in tumore ventriculi opus sit uti reprimentibus, modo intensioribus, modo remissioribus, ut tumoris materia, est vel magis, vel minus calida: primum, si tumoris materia ab insigni feruore recedat, id est, si non sit admodum calida: probatur medicamentum confectum è *mentha, mastiche, absinthio*, & *misu cydoniorum simplicis*. Si calidior sit materia: probatur medicamentum confectum è *rosis, santalis, è capbura, è cydoniis, è myrto, granatis*, & *succo immaturo vel limonis, vel citri, atque omphacis*.

*Materia
reprimen-
sum.*

*Vsus reprimen-
suum.*

Quoad rectam horum medicamentorum administrationem: in primis quoad quantum agendum: cum reprimentia possint esse vel minus, vel magis frigida: præterea possint administrari & intus, & extra: quoad minus frigida, & quæ potius assumuntur, seu intus administrantur, hoc præscribi potest: *℞. pulueris mentha, mastiches, absinthij pontici ana ʒ xv. cum misu cydoniorum simplicis, fiat pilula, Num. v. & omnes exhibeantur.* Si autem medicamentum est applicandum, hoc modo præscribetur: *℞. olj rosar. completi, mastichini, de absinthio ana ʒ ʒ. pulueris mastichis, nucum cupressi, specierum dia-*

rhod.

rhod. Abb. ℥ viij. cera lota in vino tenui ℥ ij. Misce, fiat linimentum. Animaduertetur in hoc medicamento reprimente: imponi ceram, lotam non vino crasso, sed tenui, ut sit vehiculum reprimentium. Quoad reprimentia frigidiora, & primum si exhibeantur: ℞. pulueris rosarum rub. coralliorum rubrorum, santalorum rub. ana ℥ ss. caphura ℥ v. cum omphacio, vel vino granatorum, vel succo cydoniorum, fiant pilule, Num. v. Si autem medicamentum est applicandum: ℞. carnis cydoniorum, sub cineribus decocta, carnis pirorum immaturorum similiter decocta ana ℥ ss. succi passularum immaturarum ℥ ij. granati integri & confusi ℥ ij. pulueris ros. rub. santalorum, corticis cucurbitæ, portulacæ ana ℥ viij. olei cydoniorum, myrtini ana ℥ vj. olei mastichini ℥ ss. farina hordeacea ℥ j. fiat emplastrum.

Quoad modum: in tumore calidiori, reprimentia actu frigida, sed moderate, exhibeantur & moderate calida admoveantur. In tumore autem minus calido, actu calida sunt usurpanda reprimentia: at minus calida sunt exhibenda, magis actu calida dum applicantur. Ratio est: quoniam tumoris materia calidior, valentius fluit & mouetur, ideoque agrius cedit reprimentibus: unde, quæ actu frigida sunt, cum efficacius reprimant, in calidiori materia potissimum probantur. Verum actu frigida vehementer, prohibet calor ventriculi: siquidem ventriculi calor similia postulat: & multo magis actu frigida, prohibentur, à partis externæ calore: nam hic est imbecillior calore ventriculi: accedit, in medicamenta quæ applicantur actu frigida, vim suam reprimentem non posse communicare materiæ lædenti ventriculum, quemadmodum efficere possunt, quæ exhibentur intro: & ob id reprimentia actu frigida possunt exhiberi, non debent autem applicari.

Quoad quando agendum: reprimentia administranda, dum materia morbifica reprimenda præsens, vincit alia indicantia: quare sunt administranda, & post totius euacuationem, & dum materia fluit, vel iamiam est fluxa, & nondum est impacta. Et ob id reprimentia probantur in principio & augmento: & valentiora in principio: non probantur in statu, neque in declinatione: nam impacta materia reprimentibus non cedit. Nec improbandi sunt medici, qui & in statu, & in declinatione vtuntur oleo mastichino, vel de absinthio: nam hi prudentes medici his medicamentis non

vtuntur tanquam reprimentibus, sed gratia caloris naturalis, ne dissoluatur: ideoque hæc adstringentia miscent, ad corrigendum resoluentia.

2. *Emollientia*, seu *resoluentia* *ambecilliora*.

Quoad *Resoluentia*, e cap. 4. lib. 2. ad Glau. sunt duplicia: nimirum vel debilia, & vocantur *Emollientia*: vel *validiora*, & nomine generis dicuntur *Resoluentia*. Quoad *emollientia*, de his dicit Gale. *emollientia* vocari, quæ calorem habent tepidum, non vehementem, & humiditatem nec multam, nec omnino minimam: etenim, vbi minima est humiditas, medicamenta plus quam oportet siccant: vbi autem copiosior est humiditas, medicamenta nihil omnino resoluunt. *Emollientia* igitur habent vim resoluendi: dicant alij quicquid velint. Et Gale. cap. 2. lib. 5. simpl. ait, *emollientia* esse calida & humida: ea ratione, vt sint calidiora pus mouentibus, & ob id intensiorem accedant caliditatem, quam sit in corpore patiente, vt resoluant, hincque resolutio fiat vi caliditatis, cui humiditas non suffragatur, quoniam humiditas est admodum exigua: sed nec humiditas refragatur, quoniam admodum copiosa non est. Quare *emollientia*, cum vim obtineant resoluentem, & dum fit resolutio, fiat exsiccatio: rationabiliter Gal. cap. 6. lib. 5. simpl. statuit *emollientia* calefacere & exsiccare: calefaciunt quidem, nam sunt calidiora corpore patiente: siccant quoniam vi caliditatis, insensibiliter per halitum digerunt. Quanquam autem *emollientia*, & pus mouentia excedunt caliditate, & calidiora sunt corpore patiente: tamen non sunt magnopere calida: & hinc cap. 6. lib. 5. simpl. & cap. 4. lib. 2. ad Glau. Galenus ait: *emollientia* præter id, quod sensim per halitum digerunt, materiã concretam, seu conrelatam fundere: vt materia quid simile patiat, illis, quæ sub Sole funduntur. Et propterea cum *emollientia* non nihil sint calidiora passo, & præterea aliquantisper humida: fit vt hæc in medicamenta prorsus aduersentur, durities: nam, cum durities fiat à concretionem, à repletionem, & à siccitate: & hæc omnia concurrant in scirrhus: medicamenta *emollientia*, per calorem occurrunt concretioni: per calorem intensiorem caliditate corporis, occurrunt repletioni, vt insensibiliter minuunt: & tandem *emollientia*, quatenus humiditatem continent, occurrunt siccitati: & propterea materia morbifica siccior, sicuti ope humiditatis attemperatur, ita à caliditate promptius funditur & digeritur. Cum ergo hæc sit *emollientium* naturam iure Galenus cap. 4. lib. 2.

Materia
emollientium.

ad

ad Glau. pro exemplo proponit medullas, adipēs, & cap. 7. lib. 5. simpl. proponit bāclium, styracem, galbanum, ammoniacum, sed probatur etiam malua, albaea, & hæc simplicia secundum radices, secundum folia, flores, & mucilaginem: addatis passulis dulces (non acerbæ) fenugracum, melilotum. Inter composita, emplastrum de meliloto, diachylon simplex, diachylon cum gummi.

Vnde pro iunioribus si medicamenta exhibeantur: ꝑ. ammoniaci ʒ ss. cum mucilagine albaea, fiat pilu. iij. quibus deuoratis, exhibeatis ʒ j. passularum, cum decocto radi. albaea ad ʒ j. Acceptis pilulis pro emollitione: hoc illico medicamentum exhibeatur: ꝑ. caricas Num. iij. passularum dulc. ʒ j. rad. alb. ʒ ij. aqua communis lb j. fiat decoctio ad consumptionem unius tertie. ꝑ. prædicta decoctionis ʒ ij. fiat potio. Si autem extra sint applicanda emollientia: ꝑ. medulla vitulina, adipis anserini, ana ʒ ss. ammoniaci, bdellij, ana ʒ j. mucilaginis albaea, seminum lini, ana ʒ ij. olei amygd. dulc. ʒ j. & pro relaxantium correctione mastiches ʒ ss. Misce. Hæc de quantum agendo, ratione emollientium. Quoad modum: emollientia actu calida sunt administranda: nam agunt caliditate, & præterea materia emollienda ope caliditatis funditur: adhæc materia vacuanda magis cedit actu calidis. Quoad tempus: vtendum emollientibus, dum materia dura præsens vincit alia indicantia, id est, dum durities pendet à concretionē & siccitate: siquidem, si pendeat solum à repletionē, prout materia replens vincit, pro eo licet vtī potius vehementer resoluentibus, quam emollientibus. Hæc dicta sint de emollientibus, id est, de debilitē resoluentibus.

Quoad valide resoluentia: hæc sunt calida & sicca, tenuium partium, & probantur in tumore tum calido, tum frigido: & ob id Galenus cap. 21. lib. 13. metho. eadem probat, & in phrenitide, id est, in tumore calido, & in lethargo. De quibus resoluentibus diximus in dyscrasia frigida ventriculi cum materia: Sed propter iuniores notandum: probari medicamentum, si conficiatur de schænantho, calamintha, maiorana, serpillio, melissa, aromatibus, guaiaco, sassafra: & inter composita probatur diatriopiperon, diacynum, diagalanga: probantur etiam trochisci de rhabarbarea magna antidoti: item olea & cerata ex his confecta. Hinc Galenus cap. 6. lib. 2. ad Glau. in tumore flatulento probat medicamentum confectum ex oleo, in quo ebullierint medicamenta calida, & tenuis substantia: quemadmodum off. cuminum, semen apij, marastri, dauci, & similia. Et si con-

Vsus emollientium.

3. Resoluentia valide.

Materia resoluentium.

tingat, vt frigidior fit ventriculus, licet addere *rustam, granum lauri, oleum laurinum, item vinum generosum, in quo fieri debet decoctio in duplici vase, ad consumptionem vini.* Auicennas ad resoluendum materiam in potu exhibebat *castoreum, cum oleo & antiquo, & aceto scillitico.* Vt mirandum non sit, si nos hoc tempore non extirpemus tumores ventriculi, quia solum iniuriis vtimur. Vnde propter iuniores: *Bz. castorei ℥j. olei aursui, aceti scillitici ana ℥j. Misce, & fiat potio.* Aetius dicit, *aristolochiam longam & rotundam ad ʒj. exhibendam.* Dat etiam decoctum *calamintha, aut polyi scilicet montani, cum exiguo melle, & paucissimo pipere, tenuissima trito.* Probat etiam *Aetius ouilium talum, vstum bibitum.* Idem ad extra probat *vesicam bubulam, aqua & oleo semiplenam: sed loco aquae, etiam vino uti licet.* Et urgente necessitate, ascendis etiam ad *cataplasma è sinapi.* Hæc de resoluentibus: quorum vsus patet è traditis de intemperie ventriculi. At notandum, *pituitam, & edematis causam, quid peculiare postulare.* Nam expedit, cum medicamentis calidis & siccis, tenuisque substantiæ, miscere astringentia: quod Galenus tradit cap. 3. libro 2. ad Glauc. statuens, in edemate curationis intentionem esse mistam: cum expediat aliquid substantiæ dissoluere, & aliquid congregare, & restringere: nec præter rationem: siquidem è cap. 6. libro 7. meth. austeram medicamentam humiditatem absumunt, dum partim ebibunt, partim in sinum ventris per exiguos meatus humiditatem exprimunt, partim ad continentes partes trudent: Et propterea hæc sunt inedicamenta quæ euacuant, seu consumunt: sed exsiccando, non autem quod euocent materiam ad circumferentiam: vt componantur hæc medicamenta *ex aceto, sale, cinere: ideoque probatur lixinium cum alumine.* Hæc de medicamentis causa cuiuslibet tumoris: excepto tamen abscessu.

4. Suppurantia.

Materia suppurantes.

Quoad medicamenta igitur, quibus uti licet gratia abscessus: scire oportet hæc esse pus Mouentia, & pus Euacuantia. Quoad pus mouentia: sunt quæ fouent calidum innatum, quod pus optimum generat, & præsertim si foueatur. Quare probantur medicamenta calida, humida, vaporosa, viscida: & cum Galenus cap. 8. libr. 5. simp. non mordacia, seu acria, quæ vim habent liquandi, attrahendi, & non adhaerent parti: Oportet autem vt medicamentum pus mouens parti adhaereat. Quare è cap. 4. libr. 5. simpl. probatur

farina

farina triticea, quæ è cap. 8. libro 5. simp. debet esse pura, sine surfuribus: siquidem est calida, humida, emplastica, mordacitatis expers: probatur item medicamentum confectum è caricis pinguioribus, è dactylis pinguibus, ex amygdalis dulcibus, althæa, malua, oleo communi, adipe suillo, vel gallinaceo. Quibus medicamenti quandoque addenda sunt frigida, quandoque calida: frigida quidem, ratione calidioris sanguinis, vel calidioris ventriculi: item, si à calore extraneo turbetur calor naturalis: calida vero ratione frigiditatis vel sanguinis, vel ventriculi. Quoad frigida igitur: erunt veluti decoctum cydoniorum, violarum, cum exiguo lacte vel asinino, vel caprillo, & horum copia cum non adest, licet uti lacte vaccino. Calida sunt, veluti medicamentum confectum è granis pini, cum exiguo croco: licet etiam vel radicibus petroselinæ, sed viridibus: quia loquimur non de resoluendis, sed de pus mouentibus. Præterea probatur medicamentum confectum è sapa. Adhuc probantur semina lini, radices cucumeris agrestis, farina orobi, oleum anethinum, liliorum alborum, diachylon cum gemmis. Hæc de pus mouentibus. Quorum usus hic esse potest: si pus mouentia exhibeantur: R. caricarum, dactylorum ana ʒss. lactis amygdaleni ʒj. sapa ʒss. Misce. Et huius medicamenti dosis sit à ʒij. ad ʒj. Si autem pus mouens est extra administrandum: R. adipis suilli, rad. althæa sub cineribus decocta ana ʒss. olei amygd. dul. ʒj. farina triticea pura ʒvj. & fiat emplastrum. Modus horum medicamentorum est, ut medicamentum pus mouens nunquam actu frigidum administretur. Et tempus opportunum est, dum sanguis, qui in pus mutari debet, vincit alia indicantia: & patet vincere alia indicantia, dum est copia, ut non possit resolui. Et locus etiam patet: nam, cum calor naturalis, & sanguis in pus mutandus, subsistentiam habeant secundum ventriculum: & per os, & extra hoc medicamentum est ministrandum: quamuis liberalius modo intro, modo extra: prout sanguis attinere videtur ad partes vel intimas, vel extimas.

Cum autem medicamenti quoque pus sit vacuandum, non improbantur proposita resoluentia. Sed oportet etiam quandoque confugere ad medicamenta vacuantia sensibilibus: quæ habent vim attenuandi, laxandi, & soluendi continuitatem parietum abscessus: ut hinc pus facile egrediatur: veluti est medicamentum confectum è decocto caricarum, passularum, glycyrrhizæ, malvarum, addita mulsæ, cum pipere,

vsus hic
non habet.

§. Evacuatio
pus, sensibilibus.

vsm.

te radice ieros. Et urgente necessitate, ascendendum ad *synapi, cum sale*: quo assumpto medicamento agitandus est ventriculus vomitu, tussi, sternutamento, vt fiat disruptio. Et si contingat, vt post ruptionem pus non euacuatur: estote diligentes, & exhibeatis *mel rosatum solus*. Et deinde fiat agglutinatio: sed de agglutinantibus in seq. capite. Notandum, vt exhibeantur medicamenta in summa dosi, quoniam vehemens est puris actiuitas: & exhibeatis actu calida, non frigida. Et præterea, quamprimum exhibeatis: nam periculum est in mora. Expedit tum exhibere, tum quandoque applicare. comment. 40. lib. 1. prognost. & cap. 7. lib. 2. ad Glauco. Dixta patet, ex alibi dictis.

CAPVT X.

De Vlcere ventriculi.

Nomen.

Generatio.



Definitio.

Forma.

Subiectum.

Causa efficiens.

PER ventriculi vlcus, intelligimus solutam vnitatem, distinctam à vulnere: nã de vlcere, nonde vulnere loqui instituiamus. Generatur ventriculi vlcus, dum causa morbifica agit in ventriculum: & ita agit, vt in ventriculi substantia per modum modo abrasionis, modo vna erosionis, absumatur, & vnitas solvatur. Atque ob id vlcus ventriculi est soluta vnitas, cum magnitudine imminuta ventriculi, producta à causa mordaci. Hæc definitio colligitur è Galeno passim, & lib. 3. 4. & 5. methodi: quemadmodum alibi fusius declarauimus, in sermone de vlcere corneæ. Quare Forma est soluta vnitas, cum imminuta substantia: huicque vlcus est affectus mistus è soluta vnitatem, & magnitudine imminuta. Subiectum est ventriculus: quo distinguitur vlcus ventriculi, ab vlcere aliarum partiũ. Causa efficiens, est causa mordax: ad differentiam vulneris: de cuius specie & vitio saltem dicemus: nam ex alibi traditis patet causa generans. Quoad speciem: causa est interna vel Externa. Interna esse potest quilibet succus, & cum Auicenna etiam materia catarrhalis, & atrabilis: vnde prodit vlcus cancriforme. Externa causa potest esse Necessario occurrens, vt agrumina, id est, allium, cepæ, &c. Vel Non necessario occurrens, veluti medicamento corrodens, venenum corrodens. Quoad vitium: quamuis pertinere possit ad substantiam, quantitatem, qualitatem, & vbi: tamen communiter & necessario spectat ad caliditatem, cuius causa sit exulce

exulceratio: quod cognoscens Auicennas, inquit, vlcus fieri propter acuitatem humorum: additque, multoties etiam fieri è catarrho mordicante, recipiente putredinem. Notandum Auicennam rationabiliter addere putredinem: nam succus mordax esse potest vel propria ratione, vt bilis flaua, bilis atra: vel succus mordax esse potest ratione putredinis, non propria ratione, veluti in pituita, & materia catarrhali. Statutum ergo sit vitium cōmune in caliditate situm esse. Quantitatis vitium est copia: vnde Galenus c. 3. l. 3. de temp. ait, agrumina cutim exulcerare, nam sincera applicantur: & præterea cutis calor cedit, non resistit: non ita exulcerantur partes internæ ab agruminiibus, quoniam calor magis resistit, & præterea cum copioso cibo miscentur agrumina: quare opus est ad vlcandum copia insigni.

Differentiæ quæ ad vlcus externum attinent, iam à nobis *Differentia.* omittantur: agimus enim interno. Ratio ergo formæ: soluta vnitas, cum magnitudine imminuta, dyscrasiæ calidioris vel est *Expers*, vel *Particeps*: & intemperies, est vel in *Habitudine*, vel in *habitu*: vt vlcus cacæthes prodeat. Ratione subiecti: vlcus vel est in ventriculi parte Superiori vel Inferiori. Quoad causam efficientem, vlcus producitur à causa Interna vel Externa.

Secundum Auicennam ventriculi vlcus indicatur è dolore *Signa.* pungitiuo, vlceroso, præsertim dum in ventriculum aliquod insuauè descendit: quo fit vt quiete dolor mitior euadat. Indicatur etiam ex inappetentia, è siti, è ructu foetido, (quia vbi vlcus, ibi pus) è vomitu saniei, & è causis prægressis vlcis. Cæterum cum vlcus possit corripere vicinas partes, id est, vel gulam, vel superna intestina: hæc ita distinguuntur: si enim in gula sit vlcus: indicabitur è dolore in posteriori parte inter spatulas, item è dolore in cruciante à collo seu ceruice, vsque ad pectoris initium, & præsertim intendetur dolor tempore deglutionis. Si autem attineat vlcus ad intestina: indicabitur è dolore affligente circa vmbilicum, & infra, & dolor acerbior euadet tempore expulsionis. Si autem vlcus sit in ventriculo: indicabitur è dolore vigente in regione ventriculi, & augebitur dolor, dum cibus ingreditur ventriculū, dum etiam concoquitur, & præterea dum transmittitur in intestina, nam hoc tempore mouetur ventriculus. Quoad signa differentiarum: & primum ratione formæ: si coniuncta sit intemperies calida, cognoscetur è suis

signis. Quoad differentias ratione subiecti: hæ differentie patent è traditis de tumore ventriculi. Et similiter patent differentie, quæ sumuntur à causa efficiente.

Indicationes.

Quoad præsidia, & primum si sumantur à rebus præter naturam: soluta vnitas, indicat vnientia: causa magnitudinis imminuta, oritur indicatio regenerandæ carnis. Cum igitur opus sit præsidio & vniente, & carnem generante: cum sint præsentia impediementa, hæc remouenda. Impediementa autem sunt, vel Morbus, vel Causa. Si ergo morbus sit vel calida intemperies, vel tumor: quid indicent hi morbi, suis locis dictum. Si autem quod impedit est causa: hæc causa vel est Communis vel Propria. Si causa sit communis: est tum Materia fluens, tum Alia causa à constitutione morbi. Quare ratione materiæ fluentis, varix oriuntur indicationes: pro varietate fluentis materiæ, & secundum speciem, & secundum vitium, & secundum causam generantem: quemadmodum alibi exacte docuimus. Ratione autem causæ morbificæ, diuersæ à morbo, siue sit dolor, siue pituita, siue sordes: his, contrariis occurrendum. Si autem causa impediens sit propria: primum si propria sit, vt respicit generationem carnis: hæc causa impediens, nihil aliud est, quam duplex excrementum: nempe tenue, & crassum. Et hoc loco notandum, vtrumque excrementum, cum sit toto genere præter naturam, indicare præsidium è toto eradicans. Verum ratione excrementi tenuis, vacuare oportet per modum siccationis: ratione autem crassi, per modum deterfionis. Si causa impediens propria dirigatur ad agglutinationem: cum id quod impedit, sit sanguis etiam optimus fluens, & præterea raritas carnis, ob id oritur indicatio absumendi sanguinis, per modum exsiccationis: & oritur indicatio carnem raram leuiter densandi. Alia autem è parte, ratione rerum secundum naturam, in vlcere oritur calidum suppuratorium, id est, indicatur calidum, simile caliditati caloris naturalis: sed hoc calidum suppuratorium tenue indicatur: cum in vlcere ventriculi non sit caro confusa.

Prognostica in genere.

Ventriculi vlcus est malum grauissimum, & ferme lethale, ob vehementiam dignitatis: corripit enim hoc vlcus ventriculum, nimirum vilcus spermaticum, quod chylicationi destinatum est, & *ιναισθητον*. Cum igitur ventriculus sit membrum spermaticum: dum cõsumitur, exacte non potest refici. Quatenus autem ventriculus, est chyloli destinatus: oportet

oportet ventriculum admittere cibum & potum: & hinc curatio redditur difficilior, tum quia virtus laborat causa cibi, ad concoquendum cibum: tum quia cibi & potiones vim medicamentorum refringunt: & præterea dum cibi & potus descendunt, secum ducunt medicamenta, quæ cum hæere nequeant, parum agunt. Et tandem curatio est difficilior, ob sensum exquisitum: huius enim vi in consensum ducitur cor: patitur cerebrum: nec detergentia valida possunt administrari: propterea quod dolor sit intensus, hincque principes partes ita compatiuntur, ut subsequatur vehementia facultatis. Sed pro vi differentiarum, discrimen etiam est varium. *Primadifferentiarum.*

Nam ratione formæ: cum sit soluta unitas, cum magnitudine imminuta, quandoque coniuncta cum intemperie: ratione essentia insignior est vehementia, si soluta unitas est maior, & si magis est imminuta substantia, magisque intenditur periculum, si annexa sit intemperies, quoniam insignis est recessus à naturali statu. Quo fit, ut, si intemperies sit in habitu, vitium sit mortale: nam intemperies in habitu, est in causa vehementia essentia adeo insignis, ut non possit extirpari: & propterea, (quod in externis patet partibus) cancer est periculosior carbunculo: hic enim suppurari potest, ille non potest: quamvis in carbunculo atra bilis sit effervescent: & ratio est, quia in carbunculo intemperies est in habitudine, in cancro est in habitu. Præterea si ulceris sedes perpendatur: periculosius erit vlcus, si afficiat partes superiores, siquidem subsequitur syncope, tabes: ratio est: quoniam intenditur vehementia dignitatis & facultatis. Quoad differentias ratione causæ efficientis: vlcus ventriculi erit periculosius, si fiat à materia vehementer putrida, à materia copiosiori, acriori: veluti si fiat vlcus à virulentia venerea copiosa, atrabilaria: & ob id Galenus c. 5. lib. de atrabile testatur, vlcus ab atra bile esse incurabile.

Quoad præsidiorum materias. Primum si sanguis copia sua impediatur ulceris repletionem: vena secanda, si virtus permittat. At virtus non permittit, si vlcus est progressum. Præterea dum vlcus progreditur, deficit sanguis. *Curatio.*

Quoad medicamenta: sufficiat hæc proponere, causa Generationis carnis, & Agglutinationis. Causa generationis carnis, probantur medicamenta vacuantia excrementa, per modum Deterfionis, & Exsiccationis, quæ cum Galeno cap. 7. lib. 4. meth. non debent esse mordacia: nam prohibentur *Pharmaceutica. Detergentia.*

bentur mordacia à ventriculi virtute, cuius virtutis signum est sensus exquisitus. Verum expediat, vt validiora administrentur: pro excrementorum copia, & lentore. Contra si res habuerit, id est, si excrementa non sint ita copiosa, nec ita lenta: probantur debiliora, & præsertim in ventriculo æstuante. Quare probatur aqua saccharata, aqua bordeacea, cum seminibus melonum, probatur serum lactis vel sincerum, vel cum lacte, probatur aqua B. Virginis, aqua Veronensis. Expediat quandoque in his medicamentis immiscere mannam, vel syr. ros. sol. quoniam opus est vt detersum excrementum euacuetur, non vomitu, sed vel per aluum, vel per venas. Si autem excrementum fuerit viscidius, quemadmodum esse potest in ventriculo non æstuante: probatur mel non coctum, probatur mulsio non aquosa, probatur sus cicutæ, cum melle, & succo passul. Probatur etiam aqua regule, qua reperitur in agro D. Petri; cum melle ros. solue. Et si excrementum in vlcere fuerit putrilaginosum: cum Auicenna potestis ascendere etiam ad hieram: sed deinde exhibeatis vel serum, vel aquam hordei. Quoad vacuantia per modum siccationis, quibus vtimur gratia excrementi tenuis: probantur tragacantha, thus, mastiche, sarcocolla, cornu cerui, cum aqua hordei, vel cum sero.

Exsiccantia.

Agglutinantia.

Quoad agglutinantia: cum Galeno cap. 7. lib. 4. meth. vti licet hypocistide, balaustijs, gallis immat. malicorio, succo plantag. &c. Notandum in calidiore ventriculo hæc medicamenta esse administranda, cum aqua vel plantag. vel rosacea. Si autem frigidior sit ventriculus, exhibeatis cum decocto mentha, cum vino austero: abstineatis à melle, quoniam abstergit. Neque obstat: quamuis Galen. loc. cit. proponat mel, simul cum glutinantibus: Galenus enim miscet mel, in ratione vehiculi, quoniam respicit ad vlcera remota: nos autem in præsentia loquimur de vlcere ventriculi: & propterea non est opus melle, ceu vehiculo. Quinimo in praxi obseruetis, vt medicamentum diu maneat in ventriculo: ideoque non probatur dilutum admodum copiosum. Et præterea proderit ad mouere medicamentum è pice navali, addita mastiche, bolo Arm. sang. Drac. & similibus astringentibus. Quod cognoscens Aetius, applicabat ceratnm ex oleo aut melino, aut rosaceo: cum aliqua portione thuris. Dixta erit compar.

De Cardialgia.

RE et dolorem oris superni ventriculi intelligimus illud malum, quod vocant Cardialgiam, id est, cordis dolorem. Vnde Galenus cap. 2. lib. 2. meth. ait, esse vitium, quod nomen capit à symptomate & loco affecto, id est, corde: at per cor, non intelligit Galenus quod clauditur à thorace: sed intelligit os ventriculi supernum, quod teste Galeno capite 1. libro 8. n. 7. vocabant cor medici antiqui. Vnde ex eodem Galeno, aphorism. 65. sectio. 4. cum cardialgia capiatur pro crebro & veloci cordis motu & capiatur pro affectu oris ventriculi: in præsentia accipitur pro affectu oris ventriculi. At non accipitur pro omni dolore ventriculi: siquidem è cap. 8. lib. 2. de plac. medici non omnem oris ventriculi dolorem, vocant cordis dolorem, seu cardialgiam: sed illum tantum dolorem, in quo acrimonia humorum mordet: & propterea subdit Galenus morsum fieri in angore, dum morsuunculæ euidenter in ore ventriculi creantur. Quare colligendum, morsuunculas, seu morsum, quandoque esse euidentem quandoque non ita euidentem. Si euidens sit: est cardialgia admodum exquisita: si non ita euidens, est cardialgia exquisita, sed non exacte. In præsentia autem de vtraque sermo est. Et ob id Galenus com. 30. lib. 3. progn. ait. medicos morsum oris ventriculi vocare cardiogmum, & cardialgiam. Vnde Galenus com. 30. sect. 1. lib. 1. prorhet. per cardiogmum intelligit cordis, seu stomachi morsum. Ideoque notandum, cum tres sint voces: nimirum cardialgia, cardiogmus, & cardiaca: cardialgiam esse nomen generis: cardiogmum, speciei, in qua specie est euidens morsus: cardiaca esse nomen speciei, in qua malum producitur à causa venefica. Cardialgia in genere producitur, dum causa morbigica agit in os ventriculi, & ea violentia agit, vt soluat continuum, & producat qualitatem dolorificam, spiritalem, insensam calido insito ventriculi: hincque fiat tristis sensatio, vi cuius compatiatur cor: vt hinc fiat mutatio in pulsu: hincque cor afficiatur vel leipothymia, vel syncope. Et propterea cardialgia est sensatio corrupta oris superni ventriculi, dependens à solutione unitatis, cum qualitate dolorifica, vehementer infesta, seu noxia.

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma est sensatio corrupta: quod cognoscens Galenus
cap. 7. Forma.

cap.7.lib.1. de sympt. caus. ait, cardialgiam esse symptoma è tactorio genere. Vnde notandum, è cap.8.lib.2. de plac. tristem sensationem quandoque esse euidentem, quandoque non: vnde ægrotantes de dolore quandoque conqueruntur, quandoque nō, & communiter vocant angorem. Verum siue euidentis siue nō euidentis sit tristis sensatio: attinet ad tactum.

Subiectū.

Subiectum est os supernum ventriculi, quod tactus est organum, seu subiectum. Quod hoc sit verum, ait Galenus cap.9.lib.5. de vsu part. proponens sensoria tactus: tactus sensorium esse internas manus partes, & os ventriculi. Quæ sit horum verborum ratio, intelligetis è clarissimis anatomicis. Sensus enim tactus potissimum viget in his duabus partibus: sed differenter: viget in internis partibus manus potissimum gratia melioris vitæ: quia nihil potest esse in intellectu, nisi prius fuerit in sensu. Proponit autem Gal. os ventriculi, respiciens ad commodiorem vitam: propterea quod in ore ventriculi, beneficio huius tactus, sit appetitus cibi & potus: quæ conducunt ad commodiorem vitam. Gal. c.1.1.8. & c.8.1.2. de plac. & c.7.1.1. de sympt. caus. statuit cardialgiam esse symptoma, quod attinet ad os ventriculi. Notandum autem, per os ventriculi in hoc affectu opus esse intelligere partes viuentes, neruofas, & substantiam calidi insitū: quod calidum insitum potissimum afficitur in angore, non in dolore: & hinc qualitas spiritalis molesta impertitur portioni neruofæ: vnde fit tristis sensatio, quam vocant cruciatum, seu angorem.

Causa efficiens.

Dependet hoc vitium à solutione vnitatis, cum qualitate dolorifica vehementer infesta: nam doloris causa immediata est solutio vnitatis, quatenus est obiectum improporcionatum tactus, & proinde est obiectum commune, hoc est motus: vt docuimus cap.7.1.1. de dol. capitis. Addidimus cum soluta vnitatem coniunctam esse qualitatem dolorificam vehementer infestam: per quam particulam distinguitur cardialgia à doloribus, in quibus non viget hæc qualitas dolorifica, vi cuius qualitatis imminet leipothymia & syncope. Vnde cum dolore non annectitur angor: quemadmodum cum cardialgia angor coniungitur. Hinc Galenus cap.7.1.1. de symptom. caus. ait, cardialgiam esse symptoma satis infestum: quia respexit ad qualitatem illam infestam vnde quandoque nascitur syncope cardiaca. Sed iam explicandum, quæ de causa oriatur solutio hæc vnitatis, cū qualitate ita infest.

Proda

Prodit ergo hoc malum semper ab Agente, seu vitio agentis: nonnunquam etiam è parte Patientis. Et hinc si paritas *Exquisitus* seruetur in agente, & discrimen sit in passio: in cardialgia non *oris ven-* est exigua differentia: verbi gratia si malum producatur ab *triculi sen-* humore prauo erodente, & os ventriculi non sit exquisiti *sus.* sensus: malum erit mitius: si *Cardialgia*: deterius: quia produ- citur qualitas dolorifica vehementer noxia. Et propterea Alexander cap. 9. l. 7. scribit: in cardialgia à virulento humore si os ventriculi sit exquisiti sensus, hunc patientem statim mori: nam qualitatis noxiæ auctor est, tum humor virulentus prauus, tum exquisitus sensus. Cæterum, cum præter *Cardialgia*, cardialgiæ etiam causa sit, quæ ita continuum soluit, vt spiritalis qualitas emergat infesta: iure hæc causa explicanda. Causa igitur est Interna, vel Externa. Interna potest esse Vapor, & Minera. Minera potest esse Viuens, vt vermis: vel Vitæ expers: & tunc potest esse Ichor, vel Humor, & potissimum humor biliosus. Externa causa esse potest medicamentum acre, venenum. Et huiusmodi causæ agunt, prout vitium obtinent, secundum Formam, vel secundum Qualitatem, vel Vtroque modo. Secundum formam: dum causa est toto genere præter naturam. Secundum qualitatem: dum causa est calida, acris, mordax. Vtroque modo: dum causa est & toto genere præter naturam, & simul mordax. Notandum, si causa sit toto genere præter naturam: hunc affectum à medicis vocari cardiacum: si vitium sit in euidenti acrimonia: vocari cardiognum: si non sit in ita euidenti acrimonia, dici cardialgiam. Sed breuiter circa vitia singularum specierum digrediemur. Quoad causam igitur internam: & primum quoad vaporem: toto genere hic præter naturam est, veluti vapor prodiens à verme. Minera vitæ particeps, toto genere præter naturam, est vermis vita præditus: vermes enim ad similitudinem perniciosorum humorum lædere solent, ideoque Alexander statuit cardiacum affectum fieri à lumbricis. Vermes autem agunt vel vapore, vnde fit angor: vel punctione, vnde fit dolor. Si minera sit vitæ expers: potest esse ichor, quem proponit Galenus, com. 38. sect. 3. l. 1. prorhet. inquit, cardialgiam fieri, dum copia sanguinis in venis acruata, tenue serui, id est ichor, os petit. Quoad humorem si sit venificus, patet hunc esse toto genere præter naturam. Sed potest etiâ esse calidior mordax. Galenus igitur respiciens ad vitia toto genere præter naturam, c. a. l. 5. de loc.

Causa sol-
uens consi-
minum.

Species hu-
ius causa.

Vitium cau-
sa.

loc. aff. ait. in cardialgia affici os vetriculi, à venenoso humore: respiciens autem ad mordacitatem, c. 7. li. 1. de symp. caus. ait, cardialgiam produci à succis mordacibus: id quod etiam docet. cap. 14. libr. 1. ad Glaucon. Et cap. 8. libr. 2. de plac. insinuans, exquisitam exacte cardialgiam produci à succo mordaci: asserit, cardialgiam tantum appellari, cum acrimonia humorum mordet. Et cum bilis sit humor mordax: Auicennas libr. 4. fen. tractat. 2. cap. 21. inquit, in febribus dolorem stomachi procreari ex effusione bilis ad stomachum. Et Galenus aph. 65. sect. 4. ait, cardialgiā fieri à flaua bile, ebulliente in tunicis ventriculi. Vnde colligi potest, humoris peccantis vitium secundum quietem, in hoc positum esse, vt in tunicis ventriculi occludatur & quiescat: quod etiam scribitur cap. 24. libr. 2. de aliment. & com. 30. sect. 1. prorhet. & apud Hippocratem com. 30. lib. 3. prognost. Vnde non mirandum, si Hippocrates com. 24. libr. 2. de ratione vict. statuit, cardialgiam fieri ex inedia: per hanc enim venter bile repletur: vnde morsu & contristatione afficitur ventriculus hincque victus dissoluitur. Hic Galenus per morsum intelligit dolorem, vt ab humore soluatur vnitas: per contristationem, intelligit qualitatem dolorificam. Eadem de causa Galenus cap. 8. li. 2. de plac. ait, morsum ventriculi fieri non solum dolore correptis, sed etiam è fame: præsertim si coniuncta sint vehementia exercitia: ventriculus enim bile repletur. Causæ externæ sunt venena, & medicamenta acria.

Differentie.

Quoad differentias: & primum à forma in cardialgia sensatio corrupta est Euidens, vel Non euidens. Euidens dicitur morsus: non euidens, angor; cap. 1. l. 8. x. r. i. x. Angor semper adest: interdum & morsus: cap. 8. li. 2. de plac. Ideoque in cardialgia est angor vel solus, vel simul cum tristi sensatione euidenti. Causa est: cum enim semper in cardialgia dissoluatur substantia calidi insiti, ideo semper est angor: & quia interdum soluitur vnitas partium viuentium, fit tristis sensatio euidens. Ratione subiecti: in hoc malo semper afficitur os ventriculi: verum in morsu soluitur vnitas partis viuentis: in angore soluitur vnitas calidi insiti: & propterea dicendum, in cardialgia solui vnitatem, vel, solius calidi innati, vel simul etiam partium neruofarum & viuentium: Quoad causam efficientem & primum, si secundum speciem perpendatur: dicendum: cardialgiam fieri à causa Interna, vel Externa. Si ab interna, vel à Vapore, vel à Verme, vel ab

Ichore,

Ichore, vel ab Humore, & præsertim bilioso. Externa causa est Medicamentum acre, vel Venenum. Si causa efficiens perpendatur solum secundum vitium: est vel Toto genere præter naturam, vel Calida & Acris.

Nisi patientis mens ægroter, ipsemet hoc malum indicabit. Sed cognoscitur etiam è pulsu frequenti, paruo: quia cor compatitur: item, è corporis inquietudine, non enim potest æger in vna lecti parte se continere. Cum enim in cardialgia homo euadat debilis, musculi nec breuem tensionem efficere possunt, vt à patiente perferatur: nec præterea mediam figuram inter flexam & extensam homo tolerare potest: vnde, licet æger impotens sit ad motum, alias tamen alio partes proicit, desiderans consequi figuram dolore carentem: quam cum inuenire nequeat, tandem fit inquietudo, quoniam patiens tristi sensatione afficitur: vnde quasi onus quoddam excutere cupiens, alias aliam figuram appetit, ideoque patiens semper est in motu, cap. vlt. lib. i. de motu musculi. Indicatur etiam hoc malum è frigiditate extremorum: quoniam calor & spiritus intro trahuntur. cap. j. lib. de trem. Item indicatur è sudore circa faciem, & circa pectus: ratio est, quoniam in hoc malo ita compatitur caput & cor, vt facultas retentrix alimentalem humiditatem non possit retinere: ac proinde sudor non tantum indicat cardialgiam, sed eam insignem. Differentiæ quæ sumuntur à forma, ita sunt cognoscendæ, vt inquiramus, an cum angore connexa sit tristis sensatio euident, nec ne: sed has differentias æger manifestabit. Quoad differentias ratione subiecti: manifestantur à differentiis formalibus: nam solus angor, indicat solutam vnitatem calidi insiti: si coniungatur euident dolor, indicat solutionem vnitatis in parte viuente. Quoad differentias ratione efficientis, an causa sit interna, vel externa: æger & assidentes patefacient. Sed quoad internam causam: si fuerit vapor, indicatur è solo angore. Si autem annexus sit dolor euident, indicatur minera. At minera, si fuerit vermis, signa erunt vermium. Si fuerit ichor, cum Galeno. com. 38. sect. 3. lect. i. prorhet. indicatur è coniuncto lumborum dolore: si quidem plurima abundantia portio, ad infernas partes repens, est in causa, vt, si hæc materia detineatur, (cum consueuerit defluere per hæmorrhoides) si non euacuetur, lumborum dolor producat. Si autem fuerit bilis: indicatur ex amaritudine oris, è vomitu bilis, è febre biliosa, & re-

Signa in genere.

Signa differentia.

liquis bilis indiciis. Vtrum autem causa sit venefica, vel solum acrisita scitur: si est venefica, etiam citra *diagnosin* ventriculi, facile sequitur leipothymia, & syncope. fit extremorum frigiditas: contra, si materia non sit venefica.

*Indicatio-
nes.*

Quoad præsidia: secundum Galenum cap. 1. lib. 8. *x. rón.* & cap. 14. lib. 1. ad Glau. sumuntur à tristi sensatione, ab ore ventriculi, & à causa solvente continuum. Vnde à tristi sensatione indicatur anodynum, præsertim si tristis sensatio fuerit evidens. Quid per anodynum veniat intelligendum diximus in dolore cap. Quoad os ventriculi: ratione proportionis, requirit remedium fouens proportionem: ratione calidi insiti, cum moueatur præter naturam ad circumferentiam, indicatur præsidium impellens calidum insitum ad cætrum, Quoad causam soluentem continuum: secundum speciem, indicat determinata. Secundū vitium, si à toto genere præter naturam, indicat eradicans: & si venefica, alexipharmacum: si acris, indicat refrigerans. Quibus præsidiis habitis, facile auctores intelligentur. Quoad anodynum igitur: hoc insinuat Avicen. lib. 3. fen. 13. tr. 1. cap. 14. vbi in ventriculo sensus exquisiti probat narcotica cum facilitate. Quoad præsidia oris ventriculi, ratione calidi insiti ad hoc præsidium respexit Alexander cap. 10. lib. 7. vbi probat, quæ particulas resolutas possunt confirmare, hoc est impellere ad centrum, calidum insitum. Et Galenus cap. 1. lib. 8. *x. rón.* in morfu oris ventriculi, & in anxietate seu angore, probat communiter adstringentia: hæc enim motum immodicum calidi insiti ad circumferentiam compescunt. Præsidia causæ soluentis continuum tangit Gale. cap. 1. lib. 8. *x. rón.* dum ait: plerisque misceri calefacientia & siccantia. Vnde cap. 14. lib. 2. aliment. probatur in cardialgia, polenta, seu farina ex hordeo viridi assato, cum succo puniceorum. Et cap. 14. lib. 1. ad Glau. probantur vacuantia per aluum: ibi enim respicit Galenus ad causam soluentem continuum, quæ causa vt plurimum est minera, & ob id vt plurimum cum adstringentibus miscenda vacuantia, & præsertim insensibiliter vacuantia. Notandum autem cum materia morbifica possit vacuari sensibilibiter & insensibiliter in cardialgia: Galenus utramque vacationem proposuit. Insensibilem probat: per modum resolutionis, per modum siccationis, per modum percussioneis, & reuulsionis. Resolutionem & exsiccationem, insinuat cap. 1. lib. 8. *x. rón.* vbi probat calefacientia & siccantia. Calefacien

facientia vacuant per modum resolutionis: siccantia, per modum siccationis. Respicens ad siccationem & repercussionem cap. 24. lib. 2. alim. probat polentam cum succo punicorum: polenta enim humorem siccatur: quare euacuat per modum siccationis: succus autem punicorum euacuat per modum repercussionis. Neque Galenus neglexit reuulsionem: nam cap. 14. lib. 1. ad Glau. proponit vacuantia per aluum. Quoad sensibiliter vacuantia, per vomitum, & per aluum: hæc proponit Gale. 14. lib. 1. ad Glau. Et iccirco materia residens in cauitate ventriculi, vacuanda sensibiliter: quiescens in tunicis, vacuanda insensibiliter.

Cum Hippocrate & Galeno comm. 74. sect. 2. lib. 1. epid. *Prognosticam gener.* cardialgia est symptoma semper prauum, nedum in principio. Per hæc verba insinuat Galenus, esse symptoma, quod molestat in angore, peius in principio: nam materia est magis copiosa, nec à medicamentis correcta. Atque Hippocrates vna cū Galeno apho. 65. sect. 4. ait: cordis, id est, stomachi morsum esse malum: licet deterius sit malum, quod pertinet ad morsum veri cordis: quoniam cor est dignius ore ventriculi. Rationabiliter autem cardialgia est periculi plena: nam omnis ferme viget vehementia. Quælibet enim cardialgia fit à causa admodum infensa, & hinc multum recedente à statu naturali: quare adest insignis vehementia essentia. Additur vehementia dignitatis: nam afficitur os ventriculi, ita vt cor consentiat. Et si contingat, vt os ventriculi sit exquisitoris sensus: coniungitur vehementia facultatis: vnde cum Alex. homo statim interit. Adhæc cum immineat, vel actu sit leipothymia: adest vehementia facultatis: vnde Gale. cap. 5. lib. de trem. ait, in deliquiis ventriculi robur solui: hinc tremor: hinc calor mouetur ad extra, & vires dissipantur per sudores. Vnde ait Galenus, hos calefacere, esse errorem maximum: cum oporteat potius refrigerare & astringere. Sed dubitatur: nam Gale. cap. 5. lib. 2. de caus. symp. ait: per dolorem animam contra moueri, ac moueatur è gaudio: hincque similia maximo timori produci symptomata: nam vi doloris color corporis euanescit, homines refrigerantur, & quandoque moriuntur: sicuti euenit his qui timent. Si ergo dolor, instar timoris est in causa motus ad centrum: quomodo in cardialgia est motus ad circumferentiam? Responsio. Si dolor sumatur vt tristis sensatio: motus fit ad centrum: at si sumatur ratione qualitatis dolorificæ, & causæ mordacis con-

probat medicamentum quod vocat Glycy:& optimum est, vt exhibeatis ægrotantibus: præscribetur ergo hoc modo: *℞. aceti ʒ vj. corticum radicum feniculū ʒ ij. alois hepatica ʒ vj. mellis optimi, seu Attici ʒ iiij. fiat eclegma. Atque Alexander exhibet cochlearia ij. aut iij. hoc est, ʒ vj. aut ʒ ix.* At animaduertendum ne sit febris: tunc enim non conuenit. Et ob id Gal. cap. 14. lib. 1. ad Glau. non proponit hieram: quoniam loquitur de symptomatibus seu cardialgia cum febre: ideoque non est discordia inter Alexandrum & Galenum. Cæterum Galen. ad vacuandum bilem, probat *comam absinthij in melicrato decoctam & potam.* Quod medicamentum non est medicamentum simpliciter vacuans, quemadmodum oleum, verum etiam astringens: nam absinthium ponticum astringendo roborat. Hæc de vacuantibus sensibilibus.

Quoad vacuantia insensibilibus: quæ euacuât per modum resolutionis, oportet vt sint calida: quæ euacuunt per modum Siccationis, debent esse sicca: quæ euacuunt per modum Repercussionis, oportet vt sint astringentia. Quo fit, vt medicamentum confectum è melicrato & absinthio, omnes facultates obrineat. Et in hoc admirari oportet summam diligentiam Galeni. In melle enim est vis detergendi, & resoluendi, ratione caliditatis: in absinthio, per eius caliditatem, est vis resoluendi: per siccitatem, siccandi: per astrictionem habet vim repellendi, & præterea compescendi motum immoderatū calidi insiti. Non ergo illi sunt improbandi, qui vtuntur *semibus citri:* hæc enim semina præter vim alexipharmacā, per modū resolutionis etiam vacuant. Sic etiam in cardialgia probantur *rad. & sem. feniculi, melissa, & similia resoluentia.*

Quoad firmantia calidi insiti imperum, & proinde astringentia: ad hæc respiciens Gal. cap. 14. lib. 1. ad Glau. ait, membra esse roboranda, & Admotis, & Assumptis: veluti inter ea, quæ assumuntur, est *potio absinthij.* Alexander probat succum granatorum, & grana etiam. Auicenna exhibet parum syrupi de malis cydoniis, cum syrupo acetoso, vel omphacio. Et propterea etiam uti licet *rbu opsoniorum, & vino cydoniorum,* quod est in communi vso. Hæc ergo probantur inter astringentia. Ex his potest fieri medicamentum, quod applicitum roboret: verbi gratia, *℞. ona integra num. iij. eleorum mastich. de absinth. cydoniorum ana ʒ j. fiat decoctio in sartagine, & in fine adde pulueris specierum diarrhod. Abbatis, aromatici rosati, coralliorum, ana ʒ ss. Misce, & fiant placenta.* Probat etiam fomentum è vino

Insensibilibus vacuantia.

Motum caloris firmantia.

rubro, alterato cum rosis, absinthio, mastiche, &c.

Quoad alexipharmaca: probantur semina citri, semina acetosa, qua præter vim bezoaricam non calefaciunt, unde & in febris his uti licet: & quod maius est, manifeste astringunt, roborant. Licet etiam uti corallis, sentalis, margaritis, hyacintho, foliis auri, bolo Arm. terra sigill. efficacissimum est medicamentum, lapis bezoar, præsertim orientalis. Et, nisi febris prohibeat, primum locum sibi vendicant magna antidoti. Ratio est, quia magnæ antidoti, ut medicamenta calida vacuant per modum resolutionis: ut sicca, per modum siccationis: ut recipiunt astringentia, per modum repercussionis: & præterea per vim constringentem calidi insiti dissolutionem prohibent: atque virtute proportionis mirabilis habent vim alexipharmacam, & omnium partium corporis, atque hinc oris ventriculi, & cordis proportionem fouere possunt. Vnde non mirandum, si auctor ille, qui edidit librum de Theriaca ad Pamphilium, & ad Pison. cap. 15. fateatur, theriacam tanquam ad vitam reuocasse cardiacos.

Alexipharmaca.

Astringentibus semper utendum: vacuantibus cum syncope abest.

Cæterum, cum in cardialgia probentur vacuantia & astringentia: dubitatio oritur circa Quando agendum: nam Galenus cap. 14. lib. 1. ad Glauc. monet in principio non esse utendum astringentibus, sed quando partes alui sunt expurgatæ: dum enim humor detinetur, non licet astringere, sed calefacere, hoc est, vacationem sensibilem adiuuare, vel per vomitum, vel per aluum. At contra idem Galenus cap. 1. lib. 8. x. τόπ. iubet in morfu seu angore communiter probari astringentia: plerisque autem opus esse miscere calefacientia & siccantia. Hinc igitur plerumque miscet calefacientia & siccantia: semper autem utitur astringentibus. Ita etiam Alexander primo omnium utitur astringentibus: mox vacuantibus: quemadmodum erat medicamentum ex aloë. Responsio. Quando agendum capitur ab indicante præsentē, sed vincente alia indicantia: ideoque cum indicans sit motus immoderatus calidi insiti, & materia morbifica: si magis potest motus importunus calidi insiti, vsurpanda sunt astringentia: dum autem minus potest, sunt administranda vacuantia. Quare dum syncope vel adest, vel imminet: tunc magis potest motus calidi insiti, quam materia morbifica: si autem contra nec præsens sit syncope, nec vsque adeo immineat, tunc magis potest materia morbifica, quam motus calidi insiti. Ob id dum Galen. loc. citat. lib. 1. ad Glauc. probat

vacuan

vacuantia: respicit ad cardialgiam, in qua syncope non adest. Et dum lib. 8. p. 267. probat in morfu & angore astringentia, insinuat, in qualibet cardialgia probari astringentia: quoniam omni cardialgia viget motus importunus calidi innati. At Galenus non dicit, his astringentibus omni tempore esse vtendum: supponit enim administranda esse astringentia in omni cardialgia: sed tempore opportuno. Nec Alexander improbandus, qui primum vtitur astringentibus: respicit enim ad cardialgiam, in qua magis potest motus calidi insiti: nam agit de cardialgia, in qua imminet syncope. Atque hinc Alex. dum conqueſcebat affectus, id est, dum refringebatur motus calidi innati, vt syncope non immineret, vtiebatur vacuantibus.

Sequitur Diæta. Si adest sudor: Celsus adhuc prohibendum, probat aerem non calidum, cum fenestris patentibus. Quod si talis sit cardialgia, in qua extrema frigent: prodest, extrema inungere, manibusque excaſactis partes fricare & fouere. Præterea Celsus ad reficiendos spiritus, naribus admouet rosas & vinum: vnde probari possunt odoxamenta, quæ fiunt ex aceto, rosis, pomis aurantiis, citro & violis: aer enim ita alteratus spiritus reficit. Cibus sit medicinalis, non facilis corruptionis, qui saltem per aliquam siccitatem, seu per modum siccationis absumat. Quare probantur cibi astringentes, non admodum facilis coctionis, & exsiccantes. Hic Galenus cap. 24. lib. 2. alim. edoctus ab Hippocrate lib. 2. epid. sect. 2. circa principium, exhibet *potentam succo punici aspersam*, semel in die: nam succus mali punici, moderatur motum calidi innati, ne nimis ad circumferentiam feratur: reprimittiam materiam: potentia vero datur quia non facile corrumpitur ab æstuantē ventriculo: & facultate siccandi, materiam morbificam absumit. Notandum, quod Galenus hoc solo cibo solum semel in die vtatur: id quod locum habet in ea cardialgia, qua mulier illa torquebatur, cuius causa erat humor vitiosus & copiosus, quo ventriculi os ita replebatur, vt nauseabunda esset mulier, ideoque potius euacuatione, quam repletionē erat opus. Si vero cardialgia teneat corpus, quod in ediam non ferat: cibus & bis & ter in die est exhibendus. Auicennas cap. 30. si oriatur syncope, ante vel prope paroxysmum, exhibet *frustum panis, cum aqua gravatorem*, vel cum aqua agreſta: & si subsequatur syncope, dat etiam *panem cum vino antiquo*, sed in parua copia, nimirum

Videmus rationem.

ad 3ij. Præterea probatur cremor hordæ infrigidatus, cum granis granatorum, & uine: exhibetur actu frigidus, ne ita facile vincatur à calido igneo, in ventriculo existente, & per consequens corrumpatur: cuius rei gratia idem etiam cremor munitur granatis. Consummatissimus Alexander, probat cibos difficilis coctionis, quia hi difficulter corrumpuntur: ut mala mediocriter astringentia, pyra, persica, uua austeram: & si æger sit valde calidus, & humores sint nimium rodentes, exhibet panem etiam cum frigida. His autem cibis Alexander vitur inter initia: reliquo autem tempore paulatim exhibet, quæ ægre coquantur, & acres succos attemperare possunt: ut est vuluula, id est, uerna, & omisum, id est, pingue intestinum: admittit buccinas, cochleas, cancores, ventriculos anserum, malum citrium sine cortice, nam in cortice est vis calefaciendi. Monet autem Alexander, cito esse occurrendum cibo. Et Celsus addit, si vires sint debiles, cibum esse exhibendum non multum, sed sæpissime enim nutrit, nec onerat. Vnde probatur destillatum caponis, vituli, & potissimum pedum visulorum, item destillatum à cochleis: oportet enim viscidum esse, ne corrumpatur. Quoad potum: Celsus vinum fugit, nisi sit sitis & virtus concedat: ideoque si æger in tuto est, curandum, ne ad imbecillitatem redeat, idque cibis validis, remoto vino: at si metus sit, ægrum deficere posse, probantur cibaria in vinum intincta, vinum autem debet esse austerum & mediocre. Quod si æger cibum assumere nequeat: vinum exhiberi potest, sed actu frigidum, & in mediocri copia: idem etiam facere licet, si cibi euomantur. Addit Celsus, in aluum quandoque iniiciendum esse prisanæ cremorem, vel etiam alicam: hæc enim infusa vires tuentur: vaporibus enim à cremore prodeuntibus, reparatur substantia vaporosa calidi insiti, quamvis non fiat nutritio partis viventis. Quoad inanitionem & repletionem, cum in cardialgia quandoque noceat inanitio per sudorem, iure Celsus corpus alpergit pulueribus astringentibus, ut myrsi, rubi, vel etiam arida fœce vini austeri: & urgente necessitate oblinis corpus gypso, ad inhibendum sudorem. Vnde mirandum non est, si hoc tempore cardialgia affecti moriuntur, quia medici permittunt sudare.

De Fame morbosa.



ER famem morbosam intelligimus famē præter naturam, id est, læsam appetentiam attinentem ad cibum, ad differentiam sitis. Hæc autem vel Aufertur, vel Imminuitur, vel Corruptitur.

Nomen.

Generatio famis morbosæ, patebit è generatione famis secundum naturam. Primum supponendum, appetitum vel esse mortalem, vt est naturalis & animalis: vel immortalē, vt est rationalis & volūtas. Appetitus naturalis, excitatur à penuria similis: animalis, à bono apparente: naturalis à bono vero.

Appetitus
quoduplex.

Porro naturalis appetitus confert ad vitam, ad vitam commodiorem, & ad meliorem vitā. Declaro. Appetitus naturalis, id est, vis concupiscibilis, quatenus respicit vitam, non est facultas simpliciter naturalis: seu simpliciter necessaria ad vitam: (nam facultates simpliciter ad vitam necessaria sunt solum quatuor, attrahitrix, retentrix, alteratrix, & expultrix, quarū nulla est facultas concupiscibilis) sed est facultas, cuius causa melius celebratur operatio necessaria ad vitam, nimirū attractio: hinc fit, vt facultas concupiscibilis quodammodo statui possit attractionis principium, dum enim adest appetentia, fit attractio: dū non adest, fit potius expulsio: Hic appetitus inest omnibus animalis partibus, quæ conuenientē omnes qualitatē desiderant, c. 6. l. 3. fac. natur. in est etiā plātis, c. vlt. l. 6. de plac. ideoque eum non influentem, sed insitum esse oportet. Si capiatur facultas concupiscibilis, quatenus respicit commodiorem vitā: huius principium est hepar, c. 18. l. 6. de vl. part. c. vlt. l. 6. de plac. ideoque laborāte iecinoris facultate, perit cibi & potus appetitus, com. 13. sect. 3. l. 3. epid. Hinc liquet, quod concupiscibilis causa vitæ, dirigatur ad id quod est simile cuiuslibet partis: causa autem commodioris vitæ, pro conseruando indiuiduo, referatur ad cibum: pro specie seruanda ad Venerē. Et propterea facultas hæc concupiscibilis non est insita, sed influit ab hepate in os ventriculi, vt homo cibum, potumque appetat: & in pudenda, ad Veneris desiderium. Si denique capiatur concupiscibilis causa melioris vitæ: est sane iam proposita concupiscibilis. Verum cum Galen. c. 3. l. 7. de plac. accipitur hæc facultas concupiscibilis, prout vincitur & regitur à facultate irascibili & rationali, vnde homo secundū iustitiam viuit. Animalis, seu sentiēs appetitus, residet in ce-

rebro, tanquam in fonte, & influit præcipue in pudenda, & in os ventriculi. Vnde apparet vim appetentem diuersam esse à facultate tactrice: quâuis vtraque facultas à cerebro, per neruos sexti paris in os ventriculi influat: per eundem enim neruum influit & motus & sensus: quare & tactus & animalis appetentia. Sicuti enim eadem lingua particeps est gustus & tactus: ita idem ventriculi os, eadem temperie & proportionem est donatum, vt per eosdem neruos, vtramque vim admittat. Ex his facile patere potest modus, quo fit fames & sitis.

Quomodo

fames sit

appetitus

calidi sicc

sis, frigi.

di & humi

di. Arist.

tex. 28. lib.

2. de ani-

ma.

Iam vero explicandum est, quomodo fames dicatur appetitus calidi & siccus: sitis frigidi & humidus. Per sicci igitur intelligere oportet solidum: per humidum liquidum: vnde secundum Hippoc. facilius est impleri potu quam cibo: hoc est, liquido, quam solido. Hic duplex appetitus, solidi scilicet & liquidi, ideo est necessarius, quia solido, id est, cibo, seu alimentum, solidæ corporis partes nutriuntur, liquido autem solidum alimentum defertur. Vnde, si exacte loqui volumus, fames erit appetitus alimentis: sitis erit appetitus vehiculi alimenti. Quo autem intelligatur: cur fames sit appetitus calidi, & sitis frigidi: supponendum est è c. 6. l. de rigore, ad calidum innatum attinere substantiam, qualitatem & motum, tum ad centrum, tum ad circumferentiam. Penes hæc igitur calidum innatum læditur: secundum substantiam quidem, si deficiat alimentum: secundum qualitatem, id est, caliditatem, si aliquod frigidum occurrat, vt extinguatur, instar flammæ quæ ab aqua extinguatur: secundum motum ad centrum, si grauatur à copia: secundum motum ad circumferentiam, si ab immodico calore dissoluatur, sicut exigua flamma à maiori dissipatur. Notandum obiter, vitium in motu esse causam noxæ caloris natui secundum substantiam: nam dum calor à copia grauatur, substantia euadit impura: dum à calore afficitur, & extra mouetur, substantia minuitur. Quare cum expediat per famem & sitim modo corpus nutrire, verum etiam calidum in situm custodire per calidum seruetur motus caloris, ne plus iusto concitetur: per frigidum autem custoditur calor, ne plus quam decet extraferatur: vnde calidum ad famem attinet, frigidum ad sitim. Nam in fame locum habet alimentum siccum, id est, solidum, in quod, dum agit calidum, ita concentratur, vt suffocari posset, nisi ope calidi extra ad circumferentiam eius motus seruaretur. At in siti locum habet humidum, id est, liquidum

neque

semper cibi vehiculum : quia calor innatus extra , & ad circumferentiam mouetur, idque eo magis, quo cibus est calidior, & ambiens aer calidior. Vt ergo hic calor ad extra motus compescatur, opus est frigido: vnde post cibos calidiores, & tempore æstiuo, potus etiam frigidior desideratur. Sitis ergo est appetitus frigidi & humidi: licet enim sitientes plerumque magis appetant vinum, quam aquam: vtrumque tamen cibi est vehiculum, & actu frigidum offertur: vini autem desiderium potius accidit ratione gustus & voluptatis: vnde Aristoteles dicit com. 28. lib. 2. de anima, saporem esse cibi & potus condimentum.

Porro, vt intelligatur, quomodo fiat fames secundum naturam: sciendum est c. 7. lib. 1. de symp. caus. in fame quinque esse motus: primus, est inanitio totius corporis: secundus, est appetentia membrorum naturalis alimenti & potionis: tertius est ventris sectio: quartus, est sensus suctionis: quintus, pertinet ad appetentiam animalem. Tres priores motus sunt naturales, seu spectant ad functionem naturalem: reliqui duo ad animalem: vnde à Galeno fames & sitis recensentur modo inter naturæ functiones, vt c. 4. lib. de diff. symp. modo inter animales actiones, vt cap. 7. lib. 1. de symp. caus. Totius corporis inanitio fit, quoniam corpus assiduo consumitur: vnde & necessaria est instauratio seu resectio. Concupiscentia naturalis fit, concurrente facultate concupiscibili insita, vt partes inanitæ repleantur: cibo enim restituitur, quicquid siccioris substantiæ effluxit: potione autem quicquid humiditatis effluxit. c. 2. l. 1. de tuen. san. Ventris sectio attinet ad ventriculi venas, quæ inanitæ concurrunt attractrice vi, vnde attrahunt ab ore ventriculi, vi cuius attractionis os ventriculi supernum afficitur motu, qui motus intenditur à melancholia, quæ ventriculum contrahit & mouet, cap. 4. lib. 5. v. s. part. Vbi tamen notandum, si cum motu coniungatur frigiditas, fieri famem: si caliditas, oriri sitim: quia appetitus non est rei præsentis, sed absentis: hinc melancholia agens in ventriculum, quia frigida est, causat famem: contra, bilis calida, in causa est sitis: vnde in ventriculo suctionis producit motus: & obiectum commune, quod coniunctum habet proprium obiectum, nimirum in fame frigidum, in siti calidum. Sensus suctionis & receptio obiecti fit ab attractione venarum ventriculi, & causa agente in os ventriculi sui, vel caliditate, vel frigiditate.

*Generatio
famis naturalis.*

1.

2.

3.

4.

tate. Hæc receptio fit in ore ventriculi, quatenus ventriculi os est organum tactus, beneficio neruorum, quos à cerebro suscipit: insigniter autem os ventriculi afficitur, tum ob neruorum mollietatem & magnitudinem, tum ob vim concupiscibilem à iecore impertitam. Quare os ventriculi, quatenus organum tactus est, afficitur à proprio obiecto, nim. à calido insito, à frigido in fame: afficitur item à communi obiecto, nim. à motu. Appetentia animalis fit in ore ventriculi, quatenus hanc suscipit à cerebro per neruos: vnde Auicennas dicit, Ventriculum suscipere neruos à cerebro, vt acquirat sensum, per quem percipiat famem: hoc est acquirat appetitum sensitium, cuius vi animal ad cibum & potum se conuertat. Cæterum, vis appetens non insita est ventriculo, sed influit à cerebro, dum impellitur & excitatur ab obiectis sensuum externorum: primum quidem ac principaliter à tactu, secundario ab obiectis aliorum sensuum: vnde Aristoteles l. 2. de anima dicit, tactum esse sensum alimenti: cæteros autem sensus per accidens concurrere: nam secundum Philosophum, alimur à calido, frigido, humido & sicco, quæ sunt obiecta tactus: reliqui vero sensus per accidens concurrunt: nihil enim ad alimentum conducit color, sonus, odor: & si odorata nutriunt, hoc fit, quatenus sunt calida, vel frigida, vel humida, vel sicca, non autem vt odorata. Sic & sapor concurrit vt condimentum, non vt alimentum. Ad hæc vis animalis in cerebro residens, etiam principaliter excitatur ab obiecto tactus: ex accidenti ab obiecto reliquorum sensuum: quoniam tactus obiectum primum attingit os ventriculi, prout est organum tactus: obiecta autem reliquorum sensuum non agunt in os ventriculi, sed in propria organa, & propterea meditantibus, vel oculis, vel auribus, vel naribus, vel lingua: vnde ita afficitur cerebrum, vt animalis appetentia exciteretur, & excitata influat in os ventriculi, & tandem desiderium replendi emergat. Ex his igitur colligi potest, ingerendorum appetentiam secundum naturam fieri: primo, dum membra inaniantur: secundo, dum inanita attrahunt à venis ventris: tertio, dum venæ inanitiæ attrahendo ventriculi os agitant: quarto, dum ventriculi os afficitur, vt affectionem cerebro impertiatur: quinto, dum in os ventriculi influit animalis concupiscentia, necessario impulsæ ab obiecto tactus oris ventriculi, ex accidenti autem ab obiecto reliquorum sensuum. Vnde obiectum tactus

est effectus talis causa famis & sitis: obiecta reliquorum sensuum, sunt causa ut melius fiat & fames & sitis: v.g. si quis post inediam famefeat, & vel optima inspiciat cibaria, vel de his sermo fiat, vel olfaciat, vel gustet, augebitur cibi cupiditas: quia facultas sentiens vna impellitur ab obiecto & tactus, & aliorum sensuum.

Hinc fames naturalis ita definiri potest: quod sit appetitus secundum naturam oris ventriculi, procedens ab eius motu, dependente à penuria alimenti, gratia instaurationis animalis. Forma, in hac finitione, est appetitus secundum naturam: ad differentiam famis morbosæ. Subiectum est os ventriculi supernum. Causa efficiens est motus, quo afficitur os ventriculi ob penuriam alimenti, ad differentiam sitis in qua scilicet adest non alimenti penuria, sed vehiculi alimenti. Finalis causa est animalis resectio & instaurationis.

Fames naturalis quid sit?

Quare fames morbosæ generatur, dum corpori occurrit aliquid præter naturam, vi cuius facultates aliquæ, appetitioni cibi destinatæ, ita suo munere frustrantur, ut functio appetentis animalis oris ventriculi usque adeo lædatur, ut præter naturam euadat. Proinde fames morbosæ est concupiscentia animalis præter naturam oris ventriculi, dependens à frustratione concupiscibilis cibo destinatæ. Forma est concupiscentia animalis præter naturam: ad differentiam concupiscibilis naturalis (unde colligitur famem esse symptomata ad actiones atinens.) Est autem præter naturam, ad differentiam concupiscibilis secundum naturam: & proinde ad differentiam famis secundum naturam. Hæc igitur concupiscentia animalis, pertinet ad causam formalem: nam quamvis in fame læsio esse possit secundum concupiscentiam naturalem, ea tamen habet rationem causæ efficientis, non formalis. Subiectum Galenus proponit c. l. 8. n. 7. ubi famem recenset inter symptomata oris ventriculi.

Famis morbosæ generatio.

Definitio.

Forma.

Subiect.

Causa efficiens in finitione proponitur, his verbis: dependens à frustratione concupiscibilis, cibo destinatæ. Dicimus cibo destinatæ ad differentiam sitis morbosæ: quæ pendet à frustratione concupiscibilis potui dicatæ. Hic explicanda causa, ob quam concupiscentia animalis frustratur frustratur autem vel Propria ratione, vel ex Accidenti. Propria ratione: dum vitium est in quinto motu: ex accidenti, dum læsio est in reliquis quatuor motibus: nempe in sensu suctionis, in suctione, in vacuatorum appetentia naturali, & totius corporis inani

Causa efficiens.

I. Appetitus animalis vitia.

Vitia concupiscētia animalis, residentis in cerebro.

inanitione. De horum motuum vitiis dicemus. Animalis igitur appetentia frustrari potest, quatenus pertinet vel ad Cerebrum (antequam sc. in os ventriculi influxerit.) vel ad Os ventriculi prout ab hoc suscipitur. Si primo modo sumitur, ut ad cerebrum attinet: functio huius facultatis concupiscibilis læditur, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læditur facultas ob morbos vel Cerebri, vel Neruorum sexti paris. Ob morbos cerebri: veluti in apoplexia, epilepsia, caro, & aliis cerebri morbis: vi quorum prohibetur fluxus facultatis concupiscibilis à cerebro in os ventriculi. Læditur autem facultas ob morbos neruorum sexti paris: quando huiusmodi nerui afficiuntur potissimum densitate: cuius causa esse solet tum quælibet materia Densans, tum Refrigerās. Sed de malis cerebri & neruorum alibi. Cæterum hæc vitia ita se habent, ut dum Integra est angustia, fames auferatur: si Nō integra, fames minuatur. Quod si concupiscibilis actio lædatur ob errorem externum: hic error est, vel Vitiosa cerebri proportio, vel Obiectum improportionatum. Vitiosa proportio viget in his, qui etiam famescunt, dum intuentur murem, vel dum de mure fit sermo: nam quamvis famescant, illico tamen fames prorsus aboletur: vnde huiusmodi homines & nausea & quandoque vomitu afficiuntur. Obiectum improportionatū principaliter attinet ad sensum Internum, vel Externum. Ad internum: veluti dum immoderata animi accidentia occurrūt: idem enim his euenit, quod iis, qui fortibus imaginationibus detinentur, qui ob oculos posita non cernunt, nec aspiciunt, ut phreneticis quandoque accidit: si enim magis potest obiectum morbificum, quam obiectum impellens facultatem concupiscibilem ad cibum: necessario fames vel minuitur, vel aufertur: contra, si obiectum sit potens ad impellendum concupiscentiam: fames intenditur, vnde patiens, ut phreneticus violentia quadam cibum petit. Si obiectum improportionatum spectet ad sensum externum: attinet vel ad Visum, vel ad Auditum, vel ad Olfactum, vel ad Gustum, (de tactu dicemus in suctionis sensu: attinet enim ad os ventriculi.) Visus obiectum concurrat ad destruendum, appetitum, dum vim interiorem auertit ad excitandum animalem appetentiam: verbi gratia si in mensa aliquis videat manum humanam coctam, vel euomentem aliquem, licet famescat, illico tamen destruitur appetitus. Quoad auditum: fames auferatur, si quis comedens audiat loquentem de rebus tetricis & iniucundis.

lucundis. Olfactus adfert famem, si deuorentur foetida: si etiam offeratur aliquis cibus, qui obtineat odorem proportioni organi olfactus aduersarium, veluti accidit, dum aliquis caseum comedit, & eius odorem percipiens, vel eum non admittit, vel reuomit. Quoad gustum: destruitur appetitus, dum iniucunda assumuntur: & hæc vel simpliciter sunt ingrata, vel vni certo indiuiduo sunt iniucunda, aliis autem grata: & tunc vitium pendet à vitiosa proportionem linguae illius indiuidui: veluti si aliquis casei saporem profus respuat. Hæc igitur sunt vitia animalis concupiscentiæ, vt attinet ad cerebrum. Si vitia concupiscibilis animalis perpendantur, vt spectat ad os ventriculi, id est quatenus facultas à cerebro ori ventriculi est impertita: tunc huius facultatis functio læditur, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læditur facultas, dum os ventriculi afficitur, vel Intemperie, vel Mala compositione, vel Soluta vnitatem: de quibus morbis iam supra egimus. Si lædatur ob errorem externum: hic error positus est in proportionem culpata oris ventriculi: veluti dum homines inscii caseum in ferculis assumunt: vnde fit, vt quamuis nec odorem, nec saporem casei percipiant, nausea tamen fiat, ac destruat appetitus. Notandum autem hoc loco, proportionem oris ventriculi à naturali deflectere & recedere: quoniam vel Deficit, vel Excedit. Si deficiat: sunt homines qui vix appetunt, si excedat: sunt homines, qui nimis appetunt, vt, dum comedunt ac bibunt, magis edere ac bibere cupiant. Verum cum appetentiæ animale adiuuet naturalis concupiscentia prodiens ab hepate: in ratione erroris externi concurrat cum Auicenna debilitas hepatis. Hæc sunt vitia concupiscentiæ naturalis.

Sequuntur vitia attinentia ad sensum suctionis: qui motus spectat ad facultatem tacticem. Hæc igitur facultas (cum instar concupiscibilis animalis à cerebro ori ventriculi comunicetur) frustrari potest, vt attinet vel ad Cerebrum, vel ad Os ventriculi. Quatenus ad Cerebrum attinet: lædi potest ob morbos cerebri, & neruorum sexti paris vt modo diximus, de concupiscentia animali. Si occurrat error externus: occurrit dum in ore ventriculi suction recipitur: nō autē ratione iudicij, quia hoc fit in cerebro, nō in ore ventriculi. Itaque error externus esse potest cerebri proportio, vel quia vis sentiēs & iudicās tāgibilis distrahitur ab obiectis aliorum

*Appetitus
animalis
vitia vt
spectat ad
orificium
ventriculi*

II.

Sensus suctionis vitia.

1. ratione cerebri.

2. ratione
oris ventri-
culi.

aliorum sensuum, quatenus hæc obiecta sunt efficaciora, si-
cut diximus de concupiscentia animali. At differentia est in-
ter concupiscentiam animalem & tactum: quoniam ratione
concupiscentiæ animalis, obiecta agunt indifferenter in vim
sentientem: rationem autē tactus obiecta determinate agunt
in facultatem indicantē obiecta tangibilia, veluti dum à viuo
verme os ventriculi pungitur: nam in ore ventriculi fit af-
fectio, vi cuius ita afficitur cerebrum, vt facultas sentiens di-
strahatur à iudicio suctionis, quæ suction fit ab alia causa agē-
te in os ventriculi: & huius ordinis sunt vapores vermium
defunctorum, materiæ veneficæ, & putridæ: nam vi ha-
rum causarum magis afficitur os ventriculi, vt est organum
tactus, quam à suctione. Si suctionis sensus attineat ad os
ventriculi qua, recipit obiecta tangibilia: receptio hæc læditur
vel Lassa facultate, vel ob Errorem externum. Læditur fa-
cultas ob morbos oris ventriculi, qui iam propositi sunt, vi
quorum fit fames morbosa: nam licet fiat suction, ea tamen
non sentitur, vt decet: vnde, si prorsus non sentiatur suction,
aufertur actio: si vix sentiatur, id est cum difficultate, immi-
nuitur: si plus sentiatur, corrūpitur. Declaro. Et primo si per-
pendatur intemperies: Galen. com. aph. 10. sect. 2. com. xi. sect.
1. l. 3. epid. dicit: si intemperies summa fuerit, sensus suctionis
non fit: nam vt inquit Auicennas, virtus perit, quoniam or-
ganum ob summam intemperiem prorsus ineptum reddi-
tur. Hæc summa intemperies, est Frigida, vel Calida. Si fri-
gida: fit fames vaccina seu magna, quæ est affectus frigidus,
coniunctus cum siccitate, c. 7. l. 3. de sym. caus. At si alia ē par-
te sit summa caliditas, etiam cum siccitate coniuncta: non fit
sitis, quoniam suction non recipitur. Si autem intemperies
non sit summa, à qualibet intemperie, excepta humida, su-
ctionis receptio intenditur & augetur. Cæterum discrimen
est inter tactum, & animalem appetentiam: nam animalis
appetentia, quacunque dominante intemperie indifferenter
se habet ad cibum & potum: tactus non indifferenter. Ratio
huius discriminis est: quia appetentia animalis ab alia facul-
tate naturali impellitur, nempe à sensu interiori: tactus mi-
nime, cum ab obiecto recepto, vt offertur sensorio iudican-
ti, sensus interior potius impellatur, non impellat: hincque in
fame procedat obiecti tangibilis receptio, in cerebro iudi-
cium, & mox sequatur impulsio, prodiens à facultate sentien-
te, in cōcupiscibilem animalē: vnde concupiscibilis animalis
impulsa

impulsa descendit in os ventriculi: & fit fames. Itaque cum tactus ad differentiam concupiscibilis non indifferenter se habeat ad cibum & potum: fit, vt si ventriculi os, tanquam organum suctionis sensus, afficiatur intemperie frigida, intendatur fames, & minuatur sitis: si afficiatur intemperie calida, minuatur fames, intendatur sitis: si afficiatur intemperie sicca, augeatur & fames, & sitis: si humida, fames minuitur, sed magis sitis. Ratio est: nam cum appetitus cibi & potus fiat, quoniam afficitur os ventriculi suctione: suction autem similis est solutioni vnitatis: & solutio vnitatis fiat à calido, frigido, sicco, non ab humido: fit vt ab humido non excitetur appetitus, sed potius minuatur: licet magis minuat sitis, quam fames: nam præter id, quod non fit suction ab humido, adest præsentia humiditatis: sitis autem fit ob humidi penuriam. Quo autem ad caliditatem, frigiditatem, siccitatem: quamuis à qualibet fiat suction: tamen, cum fames sit appetitus calidi, sitis autem frigidi: ob id, dum caliditas mouet tactum, per hunc sensus interior impellit appetentiam animalem in frigidum: dum enim viget caliditas, adest penuria frigidi, vnde minuitur cupiditas calidi, & augetur oriturque frigidi appetitus: hincque fames minuitur, & sitis augetur. Contra autem accidit, si frigiditas agat in tactum: fames enim intèditur, & sitis minuitur. Quoad causam siccantem: vel est intemperies sicca coniuncta cum actiuis, vel est sola. Si coniuncta: quoniam iuuat & intendit suctionem, ideo auget sitim, si caliditati iungatur: & famē, si frigiditati com. 19. sect. 4. apho. & cap. 30. lib. 1. simp. Si autem sola sit siccitas, in penuria alimenti augetur fames: in penuria vehiculi alimenti, augetur sitis. Hæc de intemperie. Quoad malā compositionem: concurrit, quatenus angustat nervos oris ventriculi: quo fit, vt os ventriculi non afficiatur à suctione: ob angustiam enim tactrix facultas influens à cerebro, non suscipitur in ore ventriculi. Quoad solutam vnitatem: est in causa deiectionis appetentia: propterea quod os ventriculi magis afficitur à morbo in soluta vnitatem, quam à suctione: vnde, licet vtrumque obiectum offeratur sensorio tactus: tamen iudicium dirigitur potius ad obiectum, quod promouetur vi solutæ vnitatis, quam suctionis: quia obiectum efficacius & potentius, sensum iudicantem ad se allicit, vt reliquorum obiectorum iudicium non exerceat. Quoad errorem externum hic attrinet tum ad Proportionem oris ventriculi.

tum ad Causas, quæ ventriculi sensum vel exquisitum, vel obtusum reddunt. Si exquisitus reddatur, intenditur appetitus: si contra, minuitur. Quoad proportionem: hæc spectat ad os ventriculi, quatenus est organon tactus: & ideo pro varia proportionem vario modo afficitur: & hinc in aliquo indiuiduo suctio remissa magis afficit os ventriculi, quam in alio indiuiduo suctio intensa: cuiusmodi viget in his, qui famem vel sitim nequaquam perferre possunt. Quo vero ad reliquas causas: præsertim sunt veneficæ, & vehementer refrigerantes: vi quarum licet fiat suctio, non tamen sentitur. Vnde non est mirandum, si opiata appetitum destruant: si etiam Gale. dixerit. com. aph. 21. sect. 2. ab aere frigidiore primum tactum excitari, mox extinguere, hincque os ventriculi à suctione non affici.

3.
*Suctionis
vitia.*

Si autem perpendamus suctionis vitia, ita se habent: aut enim non fit suctio, vnde appetitus aufertur: aut debiliter fit suctio, vnde appetitus minuitur: vel suctio iusto fit intensior, vnde appetitus deprauatur. Et ob id, cum suctio sit motus oris ventriculi, dependens à causa agitante os ventriculi: læditur hæc suctio, dum causa viget vel In ore ventriculi, vel Infra: vnde primum afficiuntur venæ ventriculi, mox afficitur os ventriculi. Quo igitur ad causam immediate agentem in os ventriculi: huius perpendenda & Species, & Vitium. Quoad speciem: cum Galeno cap. 7. lib. 1. de symp. caus. & c. 9. lib. 6. de tuen. san. com. aph. 21 sect. 2. & com. 1. lib. 4. de ratione vict. causa est Interna, vel Externa. Interna, Vapor, & Minera. Si minera: potest esse Sanies, prodians vel ex vlcere, vel ex abscessu: potest etiam esse Humor. Externa causa, potest esse medicamentum, venenū, aer, cibus, potus, com. 34. lib. 2. de victus ratione. & com. 1. lib. 4. de rat. victus & com. aph. 19. sect. 4. & cap. 27. lib. 3. alim. Vitium attinere potest ad Substantiam, Quantitatem, Qualitatem, & Vbi. Ad substantiam, vt est succus vitiosus, qui est in causa picæ. At potissimum locum habet vitium in quanto, & in quali: nam vitium secundum vbi, commune est & quanto & quali: nisi enim causa moueatur in os ventriculi, & ibi quiescat: copia vel qualitate non aget: cum per contactum actio fiat. Ceterum, cum causa lædat vel Copia, vel Qualitate: quoad Copiam, huius causa suctio aufertur, vel saltem minuitur: dum vel excedit, vel deficit: nam si excedat, siue causa sit interna, siue externatum copia replet os ventriculi, & impedit, quo minus corrugari & agitari possit: quævis à ventis ventriculi fiat

*Causa suctionis ratio-
ne cause
in ventri-
culi origi-
ne.*

fiat attractio: vnde pituita copiosa, residens in ore ventriculi, impediens suctionem, est causa inappetentiae. Et pariter, quoad causas externas: vt ait Galenus cap. 27. lib. 3. de alimen. pingues & lenti cibi ita celeriter implent, vt appetitus evertatur. Quoad vitium in qualitate: concurrit materia, quatenus agit Caliditate, Frigiditate, Siccitate, Humiditate. Arcet discrimen: nam materia concurrens humiditate, est in causa vt minuatur suctio: qua autem concurrit reliquis qualitatibus, causa est suctionis intensioris: nam suctus affinis est solutioni vnitatis, quæ à qualibet causa fieri potest, excepta humiditate. Quare, vi materiæ humidioris, minuitur desiderium cibi & potus: vi autem reliquarum qualitatatum, intenditur appetitus: circa cibum quidem, si materia est frigida: circa potum, si calida, si sicca: nam dum frigiditas suctionem parit, ita afficitur os ventriculi, vt obiectum offeratur sensui interiori, qui sensus, cum agnoscat præsentiam esse frigidi, facultatem appetentem impellit ad appetitum illius, cuius est penuria. Idem de reliquis causis, in os ventriculi agentibus, statuendum. Sed notandum, cum intenditur fames vel sitis: desiderium esse vel boni, vel mali, tum cibi, tum potus. Desiderium est boni, quando quis appetit bonas carnes, bonum vinum: mali desiderium est, si appetat carbones, aquam turbulentam, vrinam. Huius discriminis causa colligitur è Galeno in arte med. capite de signis ventriculi: dum dicit, intemperantias morbosas à naturalibus differre: nam intemperantiæ naturales, similia appetunt: morbosæ contraria. Vnde ventriculus secundum naturam calidus, in penuria cibi appetit cibum calidum: frigidus autem natura ventriculus, appetit frigidum. Contra ventriculus præter naturam calidus, appetit cibum frigidum. Hæc differentia inde pender: dum enim ventriculus secundum naturam est constitutus, eget conseruantibus, quæ similia sunt: vnde dum fit suctio, ita afficitur sensus interior, vt concupiscentiam animalem impellat in penuria cibi, ad desiderium cibi: & in penuria cibi, in ventriculo secundum naturam calido, impellat ad desiderium cibi calidi: propterea quod, sensui interiori offertur suctio cum sensu caliditatis naturalis conseruandæ, vnde concupiscentia animalis, impellitur ad desiderium simile. Si ventriculus sit præter naturam calidus, sensui interiori offertur suctio, cum sensu caliditatis morbosæ, non conseruandæ, sed destruendæ: vnde concupiscentia

Vnde desiderium boni, maliue cibi & potus.

animalis impellitur ad desiderium non similis, sed contrarij, nim. frigidi, vt morbus calidus dissipetur ac vincatur: & præsertim quia concupiscentia animalis, influxa in os ventriculi, fouetur à concupiscentia naturali, à iecinore prodeunte, quippe quæ semper appetit quod conseruat, ac veluti fugit, quod est inimicum: ideo cum in ventriculo, calido morbo affecto, caliditas sit inimica & contraria, propterea sit appetitus contrarij. Sed explicandum etiam est, cur in ventriculo male affecto appetitus sit intensus ad contrarium, quod modo bonum est, vt quando quis appetit capones, modo malum, vt quando carbonem appetit. Dicendum, discrimen prædire à causa morbofa, quæ suctionis auctor est: quæ causa vel minoris, vel maioris est actiuitatis. Minoris est actiuitatis: quotiescumque minus recedit à naturali statu, nec pertinaciter adhæret ori ventriculi. Maioris est actiuitatis: dum causa magis recedit à naturali statu, & hinc est à toto genere præter naturam, & præterea magis impertitur ori ventriculi: impertitur autem non secundum fibras, nam fieret singultus: sed secundum porciones membranosas, quemadmodum euenire solet prægnantibus, præsertim ad secundum vel tertium mensem: nam prægnantes hoc tempore seant succis vitiosis secundum ventriculum. Verum & in viris similes succi redundare possunt, præsertim in scabiosis, in elephanticis. Itaque succi, quia sunt præter naturam, sunt in causa appetitus contrarij: quatenus sunt exiguæ actiuitatis, sunt in causa appetitus quidem contrarij, sed boni: Si succi sint præter naturam, sunt in causa appetitus præter naturam & quatenus sunt intignis actiuitatis, sunt in causa appetitus contrarij, non boni, id est non alimentalis, sed medicinalis: ratio est, quia prauus succus potius à medicamento, quam ab alimento corrigitur: verbi gratia calx est efficacior ad absorbendum materiam impactam, quam panis bis coctus: vrina etiam magis strenue absorbit succum vitiosum, quam aqua: nam alimentum magis à corpore patitur, quam agit: medicamentum magis agit, quam patiatur. Succus igitur prauus est causa cupiditatis succi prauis, & proinde sibi similis. Vnde Galenus cap. 7. lib. 1. de symp. causat, vitiosum succum excitare appetentiam, naturalis affectus similitudine: quemadmodum enim naturalis affectus efficit appetitum similis, hoc est & naturalis, & boni: ita succus vitiosus excitat appetitum similis, hoc est vitiosi, prauis, nim. efficacia actiuitatis:

quamuis

*Ventricu-
lus male
affectus
contrariu
appetit.*

Quamvis discrimen sit: nam quod desideratur ob affectum secundum naturam, naturale est, & conseruat affectum naturalem: quod autem desideratur causa succi vitiosi, est quidem simile, nam est vitiosum & prauum, non est autem alimentale, sed destruit succum vitiosum, quia omne morbosum refertur in sui destructionem. Alia ex parte læditur *suctio*, ratione causæ, quæ viget infra os ventriculi, utpote in venis ventriculi, & fundo ventriculi. Cum ergo *suctio* secundum naturam fiat, dum ventriculi venæ naturaliter trahunt ab ore ventriculi: sequitur, suctionem leges naturæ egredi, dum venæ vel non attrahunt, vnde fit inappetentia: vel imminute attrahunt, vnde fit imminuta appetentia: vel plus iusto attrahunt, vnde oritur fames canina. Caterum, dum venæ repletæ sunt, vis attractrix, & naturalis concupiscentia cessat à suo munere: dum sunt inaniæ, attrahunt, & naturaliter appetunt: ideo dicendum de causis tum Replentibus, quæ causæ sunt inappetentiæ: tum Vacuantibus, quæ causæ sunt famis, & faciunt ut lædatur attractio & concupiscibilis naturalis venarum, quæ ab ore ventriculi attrahunt. Quoad causas Replentes: è cap. 7. lib. 1. de symptomat. caus. attractio venarum læditur, vel ob Morbum venarum, vel ob Errorem externum. Venarum morbi sunt tumores, obstructions, à materia replente prodeuntes: sed principem locum obtinet caliditas, quippe quæ succos fundendo implet, cum hi fusi, locum maiorem occupent. Error externus esse potest materia replens ventriculum, potissimum secundum fundum, & præsertim esse solet succus crudus collectus, cuius classis etiam sunt succi excrementitij, qui interdum propter famem in ventriculum confluunt: dum enim diu fames urget, ventriculus succos vitiosos allicit, qui replentes, attractionem impediunt, ita ut fames tunc in inappetentiam degeneret. Inanientes causæ sunt venarum frigiditas, quæ exprimendo vacuat: item calor corporis robustus absumens, vnde qui plurimum habent calidi, plurimum absumunt, attrahunt, & denique valenter appetunt. Inanitionis etiam causa est, retentricis imbecillitas, siue simpliciter, siue in respectu ad expultricem, quem admodum contingit in immoderatis euacuationibus. Huius ordinis est etiam vermis alimentum consumens.

Tandem, si respicimus ad totius corporis inanitionem: dum hæc immiuuitur, fit inappetentia: dum augetur, fit

Suctio læsa ratione causa in venis & fundo ventriculi.

4.
Vitia inanitionis totius corporis.

fames. Immodica euacuatio & absolute talis est, & in respectu ad assumpta alimenta: & fit, tum per sensibilem vacuationem, tum per cibi paucitatem. Imminuta autem inanitio fit, dum quod effluit, modicum est: hoc autem est vel simpliciter modicum, sicuti in corpore dentioris cutis: vel est modicum respectu illius quod ingeritur, quod experientur homines in delitiis vitam agentes, qui die noctuque potant & otiantur.

Differenzia. Quoad Differentias à forma: Concupiscentia animalis redditur præter naturam, quatenus vel Non fit, vel Male fit. Si non fit, Adest naturæ fames, vel Non adest, fit fames vaccina, seu magna, in qua, licet inter initia vigeat appetentia animalis, illico tamen aufertur, & adest fames naturæ, videlicet insignis Indigentia alimenti. Si autem non adest fames naturæ: fit fames, quæ dicitur Inappetentia, seu cibi fastidium, id est: *propria*. Si animalis concupiscentia male fiat: tunc vel Imminuitur, & fit Fames imminuta, vel Corruptitur, & tunc intensum est desiderium, vel simpliciter cibi, & fit fames canina, vel pravi cibi, & dicitur *visum*, pica, seu malacia. A subiecto non sumuntur differentie, cum malum solum ad os ventriculi pertineat. Ratione causæ efficientis: cum malum pendeat à frustratione concupiscibilis cibo destinatæ: dicendum, frustrari vel Propria ratione, vel ex Accidenti. Harum causarum subdiuisio patet e supra dictis.

Signa.

*Signa diff.
à caus. eff.
sic.*

Cognitio famis morbosæ in genere, patet ab ægro: sicuti etiam differentie à forma: dicit enim æger, vel nihil se appetere, vel vix appetere, vel plus quam deceat. Quoad differentias ratione causæ efficientis: cum malum fiat, quoniam frustratur concupiscibilis animalis, vel propria ratione, vel ex accidenti: hoc cognoscitur, e præsentia & absentia signorum læsionis, vel propria ratione, vel ex accidenti: de quibus signis seorsim dicendum. Itaque si frustratur propria ratione, cum causâ morbificâ attineat vel ad Cerebrum, vel ad Os ventriculi: si spectet ad Cerebrum: si læsio fiat ob morbos cerebri: signa erunt morborum, de quibus in propriis capitibus. Si lædatur ob errorem externum: si error externus sit cerebri proportio, cognoscetis inde, quod lædatur appetitus, quamprimum obiectum vel visui offeratur, vel de eo fiat sermo, v. grat. de mure. Si error sit obiectum improporcionatum: si attineat ad sensum intentionem: deprehendetis ex immoderatis animi accidentibus, e delirio.

è delirio. Si error attineat ad sensus externos: cognoscetis ex obiectis sensuum externorum, verb. grat. si ilico post intuitum manus humanæ decocto, concidat appetitus, facile est cognoscere, mali causam esse obiectum visus, & sic de reliquis. Si autem frustratio concupiscibilis pertineat ad os ventriculi: si læsio fiat propter morbos oris ventriculi: signa erunt morborum, de quibus supra. Si lædatur ob errorem externum: si error sit mala ventriculi proportio: cognoscetis, si malum oboriatur post aliquod assumptum, incipio ægro: adhuc cognoscetis è defectu, vel excessu ferme perpetuo appetentiæ, citra causam euidentem. Mali autem causam esse iecinoris debilitatem: cognoscetis è signis indicantibus vitia hepatis, de quibus suo loco. Si frustretur concupiscibilis ex accidenti: & primum, si vitium sit in sensu suctionis: si vitium attineat, vel ad cerebrum, vel ad nervos: signa petenda è propriis capp. Si vero mali causa sit error externus: si error fuerit vitiosa proportio: indicabitur, si præter noxas vel ventriculi, vel aliarum partium, homo plus iusto vel appetat, vel à cibo abhorreat: id enim fit, quoniam in cerebro est proportio, vi cuius facultas sentiens, vel est pigra, vel nimis vigilans ad excitandū animalem appetentiā. Obiectum autem distrahens facultatem, cognoscetur: quoniam occurrit obiectum, quod est efficacius suctione: veluti si pungatur ventriculus. Si autem vitium attineat ad os ventriculi, si causa sint morbi: signa erunt morborum oris ventriculi, de quibus diximus. Si error externus sit proportio, cognoscetur ex eo, quod non plus iusto famē vel ferre, vel non ferre possunt. Si error sint venena, vel opiata: horum signa aderunt. Si deinde mali causa sit vitium in suctione non in sensu suctionis: si vigeat in ore ventriculi: oportet cognoscere specie & vitium huius causæ. Si causa sit interna, cognosceris, quia nulla causa est prægressa. Vtrum autem interna causa sit vapor, vel minera: & quæ minera: cognoscetis è signis, traditis in malis ventriculi. Externæ causæ cognoscuntur è patiente & alidētibus. Quoad causam vitij: omisso vitio in quanto, & ubi, quoniam in his tantum est differentia secundum magis & minus, vnde discriminē cognoscitur ex intensiōe & remissionē symptomatum, si vitium sit in substantia: indicabitur è desiderio pravi cibi, vt carbonis. Si vitium sit in qualitate: caliditas cognoscetur è diminuta appetentiā, frigiditas è fame aucta, siccitas similiter è fame aucta, & præsertim si annexa sit

frigiditas, nam si cū siccitate coniungatur caliditas, indicabitur ē siti aucta: humiditas ex imminuta appetentia cognoscetur. Si autem frustretur concupiscibilis vitio appetentia naturalis ventriculi: si in alium pendeat à causa replente: si hæc causa replens sit morbus, hoc est, intemperies calida, tumor, obstructio: cognitio patet ē traditis signis morborum ventriculi. Si autem causa sit error externus, cum sit materia replens ventriculum: si materia sit paulatim collecta: cognoscetur ē fame, quæ sensum imminuta est. Si autem hoc factum sit vi prolixioris famis præcedentis, ut non paulatim sit collecta materia, sed violentia quadam attracta: cognoscetur ē fame prægressa, ē ieiunio. Si causæ sint inanitæ: si fuerit frigiditas: patebit ē signis indicantibus frigiditatem ventriculi secundum fundum, de quibus dictum est. Si calor robustus consumat: cognoscetur ē temperatura calida principalium viscerum, ē carnosio habitu, ex ætate florente. Si causa inanienis sit imbecillitas retentricis, cognoscetur ē fluxu ventris. Si vermis sit absumentis: signa erunt vermium, de quibus infra. Tandem si appetentia vitium sit positum in inanitione totius corporis: excedens inanitio indicabitur ex inedia, exercitio intenso, & similibus: deficiens inanitio contra indicabitur ē cutis densitate, & cum Auicenna exlorio.

Indicationes.

A forma nihil ex usu indicatur. Causa subiecti, oportet seruare calidum insitum oris ventriculi: & oportet fouere proportionem. Ratione efficientis, cum efficiens sit vel morbus, vel error externus. Si morbus: quid indicent morbi, tum ventriculi, tum aliarum partium, petendum ē propriis locis. Si causa sit error exterius: si causa interna: si ad ventriculum attingat: quid indicet, dictum fuit: si autem ad alias partes: suis etiam locis dicetur. Si causa sit externa: hæc non indicat.

Prognostica.

Fames morbosa in genere est vitium non despiciendum: quoniam aduersatur instaurationi animalis, unde est vehementia essentia: & attinet ad os ventriculi, quare vehementia dignitatis. Verum discrimen est pro vi differentiarum. Vnde ratione formæ, cum fames vel auferatur, vel minuatur, vel corrumpatur: si paritas seruetur, periculosius est vitium, si auferatur fames: ideoque Hippoc. aph. 6. sect. 7. ait, inappetentia esse malum, & præsertim in morbis diuturnis: nam patitur homo secundum totum corpus, secundum ventriculum, secundum caput: secundum totum quidem, quoniam non nutritur, secundum ventriculum & caput, quoniam facultas sentiens suo munere destitui

destituitur, desinit, & ad interitum properat: quod fit, ut dum inappetentia protrahitur, consequatur vehementia facultatis: siquidem cum Hippoc. aph. 59. lect. 7. fames corpora siccet: & siccare est deducere ad mortem. Sed notandum, cum fames sit quadruplex: Inappetentia, Fames canina, Pica, & Fames vaccina. Si fuerit inappetentia: si patiens copioso alimēto nō egeat, periculo vacat: veluti in principiis morborum materialium. At si patiens alimento egeat, veluti in morbis diuturnis, in pueris, in euacuationibus immoderatis, tunc malum non est exigui periculi: nam virtus concidit, vnde adest vehementia facultatis: quod potissimum euenit, dum prorsus aboletur appetentia: nam admodum recedit à naturali statu, & multo magis, quam imminuta appetentia. Si fuerit fames canina: si fuerit cum desiderio boni cibi, inter initia vinci potest: at dum producit, periculo non vacat, & cum Auicenna, degenerat in famem vaccinam: quo enim fames canina diutius durat, eo fit vehemētior, & quandoque cōiungitur vehementia facultatis, hincque oriuntur syncopæ, & homines moriuntur: nā in fame canina cibus ingeritur supra cibum incoctum, cibus etiam euomitur, vnde corpus nō alitur, & vis ventriculi hebescit, ideoque fit fames nature. In pica, cum sit desiderium prauī cibi, vitium est curabile, quoniā pendet à succo vitioso, qui vacuari potest: & ob id Galenus cap. 7. lib. 1. de sympt. caus. ait, prægnantes hoc malo sollicitari, quando succi in ventriculo vigent. Sed notandum, malum esse mitius, quo desiderium fuerit cibi minus prauī: quia tunc malum producit à materia minus recedente à naturali statu: & propterea, est vehementia essentia non admodum intensa. Vaccina fames est admodum periculosa: nam cito annectitur vehementia facultatis, quia cū Actio animi deliquit oboriuntur. Cæterū, si prognosticum capiatur à vi causarum efficientium: pro vehementia causarum augeatur & minuitur periculum. Quæ autem sit vis causæ, hoc est morborum, & erroris externi: patet ex his quæ dicta sunt in malis ventriculi. Hoc loco quædam notanda, circa intemperiem, & circa proportionem. Circa intemperiem statuit Auicenna, cum inappetentia causa efficiens esse possit caliditas & frigiditas: vitium esse deterius si producat à frigidityte: nam à caliditate appetitus minus intenditur, à frigiditate magis: & propterea si accadat, ut vi frigiditatis destruat appetitus, hoc fit ob insignem frigiditatem. Quare

cum inappetentia causa esse possit tū frigiditas: tū caliditas cū frigiditas magis recedat à naturali statu, & hinc sit vehementior secundū essentiā: ob id frigiditas est causa deterioris inappetentia. Circa proportionem scire oportet, quemadmodum proportio est nativa, introducta à principiis generationis, & immutabilis: at fieri potest, vt facultas à proportionē contracta, quandoque à secundo actu, id est, ab operatione deficiat: sicuti etiam magnes deficere solet ab attractione ferri, secundo actu, è contactu adamantis: ita colligere etiam licet, famem morbosam, à proportionē prodeuntem, corrigi posse, non destructa proportionē: nam stante vita, necessario permanet proportio: at proportio ita potest affici, vt cum non conferuetur facultas, facultatis actio, & hinc actus secundus pateat.

Curatio.

*H' aroget-
tia.*

*Ad reple-
tionem v-
triculi.*

De materiis breuiter dicemus. Quid enim postulent morbi vetriculi, cerebri & neruorum: dictum est suis locis. Scorsim autem circa quamlibet famem digrediemur. Quo igitur ad inappetentiam attinet: cum Aetio, Paulo, Alexandro, & Auicenna, cum malum fiat potissimum, quoniam vetriculus vel repletur, vel intemperatus redditur: quantum attinet ad repletionem vetriculi: probantur vomitoria, si æger ad vomitum sit procliuus: sin minus, probantur vacuantia per aluum. Vnde pro vomitorio *aquam copiosam vipose ad Tbjs. & tepidam, frequenter exhibebimus.* Alexander improbat *mulsam*, vt quæ intemperiem latentē corpori insinuet, quod proposuit Alexander, quoniam vomitorio vtitur causa bilis, & iccirco mulla improbatur, quia potest calefacere, & in bilioso corpore in bilem mutari. Id quod intelligendum de mulla meraciore, quæ multam mellis copiam recipit. Paulus enim probat mulsam, scilicet dilutissimam, cum copiosissima aqua. Sed quia vomitoria nocent iis qui difficulter euomunt: (vetriculus enim vellicetur, distenditur, & hinc appetitus magis subuertitur) ob id studendum vt quantum fieri potest, vomitus facile fiat: ad quod consequendū cibis humectantibus & porionibus occurrendū: sic namque recrementa humorosa supernatant, hincque facile educuntur per vomitum. Et ob id etiam Paullus *ante tepidam exhibet vel psiana cremorem, vel onorum lutea.* At si prorsus difficulter vomat patiens: probatur potius *aloe, quam scammonium: hoc enim stomachum offendit, & propterea vel non exhibendum, vel in parua copia, & malis coctis castigatum: unde exhiberi potest*

Disco, 10

Dizydonites, confectum cum exiguo scammonio, seu diacrydio. Quod si Paulus, cum reliquis, admittit scammonium, nobis etiam licebit ut rhabarbaro. Causa vero cur Græci scammonio sint vsi, & cur nostrabarbarum admittamus, est: quoniam expedit quam celerrime bilem vacuare: nam expedit appetitū reuocari. Verum cum medicamenta facilius par aluum euacuent, cum Paulo copiosa & temperata alimenta prius exhibenda: quare per duos vel tres dies exhibere licet onorum viscosos, in iure conquassatos: licet etiam exhibere cremorem pisanas, & similes. Verum si humores vacuandi sint crassi & viscosi: exhibere poteris specierum hiera 3 β. cum melle rosato soluto. Et ut humores cedant, cum Aetio probatur oxymeli, item cibi parati cum aqua salita, & pōnde sal, cappares, oliue, & similia attenuantia, & inculentia. Optimum in hoc malo est medicamentum, si exhibeatur mellis ros. solut. 3 v. cum oxym. simpl. 3 ij. Si autem ventriculus sit intemperatus: si intemperies calida: Auic. probat frigida potum, sed ea quantitate, qua calidum innatum non exstinguatur: vnde exhibere licet à tb i β. ad tb ij. & potius repetere. Alexander probat, quæ cum aceto parantur. Quare exhibere licet poscam, id est, aquam cum aceto, lactucam, endiuia, aceto conditas, ut refrigeretur ventriculus. Paulus exhibet panem posca imbutum, & opsonium è lacte & aceto paratum: potest etiam confici cibus è portulaca cum aceto: (per opsonium intelligimus cibum ab aliis separatum, veluti ex salsa, quæ conficitur è petroselino, ex amygdalis, & aliis id genus.) Auic. etiam extrinsecus probat medicamentum confectum ex oleo rosaceo, carne cydoniorum, rosis, cum exiguo mastiches: verbi gratia, xl. carnis cydon. decocta sub cineribus 3 j. olei rosac. complet. 3 j. β. pulv. rosar. 3 j. β. mastiches 6 β. Misce, & fiat emplastrum. Mastiche miscetur ad corrigenda medicamenta frigida, & ut seruetur calidum innatum. Si autem intemperies fuerit frigida: Auic. proponit decoctum piperis, cinamom. diatrionpiper. diacalaminth. methridacium. Alexander probat theriacam, decoctum ruta, anisorum: probat alia, ius columba, & uuarum passarum: vix enim passe stomacho sunt gratæ, contemperant succos malignos, & crudos concoquunt, & nutriunt. Alexander cum Paulo probat vinum vetus, & conditum, id est, calidis alteratum, de quibus in sermone de frigido ventriculo. Extra autem probat medicamentum, confectum ex oleo de spica, de absinth. mastich. additis mastiche, xylolaloe, gallia moschata, maci, & aliis

Ad intem-
perie ven-
triculi.
Calida.

Frigida.

ab *Auiscen. propositis*. Verum admonet Paulus, si forte contingat, ut sit patiens qui simulet inappetentiam, quoniam desiderat sibi concedi inutilia: tunc oportet patientes grauitur reprehendere, ut utiles cibos admittant. Si non obediunt, & hinc contabescant: expedit cibum parum deteriorem exhibere. Cibaria autem cum Paulo ita paranda sunt in hoc malo, ut facile deuorentur: quæ non multa egent masticatione, iniucunditatem afferunt, & appetentiam euertunt.

*Ἡ κωσπὶ-
ξίν, ἢ κωσά
δης ὀπὲξ.
Ad frigi-
dam dys-
crasiam,
materiam
acidam, &
sensum su-
ctionis.*

Fames canina sequitur. Hæc si fiat citra inanitionem: cum suctio in hac intendatur, vi vel frigida intemperiei, vel materiei acidæ: è dictis patet, quæ medicamenta conueniant. Id solum cum Aetio notandum: probari cibaria, quæ & sensum suctionis obtundunt, seu compescunt: & materiam morbificam attenuant, ac incidunt, ut facile possit euacuari. Ad sensum suctionis obtundendum: Gal. com. aph. 11. sect. 2. probat lenta, & pingua: nam hæc replent os ventriculi, ut à suctione non ita afficiatur. Aetius probat iniucunda, & quæ in magna copia accepta parce nutriunt. Hinc conueniunt *pulces, placenta cum melle copioso, aut oleo plurimo, aut adipe asferino, gallinæ, suillo, item malua, cerebella. Præterea lac, vel solum, vel cum melle: item oryza cum lacte: & amygdala, nuxes pineæ. Abstinentium ab acidis & astringentibus: nam hæc suctionem intendunt. Quoad incidentia & attenuantia: probantur cibi conditi allio, porro, thymo, satyria, origano, &c. (vnde non est mirum, cum ita varia sint usurpanda, quod patientes sæpe non restituantur sanitati.) Probat etiam vinum alteratum calamentis, salvia, guaiaco, sassafrae, &c. Vinum autem sit tenue, fulvum, odoratum, non valde vetustum: & dabitur tum ieiuno, tum post sumptum cibum, in magna copia, id est, secundum Aetium, quantum homo bibere potest: quoniam hoc vinum ventriculum calefacit, humores acidos destruit: ideoque solum vinum quandoque sufficit, ad perfectam curationem: quam in sententiam Hippocr. aph. 11. sect. 2. ait, famem vini potione solui: ubi per famem, intelligitur canina (teste Gal. in com. facta vel ab intemperie frigida, vel ab humore acido: & gloriatur Gal. se multos, indefinenter famelicos, sanasse vino abundanter exhibito. Quod si fiat fames canina vi inanitionis: medicamenta & cibi probantur, quæ à dictis plurimum distant. Aloe tunc insensibilissima est, ut etiam incidentia & tenuantia. Probantur autem densantia cutim: ut medicamentum confectum ex oleo emphacino, cum myrio, aut rosis, ad lentum ignem decoctum.*

Ad inanitionem.

Licet

Licet etiam, urgente necessitate, immiscere alumen scissile, prius in aceto tritum: pro singulis scilicet olei omphacini uncij, misceri poterunt singuli scrupuli aluminis. Cibos Aetius probat stabiles, id est, qui ægrè corrumpantur, ut cochlea sunt, & omne genus ostrearum. Probat etiam carnem suam ætate florentium, & potissimum probat ventres & vulvas suam: & in summa probat cibos tarda coctionis, & tarda distributionis: unde & ova indurata, aut in stragine fixa, imò panem non fermentatum. Vinum, in fame canina ex inanitione, potius ledit, teste Galeno: quare exhibenda aqua, vel vinum astringens. Notandum cum Aetio, circa quantum agendum, in cibis crasse facientibus, & medicamentis astringentibus, quæ extra applicantur: ut, quantum accessio imminuitur, tantum etiam minui debere cibos crassos, & medicamenta astringentia: ne aliud grauius suboriat malum, dum crudis crassisque succis corpus repletur.

Quoad Picam: in hac oportet succum in ore ventriculi impactum discutere: & in cavitatem existentem euacuare: & ventriculum roborare ne suscipiat. Quoad vacuantia igitur: nisi vomitus sit admodum difficilis, probatur ius pulli tepidum, cum syrupo acetoso simplici, vel etiam cum oxymelite: & usu postulante, ad succum raphani ascendere licet, præsertim si vtero non gerat: hæc enim mitius tractanda, ne fiat abortus. Et ob id Aetius exhibet aquam tepidam, præcipuè si scemina ventriculi habeat repletum humore acris, acido: aut salso. Si patiens maxima difficultate vomat: probantur species hieræ, mel rosæ, cum oxymelite: si vtero gerat, hieræ species non conueniunt, quia menses prouocant. Si lutum appetat patiens: secundum Auicem, exhibeatur aqua, cum vomitorijs, ad lb. ss. & in ea dissoluatur lutum mundum ad xj. Quoad discutientia succos impactos in ore ventriculi: probatur diatrion piper, diacalaminsbes, & potissimum licet conficere pilulas de quinque granis annuicis, macis, saffra, & Zingiberis, fiat pil. num. vij. cum oxymelite scillitis. hoc medicamentum summa vehementia discutit succos. Probatur etiã oxymeli scilliticum. Quoad roborantia os ventriculi: Aetius probat succum mali punici dulcis, cum menta sicca, sed aspersa cremore portulacæ, vel inspersa decocto polygoni: quæ habens vim astringendi. Probantur & alia astringentia, ut est confectio à santalis, & diacydonites cum saccharo. Extrinsecus probatur cataplasma, confectum de rosæ, gallis immaturis, malicorio, myrro, cotoneis, quæ baseos erunt loco: addenda quæ tenuis sine substantia, pro vebiculo: item quæ corrigant frigida, ne calidum infirmo

Mucosa.
in xij.
Vacuata.

Discutien-
tia.

Roboran-
tia.

latur:

ladatur : pro correptione frigidorum , addatur mastiche & absinthium ; pro vehiculo , miscatur feniculum , cuminum , aromata : basis autem in maiori erit quantitate , verbi gratia ℞. rosarum , galbanum , munnuratum , malicorum , myrtillorum an. ʒ. carnū cydoniæ decoctæ sub cineribus ʒ. β. mastiches , absinth. an. ℞. fenic. cimini , cinamom. an. ḡ. v. M. i. s. & fiat cataplasma.

Diat.

Cibus proportionem respondebit. Victus mediocris erit , nisi sit prægnans : tunc enim suavis Aëtiij , cibum oportet exhibere in minori copia , si scilicet prægnans sit , in qua multus sanguis collectus sit. Si patiens cibos respuat : occurrendum variis & iucundis opsoniis. Si terram patiens appetat : prodest exhibere amyllum recens (secundum Aëtium) vice terræ. A dulcibus opsoniis abstinendum , quia ventriculi os laxant. Et , si patiens delectetur dulcibus , miscenda astringentia : unde opsonium fieri posset è saccharo , cum succo cydoniorum. Ad minuendum sensum suctionis in pica , probantur pedes , rostra , ventriculi porcorum. Verum ante cibum , dum institutum est succos discutere , Aëtius exhibet olivas sale conditas , vel v. vel vi. amygdalas amaras. Dum propositum est vetricumilum firmum reddere , exhiberi potest , vel polenta , vel panis , cum succo cydoniorum , aut puniceorum madefactus. Post cibum Aëtius probat pissulas. Et si periculum est vomitus , probat poma granata , pica. Pro potu probat , vinum fulvum , odoratum , antiquum & pro robore vetriculi subastringens.

Valius.

Vaccina fames , vel Exquisita est , vel Notha , seu spuria. Exquisita est , quæ fit à frigiditate agente in os vetriculi. unde primo intenditur animalis appetentia , mox aufertur , & relinquitur fames naturæ. Notha fit (secundum Alexandrum) ab immodico calore , agente in os vetriculi : unde calidum iniatum ita dissolvitur , ut nisi ager cibum assumat , animo deficiat. In malo igitur utroque adest alimenti penuria : ideoque alimentis occurrendum , in exquisita calefacientibus , in spuria refrigerantibus. Quoad medicamenta famis vaccinae exquisitæ , probantur medicamenta proposita in temperie frigidi vetriculi , verbi gratia , uti licet dianthos , conserva & betonica. In fame autem vaccina spuria , probantur proposita in calidiori vetriculi intemperie , ut est , verbi gratia , saccharum rosatum , conserva ex succo citri , &c. At cum Alexandro notandum , ab opio cavendum esse , licet intentas sit feruor. Vigente tamen necessitate , probantur magna antidoti , sed recontes. Item Philon. Romani hac enim opum recipiunt , sed plurimum

Medicamenta.

calidus

calidis misium. Expedi autem his miscere conseruas calefacientes, ut est dianthon. Proinde Alexander opium sincerum prohibet quod nonnulli cum frigida exhibebant. Quoad ea quæ admouentur in fame vaccina notha: probatur emplastrum è carne cydoniorum, additis oleo rosæ cum rosis, & exiguo mastiches. Quoad diartam: primû in vaccina fame exquisita, probatur aer alteratus, ambra, mascho, cinamom. aniso, maci, &c. licet etiam odorari carnem assatam: ita enim aeraptus redditur, ad reficiendos spiritus. Probatur odor vini aromatici cum aceto. Præterea in penuria materiæ, cum Galeno lib. de med. facile parabil. cap. 15. licet etiam ad olfaciendum porrigere acetum, fructus odoratos, & terram aceto madefactam. Cibi sint euchymi & eupepti. Vinum probatur vinosum. Si fames vaccina sit notha: probatur aer frigidus: quæ odoramenta fiant ex aqua rosacea, rosis, aceto, pomis, violis, caphura, &c. Cibos Alexander probat qui ægre coquantur, ut oryza, & alia superius dicta. Alterandi cibi sunt in hac fame notha, endivia, lactuca, portulaca. Vinum eris pauciferrum, & subastringens.

Dieta.

CAPUT VIII.

De Siti morbosa.

RE hanc intelligimus sitim corruptam, hæc est, intensiorem redditam, siue sit immoderata portionis, siue portionis prauæ. Excludimus sitim ablatam, & imminutam: harum enim doctrina patet è traditis de fame morbosa. Proinde corrupta sitis generatur, cum corpori aliquid præter naturam occurrit, ut cuius os ventriculi afficitur, ut hæc affectio impertijatur sensui interiori, & hinc impellatur animalis appetentia, ut ea lege influat in os ventriculi, ut desiderium potus præter naturam intendatur. Sitis ergo corrupta, est concupiscentia animalis deprauata oris ventriculi, dependens à frustratione concupiscebilis potui destinata. Forma huius vitij est concupiscentia animalis (de qua supra) deprauata: ad differentiam & sitis secundum naturam, & præter naturam, sed ablatæ & imminutæ. Subiectum est os ventriculi.

Nomen.

Generatio.

Definitio.
Forma.

Subiect.

Causa efficiens.

Ratione efficientis, diximus, quod dependeat à frustratione concupiscebilis potui destinata: ad differentiam famis. Iam ergo proponenda sunt causæ, ob quas hæc facultas frustratur. Gal. c. 30. li. simp. ait, sitim fieri part. humoris inopia, part. caloris

caloris copia. Dum enim vehiculi est inopia, insurgit appetitus huius humiditatis, huius liquidi. Præterea dum adest calor immoderatus, est priuatio frigidi: unde plus iusto calidum insitum extra mouetur: quare excitatur appetitus frigidi, ut retundatur caloris motus ad extra, & prohibeatur dissolutio. Cum igitur humoris inopia fiat appetitus humidi, caloris inopia, appetitus frigidi: nihil aliud sit quam sitis. Immediata quidem sitis causa vnica est, cum vnus affectus non possit habere duplicem causam: sed mediata, est multiplex, quæ tamen ad duos principes fontes reducit: nimirum ad duplex vitium humiditatis roridæ oris ventriculi: quorum vnum attinet ad quantitatem imminutum, dum humiditas deficit: alterum ad qualitatem, dum humiditas non deficit, sed effervesceat. Porro indagandæ sunt causæ, ob quas rorida humiditas, & deficit & effervesceat. Deficit, cum Aui. Alex. & reliquis, propter causam Internam, vel Externam. Interna causa, est morbus siccus oris vetriculis & humor siccus, & renū diabetica affectio. com. aph. 19. sect. 4. Externa causa non necessario occurrens, est veluti medicamentum soluens, nimirum purgans: medicamentū etiam astringens & exprimens humiditatem: item venena exsiccantia. Causa externa necessario occurrens, est veluti cibus stipticus, consumens humiditatem: item defectus potionis, com. aph. 27. sect. 3. item immoderata inanitio, vigiliæ, timores, mœrores, dum excedunt. Effervesceat rorida humiditas, ob causam Internam, vel Externam. Interna, est causa calefaciens: quæ vel simplex est Qualitas, vel Humor calidus. c. 30. l. 1. simpl. Simplex caliditas detinens os ventriculi, vel est causa Præcipua, vel sine qua non. Causa præcipua, seu principalis, est intemperies ventriculi calidior, quæ suborta sit citra vitium caliditatis alterius partis. com. aph. 19. sect. 4. Caliditas autem sine qua non, est caliditas affligens os vetriculi, sed impertita ori vetriculi vel à Toro, vel à Parte. com. 1. l. 4. de ratione victus. Si caliditas sit in toto, vel in febre ardenti, sitim omnino parit è necessitate. Si fuerit caliditas in parte: sitis non oboritur, nisi pars primo affecta proxima sit ventriculo, apertæque sit ad producendum sitim: primum locum cum Galeno. tener os ventriculi: secundum, ventriculi corpus: tertium, oesophagus: quartum, pulmones: quintum, ieiunum intestinum. Ratio est: nam os ventriculi est pars, sine cuius affectione non fit sitis: reliquæ partes sitim committunt, quatenus in consensum ducunt

*Defectus
humidita-
tis rorida.*

*Effervesce-
ntia humi-
ditatis ro-
rida.*

1.

ducunt os ventriculi, h. e. vbi impertiuntur veluti caliditate ori ventriculi. Dum Galenus pulmonem proponit, non excludit cor, quatenus cor est viscus in thorace contentum: vnde Auicenn. statuit, sitim fieri à corde, & à pulmone, dum hæc viscera incalescunt. Præterea, cum sitis fiat à ieiunio: intestino: iure Auicenn. ait, etiam fieri ab hepate. Quin etiam, cum Auicenn. à cerebro, si insignem contraxerit feruorem, caliditas impertiri potest ori ventriculi: indeque sitis excitari. Auicenn. non fuit superfluous, nec Galenus diminutus: hæc enim per modum exempli loquitur: ille è proposito. Hæc de simplici caliditate, quæ est in causa sitis. Quoad materiam: potest esse Vapor, vel Minera. Vapor est febrilis, item saluus vapor, prædiens à materia aquosa in hydrope ascito: vnde Auicenn. ait, sitim fieri in hydrope, quoniã prohibetur transitus humiditatis, quæ membra humectare debebat: dum ait, membra priuari humiditate, intelligit sitim naturæ, non animæ: ratione ventriculi, intelligit sitim animæ; nam materia aquosa, seu perulenta, si derineatur, salsa euadit, & hinc mittit in os ventriculi vapores saluos, & calidos, vnde fit sitis. Quemadmodum etiam vermis mortuus, vapore calido potest sitim parere. Quoad humorem seu mineram, præsertim est materia biliosa, item salsa pituita. At humoris vitium, quandoque est à toto genere præter naturam: veluti si quis appetit vrinam, cap. 7. lib. 1. de symp. caus. sed hic humor vergit ad calidum, ad differentiam humoris, qui picæ est causa. Cæterum & vitium in substantia esse potest, dum humor putrescit. Sed perpetuo vitium situm est in caliditate, qua afficitur bilis amara, pituita dulcis, pituita potissimũ salsa. Causa externa non necessario occurrens, est medicamentum calidum, vel acre, vel salsum. com. aph. 19. sect. 4. præterea & medicamentum purgans, qua euacuat, & humiditatem absumit: (si enim concurrat vt calidum, humiditatem accendit.) Humus ordinis est venenum calidum. Efficax admodum causa sitis est viperarum punctio, quoniam emittitur virulentia, cuius forma est tantæ actiuitatis, vt sui calore, cen organo, vehementer accendat oris humiditatem, & vehementer siccet, ac absumat. Secundum Auicennam igitur, vinum viperinum, seu veneficum, sitim parit. Causa autem externa necessario occurrens, est aer æstiuus, præsertim si eo tempore fuerit. Concurrit etiam cibus vel copiosus vel calidus, vel crassus, vel lentus. Copiosus quidem cibus, causa est sitis: nam

huius gratia laborat calor ventriculi, vnde effervescit humiditas, præcipue quia cibus copiosus non facile descendit. vnde vicinus manens ori ventriculi, suo vapore humiditatem accendit. Quo fit, hanc sitim somno sedari: quippe est in causa, vt calor vniatur, & non ita labore. Somnus etiam prodest cum Galeno, com. aph. 17. sect. 5. quoniam est in causa, vt descendat id quod facit sitim. Calidus deinde cibus in causa est sitis, quoniam humiditatem accendit: vnde sesamum, & erysimon, vt calida sunt, faciunt sitim. c. 30. l. 1. alim. quemadmodum etiam cibi aromatibus conditi, & cum Auicenn. pisces saliti. Cibus denique crassus & lentus potest esse in causa sitis, instar cibi copiosi: quoniam calor laborat, & in attenuatione, & in deterfione. Præterea causa sitis est potio calida, vt vinum, aqua salsa. com. 35. l. 2. de ratione vict. & com. 1. l. 4. de rat. vict. & com. aph. 17. sect. 5. Auicennas addit somnum, tanquam causam sitis, si scilicet fiat super cibum calidum: nam in causa est, vt vapor calidus petat os ventriculi. Auicennas etiam addit motum vehementem & linguæ, & totius corporis: & tandem iram: nam huius causa humiditas oris ventriculi accenditur.

Differentia. Quoad differentias, ratione formæ: concupiscibilis intensior, est vel simpliciter Potus, vel Potionis prauæ. A subiecto non sumuntur differentia. Ratione efficientis: suctio est immodica, quoniam oris ventriculi humiditas, vel Deficit, vel Feruet. Atque vtcunque se habeat: defectus & feruoris causa est, vel Interna, vel Externa.

Signa. Sitis in genere ab ægro fit evidens: sicut etiam differentia à forma. Ratione causæ efficientis: cum oris ventriculi humiditas vel deficiat, vel accendatur: cum Auicenna deprehendetur, è signis præsentibus vel inopie humiditatis, vel excedentis caliditatis. Quoad causas inopie humiditatis, & proinde quoad causas siccantes: si causa siccans sit intemperies ventriculi: signa patent è proprio loco. Et similiter si in causa fuerit humor siccans. Si causa sit, morbus renum: sunt signa diabeticæ affectionis. Si causa sit accendens humiditatem oris ventriculi: vtrum sit vel caliditas, vel humor calidus: cognoscetur è traditis de intemperie ventriculi calida, vel sine materia, vel cum materia. Vtrum autem caliditas sit principalis, vel sine qua non: deprehendetis è signis, vel indicantibus, vel non indicantibus vitium extra ventriculum: verbi gratia, è febre cognoscetis, caliditatem esse sine qua

qua nō, & à toto prodire. Si in iecinore fuerit inflammatio: pariter cognoscetis ex hac inflammatione, caliditatē esse sine qua nō, & prodire ab hepate. Et sic de reliquis. Nū causa sit vapor, vel humor: cognoscetis è traditis in sermone de intēperie vetriculi: ubi tradita sunt signa cuiuslibet & vaporis & humoris.

Secundum Galenum c. 30. l. i. simp. si sitis fiat ex humoris inopia: humectare oportet: si è caloris abundantia: si simplex sit caliditas, oritur indicatio refrigerandi: si humor, vacuandi.

Indicationes.

Non autem est contemnendum hoc vitium: quia, vt & famus, nocet refectioni corporis. Si autem perpendamus differentias, ratione formæ: sitis est magis periculosa, si fuerit desiderium prauæ potionis. Ratione causæ efficientis: si causa efficiens sit vehementior: malum non tantum periculosum est, sed interdum etiam lethale: & propterea Galenus cap. 7. l. i. de causis sym. ait, obiisse quosdam, qui pertinaciter sitim sustinere voluerunt: & nonnullos obiisse, qui malignam aquam immoderate biberant: præterea, qui viperam comederat, & qui vinum viperinum biberat: obiit etiam ex inopia & feruore humiditatis, qui vinum vetus ad ebrietatem hauserat. Vbi notandum, sitim non fuisse mortis causam, sed fuisse occasionem, vt homo impatiens vinum biberet immodice, quod vinum deinde mortis fuit causa: sicut etiam contingit ei, qui ardenti correptus febris, immodice frigidam bibit. Sed ad rem: Causa admodum vehemens est in causa mortis: nam insigniter afficitur os ventriculi, vt emergat qualitas spiritalis ita infensa, vt cordis calor euertatur, & homo pereat.

Prognostica.

In hoc malo pro diuersitate causarum variis vt oportet præsidiorum materiis: cap. 30. lib. i. simp. Nam in siti à siccitate, omne acetum improbat. In siti à caliditate & siccitate, probatur acetum, sed aqua mistum. Tandem in siti, à pituita salsa, probatur acetum simplex. Acetum enim strenue refrigerat, & humectare non potest, expedite porneat: incidit: quare in siti è siccitate improbat, cum exsiccet: in siti è caliditate & siccitate, probatur, sed aqua mistum: nam acetum refrigerat; aqua permista humectat: probatur denique acetum simplex in siti, cuius causa est salsa pituita, quoniam refrigerat salis calidamque pituitam: præterea pituitæ humiditatem seccat, crassitiem incidit. Vacuantia probantur in siti, quæ sit à materia. Proinde cum Alexandro, si patiens facile euomat: si peccet bilis: probatur aqua bordeacea lapida,

Curatio.

Aceti usus.

Vacuatio.

Refrige-
ransia, &
humectan-
tia.

Et simplex aqua tepida. Auicennas dicit, aquam frigidam sitim augere, & tepidam minuere: quoniam vi aquæ frigidae bilis, quæ est in causa sitis, magis detinetur, & virtute tepidæ euacuatur. Si pituita falsa sitis sit causa: probatur aqua bordeaceæ, cum oxymelise. Et si æger difficulter vomat: probantur variæ per aluum lenientia: de quibus alibi diximus. Quoad alterantia, probantur, quæ fauces possunt alterare: ea enim alteratio ori ventriculi impertitur. Quare cum Galeno, com. aph. 54, sect. 4. dicendum, febre ardenti correptos, non sitire, si à tussi sicca leuiter irritentur: quoniam per tussim oris partes humectantur. Iure igitur Auicennas probat frigidam, administratam super linguam. Confert in ore detinere nucleos prunorum, folia lactuæ, immersa in frigida: probantur cules lactuæ. Et cum Actio probatur liquiritia. Vii etiam licet cremore pampinorum visis, succo portulacæ, succo cucumeris: probantur etiam grana puniceorum, araniæ, probantur limones, frusta melonum quæ sunt prope corticem, anguriae, cucumeres. Possumus hoc medicamento vti: ꝑ. seminum cucumeris hortensis, melonum, amygdalarum dulcium, diacodeion in forma solida, cum saccharo, ana ʒj. cum albumine ouorum, fiat pilula. Et, si malum non cedat: hæc medicamenta non tantum in ore sunt detinenda, sed etiam deuoranda.

Dietæ, in
siti tenen-
da.

Cæterum, si eueniat, vt immoderatus sit vini appetitus, vt propterea homo ebrius euadat: bifariam possumus occurrere: primum, remediis, quorum beneficio homo à copioso vino abstinere: deinde in medicamentis, quorum beneficio homo citra ebrietatem bibat, quantum libuerit. Quoad primum, potius alimentis quam medicamentis occurrere potest: ideo in doctrina de dieta simul hæc persequemur. Auicennas igitur in siti prodeunte à pulmone probat aëris frigidi attractionem: quare urgente feruore pulmonis, expedit prope os detinere vas frigida repletum. Cibus (nisi sitis prodeat à falsa pituita) probatur refrigerans & humectans. Vnde Galenus cap. 4. lib. 3. de temperam. probat lactucam: & cap. 9. lib. 1. de alimen. & cap. 5. lib. de ptisana, probat ptisanam bordeaceam. In summa probantur cibi propositi in calidiore & siccioris ventriculo. Si autem sitis prodeat à falso humore: cum Alexandro ad deterfionem probantur cibi salsi, vt cap. papes, salsamenta, pisces salis: cap. 6. lib. 7. Quoad potum, si sitis procedat ex inopia alimentis: vinum exhibendum, quale sine noxa bibere consueuerunt. Si sitis prodeat à caliditate: aqua exhi

exhibenda. comm. aph. 27. sect. 5. Si è bile fiat sitis: probatur aqua. Si è falsa pituita: cum aqua oportet miscere acetum. Tandem si immodicum sit desiderium vini & primum, ut patiens ab hoc appetitu vindicetur, probatur vinum detentum in vase, in quo, patiente in scio, immixta sit vel anguilla, vel lacerta viva, vel testudo lacustris, vel semina caulium. Probatur etiam vinum medicatum, cum myrto, vel granatis. Cæterum Auicennas circa usum potus probat, ut non bibatur aqua plurima subito: unde Philosophus proble. 17. sect. 2. ad extinguendum sitim laudat potum exiguum, sed frequenter exhibitum. Probat quidem parvam dosim: nam licet possit esse indicans summæ actiuitatis, tamen virtus prohibet: quoniam aqua copiosa mortificat calidum insitum, secundum Auicennam: verum gratia sitis atque etiam virtutis, oportet frequenter exhibere. Et si contingat, ut indicans sit admodum vehemens: potio exhibenda est etiam tempore noctis. comm. aph. 27. sect. 5. quod non faciendum, si modica sit sitis, quoniam sitis non valde intensa per somnū corrigitur. Si sitis fiat è caliditate: secundum Aetium, probantur vigilie, quoniam refrigerant: & propterea somnus (ut supra dixi) super cibum calidum, sitim excitat. At si fiat sitis à siccitate: cum Aetio & Auicenna probatur somnus. Et similiter si fiat ex humore: nam per somnum coquitur humor & descendit. In siti è siccitate: quia labor siccatur, improbantur tum corporis, tum animi motus, secundum Hippocratem. text. 31. l. de sal. diet.

Ut vini
oriatur
fastidium.
Plura, de
diata.

Quod si patiens summe vinum appetat, ac facile inebrietur: occurrendum præfidiis & assumptis, & applicitis. Quoad assumpta: antequam homo vinum bibere incipiat, oportet ut hauriat duo vel tria cochlearia olei communis simplicis, extrahæ ex immaturis oliuis, & oportet addere sem. caulium. Et: oleum quidem supernatando prohibet ascensum vini vaporum: & quia factum est ex oliuis immaturis, propellit etiam vapores vini ad partes infernas, præsertim si miscetur pulvis caulium: summa enim est inimicitia inter caules, & vitem: nam si brassica prope vitem plantetur, discedere ab inuicem hæc duo videntur. Quoad ea quæ admoventur: roborandum est caput, & abluendum è lixurio, & aqua alterata cum brassicæ. Videatur Galenus, cap. 1. lib. 2. de ratione.

Ad auer-
tendum
ebrietatē.

*De laesa chylicatione.**Nomen.*

Dimplex in ventriculo celebratur coctio, vna cibi, altera chylinam ope alteratricis cibis primum mutatur in chylum: mox chyli portio ope eiusdem alteratricis in substantiam conuertitur ventriculi. Nos in praesentia versabimur circa concoctionem, vt ad cibum refertur, cuius opus est chylus: mutationem autem cibi in chylum vocamus chylicationem. cap. 1. lib. 3. de sym. caus. Per chylum vero non oportet intelligere cremorem pituitosae substantiam albam, aut lac: sed cibum, mutatum in quandam substantiam, quae conuenientem assequitur qualitatem, vt in iecinore in sanguinem conuerti possit. Quoniam ergo impossibile est, vt error, qui in prima coctione committitur, corrigatur in secunda coctione: sequitur, quod per chylum non debemus intelligere substantiam simpliciter liquidam, & albam: sed eam quae obtinet conuenientem qualitatem, quam acquirit ab alteratrice ventriculi. Quod si enim e bruto sanguis extrahatur, sanguis est: sed non est sanguis, qui in humano iecore in sanguinem fit conuersus: ideo in sanguinem in humano iecinore debet conuer-
Generatio. ti. Dicemus ergo de laesa chylicatione, & quidem in genere, hoc est, quatenus aufertur, imminuitur, & corrumpitur. Malum hoc ita sumptum, hoc generatur: oportet ventriculo aliquid occurrere praeter naturam, vi cuius chylicatio (vel propria ratione, vel frustratione reliquarum facultatum, famulantium chylicationi) ita frustretur, vt mutatio cibi in chylum praeter naturam efficiatur. Vnde sic potest definir: Laesa chylicatio est functio praeter naturam ventriculi dependens a frustratione chylicatricis. Forma, est functio praeter naturam, quare quid genericum, quod praedicatur de chylicatione ablata, imminuta, & corrupta. Nam cum Galeno cap. 4. libr. de diff. sympt. in coctione triplex est vitium, nempe cruditas, concoquendi tarditas, & prauitas. Cruditas, seu *ἀσψία* dicitur, si nulla omnino alteratio fiat. cap. 1. 3. de sympt. caus. Si autem cibus alteretur, non tamen sicut oportet: cruditas à Galeno adhuc vocatur, at non vt prius. Et propterea dum nulla sit alteratio, vocari potest cruditas simpliciter: dum sit aliqua alteratio, sed non vt fieri debet, fit cruditas secundum quid, quia in hac non priuatur, sed

*Definitio.**Forma.*

sed deprauatur. Cæterum, hæc alteratio deprauata duplex esse potest: nam vel alteratio tarde fit, & cibi nondum conuenientem mutationē susceperunt: & vocatur *βενδυσιψία*, seu tarda coctio: vel fit alteratio, vt cibus corrumpatur omnino, vnde cum Galeno naturalem gratiam cibus prorsus recipere nequit: & hæc proprium nomen non habet, sed licet nobis *δυσπτογία*, id est, chylicationem corruptam nominare. Notandum igitur differentiam esse, inter imminutam & corruptam coctionem: nam in diminuta, cibus naturalem gratiam suscipit, sed tempore longiori: in corrupta nequaquam cibus suscipit naturalem gratiam. Et propterea dum dicit Galenus, in tarda coctione cibum nondum conuenientem mutationem suscipere: nil aliud vult, quam cibum, qui nondum conuenientem mutationem suscepit decenti tempore, tandem tarde mutationem decentem accepturum. At dum Aetius dicit, interdum contingere, (scilicet in bradypepsia) vt cibus nūquam propriam mutationem accipiat: intelligit, secundum aliquam cibi partem: nam si cibus secundum omnes partes propriam transmutationem non susciperet: secundum nullam partem nutrirer: ideoque in tarda coctione fieret atrophia, non gracilitas, quæ non penetrat ultra pinguedinem & carnem, sicut macies: quod tamen citato Galeni loco aduersatur. Subiectum est ventriculus: per quod distinguitur à frustratione læsa aliarum partium: intelligere autem oportet ventriculum præsertim secundum fundum. Vnde Auicennas dicit, nocumenta digestionis sequi nocumenta in inferiori stomacho.

Subiectum.

Efficiens causa, his verbis describitur: dependens à frustratione chylicatricis: qua particula, distinguitur læsa chylicatio, à læsa vetriculi attractione, retetione, & expulsionem, cap. 1. libr. 3. de sympt. caus. Frustratur autem chylicatrix, vel Propria ratione, vel ex Accidenti. Hoc vt intelligatur, supponendum è cap. 8. & 11. libr. 3. de facultat. natural. ventriculum, instar cuiuslibet partis, quatuor facultatibus esse donatum: nempe alteratrice, attractrice, reventrice, & expultrice: quæ facultates, præter communes functiones, quas gratia nutritionis obeunt, id etiam in gratiam totius corporis præstant. Vnde alteratrix cibum mutat in chylum: attractrix rectis fibris contractis, cibum attrahit: retetrix fibris obliquis cibum attractū vndique amplexatur,

*Causa efficiens.
chylica
facultas
frustratio.*

*Frustratio
χυλῳσις
propria ra-
tione.*

*1. Ob mor-
bos ventri-
culi.*

*2. Ob erro-
rem exter-
num.*

*Error ex-
ternus tri-
plex.*

& donec in chylū mutetur, continet: expultrix denique fibris transuersis tum quodlibet excrementum, tum chyli portionem superuacaneam expellit. Chylificatio igitur propria ratione dicitur frustrari, dum deficit à suo munere, citra frustrationem reliquarum facultatum. Cum Galeno igitur, cap. 1. lib. 3. de sympt. caus. chylificatrix propria ratione frustratur, vel quia Læditur, vel quia aliquis Error externus occurrit. Læditur facultas ob morbos ventriculi. Vnde, si morbi sunt in intemperie, Labefactatur facultas: si in mala compositione, Impeditur. Et de his morbis suo loco diximus. Galenus ait, facultatem labefactari, ob intemperies quasdam actiuarum qualitatum: quasdam dicit: intelligens intemperiem egritudinis, ad differentiam intemperantiarum sanitatis: proponit autem tantum actiuas qualitates, quia respicit ad intemperantias, ut sunt causa ablatae actionis breui tempore, id est, ut sunt magna actiuitatis: quod fit à calido, & frigido, non ab humido & sicco. Quod si ab humido auferatur actio, hoc fit per mediam hydropem: & si per siccitatem auferatur actio, hoc fit interuentu senij, vel marasini. Notandum per quamlibet valde intensam intemperiem auferri coctionem, seu actionem: ita tamen, ut citius & magis lædant qualitates actiuæ: & inter actiuas cum Auicenna magis lædat intemperies frigida, quia magis nocet calido infuso. Hæc de causis, ob quas læditur chylificatrix propria ratione. Dubitatur autem num etiam lædi possit ob errorem externum. Nam Galenus cap. ult. lib. 1. de loc. aff. ait, naturæ actionem semper lædi affecto organo: si ergo semper afficitur organum: semper læditur actio vi morbi, non autem propter errorem externum. Responso. Organi affectio non semper est morbus, sed interdum est error externus, vi cuius afficitur organum, & quidem organum naturæ, ad differentiam organi animæ, id est, facultatis animalis: & recte quidem, nam animalis facultas influit, naturalis est insita: vnde error quia afficit organum naturæ, est etiam error ex usu, id est, indicans utile. Sed ad rem. Si chylificatrix frustratur propria ratione, ob errorem externum: Galenus cap. 1. lib. 3. de sympt. caus. statuit errorem externum triplicem esse, nempe attinentem ad Ventris excrementum, ad Cibum, ad Tempus somni. Ratio numeri hæc est. Error externus rationem habet causæ morbificæ: & hæc Interna est, vel Externa. Si interna, est excrementum in ventriculo detentum.

rum. Si externa, hæc est Principalis, vel Secundaria: principalis est cibus: secundaria, est somnus exiguus. Cibus quidem est causa præcipua: nam ad coctionem celebrandum duo potissimum concurrunt, nimirum agens & passum: agens est ventriculus: passum est cibus. Et propterea dicit Auicennas cibi coctionem lædi, quatenus vitium est, vel in receptore cibi, id est, in ventriculo, vel in cibo. Somnum autem exiguum esse errorem in ratione causæ non principalis, inde facile colligitur: quoniam, licet nullum sit vitium, vel in ventriculo, vel in cibo: tamen si error committatur in somno, ut somnus iusto breuior sit, læditur actio. Quare Auicennas summa diligentia respiciens ad causas non principales: inquit, coctionem lædi, ut vitium est in rebus accidentibus, superuenientibus post assumptum cibum, quemadmodum est somnus exiguus. Quare Galenus per vitium in tempore somni, insinuat omnes causas externas, sed non principales: nam in eodem capite proponit etiam vitæ rationem, in censu erroris externi, quia preponit equitationem, piscationem, ambulationem, nauigationem, Venerem, balneum &c. Itaque cum error externus sit triplex, nimirum excrementum, & cibus, & ea quæ extrinsecus superueniunt: quantum attinet ad excrementum: potest esse Vapor, sed potissimum Humor: hicque humor esse potest Pituitosus, Biliosus, Melancholicus. Excrementi autem vitium multiplex esse potest, nempe Putridum, ut quilibet humor: præterea Frigidum, ut excrementum pituitosum, & melancholicum: Calidum, ut bilis, pituita salsa, bilis atra exusta. Præterea vitium esse potest in excremento, quatenus Moram trahit in ventriculo: & quatenus Aliunde fluit: oportet autem fluere, secundum Auicennam à capite, ab hepate, splene, & aliis partibus: siquidem & generatur quandoque in ventriculo, quandoque extra. Cæterum: Galenus cap. i. lib. 3. de sympt. caus. ait: si excrementum sit calidum: chylificationem corrumpi, in qua corruptione cibus mutatur in chylum nidorulentum: hoc autem excrementum calidum & nidorulentum varij potest esse nidoris: modo enim tanquam virus, modo lutum, modo crudos pisces, modo indicibilem putredinem olet. Si autem excrementum sit frigidum, si cibus permisceatur: corruptio fit acida: de qua locutus est Galenus cap. 4. libr. 3. de vsu part. Quod si excrementum frigidum non permisceatur cibo: tunc coctio imminuitur. Auicennas ait,

1. Excrementum in ventriculo.

coctionem cibosque corrumpi, quia cibi vel acquirunt qualitatem, non proportionatam ad aliquam qualitatem consuetam, vel putrescunt cibi, vel aduruntur, vel acescunt. Quibus hoc vult: Si excrementum toto genere sit præter naturam, quamuis non putridum, cibos affici qualitate insueta: si autem excrementum putrescat, cibum putrescere: si excrementum sit calidum, cibos aduri, & nidore affici: si frigidum sit excrementum, cibos acescere. Hæc de excremento.

2. *cibus.*

Quoad cibum: hic bisariam accipitur: primum, ut est materia alimentalis: deinde, quatenus vsurpatur & administratur. Si capiatur ut materia alimentalis: perpendi potest, vel secundum vitium, vel secundum causam efficientem. Vitium attinet ad substantiam, vel qualitatem. Si perpendatur secundum causam: tunc vitium pendet vel à natura, vel ab arte. Denique si accipiat cibum, ut vsurpatur: vitium pertinet ad quantum agendum, quomodo agendum, & quando agendum. Declaro. Vitium ad substantiam spectat, dum cibi sunt vel putridi, vel sua forma aduersarii, qui coctionem corrumpunt, & secundum Auicennam à proprietate appetentiam euertunt. In qualitate prima vitium est, dum cibi sunt vel calidiores, vel frigidiores: in secunda qualitate, dum cibus est vel tenuior, ac facile corruptibilis: vel crassior, & grauis, diuque manens in ventriculo: & si non coquatur, remanet vel crudus, vel imminute coctus. Si vitium attineat ad causam efficientem: si causa sit natura, est cibus natura prauus, ut fungi. Si causa sit ars: dirigitur ars vel ad unum cibum, vel ad plures. Si ad unum cibum ars dirigatur, est veluti, frumentum boni succi, quod vitium contrahit ob malam artem, si nimirum diu seruetur, ut ab avaris fieri solet, vel si in loco humidior seruetur, ut corrumpatur. Ita si ouium boni succi, per coctionem durius euadat. Artificium dirigitur ad plures cibos, ut sunt cibi qui conficiuntur e pasta & lacte, quemadmodum sunt tortæ. Tandem, si capiatur cibus ut vsurpatur: quoad quantum agendum: si vitium sit in excessu, cibus non vincitur, non coquitur, unde crudus permanet: si in defectu, veluti exurit, unde fit corruptio nidorulenta. Quoad modum: cibus nocet, dum iusto vel calidior, vel frigidior vsurpatur. Quoad tempus seu quando agendum: bisariam perpenditur: primum, ut cibus exhibetur horis diuersis, interuallo scilicet quinque, vel sex, vel plurium, aut pauciorum horarum: & si committatur error, vocatur à Galeno intempestiuitas. Deinde perpenditur

tempus, quatenus cibus eadem hora offertur: dum in eodem prandio, vel in eadem cœna plures exhibentur cibi, vnus prius, alter posterius: & si contingat error, à Galeno dicitur, incongruus ordo. In vtroque vitium est, quādo cibus exhibetur, presente aliquo quod prohibet, id est, quod vincit indicantia alimentum. Si enim diuersis horis exhibeatur cibus: id quod prohibet, seu vincit, est materia existens vel in ventriculo, vel infra ventriculum: in ventriculo, dum hic repletus est vel cibo, vel excremento: Auicennas vocat, repletionem in stomacho, dum cibus supra cibum incoctum ingeritur: innuens repletionem à cibo: præterea, remanentiam alterius, diuersi scilicet à cibo: innuens repletionem ventriculi ab excremento. Materia infra ventriculum existens etiam prohibet, quo minus recte fiat coctio: ideoque vtile est, primum materiam exercitiis distribuere, mox cibum exhibere. Vnde Auicennas dixit, errorem externum consistere in tempore cibandi, si assumatur cibus post expulsionem cibi primi, id est, cibi in chylum conuersi, ante exercitium consuetum. Quoad cibos qui eadem hora exhibentur: id quod prohibet, est cibus prius assumptus. Cum enim cibus sit vel tardæ, vel velocis digestionis: item, vel astringens, vel aperiens: si prius assumatur cibus tardæ digestionis, sui præsentia prohibet cibum velocis digestionis: alias enim fieret supernatio & corruptio. Sic cibus stipticus prius sumptus, prohibet cibum aperientem: nisi (monente Auicenna) præmittatur cibus stipticus ad cohibendū aluum. Sequitur causa externa secundaria, seu superueniens ventriculo: vi cuius venter non concoquit, nec cōcoquere tentat. Hæc autem causa est primum aer, peccans vel substantia, vel immodico calore aut frigore, quibus omnibus coctio læditur. Huc facit, potus copiosus, potus deficiens, somnus exiguus, vigilia: nam cibus eget somno gratia concoctionis. Addit etiam Auicennas importunum & vehementem motum tum corporis, tum animi. Læditur etiam coctio, si ilico post cibum quis Venere vtatur, balneo, equitatione, cursu, &c. Sic chylicatrix propria ratione læditur.

3. Extrinsicus superueniens.

Sequuntur causæ, ob quas chylicatrix ex accidenti læditur seu potius frustratur: quæ diriguntur ad Attractionem, Retentionem, & Expulsionem. Attractio, cum Galeno cap. 2. lib. 3. de sympt. caus. læditur, quoniam vel Aufertur, & dicitur paralytis ventriculi: vel Imminuitur, dum vix & longo tempore

Frustratio
χυλώσις
ex accidente.

1. *Attractio laesa.*

tempore fit attractio, & dicitur stupor: vel Corruptitur, dum fit cū malo ventriculi motu, nempe cum palpitatione, vel singultu, vel concussione, vel veluti tremore. Læditur igitur attractio vel laesa facultate, vel ob Errorem externum. Facultas læditur ob morbos, de quibus supra diximus: præsertim autem ob intemperiem frigidam, humidam, quamvis à qualibet morbosa intemperie lædatur. Porro, ut intelligatur, quid statuendum sit de qualibet intemperie, facultatem lædente: sciendum (cum Galeno cap. 3. lib. 3. de sympt. caus. & cum Auicenna prima, primi. cap. proprio de virtutibus naturalibus) caliditatem omnibus facultatibus esse communem: humiditatem autem iuuare concoctionem, præsertim secundum nutritionem, & potissimum secundum incrementum: siccitatem autem reliquis tribus opitulari. At in concoctione, seu alteratione, intensior requiritur caliditas, quā humiditas: ne tamen ita sit intensa, ut colliquetur: hinc fit ventriculum iuuari à caliditate vicinarum partium, ut omenti, &c. Remissiori caliditate opus est in attractione: adhuc remissiori, in expulsionem: maxime remissa, in retentione. Hinc fit, retentricem & expultricem à frigiditate, sed per accidens iuuari. Siccitas à concoctione excluditur: magis viget in retentrice: minus in attractrice: adhuc minus in expultrice: & ratio est, quoniam attractrix siccum requirit, quatenus apponit: præsertim autem attractrix quæ operatur sine fibris: nam quæ fibris euentibus operatur non apponit, & proinde ita sicco non eget. Sic retentrix etiam astringendo siccum postulat. Quod si inuicem conferamus caliditatem cum siccitate: in retentrice, magis adiuuat siccitas, quam caliditas: contra in attractrice: expultrix autem magis eget caliditate, quam siccitate, quoniam ad motum cōfert caliditas, ad quietem siccitas: in retentrice autem tempus motus est breue, tempus quietis longū, contra in attractrice, tempus motus longū, quietis breue: in expultrice nulla quies est, sed tantum motus, in quo tamen motu cum fiat quædam densitas ad exprimendum accommodata, siccitas auxiliatur. Vnde colligendum, coctricem iuuari præsertim à calido nativo, & proinde à calido cū humido: reliquas autē facultates adiuuari à calido naturali asscitis. Ideoque cum in pueritia vigeat calor natiuus: merito in pueris magis viget coctio, quam reliquæ functiones: & propterea pueri parum plerumque valent secundum retentionem, quia retentrix

pentrix præ cæteris siccum magis postulat. Facile hinc patet,
 attractricem præsertim lædi ab intemperie frigida, ab in-
 temperie humida. Et, si intemperies sit remissa, & in habi-
 tudine: ventriculus incipit relaxari, vnde ægre fit attractio:
 si autem intemperies sit intensa, vel in habitu, tum iam re-
 laxatus est ventriculus, ita ut cibum trahere prorsus non va-
 leat. Si autem lædatur attractio ob errorem externum: è
 cap. 1. lib. 3. de sympt. caus. si error sit causa interna: est ma-
 teria quæ citra medium morbum ventriculum exercet, siue
 hæc materia pariat singultum, siue concussionem, siue
 veluti tremorem, siue palitationem. Si causa sit externa:
 est materia vel medicinalis, vel cibalis quæ præ nimia hu-
 miditate rectas fibras laxat, vel aliquem è propositis moti-
 bus molitur, quoniam hi motus fieri etiam possunt à causa
 externa. In retentione bona, cibi vndique à ventriculo tan-
 gi debent, & tandiu detineri, donec concoquantur. Hæc læ-
 ditur tripliciter: primum enim Aufertur, dum cibum ne exi-
 guo quidem tempore detinetur, ut in lienteria: secundo
 Imminuitur, dum secundum aliquam tantum partem ci-
 bus tangitur à ventriculo: vel saltem ante consummatam
 coctionem egreditur: vel etiam dum ambo hæc concu-
 runt: tertio Corruptitur: dum ciborum fit amplexus,
 cum aliquo è propositis motibus. Porro si facultas hæc læ-
 datur: læsio pendet à ventriculi morbis, qui præsertim ven-
 triculum affligunt secundum fibras obliquas: morbi autem
 sunt, intemperies, mala compositio, & soluta unitas: de qui-
 bus supra. Intemperies frigida & humida retentricem læ-
 dunt penes detentionem: caliditas & siccitas ventriculum
 offendunt, penes amplexum: siccitas enim facit, ut cibum à
 ventriculo non tangatur. Quoad malam compositionem:
 læditur retentrix à magnitudine imminuta natiua, vnde non
 concoquitur cibum idoneus, sufficiens ad nutritionem totius,
 quoniam ventriculus non potest continere tantum cibum
 quantum oportet. Quoad solutam unitatem: retentrix im-
 peditur potius à vulnere, quam ab ulcere: quoniam ob vul-
 nus cibum non detinetur: propter ulcerem autem dum pars vl-
 cerata irritatur à cibis, expultrix insurgit: quare non est vi-
 tium in retentione, sicut in vulnere. Si autem retentrix fru-
 stretur ob errorem externum: si error externus sit causa in-
 terna: est excrementum vel flatulentum, vel aquosum, vel co-
 piofum, vel humidum: at potissimum ab excremento statu-
 lento,

2. Retentio
 laesa.

1. *Attractio laesa.*

tempore fit attractio, & dicitur stupor: vel Corruptitur; dum fit cū malo ventriculi motu, nempe cum palpitatione, vel singultu, vel concussione, vel veluti tremore. Læditur igitur attractio vel læsa facultate, vel ob Errorem externum. Facultas læditur ob morbos, de quibus supra diximus: præsertim autem ob intemperiem frigidam, humidam, quamuis à qualibet morbosa intemperie lædatur. Porro, ut intelligatur, quid statuendum sit de qualibet intemperie, facultatem lædente: sciendum (cum Galeno cap. 3. lib. 3. de sympr. caus. & cum Auicenna prima, primi. cap. proprio de virtutibus naturalibus) caliditatem omnibus facultatibus esse communem: humiditatem autem iuuare concoctionem, præsertim secundum nutritionem, & potissimum secundum incrementum: siccitatem autem reliquis tribus opitulari. At in concoctione, seu alteratione, intensior requiritur caliditas, quā humiditas: ne tamen ita sit intensa, ut colliquetur: hinc fit ventriculum iuuari à caliditate vicinarum partium, ut omenti, &c. Remissiori caliditate opus est in attractione: adhuc remissiori, in expulsionem: maxime remissa, in retentione. Hinc fit, retentricem & expultricem à frigiditate, sed per accidens iuuari. Siccitas à concoctione excluditur: magis viget in retentrice: minus in attractrice: adhuc minus in expultrice: & ratio est, quoniam attractrix siccum requirit, quatenus apponit: præsertim autem attractrix quæ operatur sine fibris: nam quæ fibris euidentibus operatur, non apponit, & proinde ita sicco non eget. Sic retentrix etiam astringendo siccum postulat. Quod si inuicem conferamus caliditatem cum siccitate: in retentrice, magis adiuuat siccitas, quam caliditas: contra in attractrice: expultrix autem magis eget caliditate, quam siccitate, quoniā ad motum cōfert caliditas, ad quietem siccitas: in retentrice autem tempus motus est breue, tempus quietis longū, contra in attractrice, tempus motus longū, quietis breue: in expultrice nulla quies est, sed tantum motus, in quo tamen motu cum fiat quædam densitas ad exprimendum accommodata, siccitas auxiliatur. Vnde colligendum, coctricem iuuari præsertim à calido nativo, & proinde à calido cū humido: reliquas autē facultates adiuuari à calido naturali assciritio. Ideoque cum in pueritia vigeat calor natiuus: merito in pueris magis viget coctio, quam reliquæ functiones: & propterea pueri parum plerumque valent secundum retentionem, quia retentrix

patrix præ cæteris siccum magis postulat. Facile hinc patet,
 attracticem præsertim lædi ab intemperie frigida, ab in-
 temperie humida. Et, si intemperies sit remissa, & in habi-
 tudine: ventriculus incipit relaxari, vnde ægre fit attractio:
 si autem intemperies sit intensa, vel in habitu, tum iam re-
 laxatus est ventriculus, ita ut cibum trahere prorsus non va-
 leat. Si autem lædatur attractio ob errorem externum: è
 cap. 1. lib. 3. de sympt. caus. si error sit causa interna: est ma-
 teria quæ citra medium morbum ventriculum exercet, siue
 hæc materia pariat singultum, siue concussionem, siue
 veluti tremorem, siue palpitationem. Si causa sit externa:
 est materia vel medicinalis, vel cibalis quæ præ nimia hu-
 miditate rectas fibras laxat, vel aliquem è propositis moti-
 bus molitur, quoniam hi motus fieri etiam possunt à causa
 externa. In retentione bona, cibi vndique à ventriculo tan-
 gi debent, & tandiu detineri, donec concoquantur. Hæc læ-
 ditur tripliciter: primum enim Aufertur, dum cibus ne exi-
 guo quidem tempore detinetur, ut in lenteria: secundo
 Imminuitur, dum secundum aliquam tantum partem ci-
 bus tangitur à ventriculo: vel saltem ante consummatam
 coctionem egreditur: vel etiam dum ambo hæc concur-
 runt: tertio Corruptitur: dum ciborum fit amplexus,
 cum aliquo è propositis motibus. Porro si facultas hæc læ-
 datur: læsio pender à ventriculi morbis, qui præsertim ven-
 triculum affligunt secundum fibras obliquas: morbi autem
 sunt, intemperies, mala compositio, & soluta vnitates: de qui-
 bus supra. Intemperies frigida & humida retentricem læ-
 dunt penes detentionem: caliditas & siccitas ventriculum
 offendunt, penes amplexum: siccitas enim facit, ut cibus à
 ventriculo non tangatur. Quoad malam compositionem:
 læditur retentrix à magnitudine imminuta nativa, vnde non
 concoquitur cibus idoneus, sufficiens ad nutritionem totius,
 quoniam ventriculus non potest continere tantum cibi
 quantum oportet. Quoad solutam vnitatem: retentrix im-
 peditur potius à vulnere, quam ab ulcere: quoniam ob vul-
 nus cibus non detinetur: propter vlcus autem dum pars vl-
 cerata irritatur à cibis, expultrix insurgit: quare non est vi-
 tium in retentione, sicut in vulnere. Si autem retentrix fru-
 stretur ob errorem externum: si error externus sit causa in-
 ternæ est excrementum vel flatulentum, vel aquosum, vel co-
 piofum, vel humidum: at potissimum ab excremento statu-
 lento,

2. Retentio
 lafa.

3. *Expulsio*
læsa.

lento & aquoso reteritrix frustratur secundum amplexum. Addit Auicenn. vitiosos humores, & potissimum mordaces. Si error externus sit causa extrinseca: hæc causa est cibus flatulentus, copiosus, humidus, & cum Auicenn. etiam calidus, cibus grauis. Huius classis etiam est potio immodica, quæ vera est fluctuationis causa, secundum Galenum. Auicennas addit potionem calidam, vnde fit patientes iuuati potu frigido. Potio quidem copiosa facit, vt ventriculus non amplectetur cibos: calida autem potio facit, vt eos non detineat ventriculus. Expulsio naturalis sit, è cap. 7. lib. 4. vñ par. dum omnes ventriculi partes astringuntur, & solum orificium infernum recluditur: vnde chylus in descensu ad intestina, alio modo descendit virtute expultricis, ventriculo scilicet secundum omnes partes constricto: alio modo descendit læsa reteritrice, laxato nimirum ventriculo secundum omnes partes. Hinc sequitur, expulsionem naturæ liquores egredi: dum vel aufertur, veluti in inteso voluulo, in quo vitio materia fecalis seu stercorosa ita transmittitur ab intestinis, vt ventriculus hanc prorsus admittat, eamque nequeat infra expellere. Expulso autem Imminuitur, quemadmodum in remisso voluulo. Vel Deprauatur expulsio, sicut in palpitatione, singultu, vibrato motu, veluti tremore, nausea, vomitu, & cholera: de quibus infra. Læditur expultrix, Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Facultas læditur ob ventriculi morbos: præsertim dum occupant fibras transversas. Morbi autem sunt, intemperies, mala compositio, & soluta unitas. Ab omni intemperie læditur expultrix: sed potissimum à frigida, ab humida, à frigida & humida. Nam quamuis intensior requiratur calor in coctione & attractione, quam in expulsionem: tamen in expulsionem caliditas siccitatem vincit: vnde potissimum ab insigni frigiditate expultricis functio aufertur: à remissiori imminuitur. Si morbus sit calidus: tunc actio corrumpitur, & intempestiue fit expulsio. Malæ compositionis causa est angustia, secundum os infernum ventriculi, è cap. 2. lib. 3. de sympr. caus. quod in quibusdam voluuli speciebus euenit, in quibus os infernum vel è toro, vel secundum partem ocluditur. Hic Galenus quasdam species voluuli proponit, quia voluulus etiam fit ob angustiam intestinorum. Angustia autem est obstructio, quæ fit à materia copiosa, crassa, viscida: sed angustia etiam esse potest constipatio & compressio, producta à tumore vel consti

consistante, vel comprimente. Quoad errorem externum, in ratione causæ internæ: potest esse materia, id est, vapor & minera: & peccans secundum formam, siue materia sit putrida, siue non putrida: & peccans etiam secundum quantitatem, ut copiosior materia, vel secundum qualitatem. At materia calida, instar materiæ à toto genere præter naturā, & copiosæ: est causa expulsionis deprauatæ: contra, materia frigida, est causa imminutæ expulsionis. Concurrit etiam error, in ratione causæ externæ: verbi gratia medicamentum purgans est causa expulsionis corruptæ: opiata, sunt causæ expulsionis imminutæ.

Quoad differentias: ratione formæ, Chylificatio vel Nō fit, *Differētia.* & dicitur cruditas: vel male fit: tuncque aut Tarde, & dicitur tarda coctio: aut Corrupte, & dici potest chylificatio corrupta, quæ est vel Acida, vel Nidorulenta. Ratione efficientis, chylificatio frustratur, vel Propria ratione, vel ex Accidenti.

In genere hoc malū ab ægro patet: & præterea cognoscitur è mutatis excrementis. Quoad differentias formales: *Prima Differētia à forma.* num chylificatio sit ablata, imminuta, vel corrupta: cognoscitur è c. 4. l. de diff. symp. Ablata enim coctio indicatur: si cibi ingesti nullā suscipiunt mutationē, unde etiam oua integra denegantur. Imminuta coctio cognoscitur è cibis, qui longo tēpore coquuntur. Corrupta deprehenditur è ructibus: at corruptio acida, indicatur è ructibus acidis: nidorosa, è nidorulentis. Sed notandum, ructus indicare coctionem corruptam, si procedant potius è chylo, quam è cibo: dum nimirum post cibum concoctum perseverant ructus acidi.

Quoad differentias efficientis: & primum, si frustretur *Secunda differētia ab efficiēte.* chylificatrix primaria ratione: tunc læditur chylificatio, quamuis cibus facile descendat in ventriculum, & decenti tempore detineatur, verbi gratia, si quis cum appetitu capiat oua, & decēter detineat, tamen excernat, quemadmodū accipit iudicandū, chylificationem propria ratione frustrari: si *Colicis læsa per se, signa.* contra, secundario. Verum, cum frustretur chylificatrix, quoniam vel læditur, vel occurrit error externus: si signa erunt morborum: iudicandum facultatem lædi: sin minus: iudicandum frustrari chylificatricem ob errorem externum: verbi gratia, si post assumpta oua copiosa & frixa, coctio corrumpatur: facile patet, frustrari facultatem ob errorem externum: qui error quandoque est causa interna, veluti est materia in ventriculo. Quare cognoscendū est, num malū procedat vel læsa facultate,

facultate, vel ratione huius materię, seu erroris. Gal. cap. 4. lib. 1. de loc. aff. ad hoc cognoscendum, iubebat panem offerri, si corruptio erat nidorulenta: mel autem si corruptio erat acida: quibus assumptis, ait Galenus, si quod egreditur, & præcipue per vomitum, fuerit Syncerum, sine mistione humoris vel calidi, vel frigidi, iudicandum est facultatem lædi: Si autem sit humor permistus, indicatur læsam esse coctionem ob errorem externum. Et cum illa materia, habens rationem erroris externi, egrediatur quidem, si in cavitate ventriculi resideat: non autem egrediatur, si in tunicis sit impacta: ob id statuendum, coctionem (si humor permistus non egrediatur) potius lædi vi materię, quam morbi, si appetentię symptomata magis sint contumacia: exempli gratia, si materia calida fuerit, sitis erit magis contumax: si frigida, fames insignior erit: quę symptomata mitiora erit, simplex si fuerit intemperies. Cum autem chylicificatio frustretur, vel ob morbum, vel ob errorem externum: quę sint signa tum morbi, tum errorum, alibi dictum est.

*Signa læsę
gastricę.*

*Signa re-
ventricis
lę.*

Si frustretur chylicificatio secundo: primum, si frustretur vitio attracticis: indicabitur ē cibo, qui descēdit vel citra delectamentum, vel cum difficultate: vel etiā quia ventriculus secundum os supernum aliquo motu prauo vitatur. Si autem vitium attineat ad retentricem: & si vitium sit in complexu cibi, ē cap. 4. l. 3. fac. natural. complexus ablatus & imminutus: indicatur ē flatu, & fluctuatione cum sonitu, seu strepitu: nam flatus occupat spatium inter cibum, & ventriculum, & sic prohibet complexum: sic etiam materia aquosa fluctuans, est in causa, ut cibus non possit a ventriculo tangi: quia aquosa materia spatium in ventriculo occupat: & propterea ē solo flatu indicatur complexus imminutus: ē sola fluctuatione cum sonitu, indicatur cōplexus ablatus: ē flatu autem vna cum sonitu, indicatur complexus imminutus, dummodo non ingerantur cibi flatulenti: nam si assumantur, indicatur complexus ablatus: quia dum gignitur flatus, vitiumque fuerit potius causa ventriculi, quam cibi: facultas non ita languet, cum flatus fiant quidem a calore imbecillo, non tamen ita summe imbecillo. Tandem complexus corruptus, indicatur ē pravis motibus, si hi fiant tempore complexus. Quoad autem detentionem ē c. 4. lib. de sympt. diff. detentio ablata indicatur ē leienteria, in qua cibi non mutati egrediuntur: at ilico egrediuntur, ad differen-

tiam

differentiam læsæ coctionis propriâ ratione : & præterea egrediuntur citra morsum, ad differentiam leienteriz, quæ sit vitio expultricis. Detentio imminuta indicatur è cœliaca affectione, (de qua suo loco) si nihil sit in intestinis, quod ciborum semicoctorum exitum prohibeat: nam si tale fuerit: indicatur imminuta detentio, è cibi corruptione, quoniam cibi semicocti facile corrumpuntur, unde per aluum descendentes fœtidi sentiuntur: cum fœtore autem erit mordicatio, si cibi sint acres: erit inflatio, si assumpti cibi sint flatulenti: vtrumque experientur ægri, si cibi fuerint tum acres, tum flatulenti: neutrum autem sentient ægrotantes, si cibi probi sint accepti: tunc enim solum corrumpuntur, & sunt graueolentes: quia ob diminutam detentionem semicocti descendunt. Tandem deprauata indicatur detentio è prauis motibus, si fiant tempore detentionis. Expulsio è c. 4. l. de diff. sym. & c. 2. l. 3. de sym. caus. si sit ablata: indicatur ex ileo, seu voluulo, in quo nihil à ventriculo in intestina impellitur. Diminuta indicatur expulsio, è tarda excretionem. Deprauata, è prauis motibus, quæ fiunt tempore expulsionis: sed præterea è fluxu alui, cum morso: ex intempestiua & veloci excretionem. Hæc de signis.

*Signa læsæ
expultri-
cis.*

Quoad præsidia: patent. Nam chylicatio, siue lædatur primario, siue secundario: siue læsa facultate, siue ob errorem externum: quid hæc indicent, dictum fuit in prioribus affectibus ventriculi. Notandum autem excrementorum alui defectionem præcipuum esse cruditatis remedium.

Indicationes.

Quoad prognosticum: pater hoc è traditis de intemperie ventriculi, & reliquis ventriculi morbis. Notandum tamen in genere, malum esse non negligendum: unde mater ægritudinum Auicennæ dicitur: quia est vitium vehemens ratione dignitatis, cuius causa morbi innumeri oriri queunt: nisi enim medicus sit diligens, æger maxima incurrit mala. Verum pro vi differentiarum, periculum est varium. Nam quoad differentias à forma: cum Galeno c. 1. l. 3. de sym. caus. chylicatio ablata, minatur atrophiam: imminuta, gracilitatem: corrupta, erysipelata, caneros, vlcera serpentia, & præsertim si corruptio fuerit nidorulenta: nam si acida extiterit, minatur hydropem, & cum Auicenna minatur recidiuam. Ratione causæ efficientis, admonet Galen. loc. cit. in errore externo vehementiam esse remissiorem: unde dicit, symptoma, quod è cibus oritur, facile corrigi: quod autem sit è

Præfagia.

virtutis collapsu, id est, ex intemperie, & præsertim in habitu, esse malum, quod in leienteriam, & in hydropem finitur. Addit Auicennas: si coctio lædatur à materia, facile curari: & si accidat, aut propter malitiam complexionis, aut debilitatem virtutis, ægre curari. Per virtutis debilitatem, non intelligit effectum morbosæ complexionis; nam iam dixit, malum ægre curari, propter malitiam complexionis: intelligit igitur imbecillitatem calidi innati. Errant igitur, qui intemperiem cum calido innato confundunt.

Curatio.

Ratio decubitus tempore somni.

Materiæ præsidiorum patent è vitiis ventriculi. Sufficit ex Auicenna, vnum monere circa decubitum tempore somni, qui, exit supra latus sinistrum: ita enim iecur ventricululum comprehendit, supque calore fouet. Decubitus autem super dextrum latus, descensui cibi fauet: nam ventriculus in parte dextra infernum obtinet orificium; per quod chylus à ventriculo in intestina descendit. Et ob id Auicennas in curatione cibi supernatantis, & tarde descendentis, probat tempore somni decubitum in dextro latere. Et quibus obiter colligatis, salutare esse in priori somno decumbere super latus sinistrum, in posteriore tempore super dextrum.

CAPVT X.

De Singultu.

Nomen.



Generatio.

B E R singultum intelligimus quemcunque singultum, & hinc omnem ventriculi motum, in quo ventriculus quasi conuulsionem pati videtur. Generatur hoc malum, dum noxium occurrit ventriculo, præsertim secundum omnes fibras: vnde expultrix insurgit ad noxium expellendum, eà violentia, vt dum nititur expellere, fibræ ita afficiantur, vt ventriculus veluti conuulsione affici videatur: & proinde ita prauus oborietur

Definitio.

motus, vt vicissim fiat tensio, ac dilatio. Quare singultus est motus prauus tensionis & dilatationis ventriculi, dependens ab expultrice præter naturam impulsà à causa agente

Forma.

in fibras. Forma singultus, est motus prauus tensionis, & dilatationis. Sic enim cap. 2. ib. 2. de caus. sym. Galenus ait: motum prauum esse genus commune conuulsionis, tremoris, rigoris seu motus vibrantis, palpitationis, vomitus, & singultus. Quare per hanc particulam singultus distinguitur à vitiis, in quibus functio vel aufertur, vel imminuitur: quia singultus

gultus est motus prauus. Hic motus prauus, est cum tensione & dilatatione: est enim veluti conuulsivus: nam in singultu fit contractio, sicuti in conuulsione: & stomachus sic afficitur in singultu, sicuti musculus in conuulsione, comm. aph. 3. sect. 7. quia nimirum in singultu ventriculus contrahitur. Gale. proponit motum veluti conuulsivum: nam conuulsio pertinet ad organum animæ: singultus ad naturæ organum: ideoque è comment. aphor. 39. sect. 6. singultus proprie non est conuulsio, sed quidam motus, cum vomitu genere conueniens: nam & singultus & vomitus, sunt vitia ad naturæ organa spectantia. Cæterum, singultus est motus vehementior vomitu: nam in vomitu natura euidenter expellit, quæ solum in ventriculi spatio latiori continentur: in singultu autem ea expelluntur, quæ resident in loco penitioris: unde singultus non parum assimilatur motui conuulsivo. Hinc Auicenn. statuit, singultum esse motum compositum instar spasmii, vt scilicet sit contractio & dilatatio, seu flexio, & extensio: vel motus cum tensione dilatatiua, vt videlicet quadâ vicissitudine fit tensio, & dilatatio. Tenditur ventriculus (secundum Auicenn.) dum vel fugit quod nocet, aut preparatur ad motum fortis expulsionis, atque ita dilatatur: dum enim expellit ventriculus, ita se habet, vt arcus, sagittas proiciens. At cur Gal. com. aph. 39. sect. 6. ait, singultum esse motum, vomitu vehementiorem: contra Auicenn. inquit, singultum esse motum debiliorem vomitu? Responsio. Singultus & vomitus bifariam possunt accipi: primum, vt vtrumque vitium est motus ratione subiecti, & proinde passio: secundo hæc vitia capi possunt in ratione causæ efficientis, & tunc hi motus non sunt passiones, sed actiones. Si sumantur pro passionibus: singultus est motus vehementior vomitu, quoniam ventriculus in singultu magis patitur, nam læditur à materia impacta: in vomitu afficitur à materia, residente in cavitare. Si hi motus capiantur pro actionibus: vomitus est motus vehementior singultu, nam per vomitum fit vacuatio sensibilis: secus per singultum.

Subiectum huius affectus est ventriculus: ad differentiam conuulsionis, cuius subiectum est organum facultatis animalis motricis, nimirum musculus. Ventriculus autem è ca. 2. lib. 1. de sym. caus. nec secundum os, nec secundum se totum, est musculus: quare ventriculus est subiectum singultus, quatenus est facultatis naturalis organum. Per ventriculum

*Dubium
soluitur.*

Subiectum.

autem intelligimus & corpus ventriculi, & œsophagum; nam in singultu ventriculus quandoque afficitur magis in vna parte, quandoque magis in alia: modo scilicet secundum se totum, modo secundum gulam, modo secundum os superius, com.aph.3. sect.7. quod orificium supernum c.6.l.5. loc. aff. solum proponitur singultus subiectum: non sane, quod id tantum singultus subiectum sit, sed quod ibi verba fiant de vitiis oris ventriculi: & præterea hæc est pars, quæ affecta magis afficitur ventriculus. Auicennas etiam dicit, singultus motum attinere, aut ad totum ventriculum, aut ad meri, id est, œsophagum.

Causa efficiens.

Ratione causæ efficientis, diximus: dependens ab expultrice præter naturam, impulsâ à causa agente in fibras. Singultus est motus solius expultricis, c.1.l.2. de caus. sym. ad differentiam conuulsionis & palpitationis: quæ vitia sunt motus solius morbi: item ad differentiam tremoris, qui est motus & morbi, & naturæ. Nec obstat, licet Galenus dicat, c.1. l.3. de sym. caus. singultum esse commune symptoma expultricis, & retentricis: nam singultus capitur, vel pro effectu, seu symptōmate, & sic est symptoma solius expultricis: vel sumitur pro causa efficiente, & sic est commune symptoma tum retentricis: tum expultricis: nam si singultus fiat ab expultrice, irritata à causa morbifica, dum chylus expellitur à ventriculo: singultus est causa læsæ expulsionis: at si fiat singultus eo tempore, quo retentrix cibum detinet: singultus est causa læsæ retentionis: ita, si fiat singultus eo tempore, quo facultas attractrix cibum attrahit: singultus est prauus motus attractricis, & propterea singultus est causa prauæ attractionis. Galenus dum singultum sumit pro causa efficiente, ait, etiam esse symptoma commune expultricis & retentricis, nec attractricis meminit: quia scilicet nondum de attractrice erat locutus. Proinde postea verba faciens de attractione, statuit attractricem prauè attrahere, propter prauos motus: de quibus sæpe dixisse se ait, nimirum in sermone de læsâ retentione, de læsâ expulsionem: ubi inter reliquos motus etiam singultum proposuit. Quare singultus, ut est prauus motus, potest etiam esse causa læsæ attractionis.

Ad idem

*Distinctio
singultus
ab alijs
motib.*

ratum igitur sit, singultum esse motum solius expultricis, quemadmodum in finitione diximus. Hinc singultus distinguitur à reliquis motibus, vim ventriculo inferentibus, & præsertim à conuulsione, palpitatione, & tremore: quatenus singul

singultus est motus solius naturæ, hoc est, expultricis. Cæterum, cum præter hos motus sit veluti tremor, sit nausea, sit vomitus, sit motus fibrans: distinguendi sunt hi motus à singultu. Ventricula veluti tremor (nec enim vero tremore ventriculus afficitur) è c. 2. l. 3. de sym. caus. dicitur ille motus, in quo, sicut in legitimo tremore, facultas motrix nititur membrum sursum attollere, membrum autem suo pondere non cedit: sic etiam vis ventriculi studet, ventriculi corpus cum cibo coniungere, ac veluti attollere: at ventriculus sui gravitate reluctatur. At quoniam in hoc motu non concurrat vis animalis, quemadmodum concurrat in legitimo tremore, sed concurrat facultas naturalis: ob id dicitur veluti tremor, qui ratione ponderosi ventriculi statui potest motus morbi: ratione autem naturæ concurrentis, censeripotest naturæ motus, hoc est, retentricis & expultricis: nam retentrix propter ciborum amplexum, ventriculum quodammodo attollit: expultrix autem præter os infernum, totum ventriculum astringit, & proinde veluti attollit. Excipitur concoctrix: quæ citra motum evidentem agit. Excluditur attractrix: dum enim hæc fibris utitur rectis, ventriculus deorsum potius trahitur, quam quod sursum impellatur. Singultus ergo est motus solius expultricis: veluti tremor, est motus mixtus morbi, & retentricis, atque expultricis. Nausea, vomitus, & motus vibrans, sunt etiam motus solius expultricis, quemadmodum singultus: nam in nausea expultrix noxia expellere contendit: in vomitu, natura expellit sensibiliter: motus denique vibrans: qui etiam concussio dici potest, & rigor, sit à sola expultrice: quemadmodum enim in febribus sit rigor, quia expellitur materia per totum corpus: ita in motu fibrante secundum totum ventriculum, irritatur expultrix: quemadmodum in nausea expultrix irritatur solum secundum supernam partem: præterea in nausea expultrix irritatur à materia impacta: contra in motu vibrante irritatur à materia quæ movetur, nec citra impetum. Cum igitur nausea, vomitus, motus vibrans, sint motus solius expultricis, quemadmodum singultus: diximus in definitione, ad distinctionem, singultum dependere ab expultrice, impulsæ à causa præter naturam, in fibras agente. Nam in singultu expultrix præter naturam contrahit ventriculi fibras: primum enim rectas fibras & obliquas contrahit: quæ tamen secundum naturam contrahuntur ab

Quasi tremor.

liber

Nausea vomitus, vibratio.

alia facultate, rectæ scilicet ab attractrice, obliquæ à retentrice: fit etiam contractio præter naturā, dum expultrix transuersas contrahit ad superiora: cum naturaliter contrahantur ad inferiora, quia chylus expellitur per os infernū. Quia igitur in singultu, præter naturam contrahunt fibræ, modo rectæ, modo obliquæ, modo transuersæ: iure varius ac multiformis oritur singultus. Et cum hæc contractio sit morbifica, quoniam causa morbifica potissimum agit in ventriculū secundum fibras: ob id singultus distinguitur à nausea, vomitu, & motu vibrante: nam in nausea expultrix impellitur à causa agente in portionem ventriculi membraneam, & materia seu causa in ea incompacta est: in vomitu impellitur à causa agente in portionem membraneam, sed hæc materia residet in cavitate, non est incompacta: in vibrante motu impellitur à causa agente in portionem membraneam, sed quæ per ventriculi corpus imperiū mouetur: at in singultu expultrix præter naturam impellitur à causa agente in fibras.

*Subdixiſſi-
cauſa.* Causa igitur cuiuslibet singultus immediata est expultrix, præter naturam fibras contrahens, impulsæ à causa morbifica agente in fibras. Iam exponendæ sunt causæ, ob quas facultas expultrix frustratur: id autem fit, vel quia Læditur, vel quia Error aliquis externus occurrit. Læditur expultrix à causa vel Quantitate, vel Qualitate peccante, com. aph. 13. & 39. sect. 6. Causa quantitate peccans est Inaniens, vel Replens: unde emergit singultus vel ex inanitione, vel è repletione, & uterque fit ratione morbi: si enim fiat ex inanitione, fibræ afficiuntur morbo in magnitudine imminuta, secundum breuitatem; & nullo modo aucta: si è repletione, fibræ afficiuntur morbo in magnitudine aucta secundum latitudinem, imminuta secundum longitudinem. Hinc, cum fibræ promptius repleantur, quam inaniantur: fit, vt singultus à repletione frequentius oriatur: ex inanitione autem adeo raro, vt quodammodo anceps sit, an detur, com. aph. 13. sect. 6. Et ob id Galenus cap. 3. l. 8. κρόν. dicit, an singultus fiat ad similitudinem conuulsionis ob nimiam vacationem, dignum esse consideratione: innuens, singultum ex inanitione raro oboriri. Et Alexander, c. 13. l. 7. ait, singultum ex inanitione raro contingere. Porro singultus ex inanitione, cum Alexandro, Auicenna, & reliquis, fit à causa vacuante vel Sensibiliter, unde fit in dysentericis, & quomodocunque plus iusto sensibiliter vacuatis: vel fit à causa vacuante Insensibiliter,

veluti

veluti ob immoderatam famem, ieiunium, ob febres, quæ habent vim siccandi: nam singultus ex inanitione, non simpliciter est febre intensa, sed perseverante, ideoque Auicennas ait, fieri in postremo seu ultimo febrium ardentium: & Rhasis addit, fieri post febrem. Singultus est repletionem, producitur à materia replente, sed ea lege, ut fiat tumor, ut cuius fibræ secundum latitudinem augeantur. Quæ autem tumoris sint causæ, suo loco diximus. Et hæc de singultus causis, quantitate peccantibus, ut quarum expultrix lædatur: unde morbi oriuntur per se totius ventriculi, & ex accidenti fibrarum.

Si lædatur expultrix à causa qualitate agente: ventriculus afficitur vi vel Frigiditatis, vel Caliditatis. Si afficiatur vi frigida: capitur frigiditas, ut simplex frigiditas, quæ, ut contraria, immediate agit in organum expultricis: nam, secundum Auicennam, frigiditas singultus causa est tribus modis: vno modo, mediate, duobus immediate. Mediate concurret frigiditas: dum vi frigiditatis, alimenti portio excrementitia, quæ deberet diffilari, detinetur: nam frigiditas corpora, & potissimum nervosa, ad diffilandum difficilia reddit, comment. aphor. 13. sect. 6. & hinc excrementitia portio, quæ non diffilatur, immediate concurret: frigiditas, autem mediate. Concurret etiam immediate frigiditas, cum Auicenna, prout frigiditas est, vel cum materia vel sine materia. In præsentia ergo cum sermo sit de simplici qualitate, intelligere oportet frigiditatem sine materia. Patet autem eam immediate concurrere, siue sit sine materia siue cum materia. Si autem qualitas vergat ad calidum: hæc accipitur, ut contraria, immediate agens in ventriculum: siquidem & caliditas tribus modis potest esse singultus causa, vno mediate, duobus immediate concurret caliditas, secundum Auicennam, dum ab ea caliditate producitur vapor, qui non dissolvitur: unde causa immediata singultus est vapor, mediata caliditas. Immediate concurret caliditas, vel cum materia, vel sine materia. In præsentia accipitur sine materia. Hæc autem caliditas vigere solet in febre ardente, non ut siccet: (nam suo loco de febre siccante diximus) nec consideratur hoc loco febris ardens, ut mittit vapores febriles: sed ut simplex caliditas ventriculo imperetur: nam febris est intemperies calida omnium partium similium corporis.

Hactenus constitutum sit, singultum fieri læsa expultrice,

*Dyscrasie
calida &
frigida.*

& proinde ob inorbum, vel in mala compositione, id est, in magnitudine imminuta vel aucta: vel in intemperie calida aut frigida.

Error externus.

Si autem alia è parte expulsi frustretur ob errorem externum: sciendum cum Gal. com. aph. 1. sect. 5. & com. aph. 13. & 39. sect. 6. & com. aph. 10. & 17. sect. 7. & com. 69. l. 4. de ratione vict. & potissimum cap. 3. l. 8. *κ. τ. ο. π.* errorem esse causam Internam, & Externam. Interna, est Qualitas, vel Materia.

Qualitas spiritalis.

Materia, est Vapor, vel Minera. Minera, vel est vitæ Particeps, vt vermis: vel Expert vitæ, vt Humor vel Ichor. Quantum ad qualitatem attinet: qualitas est spiritalis, & proinde à toto genere præter naturam: quo respiciens Aetius, ait, singultum fieri in tetanis, in animi deliquiis, in altiori sopore: in tetanis, vt arbitror, quia qualitas spiritalis ventriculo impertitur à nigris, non vapor, non aliqua materia: in animis deliquiis impertitur à corde: in sopore profundiore, à cerebro. Et hinc etiam Auicenna. scribit singultum fieri in capitis percussione, quia tunc spiritalis qualitas à cerebro communicatur ventriculo. Materia autem cum possit esse vapor à toto genere præter naturam: veluti sunt vapores prodeuntes à vermibus, item à fecibus, veluti in voluulo exitiali, quemadmodum fatetur Galenus com. aph. 10. sect. 7. Huius ordinis est vapor putridus, prodiens à materia putrescente. Vnde mirum non est, si singultus fiant in febribus pestilentibus. Præterea vapor copia peccare potest: & idcirco dicit Auicenna singultum fieri à vapore, qui producitur à calore, sed non potest dissolui: quare copia peccat. Peccare etiam potest qualitate, & præsertim caliditate: sicuti est vapor febrilis: qui, licet prodeat materia febrili, nempe putrescente: tamen agit potius ratione caliditatis, quam putredinis: & ob id Auicenna ait, singultum fieri per communitatem, seu consensum à toto. Aetius addit, singultum fieri à vapore febrili, præsertim dum corripitur inflammatione, vel ventriculus, vel aliquod viscus: nam vapor è loco inflammato petit ventriculi

Vapor.

Lumbrici.

Humor, &

ichor: horum

que visum

in copia,

& qualitate.

fibras. Si causa singultus sit minera, & quidem si sit vitæ particeps, est vermis: qui in præsentia (ne fiat confusio) statuitur causa singultus, non vapore, sed morsu. Si minera vitæ sit expert: potest esse quilibet succus, siue sit humor, siue ichor, dummodo hæc materia sit præter naturam, siue venefica, siue putrida, & hinc à toto genere præter naturam: siue etiam copia peccet. Ad quem singultum Galen. respiciens

c. 3. l. 8. x. 76. ait, singultum fieri propter frigiditatem, & repletionem: ubi Galenus per frigiditatem insinuat, singultus causam immediatam esse materiam copiosam, nam à frigiditate prohibetur diffusio: per repletionem autem intelligit materiam copia peccantem, etiamsi vi frigiditatis non prohibeatur diffusio. Vnde Gal. seipsum explicans, com. aph. 14. sect. 6. ait, frigiditatem, inhibentem diffusionem, esse in causa repletionis. Et ob id etiam Aetius in singultu à frigiditate, non tantum vitur calefacientibus, sed etiam vacuantibus, quia respicit ad copiam. Avicennas etiam hanc causam proponens, dicit, singultum fieri à re nocente, sui gravitate: quare copia. Et Alexander proponit excrementa gravantia, & copiosa. Vt manifestum sit, singultum fieri à copiosa materia: id quod bifariam fieri potest: primum, quatenus copia materiz sit tumor, ideoque sit singultus, in quo frustratur facultas, quia vi morbi læditur: deinde sit singultus, quatenus vi copiosæ materiz gravantis, citra tumorem, sit singultus, & proinde ob errorem externum. In minera est vitium etiam in qualitate: proinde Galenus cap. 3. lib. 8. x. 76. ait, singultum fieri ob mordaces humores: & præterea ob humores medicamentaria qualitate præditos: quibus verbis Galenus significat, humores mordaces genitos, vi causæ internæ, & vi causæ externæ. Generantur quidem mordaces humores à causa interna: dum vi caloris, vel inflammationis, vel febbris generantur: at à causa externa generantur, si acre vsurpetur medicamentum, quod succos, antea etiam non acres, sua qualitate medicamentaria, id est, acrimonia afficiat. Et quamvis singultus fieri possit à quolibet succo mordaci, & hinc à pituita salsa: tamen frequentius fit à succo bilioso: nam hic succus suapte natura est calidus & siccus. Vnde, dum vi causæ morbificæ eius calor intenditur, & petit ventriculum: fit singultus: ideoque Galenus com. aphor. 17. sect. 7. ait: singultum è bile, fieri à causa calida, à flava bile, quæ etiam copiosa generatur vi inflammationis iecinoris. Si autem error sit causa externa: cum Avicenna est venenum, ac potissimum acre: item piper, allium, lac corruptum, & similia quæ singultum excitant, dum ingesta partes penitiores, id est, fibras adeunt, vnde expultrix non sine violentia irritatur. Hinc Galenus com. aphor. 39. sect. 6. dicit, singultum fieri, si quis acre aliquid deglutiatur, ut piper, vel per se solum, vel cum melle, mox vinum bibat, aqua calida temperatum: quoniam calida

Causa externa.

potio, piper deuehit ad interiora, ad fibras.

Differentia. Quoad differentias ratione formæ: cum singultus sit motus prauus tensionis, & dilatationis: dicendum, motum hunc vergere, vel ad Rectum, vel ad Obliquum, vel ad Transuersum, prout varix fibræ afficiuntur. Ratione subiecti dicendum: singultum attinere vel ad ventriculi Corpus, vel ad eius Os, vel ad Gulam. Ratione causæ efficientis, dicendum: expultricem frustrari, vel quia Læditur, vel quia Error externus occurrit. At notandum, Galenum cap. 3. lib. 8. *u. r. l. a.* dicere, differentiam esse inter conuulsionem & singultum: nam legitima conuulsio, est duplicis tantum speciei, nempe ex inanitione, & repletionem: legitimus autem singultus triplici specie donatur: fundamentum est: quia legitima conuulsionis subiectum, est organum animæ, seu facultas animalis: singultus autem exquisiti subiectum, est organum naturæ: ideo conuulsio si fiat ab expultrice, est conuulsio spuria: contra singultus ab expultrice est legitimus.

Signa. Singultus in genere seipsum prodit, quoniam est auditus obiectum. Differentias à forma æger patefacit: num scilicet ventriculus trahatur magis secundum rectum, vel obliquum, vel transuersum. Sic etiam æger manifestabit differentias à subiecto: ostendet enim sedem affectam. Et præterea si gula afficiatur: indicabitur è difficili deglutitione, è propulsione cibi in os, præsertim si fiat retractio fibrarum rectarum ad superiora. Si afficiatur os ventriculi: acerbum erit vitium: unde vix fit sine angore, sine leipothymia. Si malum infra cruciat: nec angor, nec leipothymia aderit. Ratione causæ efficientis: cum singultus fiat, vel læsa facultate, vel ob errorem externum: distinguetur è signis, quatenus vel assunt, vel absunt, aut læsæ facultatis, aut erroris externi. Unde, cum singultus ortus è læsione facultatis, prodeat vitii morbi, qui est vel mala compositio, vel intemperies: quoad malam compositionem, & primum in magnitudine immutat: indicabitur è prægressis causis inanientibus: verbi gratia è præcedenti fluxu, è ieiunio, è febre ardenti, &c. Magnitudo aucta indicabitur è prægressis causis replentibus: de quibus supra diximus. Si morbus sit intemperies frigida, aut calida: harum signa patent ex intemperie ventriculi. Si singultus fiat ob errorem externum, cum hic error sit causa interna, vel externa: num externa sit prægressa, & quænam patefaciet æger, & assidentes. Si sit causa interna, si qualitas spirita

spiritalis: indicabitur à præsentibus affectibus, à quibus hæc qualitas procreatur: verbi gratia si in tetano oriatur singultus: iudicandum, singultus causam esse qualitatem spiritalem. Si causa interna sit materia, siue vapor siue minera: patet ex alibi traditis.

Præsidia sumuntur ab essentia, quæ attinent ad formam, subiectum, & causam effectricem. Forma est motus prauus, & proinde symptoma, à quo nō sumitur indicatio, nisi habeat rationem causæ: id est, nisi sit admodum vehemens. Cum Galeno igitur cap. 1. lib. 12. meth. symptoma indicat remedium sedans, id est, mitigans, non sanans. Quare in præsentia indicatur remedium sedās singultum. Sed hoc nimis genericum est remedium: quare specificum est inueniendum. Cum igitur singultus vehemens, pendeat ab insigni caliditate oris ventriculi, quæ viget in ventriculo sensus exquisiti, ut testatur Alexander: & præterea viget in singultu à materia mordaci: propterea remedium sedans singultum, frigidum esse oportet vehementer, ut oris ventriculi caliditas insignis vincatur: vnde & stupefaciens indicatur, quod Aëtius probat in singultu à causa mordaci.

Quoad subiectum, cum sit ventriculus: quemadmodum in quolibet ventriculi vitio, eius calidum insitum seruandum, & proportio fouenda, secundum partes carnosas, & secundum membranas: ita priuatim, in singultu oportet fibrarum proportionem seruare: & ideo Alexander proponit medicamenta, à proprietate singultum expugnantia. Effectrix causa, quia multiplex est: indicat etiam remedium contrarium multiplex. Si fiat ex inanitione: indicatur remedium replens: si è repletionem, vacuans. Si è qualitate spiritali: indicatur remedium materiale, quo præsentem qualitatem spiritalem non agat: vnde, sicuti radij solares, præsentem nubem, suo munere fungi nequeunt: ita qualitas spiritalis, præsentem aliquam materiam, agere nequit. Aëtius igitur respiciens ad qualitatem spiritalem dissipationem, assiduo bibendam exhibet, aut mulsam, aut aquam puram, moderate calidam.

Singultus in genere, nec malus est, nec bonus: quia quidam singultus est incurabilis, quidam vix curatur, quidam facile curatur: aliquis est utilis. Et ob id Auicennas dicit, in signis crisis, singultum quandoque esse bonum, quandoque malum. Quare vis differentiarum perpendenda.

Ratione

Indicationes.

Præfagia.

Ratione formæ igitur singultus est admodum periculosus, si triplex vehementia insignis adsit: nimirum quoad vehementiam essentiz, si in singultu fuerit insignis tum tensio, tum dilatio: quoad vehementiam dignitatis, si afficiatur os ventriculi, si omnes fibræ afficiantur: quoad vehementiam facultatis, si immineat leipothymia. Ratione causæ efficientis: cum hæc sit morbus, vel error externus: si morbus, si fuerit singultus ex inanitione: cum Galeno comm. 69. lib. 4. de ratione victus fere curam non recipit: nam admodum recedit à vita, quæ in humido posita est. In hunc sensum Auicennas ait: si singultus fiat à siccitate, est timorolosus: si tamen siccitas non sit confirmata, humidis curari potest. Alexander etiam dicit, hunc singultum esse periculosum: at se nouisse quendam, frigida leuatum. Si singultus fiat è repletione: vinci potest, siccantibus & abstergentibus comm. 69. lib. 4. de ratione victus. nec enim vitium in materia ita vehemens est secundum essentiam, vt vacuantibus non cedat: nam etiam sternutamento euacuatur. comm. aphor. 13. sect. 6. & proinde à singultu habito, sternutatio superueniens bonum: nam vt sternutatio materiam vincit, ita est signum vehementiæ non insignis materiæ morbificæ. Si singultus causa sit morbus calidus, vel frigidus: patet quid sit prædicendum de his morbis.

Quoad errorem externum: si sit qualitas spiritalis: singultus est lethalis: nam est effectus causæ admodum vehementis, & multum recedentis à naturali statu. Proinde Aëtius ait: si singultus eueniat in altiori sopore, aut animi deliquis, aut tetano: mortem non longe abesse: singultus enim signum est summæ vehementiæ soporis, animi deliquis, & tetani. Si causa, seu error externus sit materia morbifica: hæc vinci potest, nisi pendeat à causa nimis vehementi. Propterea dicit Galenus comm. 69. lib. 4. de ratione vict. singultum à mordaci humore procedentem, vacuatione sanari. Additum autem fuit, singultum prodeuntem à materia, expugnari posse: nisi materiæ opifex sit nimis vehemens: vt pote si qua fuerit inflammatio. Et ob id Hippocrates aph. 3. sect. 7. dicit, à vomitu singultum, & oculorum ruborem, malum: nam si post vomitum perseveret singultus, & singultus vi vomitus non adimatur: indicium erit inflammationis vel cerebri, vel ventriculi: & præsertim, si oculorum rubro coniungatur. Si ergo singultus materia fouetur ab inflam

inflammatione viscerum : singultus maxime est periculosus : quia eius causa, id est, materia, pendet ab efficiente admodum vehementi, nimirum à viscerum inflammatione. Auicennas etiam ait, quando vomitus non sedat singultum, & rubor est in oculo, est malum : innuens, vomitum esse signum insignis vehementiæ causæ singultus. Si error sit causa externa : pro varia vi vario modo prædicendum : verbi gratia, singultus erit periculosus, si fiat à veneno : facile superabitur, si à pipere. Et Aëtius iubet, in lethali singultu præclara remedia non esse usurpanda.

Quoad materiam cheirurgicam : cum non liceat venam secare, nisi sanguis peccet : ob id Auicennas in singultu, cuius causa est inflammatio, venam secat : nam inflammatio est malum sanguineum. Et hinc Alexander venam secat, tantum in singultu ex inflammatione : nisi vires dissuadeant, quæ maxime in singultu cōcidunt, quoniam singultus violentia prompte calidū insitum dissolvitur. Auicennas probat cucurbitulas sine scarificatione, quæ insensibiliter vacuant materiam morbificam, quæ viget in singultu è repletione : eas autem admouet ventriculo, ventri inferiori, & in medio spatularum, præsertim dum singultus œsophagum exercet : nam iuxta dorsum œsophagus post tracheiam ascendit.

*Curatio.
Cheirurgia*

Medicamēta triplicia sunt : quædam enim respiciunt singultum, quatenus est symptoma vehemens, id est, quatenus rationem habet causæ : & hæc sunt sedantia singultum : quædam autem respiciunt fibrarum proportionem : quædam demique singulis causis aduersantur. Quoad medicamenta sedantia singultum : Aëtius probat refrigerantia : vnde uti licet succo lactuca, diacodeium, nymphæ, lacte pæpaneris albi : & Auicennas ad philonium Rom. ascendit : quod medicamentum probatur non solum ut stupefaciens, sed etiam ut roborans, resoluens, & expellens : philonium enim quatenus frigida recipit, stupefacit : quatenus non permittit calidum insitum dissolui, habet vim roborandi, nempe ope moderate astringentium & refrigerantium : quæ vero recipit calida & tenuis substantia, resoluit : quæ suscipit, quæ possunt inuadere à proprietate, est causa ut facultas expultricæ bene expellet. Cæterum quamuis in singultu vehementiori probentur stupefacientia : tamen causa virtutis oris vetriculi non facile tolerantur : vnde & corrigenda sunt, & non nisi in parua copia danda : nec debemus excedere philonij ʒ j.

Pharmacia.

*Singultum
sedantia.*

Materiæ, quæ respiciunt proportionem fibrarum, proponuntur

*naturalia
appropria
sa.*

ponuntur ab Alexandro : inquit enim, si multis arte tentatis æger non iuuetur, etiam ad naturalia confugiendum. Inter reliqua proponuntur *festuca aut lapilli, è terra sublatis, si capiti singultientis imponantur, ipso ignorante.* Proponuntur etiam à proprietate conferentia, in potu, *apium, asarum, daucus, castorium* : quibus tamen non in omni singultu vtendum: quia in singultu ex inanitione, suo calore & siccitate magis obessent. Et ideo Auicennas prudenter ait : in singultu à materia frigida, *castorium* mirabilem obtinere proprietatem, datum ad 3j.

*Ad causas
singultus.*


Sequuntur medicamenta respicièntia causam efficientem. Si ergo singultus sit ex inanitione : cum Alexandro probatur aqua temperata : unde etiam testatur quendam frigidam sorbitione fuisse seruatum. Probat etiam aquam hordeaceam, cum lacte amygdalino. Quod si singultus fiat ex inanitione, citra causam calefacientem, utpote ex immodica euacuatione: probatur aqua temperata: at si singultus fiat ex inanitione, vi causæ calefacientis : probatur frigida. Auicennas exhibet lac recenter multum, succum citrullorum, aquam cucurbita : & alia refrigerantia ac humectantia. Verum cum his uti liceat & intus & extra : quæ intus vsurpantur, cum Alexandro creberrime sunt exhibenda, & cum Rhasi paulatim : ratio est, quia medicamentum sic admissistratum, diutius contingit ventriculum, & efficacius operatur. Quæ extra applicantur, cum Rhasi sunt applicanda vertebris cervicis, ut oleum amygdalenum, sed cum frictione penetrabili. Si singultus prodeat è repletionem tum Auicenna probatur medicamenta vacuantia sensibilibiter, & insensibiliter. Sensibiliter: per vomitum, per aluuntum unde præter vomitoria laudantur species biera. Insensibiliter vacuantia, vel propria ratione, vel per medium motum materiam vacuare possunt. Quæ propria ratione vacuant, sunt calida, tenuis substantiæ: ideoque materiâ euacuant per modum resolutionis & deterfionis, ut est succus laserpitij, oxymeli, daucus, cuminum cum melle, com. 69. lib. 4. de rat. vict. hac medicamenta decoqui possunt cum melle, ad consistentiam eclegmaticam. Probat etiam castorium è puer, acetum mulsam, acetum scilliticum. Auicennas probat Zingiber decoctum in aqua cum penidiu item probat magnas antidotes, ad dissoluendum materiam. Alexander applicat ventriculo oleum, in quo decoquit castorium, styracem & mastichem: & inter coquendum, oleum rursus agitas : ideoque licet etiam decoquere in duplici vase cum vino, ad consumptionem vin-

Auicennas etiam ascendit ad rubrificantia. Et propterea in singultu etiam stillicidio vti licet. Medicamenta per medium motum vacuantia, sunt quæ sternutationem promouent: à sternutatione enim singultus remouetur, aphor. 13. sect. 6. Huius ordinis cum Auicenna est, repentina aspersio frigida super faciem: nam mouet cum labore, seu medio motu. Vnde notetis, frigidam habere vim discutiendi, sed per medium motum. Sin. autē singultus fiat ē in morbis frigidis, siue etiam ē calidis: confugiendum ad morbos calidos & frigidos ventriculi. Si singultus fiat à materia: quæcunque sit materia: patet etiam, quibus medicamentis sit vtendum. Si fiat singultus ex excrementis rodentibus & corruptis: probantur medicamenta detergentia, attemperantia, vt quæ ex *herdeo* parantur. Addit Alexander hos non esse purgandos, scilicet soluentibus: nam lenientibus vti licet, vt *manna*, *sy. viol.* *sal. assia.*

Dieta varia instituenda, pro varietate causæ: verbi gratia si singultus fiat ē frigiditate, probatur aer calidus. Quoad cibum: si singultus fiat ex inanitione: probatur *lat.* & *carne bona*, sed copia exigua. Si singultus fiat ē repletionē: cum Auicenna probatur victus attenuans, & ieiunium. Idem de potu dicendum. Quoad motum & quietem: quies corporis & animi probatur in singultu ex inanitione: contra, in singultu à repletionē probatur motus, & quidem motus cum labore, vt est vociferatio. Alexand. probat aurium & pris occlusionem: nam cum Auicenna hinc vnitur & augetur caliditas, vnde impetum acquirit ad exeundum versus poros & querit attractionem aeris, vnde humor mouetur. Et propterea in hoc singultu cum Auicenna, cōfert ira, timor, gaudiū, oportet vt repente eueniant: sic enim non sunt contraria, sed conueniunt in motu.

CAPVT XI.

De Vomitu, & Nausea.

 Equitur, vt de Vomitu dicamus: ita tamen vt nausea etiam pateat. Per vomitum autem intelligimus vitium, in quo materia sensibilibiter per os à ventriculo intempestiue expellitur. Generatur vomitus cū Gal. c. 4. l. 3. vsu part. & c. 2. lib. 3. de cau. sym. cap. 3. lib. 2. de caus. sympt. dum ventriculo occurrit causa, ita

Nomen.
Generatio.

*naturalia
appropria
sa.*

ponuntur ab Alexandro : inquit enim, si multis arte tentatis
ager non iuuetur, etiam ad naturalia confugiendum. Inter
reliqua proponuntur *festuca aut lapilli, à terra sublatis, si capiti
singultientis imponantur, ipso ignorante.* Proponuntur etiam à
proprietate conferentia, in potu, *apium, asarum, daucus, ca-
storium* : quibus tamen non in omni singultu vtendum: quia
in singultu ex inanitione, suo calore & siccitate magis ob-
essent. Et ideo Auicennas prudenter ait : in singultu à
materia frigida, *castorium mirabilem obtinere proprietatem, da-
tum ad 3j.*

*Ad causas
singultus.*

Sequuntur medicamenta respiciētia causam efficientem.
Si ergo singultus sit ex inanitione : cum Alexandro proba-
tur aqua temperata : unde etiam testatur quendam frigidam sorbi-
tione fuisse seruatum. Probat etiam aquam hordeaceam, cum lacte
amygdalino. Quod si singultus fiat ex inanitione, citra cau-
sam calefacientem, vt pote ex immodica euacuatione: proba-
tur aqua temperata: si singultus fiat ex inanitione, vi causæ
calefacientis : probatur frigida. Auicennas exhibet lac recentis
mulctum, succum citrullorum, aquam cucurbitæ : & alia refrige-
rantia ac humectantia. Verū cum his vti liceat & intus & ex-
tra : quæ intus vsurpantur, cum Alexandro creberrime sunt
exhibenda, & cum Rhasi paulatim : ratio est, quia medica-
mentum sic admixistratum, diutius contingit ventriculum,
& efficacius operatur. Quæ extra applicantur, cum Rhasi
sunt applicanda vertebris ceruicis, vt oleum amygdalinum, sed
cum frictione penetrabile. Si singultus prodeat è repletionē:
cum Auicenna probatur medicamenta vacuantia sensibili-
ter, & insensibiliter. Sensibiliter: per vomitum, per aluum:
vnde præter vomitoria laudantur *species biere.* Insensibiliter
vacuantia, vel propria ratione, vel per medium motum ma-
teriam vacuare possunt. Quæ propria ratione vacuant, sunt
calida, tenuis substantiæ: ideoque materiā euacuant per mo-
dum resolutionis & deterfionis, vt est *succus laserpitij, oxyme-
li, daucus, cuminum cum melle, com. 69. lib. 4. de ras. vult. hac medi-
camenta decoqui possunt cum melle, ad consistentiam eclagmatis.*
Probat etiam castorium è poset, acetum mulsum, acetum scilli-
ticum. Auicennas probat Zingiber decoctum in aqua cum penidinis
item probat magnas ansidosas, ad dissolucndum materiam. Alexan-
der applicat ventriculo oleum, in quo decoquit castorium, styracem
& mastichem: & inter coquendum, oleum rursus agitat : ideoque licet
etiam decoquere in duplici vase cum vino, ad consumptionem vini.


Auicen

Auicennas etiam ascendit ad rubrificantia. Et propterea in singultu etiam stillicidio vti licet. Medicamēta per inedium motum vacuantia, sunt quæ sternutationem promouent: à sternutatione enim singultus remouetur. aphor. 13. sect. 6. Huius ordinis cum Auicenna est, repentina aspersio frigida super faciem: nam mouet cum labore, seu medio motu. Vnde notetis, frigidam habere vim discutiendi, sed per medium motum. Sin. autē singultus fiat è morbis frigidis, siue etiam è calidis: confugiendum ad morbos calidos & frigidos ventriculi. Si singultus fiat à materia: quæcunque sit materia: patet etiam, quibus medicamentis sit vtendum. Si fiat singultus ex excrementis rodentibus & corruptis: probantur medicamenta detergentia, attemperantia, vt quæ ex *hordeo* parantur. Addit Alexander hos non esse purgandos, scilicet soluentibus: nam lenientibus vti licet, vt *manna*, *lyr. viol. sol. dāsisia*.

Dieta varia instituenda, pro varietate causæ: verbi gratia si singultus fiat è frigiditate, probatur aer calidus. Quoad cibum: si singultus fiat ex inanitione: probatur *lat.* & *car-* Vitiu-
ra-
110.
nes bona, sed copia exigua. Si singultus fiat è repletionē: cum Auicenna probatur victus attenuans, & ieiunium. Idem de potu dicendum. Quoad motum & quietem: quies corporis & animi probatur in singultu ex inanitione: contra, in singultu à repletionē probatur motus, & quidem motus cum labore, vt est vociferatio. Alexand. probat aurium & oris occlusionem: nam cum Auicenna hinc vnitur & augetur caliditas, vnde impetum acquirit ad exeundum versus poros & querit attractionem aeris, vnde humor mouetur. Et propterea in hoc singultu cum Auic. cōfert ira, timor, gaudiū, sed oportet vt repente eueniant: sic enim non sunt contraria, sed conuepiunt in motu,

CAPVT XI.

De Vomitu, & Nausea.



Equitur, vt de Vomitu dicamus: ita tamen vt nausea etiam pateat. Per vomitum autem intelligimus vitium, in quo materia sensibiliter per os à ventriculo intempestiue expellitur. Generatur vomitus cū Gal. c. 4. l. 3. vsu part. & c. 2. lib. 3. de cau. sym. cap. 3. lib. 2. de caus. sympt. dum ventriculo occurrit causa, Nomen.
Generatio.
ita

*Definitio.
Forma.*

ira eum infestans, ut eius expultrix ad expellendum insurgat, sed intempestive: quo fit, ut os ventriculi recludatur, & tunice prius distenta contrahantur, & ope fibrarum transversarum sursum per œsophagum, & demum per os materia sensibilibiter expellatur. Quare vomitus nil aliud est, quam motus prauus ventriculi, dependens ab expultrice, expellente materiam per os sensibilibiter. Forma est motus prauus cap. 3. lib. 2. de caus. sympt. ad differentiam motus secundum naturam, & proinde vomitus tempestiuus item ad differentiam motus præter naturam, qui est ablatu, vel imminutus. Vomitus ergo formaliter est actio læsa, quæ fit cum motu euidenti: ad differentiam læsæ actionis, quæ fit citra motum euidentem. Subiectum est ventriculus: ad differentiam functionum cum motu aliarum partium.

Subiectu.

Causa efficiens.

Ratione causæ efficientis, diximus: dependens ab expultrice, expellente materiam per os sensibilibiter. Diximus, dependens ab expultrice: quoniam actio cum motu ventriculi potest esse attractio, retentio, expulsio: at cum aliquid euomitur, est actio expultricis. Expellitur autem materia per os, seu viam oris: ad differentiam expulsionis per aluum. Idque fit sensibilibiter, ad differentiam nausæ: nam expultrix in vomitu agit in materiam residentem in cavitare, & præsertim supernatantem, com. aph. 39. sect. 6. & cap. 3. lib. 2. de caus. sympt. At in nausæ expultrix agit in materiam impactam, unde fit vacuatio insensibilis. Differt autem nausæ a subuersione: nam ventriculi subuersio fit, dum appetentia ventriculi læsa est ratione cibi, ideoque subuersio non fit, nisi cibo assumpto: nausæ autem fit sine cibi assumptione,

*Diagnosif
affectuum
cognatoru.*

*Vomitus è
quo sym-
ptomatum
genere.*

secundum Aetium. Porro quaeritur, cum vomitus sit actio, an possit referri in exiens mutatum? Vbi sciendum, vomitum dupliciter accipi posse: nimirum ut vomitus in aliud refertur, quod fit vel symptoma, vel efficiens. Si capiatur vomitus, ut refertur in aliud symptoma: potest recenseretur inter exeuntia: nam est exiens, quod refertur in læsionem expultricis. Quare secundum hanc rationem, vomitus formaliter est exiens mutatum: effectiue, est expulsio læsa: cum enim vomitus sit exiens, sequitur læsam esse expulsionem. Et hoc modo sumitur à Galeno, cap. ult. lib. de diff. sympt. nam ibi Galenus loquitur de symptomatis, quæ consistunt in exeunte mutato. Si sumatur vomitus ut symptoma, quod non refertur in aliud symptoma, sed in causam: formaliter est actio

actio læsa : nam actionis læsio immediate refertur non in symptoma, sed in causam efficientem, quæ est facultas frustrata, vel ob morbum, vel ob errorem externum. Et hoc modo sumit Galenus, cap. 3. lib. 2. de caus. sympt. nam ibi loquitur de motibus seu actionibus prauis. Nobis placuit sumere secundo modo: quatenus est symptoma, quod refertur in causam efficientem: ratio est: quia vomitus secundo hoc modo acceptus, magis genere conuenit cum singultu, nausea, & reliquis malis, quæ motum illegitimum pro communi genere habent. Deinde etiam queritur: cum vomitus sit motus prauus, an possit esse secundum naturam? Dicimus in vomitu perpendendum esse, vel locum per quem excernitur materia, vel agens, quod ad expellendum concurrit. Si perpendatur locus, per quem materia excernitur: statuendum, vomitum esse à toto genere præter naturam, non quidem absolute, sed ratione loci, per quem excernitur materia: nam à natura non est creatum os ventriculi, vt per illud materia euacuetur. Et secundum hunc modum Galenus loquitur, cap. vlt. lib. de diff. sympt. statuens, sanguinis profusiones & vomitiones toto genere esse præter naturam, ad differentiam vacuationis, quæ fit per alium, vesicam, vterum: quæ membra, ad differentiam ventriculi, destinata sunt ad excretionem: vnde excretio sanguinis per vterum, non est à toto genere præter naturam. Si autem perpendatur in vomitu agens, quod ad excernendum concurrit: capitur vel secundum speciem, vel secundum actionem. Si secundum speciem: è cap. 1. lib. 2. de caus. sympt. est speciei vel vnius, vel duplicis. Vnius est speciei, dum solum est vel secundum naturam, vel præter naturam. Duplicis speciei est, dum vnum est secundum naturam, aliud præter naturam. Si ergo agens sit duplicis speciei: motus statuitur mistus, vt sit opus & morbi & facultatis, veluti torpor. Sin agens sit vnius speciei: fit motus qui comitatur morbosos affectus, quemadmodum palpitatio & conuulsio: vnde hic motus statuitur à toto genere præter naturam. Quod si agens vnius sit speciei, & fiat motus solius facultatis: statuitur opus solius naturæ, vt sternutatio, tussis, singultus, vomitus. Galenus quidem vomitum gratia exempli non proponit cap. 1. lib. 2. de caus. sympt. sed tamen cap. 3. lib. eiusdem proponit, dum ait: vomitum esse expultricis actionem: vnde vomitus tussi assimilatur, quatenus vterque motus solius est expultricis. Et ob id, secundum hanc ratio-

Quomodo vomitus sit opus naturæ: & quomodo præter naturam.

1. Ratione loci.

2. Ratione speciei agētis.

3. *Ratione
modi actio
nis.*

nem, vomitus statui potest motus, à toto genere secundum naturam. Si autem capiatur agens secundum actionem: perpendimus vel modum secundum quem fit actio: vel tempus in quo fit actio. Si perpendamus modum secundum quem fit actio: hic duplex est, e cap. 1. lib. 2. de caus. sympr. prout expultrix impellitur à causa vel morbosa, vel non morbosa. Vnde, sicuti excretio, quæ per aluum fit, potest esse motus solius naturæ, nec irritatæ à causa morbifica, quoniam hæc est vacuatio, quæ fit per locum, vacuationi à natura destinatum, & proinde hic motus non est symptoma, quia actio secundum naturam obitur: ita contra in vomitu fit excretio per locum inanitioni non destinatum, & fit quidem expulsio à natura, sed quatenus à causa morbosa violenter agitur. Et propterea quemadmodum singultus est motus solius naturæ, à causa morbosa violenter coactæ, & proinde est motus prauus: ita etiam vomitus est motus prauus, & proinde symptoma, quia est opus naturæ, sed coactæ. cap. 3. lib. 2. de caus. sympr. Si denique perpendamus tempus in quo fit actio: fit vel tempestiue, vel intempestiue: cap. vlt. lib. de diff. symp. Tempestiue fit, cum expellitur quod contristat: intempestiue si aliorum fiat euacuatio, non molestantium. Quare si vomitus tempestiue fiat, quamuis sit toto genere præter naturam, quatenus fit per os ventriculi: nondum tamen præter naturam est, quia fit cum providentia de animalis salute, & virtutis robore. Vnde com. aph. 2. sect. 1. dicitur, in vomitibus spontaneis, si talia purgentur, qualia purgari oportet, confert, & facile ferunt ægrotantes: vacuantur enim quæ corpus infestant: ideo si vacuentur non molestantia, grauius ferunt ægri, quia educitur materia non morbosa, cuius præsentia custodiebatur virtus. Quare si tempestiue fiat vomitus, est opus naturæ: si intempestiue, est symptoma. Verum dum est naturæ opus, nulla actio læditur, ut in sudore, alui deiectione, vrina: hæc enim vacuationes, etsi multo ampliores ægris occurrant, quam pro naturæ modo: non tamen inter symptomata recensentur, sed inter naturæ opera, dum fiunt non solum nulla actione læsa, sed etiam cum virtutis robore, & providentia animalis salutis. Quare cum vomitus tempestiue factus sit opus naturæ, non læsa aliqua actione: nos hic loquimur tantum de vomitu intempestiuo, qui est prauus motus, & symptoma, & ratione loci toto genere præter naturam.

4. *Ratione
temporis,
quo fit
actio.*

Iam dicendum: quænam causa expultricem ad vomitum *Cause efficiens sub-*
incitet: id autem facit tantum error externus. Hic error *diuisio.*

quatuor modis considerari potest: secundum speciem, vitium, *1. A specie.*

causam generantem, & modum quo concurret ad facultatem irritandum. Quoad speciem: materia est causa Interna, vel Externa. Interna, vel est Vitæ particeps, vt vermis: vel Expers, & aut materia Alimentalis, aut Excrementitia. Si alimentalis: succus vel Chylosus, vel Sanguineus. Si chylosus: vel Coctus, vel Crudus: & hinc particeps vel Pituitæ, vel Succu crudi. Si sanguineus: vel est Sincerus, vel Particeps succi alimentalis, siue pituitosi, siue biliosi, siue melancholici. Materia excrementitia, vel est Non prima, vel Prima. Non prima est, quæ fit ex alia excrementitia: prima, quæ non fit è priori. Non prima, vt vermis defunctus: hic enim generatur è putri materia. Prima attinet ad coctionem vel Primam, vel Sequentes. Si ad primam: est materia Fecalis, vel Serosa. Si ad sequentes coctiones: pertinet vel ad Secundam, vel ad Tertiam. Si ad secundam: excrementum est vel Biliosum, vel Melancholicum. Si ad tertiam: materia excrementitia est vel Sanies, vel Mucus cerebri. Externa causa, concurret Necessario, vel Non necessario. Non necessario occurrens, potest esse venenum, medicamentum. Necessario: cibis, porus. Quoad vitium: si attineat ad substantiam: est *2. A vitio.*

materia vel Simpliciter toto genere præter naturam, vt vermis viuens, venenum: vel est toto genere præter naturam, non simpliciter, sed ratione Putredinis, vt est vermis mortuus, & quælibet materia putrida. Si vitium ad quantitatem spectet: est quælibet materia, copia grauans. Si ad qualitatem: est materia calida, siue sit bilis, siue pituita salsa. Si vitium attineat ad *ubi*: si ad quietem: vitium in hoc positum est, vt materia residet in cavitae ventriculi, supra fundum, & supernatat. Si ad motum spectet vitium: terminus ad quem est Ventriculus: terminus à quo, vel Totum, vel Pars: vt sæpe diximus. Sed notandum, quomodo in dissec- *Cerebro*
tione cerebri, bilis vomitum superuenire dicat Hippo- *vulnerato*
crates, aphorif. 30. sectio. 6. Galenus ait, id fieri, quoniam *bilis vom-*
cerebrum præcisum, citissime suam passionem ventri- *cus super-*
culo communicat, id est, qualitatem spiritalem, vi cuius *uenit.*
partes proximæ ipsi ventriculo, & proinde iecur, superfluitates, præsertim tenues & biliosas, & serosas, dimittunt in ventriculum: vt hic motus materierum à iecore in ventricu-

3. *A causa
generante.*

4. *A modo
irritatio-
nis.*

lum fiat per modum transmissionis. cum ventriculus imbecillis euaserit, vi qualitatis spiritalis: & ita imbecillis, vt vicinas superfluitates admittat: quæ deinde superfluitates, dum irritant expultricem, per vomitum educuntur. Causa generans varia est, pro discrimine materiæ: vt alibi diximus. Postremo, si capiatur materia penes modum, quo irritat expultricem: concurrit vel Propria ratione, vel ex Accidenti. Propria ratione: dum materia morbifica, suapte natura, id est, vi proprii vitij agere potest. Ex accidenti autem dum vitium attinet non ad materiam, sed ad ventriculum: quod vitium, positum est, vel in morbis, vel in destructione appetentiæ cibi. Si in morbis est situm: morbus est vel Intemperies, vel Mala compositio, vel Soluta vnitas. In intemperie, verbi gratia, si ventriculus sit frigidior, cibus etiam exiguus euadet copiosus: si ventriculus calidior sit, cibus etiam non mordax irritare poterit. Mala compositio, est, verbi gratia, angustia in orificio inferno ventriculi: vnde materia non potest infra expelli, ideoque irritat expultricem ad superiora. Soluta vnio, est vlcus, vi cuius à cibo etiam probo facultas irritatur. Si vitium sit positum in destructione appetitus cibi: fit vomitus ex imaginatione obiecti iniucundi: vtpote si quis aliquem vomentem intueatur, ilico potest euomere cibum etiam probum: nam ita afficitur imaginatricis organum, & dum impellitur animalis appetentia, hæc ita influit in os ventriculi, & hoc ita afficit, vt dissipetur cibi appetentia, & cibi attractio: vnde portio expultrix irritatur à cibo bono.

Differentia.

A forma non sumuntur vomitus differentia, nisi secundum magis & minus, prout est Magis aut Minus prauus: & hinc vomitus statuitur Magis aut Minus vehemens. Ob id, ratione differentiarum à forma, non licet dicere, vomitum esse vel criticum, vel symptomaticum: nam vomitus criticus fit tempestiue, & est naturæ opus, non symptoma, de quo hic loquimur: quare non est motus prauus, nisi sit vomitus criticus imminutus. A subiecto non sumuntur differentia: nam subiectum est ventriculus. Causa efficiens est error externus: cuius variae sunt differentia, secundum speciem, vitium, causam generantem, & modum quo concurrit ad irritandum expultricem: de quibus supra. Id notetur, si vomitus fiat ab errore, in ratione causæ internæ: vocari vomitum spontaneum.

Signa.

Vomitum in genere est manifestus. Sed morbosus vomitus,

mitus, distinguendus est ab eo, qui est naturæ opus. Si igitur conferat, & leuiter ferant patientes: est vomitus secundum naturam: si contra: præter naturam: de quo nos iam loquimur. comment. apho. 1. sect. 1. Differentiæ à forma patent. Sic etiam differentiæ à causa efficiente patere possunt ex alibi traditis. In præsentia sufficiant signa materiæ morbificæ irritantis ptopria ratione, & ex accidenti. Igitur si materia propria ratione lædat: cognoscitur inde, quod materia quæ euomitur, est vitiosa: si ex accidenti: indicatur è materiâ egrediente inculpata. Vtrum autem ventriculi vitium positum sit, vel in intemperie, vel in mala compositione, vel solitra vnitatis: suis traditum est locis.

Quoad præsidia: cum vomitus sit motus prauus, procedens à materia irritante expultricem: præsidia potiss. sunt capienda à materia irritante, quoniam hac superata ilico cessat vomitus: interdum tamen etiam à vomitu, quatenus prauus est, præsidia haurire cogimur. Quo igitur ad materiam: cum perpendatur secundum speciem, vitium, causam generantem, modum quoad irritandum concurrat: quoad speciem: indicantur præsidia determinata. Quoad vitium: varia indicantur præsidia, de quibus alibi. Nunc duo notanda, ratione vitij secundum vbi. Primum est Alexandri: qui cap. 11. lib. 7. ait: si crudi humores solum redundant in ventriculo, & non è toto corpore confluunt: ægrotantes medicamentis sollicitandos non esse: si autem humores è toto corpore confluunt in ventriculum: probari interdum sanguinis missionem, interdum purgationem, interdum vtrumque. Per crudos humores in toto ventriculo redundantes, intelligit Alexander portiones cibi frigidas & crassas, qui non potuerunt in chylum conuerti: vnde hi crudi succi non egent euacuatione, sed potius alteratione, vt concoquantur, & in alimentum mutantur: & ob id Alexander solo victu hos crudos humores mutat. Cum igitur succi crudi peccare possint copia, & necessario sint frigidi, crassique: ob id opus est euacuatione, calefactione & attenuatione: quorum præsidiorum materiæ cum Alexandro, attinere debent potius ad victum, quam ad materiam cheirurgicam, aut medicinalem: nam per victum tenuem humoris copia minuitur: per victum calidum, vincitur frigiditas, & ob id succi crudi ita disponuntur, vt à calore naturali coquantur. Quoad humores, qui confluunt è toto corpore in

Indicationes.

ventriculū, cum peccent copia & motu: sunt minuendi, & retrahendi: quia vitium vehemens est, postulatur etiam vehemens præsidium: cuius materia, causa sanguinis est venæsectio: causa reliquorum humorum, medicamentum purgans: ideoque iure cum Alexandro maioribus utendum remediis. Alterum, quod notandum diximus, spectat ad vomitum criticum imminutum: ubi quaeritur, à quo indicetur remedium adiuuans. Hoc ut intelligatur, primo sciendum, differentiam esse inter vomitum symptomaticum & criticum: ille enim fit intempestiue, ideoque est prauus, & symptoma: hic autem fit tempestiue, & est vel integer, in quo tota materia vacuatur, ideoque ab eo nulla debet sumi indicatio: vel est imminutus, in quo non tota vacuatur materia, quia, licet fiat tempestiue, tamen nec ita vehemens, nec perseverans est, quemadmodum requirit materia morbolæ: proinde vomitus criticus imminutus non est opus naturæ, sed symptoma, nimirum actio læsa imminuta. Causa huius vomitus est materia, cuius vitium positum est in motu, quia minus vacuatur, quam decet: & proinde hic motus imminutus adiuuandus. Denique, cum interdum contingat, ut antequam materia è toto vincatur, vires patientis collabantur: fit, ut etiam à vomitu, quatenus est symptoma, indicatio hauriatur: quoniam est symptoma habens rationem causæ, id est, vires. Cum igitur vomitus formaliter acceptus, sit motus prauus, in quo necessario aperitur os supernum ventriculi: propterea indicatur remedium occludens os ventriculi; videlicet astringens. Vnde Galenus, com. apho. 37. sectio. 7. vomitum sanguinis curat astringentibus & refrigerantibus: astringentia respiciunt apertionem orificii, & in vomitu sanguineo, diapedesin, anastomosin, vel diaresein venarum, à quibus erumpit sanguis: refrigerantia diriguntur ad sanguinis caliditatem, cuius causa sanguis facile fluit.

Prognostica.

Quoad vomitum in genere, nihil certi potest statui circa euentum. Quoad differentias ratione formæ: si vomitus sit criticus diminutus: facile adiuuari potest. Si autem vomitus sit symptomaticus: quo est vehementior, eo periculosior. Ratione efficientis: cum causa efficiens sit multiplex, ex alibi dictis patet quid minetur: verbi gratia, quoad speciem: vomitus est peior, si atra bilis: mitior, si pituita: nam atra bilis magis recedit à naturali statu. Quoad vitium: peior

peior est vomitus, si fiat à pituita putrida, quam si copiosa: nam materia putrida est magis inimica. Quoad causam generantem: vomitus est magis periculosus, si fiat à materia genita potius vi morbi, quam erroris externi: verbi gratia, cum Galēno com. 39. sect. 2. progn. bilis porracea est in causa vomitus minus periculosi, si generetur in ventriculo ex oleribus, quam si generetur ratione morbi in venis: nam si bilis generetur ob errorem externum, non est ita praua, & vnus tantum est inimicus: at si generetur ob morbos in venis, est peior, & duplex est hostis. Quoad motum, secundum quem causa concurrit ad irritandum expultricem: periculum est maius, dum pendet à materia, propria ratione agente: & præterea ex eo, vi cuius materia etiam proba vomitum efficit: verbi gratia, si vomitus fiat à pituita copiosa, vel cibo copioso, vomitus erit minus periculosus: magis periculosus si fiat à bono cibo, sed vi vlcis: nam vlcus magis recedit à naturali statu, quam vel pituita copiosa, vel cibus copiosus. Sed oportet etiam ad artem prognosticandi dirigere Hippocratis aphorismum 37. sect. 7. vbi inquit: qui- *Explica- tur aph. 37. sect. 7. de vomitu cum & sine febre.* cumque euomunt sanguinem, si sine febre, salutare: si cum febre, malum. Hic statuitur sanguinis vomitus cum febre esse magis periculosus. Licet enim non sit discriminē in specie: nam in vtroque vomitu, & sine febre, & cum febre euomitur sanguis: differentia tamen est in sanguinis vitio, & numero rerum præter naturam. Quo enim ad vitium: sanguis est calidior in vomitu cum febre: quare magis recedit à naturali statu, & proinde vehementior est secundum essentiam. Quo vero ad numerum: in vomitu sine febre, naturæ inimicus est sanguis peccans, & venarum vitium, id est, diapedesis, anastomosis, vel diæresis: in vomitu autem cum febre, etiam præter proposita vitia est inflammatio, & febris sequens inflammationem. Ergo sanguinis vomitus cum febre, malum. Redigemus etiam ad prognosticum, context. 38. lib. 2. prognost. vbi Hippocrates ait: Vomitus est utilis, si fiat à pituita, ac bile, si maxime permiscendantur, & præsertim si materia non fuerit valde crassa, neque multa: sinceræ enim vomitiones deteriores sunt. Respicit Hippocrates ad vehemenciam materiæ penes causam generantem. Quod artificium cognoscens Galēnus, ait in commento: humorem biliosum sincerum multam indicare caliditatem, generantem scilicet bilem:

Alius Hipp. locus enarratur: de colore materiæ vomitu te- ste.

contra, pituitam sinceram, indicare frigiditatem vehementem, generantem pituitam. Hoc confirmatur ab Hippocrate, context. 39. ubi ait, varios colores, id est, porraceum, liuidum, aut nigrum, esse malum: quod verum est, quatenus hi colores indicant causas generantes admodum vehementes. Cum ergo Hippocrates respexerit ad vehementiam causæ generantis: recte statuit, vomitum materiæ mistæ, è bile pituita, esse vtilem, id est, minus malum: materiæ autem sinceræ esse deterio rem: ratio est, quia, sicut mista materia generatur ab intemperie remissiore: ita & vomitus mistæ materiæ minus est malus. At vomitus materiæ sinceræ est deterior: nam bilis sincera, id est, summe flaua, & vitellina, indicat insignem caliditatem: pituita sincera, & acida, insignem frigiditatem, scilicet generantem. Cæterum, materia sincera est signum maioris vehementiæ, non tantum vt est sincera, sed etiam vt est crassior: nam cum Galeno sincerus humor crassior existit, pituita quidem propter frigiditatem astringentem quasi cōcreta: bilis autem propter caliditatem euaporantem tanquam assata. Vnde colligitur, materiam etiam copiosam esse indicium causæ generantis vehementioris. Et hinc Hippocrates locis cit. iure statuit, vomitum materiæ vitiosæ, affectæ prauo odore, malo colore, esse malum: quia indicat causam generantem vehementer peccantem. Materia enim foetida & putrida indicat agens, in quo calor præter naturam dominatur. Materia prauo colore infecta etiam est mala: quia prauis colores significant causam generantem admodum vehementem: nam porraceus color, vi caliditatis morbosæ genitus, indicat insignem caliditatem in venis: materia liuida & nigra, differunt secundum magis & minus, quare niger color indicat peiorem causam generantem. Sufficiat iam circa nigrum tantum calorem digredi. Nigra igitur redditur materia, vel ob misionem nigra materiæ, vel citra misionem. Si reddatur nigra ob misionem materiæ: cum Galeno, context. 22. lib. 2. prognost. dum excretio ab atra bile tingitur, oportet, vt materia nigra sit copiosa, nec modice mista, nam secus exeuntia essent liuida, non nigra. Materia autem nigra potest esse atra bilis, vel melancholia: peior est excretio atræ bilis, quia magis recedit. Si autem vomitus fiat materiæ nigra citra misionem alterius materiæ: hic color indicat causam generantem, admodum vehementer vel refrigerantem, vel calefacientem.

Et hinc

Et hinc Galenus context. 29. lib. 2. prognost. ait. nigredinem fieri ob vehementiam frigiditatis, vel caliditatis. Ob frigus frigus quidem: dum sanguis congestus in globos nigrescit: frigore enim sanguinis partes diaphanas exprimuntur. Ob calorem: dum sanguis contrahit nigredinem, si veluti comburatur: calor enim insignis portiones diaphanas dissolvit. Partibus igitur diaphanis dissipatis, dominantur opacæ: & hinc materia nigra euadit. Constitutum igitur sit, materiam quæ euomitur, ratione prauæ coloris indicare vehementiam essentia: causæ generatæ: ut hinc periculosus sit vomitus. Icirco Hippocrates text. 40. lib. 2. prognost. ait: si homo omnes vomat colores, exitiale. Nam dum plures sunt colores, plures sunt sinceræ materiæ, quæ se inuicem quidem contingunt, sed non sunt exacte mixtæ, quemadmodum requirit vomitus materiæ non sinceræ: plures autem illæ sinceræ materiæ, nil aliud indicant, quam in corpore multas haberi difficiles affectiones: nam cum causa generans sit vehemens, & propria ratione, & ut numerosior: iure hic vomitus Hippocrati est exitialis.

Alexander in vomitu procedente à toto, probat venæ sectionem, si sanguis abundat. Auicennas secatur venam, si patienti sit repletus sanguine: & primo secatur basilicam: nam sanguis subsistentiam habet in iecinore, estque copiosus, & vires inter initia sunt robustæ. Mox, si reliquæ sanguinis supersunt, secatur venas pedum: quia sanguis non est ita copiosus, nec ita potens, virtus etiam non est ita firma, ut primo tempore. Denique, si adhuc assint sanguinis reliquæ, & virtus sectionem venæ non possit perferre: Auicennas cucurbitulas cum scarificatione cruribus applicat. Paullus cucurbitulam cum magna flamma admouet circa umbilicum: & addit violentas frictiones, vehementes ligaturas secundum crura: ad materiam retrahendum.

Medicamenta, quibus vomitui occurrendum, respiciunt vomitum vel Imminutum, vel Superfluum. Ad imminutum vomitum probantur medicamenta, quæ sensibilibus per vomitum euacuant. Vnde Auicennas de imminuto, tertij tract. 5. cap. 12. inquit, vomitum vomitu abscindi: quod in vomitu superfluo locum non habet, in quo timoroscum est fluxu fluxum curare, quarta, primi, cap. 3. Itaque in vomitu imminuto, cum Galeno, cap. 11. lib. 7. meth. si materia sit pituitosa, crassa, viscida, probatur hoc medicamentum: R. succi

raphani ʒvj. *oxymeluis simolicis* ʒj β. *iuris pulli tepidi* ℥j. *Missa* pro vomitorio. Si materia sit minus crassa, minus viscida: Galenus exhibet *mulsam cum aceto in cremore ptisana*, verbi gratia. R. *malsa* ʒij. *aceti* ʒβ. *cremoris ptisana hordeacea* ʒviij. *Missa* pro vomitorio. Si autem materia sit biliola: possumus exhibere ʒx. *aqua tepida*, vel *simplicis*, vel *hordeacea*, cum ʒj. *syropi acetosi simplicis*. Quod si admodum acris & mordax sit biliola materia: loco *aqua tepida* vti possumus *iure pingui*. Si autem materia sit melancholica, dummodo non sit attrahilaria: probatur *malsa*, cum *succo raphani in iure*. Si autem vomitus fuerit materiae sanguineae: non probantur vomitorium, nisi sanguis sit vel imminet, ne concresecat: tunc enim probatur *malsa calida* (non tepida) ad ʒij. cum *syropo acetoso*, ad ʒj β. cum *melle* ad ʒβ. & hoc si imminet sanguinis concretio. Quod si iam concretus sit sanguis: probatur *malsa* ad ʒvj. cum *decocto vel matricaria*, vel *thymi*, vel etiam *ebuli*, urgente necessitate, ad concretionem dissoluendum: dosi decocti ad ʒij. His medicamentis si non cedat malum, quia de vita patientis agitur: propinare cogimur *aquam cineris*, seu *lininum*, ad ʒv. cum *lacte ficuum*, ad quantitatem ʒj. cum *bdello*, & *opoponace*, ad dosin ʒij. *Auicennas* probat ʒij. *sanguis leporis*, & *aqua mentha* ʒij. cum *salis contriti* ʒij. Inprobatur autem vomitorium in vomitu sanguinis, dum menses sunt suppressi: nam non decet sanguinem menstruum per os euacuare: attamen, cum exitiale sit hunc sanguinem menstruum in corpore detineri: occurrendum potius materiae chirurgica, de qua suo loco.

Cohibentia vomitum.
1. Reuellentia sensibiliter, & **insensibiliter.**

In vomitu superfluo probantur medicamenta Reuellentia, & Astringentia. Reuellentia sunt vacuantia Sensibiliter, vel Insensibiliter. Sensibiliter vacuantia, sunt medicamenta per clysteres infusa: nam medicamentum per os exhibitum potius egreditur per vomitum, quare non reuellit, non retrahit, ideoque potius nocet. *Auicennas* probat clysmos acutos: quos ait multoties vomitum abscindere. Reuellentia insensibiliter vacuantia, sunt calida medicamenta, & tenuis substantiae. Quare cum *Auicenna* mirabile est in sedando vomitu calefacere extremitates. Nec sibi contradicit *Auicennas*, dum decimatertia, tertij &c. scribit, in frigiditatem extremitatum, sedare vomitum velocem calidum: respicit enim ad vomitum, qui habet rationem causae, ut est vomitus, in quo velociter inouetur materia calida: extremita-

tes namque refrigeratæ, frigiditatem impertiuntur ori ventriculi quod inde astringitur, & vomitus sedatur. Hic igitur refrigeratio extremorum dirigitur ad vomitum, non ad materiam. Contra extremorum calefactio, non respicit vomitum, sed materiam vomitus, quam ad inferiores partes retrahit: ideoque Auicennas proponit medicamenta vehementer calida, ita ut etiam ad rubrificantia ascendat, & ad exulcerantia, quæ sæpius cruribus applicat, reuulsionis gratia.

Astringentia vomitum respiciunt, quatenus est symptoma, habens rationem causæ. Cum autem vomitus fiat à materia frigida, vel calida: Si materia sit frigida: & primum si sit materia melancholica: cum Auicenna quantum fieri potest abstinendum ab astringentibus, hæc enim materiam melancholicam crassiores reddunt. Vnde & in vomitu à pituitosa materia astringentibus mitioribus utendum: & proinde ijs medicamentis, quæ parum etiam attenuare valent. Quare in vomitu à materia frigida, probatur *diacydonites cum melle*: probatur *saccharum rosaceum etiam unius anni*, sed cum *mastiche, mēsha, tōtre*: pro singulis uncis sacchari rosacei, sufficit miscere \mathfrak{zj} . *propolisitorum medicamentorum*: & hæc uncia in duas doses dividatur. Extra autem probatur *oleum de absinthio, de mēsha, mastichinum, verbi gratia ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. cum pulvere mastiches, mēsha, absinthij, & gallarum immaturarum ad \mathfrak{g} v. pro singulo medicamento*: & addantur \mathfrak{zj} . *cera elota cum vino astringente fiat linimentum*. Probatur etiam panis torrefactus, madefactus vino, maluatico, cum pulvere nucum cupressi. In vomitu à materia calida, probantur astringentia valentiora, id est, frigida, crassa: quoniam oportet os ventriculi occludere, & calidam materiam attemperare, tenuemque crassescere. Quare probatur *syrupus de granatis, syr. de ribes, de cydonis, rosatus, & siccis rosis myrtinus*: & hi syrupi exhibendi, vel cum aqua plantaginis, vel cum aqua chalybeata. Probatur etiam *saccharum rosaceum vetus, diacydonites, sed non cum melle, ut prius, sed cum saccharo*. Probatur *diacornu*, quod est medicamentum mirabile. Si vomitus adeo sit vehemens, ut cum Auicenna deficiat curatio: ascendendum ad semen lactuca, deinde ad semen papaveris, præterea ad corticem papaveris nigri, & urgente necessitate, ad corticem radicis mandragora, & tandem ad philonium Ram. & proinde ad recipientia opium: unde Auicenna non probat trachiscos Amaricos nuncupatos, qui conspiciuntur

Astringētia, in materia frigida.

Astringētia in calida materia.

Gal. cap. 3. lib. 8.

& semini

de seminibus anisorum, apij, ex absinthio, cinamomo, opio, & castoreo. Opium est basis, cuius virtute potissimum sedatur vomitus: absinthii sua vi astringente opium adiuuat: castorium est alexipharmacum opij: cuius tum odor, tum sapor corrigitur aniso, cinamomo, & reliquis iucundis, quæ etiam vi calida, opij frigiditatem corrigunt. Extrinsecus probatur medicamentum ex oleo rosaceo, melino, myrtino, cum exiguo mastichino, additis pulveribus coralliorum, santalorum, malicetij, cum cera. Formula patet è supra dictis. Probatum etiam panis terrefactus, madefactus aqua rosacea, vel vino astringente, additis pulveribus modo dictis. Addit Auicennas extremorum refrigerationem: quemadmodum si manus pedesque in frigidam immergantur.

Videtur ratio.

Aqua carnis, vires instauras.

Dixit varia est, pro varia vomitus causa. Secundum Auicennam igitur in vomitu è cibi corruptione, probantur cibi, suavis odoris & saporis: qui calidi sunt in corruptione acida: frigidi, in nidorosa. Tandem addit Auicennas in vomitu contumaci, in quo virium lapsus imminet, esse exhibendam aquam carnis, è pullis, & extremis atibus hedorum & castratorum: qua aqua sic conficitur. Pulli & extremitates hedorum atque castratorum in aqua elixantur: deinde aqua illa abicitur: mox rursum decoquantur carnes in alia aqua, quousque dissoluantur: deinde carnes teruntur in mortario, & hinc aqua exprimitur, cui deinde sunt miscenda vel semina, vel aromata, modo calida, modo frigida, pro mali conditione. Hic aquam carnis parandi modus tunc probatur, cum vires collabuntur ob immodicam vacuationem: in qua opus est alimento velociter nutriente, neque ita dissipabili. Hæc de causa Auicennas accipit cum carne pulli etiam animalium extremitates, quæ viscidum & firmum præbent alimentum. Et eandem ob causam, primum pullos elixat, mox aquam abicit: quoniam per primam elixationem portiones tenues, & facile dissipabiles euaporant, & dissoluantur: remanent autem portiones magis firmæ & solidiores, quibus causa fluxus egemus. Quod si autem vires concidant citra fluxum: satius est in aqua carnis paranda, tenues etiam portiones seruare: neque caribus pullorum, animalium extremitates tunc sunt addendæ, nam potius obessent. Cæterum cum aqua carnis ab Auicenna proposita, in virium lapsu vi vomitus, stabile alimentum præbeat, verum non celeriter nutriat: iccirco prudentissimus Auicen, cum aqua carnis dat parum vini, quoniam vinum

omnium

omnium celerrime nutrit. Auicennas etiam addit, paulatim cibum esse exhibendum, ne motus motui addatur. Vnde cum quies prodest, statuit Auicennas curæ radicem esse somnum. Et hæc de Vomitu.

CAPVT XII.

De Cholera.

DE Cholera, seu Barbarorum cholericam, intelligimus illud vitium, in quo patiens secundū ventriculum ita turbatur, vt materia & per os, & per sedem euacuetur. Vnde sermo noster dirigitur, ad cholera exquisitam & notham, humidam, & aridam. Generatur cholera, dum materia morbifica agit in ventriculum non secundum vnicam tantum partem, sed è capite secundo, libro tertio, de symptom. caus. secundum totum ventriculum, id est, secundum partem supernam & infernam: hincque expultrix adeo irritatur, vt materia & per os, & per aluum expellatur. Cholera igitur est motus prauus ventriculi, dependens ab expultrice, expellente materiam per vtrumque os. Forma est motus prauus, capite secundo, libro tertio, de symptom. caus. qui motus prauus est expulsio, & hinc functio deprauata, quam Alexander vocat immoderatam perturbationem. Auicennas dicit, cholera esse motum materię morbificę: nam loquitur de fluxu, & accipit hoc vitium in ratione exeuntis mutati: Galenus autem in ratione læsę actionis: Quare non sibi repugnant. Subiectum est ventriculus totus, secundum partem superiorem & inferiorem.

Ratione causę efficientis, diximus: dependens ab expultrice, expellente materiam per vtrumque os. Vnde cholera distinguitur ab eo vitio, quod quidam cholera esse credunt, cum tamen non sit: vt monet Galenus tex. 103. libro quarto, de ratione victus, loquens enim de arida cholera inquit: Cum spiritus vitij causa interdum retineantur, interdum exeant: si spiritus retineantur, non gignitur cholera: probabilius enim est, cholera vocare, dum spiritus & vapores egrediuntur, non autem dum retinentur. Hactenus ergo patet, cholera pendere ab expultrice, expellente materiam per vtrumque os. Iam inquirendum, quam ob causam expultrix ad expellendū insurgat. Cum igitur expultrix concutrat

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Subiectum.

Causa efficiens.

Materia irritata expultricem.

concurrat vt causa præter naturam: dicendum in qualibet cholera eam frustrari ob errorem externum, non laxa facultate: nam immediata causa est materia, ita aduersaria ventriculo, vt expultrix summa violentia insurgat ad expellendum. Hinc Galen. cap. 2. lib. 3. de caus. symp. scribit, in cholera ventriculum expellere quod offendit. Id igitur quod offendit, considerandum est, secundum speciem, vitium, & causam generantem.

1. *Species materia.*

Quoad speciem, est causa Interna, vel Externa. Interna è con. 103. libro quarto, de ratione victus. potest esse Vapor, vel Minera: vapor est causa cholerae siccae: minera potest esse causa cholerae tum siccae, tum humidæ: humidæ quidem, si materia morbifica per os & aluum euacuetur, copia effatu digna: siccae, si causa sit materia biliosa (secundum Alexandrum) verum materia in parua copia egreditur: vnde, nisi flatus vel vapores egrediantur, vitium dignum non est nomine cholerae. Quantum ad mineram: potest esse Chylus, vel Humor: & humor, vel Pituitosus, seu aquosus, Vel Biliosus, non tantum bilis flaua, sed cum Auicenna etiam eruginosa: quare esse potest etiam porracea, & vitellina. Causa externa, non necessario occurrens, sunt medicamenta acria, venena. Externa causa, necessario occurrens, attinere potest ad cibum, ad potum: vt est cibus facilis corruptionis, vt lac: item è capite 4. libro 2. aliment. pepones, dum probe non coquantur: similiter fungi, si non vincantur. capite 4. lib. de cibus bon. & mod. succi: item potio putrida vel vini, vel aqua.

2. *vitium materia.*

Quoad vitium speciei: & primum quoad vapores: hi sunt acres: tex. 103. lib. 4. de ratio vict. vi enim acrimoniae corpora neruosa mordentur. Quoad mineram: esse potest quilibet siccus siue sit chylus, siue humor, dum hic succus est putridus, & proinde toto genere præter naturam. Verum in cholera exacte exquisita, vt vult Galenus loco citato est materia acris: nam habet modum generationis communem cuiuslibet cholerae: sicut enim cholera humida, fit ex acri humore: ita cholera sicca, fit ex acri vapore. Diximus autem choleram exquisitissimam fieri à minera acri: quoniam cum Aetio fit cholera è cruditate, non modo nidorosa, sed etiam acida: at magis exquisita cholera prodit è corruptione nidorosa. Quoad causas externas, si fuerit venenum: patet vitium esse secundum substantiam: sed potest annexi acrimonia, Si autem

tem sit medicamentum, est calidum:quare acce. Et idem dicendum est de cibis ac portionibus.

Quoad causam generantem:& primum quantum attinet *3 Causa ge-*
ad vaporem, cum sit vapor acris: generatur rationabiliter *nerans.*
minera acris, sed viscida: ut minera hæc nequeat expelli, quia si
expelleretur, non esset cholera sicca. Quoad mineram: potis-
simum generatur tripliciter: nempe, vitio vel eorum quæ in-
geruntur, vel vetriculi, vel iecinoris. Generatur minera vitio
eorum quæ ingeruntur, dum (cum Galeno loco citato)
cholera sit ex acris humore, qui è comestorum corruptione
prodiit: veluti est cholera, cum Alexandro, quæ sit ob frigida
applicata, aut ab aqua frigida, siue bibita. Auicennas, dum quasi
interpretatur Alexandrum, inquit, choleram fieri è potu fri-
gidæ in ieiunio, sequente cibo crasso: nam dum post ieiunium
ingeritur cibus crassus & difficilis coctionis: vi ieiunij iusto
citius attrahitur chylus, proinde crudus: præsertim cum à
causa refrigerante, vel assumpta, vel admota, reddatur ventri-
culus ad cibum crassum concoquendum imbecillior. At in
hac cholera, cum Aëtio, vomitus acidus oboritur. Materia
etiam gignitur vitio vetriculi: & cum Alexandro proprie
cholera nuncupatur. Cum Auicenna magis sit æstate & au-
tumno, propter debilitatem digestionis: quia tunc calor im-
becillior est: minoratur autem hyeme & vere: quia tunc fir-
mior est calor. Tandem generatur, minera vitio iecinoris
& venarum: nam calore hepatis & venarum, succus bi-
liosus generatur: ideoque mirum non est, febricitantes
quandoque cholera corripì. Alexander inquit, hanc esse
choleram è bile prodeuntem. Et Hippocrates aphorism. 30.
sectio. 3. ait, post iuuenilem ætatem vigere choleram,
quæ scilicet sit à bile, tunc temporis collecta: licet enim
eadem in iuuentute generetur: non tamen ita colligitur,
sed expellitur.

In forma, differentia est secundum magis & minus, qua- *Differentia.*
tenus motus est Magis vel Minus prauus. A subiecto non
sumuntur differentia: nisi dicamus, vetriculū magis affici,
vel Supra, vel Infra. Ratione efficientis, causa est Interna, vel
Externa.

Hic affectus in genere indicatur è nausea, siti, è tristi *Signa.*
sensatione secundum totum vetriculum & intestina, ex
angore, quia vehementer afficitur os vetriculi. Præterea cō-
pariente

paciente corde, indicatur è pulsu læso : & compatiensibus nervis, cum Aetio indicatur è contractione musculorum manuum, & pedum. Tandem indicatur è materia : supra & infra erumpente. Differentias à forma æger patefaciet : num scilicet motus sit magis vel minus prauus.

Quoad differentias à subiecto : si magis afficiatur ventriculus secundum partes supernas, symptomata magis cruciantur supra : si magis secundum partes infernas, contra.

Quoad differentias ratione efficientis : primum an cholera causa sit interna, vel externa, cognoscitur ex ægro & assidentibus : dum externam causam vel prægressam vel non prægressam dicunt. Si sit causa interna : si vapor : dicit æger se percipere vaporem acrem exeuntem. Si sit mine-
ra : oculis materia conspicietur : ita vt species materię etiam visu deprehendatur. Quæ autem sit causa generans, patet ex alibi dictis.

*Indicatio-
nes.*

Quoad præsidia : cum cholera sit motus prauus ventriculi dependens ab expultrice materiam expellente & supra, & infra : à motu prauo, vt est symptoma, habens rationem causę, cum plus iusto vtrumque ventriculi os relaxetur, oritur indicatio astringendi. Deinde, vt hic motus pendet ab expultrice, quæ irritatur à materia, cum haurienda sint præsidia à specie materię, à vitio, & à causa generante : Quoad speciem : determinata indicantur præsidia : vnde si bilis peccet, medicamenta dirigenda sunt in bilem : si cibus, in cibum, secundum Alexandrum. Pro varietate vitiorum : varia indicantur contraria remedia. Vnde, secundum Alexandrum ratione copiosę materię, opus est vacuare : causa bilis calidioris, opus est refrigerare, &c. Similiter patet varias causas generantes, varia postulare præsidia : vnde, secundum Alexandrum in cholera prodeunte ab imbecillitate stomachi, roborandus est ventriculus, eiusque intemperies remouenda.

Prognosis.

Cholera in genere est malum periculosissimum : nulla enim deest vehementia. Quatenus enim omnis cholera est motus admodum prauus : adest insignis recessus, & proinde insignis vehementia essentię. Et quatenus cholera pendet à materia admodum molesta expultrici : augetur vehementia essentię. Præterea quatenus malum attinet ad totum ventriculum : adest vehementia dignitatis. Quatenus autem lædatur pulsus, & vel imminet, vel superuenit syncope : vehementia adest facultatis. Hinc, secundum Alexandrum chole-

ra est acutissimus affectus, qui syncopen insignem, & hunc immodicam virium resolutionem inducit. Verum pro varia vi differentiarum, intenditur, & minuitur periculum. Vnde cholera magis est periculosa, si motus sit magis prauus, si magis, vigeat secundum os supernum, si causa magis recedat à naturali statu: verbi gratia deterior est cholera, si fiat à bile æruginosa, quam si à flaua. Idem de externis causis statuendum. Hinc Galenus cap. 4. lib. de cib. bon. & mod. succi, ait à boletis deuoratis neminem obiisse: vi autem cæterorum fungorum alios mortuos esse, alios proxime ad mortem accessisse. Quamuis autem cholera periculosissimum sit malum, quod celerem necem minatur: cum Rhasi tamen non prorsus est desperandum. Et cum Alexandro celerrime est occurrendum, nam etiam levis mora tabem committit, & periculum affert.

Quoad materias igitur cheirurgicas: Rhases probat artuum ligaturas, tanquam materias remedij reuellentis. Ligandi autem & fricandi sunt artus, modo superni, modo inferni, modo vtrique: prout subsistentia sequitur materiam, quæ impetum ad os vel aluum habet, modo inæqualem, modo æqualem. Si enim æqualis sit impetus: frictiones & ligaturæ probantur secundum omnes artus, id est, manus & pedes: si impetus sit inæqualis: & si vehementior ad os, oportet ligare artus infernos: si ad aluum, supernos. Rhases præterea ad inhibendum vehementiorem impetum, magnam cucurbitam stomacho adhibet, sine scarificatione: quæ tamen in arida cholera non probatur, sed in humida, in qua neque cibus detinetur.

Medicamenta probantur Vacuantia & Astringentia. Vacuantia probantur in cholera sicca, ut vaporum minera euacuetur. Probantur etiam in humida cholera cum Alexandro, si fiat à cibis corruptis: si etiam fiat à bile, in qua nil mentione dignum erumpit. Vacuantia autem hæc frigida sunt oportet: quia feruens est materia morbifica. Quare Alexander cum reliquis probat mulsam, sed dilutam: & si ager non libenter mulsam admittat, iubet aquam tepidam liberaliter esse bibendam. Probatur etiam serum lactis caprini, vel vaccini: sed sine seminibus melano: cum non sit insitutum per lotium vacuare, quia corrupta materia non debet per medium iecur permeare. Cum lactis autem sero, gratia vomitus, misceri debet oleum, vel butyrum: gratia diuersionis per aluum, misceri possunt manna, syr. ros.

*Cyratio.
Cheirurgia.*

*Pharmacia.
Vacuantia.*

solut. samarindi. Non improbantur aqua Veronenses, vel B. Virginiæ. Probantur item clysteres è cremore hordei, è sero lactis, addita saccharo cum ovi vitello, sed sine sale. Quoad usum: notandum circa exhibitionem aquæ, quatenus est materia remedij vacuantis per vomitum: Rhasin exhibere aquam copiosam, moderate calidam, sæpe, & quamprimum. Ratio est: quoad quantum agendum: probat aquam copiosam: quia pauca non potest vacuare: & præterea, quia summa est actio materię morbificæ, cum naturâ cogat ad expellendum per vtrumq; os. Quoad modum: probat aquam moderate calidam, id est, tepidam: hac enim acris materia attemperatur, & ventriculi orificia laxantur, vnde materia promptius euacuatur. Quoad tempus: propinat aquam quamprimum: nam materia morbifica præsens vincit alia indicantia: vnde Alexander iubet, cholera celerrime esse curandam. Sæpe autem exhibetur aqua: quia perseverat materia præsens, vinceps alia indicantia. Quoad ubi: aqua vsurpatur per os: quia materia morbifica residet in ventriculo.

*Astringen-
tia.*

Astringentia medicamenta Exhibenda sunt & Applicanda. Rhasis exhibet trochiscos de olibano, cum aqua & niue, & rob seu succo granatorum: exhibetque semel, ac iterum. Componuntur hi trochisci, è mastiche, olibano, cubebis, cardamomo, gallia moschata, caryophyllis, & caphura: quæ omnia medicamenta sunt calida, excepta caphura. Rob autem granatorum, sic conficitur: Succus granatorum acetosorum in vas mittitur, in quo detinetur, donec pars crassior resideat: deinde purior portio accipitur, & decoquitur ad iulepi consistentiam: deinde in eum adhuc valentem imponuntur stipites mentha viridis, qui eo usque detinentur, donec succus refrigeretur. Basis in trochiscis est thus: in rob granatorum, basis est succus granatorum. Basis autem medicamenti compositi è trochiscis, rob granatorum, aqua, & niue: sunt trochisci: nam institutum est tuto astringere, & citra detrimentum calidi insiti. Cum igitur astringentia frigida, nimium cogant calidum innatum: ob id medicamentum recipit astringentia calida, ut est thus, & reliqua. Verum pro adiuuante, gratia astrictionis, additur caphura, quæ sui frigiditate occludit orificium ventriculi. Et ob id etiam additur rob de granatis, cum niue, seu aqua gelida. Quoniam igitur cholera est vitium calidum: ideo pastilli ex olibano, compositi è plurimis calidis, non exhibentur sinceri, sed cum

cum succo granatorum, id est, cum medicamento frigido & astringente. *Vsus* hic esse potest: *℞. trochisc. de oliv. ʒj. rob. de granatis ʒij. aqua gelida ʒβ. Misce.* Quoad modum: exhibeatur hoc medicamentum actu frigidum, quoniam validius astringit. Quoad tempus: exhibet Rhasis hoc medicamentum: dum apertio orificiorum vincit alia indicantia: nimirum dum vomitus, vel ventris deiectione vehementer fiunt, & symptomata terrefacientia superueniunt, His medicamentis astringentibus addere possumus ea, quæ in doctrina de vomitu proposuimus: & quæ proponemus in sermone de fluxu alui. Addit Rhases, si in cholera admodum insignis sit vacuatio: pedes & crura madefieri debere aqua gelida: & malo urgente. pedes, cruraque, in propositam aquam immitti debere: nam artubus refrigeratis, frigiditas ventriculo impertitur, vnde clauduntur orificia, & fluxus sistitur.

Quoad dietam: probatur aer, reficiens spiritus, qui in cholera dissipantur: quare, cum Rhasi, pulli sunt assandi, & ante nares scindendi. Quoad cibum: si ægritudo quiesuerit, & vacuatio non amplius perseveret: secundum Rhasin probantur alimenta leuia, id est, facilis coctionis: Si autem vacuatio perseveret in cholera, ut syncope vel immineat, vel etiam assit: si immineat, exhibet Rhasis panem, infusum in succo granatorum, cum vino: & monet idem auctor, ægros esse cogendos ad comedendum: & si euomant, iterum atque iterum dandos cibos: nam virtus vincit alia indicantia: & potissimum ad vinum confugiendum, si superueniat syncope. Hinc Alexander ait: si vomitus perseveret, probari mentha decoctum, quod stomacho gratum est, & naturaliter ad hunc affectum accommodatum, cui tamen vinum misceri debet: notat enim Alexander se multos nouisse, qui à sola vini portione, præter spem mortis periculum euaserint. Ad corpus facilius nutriendum probatur à Rhasi, balneum aquæ dulcis, per horam: nam facile attrahitur alimentum. Et si contingat conuulsionem oboriri: balneo aquæ dulcis addi debet aliquod pingue, ut est butyrum, oleum: inuat etiam misce balneum è solo oleo. Hæc de ventriculi malis.

De natura, usu, vitiisque precipuis Intestinatorum: & primum de Doloze intestinatorum Colico, atque Iliaco: simul etiam de Aluo prater naturam cohibita.

Transitio.



E ventriculi malis hucusque diximus. Quia autem intestina proxima sunt vetriculo, & ab eius orificio inferiori oriuntur: de intestinatorum malis iam agemus. Primum autem vitiorum numerum indagabimus: quod ut recte fieri queat, de intestinatorum

De natura & usu intestinatorum.

natura quaedam præmittemus. Intestina igitur sunt instrumentum, confectum è tribus tunicis, fibris transuersis & rectis, pinguetudine, & organis communibus. Quamuis autem intestinum, vnum sit corpus continuum: ita tamen formatum est, ut secundum partem, attrihentem ad ventriculum, sit magis, tenue: secundum partem qua sedem spectat, minus sit tenue. Vtrumque autem & tenue, & non tenue intestinum, in tria diuiditur. Intestinum igitur, quatenus est vnum corpus, existit causa communis vtilitatis: quatenus autem partes habet, discrimen aliquod est in usu & functionibus. Hoc ut intelligatur, sciendum: intestina conferre, causa ma-

Chyli distributionis, & plenior elaboratio, ope intestinatorum.

teriarum & alimentalis, & excrementitiarum. Materia alimentalis, est chylus; qui, dum in ventriculo est affecutus suam perfectionem, intestinis eget, ut ductibus, per quos, tanquam per viam, hepar petat. Si contingat, chylum secundum aliquam partem non esse adeptum perfectionem: intestina chylum imperfectum perficiunt. Hinc Galenus ca. 8. li. 4. de usu part. ait: intestina esse organa distributionis: & cap. 17. lib. 4. de usu part. in intestinis cibum mutari in chylum; & cap. 12. lib. 5. de usu part. ait, intestina esse coctionis organa, non tantum distributionis. Cum ergo intestinum gratia alimenti, sit organum distributionis, & coctionis: quantum attinet ad distributionem, sciendum cum Galeno cap. 17. lib. 4. de usu part. in intestinis chylum perfici, & fieri secum excretionem, ut bona fiat distributio. Conferunt autem intestina ad distributionem, è cap. 3. lib. 6. loc. affect. quatenus sunt ductus: nam ventriculus, chylum in ieiunum intestinum per duodenum transmittit, & iecur à ventriculo trahit. Vnde intestina non agunt, non attrahunt à ventriculo. Nec obstat, quod intestina

stina fibras rectas habent: nam hæc tantum sunt ad tutelam transuersarum. cap. 17. lib. 4. vsu part. Proinde chyli distributio est actio ratione ventriculi expellentis, & hepatis attrahentis: vsus autem pertinet ad intestina, non actio. Porro, secundum Auicennam, omnia intestina concurrunt ad digestionem, id est, ad chyli distributionem: recipiunt enim venas hepatis seu ramos mesaraicarum: plures quidem intestinum ieiunum, pauciores reliqua: proinde chyli distributio magis viget in tenuibus intestinis, quam in crassis, cap. 17. & 18. lib. 4. de vsu part. Quoad concoctionem: si perpendamus chyli imperfecti coctionem: cum intestinorum tunica interna similitudinem habeat cum interna ventriculi tunica: recte intestinum statuitur organum coctionis. cap. 12. lib. 5. de vsu part. At cum calor magis vigeat in tenuibus intestinis: ob id tenuia intestina potissimum alimentum coquunt. cap. 18. lib. 4. de vsu part. Hæc de materia alimentali. Excrementum, in quod agit intestinum, est excrementum mutationis cibi in chylum, & non est quodlibet excrementum: quoniam in ventriculo, præter chylum triplex generatur excrementum: sicuti etiam in venarum coctione triplex reperitur excrementum: nempe biliosum, melancholicum, & serosum. cap. 2. lib. 3. de symp. caus. Nec obstat, quod passim Galenus dicit, in qualibet coctione duplex tantum generari excrementum, nimirum tenue, & crassum. Excrementum enim bifariam sumitur. Primum, vt prorsus est inutile, & nullo modo in sanguinem verti potest: sicuti accipit Galenus cap. 1. lib. 6. de tuen. san. inquiens: excrementum vocari ciborum substantiam, quæ in nutrimentum non abiit: vt est excrementum serosum, seu humidum: & fecale, seu siccum. Deinde sumitur excrementum, vt secundum aliquam sui partem est vtile, vt in sanguinem mutari possit: sicut sumitur à Philosopho, cap. 18. lib. 1. de gener. animal. dum ait, pituitam esse vtile excrementum primi alimenti, id est, chyli, quod in sanguinem mutari potest: vnde & Gale. cap. 8. lib. de attrabile ait: pituitam quæ in ventriculo generatur è cibis pituitosis, in hepate mutari in sanguinem, scilicet secundum portionem alimentalem: nam portio excrementitia, depulsa ad intestina, cum nequeat acquirere formam fecis, alba cum fecibus egreditur. His sic positis: verum est, in qualibet coctione duo tantum esse excrementa, sed inutilia. Et propterea non est inconueniens tertium excrementum gene-

Excremen-
torum ex-
cretio, &
verminum
generatio
in intesti-
nis.

rari, quod in sanguinem possit mutari. Quo autem ad Galenum cap. 2. lib. 3. de caus. sym. dum proponit tria excrementa, quorum nullum in sanguinem mutari potest: id hoc modo accipiendum. In sanguificatione duplex tantum producit excrementum: biliosum scilicet & melancholicum: Galenus proponit etiam tertium, nimirum excrementum serosum, & prorsus inutile ad alendum: quod, licet in venis non generetur (est enim tenue chylicationis excrementum in ventriculo genitum) reperitur tamen in venis, & in generatione sanguinis: quia hoc excremento opus fuit, ut vehiculo chyli. Perpetuum igitur est, in omni coctione duo tantum inutilia generari excrementa. Cum ergo constet triplex excrementum in ventriculo generari, serosum, fecale, & pituitosum: quæ singula vna cum chylo in intestina mittuntur: iam explicandum est, quidnam circa hæc tria excrementa agant intestina. Quoad excrementum serosum: in hoc non agunt intestina, sed concurrunt, ut ductus: fit enim distributio serosi excrementi, ut sit portionis alimentalis vehiculum. Quoad excrementum fecale, & pituitosum: intestina bisariam concurrunt: nimirum quatenus agentia, & quatenus rationem habent loci agentis. Qua enim sunt agentia, respiciunt feces: quatenus sunt locus agentis, respiciunt vermes. Declaro magis. Quoad fecale excrementum: intestina concurrunt ad fecum expulsionem: expulsio est actio. Ideo Galenus cap. 17. lib. 4. v. part. ait, omne intestinum vnam speciem motus habere, hoc est, expulsionem: & propterea intestina obtinere villos transuersos: id quod etiam asseritur cap. 3. & 4. lib. 3. de symp. caus. Differentia tamen est inter intestina: nam tenuia magis respiciunt chyli distributionem: crassa magis expulsionem fecum: cap. 18. lib. 4. v. part. Hinc Philosophus ait, intestina esse conceptaculum excrementi siccis, c. penult. l. 3. de partib. anim. Nec ad detentionem fecum opus fuit fibris obliquis: quia spiræ, seu circumuolutiones sufficiunt. Et dum Galen. c. 7. lib. 3. fac. natural. inquit, in tenuibus intestinis stercus generari: significauit excrementum chylicationis crassum, separari à chylo, & à sero: quod tamen integre demum fit in crassis intestinis. Principaliter ergo productio fecum, attinet ad tenuia intestina, integra autem creatio ad crassa: quemadmodum etiam fateatur Hippoc. l. de carnibus. Quare constitutum sit intestinum esse organum expulsionis fecum, & hinc pituitosi excrementi.

menti. Quoad intestina vt vermes respiciunt: supponendum in præsentia, vermes generari in intestinis, è materia putrida, existente in intestinis: agens autem non esse calorem intestinale, sed calorem insitum materiæ putrescentis. Quare intestina concurrunt vt sedes, in qua è putrescente materia vermes generantur. E dictis constat, intestinum esse organum distributionis, concoctionis, expulsionis, & sedes generationis vermium.

Auicennas circa singula intestina digreditur, scribens: duodenum genitum esse ad expellendum feces à stomacho: non enim hæc expulsio de chylo accipi potest, qui expellitur à ventriculo, & attrahitur à lecínore. Ieiunum, ait, expellere infra, præsertim quia bilis è vesicula fellis prodiens, mouet expultricem, cum mordicatione. In ileo autem intestino dicit morari cibum: vbi chyli portio imperfecta perficiunt, & feces segregantur à chylo, & expelluntur. Cæcum statuit recipere à supra, & expellere infra, vt etiam sit secum locus, in quo detinentur: & addit, in ruptura inguinis facilius descendere, quia non admodum coniunctum est cum mesenterio. In Colo ait, esse aggregationem fecum, expressionem, & gradationem ad expellendas feces, post complementum residui è cibo. Denique ad rectum, intestinum refert expulsionem fecum ad extra.

His ita explicatis: constat, intestinum esse instrumentum animæ, ratione, nerui: & instrumentum naturæ, ratione reliquarum partium. Quatenus igitur intestinum est animæ instrumentum: est obnoxium DOLORI. Quatenus autem est organum naturæ: cum intestinum sit destinatum cõctioni chyli, non perfecte elaborati in ventriculo: & distributioni chyli: & expulsionì, tum fecalis excrementi, tum pituitosi: quatenus intestinum est organum destinatum cõctioni, & expulsionì: est prompta sedes VERMIUM: quoniam dum chylus non perficitur, dum excrementa non expelluntur, putrescunt, indeque vermes oriuntur: tandem, quatenus intestinum accommodatum est distributioni chyli, & excretioni excrementorum, facile corripitur ALVI FLUXV, & STIPTICITATE. Cum autem stipticitas cruciet patientes in dolore præsertim iliaco, & colico: ob id, breuitatis causa, de hac stipticitate in sermone de dolore intestinorum agemus. Propterea concludendum, intestinorum vitia discutienda esse, Dolorem, Vermes, Fluxum alui.

*Vfus intesti-
norum
secundum
Auicennam.*

*Vitia intesti-
norum
præcipua.*

De dolore Intestinorum.

Nomen.

Generatio.



Ex dolore hic intelligimus omnem intestinorum dolorem. Generatur, si qualitas tangibilis ea violentia agat in intestina, ut fiat solutio continui: quæ solutio continui in ratione motus violenti, & proinde obiecti communis improportionati, ea vi agit in intestina, quatenus sunt corpora nervosa, ut corrupta fiat tum affectio, tum receptio: quæ in instanti impertiuntur cerebro, & sensui interno, à quo sensu interno iudicatur iniucundum: unde sensus interni actio est tristis: & hinc ad differentiam voluptatis male afficitur vis appetens, hincque fit dolor, id est, affectio voluptati contraria. Dolor igitur intestinorum est sensatio corrupta intestinorum, dependens à solutione unitatis. Forma est sensatio corrupta, quæ, si capiat, ut eius subiectum est intestinum: potius est affectio, quàm actio: actio enim cerebrum attinet, quatenus iudicat, ut in doctrina de dolore capitis docuimus. Hæc autem affectio, ad intestina attinens, est corrupta, quia fit cum violentia. Subiectum huius mali est intestinum: quo hic dolor distinguitur à dolore aliarum partium. Intestinum autem est subiectum doloris, quoniam nervos recipit, à sexto pari cerebri: & proinde omne intestinum dolori est obnoxium: potissimum tamen Colum, eo quod longum est & anfractuosum, & cum Alexandro crassum ac densum: unde causa dolorifica motam in eo trahit, ac continuum soluit.

Causa eff-
fic.

Ratione efficientis: diximus dependere solutione unitatis, quia hic dolor contrahitur ad sensum tactus, cum in omni sensu dolor fiat, citra solutionem unitatis, tactu excepto. Ex hinc etiam distinguitur hic dolor à gravitate: quæ est sensatio corrupta, prodiens materia ponderosa, sed citra unitatis

Subdivisio.

solutionem. Porro in causa unitatem solvente, consideratur species, vitium, causæ generantes specierum, & causæ easdem detinentes. Quoad speciem: causa est Interna vel Externa. Interna est materia, vitæ vel Particeps, vel Experts. Particeps, ut vermis: unde Avicennas dicit, colicum dolorem fieri dum pluri vermes congregantur. Si causa sit vitæ experts, est Vapor, vel Minera. Vapor præsertim est Pituitosus, licet etiam Biliosus esse possit. Minera est vel Alimentalis, vel Excrementitia. Alimentalis, est Sanguis. Excrementitia spectat ad coctionem Primam, vel Secundam, vel Tertiam.

1. Species
causa.

Ad primam spectat materia vel Pituitosa, vel Fecalis. Ad secundam, id est, iecinoris coctionem spectat materia vel Biliofa, vel Melancholica. Ad tertiam spectat, Sanies, Calculus. Causa externa necessario occurrens, est Cibus vel Potus. Non necessario occurrens, medicamenta, venena, ferrum, lapis, ligna, & similia: quæ soluendo continuum, vel abradunt, vel frangunt, vel contundunt, vel incidunt: quæ potissimum referenda sunt ad Assumenda, & Foris incidentia.

Vitium speciei multiplex esse potest: quælibet tamen causa concurret soluendo continuum, vel Copia, vel Qualitate: verbi gratia, lapis, vt tot genere præter naturam, non soluit continuum, sed ratione duritiei, seu ratione qualitatis. Ita virulentia venerea, materia putrida, soluit continuum, ratione qualitatis, vt calida, vt acris. Sed explicanda sunt singula vitia, vt pote à quibus vtilis indicationes sumuntur: Breviter ergo digrediendum circa propositas causas. Et primum supponendum: commune esse cuilibet causæ, quæcum attinet ad *vbi*, materiã præter naturam quiescere in intestinis, siquidem actio sit per contractum. Deinde, quoad motum, seu vitium in motu, sciendum, si causæ gignantur in intestinis, vitium quidem esse secundum motum, sed in ratione causæ adiuvantis. Et ob id Galen. c. 5. l. 2. loc. aff. dicit, materiam quæ mouetur, dolorem parere vehemētiorem, quàm quiescentem. At principaliter concurret materia morbifica, vt agit vel Copia, vel Qualitate. Quod si causæ non gignantur in intestinis, annectitur etiam vitium secundum motum, quatenus materia mouetur, vel Attracta, vel Transmissa. His suppositis: quoad vermes: vitium est in substantia, cum vermes sint toto genere præter naturam. Spectat etiam ad quantitatem: nam cum Auicenna plures congregantur. Pertinet ad qualitatem secundam: dum vermes mordent, instar materiæ acutæ, quæ soluit continuum. Quoad vaporem: vitium est in substantia, dum vapores prodeunt è putri materia. In quantitate: dum vapores sunt copiosi. In qualitate, dum sunt calidi, frigidi, vel crassi: vnde dolor colicus præsertim fit à vapore copioso, frigido, crasso. Quoad mineram: primo sciendum, commune esse vitium secundum substantiã materiæ & alimentali, & excrementitiæ, dum hæ materiæ putrescunt: vnde Auicennas ait, oboriri dolores colicos, iliacos, per ægritudines pestilentes, qui proinde contagiosi sunt. Cæterum si seorsum perpendatur minera: &

2. *Vitium speciei.*
Commune quædam.

Lumbrici.

Vapor.

Minera in genere.

primum si fuerit alimentalis: si sanguis sanguinis vitium est toto genere præter naturam, dum venas egreditur, & decubitat in intestina, & concrefcit: vnde postea copia & frigiditate soluit continuum. Sanguis etiã cõcurrit, quatenus inflammationis intestinorum est auctor. Quare, vt putrescit, est vitium secundum formam: est autem causa doloris, quatenus copia & caliditate soluit continuum. Quoad materias excrementitias, si sint primæ coctionis, vt materia pituitosa, & fecalis: pituitosa esse potest putrida, copiosa, frigida, crassa, lenta, veluti pituita acida, & vitrea: potest esse calida, vt salia pituita. Materia autem fecalis peccat secundum substantiam, si putrescat: ac præsertim peccat copia & duritie: quo fit, vt dolor potissimum fiat è fecibus copiosis, siccis & duris, licet etiã interdum ex acrimonia fecum fiat. Quoad excrementa secundæ coctionis: cum sit materia biliola & melancholica: Bilis peccare potest, vt putrida, copiosa, calidior. Melancholia autem peccat frigiditate: nisi vel putrescat, vel exuratur: tunc enim caliditate soluit continuum. Quoad excrementa tertiæ coctionis: cum sit hoc excrementum vel sanies, vel calculus: Saniei vitia attinet ad substantiam: perire etiã possunt ad copiam: at necessario sanies vi caloris soluit continuum. Calculus toto genere est præter naturam: soluit autem continuum copia, & præsertim duritie. Ex his facile intelliguntur vitia causæ externæ: quorum tamen vti-
tiorum cognitione non valde est opus, cum à causa externa non sumatur indicatio.

3. *Causæ ge-
nerantes.*

Quoad causas generantes propositas species: Vermis generatur è materia putrescente in intestinis, à calido initio materiæ putrescentis. Vapor generatur è minera, potissimũ pituitosa, è calido intestinorum imbecillo: vnde minera mutatur in vaporem, quem calor imbecillis dissolvere non potest. Sanguis est causa doloris, dum vel grumescit, vel inflammationem excitat: concrefcit autem quoniam deest causa præseruans sanguinem à concretionem, nimirum, vena quæ concurret vt locus conseruans locatum, & spiritus vitalis: quæ duo desiderantur, dum sanguis venas egreditur, & in intestinis colligitur. Dum autem sanguis inflammationis est auctor: cum peccet copia & caliditate: copiosi sanguinis causa attinet ad intestina, vt præter naturam vel suscipiunt, vel attrahunt. Calidioris autem sanguinis causa, est caliditas exsistens in parte inflammata. Pituita generatur è cibis

pituito

pituitosis, à ventriculi calore debili. Feces generantur è ciborum portione terrestri, à calore ventriculi: & segregatur à portione chyli, & feri, in intestinis: vnde quo copiosior est cibi portio terrestri, eo etiam feces copiosiores generantur: & quo diutius detinentur feces, eo duriores euadunt. Bilis & melancholia generantur è portione excrementitia, non cibi, sed chyli, à calore iecoris: vnde portio tenuior mutatur in bilem, crassior in melancholiam. Sanies generatur è sanguine semimalo: à calore tum naturali, tum præter naturam. Calculus rarus generatur in intestinis: vnde id Galenus *calculi* nec vidit, nec audiuit, cap. 2. lib. 6. loc. affect. Ego tamen testor me vidisse calculum ad magnitudinem oui gallinacei, excreta à patiente, obnoxio dolori colico, & qui solum aquam potauerat: fuitque hic Excellētissimus Frisimelica, qui aliquando grauissime afflictus, excreuit hunc calculum. Generatur autem calculus è crassa & viscida materia, à calore vel intensiori, & celeriter agente, vel remissiori, & longiori tempore operante. Cum igitur in intestinis vigere possit materia, quæ diutius detineatur: ea in hac mora verti potest in lapidem: præsertim, si intestinorum calor intendatur, vel obstructionis, vel inflammationis vi, vel denique medicamenti calidioris. Hæc de causis generantibus.

Quoad causas detinentes: hæc locum habent in dolore Colico, & Iliaco. In colico enim dolore difficilis fecum est excretio. In iliaco autem dolore, secundum Galenum, com. aph. 4.4. sect. 6. nihil exit inferius, neque ex acerrimo clystere: vnde etiam aph. 10. sect. 7. ait, in ileo nihil ad inferiora descendere: hoc autem fit quia expultrix non potest se exonerare, propter angustiam partium infernarum: vnde cogitur natura violenter ad superiora materias extrudere. Et ob id è c. 2. li. 3. de caus. sym. dolor iliacus fit è priuatione expultricis. Cum ergo materia detineatur propter angustiam: hæc esse potest Obstructio, Constipatio, Compressio, & Subfidentia. Excipitur autem illa angustia, quam vocant coalescentiam: nam tanta est intestinorum amplitudo, vt, dum in ulcere fit agglutinatio, non possit ea fieri coalescentia, cuius materia intus detineatur. Obstructio igitur fit à *Obstructio.* crasso flatu: fieri etiam potest à quolibet humore, à sanie copiosa, & proinde potius à sanie abscessus, quam à sanie vlcis: verum promptius fit obstructio à copioso flatu & crasso tum pituita, tum malacholia: vix autem fit à bile, vel grumoso sanguine

sanguine, vel sanie. Sicut enim flatus, & materia pituitosa ac melancholica, sunt materiæ quæ paullatim colligi possunt, & ea copiacumulari, vt abstruant: ita sanguis extra venas egressus, bilis, sanies sunt materiæ adeo infensæ, vt nequaquam ea copia aceruentur, vt coli obstructionem faciant: nisi forte, quod raro fit, hæ materiæ confertim, non paullatim vnica vice ad intestina confluant. Quare notandum, in dolore intestinorum interdum eandem materiam, tum angustiam, tum dolorem committere: interdum vero aliam materiam dolorem parere, aliam obstructionem. Dum enim copiosus est flatus, soluit continuum, & obstruit: dum autem flatus non est copiosus, dolorem efficit flatus oclusus: quod autem obstruit, non est flatus, sed est pituita, vel quid aliud à flatu. *Constipatio.* Constipatio fit ex inflammatione, è vermibus, è calculo, è fecibus. Fit ex inflammatione non qualibet, sed ea quæ occupat propriam intestinorum substantiam, & vsque adeo internam occupat sedem, vt occludatur intestinum: quare insignis est inflammatio, cuius causæ propositæ sunt in ventriculi inflammatione. E vermibus fit constipatio, dum cum Aui-cenna plures congregantur: de causis vermium suo loco. E calculo oritur constipatio, si magnus fuerit. Oritur etiam è fecibus copiosis & aridis: vnde alius constipatur. *Hic autem commode proponemus causas alium constipantes.* Feces secundum naturam excernuntur, dum ex intestinis tempestiue expelluntur ab expultrice. Alius igitur astricta est, dum feces præter naturam detinentur in intestinis. Et hæc detentio sequitur læsam expulsionem, quoniam expultrix frustratur. Frustratur autem, vel quia ad expellendum non impellitur: vel quamuis impellatur, expellere tamen nequit. Quoad primū, cum expultrix irritetur à sensu tactus: non irritatur, dum vitium est in tactu. Vnde tactus læditur, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læditur facultas sentiens: vel Communis, vel Determinata. Communis: ob morbos cerebri, vel ductuum, id est, neruorum. Determinata: præsertim secundum receptionem, dum intestinorum nervi densitate afficiuntur: siue densitas fiat à materia, siue à frigidityte, cuius auctor est medicamentum stupefaciens. Tactus autem receptio læditur ob errorem externum: dum bilis nō fluit à iecinore ad intestina, quemadmodū cōtingere solet in icteritia citrina: dum etiam homines vtuntur cibo pauco, siquidem generantur feces exiguæ, non irritantes. Sin

autem

autem expultrix intestinorum irritetur, & tamen expellere nequeat: tunc expulsio lēditur, vel Læsa facultate, vel ob Erro-
rē externū. Lēditur facultas, & primo labefactatur, ob vitiosas
intestinorū intemperātias: quæ octo esse possunt, cum Aetio,
quatuor simplices, totidem cōpositæ, quas ad eam magnitu-
dinem perducioportet, vt expultrix imbecilla reddatur. Im-
peditur autem facultas ob intestinorū angustiam, tum eam,
de qua diximus, tum de qua dicemus: nam verbi gratia, sicut
obstructio flatus detinet, ita etiam potest detinere feces, simi-
liter compressio, sicut flatus detinet, ita etiam feces potest
detinere. Hinc Aëtius dicit, feces cohiberi, propter inflamma-
tionem partium, recto intestino vicinarum: veluti propter
inflammationem vesicæ, & vteri. Si autē expultrix non possit
expellere ob errorem externū: pēdet à causā Interna, vel Ex-
terna. Interna sunt feces, quæ vel Sinceræ sunt, vel Mixtæ cū
alia materia. Si capiantur feces vt sinceræ: vitium contrahunt
penes copiam, qualitatem, & motum. Penes copiam: si iusto
sint copiosiores: procreantur ē cibis copiosioribus. Vitium
est in qualitate: dum feces siccæ & aridæ euadunt: id quod
fit ob causas Internas vel Externas. Internæ causæ sunt,
habitus totius corporis rarus, ē calida intemperie: vnde
humiditates totum petunt, & feces remanent siccæ: ad hæc
vis immoderata attractricis membrorum, veluti euenire
solet in conualescentibus, in quibus plurima sit distributio
humiditatis in corpus: febris etiam ea est vis, vt humiditates
absumat: adhuc coniungitur hepatis, mesaraicarum, & vicina-
rum partium immoderata caliditas, vi cuius fecalis humidi-
tas euocatur: præterea huius ordinis est intestinorum sic-
citas, siccans feces. Externæ causæ debent sumi, ab Assu-
mendis, Foris incidentibus, Faciendis, & Vacuandis. Ab
Assumendis: dum feces siccantur à medicamentis siccis exhi-
bitis, à cibis solidis, siccantibus, asis: à potu exiguo, & sic-
cante. Foris incidentia sunt, medicamenta sicca applicita, aer
calidus, vt æstiuus & fornacis. Facienda sunt, immodera-
tus motus corporis vel animi. Ea quæ vacuantur, sunt copio-
sæ vacationes per lotium, per sudorem: vi enim horum ex-
siccantur feces. Tandem vitium in fecibus penes motum
est, dum præter naturam ascendunt: quod fit, dum homo
ad excreandum feces impellitur, diutius tamen excre-
tionem cohibet, & ob id, dum infra essent depellendæ,
rursus præter naturam mouentur: vnde alius fit stiptica,
Mixtæ

Mistæ feces, vel cum Pituita, vel cum flatu sunt mistæ. Si cum pituita: sui lentore sunt in causa, vt non expellantur: causæ harum fecum, sunt medicamenta viscida, cibi lenti, vt est caseus. Si cum flatu sint mistæ, vi flatus suspenduntur feces, vnde deorsum expelli nequeunt: causa autem sunt cibi flatulenti, vt legumina. Hæc de errore externo, qui pendet à causa interna. Si error externus (ob quem facultas expultrix non potest feces expellere) capiatur à causa externa: spectare potest ad Assumenda vel Admouenda. Assumenda sunt medicamenta astringentia, exhibiti cibi astringentes, & præsertim cum Aëtio, assumpti ante dulcia & pinguia. Admouenda sunt, veluti dum astringentia abdomini applicantur. Et hæc de constipatione. Compressio fit è vicinorum membrorum tumore, vel inflammatorio, vel non inflammatorio, vi cuius comprimuntur intestina: veluti est tumor, vel partis sinæ iecoris, vel lienis, renum, vesicæ, vteri. Vnde noãt dum, vicinas partes, tumore affectas, bifariam concurrere: primo, quatenus comprimendo sunt in causa detentionis fecum, à quibus fit constipatio: & de his supra locuti sumus. Deinde quatenus tumor comprimens est causa detentionis materiz diuersæ à fecibus, à qua materia soluitur vnitas: & hoc modo in præsentia intelligimus. Subsidentia oritur, dum intestina naturalem mutant situm. Fit autem ob flatus intestina contorquentes, vel quia ligamenta disrumpuntur, vel peritonæum soluitur: vnde intestina modo in scrotum, modo inter peritonæum & abdomen, & præsertim in inguina dilabuntur. Ligamentorum autem & peritonæi ruptio fit, vel è flatu imperente, vel casu ab alio in ventrem, vel alio ictu, vel vulnere, & similibus, quorum vi propositæ partes dissoluntur, vnde intestina subidēt, & materiz detinentur. Hæc de causis cuiuslibet doloris intestinorum.

Subsidentia.

Num in crassis ac senibus intestinis atrociores sint dolores.

Sed priusquam ad differentias accedamus, loca quædam difficilia explicabimus. Galen. igitur c. 3. lib. 2. loc. aff. ait, vehementiores dolores esse in tenuibus intestinis. Et ibidem tamen. vt etiam c. 2. lib. 3. loc. aff. scribit, vehementiorem esse dolorem in crassis intestinis, ob crassam substantiam: non ita vehementem in tenuibus, propter raram substantiam: vel etiam in crassis intestinis leuiorem esse dolorem, si causa sit leuior. Responsio. Dolor intestinorum penes causam efficientem bifariam sumi potest: primo, vt sit à materia frigida & crassa, veluti à pituita, vel à flatu crasso: deinde

vt sit

ut sit ab alijs, causis veluti ab inflammatione, ab aridis fecibus. Si primo modo dolor accipiat, statuendum dolores colicos, & proinde dolores crassorum intestinorum vehementiores esse doloribus iliatis: unde Galen. ca. 5. l. 2. loc. aff. proponit illos dolores colicos, quos præcedit cruditas, & flatus: & subdit, ex huiusmodi doloribus, scilicet prodeuntibus à pituita & flatu, vehementiores fieri in crassis intestinis, mitiores in tenuibus. Hinc Galenus c. 2. l. 6. loc. affect. ait, probabile esse frigidos, crassos, & viscidos humores, aut flatus, dolores parere vehementissimos in crassis intestinis, ob substantiam crassam & densam: secus autem esse statuendum de tenuibus intestinis, quorum tunicæ sunt raræ, unde non tam diu causas morificas detinent. Quod si dolores fiant ab inflammatione, ab aridis fecibus: statuendum, vehementissimos dolores oboriri in tenuibus intestinis: quoniam doloris causa, siue sit inflammatio, siue stercus, diu moram trahere potest, etiam in tenuibus intestinis: quæ cum sint exquisitoris sensus, quam crassa intestina, hinc acerbius cruciantur. Et ob id Galen. c. 2. l. 6. loc. aff. cum proposuisset dolores prodeuntes à flatibus & pituita: subdit, interdum alios esse dolores, id est, prodeuntes ab alijs causis efficientibus, qui vehementissimi sunt, & in sublimioribus intestinis eueniunt, ut qui ab inflammatione, vel aridis fecibus producuntur. Secundo notandum, quomodo Auiic. statuat, dolores iliaticos iisdem produci causis, à quibus colici? Id autem hoc modo intelligendum. Cum sermo fiat de dolore, quatenus est vel intensior, vel remissior, in ileo, & colo: quoad intensiorem dolorem: si fiat à pituita & flatu, attinet ad crassa intestina: si ab inflammatione, vel à fecibus, pertinet ad ileon. Quoad remissiorem dolorem: si fiat ab inflammatione, spectat ad crassa intestina: si à crassis humoribus, ad ileon. Tertio notandum, Hippocratem dixisse aph. 44. sect. 6. Quibus est stillicidio vrinæ ileos superuenierit, in septem diebus pereunt: nisi febre superueniente satis vrina fluxerit. Galenus in com. ait, hanc Hippocratis sententiam aduersari & experientiz, & rationi. Experientiz, dum testatur Galenus, se plerosque vidisse, qui mingere non poterant, nec paucos mortuos esse, quibus supra modum extensa erat vesica: nullum tamen ileosum euasisse. Aduersatur autem rationi, nam cum in tumore vteri in prægnante non producat, multo minus excitabitur.

*Quomodo
colica &
iliaca ab
iisdem cau-
sis orian-
tur.*

*Explicatio
aphorismi
difficilis,
de ileo strâ-
guria su-
perueniente.*

ob tumorem vesicæ: quoniam vesica suo tumore rectum tantum intestinum potest comprimere: vteri autem tumor potest etiam comprimere superna intestina, cum ad præcordia extendatur. Sed ego sentio ita intelligendum esse Hippoc. Per vrinæ stillicidium non intelligitur stillicidium prodiens ab inflammatione vesicæ, sed à pituita frigida: uñ auxilio est febris, quæ sane non iuuat ratione inflammationis, sed ratione pituitæ. Per iliacum autem intelligit Hipp. ileon, cuius causa est pituita. His positis, addimus, non esse impossibile, ut quis primum patiatur vrinæ stillicidium, mox dolorẽ iliacum: quoniam euenire potest, ut aliquod sit indiuiduũ adeo refertum pituita, ut repletio fiat, & secundũ vesicã, & secundum intestina. Vnde non dicit Hippocrates, stillicidio vrinæ semper succedere ileon: sed, *quibus, &c.* insinuans hæc vitia non corripere quoscumque, sed aliquos tantum, id est, pituita refertos secundum vesicam & intestina: quoniam ob repletionem vesicæ fit stillicidium, & comprimitur aliquantisper rectum intestinum: ob repletionem autem intestinorum, pituita sui copia replet: sui frigiditate sensum reddit obtusum: sui visciditate non permittit feces descendere. Vnde ileos non fit è tumore, sed è pituita. Et homo perit, nisi beneficio febris vacuetur pituita per lorium: cum enim homo non possit sustinere & stillicidium, & ileon: dum immunis euadit à stillicidio, sperandum deinde est, ileum posse superari.

Differentiæ.

1.

Differentiæ quæ à forma sumuntur, respiciunt vel subiectum, vel causam efficientem, vel vtrumque. Differentiæ respiciens subiectum, est dolor Pungitiuus, hic enim proprius est membranarum: intestinum autem est corpus membranolum. Differentiæ quæ respiciunt causam efficientem, respiciunt vel Speciem, vel Vitium speciei. Si Speciem, cum species sit Vapor, aut Minera: si vapor, est dolor expers gravitatis: si minera: est dolor particeps gravitatis. Si autem perpendamus vitium, hoc est vel Simplex, vel Compositum. Si vitium est simplex: & primum, si in quantitate: dolor est extensiuus, à materia copiosa: in quo dolore intestina secundum profunditatem extenduntur, ad differentiam doloris sensui, neruorum proprii, in quo est sensus secundum longitudinem, non secundum profunditatem. Si autem vitium sit in qualitate, cum sit qualitas, vel frigiditas, vel siccitas (excipitur enim humiditas, à qua non fit dolor) si vitium in caliditate sit positum: dolor prodit mordacitius, cū sensu caliditatis. Si vitium frigi

fit frigiditas: dolor est mordicativus, cum sensu frigiditatis. Fit autem hic dolor, dum intestinorum caliditas resistit causæ refrigeranti, nam secus non fieret dolor, sed potius tolleretur sensus. Si vitium sit siccitas: fit dolor exasperativus. Si deinde vitium attineat ad motum: dolor fit turgens, seu errans. Si ad quietem: erit dolor stabilis. Si causæ vitium sit mistum: verbi gratia si spectet ad qualitatem, veluti est durities, & ad motum: dolor fit contusivus, cuiusmodi est dolor qui fit à calculo, qui cum impetu movetur. Si autem vitium pertineat ad qualitatem simul & quietem: dolor fit compressivus. Si deinde dolor respiciat subiectum, atque efficientis vitium prout dolor modo perforativus, modo acualis. Nam dolor perforativus attinet ad membrum membraneum & crassum, quemadmodum est colon, in quod agit materia crassa, & impetu agens. Acualis dolor idem subiectum postulat: at differt ratione efficientis, quia causa efficiens est minus crassa, & minori cum impetu agens. Notandum vero hanc actionem ut vel maiori, vel minori cum impetu efficitur, attinere ad materię vitium, quandoque in qualitate, quandoque in motu. In qualitate, ut materia est magis vel minus frigida. Vnde cum materia admodum frigida sit vitrea, sui crassitie & visciditate quiescens: doloris perforativi auctor esse potest: veluti, dum pituita ea est, qualis à Galeno locis propositis exprimitur, quo dolore etiam Galenus fuit correptus. Quandoque etiam vitium attinet ad motum: veluti dum pituita mutatur in flatum, qui si intense moveatur, dolorem parit perforativum, si remissius moveatur, acualet. Quoad differentias, quæ capiuntur ratione subiecti: dolor afficit intestina vel Omnia, vel Aliqua, & hæc vel Superna, vel Inferna. Differentiæ ratione causæ efficientis, sumuntur à Specie, à Vitio, à Causa generante, à Causa detinente, seu colligente. Quoad speciem: causa est Interna, vel Externa. Quoad vitium, hoc est, Principale, vel Adiuuans. Principale, est in Quanto, vel Quali. Adiuuans in Motu, vel Quiete. Causa generans, est Morbus, vel Error externus. Causa colligens, cum sit Angustia, pendet à causa residente vel In intestinis, vel Extra intestina. Si intra: est Obstructio, vel Constipatio. Si extra: est Compressio, vel Subsidentia.

Malum hoc in genere indicatur è dolore abdominis, secundum regionem intestinorum. Dolor autem cum Avic. semper est pungitivus. Verum cum intestina sedem habeant

*Diagnosís
colici, &
nephritici
doloris.*

*Communia
signa v-
trique do-
lari,*

proximam renibus, & præsertim colon: ideo tradenda sunt signa, distinguentia dolorē colicum à renali. Etenim, quāvis cum Gal.c.2.l.6.loc.aff. nil obſit, etiā ſi inter initia ignoremus, an dolor ſit inteſtinalis, vel renalis: propterea quod in vtroq; dolore anodynus occurrimus: attamen progrediente malo expedit ſcire, an dolor ſit inteſtinalis, vel renalis: quoniam diuerſis occurrendum remediis. Signa igitur è c.2.& 3. lib.6.loc.aff. capiuntur & à communibus vtrique dolori, & à propriis. Communia ſunt, dolor abdominis, vomitus, nauſea, alui ſtipatio, dolor dorſi, crurum tremor, & impotentia ſte-
tendi corpus. Quoad dolorem pertinentem ad abdomen, affectus inteſtiniſ dolor eſt pungitiuus: leſis renibus, dolor eſt grauatiuus: quoniam tactus viget in inteſtiniſ ſecundū propriam membranā, in renibus autē ſecundum membranam ambientem: vnde, ſi inteſtina dolore afficiantur, intenſior eſt dolor: remiſſior, ſi renes. Indicatur etiā dolor inteſtinorū è dolore amplum ſpatium occupante: contra, renaliſ indicatur è dolore, locum anguſtum cruciante: ratio eſt, quia renes occupant anguſtam ſedem, inteſtina amplam. Adhæc dolor colicus, quamvis incipiat modo à dextris, modo à ſiniſtris, quemadmodum renaliſ: tamen colicus dolor dum incipit à dextra parte, affligit regionem infra renem dextrum, atque per inferiorem ventriculi ſedem, in dextra parte aſcendit in ſedem, cui ſiniſter renſ ſubiacet: vnde cum Galeno dolor colicus interdum locum renibus eminentiorem affligit. Si autem colicus dolor à læuo latere incipiat: progreditur verſus abdomen & peſtinem: quo fit, vt partes magis anteriores, quam poſteriores petat. Contra renaliſ, ſi accidat vt lapis deſcendat: primum partes detinet ſupernas, mox infernas inuadit, & circa poſteriores potius partes, quam anteriores vergit. Deinde diſtinguuntur hi dolores: quoniam dolor colicus repente inuadit, quia breui tempore anguſtatur inteſtinum: renaliſ autem dolor non repente, ſed longo inuadit tempore, nam lapis non cito creatur: Et ſi aliquando renaliſ dolor cito intendatur ac repente: hoc non euenit inter initia, ſed poſt lapidis generationem, dum moueri incipit. Præterea renaliſ dolor inanitionis tempore magis cruciat: colicus miſceſcit, ciboque aſſumpto intenditur: ratio eſt, quia repletio-
nis tempore, ventriculus repletus, colon comprimit, dum autem ventriculus eſt vacuus, compreſſio deſinit: in dolore autem renali, cibus in ventriculo exiſtens non comprimit
renes,

renes, sicuti quando descendit, & ab assumpto cibo dolor renalis mitescit, quoniam cibi portio tenuior & aquosior, dum petit renes, vim obrinet anodynā. Indicatur etiam dolor colicus ē dolore qui potest esse errans: at renalis indicatur ē permanente dolore. Atque dum obseruatur motus: percipitur secundum vterum progressum, dum per hæc vasa lapidis in vesicam prolabitur. Quoad reliqua cōmunia symptōmata: sufficiat in iis vehementiam & tempus perpendere. Quoad vehementiam: in dolore colico, vehementiora sunt, vomitus, nausea, alui stipatio: contra in renali dolore, vehementiora sunt dorsi & crurum tremor, & flectendi corporis impotentia: ratio est, quia intestina magis consentiunt cum ventriculo, renes autem cum dorso & cruribus. Quoad tempus: in colico dolore quæ magis affligunt, etiam citius inuadunt: atq; ad eundem modum in dolore renali. Et propterea in dolore colico citius oritur vomitus, quam in renali dolore: & tardius in dolore colico inuadit dolor dorsi: contra in dolore renali, citius oritur dolor dorsi, quam vomitus. Tandem etiam distinguuntur propriis indiciis. Dolor renalis indicatur excretionē arenularum, vel calculi ē lotio mutato, ē stupore femoris: quæ signa si non absint, indicatur dolor colicus. His addi potest alteratio, quam pariunt iuuantia, vel lædētia: nam si conquiescat patiens per vomitum, vel deiectionem alui: dolor colicus indicatur: Sin quiescat patiens per mictionem calculi, arenularū, vel crassi lotij: indicatur dolor renalis. His igitur signis renalis dolor à colico distinguitur.

Differentias à forma patefacit æger, dicens cruciari se dolore extensiuo vel alio. Quoad differentias à subiecto: Si omnia intestina afficiantur: dolor affligit totum abdomen: contra, si non omnia: & quidem, si malum sit in supernis intestinis, ē cap. 2. lib. 6. loc. aff. magis superatur à potionibus, quam à clysteribus: contra si sit in infernis. Cæterum, cum dolor attinens ad superna, præsertim sit iliacus, ad inferna, colicus: quoad Iliacum dolorem: ē cap. 2. lib. 6. loc. affect. & comm. 6. sect. 2. lib. 3. epid. indicatur ē dolore aliquantisper ad præcordia ascendente: & cum Aëtio, ē difficili expiratione, quæ interdum foetet: non quod vapores putridi prodeunt à pulmone: sed quoniam putridi vapores prodeuntes à ventriculo, miscentur cum aëre qui expiratur. Indicatur etiam hic dolor ē nausea: quia vapor hæret in tunicis ventriculi. Item ē vomitu, ita vt ægri neque potum continere queant:

Propria signa utriusque doloris.

Signa differ. à forma & subiecto.

Iliaci doloris signa.

nam secundum Aetium, dum malum intenditur, omnia sursum feruntur, ideoque fit vomitus, non tantum cibi, potus, bilis, pituitæ, sed interdum etiam stercoreis: qua etiam de causa ructus sunt foetidi. Hic autem notandum, omnia indicia ad foetorem attinentia, esse indicia ilei insalubris: deinde materiam foetentem esse posse tum vaporem, tum mineram. Indicatur etiam dolor iliacus ex integra alui stipatione: unde Galenus com. aph. 44. sect. 6. & com. aph. 10. sect. 7. ait, hoc competere omni & soli exquisito dolori iliaco, ad differentiam doloris colici, & iliaci non exquisiti: nam in dolore colico exquisito sufficit difficilis excrecio: in iliaco exquisito, necessaria est integra stipatio. Proinde Avicenna respiciens ad dolorem iliacum exquisitum: dicit in ileo podicem ita astringi, ut neque specilli extremum suscipere possit: quæ integra stipatio locum non habet in dolore iliaco non exquisito. Sed oritur dubium: nam Hippoc. comp. 6. sect. 1. lib. 3. epid. proponit, mulierem iliaco dolore affectam, in qua deiectiones erant crudæ & tenues: & tamen dolor iliacus erat exitialis & exquisitus. Sciendum ergo Hippoc. proponere dolorem iliacum, prodeuntem ex inflammatione: unde quemadmodum in inflammatione oculorum effluit materia tenuis: ita etiam in inflammatione intestinorum: unde non descendunt feces, non descendunt intestinorum excrementa, sed descendit inflammationis materia tenuis. Cæterum, cum dolor iliacus occupet vel totum intestinum, vel partem: si totum intestinum detineatur, indicatur è dolore cruciante circa vtrumque ileum, præterea circa medium ventrem, circa umbilicum, ut omnes hæ partes doleant: Si autem dolor cruciet intestinum ileum secundum partem: si intestinum afficiatur secundum mediam regionem, indicatur è dolore in ileo sinistro: si secundum principium, indicatur è dolore circa iecur: si secundum finem, indicatur è dolore circa ilium dextrum, propter humiliorem sedem renis dextri. Quoad dolorem Colicum: cum colon afficiatur modo totum, modo secundum partem: si totum affligatur, indicatur è dolore cruciante circa vtrumq; ilium, & infra umbilicum, & supra versus ventriculi fundum: Si afficiatur secundum partem, & quidem mediam, indicatur è dolore in ilio sinistro: si secundum principium, in ilio dextro: si secundum finem, indicatur è dolore non ascendente ad umbilicum, sed prope.

*Quomodo
cruda ac
tenuis de-
iectiones in
ileo.*

*Quenam
intestini
pars affi-
gitur.*

*Colici dolo-
ris signa.*

Sequun

Sequuntur signa indicantia differentias, quæ sumuntur *Signa dif-*
 à causa efficiente. Quoad speciem: an causa sit interna vel *ferent. à*
 externa: patet ex alibi dictis. Quoad causas internas: si fue- *caus. effe.*
 rint vermes: assunt horum signa. Si species sit vapor: indica- *Signa spe-*
 tur è dolore sine grauitate, è dolore extensiuo, propter co- *ciei.*
 piosos flatus, è dolore errante, non stabili, è rugitibus copio-
 sis, è fecibus bubulis similibus, quæ ob copiosos flatus aquæ
 supernatant: indicatur etiam è prægressis causis, quæ potue-
 runt generare flatus: præterea ex utili alteratione, quam
 æger percipit, dum flatus erumpunt. Quoad *sanguinem, si*
grumescat, indicatur è dolore cum sensu grauitatis, è dolore
 extensiuo, ratione copix: præterea è refrigeratione totius
 corporis: item è prægressis causis violentis, vi quarum san-
 guis venas egredi potuit: tandem indicatur è comodo &
 utilitate, quam sentit patiens, dum sit sanguinis grumosi de-
 iectio. Si *sanguis sit inflammationis auctor:* indicatur è dolore
 cum sensu grauitatis & caliditatis, è dolore extensiuo, è do-
 lore permanente, è febre, & reliquis inflammationis signis.
Quoad pituitam: indicatur è dolore cum sensu grauitatis, è
 dolore extensiuo, è mordicatio, sed cum sensu frigiditatis,
 nisi falsa sit pituita: indicatur etiam è dolore permanente,
 nisi misti sint flatus, tunc enim etiã indicatur è fecibus bu-
 bulis similibus: & Auicenna monet, in dolore colico, magis su-
 spensas esse feces, vbi magis dominantur flatus: indicatur
 etiam è prægressis causis generantibus pituitam: & ex utili-
 tate, dum excernitur pituita. Quoad *feces:* indicantur è dolo-
 re grauatiuo, extensiuo, citra sensum caliditatis: vel frigidi-
 tatis præterea: è cupiditate excernendi: è dolore exasperati-
 uo, propter siccitatem fecum: è dolore compressiuo, propter
 duritiem: è dolore quiescente: & è deiectione fecis duræ, qui-
 busdam mucilaginisbus *obuolutæ:* nam dum feces diu mo-
 rãtur in intestinis, pituita adhæret: præterea indicatur è præ-
 gressis causis, vel generantibus, vel colligentibus feces: nec
 non è commoditate percepta, dum feces deiciuntur. Quoad
bilem: indicatur è dolore, cum exiguo sensu grauitatis: bilis
 enim ob tenuitatē non ita est ponderosa: indicatur è dolore
 non admodum extensiuo, quoniam admodum copiosa bilis
 non colligitur: indicatur è dolore mordicatio, cum insigni
 sensu caliditatis, ita vt interiora, secundū Alexan. vti videan-
 tur: & præterea indicatur è siti inextinguibili, è biliosa deie-
 ctione, è febre biliosa, è causis prægressis generantibus bilem:

è iuuamento vacuationis bilis, & refrigerationis. Quoad *melancholiam*: indicatur è dolore cum exiguo sensu grauitatis, nec admodum extensiuo: nam melancholia non est ita copiosa, vt pituita: indicatur etiam è dolore mordicatio, cum sensu frigiditatis, nisi melancholia sit exusta, indicatur è dolore compressiuo, propter duritiem: è dolore quiescente, è ructibus acidis, è nigris deiectionibus, è causis prægressis, quæ possunt producere melancholiam, è communi vacuatione melancholix, quæ prodest. Quoad *saniam*: indicatur è dolore, cum sensu grauitatis, è dolore extensiuo, siquidem in abscessibus sanies copiosa viger: indicatur è dolore mordicatio, cum sensu caliditatis, è purulentis deiectionibus, è prægressis causis abscessus, ex emolumento vecuationis saniei. Quoad *calculi*: indicatur è dolore, cum insigni sensu grauitatis, & admodum extensiuo, è dolore experte morsus, & sine sensu vel caliditatis, vel frigiditatis: indicatur è dolore contusiuo, si moueatur calculus: è dolore compressiuo, si quiescat: è prægressis causis generantibus calculum: postremo è iuuamento deiectionis calculi. Et præterea, si contingat, vt antea quoque patiens liber euaserit à dolore, per calculi excretionem, & nunc simili dolore crucietur: coniiciendū, hunc etiā dolorem prodire è calculo. Et hoc consequimur virtute non signi, sed exempli. Hæc de signis specierum. Sequuntur signa, quæ indicant vitia. Vicia principaliter spectant ad quantitatem & qualitatem: & vt adiuuantia, spectant ad substantiam, & vbi. Quoad vitium secundum formam: cum sit materia venerea, vel quælibet putrida materia: venerea indicatur è propriis signis: putrida indicatur è dolore mordicatio, cum sensu caliditatis, quia putrida materia est calida: indicatur etiam è foetida excretionem è febre. Quoad vitium in quantitate: indicatur è dolore extensiuo. Vitium in qualitate: si sit secundum caliditatem: indicatur è dolore mordicatio, cum sensu caliditatis: si qualitas sit frigida: indicatur è dolore mordicatio, cum sensu frigiditatis. Vitium in siccitate, indicatur è dolore exasperatio. Vitium in motu, indicatur è dolore errante in quiete, è dolore stabili. Si vitium sit mixtum, sitque indifferens ratione subiecti, vt detineatur pars membranea & crassa: si contingat, vt vitium sit maioris actiuitatis, indicatur è dolore perforatio: si minoris actiuitatis, indicatur è dolore acuali. Quoad cognitionem causæ generantis: hæc cognitio petenda est è propriis capitibus. Quoad

cogni

Signa vitium.

*Signa causa generantis, & de-
rinentis.*

Cognitionem causarum detinentium : cum hæ causæ pertineant ad angustiam , quatenus est vel obstructio , vel constipatio , vel compressio , vel subsidencia : quoad obstructionem , pater e signis causæ obstructantis : & idem de reliquis dicendum. Causæ autem hæ manifestari debent in propriis locis.

Quoad præsidia : cum hoc vitium sit sensatio corrupta intestinorum, dependens à causa solvente continuum: quantum attinet ad sensationem corruptam : dum habet rationem causæ , indicat anodynum. Quoad intestina : horum proportio postulat remedium fouens proportionem. Quoad causam soluentem continuum : in genere indicat remedium non anodynum , sed sanans. Et cum causa interna sit multiplex , secundum speciem, vitium, causam generantem , & detinentem : hæc omnia indicant contraria præsidia : de quibus sæpe diximus.

Quoad prognosticum : hoc malum in genere non est despicendum : quia omnis vehementiæ particeps esse potest : & primum vehementiæ essentia : non dolor, quatenus est sensatio corrupta, admodum recedit à naturali statu, nim. à sensu iucundo. Adest vehementia dignitatis : quoniam afficiuntur intestina, quæ, vt sensum exquisitum habentia, principes partes in consensum trahunt. Facultatis etiam vehementia vel adest, vel imminet : quia cum Galeno, cap. 14. l. 1. ad Glaucon. omnis dolor vires exoluit. Cæterum, suppositis rebus secundum naturam : quoad differentias formales : ratione vehementiæ essentia , dolor vehementior est periculosior. Ratione dignitatis : dolor magis periculosus , si afficiantur tenuia intestina : tunc enim malum est acutissimum ; & proinde periculosum : com. 6. sect. 2. libr. 3. epidem. vnde iliaci vix possunt tonualescere : cap. 2. lib. 6. loc. aff. Porro cum præcipui intestinorum dolores, sint Iliacus, & Colicus : circa hos digrediemur. Iliacus ergo dolor magis est periculosus , si totum intestinum afficiatur : minus periculosus , si intestinum secundum partem lædatur : & adhuc minus periculosus , si intestinum secundum partem infernam crucietur : quoniam dolor , quo partes occupat vel plures , vel superiores, eo vehementior est ratione dignitatis. Colicus etiam dolor non vacat periculo , propter sensum exquisitum : vnde & homines animi deliquio fatigati obeunt , & manus sibi violentas inferunt. cap. 1. libr. 2. u. 767. Quod si dolor urgeat

Indicationes.

Præsidia.

Prognost. diff. à forma, & subiecto.

secundum vmbilicum: est minus periculosus: nam ibi est pars inferior, & minoris dignitatis, in quam partem etiam Hystreres strenue agunt. Si dolor afficiat partem sinistram: magis est periculosus: nam dignitatis vehementia intéditur. Et adhuc periculosior est dolor, si dextra quoque pars afficiatur: maximum enim adest discriminem, si totum intestinum afficiatur. Quoad vehementiã facultatis: quo tristis sensatio erit vehementior, eo dolor erit periculosior. Hinc Galenus com. 48. l. 2. de rat. viſt. ait, ob dolores sæpe pulsus deficere, & oboriri animi deliquium. Præuus igitur est dolor iliacus & colicus, dum coniungitur vehementia facultatis, vt dum animi deliquia, & syncopæ oboriuntur. Vehementia etiam facultatis indicatur à perpetua extremorum frigiditate, vnde Galenus com. 6. ſect. 2. l. 3. epid. ait: iliacam ad perniciem tendere, dum perpetua est extremorum frigiditas. Frigiditas autem est signum vehementiæ, non modo facultatis, (quia vires læduntur) sed etiam essentiæ: quia plurimis est recessus à naturali statu. Si perpendatur vis differentiarum ratione causæ efficientis: eadem est ratio & in forma, & in causâ efficiente, merito vehementiæ & dignitatis, & facultatis: vt sufficiat digredi circa vehementiam essentiæ. Itaque cum causâ efficiens perpendatur secundum speciẽ, vitium, causam generantem & detinentem: cum reliqua pateant: sufficit quædam breuiter admonere. Hippocrates ergo aph. 44. ſect. 6. ait: quibus ẽ stillicidio vrinæ ileos superuenerit, in septem diebus pereunt, nisi febre superueniente copiosa vrina fluxerit. Hippocrates hoc loco prognosticum capit à vehementia essentiæ, vt pertinet ad vehementiam duplicis causæ, id est causæ doloris iliaci, & causæ stillicidij: vnde si febris superueniat, & vrina fluat: vrinæ fluxus cum febre, est signum vehementiæ materiæ secundum essentiam, sed non admodum in signis, cum vineatur à febre, & patiens restituatur: nam cum antea duo essent mala: vnicum tantum permanet, cum iam superatum sit stillicidium. Galenus addit, in iliaca vomitum stercoris esse exitialem. Hoc prognosticum pendet à vehementia essentiæ speciei: & à vitio speciei: à speciei: quoniam dum per os excernitur materia fecalis, excernitur materia, quæ summe recedit à naturali statu: à vitio speciei etiam pendet prognosticum, nim. à motu fecum, nam feces mouentur ad superiora, & propterea vitium est vehementissimum. Auicenna sequentia symptomata lethalia esse dicit, dum fectorem

*Pr. diff. à
causâ effi-
ciente.*

præ se ferunt: ea autem sunt, stercoris vomitus, sudor, anhelitus, ructus, flatus per sedem erumpentes: sceler enim minatur periculum, quia indicat insigne vitium secundum substantiam. Primum autem proponit stercoris vomitum, quia stercus secundum omnes sui partes petit os: ideoque vapor minus est malus: deinde proponit sudorem, qui indicat copiosos esse vapores, habentes impetum ad omnes corporis partes: reliqua, quæ proponit, sunt signa vaporis minus copiosi, quia vapor vnicam tantum partem petit: tertio ergo sequitur anhelitus, qui si signum est grauis vitij, præsertim si vapor petat pulmones: quarto est ructus foetidus, qui minus est periculosus, quam est signum vaporis, qui in os mouetur: quinto sunt flatus per sedem exeuntes, qui potius sunt signum salutare, seu motus salutaris: adest enim materia, quæ mouetur ad infernas partes: attamen malum signum est, quatenus significat materiam esse putridam. Hippocrates etiam aph. 10. sect. 7. ait: ab ileo vomitus, singultus, desipientia, vel conuulsio, malum. Sumitur hoc prognosticum à vehementia essentiae materię fecalis, secundum quantitatem, & motum: quorū vitiorum signa sunt symptomata ab Hippocrate proposita: nam, vt Galenus in com. inquit, hæc symptomata sunt ab intestinis à se expellere stercus appetentibus. Ad copiam quidem attinet vitium, quatenus intestina appetunt expellere feces, diu molestantes, quæ temporis diuturnitate stercus copiosum est aggregatum, quod licet non moueatur, ita tamen afficit intestina, vt qualitas spiritalis impertiatur ventriculo, vnde vomitus fit, non fecum, sed materię existentis in ventriculo. Deinde vitium attinet ad motum: nam, cū Galeno, stercus ascendit, vnde læditur venter: ideoque fit singultus, & compatiante neruorum principio, fieri potest desipientia & conuulsio. Galenus com. 6. sect. 1. 3. epid. cū Hippocrate statuit, in ileo maligno esse extremorum frigiditatem: de qua dictum est supra. Ibidem ait, dolorē esse periculosum, quoties vrinæ sunt prauæ. Praua vrina est signum vehementiæ causæ secundum essentiam: nimirum & fecum, & tumoris inflammatorij, cuius vi feces detinentur: idque duobus modis: primo, quatenus recedunt à naturali statu, vt ducunt in consensum genus venosum, vnde vrina est praua: secundo, quatenus vitium duplicatur, est insignis vehementiæ: intestinorum enim vitium intensum, coniungitur cum vitio venarum: vnde Galenus ait, si vrina sit bona, paruum salutis

spem ab ea peti posse: si autem praua sit, non parum facere ad malum: nam quando malum intestinorum habet coniunctam prauam vrinam, non est simplex affectio. Aëtius ait: ileon esse malum pueris familiare: at naturalis humiditatis beneficio pueros euadere: senibus non admodum accidere: si tamen corripiantur, fere nunquam euadere. Prognostici huius hæc est sententia. Ætas puerilis est signum virtutis robustæ, præsertim secundum calidum insitum: vnde naturalis humiditatis beneficio pueri euadunt: oppositum de senibus est statuendum. Præterea puerilis ætas est signum vehementiæ essentia remissioris causæ morbificæ: vt materia nec sit ita copiosa, nec arida, vt in senili ætate: si igitur pueri frequenter afficiuntur, id sit ob intestinorum paruitatem, quæ proinde ab exigua materia angustari possunt. Quoad prognosticum, ratione causæ detinentis: quoad obstructionem: potest expugnari: nam pituita & copiosa, & frigida, & crassa, & lenta, vinci potest. Constipatio ægrius superatur: etenim causa est insignioris vehementiæ, quam causa obstructionis: siue cõstipatio fiat à verme, siue ab arido stercore, siue à calculo: multo deterior est constipatio, si fiat ab inflammatione: vnde Paulus dicit, colicam inflammatoriam, inter omnes esse grauissimam: nam minatur ileum, quoniam sanguis magis potest, vt sit vehementia secundum essentiam, admodum insignis, penes copiam, & potissimum quietem, cum sanguis in inflammatione sit vehemēter impactus. Quoad compressionem: huius causa cum sint tumores partium vicinarum pro varietate tumorum, vario modo prognosticandum: de quibus in propriis capitibus. Quoad subsidentiam: pariter pro varia causa: varie prognosticandum.

De Curatione.

*Curatio
Cheirurgica.*

Sequuntur præsidiorum materia: & primum cheirurgicæ. Auicennas cum Græcis statuit in dolore intestinali secandam esse venam, si sanguis vehementer peccet: in ratione causæ vel principalis, quemadmodum in dolore procedente ab inflammatione: vel in ratione causæ sine qua nō, vt in dolore à flatu, à pituita, sed in corpore sanguine repleto. Propterea cum dolor iliacus frequenter fiat ab inflammatione, & frequentius quam dolor colicus: recte magis frequenter secatur vena in dolore iliaco. Quoad vsum, & primū quoad *Quando*: Rhasis inter initia secatur venam. Aëtius

ante

antequam topica vsurpentur: Auicennas, si secanda sit basilica & saphena: primum basilicam, mox saphenam aperit. Cum enim quando agendum sumatur ab indicante presente, vincente alia indicantia: inter initia vena est secanda: quia sanguis ita vincit, vt nihil prohibeat. Et, ante topica vena est secanda: nam sanguis ita vincit, vt dum est præsens, topica prohibeat: qui sanguis, vi localium, fluere in intestina. Tandem, si vena & cubiti & pedis sit secanda: illa primum tundenda: quia magis potest sanguis subsistens supra iecur, quam infra. Quoad *vb* agendum: omnes venam cubiti secant: Auicennas basilicam. Alexander tali venam tundit: si dolor fiat ab inflammatione, ita adaueta vt vrinam supprimat, aut si sanguis etiam ad vesicam pertingat. Hæc enim loca ostendit varia sanguinis subsistentia: vnde, cum sanguis subsistat in iecore, & venis intestinorum, secanda basilica: modo dextra, modo sinistra, prout dolor sollicitat regionem dextram, vel sinistram: Et, cum sanguis fluat in vesicæ vasa, hincque infra iecur: vena pedis secanda.

Cucurbitulæ scarificatæ probantur loco venæsectionis, dum prohibetur venæsectio. Eædem quoque probantur, quatenus propria ratione agunt, & non vicem gerunt venæsectionis, veluti in dolore ab inflammatione: sed hæc cucurbitulæ propria ratione agentes, vsurpantur post totius euacuationem, & applicantur parti inflammata: ad differentiam cucurbitularum, quæ vicem gerunt venæsectionis: nam sanguis in parte inflammata subsistit. Cucurbitulæ etiam non scarificatæ probantur: vnde Galenus cap. vlt. lib. 12. meth. probat cucurbitulam maximam: & Paulus administrat cum flamma copiosa, post totius euacuationem: applicat autem abdomini, potissimum secundum vmbilici regionem. Hic igitur à Galeno & Paulo proponitur necessitas, & vsus. Quoad necessitatem: cucurbitula est materia remedij, vehementer discutientis flatus: nam etiam citra excalfactionem partis vehementer trahit, cap. 6. lib. 13. meth. ideoque in dolore colico à flatu, est veluti incatamentum: cap. vlt. lib. 12. meth. Quoad vsum, probatur cucurbitula quam maxima, nam summa est flatus actio: deinde probatur cum flamma copiosa, id est, vehementer agens, nam flatus copiosus & crassus est difficilis passionis: tertio, probatur post totius euacuationem, nam materia replens prohibet: tandem applicatur abdomini, & potissimum vmbilico,

Cucurbitula.

nam status subsistentiam habet in abdomine, & præsertim secundum umbilicum: & quia in his locis non adest ventriculus, lien, aut iecur, ideo hæc viscera non prohibent applicationem cucurbitulæ.

Frict. ligatura, &c.

Tandem laudantur etiam cheirurgicæ materiæ, quæ sunt materia anodynæ, ratione iudicii: ita agentes, ut sensorium iudicans afficiatur causa dolorifica vincente: vincitur autem ab affectione dolorifica intensiori, quia dolor remissus à vehementiori, exstinguitur. Tales autem sunt frictiones vehementes & dolorificæ, similes ligaturæ, cucurbitulæ cum dolore applicatæ, parti non dolenti. Hæc materiæ cheirurgicæ, quatenus dolorem excitant, sunt materiæ anodynæ, ratione iudicii: quatenus autem retrahunt ab intestinis, sunt materiæ sanantes: quoniam causam doloris principalem respiciunt.

Pharmaceutica.

Materia medicinalis est triplex: scilicet materia Anodynæ, materia remedij Sanantis, & materia proportionis.

I. Anodyna.

I.

Quoad materiam anodynæ: Anodynum quadruplex est, ut in doctrina de capitis dolore monstrauimus: vnum ratione iudicii, alterum ratione causæ adiuuantis, tertium & quartum, ratione receptionis. Quoad anodynum ratione iudicii: cum pertineat ad materiam cheirurgicam, medicinalem, & diætericam: de materia cheirurgica dictum est: de diæterica dicetur suo loco. Ergo, quoad medicinalem materiam, si probatur medicamentum, ut cuius exciteretur dolor admodum intensus, in parte diuersa ab intestinis: verbi gratia, si patiens gesserit vesicantia, vel fonticulos: tunc locis exulceratis applicanda sunt acria medicamenta, ut *helleborus niger* & *albus*, *euphorbium*, *sinapi*, &c. Quoad materiam remedij anodynæ, ratione causæ adiuuantis, cum Galeno c. 18. lib. 5. simp. probatur oleum anethum, chamamelinum: ut commune, in quo bullierint anethum, chamamelum, & cymium in parua copia: licet etiam addere vinum album tenue. Ratio horum medicamentorum est, quoniam cutim rarefaciunt, & ad circumferentiam trahunt humores ac vapores. Quoad vsum horum medicamentorum sufficiat modum agendi explanare. Proinde hæc medicamenta actu calida admoueantur: ea tamen lege, ut medicamentum actu calidum existens, primum caliditatis gradum non excedat: nam si excedat, est

2.

materia remedij, non anodynæ, sed sanantis. Quoad anodynum ratione receptionis, hoc duplex est, nempe materia calida

3.

calida instar corporis patientis, & materia lenta, instar suppurantis: nec non materia frigida. Medicamentum calidum, e cap. 7. & 8. lib. 5. symptom. est *hydrelaum*, *farina triticea*, *pans triticeus*, sed modico coctus, *adeps suillus*, *butyrum*, *lac bubulum*, *lac onisium*, *amygdalinum*, *mucilaginee malua* & *alibaa*, *omenta animalium*, *aqua dulcis moderate calida*. Alexander anodynis humidis miscet modo frigida, modo calida: ut eodem tempore occurrat & dolori, & causæ doloris. Proinde, si dolor colicus sit è frigido humore: probat *balneum aqua dulcis*, quod dolorem quidem mitigat, sed non curat. Si dolor fiat à causa calida, uti possumus, vel sinceris anodynis, vel miscere possumus frigida, ut sunt *viola*, *hordium*, &c. & hoc medicamentum ita mistum, est tum anodynum, tum sanans. Si dolor fiat à causa frigida: addi possunt *anctum*, *melilotus*, *fanumgræcum*, *chamamelum*, *oleum amygdalarum amararum*: quod & ipsum est medicamentum & anodynum, & sanans.

usus. Quoad quantum: medicamenta proposita in summa dosi sunt usurpanda, si summa sit actio indicantis: unde quandoque licet exhibere *oleum amygdalinum*, usque ad lb j.

Quoad modum: si difficillima sit passio indicantis: administrandum est medicamentum ut efficacissime agat: veluti dum vesicæ medicamenti implentur, secundum Aetium. Redditur autem strenuum valde medicamentum, si in modum stillicidij admoueatur: & præsertim, cum Auicenna, si liquore seu decocto cennuente repleatur vas, in cuius fundo plura sint foramina: deinde vas illud eleuetur à patiente, ad longitudinem staturæ humanæ: & liquor dimittatur supra ventrem: sic enim stillæ frequentes destillantes efficacissime operantur: probari autem potest vasculum, quod est in communi usu, pro irrigandis hortis: & hoc medicamentum Auicennas ait esse vehementis iuuamenti. In quolibet autem dolore, siue fiat à causa frigida, siue à calida: obseruandum, ut anodynum usurpetur actu calidum, non frigidum: verum in dolore à causa calida, caliditas erit moderata: id est, tepor potius, quam caliditas: in dolore à causa frigida, caliditas teporem excedet. Licet enim doloris calidi resistentia ab anodyno actu frigido magis vincatur: id tamen prohibet, primum materia doloris, quæ indicat vacuas per modum attractionis: deinde prohibet intestinorum calor insitus, qui calida indicat. Quare cum difficilior sit passio materiæ frigidæ, quam calidæ: ob id anodynum

dynamactu magis calidum administrandum, in dolore à causa frigida.

Quoad tempus: his vtendum, dum dolor vincit materiam replentem: at materia replens vincit, præsertim si anodynum applicetur, secus si exhibeatur: nam dum applicatur anodynum calidum, materia in toto existens fluit in partem dolentem: at si exhibeatur, si anodynum sit destitutum vi vacuante, potest esse in causa, vt materia fluat: si vero facultatem habeat euacuandi, si materia replens totum sit sanguis, primum sanguis vacuandus, si materia replens sit alia à sanguine, quamprimum vtendum hoc anodyno exhibito: *℞. olei amygdalini dul. ʒ. vj. olei amygdal. amar. ʒj. mellis ros. sol. ʒ. β.* si inodo dolor fiat à materia frigida: nam si fiat à calida materia: exhibeatur oleum amygdal. cum manna, vel *(grapo violaceo solutio)*.

Stupefacientibus
quo in ra-
su possi-
mus vi.

Quoad vbi agendum, dum intestina afficiantur, propterea quod receptio subsistentiam habet in intestinis: recte medicamenta & abdomini possunt applicari, & per os exhiberi vtputa dum oleum propinatur, quod in iliacis mirabile esse Galenus ait in lib. de medic. facile parabil. ita vt homo, etiam si fere stranguletur, huius tamen medicamenti beneficio seruari queat. Sed notandum, in quolibet dolore intestinorum, anodynum posse applicari abdomini, & regioni dolenti. At si dolor occupet tenuia intestina, anodynum probatur per os: si crassa per sedem. Frigida medicamenta, ratione receptionis sunt lactuca, nymphaea, succus solani, mandragora, hyoscyamus, capita papaueris, semina papaueris, opium, philonium Rom. raquies Nicolai, pilula de cynoglossa, magna antidoti recentis. Locum autem habent opiata, dum vehemens est dolor, maximaque vrget necessitas: cap. vlt. lib. 12. meth. Vrget autem necessitas, dum dolor colicus sit, vel à succo calido, vel à frigido & crasso, sed cui vapor est mistus: & præterea dum adest febris: Ratio Galeni est: quia in dolore à succo calido, magis potest dolor, quam causa doloris: nam dolor pendens à materia calida, vehementissimus est materia autem calida est tenuis, est etiam calida: vnde, cum stupefacientia sint frigida & sicca: primo sensui torporem inferunt: secundo, humorum acrium tenuitatem cogunt & crasse faciunt: tertio, materię caliditatem extinguunt. In dolore à succo frigido & crasso, cum flatu atque febre, etiam magis potest dolor, quam causa: quia à flatu fit dolor

intren

intensissimus, vnde magis potest, quam materia frigida, præsertim si febris sit annexa. Contra statuendum est de dolore à succo frigido, vel sine flatu, vel cum flatu, sed citra febrim: nam vbi non est flatus, ibi nec dolor tam atrox esse potest: si autem sit flatus, & febris absit, cui non corrigatur opiatum à febre, ob id ab opiato desistendum. Et hæc Galenus de dolore colico prodidit. At, si dolor sit iliacus, à flatu, etiam sine febre: cum Rhasis probatur opiatum, vt philonium, &c. si vehemens sit dolor, vt syncope imminet: plurimum etiam potest dolor, quia adest vehementia essentia: item dignitatis, quia dolor est non in colo, sed in ileo: præterea additur vehementia facultatis, quia syncope imminet: & potissimum augeri potest dolor, quia flatus in colica violentia distendunt. Verum non probatur quodlibet opiatum, sed philonium, quod recipit medicamenta calida, & flatus discutientia. Vnde sciendum, etiam in dolore à causa calida, & in dolore à causa frigida cum flatu & febre, probari quidem opiata, sed non sincera: nam licet magis possit vis doloris, quam causæ, & caloris insitis, attamen dolor non potest tantum, vt causam morificam, & calidum insitum, prorsus despicere liceat: præsertim, cum intestinorum temperamentum non sit admodum calidum, nec intestinorum calidum insitum sit admodum robustum. Quare opiatis calida misceri possunt. Rhasis autem opiatis etiam interdum addit soluentia: vt scammonium. Vbi notandum, non esse miscenda opiata cum soluentibus, si principale institutum sit ventrem soluere: opiata enim vim soluentium turbant, & actionem impediunt. Interdum tamen cum opiatis licet miscere soluentia: dum scopus est vehementia doloris compescere, & materiam in intestinis existentem euacuare: & præterea soluentia efficiunt, vt opiata breuiori tempore retineantur, & minus refrigerent. Rhasis miscet scammonium, quod acrimonia sua irritat expultricem, vt materia proxima expellatur. Hæc de opiatorum necessitate. Quoad *usum* opiatorum, & primum, quoad *quantum*: si summa sit actio doloris, summa dosis probatur: vnde philon. datur ad ʒj. & Rhasis suum philonium: quod Romano mitius est, exhibet ad ʒijß. Quoad *modum*: opiata non actu frigida sunt ad mouenda: nam partis affectus calor prohibet. Quoad *quando*: opiata sunt usurpanda, dum dolor vincit alia indicantia, id est, si sit

*Quando
narcotica
miscere li-
ceat pur-
gantibus.*

intensissimus c.1. & 7. l. 12. meth. & si assit metus syncopes. Quoad *ubi agendum*: Aëtius & Auicennas exhibent per os, & immittunt per sedem: at virtus melius sustinet immissa per sedem, quam exhibita. Sed causa subsistentiæ indicantis, in dolore iliaco, præstat per os exhibere: in colico per sedē immittere. Hæc de materia medicinali remedij anodynū.

2. *Sanans
remedium.
Ad colicā
flatulentā.
Interna.*

Quoad materiam medicinale[m] remedij sanantis, disgre-
diemur circa dolorem ē Vapore, ē Pituita, ē Bile, ex Inflam-
matione, & ē Febribus. Quoad dolorem à vapore prodeun-
tem, quem Auicennas vocat Colicam ventosam: & primum,
quoad ea quæ exhibentur: Auicennas probat *medicamentum*
confectum ē semine carui, ruta, in decocto anisorum, feniculi, cy-
mini, dauci, &c. Vel decoquantur hæc in vino generoso, aut in
mulsameraciori. Rhasis probat confectionem ē baccis lauri, ex-
hibitam cum vino generoso, vel cum aqua alterata aniso, simili-
busque: & hoc medicamentum omnibus anteponit. Mesues, cum
admirabile, laudat oleum de kerna, quod efficacissime flatus dis-
cutit. His addi possunt, diacymium, diacalamithia, diagalanga,
magna antidoti, sed antiqua, sassifras, amhora, guaiacum, ius
galli repleti cum discutientibus flatus. Admirabilia sunt, quæ
passissimum apud Germanos reperiuntur, olea destillata ē feniculo,
& aromatibus. Hæc sunt discutientia flatus. Quoad vsum, &
primum, quoad quantum: Rasis in dolore vehementiori ex-
hibet confectionem ē baccis lauri ad ʒ j. Auicennas exhi-
bet olei de kerua, primum ʒ iij. deinde singulis diebus
addit ʒ ij. & ʒ v. & ascendit ad ʒ xʒ. hincque singulis die-
bus adimit ʒ ij. & ʒ v. donec dosis descendat ad ʒ iij. Qua-
re in eodem dolore exhibet dosin maximam, infimam, &
mediocrem. Ratio autem hæc est: In dolore colico ē flatu,
summa est actio flatus: quare ascendendum fuit ad sum-
nam dosin. At quia vapor, ob crassitiem, perseverat, vʒ ne-
cesse sit medicamentum longiori tempore vsurpare: proinde,
licet à flatu summæ actiuitatis, summa dosis medicamenti
indicetur: virtus tamen eam non permittit: ideoque medi-
camentum etiam in mediocri & infima dosi exhibendum.
Et quia virtus facilius fert summam dosin, dum sensim assue-
scit: ob id Auicennas ab infima dosi, ad summam, per medio-
crem sensim progreditur: & dum factus est ascensus ad sum-
nam dosin, cum imminuta sit actiuitas flatus, & vires sint
defatigatæ: recte dosis minuitur: & cum subinde magis
minuatur vaporis actio, eodē etiam modo dosis minui debet,
donec

donec superetur vapor, vt actio sit infima, & proinde minima dosis sufficiat. *Modus* autem est cum Rhafi, vt medicamentum exhibeatur actu calidum: nam vapor crassus, quatenus agere discutitur, indicat efficax discutiens, id est, medicamentum actu calidum. *Quoad quando.* Rhafis exhibet discutiencia status multis vicibus. Auicenn. exhibet oleum de kerua, vsque ad 21. dies: quoniam indicans perseuerat. Si autē medicamenta per sedem immittantur: probantur proposita medicamenta: sed licet etiam addere iniucunda, quia virtus intestinorum ea permittit, virtus autem oris non permittit: talia sunt, oleum anethinum, oleū de castorio, &c. Auicennas habet clysmum efficacissimum, ad status expugnandum: ℞. succi ruta ℥ ij. & in huius penuria ruta copiosa decoquatur in aqua ℥ xij. ad consumptionem trium partium: deinde ℞. vel succi ruta, vel decocti praedicti ℥ ij. hyssopi, ruta, origani, anethi, chamamelis, calamintha montana ana ℥ j. seminum lini, fani grati, petroselinis, feniculi, dauci, ana ℥ ij. fiat decoctio ad consumptionem duarum partium. Deinde ℞. praedicti decocti ℥ j. olei chamamelini completi ℥ ss. fiat decoctio ad consumptionem decocti, adde castorei ℥ j. opopanax: ij. adipis anatis ℥ j. (ad emolliendum feces) Mis, pro clystere. Dosis huius clysmi ascendit ad ℥ vij. & ℥ iij. non ultra, & aliquando solum immittuntur ℥ v. Nam hic Auicennas respicit ad dolorem vehementiorem, prodeuntem ē statu summæ actiuitatis: ideoque requiritur medicamentum strenue agens in flatu: vt est clysmus, constans medicamentis vehementibus, copiosis. Summa dosis est ℥ vij. & ℥ iij. quia hoc est totum medicamentum. Vnde colligitur contra aliquos practicos, clysteres esse efficacissimos, etiam si ad libras non immittantur: modo componantur ē medicamentis & copiosis, & vehementibus. Ex his etiam patet, quæ abdomini sint applicanda: ea enim sunt proposita. Circa modum tantum notandum: efficacissimum esse medicamentum, si proposita semina status discutiencia, immittantur in vas cinere calente repletum. Et hæc de Colica flatulenta.

*Aluo subit
cienda.*

*Applican
da.*

Si dolor colicus fiat à pituita: inter Vacuantia sensibiliter, Colica probantur Lenientia, & Soluētia. *Quoad lenientia:* probatur mel rosatum solutiuum: Auicennas probat hieram, sed admonet, agaricum non esse miscendum, ne scilicet excisetur vomitus, i. Lenientia, qui in dolore colico, cum alui suppressione, non est tutus: nec licet vti agarico, quia trahit materiam ad locum læsum. Circa vsum, & primo circa quando, notandum: quā prius

2. Turgan
sia.

* De his
vide raras
observa-
tiones
Dodonai.
cap. 36.

vtendum esse lenientibus: nam materia morbifica vincit alia indicantia, nisi quandoque materia morbifica vincatur à vehementiori dolore, vbi anodynis vtendum: quamuis etiam lenientia anodynis misceri queant, vt si exhibeantur species hieræ, mox oleum amygdalinum. Quoad *vbi agendum*, vsurpanda sunt lenientia, & per os, & per sedem, pro materiz subsistentia: in iliaca per os, in colica per sedem. Quoad soluentia: probatur *agaricus*, & *potissimum diaturbith*, quoniam non ita imminet vomitus è diaturbith, sicuti ex agarico. Rhasis probat *medicamentum è turbith*, *Zingibere*, & *saccharo*: & ascendit ad *euphorbium*, ad *colocynthidem*. *Actius* vsitur *colocynthide*, per noctem infusa in vino generoso: id quod aliqui pro secreto habent. Præterea in dolore iliaco *Actius* ascendit ad *elaterium*, cum *terebinthina*: hinc verbi gratia uti licet, *elaterij* ℥ ij. cum *terebinthina* ʒ j. Rhasis probat *pilulas*, quas vocat * *iliacæ*. Dubitatur autem circa *medicamentum Rhasis*, quod vocat *medicamentum de gallia*: nam præter aromata recipit *scammonium*, quod bilem attrahit: & recipit *succum cydoniorum*, qui refrigerat & astringit, in dolore à pituita. *Arculanus* solvens hanc difficultatē, ait, in codice aliquid desiderari, vnde addit, *turbith* ʒ xxviij. Hæc solutio nimis est puerilis. Sciendum igitur *Rhasin* sermonem habere de ileo, prodeunte à causa frigida, cum alui stipitatione & nausea: vnde sermonem habet de ileo vehementissimo, in quo vi stipitationis, & nausea imminet vomitus secum. Conficit igitur *Rhasis* *medicamentum* ex aromatibus, vt frigida materia attemperetur, attenueturque: & vt oromatum familiaritate, & suavi odore nausea compescatur. Insupet vero, vt materia descendat (nō ascendat) miscet tum *masticem*, tum *succum cydoniorum*: *Scammonium* autem miscet ad ℥ vj. vt cum acre sit *medicamentum*, & bilem alliciat, & sua acrimonia expultricem irriter: quatenus autem bilem attrahit, est in causa, vt bilis attracta ipsa quoque irriter expultricem. Quoad *usum* soluentium: norandum circa *quando*: cum capiatur ab indicante vincente alia indicantia: dum dolor ita est vehemens, vt nisi materia expellatur, subsequatur fecis vomitus: soluentibus vtendum: nam talis materia, quæ minatur vomitum secum, magis potest, quam materia furiosa, seu turgens: quæ cum vincat cruditatis vehementiam, multo magis materia minans vomitum secum, cruditatem superabit. Accedit, materiam non esse in venis mistam cum bonis succis, nam rept-

ratur in intestinis. Verum, si cacoehymia vigeat in toto: non
 licet ante coctionem soluens exhibere. Quare Auicennas
 monet, ne ilico vtamur clysteribus acutis. Sequitur vt de 3. Discu-
 Alterantibus agamus: quæ etiam insensibiliter vacuare *tenuia.*
 possunt. De his Galenus cap. vltimo, lib. 12. method. præcipit,
 cauendum à vehementer calefacientibus, nisi etiam vehe-
 menter digerant: nam frigidos, crassos, & lentos succos li-
 quant, & mutant in flatu: vnde dolor intenditur. Ea autem
 calefacientia improbantur à Galeno, quæ sunt crassæ sub-
 stantiæ, non quæ tenuis: quamuis potissimum ea probentur,
 quæ sint tenuis substantiæ, & non vehementer calida, quæ
 incidunt simul & coquunt pituitam, nec vertunt in flatum.
 Interim tamen etiam, sed minus, probantur, quæ sunt te-
 nuia & vehementis caliditatis: succos enim liquant quidem
 & in flatu mutant: verum quia tenuia sunt, flatu discu-
 tiunt: vnde dolor quidem intenditur, sed non perseverat.
 Cum ergo probentur, quæ valenter calefaciunt, hoc est,
 quæ ascendunt vltra secundum caliditatis gradum: & pro-
 bentur quæ infra subsistunt: iure Alexander lib. 10. probat
succum foliorum rhamni, cum viij. vel viij. granis piperis, &
duobus cochlearibus mellis. Quamuis autem è lib. 8. simplic.
 rhamni succus sit frigidus, vel in fine primi, vel in princi-
 pio secundi: eo tamen Alexander vtitur, quia est attenuans
 in secundo gradu: nec frigiditate obest, quoniam ob mel
 & piper, medicamentum euadit tenue, & moderatæ calidi-
 tatis. Aëtius probat *radices verbene & rectæ, tenuiter contu-*
fas, & decoquis in aqua, ad consumptionem duarum partium.
 Auicennas mirabile medicamentum conficit, ex aquali por-
 tione *castorei, piperis, anisi, ad 3 j ss.* Galenus capite 4. libro 9.
 & 10. probat cinerem cornu cerui iuuenis, cum pipere albo, &
myrrha: pro cornu 3 j. accipi possunt reliquorum ḡ ij. Notan-
 dum autem circa quando agendum, dum hoc medicamen-
 tum, & similia in modum fomenti vsurpantur: dixisse Ale-
 xandrum, nisi dolor ope fomentorum mitescat, non opus
 esse diu calefacere, neque ad vehementiora esse confugien-
 dum, quoniam materia copiosa prohibet: quare materia
 primò vacuanda, mox fomentis, quod residuum est: dissol-
 uendum. Quantum denique ad vacuantia & insensibiliter, 4. Discu-
 & sensibiliter: probatur *ius galli antiqui, cum calorisicis proposi-* *tientia si-*
tu alterati: sed additis soluentibus, ut est turbitis, cum carthamo, *mul & va-*
senicico. Huius classis est oleum è seminibus lini, & amygdalarum euantia.

amararum, addito nitro, & melle ros. sol. Alexander in potu probat aquas sulphureas & bituminosas, & exhibet dolore actu existente. At expedit simul exhibere mel. ros. solus.

Colica biliosa.

- Si dolor fiat à bile: Galenus cap. 7. lib. 12. metho. in quolibet dolore probat Refrigerantia & humectantia: in aliquo autem dolore (scilicet à bile) probat Vacuantia bilem, videlicet dum bilis retinetur: in aliquo autem dolore probat Astringentia, scilicet dum alius est liquidior. Cognoscenda igitur sunt medicamenta refrigerantia & humectantia: vacuantia bilem: & astringentia. Quoad refrigerantia & humectantia: probatur medicamentum compositum è violis, pomis, lactuca, nymphaea: conficiatur autem vel sine saccharo, vel cum exiguo saccharo. Praesertim autem probatur frigida potus, nisi aliquid prohibeat: hoc enim gloriatur Alexander è toto se dolorem biliosum sanasse: quia vi huius vincitur & materia morbifica, & causa generans. Quoad vacuantia. cap. 7. lib. 12. meth. probatur hiera, quia Alexander tantum venit, si bilis solum in intestinis vigeat: nam si aliunde fluat, addit scammonium. Dubitare autem quis posset, cur probetur hiera, medicamentum calidum, praesertim cum vis vacuatoria attineat solum ad aloem: quare tutius videretur, uti vel sola aloë, vel simul cum refrigerantibus. Pro resolutione dicendum: si contingat bilem pertinaciter hære in intestinis, probari hieram: & huc Alexander & Galenus respexerunt: Alexander enim proponit bilem tunicis affixam. Quod si bilis non admodum hæreat aloë sine aromatibus probatur, & secundum Avicennam, miseri debes cum prunis. Unde probantur etiam tamarindi, manna, syr. ros. sol. quæ in aqua bordei sunt dissolvenda, Si bilis aliunde confluat, loco scammonij rhabarb. ro. utendum. Et si eueniat bilem esse affixam, ut hiera sit opus: ne vi calidorum lædatur patiens, vel hiera est exhibenda cum aliquo refrigerante, vel post hieram exhibendum apozema refrigerans, ut est aqua bordei, vel cichorii. Deniq; quoad astringentia: hæc probantur, dum alius est liquidior, & imminet dysenteria. Galenus cap. 7. lib. 12. meth. probat bulicam, coctam in aqua, immixtis granis mali punici: probatur etiam cremor rhois opsoniorum, probantur austeri faeculae. De aliis astringentibus in fluxu alui dicendum.

Colica ab inflammatione.

1.

Si dolor intestinorum prodeat ab inflammatione: probantur medicamenta Vacuantia, & Refrigerantia, praesertim si inflammatio sit feruidior. Quoad enacuantia: probantur & quæ exhibentur, & quæ immittuntur. Quoad exhibenda:

Avicen

Auicennas inter lenientia probat medicamentum, confectum è cassia, sebesten, syrupo violaceo solutiuo, & tamarindis, dissolutis cum decocto vel hordei, vel endiuia. Et, si bilis exsuperet: Auicennas ascendit ad scammonium, sed tempore opportuno, apparentibus signis coctionis: at tutius est rhabarbaro uti, cum cassia. Per sedem probantur infusa è cassia, oleo violato, cremore hordei, lacte, & sero: hæc enim medicamenta & vacuant, & refrigerant. Quantum ad refrigerantia: & primum, quoad ea quæ assumuntur: Auicennas probat citrulos, aquam citrinorum, mucilaginem seminum psyllij, & quæ in dolore colico, à bile citra inflammationem fuere proposita: excipitur autem frigida potio, quoniam internis inflammationibus nocet. Quoad ea quæ admouentur: eadem probantur quæ dicta sunt in ventriculi inflammatione.

Quoad dolorem à fecibus prodeuntem: probantur Emol- Colica, ab
lientia, & calida atque acria expultricem Irritantia. Quoad alui feci-
assumenda: probatur ius galli decrepiti, & oportet ut decoqua- bus reten-
tur, secundum Auicennam addito sale, anetho, polypodio, & quan- tis.
doque cum carthamo: Alexander vinum addit, ut medicamentum euadat incundum. Probat Auicennas ius spinachiorum, prunorum. Alexander ascendit ad pilulas de euphorbio, & de plumbo, nam in plumbo est pondus, unde descendit, & secum ducit feces. Et in hoc malo ferme lethali, quia imminet vomitus stercoris, quidam sunt, nec improbandi, qui vtuntur argento viuo, seu Mercurio per os, quia descendit. Quare in malo hoc contumaci-
est etiam confugiendum ad elaterium, ad antimonium, ad nucleos pineos purgantes: sunt enim efficacissima soluentia, & liberant ho-
mines à morte vicina. Quoad ea, quæ infunduntur per se-
dem: probat Auicennas clysteres confectos è malui, althæa, fa-
negraco, furfuribus, caricis, & ex his paratur decoctum, cui addi-
tur saccharum rubrum, oleum amygdalinum, butyrum, pingue-
dines: item ad irritandum expultricem, sal & colocynthis. Et si
feces vehementer resistent, probatur clyster administratus
secundum modum ab Alexandro propositum, nisi assit in-
flammatio. Quoad ea quæ applicantur: circa vmbilicum ap-
plicabuntur butyrum, oleum amygdalinum, adipēs, fel bouis, ela-
terium, unguentum Agrippa, unguentum de cyclamino. Et hæc de
materia medicinali sanante.

Quoad materiam remedij, respicientis proportionem 3. Appro-
intestinorum: è cap. 4. lib. 9. κ.τόπ. probatur cochlea cruda, priata.

tritā, cum duobus cyathis, id est, 3 xxvj. vel vini, vel aqua. Probantur interanea gallinarum, trita, reposita in vas fictile. Ventericulum quidem gallinarum aliquando parvi facit Galenus, non omnia mistina: & aspernari videtur in malis ventriculi, non intestinorum: unde hoc medicamentum non est spernendum. Galenus præterea lib. decimo simplicium, capite de stercore, in dolore colico, sine inflammatione, probat stercore lupinum, & exhibet cum sale, & pipere: sed in colica frigida nam in calida debes exhiberi cum aqua, ut patet ad 3 j. Aulicennas probat intestinum lupinum: quia potest esse aliqua proportio inter intestinum, & intestinum. Dioscorides probat alaudam assam comestam. Aulicennas in potu probat cornu cervi usum, quod etiam medicamentum proponitur capite quarto, libro nono. κ τόν. Reliqua apud Aetium & Alexandrum videnda.

Dietā.

Cibus.

Sequitur materia dietetica. Quoad cibum, de hoc dicendum ut respicit vitium, in Quanto, & in Quali. Primum ergo, ut respicit vitium in quanto: ad minuendum materiam, cum Alexandro abstinendum à *carnibus*, si vires permittant: siquidem, ut monet Aulicennas, vel ob doloris vehementiam, vel ob vacuationem, virtus quandoque ita languet, ut expediat exhibere *aquam carum, ovorum vitellus, panem in iure, & vinum*. Secundo, si capiatur victus, ut dirigatur ad vitium in qualitate: cum dolor fiat à causa modo frigida, modo calida: si à frigida, à capite ultimo, libro duodecimo method. probatur *allium*, nam flatu discutit, & sitim non infert, ut sit rusticorum theriaca. Dioscorides ait, *allium sitim parere*: est enim calidum & siccum in quarto, è libro octavo, simplicium. At sciendum, *allium* ad differentiam ceparum sitim non excitare, quia cepa è libro septimo simplicium, non modo est calida & sicca in quarto gradu, verum etiam est crassæ substantiæ. Quare cum Galenus loco citato loquatur de dolore colico, prodeunte è crassa & viscida pituita: cepa, dum agit in pituitam, ob propriam crassitiem non dissipatur: sed agit in tunicas ventriculi, & sitim excitat. At *allium*, cum sit tenuis substantiæ, agens in pituitam, ob suæ substantiæ tenuitatem dissipatur: quare non agit in tunicas, & propterea sitim non excitat. Unde si *allium* ingeratur in nudum ventriculum, non refertur pituita, sitim promouebit. Et hinc Galenus capite ultimo, libro secundo, ament. probat *allium* in corporibus non biliosis, sed pi-

turo

tutiosis: Quare in colica frigida probatur allium crudum, in robustis corporibus: in reliquis coctum. Alexander probat usum porrerum in magna copia: item apium, asparagum, succum amygdalarum cum melle, & pipere: quibus etiam condieda est ptisana, ut sic vim refrigerandi amittat (hic obiter notandum, ne in febribus ita alteretur ptisana, ut vim refrigerandi amittat.) Auicennas cibos condit aromatibus. Postremo, quoad dolorem à causa calida: Alexander probat ptisanam, si cistram misionem porri aut satis exhibeatur, quoniam sine sale refrigerat, & bilem abstergit. Probat etiam ouorum lutea: unde obiter colligitur, ea refrigerare, & proinde in febribus exhiberi posse, contra aliquos. Probantur olera, ut lactuca, poma. Cucurbita improbat, nam secundum Alexandrum ut quadam naturalis colo aduersatur. Probantur pisces dura carnis, ostræ, cochleæ marina, pedes bubuli, ventriculi suum, &c.

Quoad potum: in colica frigida Alexander probat vinum album, tenue, non astringens, & generosum: unde cap. ultim. libr. 12. meth. Galenus ait, agricolam è meraciori vino bene habuisse. Alexander probat vinum medicatum, siue anisatum, siue apiatum. Quod si patiens vinum non admittat, Auicennas probat Syrupum de melle, cum speciebus. Probatur etiam tunc potus à Rhafi propositus: verbi gratia, si quis capiat mellis lb j. aquæ lb vj. & decoquat ad spissitudinem iulepi: deinde cuiuslibet libra addat piperis puluerisati ʒ ij. in panno ligati: post, refrigerato Syrupo fiat expressio. Aetius probat potum exiguum, licet homo sitiat: nam copiosa humiditas fauet pituitæ. Auicennas ad mitigandam sitim, probat iulepum, cum potu mistum, nam ratione dulcedinis, potus magis penetrat. Et tandem in dolore à causa calida, Alexander probat aquam, etiam extra accessionem. Et præsertim abstinendum à vino, in colica ex inflammatione.

CAPVT XIII.

De Vermibus intestinorum.



Veniadmodum Galenus cap. 7. libr. 1. π.ρόν. à pediculis morbum pedicularem vocat: ita nos à vermibus vermicularem appellabimus. Cum autem vermis attinere possit ad plures corporis partes: nunc intelligimus, quatenus spectat ad intestina.

Nomen.

Generatio. Generatur hoc malum, dum in intestinis creantur vermes, qui ita intestina afficiunt, vt corripiant morbo in numero

Definitio. Quare morbus vermicularis intestinorum, est nume-

Forma. rus præter naturam auctus, prodiens à verme. Forma est numerus auctus: nam in hoc morbo est generatio substantiæ, quæ antea non erat. cap. 8. lib. de morb. diff. & cap. penult. lib. 14. meth. Numerus auctus est morbus, quatenus est constitutio præter naturam, lædens operationes: nam huius suppositum vsque adeo male afficitur, vt facultas ad agendum impotens reddatur: omnis quippe morbus est læsio facultatis, quæ pendet à mala suppositi dispositione, & quæ dependet à mala constitutione corporis patientis. Subiectum in hac finitione, est intestinum: ad differentiam morbi vermicularis aliarum partium. c. vltim. l. 14. meth.

Subiectū.

Causa efficiens.

Causa efficiens est vermis: qua causa numerus auctus præter naturam intestinorum, ab alio eorum numero distinguitur. Porro, cum vermis (è fine lib. 14. meth.) sit substantia, toto genere præter naturam: ea autem, quæ præter naturam sunt, possint esse causæ, vel morbi, vel symptomata: statuimus, vermes esse causam, & symptomata. Nam vermis habet rationem causæ efficientis, sed contentiux, & ex usu, quatenus concurrit ad constitutionem speciei morbi: ideoque est causa efficiens, quæ gerit vicem formæ. Declaro. Et primum, si vermis capiatur, vt causa contentiua ex usu, quæ posita, ponitur & ipsa constitutio præter naturam, & qua remota, remouetur: secundum hanc rationem vermis est semper morbi in numero causa; quia assiduo adest substantia, quæ ante non fuit: interdum vermis etiam causa est angustix & constipationis, cum copia excedit, & replet. Et secundum hos modos vermis est causa contentiua ex usu: nam præsentem vermem, necessario est numerus auctus: eo absente, imminutus: id quod etiam statuendum est de verme præsentem copioso & replente, vbi tunc adest constipatio: eo autem absente, abest. Si autem capiatur causa contentiua, vt concurrit ad constituendam speciem morbi: vermis concurrit ad constituendam speciem morbi vermicularis, quemadmodum sanguis concurrit ad constituendam inflammationem: sicuti enim hæc sine sanguine esse non potest: ita nec morbus vermicularis sine verme. Cæterum vermis etiam rationem habet symptomatis, quatenus est excrementum mutatum: nam si egrediatur, egreditur quod non deberet

deberet secundum naturam egredi: si detineatur, detinetur, quod secundum naturæ leges non erat detinendum. Iam etiam circa vermium causas digrediemur. Loquemur autem de verme viuento: cuius doctrina explicata, patet etiam de mortuo quid sit statuendum. Generatur autem vermis in intestinis, dum in his colligitur pituita, quæ calido prædita, putrescit: unde dum calor pituitæ robustus, agit in pituitam putrescentem, sole concurrente, procreatur animal vermiculare. Quare vermis est animal vermiculare, toto genere præter naturam, in intestinis genitum, è pituita putrescente, à calido pituitæ robusto. Dicimus esse animal vermiculare toto genere præter naturam: ut pateat natura vermis: siue refertur ad naturam in communi, siue ad naturam humanam. Nam, ut referatur ad naturam in communi: non est elementum, non mistum, sed animal: & secundum Auicennam, non est animal muscale, sed vermiculare: quod idem potest in hac definitione, ac rationale in definitione hominis: denotat enim formam vermis, quæ quia latet, ita est circumscribenda. Si autem vermis referatur ad naturam humanam: est toto genere præter naturam, nam generatur substantia, quæ non deberet generari. Notandum cum Auicenna, si conferatur vermis cum materia adeo putrida, ut vermis ex ea generari nequeat: vermem minus obesse, quam materiam putridam: ideoque melius esse, ut è materia fiat vermis, quam ut materia remaneat secundum se pura, id est, insigniter putrefacta. Deinde diximus: in intestinis genitum: ad differentiam vermium, qui extra intestina generantur, ut in auribus, & aliis partibus. Vermes lati solum in intestinis generantur, è cap. 19. libr. 5. de trist. animal. Cum autem sermo etiam fiat de verme lædente ventriculum, quæritur, an in ventriculo generentur vermes. Respondet Aristoteles cap. 3. lib. 4. meteor. vermes non fieri in cibi coctione, sed in segregata putrefactione in inferiore ventre, qui tamen aliquando sursum ascendunt. Galenus comment. aphor. 26. sectio. 3. tradit, ascarides generari in extremo recti intestini: latos autem vermes generari in omnibus intestinis: rotundos magis in superioribus generari: nec ullam facit ventriculi mentionem. Ratio autem hæc est: Vermes fiunt concurrente materia humida, & viscida: humida, ut putrescat: viscida, ut obtineat calorem robustum: quæ cum desiderantur in ventriculo, non autem in intestinis: iure vermes

*Causarum
vermium
plurimior cō-
sideratio.*

*Vermis;
quid.*

*Locus gene-
rationis
vermium:
& num e-
tia in ven-
triculo gi-
gnantur.*

*Materia è
qua, lum-
bricorum.*

non in ventriculo, sed in intestinis procreantur. Desiderari autem hæc in ventriculo, non in intestinis, patet: nam pituita in ventriculo est mista cum cibo, cum chylo, cum excremento & tenui, & crasso, ac residet in loco amplo: vnde, licet pituita putrescat in ventriculo, non tamen est particeps caloris idonei ad generationem vermium, tum quia ob mixturem aliarum materialium, & maxime excrementi serosi, non potest obtinere lentorem, vt calor robustus seruetur: tum etiam, quia ob loci amplitudinem pituitæ calor dissipatur. Contra, in intestinis pituita est secreta ab alia materia, & detinetur in loco minus amplo: vnde quatenus est separata, non adest materia, quæ eius lentorem refringat: quare calor potens seruetur, maxime quia in intestinis minor est capacitas, & quia etiam spiræ reperiuntur, quæ caloris robori suffragantur. Materia vermium è qua est pituita putrescens: vnde Galenus comment. aph. 26. sectio. 3. ait, vermes fieri è putredine: & Aristoteles cap. 3. libro 4. meteor. ait, vermes fieri in segregatione putrefacta. Aetius dicit, in principio accessionum generari vermes: respicit enim ad substantiam è subiacente corruptione, id est, ad materiam quæ incipit putrescere: quare in principio morborum non fiunt vermes, nisi prius materia incipiat putrescere: deinde addit Aetius, vermes generari in vigore respiciens ad substantiam, quæ putrescit ob malitiam morbi, vt cuius, vt calidi alieni, allicitur calor è materia, vt putrescat: tandem subdit, in declinatione vermes accipere substantiam è permutatione omnium in melius, id est, è materia minus putrescente, quam in statu. Vnde recte scribit Auicennas, satius esse, vt materia suscipiat formam vermum, quam vt remaneat vehementer putrida. Verum in putredine est latitudo: vnde secundum Auicennam, vel est putredo remissa, & tunc fiunt vermes rotundi: vel est vehemens, & fiunt ascarides, nam calor putredinalis magis viger in infernis intestinis: vel est in medio constituta, & fiunt vermes lati. Porro materia putrescens è qua vermum generatur, est pituita: quæ ob humiditatem, & visciditatem ad vermum generationem est idonea. Hinc Paulus dicit, vermum omnium originem prodire è cruda & crassa pituita, putredini accommodata, id est, humida. Auicennas ait, vermum materiam esse phlegma, quod in intestinis calcfit, & putrescit, Notandum autem phlegma in intestinis collectum, esse vermum materiam

materiam dupliciter : primo, vt seruat formam phlegmatis : secundo, vt degenerat in pus pituitosum , veluti in vlceribus : vnde si sanies in vlcere non sit pituitosa , non generatur vermis. E melancholia , bile , sanguine , non fit vermis. Melancholia enim est frigida & sicca : quare longinqua à proportionē vitæ : nec adest calor potens in melancholia ad generandum vermem. Bilis autem ita est calida , vt ex ea non gignatur anima! humidum , seu vermis humidus , ob contrarias complexionēs : cum enim vermis sit moderate calidus , & magis humidus , à vehemēti caliditate bilis ita consumitur humiditas , quæ etiam in bile est exigua , vt non possit vermis generari. Sed nec è sanguine generatur vermis : quia sanguini custodia est attributa , cum omnia membra vehementer sanguine egeant : præterea sanguis proportionē respondet carni, ossi , id est, partibus viuētibz, quibus animal secundum naturam est donatum : non autem vermi : insuper sanguis ad differentiam pituitæ, non est materia quæ funditur ad intestina , & in eis remanet. Quibus verbis innuit Auicē. sanguinem non facile putrescere, cum à natura custodiatur : & si putrescat, non esse materiam idoneam, ad formam vermis suscipiendam, cum sit materia, mutari idonea in carnem & ossa, quorum natura est admodum diuersa à verme : nam vermis collatus ad naturā humanam, est toto genere præter naturam : adhuc sanguis non mutatur in vermem, quoniam non effunditur ad intestina : & si fundatur, non remanet : & si remaneat, grumescit, vnde ita refrigeratur, vt si subsequatur putredo, non sit particeps caloris qui vermis opifex esse queat. Nec obstat, quamuis conspiciatur vermis quandoque rubeus, quandoque flauus, interdum niger : nam id euenit, vel quoniam aliqua portio horum succorum cum pituita miscetur, vel quia à verme aliqua fit subtractio. Nec obstat, quod Paulus dicit, interdum bilem vna cum lumbricis egredi : nam id fit, quoniam bilis petit vel ventriculū, vel intestina. Tandem in definitione diximus : à calore pituitæ robusto : hæc enim est causa efficiens proxima : nam remota est Sol. Proxima hæc causa proponitur ab Aristotele l. 4. mete. cap. de putredine , vbi statuit , generari bestias, quoniam naturalis calor rei putrescentis , idemque discretus ab ambiente, facultatem habet cogendi ea , quæ sunt excreta ab ambiente. Quare vermis fit, dum fit putredo à calore insito rei seu pituitæ putrescētis. Oportet autem calorem

*Causa effi.
proxima.*

calorem esse robustum: nam secus ab alieno calore ita dissimularetur, ut materia tota putresceret, nec in vermem mutari posset. Auicennas hac de causa dicit, vermem fieri à factore potenti. Et Galen. com. aph. 16. sect. 3. dicit, solam putredinem non sufficere ad vermium generationem, verum calorem plurimum requiri. Hinc cum Hippocr. pueri adultiores corripuntur vermibus: nam in valde tenellis, non generatur pituita ita viscida, ut sit particeps caloris ita intensi, ut generet animal. Hæc de definitione.

*Differen-
tia.*

Quoad differentias: cum hoc malum sit numerus auctus præter naturam intestinorum, procedens à verme: Ratione formæ dicendum, numerum auctum esse vel Solum, vel cum Constipatione. Ratione subiecti dicendum, morbo corripit intestina vel Superiora, vel Infima, vel Media. Ratione efficientis, sumendæ sunt differentiæ à verme. At cum vermis sit animal vermiculare, in intestinis genitum è pituita putrescente, à calore pituitæ robusto: ratione formæ, cum Aristot. cap. 9. lib. 5. de hist. animal. & Galeno com. aph. 16. sect. 3. tres sunt lumbricorum species: alij enim sunt Teretes, qui sunt longi, rotundi, graciles, & à nonnullis vocantur serpentes: alij sunt Lati, qui cucurbitini vocantur, nam assimilantur seminibus cucurbitæ: & Gelenus hunc vermem, cap. 17. lib. 14. meth. vocat ceriam, nam fasciam longam & latam præ se fert: alij denique sunt Parui, qui ascarides dicuntur, id est, escam rodentes. Auicennas quatuor species videtur recensere, attamen has tres solum proponit: nam per vermes rotundos & longos, intelligit primam speciem: per rotundos & breues, intelligit ascarides: per latos, siue sint longi, siue breues, intelligit secundam speciem: nam vermes lati & longi nil aliud sunt, quam cōnexus plurimum vermium latorum, sed breuium. Ratione loci, in quo vermes generantur, ita sunt sumendæ differentiæ: cum locus ille sit intestinum: secundum Auicenn. longi & rotundi generantur in superioribus intestinis, & quâdoque ultra cucurbiti longitudinem producantur: vermes lati generantur potissimum in mediis intestinis, id est, in colo, & cæco: quâuis interdum gignantur in omnibus intestinis, ut extendantur ad ventriculum, & sedem: vnde quandoque, ut quidam referunt, longitudine æquant 30. pedes. Ascarides generantur in recto intestino, & magni non euadunt, quia vna cum fecibus excernuntur. Ratione materiæ è qua: cum sit pituita putrida

putrida, à chylo separata : cum Auicenna tripliciter se habet : vnde, si exigua sit tum putredo, tum segregatio, vermes fiunt longi & rotundi : & hæc pituita viget in primis intestinis, in quibus pituita minus secreta est à chylo : & viget calor, vnde non admodum praua euadit pituita. Si autem summa sit putredo materiæ pituitosæ & segregatio, generantur ascarides : & propterea ascarides cum Auicenn. generantur è deteriori materia, quæ in recto intestino exuberare solet. Si autem pituita medio modo se habeat, procreantur larii : & ob id dicit Auicenn. materiam latorum esse vehementius putrescentem, materia longorum : hæc autem pituita redundat in mediis intestinis, & vsque adeo adhæret intestinorum tunicis, vt vermis veluti è tunicis enatus videatur. Hinc Paulus & Aëtius dicebant, latos lumbricos esse quasi mutationem annatæ membranæ in vermem : dicunt quasi : nam vermis non fit è membranis, sed è pituita, & è viscositatibus, secundum Auicenn. fixis in superficie intestinorum, vt membrana in vermem mutari videatur. Tandem ratione causæ efficientis : cum sit calor potens : ab hoc non sumuntur differentiæ, nisi secundum magis & minus : vnde calor magis potens, generat vermem magis viuidum : minus potens, minus viuacem.

Cum autem morbus vermicularis, tanquam à causa continente prodeat à verme : sufficiet de signis vermium dicere. *Signa in genere.*
In genere vermis indicatur ex effectu & causis. Ex effectu, id est, è læsa functione, exeunte mutato, & qualitate mutata. E functione : & primum è rixa, id est, temerario delirio, præterea ex horribilitate locutionis, ex emissionem linguæ, è voce aliquando intercepta, ex insigni intestinorum dolore, eo-que perforatiuo, è conuulsiuo motu, è scalptu narium, è dentium stridore in somno, è siti, ex ira aduersus expergefascientes, è pulsu imbecillo, è motu cordis prauo, vt cor veluti palpitare videatur. Quoad exiens mutatum : indicatur vermis è saliuæ expulso in nocte, vnde os est humidum, è vomitu pituitæ non citra fœtorem, præterea è vermibus excretis, ex egestionem alui sæpe liquida. Quoad qualitatem mutatam : indicatur vermis è ventris tumore, hydropico simili, è labiis per noctem humidioribus, per ciem siccis, ex oris fœtore : (vnde etiam fœminæ agnoscunt vermes :) præterea è mutato oculorum colore. Quoad causas : indicatur vermis, è prægressis causis, quæ vermium opifices esse possunt. Horum

rum signorum causæ facile patent ex Auicenna, præsertim cum omnia signa pendeant à vi vermium putrilaginosa, quæ in consensum ducit cor, cerebrum, & ventriculum.

Signa differentia-
rum.

Quoad signa differentiarum: ratione formæ, cum sint vermes longi, lati, & ascarides: longi indicantur è dolore prope fundum ventriculi, ac si patiens mordeatur: indicantur etiam è noxa attinente ad ventriculum, verbi gratia, è nausea, siti, cibi inappetentia, singultu, & difficultate deglutendi. Lati indicantur è fame: nam alimentum absument, vnde tempore famis. symptomata intenduntur: indicantur etiam è deiectione simili seminum cucurbitæ. Ascarides indicantur è pruritu ani: vnde patiens ratione pruritus se vehementer scalpit, & vi pruritus quandoque syncope oboritur.

Quoad reliquas differentias: circa has non est laborandum: nam si capiantur à loco, in quo generantur vermes: dum cognoscimus vermes esse rotundos, cognoscimus etiam generati in superioribus intestinis, &c. Ita si differentia sumantur à materia è qua: dum patet vermes esse rotundos, constat etiam generari è materia, minus & separata, & putrida, &c. Si capiantur differentia ab efficiente: cum differentia sit solum secundum magis & minus; quemadmodum vermis procreatur à calore magis vel minus potente: ita cognoscimus has differentias è verme, ut est vel magis, vel minus viridus: vnde magis viuax, magis mordet: & si, dum excernitur, magis mouetur, est etiam magis viuax. Medicus ergo vermes excretos inspiciat.

Indicationes.

I.

II.

Quoad prædiciat indicans ex usu est vermis. Cum autem vermis sit animal, genus è pituita putrescente: ob id indicationes sunt sumendæ à verme, tum quatenus est animal, tum quatenus sit è pituita putrescente. Ideoque perpédenda species, vitium, & causa generans. Quoad speciem: hæc duplex est: nempe animal & pituita: à quibus prodeunt prædicia determinata, quæ diriguntur vel ad vermem, vel ad pituitam. Quoad vitium ratione vermis, quatenus est animal: vitium spectat ad substantiam, quæritatem, qualitatem & motum. Ad substantiam pertinet, quatenus vermis est substantia tum animata, tum in toto genere præter naturam. Quatenus est substantia animata & vita prædita, indicat remedium exanimans & mortiferum: vnde, cum vita seruetur ope substantiæ dulcis, & destituatur vi amaritudinis: iure Galen. lib. 7. simp. cap. de brassica, statuit enecantia vermes esse

esse amara: vt enim dulcia vertuntur in substantiam vermium, vnde vermes seruantur: ita amara, cum inepta sint pro vermium nutritione, vermes enecant. Nec præter rationem vermis, quatenus substantia animata, indicat mortiferum: nam vermis mortuus facilius expellitur, siquidem viuens, vicinas intestinorum partes apprehendit: mortuus autem cum fecibus vacuatur. Si deinde vermis capiatur, vt substantia toto genere præter naturam: indicat eradicans. Vitium quantitatis hoc loco perpendendum non est: cum remedium eradicans omnem quantitatem dissipet. Quoad vitium in qualitate: cum vermis sit calidus & humidus, indicat refrigerans & siccans. Quoad motum, hic duplex est: alter, vt vermis petit ventriculum, & hinc sursum mouetur: vnde indicat retrahens infra, siue retractionis causa sit, vt vermis fugiat, veluti dum amara supra vsurpantur: siue illa causa sit, vt vermis non fugiat, sed alliciatur, veluti dum dulcia infra vsurpantur. Alter motus est, dum vermes fugiunt amara, vi quorum expedit, vt vermes interficiantur. Quare, cum vermis moueatur procul ab amaris, indicat attrahens ad amara, hoc autem est dulce.

Quantum ad pituitæ vitium vt putrida, indicat eradicans: & si eradicari nequeat, vt copiosa, indicat minuens: vt humida, siccans: vt viscida, detergens: vt mouetur ad intestina, retrahens. Ratione causæ generantis: sufficit perpendere præsidia, causa pituitæ: nam nisi generetur pituita, vermis non potest generari. Vnde si verbi gratia, pituita generetur ob ventriculi mala, ob vetriculi, scilicet intemperiem: huic contrariis occurrendum, vt suo loco docuimus.

III.

Morbus hic non exigui est momenti, cum vigeat insignis vehementia essentia: est enim maximus recessus à naturali statu, tum ratione vermium, qui toto genere sunt præter naturam: tum ratione materia: è qua, cum sit materia putrida. Quare ob insignem vehementiam essentia, non raro præter vehementiam dignitatis, subsequitur vehementia facultatis, vt patientes periclitentur. Vnde Paulus dicit, plerisque, nulla lumbricorum cura habita, à vermibus fuisse exesos, & conuulsos obiisse.

Prognost.
ca in gen.

Cæterum hæc mala intendantur & remittuntur pro varia vehementia differentiarum, & patientis robore, ac imbecillitate. Cum autem huius vitij differentia capiantur à vermibus forma, & materia pituitosa: expedit perpendere vim speciei vitij

Prognost.
different.

vitij & causæ generantis. Vnde quoad vermem, & primum quoad speciem, cum sint tres species: Auicennas statuit minus prauos esse ascarides: deteriores esse teretes: deterriores esse latos & lōgos: nam si lati sint & breues, his peiores sunt teretes. Ratio Auicennæ est: quia, licet ascaridum materia sit magis putrida, tamen minus periculum imminet, quatenus ascarides & parui sunt, & cum fecibus prompte expelluntur, & præterea à visceribus magis distant: nam, ut sunt parui, significant vitium in genere exiguum: ut cū fecibus facile expelluntur, significant viciū in quiete remissum: ut distant à visceribus, colligere licet, vehementiam dignitatis non esse insignem. Quod si vero contingat, ut ascarides sint magni, & diu detineantur: omnia, secundum Auicennam, sunt intentissima, succeduntque syncopæ & mortes. Dum enim ascarides vastiores euadunt, ininsigne est vitium in quantitate: quatenus autem diu detinentur, est vitium vehemens in quiete: & ut syncopas pariunt, est insignis vehementia facultatis. Lati vermes si etiam sint longi, sunt deteriores longis & rotundis: quamuis enim in rotundis magis possit vehementia dignitatis, quatenus generantur in superioribus intestinis: tamen in latis & longis materię vitium in forma est vehementius: & similiter secundum quantitatem & visciditatem: & præterea, ut pertinaciter quiescunt: & tandem adest dignitas vehementiæ, cum lati attingere possint etiam ad superna intestina. Secus statuendum, si lati sint teretes. Et hæcenus de prognostico à specie. Quoad vitium speciei: primum, si capiatur secundum substantiam, quatenus vermis est substantia animata: referri potest ad alium vermem, vel animatum, vel defunctum. Si referatur ad animatum: cum Aërio vermes rubri, sunt peiores albis, quoniam rubri aluntur sanguine, & hinc probum alimentum consumunt: contra, albi nutriuntur pituita: & ob id in rubris locum habet vehementia insignior essentiæ, cum magis aduersentur naturæ vermes rubri, quam albi. Si autem vermis referatur ad mortuum: cum Aërio viuentes sunt defunctis deteriores: contra, cum Auicenna, defuncti sunt peiores viuentibus. Aërius respexit ad vehementiam essentiæ: ratione resistentiæ, aduersus non virtutem, sed medicamentum euacuans: nam ægrius excernuntur vermes viuentes, unde expedit illos interficere: quare vermis viuens, est signum vehementiæ insignioris ratione resistentiæ. At Auicennas

cennas respexit ad vehementiam essentia, aduersus virtutem, ratione materiae est quoniam quo magis putrescit materia eo breuioris vitae creantur vermes. Vnde vermis defunctus est signum insignis vehementiae essentiae, materiae putrescentis, in corpore exsuperantis. Quoad vitium secundum quantitatem: patet, vermes maiores, & numerosiores, deteriores esse paruis, paucioribus: etenim, dum vermis est maior, vel numerosior, maior est recessus à naturali statu, & propterea insignior est vehementia essentiae: quae referri potest in virtutem, ut, magis laedit: & in medicamenta, ut magis resistit. Quoad vitium secundum qualitatem: vermis calidior est peior: nam est magis viuax, & hinc magis recedens à naturali statu: vnde adest vehementia essentiae ratione virtutis, ut magis laeditur: praesertim ut patiens magis mordetur. Et praeterea adest vehementia essentiae ratione praesidiorum: cum facile non cedant interficientibus medicamentis: quia scilicet vermes sunt magis viuaces, Quoad vitium in quiete: vermis est deterior, quo magis detinetur. Vnde dicit Auicenna, ascarides, si diu detineantur, esse periculosos. Quoad vitium secundum motum: perpendere oportet tempus, & terminum ad quem. Quoad tempus: cum Auicenna & Graecis satius est, ut vermes generentur circa declinationem morborum, quam circa vel initia, vel vigorem: nam dum vermis inter initia egreditur: significat insignem putredinem, vi cuius natura intempestiue ad expellendum impellitur. Dum vero vermis in vigore egreditur: significat immodicam malitiam, vnde totis viribus natura nititur vermem expellere. At si circa declinationem: significat mutationem in melius. E dictis igitur colligendum, vermem inter initia egredientem, esse signum vehementiae insignis essentiae materiae morbificae: dum autem egreditur in vigore, esse signum insignis vehementiae, & essentiae, & facultatis: dum in declinatione egreditur, esse signum remissae vehementiae, tum essentiae, tum facultatis. Quoad terminum ad quem: cum Galeno comm. 18. lib. 2. prognost. melius est, ut vermes deorsum pellantur, quam ut sursum ascendant. Vnde pessimum, si moliantur ad peritonaeum vermes: & si, ut Paulus notat, ex inguinibus erumpant. Quoad vitium speciei, ut dirigitur ad materiam est quia: patet malum esse periculosius, ut pituita haeret magis vel putrida, vel copiosa, vel viscida, vel quiescens: siquidem tunc essentiae vehem-

mentia est insignior. Quoad causam generantem, perpendenda hæc est causa potissimum pituita: vnde vario modo prognosticandum, pro varia ventriculi conditione, vt alibi diximus. Verum addendum: propositas vehementias intendi, si cum vermibus annectatur vel febris, vel alui profluuium. Nam multiplex malum peius est quam simplex. Præterea, quoad febrim: febris primum vermium alimentum absumit, vnde vermis magis affligit: secundo, cum calor febrilis vermem infestet: vermis redditur magis insensus. Tertio, febris, vt postulat frigida, prohibet calida, non permittit amara: quare est in causa vt vermis non pereat, & hinc perseveret vehementia vermium. penes vitium secundum substantiam. Quarto, si febris sit putrida, cum vigeat putredo, exsuperat materia, è qua vermis producitur. Quare febris est signum multiplicis vehementiæ essentia insignis, & vermis, & materia è qua. Quoad alui profluuium: cum Autenna satius est, si vermes vna cum fecibus exeant, quam si alui fluxus sit coniunctus: nam feces citra spirituum iacturam excernuntur: alui autem fluxus languorem inducit, præsertim si fuerit fluxus alui sanguineus. Quare alui profluuium est signum insignis vehementiæ facultatis. Tandem vehementia quælibet insignis indicatur, & potissimum facultatis, si anhelitus sit frequens, frigidus, intumescat corpus: & præsertim si oculi immoti conspiciantur, prorsus desperandum est, quia summa est facultatis vehementia.

*Curgatio.
Chirurgia.*

Quoad præsidiorum materias: in hoc malo, venæ sectio non probatur: nam per venam sectam nec vermes, nec materia è qua, id est, pituita, euacuantur. At si forte cum hoc malo sit annexum malum sanguineum: probatur venæ sectio. Quod si aliquis obnoxius vermibus sit, propter copiosam pituitam, quæ in ventriculo generatur: probari possunt fonticuli in cruribus, ad præseruandum.

Pharmacia.

Phlegmago.

Quoad medicamenta: hæc diriguntur vel ad Patientem non lactentem, vel ad Infantem exsurgentem lac. Quoad patientem non lactentem: materia medicinalis est duplex: alia respicit Materiam è qua, alia Vermes. Respicientia materiam è qua, diriguntur ad Pituitam: & vel ad Vitia pituitæ, vel ad Causam generantem: de quibus in sermone de intemperie ventriculi diximus. Nunc sufficiat admonere: si pituita tantum resideat in primis ductibus, præsertim probari

• *bari species hiera* : Si autem etiam in toto abundet , probari *agaricum* , non *rhubarbarum* (quod plerique usurpant) licet enim hoc amarore suo prosit ad enecandos vermes : nocet tamen , ut alliscit non pituitam , sed bilem : inde enim relinquitur pituita , qua dominante , sopores , epilepsia , apoplexia , & mortes succedunt . Quare pro pituita in toto exsuperante probatur *agaricus* , cuius vi educitur pituita , & cum Mesue egreditur etiam vermis : siquidem amaritudine *agarici* vermes pereunt : & ob vim soluentem , vna cum pituita egrediuntur . De usu autem *agarici* in sermone de affectibus ventriculi diximus .

Medicamenta , quæ vermes respiciunt , sunt Interficiencia , Allicientia , Eradicantia . Interficiencia seu enecantia vermes enecant vel Citra astringentiam , vel Cum astringentia . Si cum astringentia : astringunt vel Leuiter , vel Insigniter . Calidis vtendum , si febris non inhibeat : frigidis autem , si febris urgeat . Non astringentia usurpanda , si aluus non sit lubrica : probantur astringentia si aluus fluat : & , si moderate fluat , leuiter astringentia probantur : sin autem larga sit fluxio , ascendendum ad magis astringentia . Calida interficiencia citra astringentiam , diriguntur vel ad Omnes vermes , vel potius ad Vnicam speciem .

I. *Necantia lumbricos.*

Quoad priora , quæ respiciunt vermes indifferenter : *Auicenna* cum reliquis probat *abrotanum* , *costum amarum* , citri semina & cortices , *persicariam* , *persici folia* , *persicorum nucleos* , *scordium* , magnas antidotos , sed antiquas . Teretes vermes magis respiciunt , *absinthium vulgare* , *santonium* , cuius semina saccharo condita sunt in communi usu : hoc autem medicamentum & interficit vermes , ratione amaritudinis seminum , & eosdem allicit , ratione sacchari . Vti etiam possumus *lupinis amaris* , *centaurio minore* , *ruta* , *hyssopo* , *ina* , *nasturtio* , *præstio* , *thymo* , *cymino* , *heliotropio minore* . *Democritus* maxime probat *stercus muris pulverisatum* . Latos magis iugulant , *anchusa* , *lauri bacca* , *cardamomum* , *nigella trita cum sale* , *filix mas* & semina : quamuis *filix femina* in feminis sit suspecta , quoniam è sententia *Dioscoridis* est causa sterilitatis . *Ascarides* ab iisdem necantur , à quibus lati .

Frigida enecantia sunt , *acetum* , *hordeum* , sed cum cortice , *cornu cerui* , *lactuca agrastio* , *succus citri* , *limonis* , *arantii medijs saporis* , sed sumantur hi succi à fructibus maturis , nam immaturi astringunt : probatur *oxymeli* , *syrupus acetos* , *simplic* . Actius

probat vermes terrenos siccatos, num. viij. cum sapa, aut cum mulla. Probatur etiam radix graminis qua in communi est usu: nam è libro sexto simplicium, hac radix est frigida, sicca, subdulcis, subacris, subacerba: qua frigida & sicca, aduersatur vermi calido & humido: quatenus est subdulcis, allicit vermes, ne fugiant ab interficientibus: quatenus est subacris, vermium humiditatem absumit: quatenus est subacerba, diu moratur: vnde efficaciter agit in vermes: nec aluum reddit stipticam, cum leuis sit astringentis, præsertim cum sit subdulcis, subacris. Probatur etiam oleum: vnde cibi oleo potius sunt condiendi, quam butyro: contra clysteres parandi: nam butyrum allicit vermes: ab oleo fugiunt: etenim, sicuti butyrum est acrimonie expers, ita oleum, è cap. 18. lib. 2. simplic. nisi beneficio artis candidum reddatur, non est expers mordacitatis, siquidem mordax est portio olei serosa.

Quoad interficientia quæ vna astringunt, & primum quæ leuiter astringunt: sunt rose, cichorium, mastiche, cortex radices mori, & cum Ætio absinthium, portulaca, myrtus, sumach, plantago, &c. Hæc de interficientibus. In quorum usu notandum: quod vermes necantia non debeant balani forma administrari, nisi in ascaridibus. Præterea, si superiora intestina afficiantur, & vermes ad ventriculum ascendant: clysteres allicientes parari debent: si descendant, & affectio spectet ad intestina crassa: clysmis amaris vtendum, qui vermes attingere possunt: non autem glandibus amaris, quæ non ultra rectum intestinum possunt ascendere: ideoque in vermibus longis & rotundis locum habent balani allicientes: nam interficientes, quia non statim possunt vermes attingere, & in eos agere: faciunt vt sursum repant: quod in enematis non in metuendum, quæ contactu statim necant.

Quoad Allicientia: hæc locum habent, dum vermes viuunt: & plerunque interficientibus misceri solent. Accedunt autem ad calidum & humidum: & sunt pingua: vt saccharum, mel, faui mellis, lac, butyrum, adipis, sapa, medulla expertes acrimonie. Porro, quoad vbi agendum: dum vermes in ventriculo subsistunt, allicientia non sunt per os exhibenda, sed per sedem, ne vermes ascendant. Glandes hoc in casu non debent oleo inungi, quod inimicum est vermibus, nec eos prolektare potest. Si vermes in ventriculo subsistentes ad os habeant impetum, & homo facile euomat: allicientia in ore sunt

sunt detinenda, non deuoranda, vt saccharum, & os sape lacte collendum, vt alliciantur. Expellentia & eradicantia, vt plurimum sunt amara: vt aloë, eaque non losa, si robustus sit patiens: unde maxime probantur species hiera, item pilula Ruffi, & agari-
cus, carthamus, iris, decoctum ebuli, epithymi: ascendere etiam licet ad veratrum nigrum & colocynthidem. Paulus etiam euphorbium & scammonium exhibet: ideoque nec rhabarbarum improbandum videtur. Sed notandum: scammonium & rhabarbarum, vt bi-
lem allicientia, improbari in vermibus, quemadmodum su-
pra diximus: probari autem, quatenus amarore vermes in-
terficiunt, acrimonia absumunt vermium humiditatem, & expultricem irritant. Quare si bilis in toto reperiatur, & ver-
mes subsistant in primis viis: hæc medicamenta probantur, vel citra minimam dosin, vel ad summum in minima dosi: quoniam enim non vacuare bilem, sed amarore vermes necare est animus: iccirco subsistimus infra minimam dosin, qua non allicitur bilis, sed vermes iugulantur. His addi possunt
filla. Cum Actio probatur oleum omphacinum, ad 3 j ss. Quoad
usum: licet summa sit actio vermium: non tamen simpliciter summa dosis soluentium exhiberi debet, & præsertim bi-
lem ducentium: vnde rhabarbari summa dosis erit 3 j. scam-
monij ḡ v. Præterea quoad vbi: iniucunda, vt fel, possunt
vmbilico aptari. Interficiencia supra vmbilicum applicari debent, ne ascendant vermes, dum fugiunt medicamenta: at
euacuantia ipsi vmbilico sunt imponenda. Circa ascarides notandum, quoad vbi agendum: posse per inferius amara
administrari. Vnde Aetius quandoque ascendit ad pastillos
Andronis, qui vehementer siccant, & materiam vermium,
nimirum pituitam, siccando absumunt.

3. Expel-
lentia.Cholagoga
quatenus
usurpan-
da.

De Victuratione.

Quoad Dietam: notandum, an asit febris, & alui proflu-
uium, nec ne. Si enim non asint: cum Auicenna probantur
cibi calefacientes & siccantes, attenuantes, detergentes, ex-
pertes pinguedinis & dulcedinis, & potius acres, vel acidi: hi
enim cibi calefaciendo & siccando prohibent pituitæ ge-
nerationem: siccando aduersantur humiditati vermium: at-
tenuando crassam pituitam attenuant: detergendo viscidam
dissipant, & vermes hærentes mouent: quatenus autem ci-
bus est expers dulcedinis & pinguedinis, adimitur vermibus

Dietæ.

alimentum, Vnde Aetius probat allium: *Auicenna probat inscicerum, folia caulium, olinas salitas, nuces siccas, amygdalas, persica, feniculum sale & aceto conditum, cappares, carnes salitas, carnes columbi siluestris.* Victus tenuis improbat: alias enim vermes magis rodunt intestina & ventriculum: ideo parum cibi, at sæpe exhibendum. Potus proportionē respondebit. Quod si patiens febricitet: probantur cibi parati ex hordeo, & cum *Aetio* est prisana, decocta cum plurimo oleo omphacino. Cibi condiantur aceto, acido citri, &c. Si annexus sit fluxus alui: cum *Auicenna* cibi condiantur *rhoe opsoniorum, seu simach, succo granatorum, omphacio, aceto ros. & similibus.* Si alius sit nimis auarus: cum *Aetio* probatur *balua, cum decocto sebesten, prisana cum cum copioso oleo omphacino.* Et his vtendum, si patiens non sit lactens.

*Cura infan-
tium.*

Si autem patiens sit infans lactens: diriguntur materię ad Nutricem & Infantem. Ratione nutricis conueniunt iam proposita medicamenta. Ratione infantis probatur *fel tauri, vel aliorum animalium, probatur aloe, farina lupulorum, mel:* Et hæc sunt applicanda vmbilico. Expedi etiam allium admo-
uere prope os infantis. *Aetius probat sales granum in ore detentum, ut liquefiat, & deglutatur: nam vbi accedunt, vermes statim subsident.* Probantur glandes e melle. Si pruritus vrgeat, cum *Aetio* ignitis lapidibus anus fouenda, quia pueri non possunt perferre pruritus. Incantamenta ouulto: non enim ad rationalem medicum pertinent: & si quis scire cupiat, videat *Sauonarolam* in sermone de vermibus.

Hæc dicta sint de morbo vermiculari intestinorum.

CAPVT XV.

De Alui seu intestinorum fluxu, in genere.

Nomen.



Intestina sunt instrumenta, per quæ egrediuntur excrementa crassa primæ coctionis, dum homo secundum naturam est constitutus. Quod si materia per hos digestus non secundum naturam egreditur: oboritur illud vitium, quod vocant alui profluvium: quando scilicet per alium egreditur materia, quæ non deberet egredi. Generatur hoc vitium, dum intestinis occurrat causa morbifica, cuius vi læditur ipsorum retentio. Profluvium igitur alui, est exiens mutatum materię morbificæ: dependens à læta retentione intestinorum. Forma est calens:

Generatio.

Definitio.

Forma.

Exiens: ad differentiam excrementi quod detinetur, vt contingit in alui stipticitate. Exiens mutatum dicitur: ad differentiam excrementi secundum naturam. Matertæ morbificæ: ad differentiam simpliciter secum, quæ sunt excrementa secundum naturam.

Hæc materia morbifica, quæ egreditur, necessario est mixta: ad differentiam vaporis: nam si soli flatus erumpant, non est alui fluxus. Porro hæc materia morbifica, est cibus, comit. lib. 1. prognost. cap. 11. lib. 1. de cras. Cibus autem bifariam perpenditur: primum, vt Non est mutatus: secundo vt est Mutatus in ventriculo. Si egrediatur cibus non mutatus: fit fluxus Leientericus, Cæliacus: vt differentia sit solum secundum magis & minus. Si autem cibus sit mutatus: mutatio consideratur secundum triplices coctiones. Quoad mutationem primæ coctionis: hæc materia est vel Alimentalis, in quam mutatur cibus in prima coctione: vel Excrementitia. Si alimentalis: fit fluxus Chylosus, quia chylus egreditur. Materia excrementitia primæ coctionis, est excrementum stercorolum, crassum: vnde appellant fluxum Stercoralem. Si consideremus hanc materiam, scilicet cibum, vt mutationem suscipit in secunda coctione: vel est materia Alimentalis, vel Excrementitia. Si alimentalis: est sanguis: quare fit profluuium sanguinis, quod largiori voce dicitur Dysenteria. Si materia fuerit excrementitia: quandoque est Humor, quandoque Ichor. Per humorem intelligimus excrementum Biliolum, Melancholicum: per ichores, quemlibet succum alimentalem: & dicitur hic fluxus Diarrhœa, communi voce profluuium. Si consideretur mutatio in tertia coctione: est materia vel Alimentalis, vel Excrementitia. Per alimentalem intelligimus materiam pinguem, pinguedinem; humiditates alimentales: vnde fit fluxus, qui dicitur Colliquatiuus. Si vero materia sit excrementitia, non potest esse nisi præter naturam: & solet in ea copia generari: vt, si defluat per intestina, excutetur profluuium alui. Hæc materia duplex est: alia pertinet ad solum Cerebrum: alia potest spectare ad alias etiam partes. Ad cerebrum pertinet: quando excrementum tertiæ coctionis ipsius cerebri, quod vocant pituitam seu mutum, demittitur ad intestina: & appellatur profluuium Cerebrale, catarrhale. Ad alias partes spectare potest excrementum, sed potius internas: quando in harum partium ab-

*Materia
morbifica
quod duplex.*

*Vitia materia mor-
bifica.*

scelsibus generatur copiosum pus, quod ad intestina fluit : & dicitur fluxus Purulentus. Sed accidit etiam interdum, vt per aluum reiciantur calculi, vermes: quos tamen nos non proposuimus : quia in fluxu alui præcipuas materias attulimus, cum quibus accidit quandoque, vt vermes & calculi sint cōiuncti. Hæc de materia morbifica : & quoduplex ea sit. Iam explicandum est, quot modis materia morbifica peccet. Peccat autem in substantia, Quantitate, Qualitate, & vbi: cap. 2. & 6. lib. 8. de placicis. In substantia: si exiens corrumpatur, & acquirat formam toto genere præter naturam, quandoque remissa, quandoque insignis actiuitatis : verbi gratia, si in febris pestilenti fiat fluxus materie pestilentialis : hæc enim materia suscepit mutationem secundum substantiam, & formam accepit inaximæ actiuitatis : dantur enim gradus : ad quod interdum respiciens Galenus, dicit : febres pestilentes ab aliis differre, secundum excellentiam putredinis. Vitium in quantitate est : quando materia, collata cum iis, quæ per os assumpta sunt, quantitate excedit. Vitium in qualitate, est in Prima, vel Secunda: in prima: vt si fiat fluxus materie calidioris, vel frigidioris: in secunda : vt si fiat fluxus materie immutata secundum colorem, odorem, vel consistentiam. Tandem si motum perpendimus localem, seu latitudinem : quoties in fluxu materia præter naturam mouetur, dicitur peccatum in motu : vt sit fluxus Symptomaticus. Addimus in definitione, profluuium alui : ad differentiam profluuij aliarum partium.

Causa efficiens.

Vltimo dicimus: dependens à læsa retentione. Sermonem enim in præsentia habemus de symptomate secundo: ad differentiam primi, id est, læsæ actionis (*primum dicitur symptoma, quod immediate morbum sequitur: secundum, quod sequitur primum: ut hoc loco exiens mutatum. cap. 2. libro 3. de caus. symptom.*) Retentio autem quia prorsus est fieri, vt omnis actio, nihil indicat: ideoque causæ læsionis afferendæ. Retentio læditur, quando eius facultas frustratur. Frustratur autem primario facultas retentrix intestinorum, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læsiō facultatis fit ob morbum, qui pertinet ad intestina : & vel occupat intestinorum Tunicas, vel Vasa. Si tunicas: est intemperies insigniter humida : vnde potissimum contingere solet cœliaca. Si ad vasa spectat: est morbus vel in Compositione, vel in Soluta vnitatem. Si in mala compositione: pertinet ad Poros vasorum, & est

Frustratio retentrix: 1. primario.

& est diapedesis : vt fiat fluxus sanguinis per aluum, per diapedesin : vel occupat Orificia vasorum : & tunc sit profluuium sanguinolentum, per anastomosin. Si in soluta vnitae: sit fluxus sanguinolentus à *disiunctis*. Error externus, est materia inmodica, quæ non potest à retentrice detineri. Si facultas intestinorum retentrix secundario frustratur : id accidit, quia frustratur vel Expultrix intestinorum, vel Motrix destinata à natura propter alui excrementa detinendum. Expultrix quandoque læditur ob Vlcus, vt sit in dysenteria: quandoque ob Inflammationem. Quibus vitiis existētibus, materia irritat expultricem non quia habet vim mordendi: nec quod sui copia extendatur, sed pondere: vt colligitur è cap. 13. lib. 3. facult. natural. vbi Galenus vult expultricem insurgere ad expellendum, non modo ratione morfus, vel copix: sed etiam ratione ponderis. Per pondus intelligit materiam, quæ propria ratione ob sui copiam, non deberet quidem aggrauare: sed aggrauat tamen, quia relata ad vires sit ponderosa: vt contingere solet, quando intestina sunt affecta vlcere, vel inflammatione. Præter morbos expultricis potest esse error externus : vt materia copiosa, mordax. Causa denique lædens est motrix pertinet ad ani musculum, cuius officium est partem occludere, vt non assiduo excrementa reiciantur & expellantur: hic musculus si paralyti afficiatur: oboritur fluxus alui : & hac ratione retentrix intestinorum non propria ratione, sed ex accidenti frustratur.

2. Ex acci-
dente.

Cum sermo fiat, de profluuiio alui in genere : differentia debet capi à materia quæ fluit: à loco, vnde fluit: & à causa efficiente. A materia fluente tot sumi possunt differentix, quot species & vitia materix morbosicæ supra sunt proposita. Quoad locum, vnde fluit : materia fluit vel à Toro, vel à Parte, vel ab Hac, vel ab Illa : & ab intestinis vel Supernis : vel Infernis. Quoad causas efficientes profluuium alui fit, quando frustratur retentrix, vel Propria ratione, vel ex Accidenti.

Differentia.

Vitium hoc in genere pater. Quoad differentias, primo quæ à materia capiuntur : materia quæ egreditur, oculis subiicitur : an sit cibus qualis assumptus est, an chylus, an feces, & quæcunque alia materia. Quoad vitium : peccatum in substantia, id est, corruptio, cognoscitur è fœtore, supra naturalem fœtorem : è morfu, vbi enim corruptio & putredo, ibi calor extraneus, & materia mordax. Vitium

Signa dif-
ferentia à
materia.

in quãtitate cognoscitur, si exeuntia sunt in maiori quantitate, quam conueniat pro ratione assumptorum. Vitium in qualitate cognoscitur: verbi gratia, si materia peccet secundum caliditatem, ægri testabuntur in exitu se sentire materiam calentem: & præterea indicatur ex acrimonia: si materia peccet secundum frigiditatem, contra. Vitium in qualitate secunda facile patet: mutatio scilicet secundum consistentiam, colorem, &c. Quoad vitium in motu locali: cognoscitur profluuium non criticum, sed potius symptomaticum, è mala tolerantia patientis: & quia in lotio coctionis indicia desiderantur. Quoad differentias termini à quo: materia fuit à toto, si prægressa sit totius corporis repletio: verbi gratia, si quis consueuerit pati fluxum sanguinis per hæmorrhoides: & hæc excretio post supprimatur, & sequatur profluuium sanguinis, præsertim melancholicis: signum est materiam collectam in toto esse, & à toto fluere. Idem de parte statuendum: materiam scilicet potius ab hac parte, quam ab alia prodire, ob dispositionem partis, &c. verbi gratia, si quis copiosissimam habeat euacuationem per os, & per nares excrementi pituitosi cerebri: & cohibita hac euacuatione succedat profluuium alui pituitosæ materię: tunc cognoscitur prodire à cerebro. Et sic de reliquis. Causa efficiens cognoscitur è propriis vitiis: verbi gratia, si erunt signa humiditatis immodicæ: iudicandum est labefactatam retentricem facultatem. Cognoscitur autem humiditas, quia celerrime & citra morsum euacuantur, quæ ingeruntur. Si morbus pertinens ad retentionem sit diapedesis, vel anastomosis, vel diæresis: egreditur sanguis: de quibus in sermone de sputo sanguinis, capit. 6. libr. 2. Si hoc malum sit vitio expultericis: aderit inflammatio, vlcus. Signa autem sunt, intestina his vitiis detineri: dolor, febris, &c. de quibus cap. de Dysenteria. Si vitium spectet ad facultatem motricem: aderunt signa paralysis illius musculi: de quibus alias: item iauitis ægrotantibus, & citra morsum egredietur materia.

Signa differunt, à causa efficiente.

Indicationes.

Indicationes vtilis, capiuntur ab Exeunte, & Efficiente. Ab exeunte, primo à peccato exeuntis materię: vt si vitium in substantia, eradicandum: in qualitate, alterandum contrariis: in quantitate, minuendum: in motu, retrahendum. Ratione efficiētis: si capiantur indicationes à morbis, quorū vi facultas frustratur, retentricis morbus, scilicet immodica humi

humiditas, indicat siccum. Quoad morbum secundum valas diapedesis indicat densum : anastomosis, astringens : diarexis, agglutinans. Quoad morbos expultrici : si fuerit vlcus, patet indicatio : si inflammatio : itidem indicat. ^{sup}patet, e doctrina de tumore ventriculi. De paralyfi musculi alias.

In genere de periculo nihil certi potest statui. Quoad dif- Prognost.
ferentias igitur formales si c proposita sit materia, eius tum 1.
species perpendi debet, tum vitium. Quoad speciem : si est fluxus cibi non mutati : est admodum periculosum, quia materia est vehemens ratione dignitatis, scilicet ventriculi : quia laesa est actio principalis, nimirum coctio ventriculi. Adest etiam vehementia essentiae, quia est insignis recessus ab excremento naturali. Adest vehementia facultatis corpus regentis : quia ubi cibis egreditur, quemadmodum assumitur, virtus ferre non potest. Ideo fluxus cibalis maxime est periculosus, & lethalis : si scilicet vires infirmæ sint, & fluxus diu duret. Fecum fluxus, non est admodum periculosus : quia in hac materia non est triplex illa vehementia. Similiter etiam discurrendum circa materiam exeuntem, quæ generatur in secunda, & tertia coctione. Notandum : ceteris paribus alui profluuium semper magis esse periculosum, quoties egreditur materia alimentalis, quam si excrementitia : vnde fluxus sanguinis periculosus est maxime autem colliquatiuus. Quoad materię vitium : si est in forma, dum scilicet exiens est corruptum : profluuium satis est periculosum : præsertim quia adest vehementia facultatis : nam omnis materia corrupta, est maligna, mali moris, quæ duo pertinent ad vehementiam facultatis : ceterum intenditur hoc periculum, prout forma est maioris æstiuatatis. Si vitium in quanto : malum periculosius, si in maiori copia egreditur : quia ubi maior copia materię, ibi maior recessus à naturali statu, maior vehementia essentię, & facultatis. Si vitium in qualitate : fluxus periculosior, ob vehementiam essentię, qui magis à naturæ modo recedit : verbi gratia, fluxus atræ bilis periculosus, quia peccat in qualitate est insigni. Vitium in motu eo periculosius, quo maior impetus : tunc enim maior vehementia essentię. Quoad subiectum : profluuium est magis periculosum, si intestina superna afficiantur, quam si interna : quia maior dignitatis vehementia. Quoad efficiētes : si perperamus morbos, vt vehētiōres sūt, ita fluxus periculosior. Si humida intēperies :
non est

non est ita desperandum : licet augeatur periculum, si hæc fuerit in habitu : quia adest vehementia essentia. Si in causa sit diapedesis, vel anastomosis : est levis vehementia: multo peius est alui profluuium, si sit diuresis.

Quoad expultricem : si morbus sit inflammatio: pro vehementiori vel remissiori inflammatione varie prognosticandum. Similiter dicendum de ulcere : quemadmodum diximus de tumore, & ulcere ventriculi. De morice, seu paralyfi alias. (In prognosticando respicimus ad vehementiam rerum præter naturam, & ad virtutem. Vehementia facultatis, non pertinet ad vires, sed ad res præter naturam. Quando enim consideramus vires, tum consideramus res secundum naturam: prout scilicet virtus est robusta, vel imbecillis. Declaro: Si materia sit mordax, cuius ratione dolor excutitur, & alui profluuium: hoc non pertinet ad res secundum naturam, sed præter naturam: quia. perpendimus materiam, quæ ita est mali moris, ut non rogatur. Amplius vero in eodem subiecto proposito, dum rationem materia illius mordacis, excitatur animi deliquium: consideramus, an patiens sit iuuenis, vel senex: boni habitus, an mali: carnosus, an emaciatus: & hoc est respicere ad vires.) In alui profluuiio si vires sint imbecilliores, est periculosum. Ideo Hippocr. aphor. 12. sect. 5. in tabidis fluxum esse lethalem dixit quia in his virtus debilis. Et Galen. c. 5. lib. 2. ad Glaucon. qui scirrho hepatis tenentur, si corripantur alui profluuiio, sit esse lethales: quia vires succumbunt. Ita, cæteris paribus, magis periculosum est profluuium, in senili ætate, in puerili quam in florente, quia vires citius collabuntur. Idem iudicium est de temperatura & habitu, quatenus sunt signa virtutis debilis, vel robustæ.

*Curatio.
Venæsect.*

Quoad venæsectionem : hæc non conuenit, nisi sanguis peccet. Sanguis autem in alui profluuiio tantum peccare potest, ut habet rationem causæ principalis : non ut habet rationem causæ sine qua non : quia si posset sic peccare, esset etiam euacuandus. Declaro : Sanguis habet rationem causæ principalis in profluuiio sanguinis : quare aperienda vena, ut sanguis, qui præter naturam in intestina habet impetum, retrahatur: nisi enim fiat retractio, periculi est, ne vires omnino collabantur. Ita etiam sanguis habet rationem causæ principalis, in profluuiio alui, quæ fit ob inflammationem intestinorum : quia inflammatio fit à sanguine, tamquam à causa principali. In reliquis fluxibus, non potest sanguis habere

habere rationē causæ sine qua non: multo minus causæ principalis: nā si fluxus sit materiæ biliosæ, vel pituitosæ: possumus his causis occurrere citra euacuationem sanguinis: hic enim veluti frenum est, modérans succos calidos, & frigidos. In nonnullis quidem affectibus vena secatur, gratia sanguinis, qui habet rationem causæ sine qua non: verbi gratia, in frigida dyscrasia ventriculi hoc facimus, propter sequentem curationem: oportet enim ventriculo applicare medicamenta calida, quæ attraherent à toto in ventriculum, si sanguis adesset: ideoque hic habet rationē causæ sine qua non. At in profluuiò alui non applicamus attrahentia, nec calida, nec relaxantia: sed frigida potius astringentia. Et ob id semper ad fundamenta oportet respicere. Altimarus probat venæsectionem, sed non explicat, num semper, nec ne. Si sanguis peccet ratione qualitatis: sat est refrigerare, non euacuare: si ratione tenuitatis: crassefacere. Quandoque est vitium ratione quantitatis: ideoque minuere licet sanguinem per venæsectionem. Sed semper in quolibet fluxu alui, qui sit à sanguine principaliter concurrente, vitium est in motu: ideoque vtendum venæsectione: cuius beneficio non solum minuius sanguinem, si copia peccet: sed etiam retrahimus ab intestinis. Quare si vires sint robustæ, vena secanda: sin minus, ad cucurbitulas confugiendum. Venæsectio & cucurbitulæ, sunt materiæ remediū vacuantis sanguinem: ideoque non indicantur in methodo medendi, sed extra methodum. In profluuiò igitur alui, cum sanguis peccet, interdum rationē copię: semper autem ratione motus, prout vehementius est peccatum, prout virtus robustior: ita etiam magis audacter vtetur venæsectione. Si non sit tanta vehementia, si vires dissuadeant: vtetur potius cucurbitulis. *Vfus.* Dum vena est secanda, non fiet euacuatio in magna copia: sed potius reuulsionis gratia pluribus vicibus est quid detrahendum. Quoad *quando*: oportet maxime festinare, eadem hora: quia in profluuiò alui, à sanguine, principaliter indicante, adest præsentia sanguinis peccantis, & virtus non prohibet: sed in progressu facile prohibere potest, quia in fluxu alui, virtus non potest robusta manere: Quare etiam noctu, eadem hora qua cœperit fluxus, secari debet vena superior: quia vtimur venæsectione reuellendi causa. Sed cum profluuium alui à sanguine duplex sit: vel citra inflammationem intestinorum, vel cum ea: Si citra,

satius

*Cucurbi-
tula.*

fatiis est pertundere cephalicam, tanquam remotiorem: si aſſit inflammatio, potius baſilica ſcindenda. Probantur etiam cucurbitula ſcarificata, & non ſcarificata. ſcarificata: quando non poſſumus venam ſecare: & hæ applicandæ ſunt potius ſuperioribus partibus: ſi non ſit coniuncta febris thoraci, dorſo: ſi febris coniuncta ſit, applicabuntur brachiis, & ibi ad libitum extrahi ſanguis poteſt. Non ſcarificata cucurbitula diuerſas obtriment facultates, pro variis locis: Si applicentur ſupernis partibus, vel dorſo, vel brachiis, vim habent reuellendi: & his uti licet, non modo in fluxu alui ſanguineo, ſed in quolibet fluxu, reuulſionis gratia. Si autem cucurbitula non ſcarificata applicetur abdomini: non permittit materiam fluxam egredi, ut Auicennas notat. Notandum ne ſit affectus inflammatorius: ne ſit corpus repletum. Quod de cucurbitulis non ſcarificatis, partibus ſupernis applicandis, diximus: idem quoque de friktionibus & ligaturis ſtatuendum: ad retrahendum, ſcilicet materię impetum.

Pharmaca.

Quoad medicamenta: materia corrupta, eradicanda: copioſa, minuenda: mala qualitate affecta, alteranda: nimirum tenuis incrassanda: impetum faciens retrahenda, reuellenda, deriuanda. Id quod vim habet eradicandi, poteſt etiam minuire, reuellere: verbi gratia, dum euacuatio ſit ſenſibiliter per vomitum, per aluum, per lotium, & quandoque per ſudorem. Quare in alui profluuiio uti poſſumus *samarindis, prunis, myrobalanis citrinis, cepulis, amplicis, nigris*: dum inſtitutum eſt, humores minuire per aluum: permuſceri autem debent *roſa, ſantalum*: quia in profluuiio alui, cuiuſcumque ſit materię, neceſſario ſit aliqua calidi innati diſſolutio: præſertim dum euacuantia adhibemus. Ideo non improbandus *ſyrupus roſ. ſolutinus*, qui diſſoluitur in decoctione *endiu. cum ſantalum*. Probatum *rheum, cum ſantalum, roſis*. Probatum aqua *B. Virginis*. Et in fluxibus materię calidioris, aqua *B. Virginis Veronenſis*, ſunt optima: quia minuunt materiam morbiſicam, contemperant ſuccos acres, & (quod maximum eſt) non permittunt ſubſtantiam calidi innati diſſipari. Si forte ſit profluuium pituitoſæ & ſalſæ materię, cum periculum imminet diſſenterię, cum materia mordicare incipiens hereat in inteſtinorum partibus: maxime probo uſum *aquarum Te-ſtuli in agro Piſtorienſi*: ſi exhibeantur huius aqua *lbj. vel lbj. per quatuor horas ante prandium*. Nec erit præter rationem, li

1.
*Vacuatio
per aluum.*

ante cibum exhibeatis aliquid, quod vim habeat corroborandi intestina, nimirum aliqua adstringentia, ut quæ præstantur à rosæ. Materię propositæ sic possunt præscribi. *Recipe pulpe tamarind. diaprumi non solut. ana ℥ss. pulv. ros. ℥j. cum succo ros. fiant boli.* Vel, *Recipe rhei immaturi 3j. sacchari rosati xij. fiat bolus.* In fluxu bilioso hoc medicamento utuntur: sed rheo immaturo, cum saccharo rosato: ne substantia calidi innari dissoluatur. Administrantur talia in forma consistenti: licet & liquida non improbentur. Quoad tempus: debetis quamprimum exhibere: quia adest præsentia indicantis: & in profluuiio alui periculum est, ne dissoluantur vires. Quoad ubi agendum: interdum per os, interdum per sedem sunt immittenda: ratione diuersæ substantiæ: si enim intestina superna sint affecta, non est ita tutum per os exhibere soluentia.

Quoad alterantia: oportet variis uti, prout multiplex esse potest materia. In præsentia notetur, si peccatum sit secundum substantiam: prodesse *salsam parillam, chinam, & antidotos recentes, dum homo corruptus est lue Gallica, & adest alui profluuium*: tunc enim non desistendum à salsa, quia malum pendet à virulentia Gallica. Secundo notandum, ut cum medicamentis respicientibus varias materias, miscentur leuiter astringentia: ut *ros. cichor. absinth. agrimonie, &c.* quia influxuali necessario deperditur substantia calidi innati. Quare, si ratione materię morbificæ cogamur uti attenuantibus, luxantibus, hæc maxime nocent nisi leuiter adstringentia misceantur. Tertio notandum, ut caueatis à dulcibus, hæc enim quia calida & humida, reddunt materiam fluxilem & laxam: potissimum ergo nocent, quando fluxus sit calida materia, in corpore calido. Quarto notandum: si alui profluuium tussim iunctam habeat: abstinendum esse ab astringentibus: si tussis non adsit, omnia leuiter adstringentia locum habere. Verumtamen, cum medicamenta adstringant, vel per crassam, vel per viscidam substantiam: dum adest tussis, admittuntur astringentia. quæ viscidam habent substantiam: ut est *tragacantha, farina amyli, symphytum, plantago.* Quinto notandum, ne utamur iis quæ recipiunt acetum: & potissimum ab acri & copioso aceto est abstinendum. Formula huiusmodi sit: *Recipe succi fonschi depranati 3j. pulueris salsa xj. tragacantha ʒss. sp. è sansalis ʒss. Misce, & fiant boli.* Hoc medicamentum virulentiæ gallicam seu

I.
Alteratiâ.

feu profluuium inde dependens. alterat: quia autem sonchus, & salsa parilla aperiunt atque laxant, pro corrigenda basi, & potissimum salsa, permiscemus 3 ss. vel spec. santal. vel tragacanthæ. Quoad usum, moher Auicennas, liquida nocere: potius formam consistentem prodesse.

III.
Diuer-
tia.
Vomitoria.
Sudorife-
ra.

Medicamenta, quæ respiciunt vitium materiæ secundum motum, quæ scilicet habent vim retrahendi, sunt medicamenta diuertentia, quæ scilicet per vomitum euacuant: quibus uti licet, si ventriculus non sit debilis. Vomitoria sunt præparanda cum iuribus pinguibus, cum succo raphani. Non licet uti valentioribus. Cauendum ab oleo: ne nimium relaxetur ventriculus. Possunt etiam diuertentia esse medicamenta, quæ per sudorem euacuant. Extra licet uti balneo moderate calido. Licet inungere ventriculum cum oleo anethino, chamamelino. Totum inungere licet, excepto abdomine: propter laxantia enim, intestina plûs iusto reciperent superfluitates. Si corpus febre affectum non sit, Auicennas ad sudorem prouocandum etiam probat vinum aquosum: non pro potu, nec pro vehiculo cibi, sed pro medicamento euacuante per sudorem. Præterea medicamenta retrahentia possunt etiam esse deriuantia, id est diuretica: vt sunt serum, mel cydoniorum, lupuli, asparagi. Non igitur præter rationem est, cum alterantibus miscere diuretica.

IV.
Incrassan-
tia.


Oportet etiam uti medicamentis, materiam fluxilem, crassam reddentibus. Hæc sunt adstringentia, modo validiora, modo debiliora, pro tenuitate materiæ & dissolutione calidi innati. Valentiora sunt, è cap. 5. lib. 5. meth. balanstia, hypocistis, rhus opsoniorum, acasia, malicorium, messila, galla. Debilia: manna thuris, cortex pini, terra sigillata. In profluuiio alui admodum pertinaci, medicamentum efficacissimum ad incrassandum proponitur ab Auicenna: & est caseus antiquus salitus: qui sape lauari & decoqui debet, ut prorsus euadat salis expertus. Desis 3 j. cum succo cydoniorum. Aetius & alij ad sistendum aluum probant coagulum equi, & aliorum animalium: quod sane ita administrari oportet, ut è toto sal amoueatur. Formula sit talis: Recipe pulu. gallarum immat. thos opsoniorum, myrtillorum ana 3 j. cum succo cydoniorum, fiant pilula & exhibeantur. Extra hoc modo: Recipe carnis cydoniorum 3 ij. pulu. ros. spodij. boli Arm. ana 3 j. el. cydon. myrtini, ana 3 vij. cera lata cum vino austero 3 ij. Misce, fiat linimentum. Circa quando agendum, Auicennas ait: si fuerit alui fluor materiæ putris;

patris, & vires non sūt debiles: non vtendum esse adstringentibus: quia talis materia eradicanda est: cogimur tamen interdum admiscere adstringētia, gratia calidi innati. Quoad *Opiata.* opiatum: hoc est materia remedij, indicati à causa morbifica, vt peccat vel caliditate, vel tenuitate: ea tamen ratione, vt vtrumque vitium secundum essentiam sit vehementissimū: vbi enim talis est materia, infestant lōgæ, vigilæ, adest dolor. Opiata autem sunt, *Philonium Roman. requies Nicol. pilula de cynoplasso, antidoti recentes, &c.* Quæ Auicennas probat, quia materiam tenuem crasse faciunt: vigilias mitigant, sensum obrundunt. Sed hæc solent debiles vires extinguere: fateaturque Auicennas, se vidisse vnum defunctum cū supposito-rio opiato. Proinde permittens adesse oportet, nimirum vires robustas: nam si calidum innatum secundum qualitatem fiat debile, exstinguetur ab opiato. *Vsu.* Summa dosis opiatorum erit ʒ j. *Tempus:* cum adest præsentia indicantis, id est materia iam proposita: & virtus permittit. Quare non expectandum est, vt materia morbifica, quæ est vehemens secundum propriam essentiam, acquirat vehementiam ratione facultatis, vt fiat animi deliquium: ideo non est differenda administratio opiatorum. Quoad *Vbi,* possunt administra-ri per os, & per sedem.

Dicta medicamenti respondebit. Auicennas improbat *Diata.* dulcia, salsa, acia: & cum cibis miscet moderate adstringentia, magis vel minus, prout necessitas postulare videtur.

CAPVT XVI.

De Leienteria.

 **V**AMVIS plures sunt species alui fluxus: de duabus tamen solum agam: quibus recte intellectis, iter ad reliquas curandum patebit facillimū. Per leienteriam intelligimus omnem fluxum, in quo id quod assumendo ingreditur, citra mutationem expellitur: siue hic fluxus procedat ex intestinis tantum: siue etiam simul è ventriculo. Generatur hoc malum, dum aliquid præter naturam occurrit intestinis, ita vt retentio auferatur: vnde quod ingreditur intestina, affatim, & nō mutatum exit. *Nomen.* Leienteria ergo est fluxus alui esculentorum non mutatorum: dependens à retentrice abolita intestinorum. Genus est fluxus alui: quod contrahitur per, differentiā: propterea dixi- *Generatio.* *Definitio.*

mus: esculentorum non mutatorum. Per esculenta non mutata, cum Galeno comin. aph. 1. sect. 6. intelligimus cibum: ut si quis comedat carnem vitulinam, eandemque nondum in chylum mutatam deiciat. Præterea per esculenta non mutata, intelligimus etiam chylum. Si enim non intestina solum lædantur, sed etiam ventriculus: cibus egreditur: at si lædantur sola intestina: egreditur chylus, sed permanens non secretus à fecibus.

Causa efficiens.

Postremo diximus: dependens à retentione abolita intestinorum: quod colligitur è c. 2. l. 6. loc. aff. com. aph. 12. sect. 3. com. aph. 12. sect. 4. com. aph. 1. sect. 6. & c. 11. l. 1. de cris. c. 2. l. 3. de sympt. caus. In qualibet leienteria frustratur facultas retentrix: & vel Primario, id est, propria ratione: vel Secundario, propter vitium expultricis. Retentrix vel Labefactatur, vel Impeditur. Labefactatur ab intemperie frigida & humida, vel sine materia, vel cum materia pituitosa, frigida: & hæc est exquisitissima leienteria. Addit Auicennas interdum præcedere intemperiem calidam, cuius ratione retentrix mortificatur: quando nim. ob vehementiam caliditatis dissipatur substantia calidi innati, & hinc succedit frigiditas. Quæ autem sint causæ intemperiei frigida & humida, item pituitæ acidæ, diximus cap. de intemperie ventriculi. Impeditur retentrix, secundum Aetium, quando intestina afficiuntur cicatrice, quæ solet succedere dysenterie. Et in hoc malo chylus tantum eiicitur: non autem cibus nondum mutatus. Hæc potius notha est leienteria. Galenus com. aph. 1. sect. 6. non reprehendit antiquos, qui hanc leienteriam proponebant: sed eos, qui credebant hanc solam esse causam leienteriz. Egreditur ergo chylus, cum non possit permeare ob densitatem cicatricis: & talis exit, qualis in intestina ingreditur. Expultrix facultas læditur ab ulcere: dum enim materia petit partem exulceratam, irritat expultricem, quæ insurgens ita agit, ut retentrix secundo lædatur. De causis ulceris, in ulcere ventriculi diximus. Quoad alteratricem, hæc labefactatur ex accidenti: nam cibus exit incoctus, quia non retinetur, sed cito deiecitur: si enim retineretur, etiam concoqueretur.

Differentia.

Differentiæ sumuntur potissimum à materia, quæ egreditur: & à causa efficiente. Materia est Cibus, vel Chylus. Efficiens, est retentrix frustrata, vel Primario, vel Secundario. Si primario: vel læditur ob intemperiem frigidam & humidam: vel impeditur ob cicatricem & densitatem. Secundario,

dario, ob vitium expultricis, id est, ob vlcus.

Lauor intestinorū in genere facile cognoscitur, ex egressu veloci esculentorū non mutatorum. Oculis etiam conspicitur materia: num cibus vel chylus egrediatur. Quoad differentias à causa efficiente. Si retentrix labefactetur, egreditur cibus: si impediatur, chylus: & prægressa est dysenteria, cicatrix. Si vitium sit in expultrice, signa sunt vlcusis. *Signa.*

Porro, supponentes indicationes generales, de quibus in alui profluvio diximus: tantum specificas proponemus. Igitur, quoad vitium retentricis, si labefactatur ob intemperiem frigidam & humidam: oritur indicatio calefaciendi & exsiccandi. Si annexa sit pituitosa materia: patet quid indicet. Si retentrix impeditur ob cicatricem, & densitatem: oritur indicatio rarefaciendi, & si coniuncta sit durities, emolliendi. Quoad vitium expultricis: locum habent vlcusis indicationes: de quibus cap. de vlcere ventriculi diximus, & infra etiam dicemus. *Indicationes.*

Hic fluxus in genere admodum est periculosus, ratione dignitatis: præterquam enim quod læditur retentio, etiam concoctio ex accidenti læditur. Est insignis vehementia essentia: nam exiens, plurimum recedit à naturali statu: cum enim feces egredi deberent, egreditur cibus, vel chylus. Sæpe etiam adest vehementia facultatis: nam vires ferre non possunt egressum cibi vel chyli: vnde mala tolerantia, & leipathymia facile sequuntur. Quoad differentias à materia: Leienteria est periculosior, si egreditur cibus: minus, si chylus. Iam enim cibus egreditur, vehementia dignitatis est intensior, quia læditur ventriculus, non tantum intestina. Et est etiam maior vehementia essentia: nam ab excretionibus secundum naturam magis recedit cibus non mutatus, quam chylus. Quoad causam efficientem, leienteria admodum periculosa est, si retentrix propria ratione lædatur. Cum autem retentrix possit labefactari, & impedi: si impediatur: malum fere incurabile: quia cicatricis densitas non potest è toto amoueri. Licet vero ratione cicatricis hic fluxus è toto sit incurabilis: nihilominus tamen homo ita affectus, diutius vivere potest: quam si retentrix labefactata sit in causa mali: nisi enim breui & primo tempore curetur, fieri non potest, ut homo diu viuatur, quia, dum cibus non mutatus egreditur, succedit atrophia. Si impediatur: chylus non totus egreditur, quia cicatrix non occupat tota intestina: vnde chylus permeare

Prognostica.

Differentia.

potest per illa loca, quæ cicatrice non sunt obducta.

Curatio.

Leientia.

Vena in hoc malo secanda non est, quia potius defectus est sanguinis. Notandum circa communia medicamenta, ratione retentricis: si verbi gratia, leienteria fiat ab intemperie, sed cum materia, hæc euacuanda est: non enim semper astringendum est, sed considerandæ causæ. Exhiberi ergo potest *mel ros. solutium, & potissimum hiera, verbi gratia, ℞. spec. hiera ʒ ij. pul. absinthij ʒ β. cum melle ros. solut. fiant boli.* Cum autem leienteria fieri possit, ob vitium vel expultricis: quibus medicamentis potissimum communibus, vtendum sit, dum læditur retentrix: iam docuimus. Si autem fiat vitio expultricis: nimirum ob vlcus: vtendum *syrupo rosa. solut. vel monna*

*Præparan-
tia.*

cum sero chalybeato. Quoad præparantia: si retentrix lædatur, materiæ exhibendæ sunt *cum salvia, mentha, cum diatriompipereon:* ratione pituitosæ materiæ. Contra, si oratur vitio expultricis, dandum *decoctum è soncho, hepatica, hordeo:* idcirco frigidis hic vtendum: sicuti causa retentricis, calidis. Ob id diligenter oportet cognoscere veras causas malorum. Notandum autem in leienteria, & cœliaca affectione (tantum enim differunt secundum minus) non vtendum esse vehementer purgantibus: quare non licet vltra proposita ascendere. Quæ autem medicamenta materias per lotium euacuant: in generali fluxus doctrina proposuimus.

Purgantia.

*Medica-
menta spe-
cialia,*

Quoad leienteriam ob vitium retentricis: retentio vel labefactatur, vel impeditur. Labefactatur ob intemperiem frigidam & humidam: quare occurrendum calefacientibus & siccantibus: de quibus egimus in sermone de ventriculi dyscrasia frigida & humida. At si impediatur ob cicatricem: cum Aetio vtendum acribus, valde attenuantibus: verbi gratia: *℞. oxymeli scill. mellis rosa. ana ʒ β. spec. diatriompiper. ʒ j. conserua è flor. malv. ʒ ij. succi sidoniorum ʒ ij. Misce, pro aliquot vicibus.* Oxymeli hic ponitur, vt cicatricis densitas attenuetur. Mel rosatum idem præstat, sed minus efficaciter: & præterea beneficio rosarum est in causa, vt non ita fluat medicamentum. Adduntur species diatriompipereon, ad efficaciorum operationem & rarefactionem. Conserua è floribus malux additur, gratia emolliitionis. Tandem adiungitur cydoniorum succus, vt medicamentum moram trahat, & ratione moræ fiat actio. Quia autem interdum contingit, vt cicatrice hæc existente, corpus ita sit constitutum, vt calida ferre nequeat: propterea hæc corrigenda sunt cum aliquo resfri

*Cicatricem
attenuan-
tia.*

refrigerante, quod interim attenuandi ac detergendi vni habeat: vt est *hordeum, cremor hordei*. Vel, iam proposita medicamenta propinate: & postea aliquid hordei exhibete. Si leienteria fiat vitio expultricis: medicamenta peti possunt è cap. de vlcere ventriculi: item è cap. sequenti de Dysenteria.

Diaza proportionem respondeat. Et proinde si labefacta sit retentio: occurrendum cibis calefacientibus & siccantibus. Si autem fiat leienteria ratione cicatricis: oportet vti cibis extenuantibus, rarefacientibus: vnde Aetius probat cibos acres, & cum aromatibus. Si fiat ratione vlceris, ratione expultricis: cum vlcus fiat à materia calida & mordaci: cibis frigidis occurrendum.

CAPVT XVII.

De Fluxu alui sanguinolento.

RE fluxum alui sanguinolentum, cum Galeno *Nomen.*
cap. 4. lib. 3. de caus. sympt. intelligimus omnem
alui fluxum, in quo sanguis egreditur: nimirum,
fluxum Hepaticum, Dysenteriam, Tenesmum:
dummodo sanguis per aluum egrediatur. *Generatio.*
Generatur, dum aliquid morbificum & præter naturam occurrit venis intesti-
norum: cuius causa sanguis ibi non retinetur, sed per al-
uum egreditur. Vitium igitur hoc est fluxus alui sangui-
neus, dependens à læsa retentione venarum intestinorum. *Definitio.*
Genus est alui fluxus: quod contrahitur per vocabulum san-
guinis: ad differentiam aliorum alui fluxuum. Per sanguinem autem intelligimus & purum, & mistum, etiam cum
reliquis succis excrementitiis.

Addimus: dependens à læsa retentione venarum intesti-
norum: ad differentiam hæmorrhoidum. Læditur autem re-
tentrix ob morbum, vel in Mala compositione, vel in Solu-
ta vnitate. Mala compositio est diapidesis, id est, immodica
raritas tunicarum venarum in intestinis: item anastomosis,
id est, immodica apertio orificiorum venarum. Soluta vnitas
dicitur diæresis, quando vnitas venarum in intestinis solui-
tur. vlt. l. 3. loc. aff. c. vlt. l. 3. de caus. sympt. cap. 2. li. 5. meth. In
diapidesi egreditur sanguis serosus: qui ob tenuitatem facile *Sanguinis*
egreditur. Per sanguinem autem serosum, non intelligimus *serosi &*
ichorosum: sanguis enim serosus est potius frigidus: & est *ichorosi di-*
verus sanguis, permixtus cum serositate, id est, cum excre- *stinctio.*

mento tenui, quod generatur in coctione prima, seu ventriculi. Sanguis autem ichorosus est, qui ob causam aliquam ta-
 les facientem vertitur in ichorem: ita ut portio illa ichorosa
 sit feruens, caliditate qua fiunt erypelata, febris synochus, vel
 cum, vel sine putredine. In praesentia igitur per sanguinem
 serosum, intelligimus frigidum, aquosum, vergentem ad
 aliquam albedinem, ut similis sit loturae carnis animalis
 recens mactati. Et generatur à iecore frigidiores: quod sua
 frigiditate non potest segregare serum à vero sanguine. In
 anastomosi egreditur sanguis vel copiosus, vel acris atque
 mordax: talis enim sanguis officina venarum reserare potest.
 Copiosus sanguis generatur à iecore calido & humido, è
 bonis & copiosis cibis: vel colligitur, suppressa aliqua con-
 sueta vacuatione, quemadmodum etiam colligi potest, quo-
 ties artuum aliquis est abscessus. Et hunc fluxum vocant
 cruentam dysenteriam. Acris sanguis generatur à iecore
 calido vehementer, ita ut in passivis potius annexa sit siccitas,
 quam humiditas. Hæc autem caliditas vel est propria, vel
 ex accidenti. Propria: dū iecur à principio generationis red-
 ditum est calidius: vel etiam dum effectum est calidius, sed
 citra obstructionem. Ex accidenti: quoties iecur calidius
 redditum est, propter obstructiones: unde calor iecoris in-
 tenditur: generatur sanguis mordax: & impeditur etiam trā-
 situs sanguinis per venam cavam, qui propterea truditur ad
 venas intestinorum, earumque officina recudit. Quoad di-
 aresin: soluta unitas potest fieri, ratione vulneris, ruptionis,
 contusions. Sed hæc ad chæirurgos pertinent. Nos in præ-
 sentia diaresin perpendimus, ut sit per modum abrasio-
 nis, quemadmodum in exuiceratione. Hæc exulceratio
 vocatur Dysenteria intestinalis: & si occupet rectum in-
 testinum, dicitur Tenesmus. ubi non tantum sanguis egre-
 ditur, sed adest etiam fere assidua excernendi cupiditas, ea-
 que sæpe inanis. Causa est materia mordax: ut capit. de vlcere
 ventriculi diximus. Hæc autem materia, ut traditur
 commentar. aphorism. 26. sectio. 4. abradit, primo pinguedi-
 nem, deinde superficiem internam intestinorum: tandem
 veram intestinorum substantiam. Species huius materiz
 colligi possunt è commentar. aphorism. 12. sectio. 3. & com-
 mentar. aphorism. 26. sectio. 4. Sunt autem bilis, flava scilicet
 & atra: ideoque etiam bilis media inter flavam & atram:
 item pituita falsa: sanguis acris: & sanies. Et, si tenes-
 mus à

*Anastomo-
 sis.*

Diaresis.

Diffinitio.

nis à flatu oriatur: est nothus tenesmus.

Fluxus sanguinolenti differentiarum sumuntur à Sanguine, à Loco, & ab Efficiente. Sanguis vel est Purus, vel Permixtus: vel peccat Copia, vel Qualitate: Si qualitate, est tenuis, vel acris. Quoad locum: prodit à venis intestinorum Superiorum, vel Inferiorum. Causa efficiens est vel Mala compositio, nimirum diapedesis, aut anastomosis: vel Soluta unitas, seu diæresis.

In genere hoc malum facile cognoscitur. Sed oportet distinguere fluxum hunc sanguinolentum, ab hæmorrhoidibus. Si igitur fluxus sit hæmorrhoidalis, egreditur sanguis sincerus: adestque tensio, & tumor aliquis circa venas: quandoque etiam orificia illarum venarum reclusa esse apparent. His absentibus, iudicandum est sanguinem effluere à propriis intestinorum venis. Quoad differentias, quæ à sanguine sumuntur: Si sanguis copia tantum peccet: egreditur ruber: & ilico concrescit: & egreditur sine dolore, quia non est mordax. Si autem fuerit serosus: egreditur satis tenuis, non rubicundus, sed leuiter admodum rubeus, instar loturæ carniū animalium recens mactatorum: non concrescit, ob permixtum serum: & egreditur sine dolore, quia nondum est particeps acrimoniarum: estque potius frigidus, quam calidus. Si egreditur sanguis acris: cognoscitur è flauitie: & quia cum aliquo dolore egreditur, habet enim vim mordicandi. Quoad differentias à loco: è cap. 2. lib. 6. de loc. aff. cognoscitur, sanguinem erumpere à partibus superioribus, si mistus appareat cum excrementis: in eo enim transitu fit mistio: præterea pinguedo vel nulla externitur, vel admodum exigua: adhuc clysteres non iuant. Si horum opposita absint: dicendum, sanguinem effluere è venis inferiorum intestinorum. Quoad differentias efficientis: Si causa est diapedesis: sanguis exit serosus, vel aquosus, sine dolore. Si anastomosis: egreditur sanguis copiosus, rubore infectus, aliquando acris, cum mordacitate aliqua. Diæresis cognoscitur è dolore, quia soluitur unitas: adhuc quia egreditur aliqua sanies, in dysenteria enim sanies generatur. Cæterum, cum diæreseos, & proinde dysenteriarum causa possit esse multiplex: nimirum bilis flaua, atra, salsa pituita, sanguis acris, & sanies in abscessu genita: hæ materiarum cognoscuntur è fluxibus prægressis: verbi gratia: si fluxus bilis flauæ prægressus sit, & subsecuta dysenteria: facilis,

Signa.

*Diagnosis
ac hæmorrhoidibus.*

Signa diff.

1.

1.

3.

tunc est coniectura, hanc dysenteriam originē ducere ē flaua bile. Idem de reliquis est iudicium. Potissimum saniem in causa esseprehenditur, si pręgressus est abscessus.

Indicationes.

Pręsidia sumuntur à Morbis, à Causis, & à Virtute. Quoad morbos: diapedesis indicat densans: anastomosis, angustans: diæresis, vniens. Quoad causas: Diapedesis producitur à sanguine seroso, quare hic inaniendus, deriuandus ad renes: cum per renes portio illa serosa potissimum sit euacuanda. Adhęc, cum hic sanguis generetur à iecore potissimum frigidus: oportet iecur calefacere. Anastomoseos causa est sanguis, vel copiosus, qui indicat minuens: vel acris, qui indicat attemperans. Et cum gignatur à iecore calidiori, indicatur refrigerans. Diæreseos causa est succus abradens: qui euacuandus: sanguis fluens ar-cendus, siue per reuulsionem, siue deriuationem. Reliquę diæreseos & vlcera indicationes accuratius pertractantur capit. de vlcere ventriculi. Quandoque in diæresi, & proinde in dysentaria, coniunctus est dolor, qui indicat calidum, vel tenuis substantiæ, vel viscidę: aut frigidum: de quibus alibi copiose diximus. Virtus indicat alimentum.

Prognostica.

In genere de periculo nihil certi statui potest: fluxus enim alui sanguinolentus interdum rarissime remouetur: interdum remouetur à sola natura, sine medicamentis: vt testatur Galenus capit. 2. libr. 1. loc. aff. Quoad sanguinem, qui egreditur: Si verbi gratia sanguis peccat copia, fluxus est minus periculosus: nam minor adest vehementia, & secundum essentiam, & secundum facultatem. Si sanguis serosus exeat: fluxus magis est periculosus: qui intensior est vehementia essentię, & facultatis: vehementia quidem essentię maior, quia sanguis serosus magis recedit à naturali statu, quam sanguis sola copia peccans. Adest vehementia ratione facultatis: quia dum sanguis alimentalis generatur serosus, virtus non sustinet sanguinis euacuationem, quia est exiguus. Intenditur etiam periculum, quia generatur sanguis serosus ob intemperiem frigidam iecoris. Si acris egrediatur sanguis: fluxus periculosior est, quam dum egreditur copiosus: sed minus idem est periculosus, quam egreditur serosus: ratio pendet à vehementia essentię: non enim debet sanguis acris esse, ideoque magis à natura recedit, quam copiosus, minus quā serosus. Pręterea maior est recessus, si iecur est frigidius, vt dū sanguis serosus exit: quam si calidius, et dū acris

exit.

exit. Quoad differentias à loco : reliquis paribus, fluxus est magis periculosus, si materia prodeat à venis intestinorum superiorum : nam è parte rerum præter naturam, maior est vehementia ratione dignitatis, & facultatis : ratione dignitatis, quia superiora intestina sunt digniora, utpote quæ distributioni chyli sunt destinata : ratione facultatis, nam dum fluxus est in tenuibus intestinis, dolores sunt vehementiores, quia non ita facile sustinentur : idque præsertim ob consensum, quem cum principibus partibus obtinent maiorem, quam crassa. Quoad differentias ab efficiente : cæteris paribus, facilius tollitur diapedesis : difficilius anastomosis : adhuc difficilius diæresis, quia hic est vlcus, quod si magnum fiat, etiam lethale est malum, comment. aphorism. 26. sect. 4. Notandum autem in vlcere intestinorum augeri & minui periculum pro vehementia causæ abradentis, ut diximus devicere ventriculi : Si enim fiat ab atra bile, actum est : si est cancriforme, lethale, nam summa est vehementia essentiae : & sic de reliquis. Virtus quo debilior, eo malum periculosius. Vnde ad vires respiciens Galenus commentar. aphorism. 47. sect. 6. ait, si lienosi afficiantur dysenteria longa, subsequi aut hydropem, aut leienteriam, aut mortem : quia virtus est debilis. Hinc etiam commentar. aphorism. 23. sectio. 7. ait : à deiectione sincera difficultas intestinorum, malum : nam & causa prava est, & virtus debilis. Item commentar. aphorism. 3. sect. 6. ait, in longis difficultatibus intestinorum, inedia è fastidio, malum : & cū febre, peius : hæc enim significant virtutem debilem.

Quoad materiam cheirurgicam : dum sanguis vehementer peccat, & vires permittunt, vena secanda est. Hinc Alexander in dysenteria, si sit inflammatio cum dolore, si corpus iuvenile, boni temperamenti, & vires permittant, si que malum oriatur à primitiua causa : venam brachii secat, & sanguinem euacuat ad lb. ij. Nam si hæc conditiones in vnum non concurrant : cum eodem Alexandro, potius per vices : & copia exigua sanguis euacuandus. Aetius etiam interdum venam secat : & quidem plus mittit sanguinis, si maxima inflammatio : & præsertim si cohibita sit consueta euacuatio. Porro cum fluxus pendeat vel à diapedesi, vel anastomosi, vel diæresi : oportet scire, quid agendum in quolibet vitio, circa vacationem sanguinis. In diapedesi, vena secari non debet : quia sanguis bonus est exiguus : adest san-

Curatio.
Vena sect.

guis serofus, qui potius diureticis vacuandus est, non per venæ sectionem. Præterea, vbi sanguis generatur serofus, iecur est frigidum: non ergo magis debet refrigerari per venæ sectionem. In anastomosi, si sanguis sit copiosus, venæ sectione detrahi debet, & in magna copia: si acris sit sanguis, potest etiam secari vena, sed non in tanta copia: sic enim primo euacuabitur sanguis acris: secundo ex accidenti refrigerabitur iecur calidius. Quoad diæresin: secunda est vena, si diæsis originem ducat à sanguine mordaci, & præterea si annexa sit inflammatio, cum hæc proprie fiat à sanguine. Quoad tempus: statim in prima visitatione vena secari debet: quia in fluxu vires cito possunt reddi debiles. Quoad vbi, probatur potissimum, vt cubiti vena secetur: quia non modo fit sanguinis euacuatio, sed etiam reuulsio: & sic occurrimus non tantum sanguini copioso, acri, sed etiam sanguini, qui præter leges naturæ mouetur. Cucurbitulæ, & alia, alibi dicta sunt.

Pharmaceutica.

Ad diapedesin medicamenta.

Quoad medicamenta: in Diapedesi oportet vti diureticis, & calidis: diureticis, propter sanguinem serofum, calidis, propter frigiditatem hepatis. Quare medicamenta parentur

è ceterach, asparago, origano, feniculo, cum iure ciccerum, hoc modo: R. pul. ceterach, asparagi, origani, feniculi, ana \bar{g} viij. iuris ciccerum \bar{z} viij. Miste. Caula iecoris refrigerati vtendum cyphoide, magnis antidotis, trochiscis de absinthio, eupatorio: maxime probatur decoctum sassafras. Caula loci affecti, ad partem dēsandum, vti possumus clystere confecto è vino austero, cum verbasco, & nucibus expressis. Quibus etiā extrinsecus fomenti forma vtēdū.

In anastomotosi vtendum medicamentis, quæ respiciunt sanguinis caliditatem & motum. Quare in hoc casu (non in omni fluxu) vtendum aquis Beate Virginis: quæ ægrum interficerent, si fluxus prodiret à sanguine serolo, per diapedesin. Vti etiam possumus sero lactis chalybeato, cum semine melonum. Vel, R. succi endiuia depurati \bar{z} β . pul. ros. \bar{z} j. corall. rub. \bar{g} . xvj. misce, pro vna vice. Gratia intestinorum, vtendum clystere composito ex aqua Beate Virginis: vel è sero chalybeato, cum vino austero, additis rosis, & succo plantaginis. Verbi gratia, R. puluer. rosati \bar{z} j. succi plantaginis \bar{z} j. aqua Beate Virginis, Vini austeri ana \bar{z} v. misce pro clysmo. Vino hic vtimur ratione moderatæ alicuius caliditatis, ad conseruandum calidum innatum: est tamen austerum, quia etiam oportet occurrere anastomosi.

Quoad

Quoad diarrhœam: utendum medicamentis, quæ respiciunt *Ad diarrhœam*
 succum mordacem, exulcerantem: & quæ diriguntur ad *sin.*
 vlcus. & ad dolorem: nam in dysenteria quandoque dolor
 acerbissimus patientes cruciat. Quoad succum igitur mor-
 dentem: si hic fuerit bilis flaua, oportet hanc vacuare: quare
 probatur *Syrupus ros. sol. tamarindi, potissimum cum cassia pru-*
na Damascena: (qua Alexander probat:) serum lactis chaly-
beatum. His flaua bilis euacuatur, nec augetur mordacitas,
 nec diarrhœis curationi officinus. Si fuerit pituita salsa: ex-
 hibebantur *myrobal. Kibula, cum melle rosato soluta.* Sed quia
 pituita salsa est mordax: debetis hæc medicamenta dissolue-
 re, vel cum sero, vel cum hordeo, cum detergentibus, & po-
 tissimum etiam refrigerantibus. Si materia fuerit atra bilis:
 probantur *myrobal. nigra, Symp. viola. solus, cum sero, ratione*
caliditatis. Si autem vlcus fiat cancrinosum: hæc cum prædi-
 ctione exhibebuntur: est enim lethale, & curari non po-
 test. Si materia mordax sit sanies, vt in abscessibus: proba-
 tur *mel rosatum solutum, mel viol. solus, cum sero lactis.*

1.
Vacuatio.

Quoad usum. hæc euacuantia quamprimum sunt exhi-
 benda: nisi enim hæc materiæ mordaces euacuentur, prohi-
 bent vlceris agglutinationem. Porro, ratione vlceris, medi-
 camenta esse debent Mundificantia, Implentia, Aggluti-
 nantia. Mundificatiua leuiora sunt, *furfures, hordeum, lupini,*
finaria, mel crudum, mel rosatum, mulla, orobus, parietaria,
amygdala amara, serum lactis, aqua Beata Virginis. Vehemen-
 tiora sunt, *præssum, gentiana, aqua olinarum salutarum, aqua pi-*
selum salitorum: quidam addunt urinam. Vehementissima sunt,
 quæ proponuntur à Galen. cap. 5. lib. 9. x. *tóm. charta combu-*
sta, calx viua (non exstincta:) Sadrina sandaracha, squama aris,
sulphur, et vltum. &c. inter composita, trochisci de charta combusta.
 In dysenteria igitur his vti possumus, pro vlcerum discrimi-
 ne debilioribus, in minori vlcere: vehementioribus in gra-
 uiori. Pastilli modo citati, ita fiunt: *Recipe charta combusta xx.*
sandaracha auripigmenti, squama aris, aluminis sicci, calcis viua,
omphacii ana ʒv. croci, opij ana ʒij. conterenda conterantur cum
vino virgino, fiant pastilli. Hic fortia corriguntur: & ne vlcus
 fiat corrosiuum ob acra medicamēta, misceatur omphacium
 quod prohibet vltiorem corrosionem. Præterea Galenus
 calcem exstinguit, cum succo plantaginis. ob eandem inten-
 tionem. Conficit medicamentum cum vino myrtino ad-
 stringente, & prohibente corrosionem. Interdum loco
 vini,

2.
Ad vlcus.

1. Mundi-
ficatiua vl-
cus.

2. Imple-
tia.

3. Agglu-
tinantia.

III.
Ad dolo-
rem.

Anodyna
digeretia.

vinum, utitur decocto rosarum. Respiciens ad dolorem, qui id dysenteria esse solet, quia ab acerbis medicamentis exacerbari posset, ideo permiscet opium: pro cuius correctione crocum addit. Quoad usum: fortioribus in pauca quantitate utendum. Modus & tempus patent. Quoad locum: pro substantia mali in intestinis tenuibus, vel crassius, uti debemus medicamentis: obseruantes, ut fortiora non per os exhibeantur, sed tantum per inferiora. Impletia cavitatem sunt, *sarcocolla, mastiche, bolus Armena, cortex thuris, cum vino stiptico*. Quibus supra & infra uti licet: si infra, addere possumus *consolidam, sine tutiam*. Nec est abs re, haec medicamenta diluere cum tremore vel alica, vel cochlearum, vel testudinum. Agglutinantia proponuntur à Galeno cap. 7. l. 4. meth. & cap. de ulcere ventriculi. Haec vim habent siccandi, adstringendi: ut, *balanisia, galla, malicorium, rhus opson, rosa, cum decocto cydoniorum, myrtillorum, rubi*: & nisi inflammationis sit suspicio, cum vino etiam *austero*. Recipe *baccarum myrti 3j. mala cotonea medicaria numero ij. aqua lbv. scobis, seu limatura corticis vel loti arboris, vel pini 3jss. fiat decoctio ad tertias*. Cum Aetio licet hoc medicamento uti etiam in potu: exhibet, quantum homo bibere potest. Sed licet etiam infundere per clysterem. Causa doloris licet uti anodynis: quae triplicia sunt, propriissima, propria, & impropria. In dysenteria propriissimis uti non possumus, quia & calida sunt in primo, & tenuis substantiae: ideoque vim habent laxandi: in fluxu autem laxare non licet. Probantur igitur anodyna propria, & impropria: haec frigida sunt illa substantiae viscidæ. Propria sunt *seuum caprinum*, quod est magis stipticum quam hircinum, licet hircinum magis resoluat. Probatur etiam *adeps suillus*, qui utrumque seuum superat in mitigando dolore: quia autem non habet vim stipticam, non licet eo sincero uti, sed aliquid adstringens, & magis condensans permiscendum. Ad quod fundamentum respiciens Auicenna, utitur *butyro, sed cum sanguine draconis*. Galen. cap. 1. lib. 12. meth. probat *succum tragi, & seuum hircinum*: corat *rosatum*, mitigat dolorem, roborat: praeterea addi potest *cremor hordei*: ut medicamentum aliquod è parte accedat ad improprie anodynum, ratione alicuius, sed exiguae frigiditatis. Probatur *cremor alicae, ius arctis, ius castrati*. Ad mitigandum dolorem praestantissimum est, quod conficitur è iure intestinorum brutorum. Sicut etiam probatur *iure confectum è testudinibus, ex anguilla, è cochleis*. Omentum castratorum animalium optimum est.

num est. Pro clystere ita ordinabitur: *Recipe seui hircini ℥ij. onum integrum, iuris intestinalis ℥viij. misce pro clysmo.* Sal non imponendus. Non iniiciatur clyster admodum calidus. Possumus etiam inunctione uti: *℞. butyri ℥ss. seui hircini 3vj. sanguinis dracon. ℥j. olei mastichini, cydon. ana ℥ss. Misce, & fiat inunctio.* Fomentum: *℞. decocti tragi, hordei, alica, ana ℥ij. olei mastichi. ℥j. myrtini ℥ss. fiat optima conquassatio, & pannus infusus applicetur abdomini.* Quoad improprie anodyna, probatur mandragora, hyoscyamus, papauis semina, capita, & opium *Anodyna frigida.* ipsum. Sed notandum, circa quando agendum: non utendum esse his medicamentis, potissimum quæ opium recipiunt, nisi dolor sit vehementissimus, & vires possint sustineretinterdum enim ne suppositoria quidem ex opio ferre possunt. Post usum horum, ut Philonij, vel similium, intestina ablunda sunt cum vino, ut corrigatur detrimentum, & frigiditas, quæ ab opiatīs induci solet.

Quantum ad dolorem in tenesmo: potissimum probantur suppositoria. In dysenteria autem omnino studendum, ut homines præseruentur à tenesmo: nam in descensu materiz acris vix fieri potest, ut non subsequatur tenesmus. Ideo fiat suppositorium à seui hircino. Potissimum autem iuuat, si vel paretur infusus vel fiat euaporatio à decocto florum verbasci, cum butyro, cum caulibus. Yrgente dolore, addantur etiam capita papauis. V. G. *Recipe flores caulium, flores verbasci, ana M. j. capita papau. albi, numero viij. butyri ℥ij. aqua lb vi. fiat decoctio ad quartam partem, & fiat euaporatio.* Potest etiam administrari fomentum. *℞. chamamel, rapsi barbati ana M. j. flo. calendula M ss. fiat sacculus, qui calefiat ex aqua feruente: vel è vino optimo, si causa sit frigida: sedique admoneatur.* Præterea in causa frigida, lignum nucis aut eupressi bene calidum *Dieta.* pedici applicentur: quod sane opem ferre solet haud mediocre. Si dolor & egerendi conatus vehemens sit, ac superioribus nihil cedat: balanis à seui aut pinguedine, cum cera, miscenda sunt narcotica, ut Phllon. athanasia, &c.

Dieta varia esse debet, pro discrimine causarum: respondetque medicamentis, verbi gratia si fiat fluxus ob diapedesin, vinum est exhibendum: si ob diæresin, nequaquam, cum sit dysenteria, feruor & inflammatio in intestinis.

De Hepatis affectibus: & primum de Hydropē.

*Iecoris
affectus
præcipui.*



Anguificatio respicit vitam, non meliorem vitam. Sanguificatrix autem facultatis instrumentum legitimum, est sola iecoris constitutio: ideoque vitia illa excutiemus, vi quorum male habet iecur secundum constitutionem. Per constitutionem intelligimus temperamentum iecoris, & compositionem. Non loquor de calore innato, seu de spiritu innato: (sunt hæc duo synonyma): quia hic spiritus non est verum instrumentum huius facultatis: quamvis sæpe Galenus dixerit, spiritum seu calorem innatum esse animam, aut primum animæ instrumentum. Ratione temperamenti iecoris, agemus de Hydropē: ratione compositionis, de obstructione: ex his reliqua vitia facile patebunt.

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Forma.

Subiect.

Causa ef.

*est materia
serosa.*

Hydrops ita nominatur, quia necessario in hoc malo peccat materia serosa, aquosa, in omni hydropis specie. Generatur hoc malum dum iecori aliquid præter naturam occurrit, vi cuius ita læditur sanguificatio, ut producat materia, quæ sit opus quoddam præter naturam: quæ, dum propellitur in cavitatem abdominis, sui præsentia ita replet cavitatem, ut abdomen augeatur. Hydrops igitur nihil aliud est quam tumor inferioris ventris, procedens à serositate. Forma est tumor: qui in hydropē quandoque est morbus, quandoque symptoma. Si enim magnitudo hæc aucta, est causa læsæ operationis, est morbus: sin minus, symptoma, quando scilicet tumor in abdomine parvus est, ut non lædatur actio abdominis, sed & muscoli abdominis, & reliquæ partes, suo officio fungantur. Quod si tum fore aliqua actio lædatur, est ex alia causa. Subiectum proprium est venter inferior, ad differentiam partium aliarum, & hydropis capitis, seu ventris supremi, & hydropis thoracis. Per ventrem inferiorem, intelligimus uniuersum abdomen.

Efficiens causa, est serosa & aquosa materia: sicut enim nomen huius vitij indicat, necesse est, ut magnitudo fiat à materia aquosa. Cæterum hæc materia aquosa non semper superat: nec fieri potest ut sit sincera: habet enim materiam statulentam & pituitosam congenitam. Discrimen autem est, quia quandoque materia aquosa prædominatur, quandoque

que flatulenta, quandoque pituitosa: prima species vocatur Ascites: secunda Tympanites: tertia Anasarca. Hæc materia, secundum Galen. cap. 2. lib. 3. de symp. caus. est prauum opus, insequens læsam sanguificationem. Quamuis enim iecur materiam puram gignat: nihilominus sæpe fit, vt ob suum robur & præstantiam opus genitum in se non contineat, sed expellat, Expellit autem in hydropse in abdominis cauitatem, & spatium illud potissimum, quod est inter peritoneum & intestina: non ad cæuitatem intestinorum, sic enim non fieret tumor, sed materia per aluum egrederetur. Læditur autem iecoris sanguificatio, quia eius facultas frustratur, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum: interdum, quia ab obstructione impeditur: potissimum autem quia labefactatur facultas ob intemperiem, quæ est morbus, habens rationem causæ efficientis tumorem, sed remotæ, non proximæ. Labefactatur autem facultas sanguificatrix, quia substantia propria intemperie afficitur. Per propriam substantiam intelligo id, quod passim Galenus vocauit proprietatem substantiæ, cap. 8. lib. 3. de symp. causa, quia sanguificatrix pro proprio domicilio habet hanc proprietatem iecoris. Substantiam appello propriam, quia ita est peculiaris iecoris, vt in reliquo corpore nulla sit substantia, quæ similis sit substantiæ iecoris: quemadmodum enim domicilium facultatis visus est humor crystallinus: ita facultatis sanguificatricis sedes, est propria iecoris substantia. Quod si quis dicat, vniuersum iecur esse domicilium sanguificationis: nec is male dicit: quia sanguificatio fit à propria iecoris substantia, & à toto iecore, vt vtrumque ad hanc actionem concurrat: quemadmodum & Philosophus dicit, non pupillam videre, sed oculum totum: actio enim est supposito- rum: & ideo dico, vtrumque concurrere, tum propriam substantiam, tum iecur totum: vt *Quod*, concurrat substantia iecoris propria, tanquam quid præcipuum, ad edendum sanguificationem, non tamen perfectam: at vero totum iecur concurrat, vt *Quid*, non ad inchoandam, sed ad perficiendam *operationem*.

*Frustratio
sanguific.
tricu.*

*Dyscrasia
frigida iecoris.*

In proposito malo labefactatur facultas, quia redditur intemperata propria iecoris substantia: cum hæc sit illud præcipuum, quod cõcurrit vt agēs, sed per tẽperiem, tãquam proprium instrumentũ. Hæc autem intemperies frigida tantum esse potest, nõ calida: nã flatus aquositas, & pituita sũt opera frigida:

frigida: quæ, seu effectus, testantur suorum principiorum naturam. Effectus sunt frigidi: ergo etiam calor est imbecillus, & intemperies frigida. cap. 3. lib. 5. de loc. aff. Flatus etiam generari posse ab intemperie calidiore, non negamus: sed hoc non fit læsa facultate, verum ob errorem externum. Hæc intemperies frigida solet esse humida: interdum est sicca, ut in ætate senili. Et hæc intemperies, quandoque habet congenitum iecoris tumorem frigidum, scirrhum: imo necessario perseverante hepatis scirrhu, hydrops succedit. Porro intemperies frigida, modo intensior est, modo remissior. Semper generatur materia serosa: quia non potest esse hydrops, nisi sit aqua: verum si intensa est iecoris frigida dyscrasia, generatur aquosa materia exsuperans, unde ascites fit: si remissior fuerit frigiditas, materia pituitosa & flatulenta dominantur. Hæc vero frigiditas interdum primam originem habet in iecore: interdum primo alias partes occupat, moxque iecori postea imperit: verbi gratia, primo excitatur intemperies frigida in iecore, ob potum frigidorem, hinc plus iusto refrigeratur iecur. Ob immodicum etiam sanguinis fluxum, iecur refrigeratur. Præterea interdum ob immodicam iecinoris caliditatem hydrops succedit, ut in præseruatione tunc egeamus frigidis: (nam in cura calefaciendum, quia hydropis materia fit à iecoris frigiditate.) Potest autem iecoris frigiditas etiam à causa calida produci: quia cum violentia dissipatur calidum innatum iecoris, ut frigidum euadat. Insuper frigiditas hæc aliquando in aliis partibus primo oritur: verbi gratia, quando hydrops fit à scirrhuoso liene: tunc enim non fit, quia materia producit à liene: sed à frigiditate iecoris, quæ causata fuit à frigiditate lienis. Quod de liene dico, idem de reliquis partibus intelligendū, mesenterio, omento, ventriculo, diaphragmate. Generatur autem materia ob errorem externum, quoties noxia materia subministratur hepatis: siue venterculus ob intemperiem hanc materiam gignat, siue error in cibis & potu committatur.

*Error ex-
ternus.*

*Differen-
tia.*

Quoad formam: tumor vel est Morbus, vel Symptoma: item vitium hoc in magnitudine, interdum Annexam habet intemperiem frigidam, interdum Non. A subiecto non sumuntur differentie, quia abdomen vnicum est subiectum. Quoad causam efficientem, alia Proxima est, alia Remota. Proxima est tumoris materia quæ dominatur, seu exsuperat: est que

estque Vapor, vel Minera. Si vapor, hydrops Tympanias. Si minera, est materia vel pituitosa, & dicitur Anasarca: vel aquosa, & dicitur Ascites. Causa remota est, ob quam hæc materiz generantur: cuius differentias proposuimus.

Hoc malum in genere facile cognoscitur: quia oculis & manibus ventrem præter naturam tumidiorem: (ad differentiam grauidarum:) cognoscimus. Quoad differentias formales: si tumor sit morbus, læduntur functiones non tantum iecoris, sed etiam musculorum abdominis, & septi transversi: contra, si symptoma. Præterea, an cum magnitudine aucta; iungatur morbosa intemperies; cognoscitur, quia abdominis partes non nutriuntur ob intemperiem. Quoad causam efficientem, & primum quoad proximam: è c. 3. l. 4. de dignoscend. puls. sic cognoscitur: tangi debet abdomen, pulsari, & commoueri: nam si fuerit anasarca, ad tactum & compressum excitabitur fouea, quæ pituitæ est indicium. Si pulsu exaudiatur sonus, instar tympani, significatur flatus, & tympanites. Si commoueatur æger de latere in latus; & murmur, strepitus, ac veluti fluctuatio quædam aquæ secundum abdomen audiatur; est ascites. Interdum hydropes permisti sunt: verbi gratia, si in compressione obseruetur fouea, cum duritie, & pulsu sonitus non audiatur; erit tympanites: nam quia in hoc hydropes permistus est flatus, ite aqua copiosa; hæc aqua prohibet, quo minus sonitus è copioso flatu audiatur: & hoc cognoscitur è duritie, quæ tactu obseruatur, indicat enim flatus copiam. Quod si ascites solus sit; nec sonitus percipitur, nec durities. Quoad causas remotas; si materia gignatur, læsa facultate ob intemperiem iecoris frigidam; prægressæ sunt causæ, quæ iecur potuerunt refrigerare: vt immodicus frigidæ potus, immoderatum sanguinis profluuium, tumor frigidus vicinarum partium, &c. Verbi gratia, si quis patiatur tumorem lienis, & hydropicus euadat, facile causa cognoscitur. Quod si hæc absuerint, & vitia potius ad ventriculum pertineant: dicemus, materiam genitam esse ob errorem externum.

Signa.

Indicationes.

Tumor, momentaneam habet permanentiam, & remota causa cedit: proinde non indicat vtile. Morbus indicat vtile: ideo si adest frigiditas abdominis, indiget calefactione. Vtiles igitur indicationes desumuntur à causa efficiente. Hæc duplex est: alia proxima, alia remota. Quoad proximam: materia vaporosa, indicat vacuans per insensibiles meatus; sicut

etiam minera, quatenus in vaporem conuertitur. Minera autem per se considerata, vaporibus contradistincta, indicat vacuus per meatus sensibiles, ideoque euacuanda, siue sit pituita, siue aqua. Quoad causam remotam; hæc est vel materia genita (nam indicatio sumitur à presenti; ideoque non à materia generanda;) vel causa generans. Genita materia est, quæ nondum producit tumorem, & nondum collecta est in cavitatibus (alias enim esset proxima materia;) & hæc non tantum indicat euacuans, ut materia, quæ in cavitatem fluxit, & proxima dicitur; sed etiam ratione motus & fluxionis indicat vacuus reuulsorium, deriuatorium. Causa generans hanc materiam, est iecoris dyscrasia: quæ indicat alterans per contrarium. Quoad causam causæ; si morbus sit vel in liene, vel in aliis partibus vicinis; quid indicent harum partium morbi, è propriis capitibus petendum. Vitales indicationes desumuntur à subiecto; non tamen ab abdomine, quia non est pars præcipua, quæ eam obtineat præstantiam, ut ab ea indicationes vitales haurire cogamur; vnde interdum neglecta abdominis virtute, abdomen pertunditur. Per subiectum igitur hoc in loco, non intelligimus subiectum morbi, sed causæ morbificæ, causæ generantis: quod subiectum est hepar, interdum lien, interdum ventriculus. Sed sufficiat solum versari circa iecur: quod sane, ad similitudinem ventriculi, per suum calidum innatum indicat moderate calefaciens, nutriens: & per proportionem substantiæ suæ propriæ requirit Hepaticum auxilium, quod foueat & roboret propriam iecoris substantiam.

*Indicatio
à subiecto
causa ge-
nerantis.*

*Prognosti-
ca.*

Malum hoc ab initio non est incurabile: comment. iii. lib. 5. de vict. ac. Augetur periculum pro vi differentiarum, ut interdum spes omnis aboleatur. Quoad formam: deterior est hydrops, si tumor morbus est; si annexa intemperies frigida morbosa. Quoad differentias à subiecto (non morbi, quia hoc subiectum idem semper est;) causarum efficientium primarum; tympanias difficilius curatur, quam ascites.

Quoad differentias à causa efficiente. Si causa proxima, sit materia flatulenta, difficulter vacuari potest, quia per meatus insensibiles educenda: ut autem residet in cavitatibus interna peritonæi, ægerrime euacuatur: quo respiciens Aëtius dicit: tympaniā difficilius curari. Si respicias ad causam remotam, generantem has materias; cum materia aquosa fiat à

fiat à iecore frigidus magis intensior quam flatus & pituita: ob id dixit Auicennas, ascitem difficilius curari. Non ergo pugnat cum Aetio, qui respexit ad proximam causam. Præterea pro discrimine causæ remotæ, varie etiam prædicendum. Si iecoris frigiditas sit coniuncta scirrhus: mors prædicenda. Et si fiat è scirrhus lienis, qui sit incurabilis: etiam impossibile est, iecoris frigiditatem, quæ fouetur à scirrhus lienis, è toto superare. Sed differentia est: quia si scirrhus in iecore est, citius perimit. Si contingat, verbi gratia, ut fiat per morbum acutum (nam huic interdum hydrops succedit, com. 1. lib. 2. prognost.) ut plurimum lethalis est hydrops: quia in iecore est insignis noxa, & virtus est debilis, ob morbum acutum præcedentem.

Secunda est vena, dum in corpore hydropico peccat sanguis, & virtus permittit. Virtus potest esse robusta in qualunque hydropis specie, etiam in ascite: unde Auicennas in ascite abdomen perforat, cum virtus est valde fortis. Sanguis peccat, si fiat hydrops è suppressione sanguinis menstrui, hæmorroidum, com. 3. lib. 4. de vict. acut. & hic hydrops non est tympanias, non ascites, sed hyposarca: imo si esset ascites, non prohiberetur venæsectio, si sanguis peccaret ob suppressam aliquam euacuationem. Errant igitur qui ad solam auctoritatem respiciunt Galeni, dicentis, non esse secandam venam in hydrope, nisi sit hyposarca, & fiat è sanguinis suppressione. Hinc Auic. ad methodum respiciens, dicit in ascite secandam esse venam, dum hydropicus conqueritur de dolore lateris: significans, si hydropicus afficiatur etiam inflammatione, pleuritide, angina, &c. venam esse secandam, cum in his malis peccatum sanguinis sit vehemens. Præterea in hydrope vesicatoria probantur: quæ possunt abdomini & cruribus opportuno tempore applicari. Probantur & fonticuli, nisi aliquid prohibeat, in ascite: prohibet autem quandoque virtus, pertinet ad crura: quia cruribus sunt administrandi, ut colligitur è com. aph. 8. sect. 6. Si enim in hydrope crura sint tumefacta: virtus crurum prohibet exulcerationem fonticulorum: cum periculum sit, ne ulcera putrilaginosa, & gangrænosa euadant. Si ergo tumida sint crura, locum non habent fonticuli: si nondum sint tumida: optimum est ulcera excitare fonticulis. Præterea in ascite probatur punctio secundum umbilicum, & scrotum: ubi hæ partes tumidiore apparent, ob aquæ præsentiam. Prodest

*Curatio.
Venæsectio.*

Vesicatoria & fonticuli.

Punctio.

*παρρησι-
της.*

etiam punctio secundum Galum. c. 3. l. 9. κ. τόν. Probatur setaceum circa scrotum, si pars illa est aqua repleta. Tandem ad abdominis perforationem confugiendum, dum summa est vis materiæ aquosæ, ut infrioribus euacuari nequeat. Summa vehementia cognoscitur; quando brevi tempore copiosa aqua generatur. Euacuatio in hac materia, non fiat confertim, quia virtus non potest sustinere. *Tempus*, est præsentia indicantis, si nihil prohibet. Quando ergo copiosa est materia, & virtus fortis; non debemus expectare dum patientes proximi sint morti. Quoad *Vbi*; perforatio facienda in abdominis parte dextra, si lien est affectus; in sinistra, si iecur; per tres digitos sub umbilico versus latera. Indicatur hoc à subsistentia aquæ. Aqua indifferenter subsistit in qualibet parte ventris inferioris; nec tamen qualibet abdominis pars indifferenter aperitur; quia affectus secundum aliquas partes prohibet, secundum aliquas permittit. Dum enim affectio est in liene, oportet ut æger decumbat in parte sinistra: & hic decubitus est magis commodus, ratione huius ægri; quod si ergo foramen in hac parte fieret, vix posset præcaueri, ne aqua assiduo egrederetur. Eadem ratio est de iecore. Cucurbitulis etiam, & aliis cheirurgicis materiis uti licet: magna potissimum cucurbitula, cum multa flamma, abdomini in tympanite admoeri potest.

*Cucurbitu-
la.*

*Medica-
menta.*

*Vacuantiæ
materiam
remotam.*

Præsuppositis medicamentis communibus, de appropriatis loquemur: ea sunt Euacuantiæ, Alterantiæ, & Corroborantiæ, Vacuantiæ vacuant vel per *Διαφύσιν*, vel per Sensibiles meatus. Sensibiliter vacuantiæ, alia respiciunt causam remotam tumoris, alia proximam. Materia remota, est aqua, vel pituita. Aqua euacuari potest per aluum, & per lotium. Per aluum euacuatur materia aquosa *succo iuridis, succo soldanellæ, succo ebuli, & sambuci*. Respicimus hic ad materiam, quæ nondum in abdominis cavitatem est collecta, sed colligi potest: ideoque cum adhuc sit in venis & ductibus, non egemus remediis vehementissimis, nec ad elaterium ascendendum. Pituitosa materia euacuatur *agarico, carthamo*: non licet uti colocynthide. De rhabarbaro nihil dicimus, quia in hydrops est instar pestis; cum non bilis, sed pituita sit euacuanda. Utendum igitur agarico; non vehementioribus: quia respicimus ad pituitam, quæ residet circa iecur, & partes vicinas. *Vsu*. *Quantum*: succi propositi exhiberi possunt à 3 ij. ad 3vj. Et his utendum, toto ferme morbi processu, non tantum

tantum ante vehementiora, sed & post, prout aderit præsentia huius materiæ, quæ regeneratur, & nondum est perducta ad locum, ut tumorem efficiat. Licet etiam gratia huius materiæ uti diureticis proprie dictis. Quoad modum: potius administrantur in puluere; quia omnis materia humida, sua humiditate actuali nocet.

Quæ causam proximam tumoris sensibiliter vacuant; debent esse efficacissima. Ratione aquæ igitur probamus *claterium, antimonium*; quia hæc materia reperitur in illa cavitate abdominis, quæ est inter peritonæum & intestina, ubi non sunt meatus: unde necessarium est, ut medicamentum summa violentia attrahat materiam illam aquosam: ideo licet uti *claterio ad gij. iij. iij. & ultra, cum pilulis alephanginis, pro correctione claterij*. Ratione pituitæ, ascendendum ad *trochiscos albandal, qui conficiuntur à colocynthide*: probantur *pilula fætida, de euphorbio*. *Usus: quando*: His utendum post initiora: primum enim mitioribus utendum, deinde valentioribus, & rursus validioribus, pro præsentia materiæ vel proximæ, vel remotæ. Quoad euacuantia insensibiliter; probatur *medicamentum à cochleis, Metij: medicamentum ex artemisia, decocta in vino generoso, & dictamno Cretico*. *Emplastra à bacis lauri maxime probantur*. Si mittatur homo in acervum frumenti, sub radiis solariibus, est mirabile. *Sudorifera probantur, & præsertim novum illud instrumentum ligneum, quod ad exigendos sudores, in morbo potissimum Gallico, iam usurpari solet*. Probatur *emplastrum confectum ex albo veratro: unguentum Agrippæ*.

Vacuantia materiam proximam.

Roborantia sunt calida, ut *decoctum guaiaci, saffra: item hepar lupi valde commendatur*. In vivendi ratione, ab omni humido abstinendum.

Alterantia, & roborantia.

CAPVT XIX.

Plenior affectuum iecoris explicatio: & primum de vitiis ad hepar, ut membrum similitudine, spectantibus.



Ecur potest considerari, ut membrum simile & dissimile: ideoque variis morbis affici potest, cap. 6. lib. 2. x. r. x. cap. 7. lib. 5. loc. aff. Ratione partium similarium affici potest iecur Intemperie; item Imbecillitate, quam vocant hepaticam affectionem;

Morbi iecur infestantes.

præterea Cachexia & Hydropes ratione partium dissimilariū, affici potest iecur Obstructione. Quod si consideretur iecur simul & vt simile, & vt dissimilare: afficitur Inflammatione, Scirrhus, Ulcere. Inflammatio quatenus est intemperies, pertinet ad partes similes: quatenus tumor, seu magnitudo aucta, ad dissimilares pertinet. Idem dicendum de tumore scirrhoso. Vlcus est soluta unitas, quæ in partibus similiaribus & dissimiliaribus locum habet. Si iecur consideretur ratione suæ proprietatis, vt pars determinata: potest detineri morbo Gallico, de quo nos infra operis huius libro quinto agemus.

De iecoris Intemperie, Imbecillitate, Cachexia, & Hydropes: primo quidem de Definitionibus, & Causis.

*Dyscrasia
nomen.*

*Dyscrasia
iecoris,
quid.*

Per intemperiem intelligimus morbosam: quia versamus in parte curatrice, non in parte tuendæ sanitatis. Galenus enim cap. 4. lib. 2. temper. aliam facit intemperiem sanitatis, cuius ratione membrum est vel neutrum, vel insalubre, persistit tamen intra latitudinem sanitatis. Alia intemperies est ægritudinis, cuius ratione membrum egreditur limites sanitatis, & non est amplius neutrum, sed ægium. Est autem intemperies, temperamentum naturale immutatum, ladens operationes iecoris. Est crasis naturalis immutata: quia dū fit intemperies, fit morbus, qui procedit ex immutatione naturalis temperamenti. Est autem temperies mutata: & propterea morbus non est in fieri, sed in facto esse: morbus non consistit in mutatione, sed in mutato esse. Quæ autem sint causæ, ob quas naturale temperamentum immutatur: diximus cap. de intemperie ventriculi: verbi gratia cibus calidior, medicamentum calidius: hæc enim vt ventriculum calidiorem reddere possunt, ita etiam iecur. Quod de causâ calefaciente dicimus: idem de refrigerante, & reliquis dicendum. Facultas iecoris attractrix & alteratrix potissimum læduntur ob intemperiem frigidam: retentrix ob dyscrasiam humidam: expultrix ob siccam. cap. 2. lib. 3. de symp. caus. Hinc colligendum, si iecur afficiatur intemperie frigida: succedere hepatis imbecillitatem, cachexiam, & hydropem: quando enim non est admodum intensa intemperies, fit iecoris imbecil

Imbecillitas: si intensior, fit cachexia: si adhuc magis intensior, fit hydrops.

Imbecillitas iecoris vocatur affectus hepaticus, per quem interdum Galenus videtur intelligere frigidam intemperiem. At lib. 8. *κ. τ. π.* imbecillitatem iecoris etiam ex aliis intemperantiis oriri, statuit: cum dicit, plerasque hepatis affectiones, initium ducere ab illis deiectionibus, in quibus excreta similia sunt locuræ carnis animalis recens mactati. Verum quidem est: quod illæ deiectiones non perseverant, dum malum progreditur, sed mutantur, pro discrimine intemperiei: vnde optime locutus est Galenus, quando dixit, initium capere à deiectionibus. Inter initia sunt illæ deiectiones, mutantur autem malo progrediente, ut infra in signis trademus. Et forsitan Altimarus hoc non vidit. Exquisita imbecillitas & proprie dicta, refertur ad intemperiem frigidam: ratione cuius attractrix iecoris non attrahit, ut deberet: & sanguificatrix diminute sanguificat: vnde imminuitur functio attractricis & alteratricis, ratione frigiditatis. De causis autem intemperiei frigidae, locuti sumus cap. de intemperie ventriculi.

Quod si frigida iecoris intemperies magis confirmetur: *Cachexia.* Introducitur Cachexia, id est, malus habitus totius corporis: quod vitium est via ad hydropem, sicut imbecillitas ad cachexiam. Fit cachexia (quicquid dicat Altimarus) quando non sit bona nutritio, ob tertiam coctionem laesam. Læditur autem coctio hæc tertia. (sicut etiā coctio ventriculi, c. 1. l. 3. de sym. caus. non tantum ob intemperiem partiam, ut Altimarus velle videtur: sed etiam ob errorem externum, id est, ob vitium alimentum: maxime cum vitium primæ coctionis non possit corrigi in secunda: nec secundæ vitium in tertia. Læditur ergo coctio illa tertia, ob noxium alimentum, id est, ob vitiosum & improbum sanguinem, qui generatur ratione intemperiei iecoris frigidae. Hæc autem est Exquisita Cachexia. Notha secundum Avicennam fieri potest, etiam ob vitium pulmonis: quando aqua in pulmone colligitur. Quare *Cachexia est deformitas totius, procedens ab intemperie frigida iecoris.* Hinc colligitur, malum hoc esse symptoma, consistens in qualitate mutata: quæ qualitas mutata refertur in frigidam intemperiem iecoris, tanquam in morbum præcipuum.

Si intemperies magis magisque confirmetur, cachexia de- *Hydrops.* generat in hydropem, seu aquam inter cutem. Hoc malum

fieri nequit, nisi iecur afficiatur frigida intēperie. Temperamentum enim iecoris inutatur in frigidius, vt alimentum nō conuertatur in probum sanguinem, sed vel in aquositate, vel in sanguinem pituitosum, vel in flatum. Et his est hydrops exquisitus, in quo iecur per essentiam afficitur: ad differentiā Nothi hydrops. Galen. c. 7. l. 5. d. loc. aff. dicit, in hydrope affici iecur, interdum primario, interdū secundo. Quod male quidam interpretantur: interdum per essentiam, interdum per consensum. Si enim in omni hydrope iecur afficiatur dyscrasia frigida: quomodo potest affici per cōsensum? Quare statuendum, iecur semper per essentiam affici: frigidam tamen hanc dyscrasiam aliquādo in iecur primo introduci, interdum primo in alias partes, & ab his postea in iecur: verbi gratia, si quis post ieiunium bibat aquam frigidissimā & copiosam: verisimile est hinc iecur primo refrigerari, ob quam refrigerationem non fiat bona sanguificatio. Interdum autem ab aliis partibus frigiditas iecori impertitur. cap. 5. l. 2. ad Glauc. vt, si ob scirrhum lienis hydrops oriatur: cum enim ratione tumoris lien reddatur frigidus, hanc suam frigiditatem iecori communicat, vt iecur afficiatur frigido morbo.

Definitio. *Hydrops ergo est tumor ventris, productus ab intemperie frigida iecoris.* Tumor interdum est morbus, si ad insignem perducatur magnitudinem, vt functionem lædat, interdum est symptoma, cum non lædit functionem: vt explicatur c. 12. l. d. diff. morb. Quare Galenus ad varia respiciens, varie loquitur: nec ob id sibi contradicit, vt Argenterius existimat: nam in lib. de tumoribus præter naturam, circa finem, connumerat hydropem inter tumores, quatenus est morbus. At l. d. diff. sym. c. 4. vult, hydropem esse symptoma, & quidem in genere functionis læsæ. At obicitur: si tumor est symptoma: non tamen est læsa actio, sed qualitas mutata? Respondendum Galenum loco citato, hydropem considerare vt symptoma est, non ventris inferioris, sed iecoris: iecoris morbus est frigida dyscrasia, symptoma vero est læsa sanguificatio. Dicitur tumor ventris inferioris, ad differentiam hydrops, qui sit ē pulmone, & est tumor in ventre medio. Hic tumor ventris inferioris, producitur à frigida intemperie iecoris, ad differentiam hydrops nothi. Porro frigida iecoris intemperies in hydrope semper adest, secundum Auicennam: quia calor iecoris imminuitur, tum quia resoluitur, tum quia interdum extinguitur: nam calor iecoris naturalis interdum repente

Frigida iecoris intemperies: & huius causa.

imminuitur, interdum autem longiori temporis spatio remittitur. Et hoc Auicennas desumpfit è Gal. com. 1.1.2. prog. & c. 7. l. 3. loc. aff. c. 5. l. 2. ad Glau. & com. aph. 22. sect. 3. Addit Galenus. intemperiem hanc frigidam, esse vel Cum tumore iecoris, vel Citra tumorem. Dum est citra tumorem: hoc fit, vel ratione causæ Calefacientis, & proinde dissoluentis calorem naturalem (sicut minor flamma à maiori dissipatur, vt etiam insinuat Alexander) vel ratione causæ Refrigerantis. Quæ autem sit causæ calefaciens, quæ refrigerans dictum est in ventriculi intemperie: verbi gratia, immodicus vsus medicamentorum calefacientium, vsus frigidorum, copia frigida. Admonet Gal. imminui calorem iecoris, quia causæ calorem imminuentes, agunt in iecur, vel Immediate, vel per Medium. Immediate, dum verbi gratia è portione frigida iecur refrigeratur (hic in curatione respiciendum ad iecur, non ad aliam partem.) Interdum causæ agunt per medium: quod vel est Totum corpus, vel aliqua corporis Pars. Totum corpus multis de causis refrigerari potest: interdum propter febres, quæ calorem dissolunt: interdum ob immodicas euacuationes, quæ corpus refrigerant: idem accidit ob suppressam vacuationem consuetam, vel mensium, vel hæmorrhoidum: sic enim totum refrigeratur, & frigiditas iecori impertitur. Pars autem refrigerata iecori impertitur frigiditatem, vel per simam partem, vt refrigeratus ventriculus, refrigerata intestina, mesenterium refrigeratum, lien vitio frigido laborans: vel pars iecori frigiditatem communicat, per vias spectantes ad partem gibbam: vt sunt partes spirituales, nimirum pulmo: item renes & vterus. Hæ sunt causæ hydropis.

Sed pro recta hydropis curatione, paulo altius causas eius rimari oportet. Hydrops omnis fit à iecoris frigiditate: com. aphorism. 11. sectio. 4. attamen discrimen est: nam, si intensior sit frigiditas, oritur Ascites, quia aqua producitur, seu aquositas, & sanguis pituitosus: si frigiditas remissior, producitur vel sanguis pituitosus, vnde Hyposarca: vel flatus, vnde Tympanias. Loquemur ergo de causis materiæ aquosæ, pituitosæ, & flatulentæ.

*Causæ triæ
hydropis
specierum.*

Materia aquosa, secundum Auicennam, est causa coniuncta ascitis, seu tumoris abdominis (non intemperiei frigida, cuius est effectus.) Hæc materia aquosa frigida est & humida, quia producitur ab intemperie, non calida, sed frigida:

*Ascitis
causa.*

effectus autem sapiunt naturam suarum causarum: item oritur è potione frigida, ex usu cucumeris, anguriae, melonum. Hæc aqua dum egreditur per abdomen, aut per alias vias, foetet, nec videtur putredinis expertus: unde qui ascite laborant, interdum magna siti afficiuntur: vapores enim ab aquosa materia prodeuntes, calidi, sicci que, petunt os ventriculi. Frigida quidem hæc est materia, quia producitur à frigido: sed postquam genita est, cum sit excrementitia, & relideat in loco, qui familiaris & naturalis non est aquositati: putrescit, & ratione putredinis calorem acquirit: unde sitis, & reliqua fiunt. Hæc materia aquosa, est portio cibi & potus: quos dum natura conficere non potest, producit sanguinem aquosum: interdum & lotium ipsum permiscetur, nam ascite laborantes, exiguum reddunt lotium. Residet hæc materia inter Zirbum, & Siphac, id est, inter omentum & intestina, ut pertingat etiam ad diaphragma. Sed dubitatur, cur hæc materia in corpore colligatur? & cur potius in proposito loco, quam in aliis? item per quas vias in hanc abdominis capacitatem deferatur. Secundum Auicennam, colligitur hæc materia in corpore, vel ratione Facultatis, vel ratione Materie, vel ratione Viarum. Ratione facultatis, vel Segregantis iecoris, vel Attrahentis renum. Dum enim excut est robustum, & optima sit sanguificatio: fit etiam segregatio. & expulsio excrementorum, & proinde serositatis: quæ omnia fiunt à valido iecore. Sin accadat, ut iecur frigidius euadat: non potest propria munia obire, non recte sanguificat; non segregat: & hic est exquisitissimus hydrops, quia fit vitio iecoris. Si autem renes consideremus dum sunt robusti, valide attrahunt: dum imbecilles sunt, & præsertim dum frigidi, non attrahunt, & proinde serositas colligitur. Et hic est hydrops spurius: præsertim si cum frigiditate renum, non fuerit coniuncta frigiditas iecoris. Vitio autem materie hoc fit: quoties materia vel plurima (ut Auicennas inquit) vel non bene digesta. Plurima est, cum aliqui frigida copiosissima vtuntur. Et animaduertendum: si accadat, ut simpliciter retineatur portio, & venter intumescat, hic est hydrops spurius, qui facile tollitur: Si vero non modo detineatur portio, sed etiam refrigeretur iecur: tunc hydrops est legitimus. Materiam autem non bene digesta est, dum non bene concoquitur à iecore: & hic est hydrops exquisitus. Ratione viarum fit hydrops,

*Quibus de
causis ma-
teria aquo-
sa in corpo-
re colliga-
tur.*

hydrops, quoties viæ angustantur, & potissimum viæ ad re-
nes pertinentes. Angustantur autem vel ratione materiæ
copiosæ, crassæ, vel viscidæ, interdum ratione calculi, ra-
tione apostematis inflammationis. Hæ causæ sunt, per quas
materia in corpore retinetur. Sed cur potissimum residet in
cavitate abdominis? Auicennas dicit hoc fieri, ob imbecilli-
tatem partium, ob propinquitatem, & ob minus incommo-
dum. Ob imbecillitatem partis, quia partes debiles facile
suscipiunt, illa autem pars laxa est & debilis. Accedit pro-
pinquitas, est enim cavitas illa maxime proxima parti af-
fectæ, quia iecur in ventre inferiori residet. Denique mi-
nus detrimentum est: nam copiosa aqua diu potest in il-
la cavitate detineri, citra ægri interitum, & citra dolorem.

*Cur mate-
ria potissi-
mū in ab-
dominis co-
aceruetur.*

Sed per quas vias hæc aquositas deferitur? Plures sunt
modi propositi ab Auicenna. Primus esse potest, quem pro-
ponit Galenus, comment. aphorism. 55. sect. 7. vbi vult, iecur
interdum scatere quibusdam pustulis, seu vesicis, aqua reple-
tis, quæ postea, dum disrumpuntur, sunt in causa, vt neces-
sario illa aquositas in abdominis cavitatem dilabatur. Inter-
dum citra has vesicas materia in iecore residet, & in cavitatem
fluit. Interdum fluit per venas mesaraicas. Interdum
per umbilicales venas, quæ disrumpuntur. Interdum hic flu-
xus fit, si vas aliquod vrinarium disrumpatur: tunc enim
serosa materia confluit in cavitatem abdominis. Et hic est
exquisitus hydrops, in quo materia gignitur à frigiditate ie-
coris: & nisi ab hac gignatur, non est exquisitus hydrops, per
quascunque vias materia fluat.

*Quib. viis
materia a-
quosa in
abdomen
confluat.*

Quod de aqua & ascite iam diximus: idem dicendum de
sanguine pituitoso, de hydropo hyposarca: qui, si exquisitus
esse debet, necessarium est, vt sanguis pituitosus gignatur
à iecoris frigiditate. Hinc Auicennas dicit, in hyposarca cer-
tiam coctionem lædi, ita vt materia alimentalis partibus
adherere nequeat: vnde partes tument, & fit tumor œde-
matosus. Hæc coctio læditur, vel vitio Partis, vel vitio Ma-
teriæ. Ratione partium corporis: cum refrigeratæ sunt: vt
contingere solet iis, qui degunt in locis humidis, palustribus,
in carceribus humidioribus: ob has enim causas extimæ par-
tes corporis, ita refrigerantur, & languent: vt, licet ad
partes optimum deferatur alimentum, non tamen mutari
possit, nec regi à partibus tumentibus. Et hic hyposarca no-
tus est, quia non fit vitio iecoris. Vnde hyposarca interdum

*Hyposarca
causa.*

non

non admodum difficulter curatur: si scilicet non sit exquisitus. Interdū coctio tertia lēditur vitio materiæ. Hęc materia, quæ causat tumorē totius, interdū est materia non pituitosa, sed liquefacta: quemadmodū accidit in febribus. Quādo igitur colliquamenta fiunt, & angustia est in viis renum: non est impossibile materiam liquefactam, protrudi ad externas corporis partes: quæ cum non possit in substantiam partium conuerti: intumescunt partes. Sed hic spurius est hydrops, imo neque hydrops nomen meretur: cum potius fiat ratione causæ calfacientis. Interdum est materia pituitosa, quæ ad partes deferretur, ideoque cum vitiosum alimentum affluat, læditur coctio, non vitio partium, sed vitio ipsius materiæ. Hęc autem materia triplicem habere potest generationis modum. Primum enim hęc materia triplicem habere potest generationis modū. Primum enim hęc materia pituitosa produci potest, ob vitium pituitosum: & hic non est hydrops legitimus. Deinde hęc materia fieri potest ob errorem ventriculi, ob dyscrasiam ipsius: & frequenter solet contingere eiusmodi hydrops, sed non est exquisitus, cum non fiat vitio hepatis, sed ventriculi. Tertio fieri potest à frigiditate, & diminuto calore hepatis: & hic est hydrops anasarca

Tympania exquisitissimus.

causa.

Idem prorsus dicendum de materia flatulenta, quæ tympanitis est causa. Hęc materia flatulenta producitur, vel ratione Materiæ, vel ratione Agentis, secundum Auicem. quod à Gal. desumpsisse videtur, qui cap. 7. lib. 14. meth. vult, materiam flatulentam generari, interdum à calore diminuto, interdum à calore auctiore reddito: nec enim flatus tantum producuntur à frigida intemperie. Quod si materia flatulenta producatur ab intensiori calore: hoc necessario fit ob materiæ vitium, quæ suapte natura est flatulenta, vt sunt legumina: Et hic hydrops non est exquisitus, cū non fiat ob iecoris frigiditatem. Si flatus fiant vitio agentis: in tympania multiplex potest esse agens: nimirum Intestina frigida, ventriculus frigidus: interdum cōtingere potest, vt iecoris intemperies potius calida sit, quam frigida, inter initia, quando fit vitio ventriculi, non iecoris. At si fiat iecoris vitio, est exquisitissimus hydrops. Sed oritur dubitatio: nam com. aph. 11. sect. 4. dicitur, ascitem produci ab intemperie frigidiori hypofarcam & tympaniam, remissiori. Hinc ergo sequi videretur: quod, sicut iecur primo remisit, deinde intense frigidum

Dubium.

gidum fit: ita etiam patiens primo hypofarca, vel tympania, postmodum ascite, apprehendi debeat? Cui tamen experientia repugnat: cum multi ab initio statim ascite: eoque legitimo, corripantur? Responsio: Causa refrigerātes interdum adeo sunt potentes, vt breuissimo temporis spatio inducant dyscrasiam intense frigidam: vnde quamprimum fit ascites. Præterea notandum, has materias in hydrope plerūque esse permistas: vt interdum tumor abdominis producatur è materia pituitosa, & aquosa, & flatulenta. Frigida enim intemperies, siue intensa sit, siue remissa, has materias potest producere: idque ob diuersitatem materiæ & ciborum: non ratione agentis: sic cibi quædam partes sunt aquosæ: aliæ quæ facile in pituitam vertuntur, nonnullæ quæ in flatum. Idem in sanis quoque conspiciamus: iecur enim sanum, vnica constans temperie, per eam è variis ciborum partibus, non tantum sanguinem generat, sed etiam alios succos alimentales.

De Differentiis.

Intemperies, vel est Sine materia, vel Cum materia. Quæ *Differentia,* sine materia, est Simplex vel Composita, vt diximus cap. de intemperie ventriculi. Si cum materia: hæc est sanguinea, pituitosa, biliosa, melancholica, flatulenta. Cum autem intemperies frigida occurrat: si remissa fuerit, oritur Imbecillitas dicta: si intensior, Cachexia: si adhuc intensior, Hydrops: Et, si ratione dyscrasiæ frigidæ intensioris, producatur pituita, fit Anasarca: si flatu, Tympanias: si aqua, cum summa est intemperies, fit Ascites.

De Signis.

Ad iecoris dyscrasias cognoscendum, oportet excrementa inspicere, cap. 7. lib. 5. loc. aff. Si enim hæc vitiosa sint, & nullus error commissus in cibis, ratione vel quantitatis, vel qualitatis, vel ordinis: statuendum, esse vitium aliquod internum, id est, intemperiem alicuius partis, potissimum ventriculi, vel iecoris: id quod è corporis colore internosci potest: si enim nulla in corporis colore appareat mutatio, intemperies est ventriculi: si color mutetur, iecur intemperatū est. Nos ad hoc signum à calore sumptum: (cui multum Galenus tribuit, vt etiam Auicennas, cap. proprio:) alia addere possumus. Dum enim ventriculus læditur, non modo excrementa sunt mutata, sed etiam aliquid chyli excernitur. Quæ autem sit intemperies, num calida, frigida, humida, *Dyscrasia iecoris signa.* sicca:

sicca : cognosci potest è cap. de intem. ventriculi : & ex iis quæ proponit Gal. cap. 6. l. 8. κ. π. Verbi gratia , si calidior fuerit intemperies , aderit cibi inappetentia , portionis appetentia , id est , sitis : pulsus frequens , velox : deiectiones biliosæ . Et quia intemperatum est iecur , interdum etiam aliquid sanguinis egreditur : vt quidam dysenteriam esse suspicentur , sicur Gal. dicit , cum tamen non sit : vomitus biliosus , interdum bilis æruginosæ , secundum Alexandr. lotium flauum : caliditas mordax , præsertim secundum plantas pedum , & volas manuum : scabrities linguæ : corpus emaciatum . His addi possunt causæ calefacientes prægressæ : item quod ægri calidis læduntur , iuuantur frigidis . Si dyscrasia , frigida : erit potius cibi appetentia , nulla sitis , pulsus tardus , rarus : excrementa pituitosa , & c. Si humida intemperies : nulla sitis , pulsus mollis , excrementa humidiora : lotium spissum , crassum , secundum Auicennam , neque corpora gracilia : præcessere causæ humectantes , iquantur siccis , læduntur humidis . In *sicca* intemperie , omnia sunt opposita . Quod de intemperie simplici diximus : idem de composita statuendum , signis coniunctis . Si intemperies annexam habeat materiam : num hæc materia sit sanguis , bilis , pituita , melancholia , status : cognosci potest ex iis , quæ diximus cap. de intemp. ventriculi .

Imbecillitas hepatis signa.

Hepatica affectio , cognoscitur ex excrementis . cap. 7. l. 5. loc. aff. c. 6. l. 3. κ. ρ. Non sufficit , eam iudicari subrubicundis excrementis , quæ similia sunt loturæ carnis , & c. sed cum imbecillitas hepatis multiplex sit : distincte cognoscendum , quamnam facultas potissimum lædatur . Si enim læsa fuerit attractrix : deiectiones erunt liquidæ , chylosæ , quia chylus non attrahitur . Si alteratrix , id est , sanguificatrix : tunc apparebunt deiectiones illæ , similes loturæ carnis . Si retentrix fuerit debilis ; non tantum hæc deiectiones apparebunt , similes loturæ carnis , sed etiam frequens erit deiectio , quia retentrix læsa , non retinet , vt opus est : hoc non fit dum alteratrix læditur . Si expultrix læditur : potius est alui stipticitas , & exigua deiectionis .

Cachexia signa.

Malus habitus facillime cognoscitur : totius enim corporis habitus subhumidus veluti est . Sed distinguendum , an hoc vitium productum sit , vel ratione partium externarum corporis , vel ratione materiæ . Si vitio partium : præcesserunt causæ , quæ potuerunt partes labefactare , refrigerare , hu-

meectare :

medtare: verbi gratia, si quis decubuerit in carceribus subterraneis, in locis frigidis & humidis. Si nihil tale præcesserit, iudicandum, cachexiam ortam esse, ratione materiæ, seu prauæ alimentæ ad partes delati. Vtrum autem alimentum hoc vitiosum sit redditum, vel ob errorem externum in cibis, vel ob vitium ventriculi, vel ob vitium iecoris: è propriis capitibus cognoscendum: si præcessit praua viuendi ratio: si sunt indicia læsi ventriculi: his non apparentibus, indicatur hepatitis intemperies. Cachexia autem triplex est: nam est via ad hydropem, vel ascitem, vel hypofarcam, vel tympaniam. Si via fuerit ad tympaniam: flatus dominantur, sunt querelæ flatibus: vnde tympanites imminet. Si hypofarca immineat: in toto corpore apparet veluti flauities quædam & extumescencia, initium œdematosi tumoris, qui sane non apparet in cachexia tendente ad ascitem, vel tympaniam. Si ascites immineat: lotium sensibilibiter imminui conspicietur.

Hydrops facile cognoscitur è tumore ventris inferioris, *Hydropis* qui effatu dignus est: adest sitis, difficultas anhelitus, &c. *signa.* Præterea è commen. 3. lib. 2. prognost. adest tumor pedum, in omni specie hydropis, magis tamen in vna, quam in altera. Quoad signa differentiarum: num hydrops originem duxerit à causa vel calefaciente, vel refrigerante: cognoscitur ex iis quæ fuere prægressa. An hydrops subsistat, vel cum tumore scirrroso iecoris, vel citra cognoscitur ex indiciis tumoris scirrholi: de quibus proprio capite. Præterea oportet distinguere, an causa hydropem faciens: agat in iecur vel per aliquod medium, vel immediate. Si enim nullum fuerit vitium in toto, si nulla etiâ sit noxa in parte corporis: certe hydrops ortus est à causa, quæ sine medio iecur reddidit intemperatum: verbi gratia, si hydrops frigidæ potum secutus est: cui dubium est, sine medio eum esse causatum? Quod si, verbi gratia, præcesserit scirrhus lienis: patet quod ex hoc duxerit originem. Si solita vacuatio sit suppressa: facile est concludere, è toto originem duxisse, & à toto iecur fuisse affectum. Quoad species hydropis: è cap. 3. lib. 4. de dignosc. puls. oportet abdomen tangere, percutere, & ad latera conuoluere. Compresso enim abdomine, si fouea inducatur, tanquam in pasta: est anasarca, tumor œdematosus, pituitosus. Si pulsus sonitus audiatur, vel etiam durities percipiatur: est tympanites: percussio enim & collisio flatuum, edit strepitum.

pitum. Sed præterea etiam duritiem considerare oportet: si enim percusso abdomine hydropici, non audiat sonitus, interim autem sit durities: etiam tunc est tympanias: nam durities illa non potest fieri à pituita, nec ab aqua, sed à flatu. E duritie ergo inferitur tympanites, licet non sit sonitus: sed is non est verus tympanites, sed permixtus cum ascite: unde cum venter sit repletus flatu, & aqua: ratione flatus sit durities: aqua autem impedit, quo minus sonitus possit audiri. Si deuoluto ægro de latere in latus audiat fluctuatio: cognoscitur aquositas, & ascites. Cognito ascite, quæritur an aqua genita sit vitio vel virtutis, vel materię, vel viarum. Si vitio virtutis: vel iecoris non segregantis, vel renum, non attrahentium. Cognoscitur autem è signis indicantibus intemperiem frigidam iecoris: de quibus diximus: è signis indicantibus intemperiem frigidam renum: de quibus capite proprio. Si fuerit ratione materię: vel est copiosa, vel non digesta. Si copiosa: præcessit frigida potus immodicus. Si non bene digesta: assunt signa cruditatis, excrementa cruda, vt supra diximus. Si ratione viarum: cognoscitur, quia est angustia, vel in renibus, vel in vicinis partibus. Et de obstructione renum, dicendum in proprio cap. Idem dicendum de hyposarca: oportet enim cognoscere, an productus sit, vel vitio partium, vel materię: idque è causis prægressis. Materia sua habet signa indicantia.

De Indicationibus.

*Dyscrasia
quid indi-
cet.*

In intemperie, oritur indicatio alterandi per contrarium: cap. 3. lib. 2. meth. cap. 3. lib. 7. meth. & pro specie dyscrasie, diuersa oritur indicatio alterandi, siue simplex fuerit intemperies, siue composita. Si materia sit coniuncta: præter alterationem, oritur indicatio euacuandi: euacuatio autem pro materię varietate variat: verbi gratia, si dyscrasia est cum materia sanguinea, oritur indicatio euacuandi sanguinem, &c.

*Imbecilli-
tatis indi-
cationes.*

Imbecillitas pendet è frigidiore iecoris intemperie: ergo oritur indicatio calefaciendi.

*Cachexia
indicatio-
nes.*

Quoad cachexiam: indicationes hauriendæ sunt à partibus extimis: à materia quæ decumbit in partes extimas: atque à iecore, hanc materiam producente. Si consideremus extimas partes, quæ veluti subtumidæ apparent: considerari oportet imbecil

imbecillitatem partium, quæ potest esse natiua, & ascititia. Natiua non indicat, dependet enim à lege naturæ, quia à natura factum est, vt in corpore aliquæ partes essent robustiores, transmittentes: aliquæ imbecilliores, vt sunt partes externæ: vnde partes extimæ non sunt corroborandæ, quia remearet materia in viscera, in partes principes, quæ à natura redditæ sunt robustiores. Imbecillitas partium ascititia originem ducit ex erroribus, qui committuntur circa habitationem in locis frigidis, & subterraneis humidioribus: vnde hæc imbecillitas consistit in intemperie frigida & humida partium. Ratione ergo huius imbecillitatis ascititiæ oritur indicatio roborandi, partes externas calefaciendi & siccandi, vt beneficio huius roboris possit alimentum à toto regi. Si consideremus materiã, quæ est in causa cachexiæ: oritur indicatio euacuandi, quæcunque sit illa materia, quia noxia est. Si consideremus partem generantem, est iecur frigidum: quare oritur indicatio roborandi, id est, calefaciendi iecur: prius tamen totius habita prouidentia.

In curatione autem hydrops, Galenus tres intentiones proponit, circa finem li. 2. ad Glau. Primo, vt sanemus durum tumorem visceris. Secundo, vt admoueamus, quæ possunt humiditatem exsiccare. Tertio, vt in potu præbeamus præsidia, quæ vrinam ciere possunt. Hæc dicta ad rei naturam reuocanda. Hydrops igitur est tumor ventris infimi, productus à frigida hepatis intemperie. Respiciendum ergo ad tumorem, & ad causam tumoris. A tumore oritur indicatio euacuandi materiam, è qua tumor productus, siue sit aqua, siue flatus, siue pituita, &c. Et hoc est, quod Galenus dicit, applicanda esse medicamenta humores dissipantia, id est, quæ eradicant humorem abdominis. Quoad causam: hæc duplex est materia, quæ nondum fluxit in ventrem, licet genita sit, fluere tamen potest: altera causa, est frigida iecoris intemperies. Materia genita, quæ nondum fluxit in cavitatem ventris inferioris: indicat reuellentia, & potissimum derivantia materiam per lotium, si materia talis sit, quæ facile possit per illas vias deduci: si alia est, per alium. Hinc Galenus, ratione aquositatis, in potu offert diuretica, vt fiat derivatio materiæ ad renes, & vias lotij. Vitium iecoris est causa, vi cuius potest noua noxia materia generari: ratione huius vitij oritur indicatio roborandi iecur: si tantum est frigida intemperies, oritur indicatio calefaciendi: At si iecur,

*Hydrops
indicatio-
nes.*

non tantum afficitur frigida intemperie, sed etiam tumore scirrholo, & proinde afficitur mala compositione: oritur indicatio, non tantum calefaciendi: sed etiam, ratione duri tumoris, molliendi & discutiendi: unde Galenus proponit sanantia durum visceris tumorem, respiciens ad vitium iecoris, ad causam generantem nouam materiam. Tres igitur præcipuos scopos Galenus proposuit: disculsionem tumoris: reuulsionem materiæ, & roborationem iecoris.

De Prognosticis.

Dyscrasia. Iecoris intemperies vitium est non contemnendum: quia viscus læsum est præcipuum, quod natura, quantum potest, tueri conatur: ideo dum intemperatum euadit, vitium non caret periculo, Discrimen variat, pro specie dyscrasiæ, ut diximus cap. de intemp. ventriculi. Dyscrasia in actiuis, facilius corrigitur, quam quæ in passiuis est, &c.

Imbecillitas. Imbecillitas vitium peius est, quam simplex intemperantia: nam dyscrasia in imbecillitate est intensior: cum sit malum, quod hydropem minatur, nisi celerrime occurramus, cap. 6. lib. 8. u. 164. Si tamen diligentia adhibeatur, curari potest.

Cachexia. Maior difficultas est in cachexia, quæ hydropi propior est, quam imbecillitas. Attamen & hæc curari potest: dummodo, ut Auicennas monet, non prodeat ex hydropo pulmonis, quæ notha est cachexia: item si non prodeat à morbis acutis, quia hæc maxime est periculosa.

Hydrops. Galenus com. 3. lib. 4. de vict. acut. eos errasse monstrat, qui tympaniam solum curari posse crediderant: nam etiam ascites, & hyposarca interdum curantur. Hydrops ergo interdum lethalis est: interdum curatur, modo facilius, modo magis difficulter, pro discrimine causarum & symptomatum: verbi gratia, si hydrops fiat post morbum acutum, est lethalis, comment. 1. & 3. lib. 2. prognost. quia vires redditæ sunt imbecilles, & iecur est refrigeratum. Attamen Hippocrates aphor. 5. sect. 7. ait: à furore hydrops, bonum. Furor autem existit in morbis acutis: & sic hydrops morbis acutis succedens, videretur bonus pronuntiari? Responsio. Hydrops à furore bonus est, non absolute, sed secundum quid: non ratione furoris, qui dum perseuerat, celerrime homines pereunt: Si ergo hydrops succedat, succedit vitio acuto, ideoque malus est, & incurabilis: dicitur autem bonus secundum

cundum quid, quia hydropici diutius viuere possunt, nam homines celerius pereunt ratione furoris. Præterea Hippocrates ait, aphor. 43. sectio. 6. si lienosis succedat intestinum difficultas, & hæc protrahatur in hydropem: moriuntur: quia validissimæ causæ præcessere: primum enim præcessit tumor lienis, ratione cuius potest refrigerari iecur, & debile reddere totum corpus: succedit dysenteria, quæ, ratione tum euacuationis, tum doloris, vires potest labefactare ac dissoluere: vnde si postea succedit hydrops, necessario homines pereunt. Galenus cap. 5. lib. 2. ad Glauc. ait, tumorem hepatis scirrhum ab initio sanari posse: antiquum esse incurabilem, vnde patientes hydropici sunt, & necessario moriuntur, quidam tardius, quidam citius: citissime quidem illi, in quibus alui fluxus coniungitur: vires enim valde dissipantur, dum iecur patitur scirrhum, & hydropem, aluique fluxus accedit. Hippocrates tamen aphor. 29. sectio. 7. inquit, ventris fluxum fortem esse bonum: vbi loquitur de hyposarca (non de hydropem in genere) qui non fit ob tumorem scirrhum lienis: & præterea si euacuatur materia, quæ euacuari debet: Nos autem supra loquebamur de alui fluxu, qui coniunctum habet hydropem, scirrhumque lienis, vnde vires prosteruntur. Addit Auicennas, hydropem à liene procedentem esse minus prauum, quam qui à iecore primario oritur: lien enim non est membrum principale, vt iecur. Hæc sunt prognostica ratione causarum. Quoad symptomata, Auicennas dicit, pessimum esse hydropem, dum ea quæ excernuntur admodum foetida sunt: indicant enim corruptionem, & summam virium imbecillitatem. Pessimus etiam hydrops est, dum quasi portiones quædam carnez aluo reiciuntur: indicant enim iecoris corruptionem, & citam mortem afferunt. Præuus est hydrops, quando in alui deiectionibus aliquid sanguinolentum conspicitur: tunc enim non euacuatur materia, quæ hydropis causa est, sed sanguis, qui non deberet vacuari. Sumuntur etiam prognostica à lotio: Quanto enim lotium magis est exiguum, tanto deterior hydrops: quia significatur materiam in ventrem decumbere. Eo etiã peior hydrops, quo magis coloratum est lotium: non enim tingitur ob iecoris caliditatem, sed ob partes sanguinis: neque ratione frigiditatis portio serosa à sanguine segregatur. Lotium igitur coloratum est prauum signum: & interdum summe tinctum:

*Quenam
hydropis
species pe-
riculosior.*

apparet, frigidus interim existente iecore. Pessimum etiam est signum, dum adest anhelitus difficultas, dum tussis molesta est: tales enim morti sunt proximi. Quoad differentias hydropis: secundum Auicennam, ascites maxime periculosus: & quidam dari potest hyposarca, leuior ceteris speciebus: ut in medio tympanias collocatus videatur. Aetius autem dicit, tympaniam esse peiorem ascite, ut etiam Aetius. Auicennas fundamentum sumpsit, e comm. aph. II. sect. 4. ubi Galenus inquit, aquositas, quæ viget in ascite, produci ab intemperie frigidior, quam sit frigiditas, producens flatum & tympaniam. Si ergo in ascite iecur redditur frigidius, quàm in tympania: ascites videtur magis lethalis. Et minime periculosus anasarca videtur: quia, materia pituitosa sit ab intemperie minus frigida, quam sit frigiditas producens vel aquam, vel flatum. Auicennas igitur respexit ad causam, quæ producit materiam. At Aetius respexit ad materiam, quæ tumorem causatur: facilius enim remouetur aquositas, quam flatum: nimirum per punctiōem abdominis, quæ flatum vacuari nequit.

De Curatione.

*Venæsectio
in dyscrasia
hepatis.*

In dyscrasia iecoris, si sanguis redundat, est euacuandus, & quidem valido auxilio, quia vehemens affectus. Vnde potissimum venæsectio conuenit in calida intemperie, in qua sanguis redundare potest. Et sic tum sanguis vacuatur, tum iecur refrigeratur.

Num in iecoris imbecillitate venam secare liceat,

In iecoris imbecillitate, generatur improbus sanguis, qui euacuandus est: & si eum natura euacuat, medicus non debet euacuare: si autem natura non euacuat, arte sanguis educendus. Hinc Galenus cap. 6. lib. 8. v. 11. non proponit venæsectionem: quia (ut ibidem inquit, & cap. 2. lib. 3. de symp. caus. & cap. 7. lib. 5. de loc. affect.) loquitur de iecoris imbecillitate, in qua euacuatur materia similis loturæ carnis recens macerata, id est, in qua egreditur sanguis ille crudus, qui gignitur ob imbecillitatem iecoris: cum ergo in hac imbecillitate absint excrementa cruenta, non egemus euacuatione quæ sit arte. Quod si materia, & sanguis ille in corpore detineatur, ob suppressionem hæmorrhoidum, aut menses: tam sane, quia sanguis redundat, isque malum fouet, & à natura non vacuatur: artis ope est subtrahendus, & quidem venæsectione, ut pote valido auxilio, quia iecoris imbecillitas

tas est affectus insignis & validus: dummodo ætas, & vires permittant. Ætas potest permittere. Sed etiam vires possunt permittere: nam si aliquando in hydropē virtus ita valida est, ut venæsectionem permittat: multo magis in hepatis imbecillitate: quia in hydropē, ob intensiorem intemperiem, vires magis sunt prostratæ: præterea è comm. 3. lib. 4. de rat. vict. in hypofarca licet venam secare: ergo, multo magis in iecoris imbecillitate. Et hoc est, quod præcepit Auicennas: nō enim in qualibet iecoris imbecillitate venam aperit, sed in ea, cuius causa est suppressio hæmorrhoidum, vel mensium: ut periculum sit extinctionis caloris, nisi sanguis euacuetur. Altimarus non meminit venæsectionis: forsan quia Galenus cap. 6. lib. 8. *κ. 7. 8.* non proponit venæsectionem in cura imbecillitatis iecoris. Capite enim nono eiusdem lib. proponit quidem venæsectionem, sed ibi non loquitur de imbecillitate iecoris, sed de alio affectu, nimirum, de tumore. Quomodo autem Galenus non admittat venæsectionem, & quomodo Auicennas eandem admittat, è iam dictis patet. Mensibus autem suppressis, potissimum aperiendæ sunt venæ inferiores. Hirudines hæmorrhoidibus affigendæ. Et, si vires non usque adeo constant, loco sectionis venæ crura scarificanda: cucurbitulæ applicandæ sunt cruribus, popliti, & supra malleolos. Quod si iecoris imbecillitas contumax sit, ut iecur non exacte possit corroborari: ad præservandum potius, ne incidant ægri in cachexiam, vel hydropē, probantur fomentum & cauteria, quæ cruribus, sunt administranda.

De cachexia idem dicendum, quod de imbecillitate. Auicennas enim venam aperit, dum oritur è retentione sanguinis. Et quia in hydropē aliquando venæsectio convenit: multo magis in cachexia, in qua vires non sunt ita languidæ. Præsertim autem confugiendum ad emissaria, ut præferantur homines ab hydropē.

Quoad hydropem: Altimarus saltem verba Galeni proponit, & nil aliud. Galenus comm. 3. lib. 4. *vict. ac.* ait in hypofarca venam posse aperiri, dummodo oriatur è suppressis mensibus, vel hæmorrhoidibus, vel ex alia causa, quæ plethorica sit: ascitem autem vel tympanitem, neminem ausum fuisse per venam sectam curare. Ergo è Galeni sententia venæsectio competit tantum in hypofarca, & quidem in illo solo, qui oritur à sanguine retento. Auicennas autem

*Venæsectio
in cachexia.*

*Nō in hydropē
venæ
secanda.*

venæsectionem approbare videtur, etiam in ascite & tympanite: nam in cap. de ascite inquit: si hydrops sit ascites, & homo correptus sit pleuritide, quamprimum esse secandam venam: deinde curandum esse hydropem: Et hypofarca dicit, aperiendam esse venam, & magis in hoc, quam in reliquis. Quare in reliquis etiam admittit venæsectionem. In tympanite ait, venæsectionem locum habere, quamvis raro. Hic ad vera fundamenta confugiendum. Nunquam secunda vena, nisi absit indicatio euacuandi sanguinis: nisi sit peccatum sanguinis. Peccatum igitur sanguinis hoc in loco duobus modis pendere oportet: Primo, ut hydropem fouet, ut est origo hydropsis. Secundo, ut fouet non hydropem, sed alium morbum, qui cum hydrope coniungitur. Si primo modo consideramus sanguinem, quatenus hydropem fouet: redundat sanguis tantum in hypofarca: dum enim malum aliud progreditur, & sit ascites, ac tympanites: magis refrigeratur iecur, ut non possit esse illa sanguinis copia, quæ tantum redundat in anasarca. Propterea si obruatur calor, sicque iecur refrigeretur ob retentum sanguinem vel mensem, vel hæmorrhoidum, vel alium: tunc sanguis originetur & fomentum præbet hydropi anasarcæ: & nisi occurramus, vique adeo suffocabitur calor, ut non modo sit anasarca, sed etiam fiat ascites, ac tympanites. Oritur igitur indicatio euacuandi sanguinem: & quidem valido auxilio, quia validum vitium. Et hoc ipsum Galenus proponit, commentar. iij. libr. 4. de vict. acut. ubi venæsectionem in anasarca: respiciens ad sanguinem qui fouet hydropem, qualis redundat tantum in anasarca. Si autem consideremus sanguinem, quatenus fouet morbum cum hydrope coniunctum, siue cum anasarca, siue cum ascite, siue cum tympanite: necesse est sanguinem euacuare. Ponatur enim quis ascite correptus, (est enim hic sæuior hydrops) & simul etiam anginam patiat: si venam aperiamus, iecur magis refrigerabitur, & augebitur hydrops: si non aperiamus venam, ilico homo strangulabitur. Quare necessarium est venam aperire: ut imminenti mortui occurramus. Et hoc significauit Auicennas: nam capite de ascite, proponit tales hydropicos, qui conqueruntur de dolore catarrhali ex inflammatione: ideoque ait, propter morbum coniunctum quamprimum venam secandam, postea hydropem curandum esse. Quare Auicennas hoc loco venæsectionem

non dirigit ad hydropem: quia præcipit, ut post venæ sectionem curetur hydrops. Si ergo aperienda est vena, ratione anasarcae: secentur venæ internæ, hæmorrhoides aperiantur hirudinibus, & secentur, quæ propositæ sunt in iecoris imbecillitate. Quod si aperiuntur venæ, non ratione hydropis, sed ob vitium coniunctum cum hydrope, si verbi gratia fuerit angina, cephalica tundenda (nec enim respicimus ad sanguinem fouentem hydropem, sed morbos iunctos hydropi) vel aliæ secandæ venæ, pro diuersitate morborum, cum hydrope coniunctorum.

*Quæ vena
secanda.*

Sed præterea in hydrope aliquando confugiendum est ad cucurbitulas, ad vesicatoria, ad cauteria, ad punctiones, ad setaceum, & per forationem abdominis. Cucurbitulæ non scarificatæ, secundum Rhafim, & magnæ, & cum copiosa flamma, abdomini applicantur in tympania, post totius purgationem: status enim discutiunt valentissime.

Cucurbitula.

Vesicatoriis potissimum in ascite vtendum: quamuis & in anasarca non improbentur: possunt enim serositates educere. Possunt affigi variis partibus, videlicet cruribus, imo etiam abdomini. Vnde non tantum vno licet uti vesicatorio, ut in febribus pestilentibus, sed pluribus, pro rei necessitate: ideoque in utroque crure duo fieri possunt, in abdomine 4. est enim affectus rebellis, & omnia, tentanda, antequam ad perforationem deueniamus. Vesicatoria fieri possunt à *batrachio*, vel *hammula tonis*, ex *alio*, è *lepidio*, potissimum è *cantharibus*. Nec formidandæ sunt cantharides, quod noxam inferant vesicæ: si enim extrinsecus vsurpentur, leuis est noxa, quæ facile corrigi potest. Cantharides etiam semper præsto sunt. Ita præscribatur: *℞. pulv. cantharidum præparatarum ʒ ss. (non ordine pro duobus vel tribus vesicatoriis, ut in febribus pestilentibus, sed pro viij. & decem) pulueris sinapis ʒ ss. fermenti ʒ vj. (alij solent accipere ʒ j. & ʒ j ss. ac sufficiens ʒ vj. imo iij.) aceti scillitici parum, fiat pasta.* Acetum scilliticum non est in causa, ut cantharides non operentur: ego enim sæpius vsus sum: si non imponatur, neque tum erit malum. Aduertendum autem quia hydrops est morbus diuturnus: & vesicatoria operantur solum per 3. 4. aut 6. dies: quid postea sit agendum. Nam dum vesicæ disrumpuntur, aqua egreditur: & dum postea imponimus folia hederæ, vel vitis, cum butyro: purgatio plerunque succedit per 3. vel 4. dies, non ultra: at in hydrope aliquando vacuationem

Vesicatoria.

produci oportet per.20.30. aut plures dies. Et hoc etiam obſervandum eſt in febre peſtilenti. Quidam denuo veſicatoria ſolent applicare. Sed ſi admoveantur iſdem partibus, quibus prima vice applicata fuerunt: excitantur dolores acerbiffimi, & vires reſoluuntur. Quare vel illis partibus non affigenda: vel (quod melius eſt) illis partibus applicandum *emplaftrum ſacrum*, quod *diadiſtammum* vocatur, quoniam ingreditur dictammum creticum: hoc enim medicamentum vim habet euocandi à centro ad circumferentiam. Et (quod obiter dico) ſi in aſcite applicetur toti ventri: optime facit.

Cauteria.

Cauteria in hydrope locum non habent, ſi tumida ſunt crura: vlcera enim in hydropicis difficulter curantur. aphoriſm. 8. ſectiō. 6. quia exſiccationem poſtulant, cum interim hydropica corpora humidiora ſint. Præterea calor in hydropicis languet: vt periculum ſit, ne vlcera caneroſa euadant. In veſicatoriis autem alia ratio eſt, quæ potius exco-riationes ſunt, & tantum partes ſuperficiarias corrumpunt: cauteria autem altum ſubeunt. Ergo vidi, tumore pedum præſente, & aſcidente, ſupra genu factum eſſe cauterium, indeque obortam gangrænâ, & miſerum obiiſſe. Quod ſi crura nondum ſint tumida, nondum labefactata: poſſumus cauteriis vtî: ſic enim homines præſeruantur, & mitior hydrops tollitur, & forſan etiam ſæuior. Auicennas in capit. de aſcite, proponit cauteria: prius tamen abdomen perforat: & ſic procul dubio cauteriis vtitur ratione præſeruationis, non ratione curationis. Quare in aſcite, ſi tumidi ſunt pedes: locum non habent cauteria. Si non ſunt tumidi: poſſumus iis vtî, & ante perforationem, & poſt eam. Ante perforationem: cum crura non ſunt tumefacta: hiſ enim id interdum efficitur, vt perforatione non ſit opus. Poſt perforationem vtimur cauteriis: vt homines præſeruemus, ne ruſus incidunt in hydropem. Quod ſi enim contingat, vt aliquis hydropicus citra perforationem ſanetur: ſi videatur periculum imminere, ne ruſus fiat hydrops, (quod periculum in ætate declinante imminet) optimum etiam eſt poſt remotum hydropem cauteriis vtî.

Puñtiones.

Per puñtiones & ſcarificationes, quæ talis applicantur, aqua copioſa effluit, per locos decentes: capite tertio, libro nono. x. rōz. Sed in aſcite non tantum expedit perforare partes inferiores: verum etiam ſecundum Aetium ac-
bus

bus interdum pun gere licet scrotum, quia in hydropse aqua in scrotum descendit: & experientia optimum hoc fuisse remedium comprobauit.

Setaceum fit ferro candente, quo perforatur cutis scro- tidum materia descendit in scrotum. Possumus igitur pun- ctionibus, vel setaceo vt: prout ægri magis vnum auxilium, quam aliud admittunt.

Setaceum.

Abdominis perforatio est maximum præsidium: quo v- tendum, quando præsentés sunt scopi & indicantes, & per- mittentes. Indicantes scopi, sumuntur è rebus præter natu- ram: quæ sunt hydrops, & materia aquosa. In solo ascite licet perforare: in reliquis speciebus non. Quod si autem hydrops ascites fuerit lethalis: verbi gratia si originem du- xerit è scirrho iecoris: si subsecutus fuerit morbos acutos, &c. aut si alia signa lethalia affuerint: non est ad hoc præ- sidium confugiendum. Quoad materiam aquosam, in ab- dominis interstitio collectam: aduertendum, num tumor sit amplius, nec ne: si magnus, indicat perforationem: si parvus, nequaquam. Deinde, si non modo sit magnus tu- mor, sed etiam celerrime ad hanc magnitudinem perue- nerit: etiam hoc velox incrementum indicat perforatio- nem. Tercio: si, exhibitis hydragogis, aquositas euacua- tur, nec tamen tumor imminuitur, sed vel in eodem consi- sit, vel etiam augetur (quia maior est portio materiæ quæ regeneratur, quam quæ euacuatur) ex hoc etiam indica- tur perforatio cutis. Ratio autem cur modo dicta indicent perforationem, hæc est: dum enim hæc conspiciuntur: indi- cant tantam esse hydropis vehementiam, vt non sit cessu- rus reliquis præsiidiis, sed tantum maximo huic præsidio, himirum perforationi abdominis. Scopii permittentes & prohibentes, sumuntur è rebus secundum naturam, & non naturalibus. Auicennas non perforat abdomen, nisi cor- pus fuerit valde forte, id est, quod post perforationem pos- sit mediocre perferre exercitium, & minorationem cibi: tale autem corpus est, quod non est gracile, in quo non est macies, præsertim circa femora & vmbilicum. Dum ergo acceditis ad patientes, non expectetis donec fiant debiles: quia frustra postmodum hoc auxilio vte- mini. Quare corporis macies prohibet. Requiritur etiam ætas florens, media inter puerilem & senilem. Quoad res non naturales: aer debet esse temperatus, non calidior,

*Perforatio
abdominis
Indicantia.*

*Permitten-
tia natura-
liora.*

nec frigidior: tempore igitur hyemis, aer alterandus. *De Ratio uti- tempore.* Dicit Auicennas: non audeas perforare abdomen, di. quandiu possibilis est alia cura. Hoc Moderni ita explicant: omnia prius esse tentanda, quam ferrum. At maximus hic est error: nam Auicennas etiam post perforationem aliis auxiliis vitur. Quare id vult docere Auicennas: non esse ascendendum ad perforationem abdominis, nisi præcognoscamus, malum aliis leuioribus præfidiis tolli non posse. Dum ergo videmus tumorem celerrime incrementum, & alia proposita: ilico est confugiendum ad hoc remedium: Quod si enim omnia prius voluerimus tentare: procul dubio gracilis reddetur patiens, & virtus prohibebit. Si igitur præcognoscamus malum tanti esse vigoris, quod omnibus resistat auxiliis, præterquam perforationi: audacter ad hanc confugiendum est, non tamen citra prædictionem: necessariis enim indicandum, malum esse periculosum, & vnicam spem salutis restare, quæ in hoc posita sit auxilio. Hora eligenda est, in qua cibus non replet ventriculum. *Quomodo,* vero auxilium hoc administrandum sit Albucasis docet, & cheirurgi norunt. *De loco.* Perforatio fieri debet per tres digitos infra umbilicum, potius versus latera. Ratio est: quoniam ibi non sunt tot partes nervosæ, tot tendines, ut in media parte. Ut autem sciatur, num perforatio fieri debeat in parte sinistra, vel dextra: aduertendum, num hydrops originem duxerit è tumore lienis, vel iecoris: an vero nullus sit tumor: quia etiam citra tumorem hydrops fieri potest. Si tumor sit lienis, perforanda pars dextra: si iecoris, sinistra. Memini perforatum esse quendam Hebræum, qui spatio 24. horarum obiit: quia nocte sequenti (in die enim facta est perforatio) effluxit copiosissima aqua, ita ut paupimentum conclauis aquositate illa permadesceret: quod factum est, quia noctu patiens decubuit super latus perforatum: unde tota nocte egressa est aqua, & tandem sequenti die ipsa anima. Quare si tumor est in liene, perforandum latus dextrum: tunc enim patientes minori molestia decumbunt in latus sinistrum, quia non ita suspensum est viscus eo decubitu: ideoque si tum etiam latus sinistrum esset perforatum, facile noctu aqua in maxima copia egrederetur: quod non fit, si latus dextrum est perforatum. Si iecoris sit tumor, pars sinistra perforanda: ob

dictam rationem. Si hydrops sit citra tumorem iecoris, vel lienis: oportet agros interrogare, in quo latere melius & frequentius dormire soleant: nam eius oppositum erit perforandum.

Extrahenda porro est per foramen non vniuersa aquositas, sed maxima eius portio: quia quod reliquum erit aquæ, ceteris præfidiis poterit eradicari. Id autem non confertim, sed sensim faciendum. Male igitur quidam singulis vicibus ad 3. vel 4. libras aquæ educunt: dicentes, nisi in magna copia aqua educatur, tunc maiorem esse portionem eius quæ regeneratur, quam quæ euacuatur. Maximus hic est error: nam singulis diebus aqua educi debet, non ad libras, sed in parua copia: & exhibenda sunt ea quæ iecur corroborant, ne gignat adeo copiosam aquositatem: tunc enim minor erit portio quæ regeneratur, quam quæ vacuatur. Pauca ergo aqua, & ea sensim vacuanda. Quod etiam Hippocrates affirmat, aphorism. 27. sect. 6. dum suppurati, inquit, & hydropici, vruntur vel secantur: si pus, vel aqua vniuersim effluerit, moriuntur: quia (vt Galenus addit) imminuuntur vires, ob spirituum exitum: & viscera etiam ventris inferioris (quæ antea ratione aquositatis tumida erant, nec indeorsum tendebant) post aquam confertim euacuatam collabuntur, & secum ducunt superna viscera, quæ laxiora sunt: vnde vires concidunt. Quare poteritis euacuare ad 3. viij. aut viij. singulis vicibus, modo magis, modo minus, pro virium tolerantia. Quare suasu Auicennæ tangatis pulsum, & semper manum arteriæ admotam teneatis: & dum incipit virtus vel parumper debilitari, desistendum ilico: nec expectanda euident imbecillitas.

De medicamentis communibus, nimirum de lenientibus, præparantibus, purgantibus, & corroborantibus, sæpe diximus. Auicennas in hydropse vomitoriis vtitur: quia his fit reuulsio ad superiores partes, ne materia decumbat in cavitatem. Priuata medicamenta alia sunt Euacuantia, alia Alterantia: & per alterantia intelligimus non tantum cassificantia, sed etiam refrigerantia, huiectantia & exsiccantia: quia loquimur de intemperie iecoris qualibet. Euacuantia respiciunt potissimum hydropem, eiusque materiam, vel Fluxam in cavitatem, vt Fluxuram. Materia fluxura euacuanda est interdum per vomitum, interdum per secesum, interdum (& potissimum) per lotium, interdum per sudorem

Diuretica. sudorem. De vomitoriis alias diximus : iam tantum particularia præsidia proponemus. Per lotium euacuantia sunt diuretica : quæ (quicquid alij dicant) diriguntur tantum ad materiam , quæ potest decumbere in cavitatem : non ad materiam quæ iam est collecta : hæc enim per lotium euacuari nullo modo potest : & , licet hoc fieri posset , non tamen deberet fieri : nam materia in cavitare residens , si per lotium euacuanda esset , oporteret vt rursus ingrederetur iecur : at non est committendum , vt materia noxia membrum nobile ingrediatur. Diuretica igitur non vacuant aquâ fluxam , sed eâ quæ fluere potest : & sic ne fiat prohibent. Hinc Galenus diuretica in potu addit , lib. 2. ad Glaucon. in fine : quæ multa sunt , & proponuntur *à Galeno cap. 3. lib. 9. n. vñ.* item ab Auic. Aëtio. & aliis. Præstantissima autem sunt quæ conficiuntur *è radice flicis, ex asparagi, è spica nardi, è fenicelo, petroselino, dictamno, cretico, calamintha montana, pulegia, cinamomo, maci, caryophyllis, nucis moschata, è speciebus dialace, è speciebus diacureuma, diacymini, diacalamintha.* Cû intensioribus autem mitiora sunt permiscēda, nimirum *capill. Vener. ceterach, liquiritia, ius cicorum, & alia* quæ possunt calidiora illa attemperare. Sed non dari debent copiosa diluta : (qualia propinantur si non adest hydrops :) non igitur excedent liquores $\frac{3}{4}$ iij. vel vj. & expedit propositis medicamentis vti in puluere. Poterimus ergo exhibere , verbi gratia *specierum diacureuma, vel diacalamintha $\frac{3}{4}$ j. & cum Symplo de corticibus citis conficere pilulam : postquam deuorata propinabimus ius cicorum $\frac{3}{4}$ iij. vel vj.*

Cantharides, diureticum vehementissimum, in ischuria hydropicorum.

Interdum hydropici patiuntur lotij suppressionem : unde non tantum augetur aquositas in abdomine , sed etiam imminet mors repentina. Quare in promptu habere oportet remedium aliquod potens : vt est *vlus cantharidum*, quæ maxime in ascite per os exhibendæ. Sed has Dioscorides cap. lib. 6. vesicæ ceu venenum aduersari dicit, eamque exulcerare. Nec est, vt quis dicat , Dioscoridem aliud sensisse, dum lib. 2. cantharidibus ad hydropem vtitur : ibi enim è mente aliorum loquitur. Galen. cap. 6. lib. 2. de antidot. aliquo modo videtur improbare vsum cantharidum, cum Asclepiade. Aui-cennas cap. de hydrope, scribit, quosdam fuisse, qui exhibuerint cantharides : seque eum putare errorem maximum. Hippocrates contra cantharides in potu probare videtur *comment. 12. lib. 4. vñ. acut. & Galenus admittit in com-*

ment.

ment, itemque lib. 11. simplic. Quare sciendum, exhiberi posse cantharides, quibusdam seruatis conditionibus. Primum, si in hydropē (& etiam in aliis casibus) lotium ita sit suppressum, ut non cedat aliis auxiliis: quia ergo mors imminet, cogimur ad validissima confugere. Et hoc faciendum est, quando lotium est suppressum, non vitio vesicæ: (sic enim possemus occurrere syringa ipsi angustiae) sed ob vitium renum, quod in hydropē solet contingere. Præterea notandum, ut cantharides propinentur integræ. cap. 6. lib. 2. de antidot. Dum enim extrinsecus cantharides applicamus, ad vesicas excitandum, utrimur solo ventre, reiectis alis & pedibus: hæc enim in causa sunt, ut venter non possit ita valide operari: nec periculum est ut partes extimæ lædantur, solo ventre applicato. At si intro exhibentur cantharides, ad duo oportet respicere: primum, ut operentur, & lotium prouocent, cuius gratia ventrem exhibemus: deinde, ne inferant insigne detrimentum, cuius gratia permiscemus alas & pedes, quæ partes in causa sunt, ne venter ita noceat vesicæ. Quinetiam ex seruandæ sunt conditiones, quas proponit Galen. cap. 23. lib. 3. simplicium, ut exhibeantur in parua copia, & permixtæ cum aliis medicamentis, potissimum cum iis, quæ in causa sunt, ne vesica plurimum patiatur. Quare poteritis exhibere *cantharidem unam integram, cum 3 j. vel pulu. ruta, vel spica, vel cum aliquo consimili. Et superhibendum datur aliquid pingue, ut inris pulli pinguis 3 iij. vel vj. ut colligitur è ediment. 124. lib. 4. viêt.* Hoc modo vtiliter & tuto dantur cantharides, in hydropē, & aliis lotij suppressionibus. Ego ab omnibus desertos, cantharidum vsu restitutos vidi.

Auicennas *urinam* in potu exhibet: ut etiam Galenus cap. 3. lib. 9. *κ. 502.* attamen lib. 10. simplicium ait, esse auxilium ingratum & abominabile. Conuenit quidem, quia calfacit, detergit, aperit, quæ omnia profunt hydropi. At si patiens non libenter admittat, non debemus ea uti: quia non desunt alia medicamenta. Quod si sponte quis expetat, dari debet. Præterea Aëtius monet, in ascite ferme toto curationis tempore exhibenda esse diuretica: quia in ascite assiduo generatur aquositas: ideoque ea assiduo est deriuanda ad vias lotij. Fiat ergo ius superius propositum à Galeno. sic enim frequenti diureticorum vsu, & diminuimus materiam, & calefacimus.

Alia diuretica.

Hydrotica.

Per sudorem etiam euacuandum, quod faciunt eadem proposita diuretica: in rerum autem affectibus declarabimus, quæ magis pronocent lotium, quæ magis sudorem. Quare iisdem utendum, quæ fuere proposita, exceptis cantharidibus. Commendatur etiam *guaiaci & sassaparilla decoctum*. Præterea excitandus est sudor medicamentis, quæ extrinsecus admoventur, & potissimum *balneis fœcis*, quæ conficiuntur ex herbis calfacientibus, & aqua calida: vix enim homines restitui possunt, nisi sudent.

Hydragoga.

Est etiam aquositas sensibiliter vacuanda per secessum. Medicamenta quæ hoc præstant, vel respiciunt materiam nondum delapsam in cavitatem abdominis: (de cuius materie euacuatione in præsentia loquimur) vel eam, quæ iam decubuit in cavitatem. Utrobique medicamenta conueniunt quæ sunt hydragoga: at ratione aquæ collectæ, exhibenda sunt robustissima: ratione aquæ nondum delapsæ, mitiora, quia hæc materia est fluxilis, tenuis, ac facile attrahitur, præsertim quia assunt ductus, per quos facile attrahitur. At materia aquosa, quæ in cavitatem abdominis fluxit, non reperitur in iecore, neque in venis, sed extra eas. Vnde, licet tenuis sit: difficilius tamen elicitur, quam materia crassa, viscida, pituitosa & melancholica, eo quod hæc materia crassa melancholica, quæ euacuatur per secessum, reperitur in venis: at materia aquosa est extra venas, ideoque non sunt ductus commodi, per quos ad intestina deueniat. Quare

*Ad aquam
in venis
adhuc ha-
rentem.*

utendum est remediis valentissimis, quæ deleteria sunt, & ad grana tantum exhibentur. Quoad materiam, quæ nondum defluxit, possumus vel *succo iridis, radice iridis, à ʒ ij. vsque ad ʒ vj.* & proponuntur à Dioscoride, Auicenna, Aëtio, & Galeno cap. 3 lib. 9. *x. rón.* In eadem quantitate prodest *succus qui extrahitur à secundo cortice sambuci: item succus qui extrahitur à radice bulb.* Possunt hæc medicamenta exhiberi, cum *mulsâ ʒ iij. vel iij.* Potest exhiberi puluis, cum *mulsâ*. Possunt decoqui *folia in iura pulli, vel columbi: & exhiberi folia brassicæ marine.* Materia quæ in cavitatem fluxit, non potest euacuari superioribus medicamentis, nisi exhibeantur in maxima quantitate. Quæ autem vere id præstant, sunt vehementissima: eaque vacuât vel sensibiliter, vel insensibiliter. Sensibiliter vacuant, *succus stithymalorum, grana cataputia, antimonium præparatum.* Ego etaterio vtor: incipio à ʒ iij. quia est validissimum medicamentum, & postea exhibeo ʒ ij. ad v. sed

*Ad aquam
in cavitatem
deiciendam.*

insensibiliter. Sensibiliter vacuant, *succus stithymalorum, grana cataputia, antimonium præparatum.* Ego etaterio vtor: incipio à ʒ iij. quia est validissimum medicamentum, & postea exhibeo ʒ ij. ad v. sed

sensibiliter

sensum : nec augenda dosis , nisi materia euacuanda postulet , & vires tolerant. Formula: ℞. elaterij ꝑ ij. pil. alephang. ʒj. cum succo iridis, fiat pilula. Quidam hydropici non possunt admittere elaterium, sed in syncopen labuntur : ideo his non est dandum. Quidam facile ferunt. Qui elaterium non possunt admittere, ij neque antimonium ferunt, quod vehemens est, & admodum periculosum: idem de succo tichymali statuendum. Ego tunc imitor Aëtium: Sumo radicem cucumeris agrestis, & incisam redigo in puluerem, cuius pulueris ʒ j. immitto in vinum generosum, ut maluaticum, ad ʒ xij. vel xij. macero per triduum : & exhibeo vinum hoc cum pulvere, tribus vicibus, per tres dies continuos, postea intermitto per 3. vel 4. dies : & rursus exhibeo per triduum : rursus intermitto, & rursus exhibeo. Si enim tumor citra ægri molestiam minuitur : radix enim illa vino corrigitur, quod etiam corroborat ventriculum & iecur. Composita medicamenta huius generis, sunt pilula de sagapeno, fatide, de euphorbia, de elaterio : est etiam medicamentum illud, quod alkalkangi vocant, & recipit proposita medicamenta. Ego magis probō elaterium, vel puluerem radiceis. Elaterium non vna tantum vice exhibendum, sed singulis hebdomadibus semel, per vices v. aut vij. ut pluribus vicibus aqua euacuetur. Profunt etiam ea quæ extrinsecus applicantur, cap. 3. lib. 9. α. ρ. ο. π. Vnde Mesue laudat unguentum factum ex arsanita, seu cyclam. unguentum Agrippa, & proponit medicamentum, factum ex elaterio.

CAPVT XX.

De obstructione hepatis.

Obstructio Auicennæ dicitur mater ægriitudinum iecoris : & est species angustia, cap. 8. lib. de diff. morb. Generatur autē dum humor iecoris meatus ita replet, ut fiat morboſa obstructio, vi cuius necessario lædatur operatio totius hepatis. Quare iecoris obstructio, est angustia morboſa iecoris, producta ab humore, replente meatus iecoris. Forma est angustia, ad differentiam ampliationis & dilatationis meatuum. Est autē angustia morboſa, ad quam immediate sequitur læſio actionum: non autem

Generatio.

Definitio.

Forma.

tem illa angustia, quæ intra sanitatis latitudinem consistit Subiectum, est iecur. Licet enim causa obstructionis primo agat in meatus iecoris, non tamen hi tantum afficiuntur morbo, sed totum iecur, cap. 6. lib. 2. meth. Obstructio potest esse morbus vasorum ex accidente: prout accidit, vasa esse particulas iecoris, seu membri instrumentalis. Hic autem morbus per se statuitur tantum totius iecoris, quoniam actio quæ læditur, est actio totius hepatis, quam obit iecur, ut est membrum dissimulare. Quare angustia morbosæ subiectum est iecur.

Causa efficiens.

Causa efficiens, est humor. Si enim meatus repleantur ab alia materia, ut à calculo, quod interdum in ictero accidit, tunc illa angustia non est obstructio, sed constipatio. Hic autem humor, modo est Sincerus, modo Permixtus cum flatu. Dicimus, humorem replere meatus, ad differentiam compressionis, quæ fit à materia extrinsecus detenta, quæ comprimendo angustat: & ad differentiam subsidentia, quæ fit citra humorem replentem: & ad differentiam coalescentia, cuius causa est cicatrix. Porro obstructio non est ex usu, & permanentiam habet momentaneam: nam remota causa, sponte evanescit. cap. 1. libr. 1. loc. affect. Ideo natura humoris, à qua utiles indicationes sumuntur, accurate cognoscenda. Hic ergo humor, quatenus est mixtum, & substantia interdum Pura est minera, interdum Permixtum habet vaporem, seu flatum. Quoad quantitatem, obstructio fit, non tantum à materia quæ toto genere est præter naturam, & putrida, ut est sanguis corruptus, sed etiam à materia, sola copia peccante. Est etiam peccatum aliquando in qualitate secunda: si materia est crassa, ut melancholia, pituita, sanguis: aut viscida, ut pituita. Hæ materiæ generantur in iecore, vel Aliunde confluunt. Generantur autem in iecore, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læditur facultas ob morbos, potissimum ob dyscrasias. Error externus est, dum iecori bene constituto, offertur vitiosus chylus, siue producat vitio ventriculi, siue ob errorem externum. Interdum materia non generatur in iecore, sed confluit vel à Toto, vel à Parte, à capite, à ventriculo, à liene, ab utero. Et hic confluxus fit, vel per modum Attractionis, dum iecur est calidius, aut dolore afficitur: vel per modum Transmissionis, dum iecur imbecillum est redditum, & ad fluxiones suscipiendas maxime idoneum.

Ratione

Ratione formæ differentia tantum est secundum Magis & Minus. Sed notandum cum obstructione aliquando coniungi posse intemperiem, ut duplex sit morbus, & tunc etiam 3 forma sumi possunt differentiæ. Si ex intemperie ita lædatur actio, ut generetur humor vitiosus, qui est causa obstructionis: tunc intemperies illa non est recensenda inter morbos, sed inter causam efficientem, quatenus generat humorem obstruentem. Quod si intemperies illa talem succum non gignat: non tamen ex hoc propriæ differentiæ sunt hauriendæ: nisi dicamus, obstructionem esse coniunctam cum alio morbo, sicut etiam cum obstructione febris esse potest. Quare veræ differentiæ sumuntur à subiecto, & causa efficiente. Quoad subiectum: obstructio occupat iecur secundum partem Simam, vel Gibbam. Ratione causæ efficientis: sumuntur differentiæ, vel ab humore, de quibus supra dictum: vel à meatibus iecoris, id est, à subiecto, non morbi, sed humoris, id est, causæ efficientis. Hi ergo meatus sunt vênæ partis Gibbæ, vel Simæ: Præterea vel pertingunt ad Vesicam felleam, unde fit icterus citrinus: vel ad Lienem, unde icterus niger: vel ad Reliquas partes simas iecoris, unde fit simpliciter obstructio iecoris.

Vbi obstructio est morbose (secundum Auicennam cap. 1. proprio, & Galenum cap. 2. lib. de cib. bon. & mal. succ.) ægri grauitatem quandam persentiunt secundum iecoris regionem. Et quia impedita facultas non exacte sanguificat: cognoscitur è mutatis excrementis, potissimum è lotio exiguo, quia obstructio transitum impedit. Sic etiam cognoscitur ex aliqua mutatione coloris corporis totius, faciei, &c. pallor enim quidam notatur, quia non generatur sanguis ille floridus, quemadmodum antea.

Quoad differentias formales, quæ improprie sunt differentiæ: cognoscitur obstructio maior vel minor, è conditione symptomatum: nam quo sunt vehementiora, eo maior obstructio. Quoad differentias à loco affecto, è cap. 7. lib. 3. loc. affect. cognoscuntur: nam si, verbi gratia, in parte gibba fuerit obstructio, fieri potest, ut, dum tanguntur hypochondria, abdomen secundum illam regionem resistat: atque hinc etiam fit, ut partes ad thoracem spectantes magis lædantur: & cum septum transversum comprimatur, aliqua oritur respirandi difficultas: & talis patiens maxime conqueritur, se non posse scalas ascendere, ut antea: & ob leuem etiam

1.
Signa differentia-
rum.
2.

motum corporis percipit in anhelando difficultatem, quia iecor secundum partem conuexam est affectum, quæ maiorem habet consensum cum partibus thoracis. Si vero secundum sinuam iecor affectum fuerit: tactu nihil percipitur, quia illa pars est satis remota: nec ita patientes conqueruntur de impotentia ad motum, nec de difficultate anhelitus. Magis autem in consensum ducitur ventriculus: vnde inappetentiæ oboriuntur. Hinc etiam facile sitis excitatur. Et fieri potest, ut alui excrementa non sint vere sanguinolenta: liquida esse possunt, quia chylus non permeat: sed cum chylus in iecur perducere nequeat, quia obstructum est, alui excrementa apparent, vel non sanguinolenta, vel si sanguinolenta conspiciuntur, sunt sanguinolenta non vere & proprie, sed instar loturæ carnis nuper mactatæ: ut nonnihil cruoris in iis conspiciatur, quia chylus, quamuis non potest è toto in sanguinem mutari, tamen rudem aliquam acquirit mutationem.

3. Quoad differentias à causa efficiente. Differentiæ erant duplices: vel ratione materiæ humoris, vel ratione subiecti humoris. Quoad differentias ratione humoris: aut corpus quod obstruit, sit vel sanguis, vel pituita, vel bilis: & qua ratione gignatur: & quo modo confluat: alterius est loci, ubi traduntur signa huius vel illius humoris dominantis, & signa indicantia causas generantes.

4. Quoad differentias, ratione subiecti, non morbi, sed causæ efficientis: si materia obstruens occupabit meatus, pertinentes ad vesicam felleam: color aderit citrinus, & aderunt reliqua signa citrinæ icteritiæ. Si vero obstruantur viæ respicientes lienem: cognoscetur è corporis colore nigro, & signis icteritiæ nigra. Si vero materia occupat reliquas partes: non erunt indicia icteritiæ, sed erunt excrementa mutata sanguinolenta, & non sanguinolenta: ut, si fiat obstructio viæ in gibbo iecoris, erunt sanguinolenta, quia in parte sinu non obstructa generatur sanguis, qui tamen non potest distribui, ob vias obstructas, spectantes ad partem gibbam: retrocedit ergo cum excrementis per aluum effluens, & alui excrementa reddit sanguinolenta: quod non apparet, si reliquæ viæ fuerint obstructæ.

Præsidia.

Vtiles indicationes sunt Vitales & Præseruatoriæ. Quoad vitalem: hæc indicat conseruans: Indicatio enim vitalis, tantum sumitur à virtute, cuius essentia pertinet ad calorem innatum iecoris, qui nihil aliud indicat, quam calidum

mode

moderate, & astringens moderate. Medicamentum autem hepaticum, sumitur etiam à virtute iecoris, sed ab essentia ignota, ideo non indicatur, sed requiritur tantum. Hæc igitur essentia nobis ignota, nihil aliud est, quam sedes & domicilium virtutis: nimirum, proportio quardam determinata & ignota, peculiaris iecori. Proportio hæc requirit remedium simile: quia inter proportionem datur similitudo & dissimilitudo: verbi gratia, inter proportionem magnetis & ferri, datur similitudo.

Differentia autem est inter proportionem: quia una est maioris actiuitatis, alia minoris: hinc facultas illa, quæ limitatur à proportionem magis efficaci, habet rationem patientis: exempli gratia, maxima dissimilitudo est inter proportionem magnetis & adamantis: sed proportio adamantis est efficacior: & ideo quamprimum fricamus magnetem, ilico desinit à proprio munere: vnde necesse est reperere medicamenta, quæ viuificant hanc proportionem à proprietate.

Indicationes præseruatoriæ desumuntur à materia, & à *Indicatio-* causa generante materiam: verbi gratia, si obstructio fiat à *nos.* materia copiosa, indicat minuens: si à crassa, attenuans: si à viscida, detergens. Et merito causæ generantis, si materia viscida pituitosa generetur à ventriculo frigido: oritur indicatio calefaciendi.

Obstructio est vitium magni momenti: quia læditur san- *Prognosi-* gnificatio ad vitam necessaria. comin. penult. lib. I. de salub. *ca.* diæta. Et, ubi adest obstructio, est initium & fundamentum omnium morborum. Variat periculum, pro vi differentiarum. Quoad formales differentias, quantumuis improprias: prout obstructio maior vel minor est, ita maius vel minus est periculum.

Quoad differentias à subiecto: cæteris paribus, maius est periculum, si iecur afficitur secundum partem gibbam, quam secundum sinistram: ratio est, nam ea pars magis remota est, & promptius cor trahit in consensum.

Quoad differentias à causis efficientibus: deterior est obstructio, si fiat à minera tantum, quam si à minera & vapore simul seu flatu: facilius enim vacuatur flatu. Satis etiam periculosa est illa obstructio, quæ fit à materia toto genere præter naturam, à materia putrida: & tunc cum obstructione plerumque febris iungitur, vnde vires bifariam patiuntur, tum ratione morbi iecoris, tum ratione febris. Minus periculosa est

obstructio facta à materia quæ peccat sola quantitate, quam quæ sit à materia crassa & viscida : nam facilius materia copiosa minuitur , quam crassa attenuatur. Intenditur etiam vel minuitur periculum, prout materia fuerit magis vel minus crassa & viscida: vnde, si fiat à materia melancholica, quæ est crassissima, vt sæpe durities contrahatur: fieri vix potest, vt homo sanitati restituatur. Quod dictum est de materia, idem intelligendum de causa generante , prout magis vel minus efficax fuerit.

*Curatio.
Phlebotomia.*

Venæsectio locum habet, si adest indicans, nimirum sanguis , & vis eius vehemens. Hinc Auicennas dicit, in iecoris obstructione esse secandam venam , quando sit antiqua. Quod non superficialiter intelligendum: nam si semper expectare vellemus , donec antiqua fieret obstructio, hæc certè ita aueretur, vt valde esset periculosa. Item si fiat obstructio à materia pituitosa, viscida, crassa: si hæc antiquetur, non est vena secanda, quia non peccat sanguis: & secundum Galenum cap. 14. lib. 11. meth. per venæsectionem non remouetur obstructio, quæ producitur à crassa & viscida materia: idque eo minus, quo magis est antiqua. Auicennas ergo per obstructionem antiquam insinuat vehemens in sanguine peccatum. Ideoque si obstructio fiat à sanguine , non cedente leuioribus præsidiorum materiis , vena est secanda. Quoad *vbi agendum* : sanguis habet eam subsistentiam, vt commode euacuetur per venam basilicam. Si autem obstructio oriatur à suppressis mensibus : tunc sanguis eam habet subsistentiam, vt prompte euacuetur per saphenam : præsertim quia sanguis peccat secundum motum , dum impetum habet ab utero in iecur, ab infra ad supra: vt deorsum reuelli expediat, & proinde venæ infernæ secandæ.

Fonticuli,

Probantur etiam fonticuli secundum crura, præsertim in obstructione, quæ non fit à sanguine, sed à crassa viscida materia, quæ aliquando ita est rebellis, potissimum si coniuncta est frigida intemperies iecoris vel ventriculi , vt fonticulis yti cogamur, quo materia noua, quæ regeneratur, non fluat ad venas, sed potius ad crura reuellatur.

*Phæque-
mia.
Vacuistia,*

Medicamenta alia communia, alia determinata. Communia sunt, quibus etiam in aliis morbis est locus : & sunt quæ determinatos humores possunt euacuare. Vnde, si pituita peccet, utendum agarico: si melancholia, epishymo, sena , polypodio: si bilis

stilis flava, rhabarbaro. Circa hæc medicamenta notandum: Error quo-
 à plerisque errores committi, potissimum in usu *rhabarbari*: runda in
 opinantur enim nos in qualibet iecoris obstructione tuto usu rha-
 vi posse rhabarbaro. Si namque à bile fiat obstructio, pro- barbani.
 batur rhabarbarum: si à pituita, vel melancholia, nequa-
 quam: præsertim quia pituita est tenuis. Quod si peccet pi-
 tuita crassa, vel melancholia, nocebit usus rhabarbari: eua-
 cuat enim bilem, quæ sui præsentia habet rationem mate-
 riæ sanantis, cum sua caliditate remittat frigus pituitæ, &
 melancholiæ: attenuet etiam, atque aliquo modo detergeat.
 Est etiam alius error circa rhabarbari usum. Cum enim hic
 morbus diuturnus sit, præcipiunt Medici, ut æger frequen-
 ter, id est, singulis vel alternis diebus, mastice rhabarba-
 rum, & deuoret. At hoc pessimum est consilium: vacuatur
 enim bilis, quæ non peccat, & proinde non est euacuanda:
 & intenditur quoque obstructio, quia rhabarbarum non ad-
 ministratur in infusione, sed in substantia, quæ ob crassitiem
 in causa est, ut obstructio augeatur. Errant etiam, quia exhi-
 bent rhabarbarum masticandum cum passulis, ut iniuncun-
 ditastollatur: sed hac ratione rhabarbari substantia perdu-
 citur ad iecur, ad locum obstructum: dulcia enim sunt vehi-
 culum aliorum: vnde vasa illa magis obstruuntur. Quare
 non indifferenter utendum rhabarbaro: sed pro materiæ
 diuersitate, remediis diuersis utendum.

2.

In obstructione, ut etiam in hydrope, opus est uti vitali- Vitalia re-
 bus: ut est *hepar lupi*, *cythoides Galeni capite septimo libro ossa- media: re-
 no. x. r. o. n. magna antidoti*, *absinthium*, *mentha*: & hæc sunt cale- spicientia
 facientia. Refrigerantia sunt, *rosa*, vel *saccharum rosatum*, ci- tum pro-
 choracea, ut *endiuia*, *cichorium*, *sonchus*. Hæc sunt materiæ portionem,
 medicamenti vitalis: quædam tamen sunt hepatica, quædam tum cal.
 non. Vitalia sunt, sed non hepatica, quæ non respiciunt pro- innatum
 portionem iecoris, sed manifestis qualitatibus respiciunt iecoris.
 calidum eius innatum, quod indicat moderate astringens.
 Hac de causa Auicennas in obstructione hepatis, utitur at-
 tenuantibus & detergentibus, ut remoueatur peccatum
 materiæ, ut crassa scilicet attenuetur, & viscida detergea-
 tur: quare hæc sunt præseruatoria. His autem permiscet
 astringentia, ut seruetur iecoris calidum innatum: talia
 sunt *rosa*, *cichoracea*, *absinthium*, non ratione omnium fa-
 cultatum, sed ratione facultatis astrictoriæ. Quare abstin-

thium, verbi gratia, est materia remedij vitalis, & præseruatorij: vitalis, vt habet vim astringendi & muniendi calorem naturalem: præseruatorij, vt habet vim detergendi. Hæc igitur quæ respiciunt calorem, sunt quidem vitalia, quia conseruant calorem, sed non sunt hepatica, nisi improprie, cuiusmodi est *agrimonia*, &c. Hepaticum ergo est *hepar lupi*.

Obstructio? Si obstructio hepatis coniunctam habeat intemperiem
cū dyscrasia calida. calidam: respiciendo ad materias vitales, sic possumus præscribere: *Recipe trochiscorum cyphoeidis ʒ ij β. hepatis lupi ʒ β. pulueris agrimonie ʒ ij. conserua cich. rosarum. ana ʒ j β. cum syrupo de succo sonchi, fiat electarium. Cuius dosis à ʒj. ad ʒ j.* Ratio huius medicamenti. Institutum est conseruare iecoris facultatem, conseruando scilicet eius calorem innatum, per illud, quod habet similitudinem cum proportionem iecoris: propositum etiam est, remouere dyscrasiam calidam iecoris. Trochisci igitur cyphoeidis, respiciunt proportionem iecoris, & parum calefaciunt: cuius gratia adduntur refrigerantia. Iecur lupi est basis, & est materia remedij vitalis: præcipua enim causa est corroborationis hepatis: quemadmodum propria caro iecoris est præcipua causa sanguificationis: ideo immiscetur hoc medicamentum in magna satis quantitate, ad ʒ β. & præsertim quia per primas qualitates non potest nocere. Puluis agrimonie misceatur, vt inuuet attenuando, & per moderatam caliditatem hepatis calorem conseruet: non autem obest calore suo, quia non pertransit primum gradum. Miscetur conserua rosarum & cichorij, vt remittatur calida iecoris intemperies: deinde vt ob leuem vim astrictoriam, iecoris calor vaiatur: tertio, quia dulcia iecori amica sunt, hæc medicamenta vehiculum sunt reliquorum, & sunt in causa, vt medicamentum citius perducatur ad iecur. Additur syrupus de succo sonchi, vt medicamentum acquirat eam consistentiam, quæ oblectat agros.

Obstructio cum intemperie frigida. Si iecoris obstructio coniunctam habet frigiditatem: medicamentum tale erit: *Recipe hepatis lupi ʒ β. misbridi antiqui ʒ ij. pulueris absinthij ʒ ij. conserua ex absinthio, & foliis agrimonie viridis ana ʒ j β. cum syrupo de corticibus citri fiat electarium, cuius dosis à ʒ j. ad ʒ j.* *Hepar lupi*, in hoc medicamento, tota substantia prodest: & cum in actiuis sit temperatum, nec calore, nec frigore potest ob esse. *Mithridatium*

propor

proportionem habet similem proportioni iecoris : & præterea calefacit. Absinthium per leuem astringtionem conseruat hepatis calidum innatum : & ob caliditatem, remittit frigidam intemperiem. Conseruæ remittunt intemperiem. Et quatenus tum ipsæ conseruæ, tum syrupus de corticibus citri, constant saccharo, faciunt vt medicamentum facile attrahatur à iecore, & retineatur ab eius retentrice, quæ iucunda & suauia retinet. His medicamentis roborandum est hepar, & secundum calidum innatum, & secundum proportionem. Quoad vtendi rationem : circa *quomodo agendum* notetur, vt medicamentum aliqua ex parte sit liquidum : quia ea est passio principaliter indicantis, nimirum caliditatis iecoris, & proportionis requirentis. Si enim iusto liquidius sit medicamentum, præterlabitur, & ita non superatur passio indicantis, sed potius resistit, non cedit. Nec medicamenta actu frigida administrentur : quia calidum innatum, prohibet actu frigidum. Et, si hepar obstructum sit frigidius, medicamentum magis actu calidum propinabitur. *Tempus vtendi* est, quando adest præsentia indicantis : & nihil prohibet. Semper adest præsentia indicantis : quia perpetuo adest calidum hepatis in actu, semper adest proportio. Veruntamen non semper licet vti hoc medicamento, quia potest aliquid adesse, quod sit efficacius ad prohibendum, quam virtus ad indicandum : id autem est materia replens totum, & potissimum proximos ductus, ventriculorum, venas mesaraicas. Talis ergo materia habet rationem causæ, sine qua non : si enim præsentem hanc materiam exhibeantur proposita medicamenta, sequitur insigne detrimentum, quia hæc materia vna deducitur in iecur, & obstructio augetur. *Vbi*. Medicamenta intus & extra vsurpari possunt : magis tamen probo vt exhibeantur, præsertim medicamenta quæ tota forma agunt, quæ respiciunt proportionem : ad differentiam illorum, quæ respiciunt calidum innatum, quæ sunt moderate calida & astringentia. Ratio est, quia vbi agendum sumitur à substantia principaliter indicantis. Quare ratione proportionis iecoris, potius exhibenda sunt medicamenta, quam applicanda. Et hinc etiam astringentia, quæ respiciunt calorem innatum, tutius exhibentur, quam applicantur : nam absinthium, verbi gratia, assumptum, roborat

aliqua è parte, astringit, euacuat: quod non faciat applicitum.

*Exopar-
tic, seu in-
farctum li-
berantia.*

Præservatoria remedia diriguntur ad materiam, quæ est causa obstructionis. Vnde semper admiscenda sunt attenuantia, detergentia, moderate tamen calida, in omnibus compositionibus. Interdum in receptis permiscenda sunt calefacientia, refrigerantia, aliquando emollientia, semper moderate astringentia: Moderate astringentes materias proposuimus, vbi egimus de materiis vitalibus. Materiae attenuantes sunt, *securidaca folia & semen*: mirabiliter enim attenuant, & exobstruunt: *chelidonium maius*, id est, *fumaria*, non autem *herba denticularis*, quæ non vtendum, *pentaphyllum* validissime attenuat, circa caliditatem, *tormentilla* attenuat, & nonnihil astringit: *filix mas* valde probatur: item *betonica*, *agræmonia*, *absinthium*.

*Alucina-
tio quar-
dam.*

Vulgares practici respicientes ad verba Galeni, non ad sensum, in obstructione hepatis vtuntur, *absinthio* & *eupatorio*: in obstructione lienis, *ceterach* & *capparibus*. At interdum in hepatis etiam obstructione, potius vtendum est *ceterach* & *capparibus*, quam *absinthio* & *eupatorio*. Ratio sumitur à recta indicantium cognitione: nam hæc medicamenta sunt materia remedij non vitalis, sed præservatoriæ: id est sunt materia remedij non requisiti, sed indicati: igitur ab essentia nota indicantis. Remedium igitur attenuans, indicatur à materia crassa: hæc si vehemens sit, indicat medicamentum vehemens attenuans: si debilis, attenuans debile. Aduertatur autem, dum materia crassa obstruens statuitur vehemens: non statui vehementem ratione actiuitatis, quia actiuitas non dependet à crassitie, sed potius à resistantia. In obstructione igitur, materia crassa, prout vel magis vel minus est crassa: ita etiam indicat remedium magis vel minus attenuans, magis vel minus vehemens. Et quia cognouit Galenus, exteris paribus, obstruentem materiam esse crassiore in liene, quam in iecore: ideo statuit in lienis obstructione opus esse *capparibus*, *aspleno*, quæ vehementer attenuant. At si materia iecur obstruens admodum sit crassa (nam interdum lapidescit) ob vehementem resistantiam expedit ad vehementissima ascendere, ad *ceterach*, ad *cappares*. Si cum obstructione iuncta sit intemperies frigida: possumus addere *hyssopum*, *feniculum*, *præsium*, quod aliqui pro secreto habent. Si iuncta sit caliditas cum superius propositis miscenda *sichoracea*, *hepatica*, *acetosa*. Si materia aliqua è parte du

re duritiem contraxerit, permiscenda sunt, *malua, althea, amygdala dulces, liquiritia, passula dulces, carica, mel, saccharum*. Dulcibus tantum ratione vehiculi uti debemus, id est in par- Vtendi ra-
ua copiosa alias vertuntur in bilem. Quoad *usum* proposito- tio.
rum medicamentorum: si iecur obstructum sit à materia sa-
tis crassa, quæ non è toto induruerit, & sit iuncta frigiditas:
utendum hoc medicamento, quod attenuat, detergit, & re-
mouet obstructionis causam, & frigiditatem coniunctam.
Recip. pulv. securidacæ ʒ j. trochisc. de eupatorio ʒ vj. pulv. su-
maria ʒ ss. mithridatij antiqui ʒ ij. hepatis lupi ʒ ij. ss. conferva è
foliis viridibus agrimonie ʒ iij. cum syr. de absinthio, fiat electa-
rium, cuius dosis à ʒ ij. ad ʒ j. Hoc medicamentum constat
non tantum ex attenuantibus & detergentibus, verum etiã
è vitalibus, quæ respiciunt calidum innatum iecoris, & eius
proportionem: sed in minori quantitate posita sunt vitalia,
in maiori præservatoria: nam imposuimus ʒ j. securidacæ,
quia institutum est potissimum oppugnare materiam ob-
struentem, non neglecta tamen proportionem, & calido innato.
Quoad quando: prohibere potest usum huius medicamen-
ti, materia replens ventriculum, primas vias, & totum cor-
pus. Prius ergo totum euacuari debet. Sed oportet hoc me-
dicamentum exhibere per plures dies: ideoque in magna
quantitate præscripsimus, quæ excedit ʒ vij. vel viij. dum
enim perseverat indicans, materia frigida, longo tempore
perseverandum est in usu huius medicamenti, & consimilis.
Hoc medicamentum per os exhibendum. Possunt etiam ex-
trinsecus applicari medicamenta, quæ ex oleis & similibus
medicamenti conficiuntur.

Victus respondeat. Si ergo fiat obstructio à materia sola Dietæ
copia peccante: probatur victus tenuis (non dico attenuas)
ut copiosa materia minuatur. Si fiat obstructio à materia
viscidia, crassa: obesset victus tenuis: ideo probatur victus
medius inter plenum & tenuem. Hic autem victus medio-
cris debet esse attenuans. Dulcibus utendum, non ut cibis,
sed ut condimentis, id est in parva quantitate. Galenus im-
probat *vina dulcia*. Exhiberi potest aqua, cum exiguo vel mellis,
vel sacchari. Vbi vinum concedi potest, dabitur vinum tenuis
substantia, & admiscebitur parva portio vini dulcis, ratione
condimenti.

*De ictero, seu Aurigine.**Generatio.*

Er icteritiam intelligo flauam & nigram. Generatur, dum bilis excrementitia ita detinetur inter partes corporis cutaneas, vt color à naturali statu mutetur, & euadat præter naturâ. Icterus

Definitio.

ergo est color præter naturam in cute totius corporis, procedens à bile excrementitia. Forma, est color præter naturam, id est, symptoma, nim: qualitas mutata visibilis: multiplex autem est hic color, prout huius causa est multiplex. Subiectum est cutis tota: ad differentiam cutis secundum partem aliquam: vnde v.g. in erysipelate mutatur color cutis, sed in illa tantum parte, in qua est erysipelas.

Causa efficiens.

Efficiens, est bilis excrementitia: ad differentiam alimentalis, & aliorum succorum: nam in anasarca mutatur color totius corporis, vt quandoque color roseus albus euadat, ratione pituitæ. Bilis porro est Flaua, vel Atra: seu melancholicatitem, vel est Toto genere præter naturâ vel Nô: toto genere præter naturâ est putrida, qualis in febribus esse solet. (Auicēnas negare videtur, icteritiâ dari in febribus: sed loquitur de icteritia principali, quæ nō fit in febre: at icteritia nō principalis fit ratione febris, quia sequitur eam.) Cum igitur loquamur de qualibet icteritiâ, iure diximus hanc biliolam materiâ posse esse putridâ, cuiusmodi redundat in putridis febribus. Ceterum, hæc materia nō potest esse causa icteri, nisi cutē occupet, & eius colorē mutet. Biliola materia bifariâ in cute reperitur: primo, quia talis in cute generatur, deinde, quia fluit in cutē. Generatur in cute, si sit iusto calidior: tunc enim alimentum etiâ probum, in cutem delatum, mutatur in bilē. Fluit autem materia, potius transmissa, quam attracta: quia iecoris partes solent esse calidiores, quam cutis: vt attractio à cute, tanquam minus calido, fieri nequeat. Quod si tamen cutis sit calidior, adiuuatur fluxio. Materia ergo hæc transmittitur ab hepate: quia eius expultrix insurgit ad expellendum vel ratione Copiæ, vel Qualitatis. Copiosa est materia duobus modis, vel quia in magna copia gignitur, vel quia tantum colligitur, & non euacuatur, sicut opus esset. Si primo modo hoc fiat: id contingit, vel læsa facultate iecoris ob temperiâ calidiorem: vel ob errorem externum, cibos & potus in magna copia assumptos, qui facile in bilem mutantur. Si altero modo

modo bilis sic copiosa: hoc fit vicio Iecoris, vel Aliarum partium, per quas deberet euacuari. Si vicio Iecoris: fit ratione obstructionis, vi cuius non potest ita expelli, vt par erat vnde collecta materia adeo stimulat & grauat, vt ad partes cutaneas expellatur. Vicio aliarum partium: vt Lienis, & Vesicæ felleæ. Lienis vicio: dum non Attrahit, vel non Suscipit. Non attrahit, ratione frigiditatis. Non suscipit, quoties afficitur vel obstructione, vel tumore. Ratione felleæ vesicæ fit: quia vel non Attrahit, vel non Suscipit: vel ratione angustiae, vel tumoris: & angustia quandoque in vesica fellea est constipatio, producta à lapidibus: nam vidi aliquot ictericos, quorum cadaueribus apertis, in vesica fellis copiosi lapilli sunt inuenti. Postremo, ratione qualitatis insurgit ad expellendū. Et hæc qualitas vel est Venefica, vel Non. Non est, sicut fit in febriculis putridis, in quibus materia eam acquirit acrimoniam, vt expultrix ad expellendum insurgat. Hæc expulsio potest esse Critica, vel Symptomatica. Qualitas venefica est quando aliquis mordetur à vipera, secundum Auicem. & Galen. cap. 7. lib. 5. loc. aff. viperæ enim morsus ita afficit sanguinem, vt vertatur in bilem excrementitiam veneficam, vt expultrix Iecoris eam expellat ad cutim. Quomodo autē ab vno morsu viperæ sanguis Iecoris mutetur in biliosum hoc excrementum: non ita facile intelligitur. Ego sentio, post morsum materiam veneficam per solutam vnitatem corpus ingredi: non tamen agere in partes cutaneas: quia non est verisimile, veneficam illam materiam vi sua primum petere omnes partes extrinsecas, sed solum illam quæ mordetur. Non autē vna corporis pars prius, alia posterius colore illo bilis afficitur, sed omnes simul: quia bilis hæc excrementitia procedit à quodam fonte, qui eam per proprios canales transmittit ad omnes corporis partes, eodē tempore: vnde etiā eodem fere tempore mutatio apparet secundum vniuersam cutim. Hic autē fons est Iecur: nec enim cor esse potest, alias læuora fierent symptomata. In morsu ergo viperæ magis videtur affici corpus secundum partes venosas: & hinc vis venefica primum impertitur Iecori & prius quam cordi. Neque hoc aduersatur naturæ veneni, quod est corruptiuū cordis & confertim, non est corumpens, sed corruptiuum: nisi enim occurramus, habet facultatem, qua potest corrumpere cor, & interficere hominem. Non tamen hinc concluditur, venenum ante cor non posse alias partes primum offendere:

*Quomodo
è morsu vi-
pera homo
fit auri-
ginosus.*

nain

nam cantharides primum offendunt vesicam, lepus marinus pulmones, & postea cor: sic venenum in morsu viperæ, prius petit hepar, quam cor. Dum autem petit iecur, fit ut sanguis in excrementitiam bilem mutetur, & acquirat prauum colorem, unde postea mutatur color totius cutis. Hæc autem actio fit à veneno, à proportionem maioris inæqualitatis, ut magis possit venenum, quam sanguis, aut iecur in facultate alteratrice. Venenum igitur per suam facultatem quæ est maximæ actiuitatis, ope suæ proportionis, quæ est non organum, sed locus conseruans & domicilium facultatis veneficæ, summæ est actiuitatis. Et, cum dissimilitudine sit, inter proportionem veneni & sanguinis, & hepatis: fit ut facultas veneni maioris sit actiuitatis, causa proportionis, facultas hepatis, minoris: sanguinis, adhuc minoris: & cum non possit sanguis resistere saltem secundum aliquam sui partem: ita vincitur à veneno, ut corrumpatur, & fiat toto genere præter naturam, & color mutetur. Hepatis autem facultas, cum sit minoris actiuitatis, quam veneni: cedit facultati veneni: sed non ita sicut sanguis, quia magis resistit: (nam minoris actiuitatis est sanguis, quam hepar) unde hepar non ita corrumpitur à veneno ut sanguis. Hinc fit, ut licet aliqua è parte patiatur iecur, non tamen corrumpatur: ratione passionis fit, ut adimatur actus secundus facultatis alteratricis, ut non possit alterare & vincere, non possit regere sanguinem, sicut opus esset. Hinc igitur sequitur, ut, cum summa sit vis veneni: sanguis per propriam vim non possit resistere, & quodammodo relinquatur à iecore, ac necessario corrumpatur, & ita corruptus ad partes cutaneas transmittatur. Tanta autem est veneni violentia: ut nisi medicus quam celerissime occurrat, venenum, ut est corruptiuum cordis, ita actu etiam corrumpat. Hoc verum esse, ostendit curatio: secundum illud Hippocr. Auicennas enim respiciens ad vim veneni, dicit adiuuandam naturam bezoartico, quod potest superare venenum. Nam venenum eam habet potentiam, ut superet naturam humanam. c. 4. l. 3. de temper. Et hinc Auerrhoes collect. 3. dicit, venenum per accidens curari à medicamento bezoartico: quia medicamentum non agit in venenum, alias per se fieret curatio, non per accidens, sed agit in corpus humanum, & ita agit, ut, cum natura non possit vincere venenum, assequatur eam virtutem beneficio bezoartici, quæ est supra humanam, ratione cuius, ita roboratur, ut vincat

vt vincat venenum. Quod cognoscens Auicennas dicit, bezoarticum medicamentum esse in causa, vt venenum vincatur, quia conseruat & auget sanitatem & virtutem in spiritu. Sanitas consistit in temperie, compositione, & vnitate. Bezoarticum nihil præstat ratione horum trium. Sic etiam venenum in icteritia dum agit in hepar, non mutat temperiem: nam si mutaretur temperies, ea non ita cito restitueretur sanitati. Per sanitatem autem Auicen. intelligit bonam affectionem facultatis. Declaro. Corpus sanum donatum est facultate, quæ ita afficitur, vt bonas edat operationes: si enim fuerit morbus, si lædatur temperies facultatis: affectio non est amplius secundum naturam, sed præter naturam, vt merito sequantur actiones læsæ: vt secundum hanc rationem morbus sit læsio, sit affectio præter naturam facultatis, sicuti sanitas est affectio secundum naturam facultatis. Nec secundum hunc modum possumus intelligere sanitatem ab Auic. propositam: quia licet hæc sanitas non sit temperies, non compositio, non vnitatis: tamen ab his dependet, vt illa habeant rationem causæ continentis, quia posita intemperie, ponitur mala affectio, & remota, remouetur: similiter, posita temperie, compositione, & vnitate, sequitur sanitas, bona affectio facultatis. Vnde non possumus intelligere secundum hunc modum, quia nec venenum mutat temperiem, nec bezoarticum mutat temperiem. Quod dico de intemperie, idem dicendum de compositione & vnitate. Præter hæc tria igitur necessario requiritur proportio, quæ est domicilium facultatis, vt facultas maioris & minoris actiuitatis reddatur, non modo beneficio constitutionis & spiritus, verum etiam virtute sui domicilij, siue proportionis, in qua est virtus conseruatiua locati. Quare similitudo est inter proportionem bezoartici & corporis viuientis: & proportio bezoartici est in causa, vt seruetur facultas maioris actiuitatis, beneficio cuius ita roboratur facultas corporis humani, vt acquirat potestatem super humanam, quia secus non possent vinci venena. Acquirunt autem superiorem virtutem, & viuificantur atque augetur sanitas: quia facultatis affectio redditur magis robusta ob bezoarticum, quod habet proportionem similem, cuius beneficio facultas fit robustior. Hinc in ictero venenum non agit in constitutionem, sed in proportionem: sicut etiam adamas agit in magnetem, & sui præsentia in causa est, ob proportionis

tionis diuersitatem, vt tollatur actus facultatis, vt facultas non possit regere. Hoc igitur modo agit venenum in iecur, vt facultas eius non possit regere sanguinem. De spiritu eadem est ratio. Si bezoarticum auget sanitatem in parte viuente, & virtutem in spiritu: necesse est, vt venenum adnerfetur spiritui: nam morbum ostendit cura. Et cum bezoarticum sit amicum omnibus corporis partibus, & conseruet virtutem in spiritu innato: necesse est, vt in omnibus partibus reperiat spiritus. Quare è morfu viperæ venenum petit hepar, & sanguis acquirit colorem præter naturam, & transijtitur ad cutem, vnde huius color mutatur.

Definitio.

Quoad differentias à forma: icteritia est Nigra, vel Citrina. Quoad efficientem: icterus prodit à bile Flaua, vel Atra, quæ perpetuo toto genere est præter naturam. Sciendum autem materiam præter naturam bisariam accipi posse. Primo modo, vt prorsus, & secundum propriam essentiam transgreditur limites naturæ: sicut est materia putrida. Deinde ratione loci, in quo reperitur: quando scilicet ille locus non est destinatus huic materiæ à natura: sicut contingit materiæ, à qua causatur icterus. Præterea ab efficiente sumuntur differentia: prout hæc materia Generatur in cute, vel aliunde Confluit. Et, si aliunde: bisariam fit quia transmittitur vel ratione Copiæ, vel Qualitatis. Si ratione copiæ: vel quia Generatur, vel Coarcesuatur. Qualitas tandem est Euidens, aut Recondita.

Signa.

ICterus in genere facile patet: præsertim si aspiciatur album oculi, quod facile inficitur. Mira naturæ est providentia, quod in ictero aliquando cornea tota afficitur colore citrino, præterquam secundum regionem, qua ante crystallinum lozatur. Hinc sæpe icterici insipientes parietem album, album iudicant: interdum quodlibet obiectum citrinum esse putant. Quoad differentias formales, facile conspiciuntur, an color sit citrinus, an niger, vel tendens ad nigrum, qualis est viridis. Quoad differentias ab efficiente: facile cognoscitur è colore, num sit flaua, vel atra bilis. Num autem hæc materia sit putrida, vel non: cognoscitur è febre putrida adiuncta. Præterea cognoscendum an fluat, nec ne: nam si non fluat materia à iecore ad cutem: paulatim fit hic morbus, totum corpus tactui se offert calidum, pulsant vehementer arteriæ ob caliditatem, & non mutantur excrementa. Si autem fluat: malum breui tempore ortum est.

Sed

Sed notandum, tamen si transmittatur materia à centro ad superficiem: non tamen fieri rigorem, ut in febribus: quia in febribus materia transmittitur summo cum impetu, in iëtero sensim. Porro transmittitur, quia peccatum est vel in copia, vel qualitate. Copia duobus modis potest contingere: & quia generatur, & quia colligitur. Generatur ob vitium calidius hepatis: seu ob vitium in cibo. Si è cibo: cognoscitur ex ægro. Si ob vitium iecoris calidioris: tum lotium maxime erit coloratum: &, si immittatur pannus lineus, tingetur colore citrino, vel nigro: alui autem deiectio non erit albicans, sed colorata, quia non adest angustia aliqua, vi cuius colligatur excrementum, & impediatur transitus bilis ad intestina. Vtrum autem vitium hepatis calidum, sit intemperies, vel inflammatio, vel erysipelas: cognoscitur è propriis capitibus. Si altero modo producatür iëterus à bile, non ut copia peccat, sed quia colligitur: hoc fit, quando bilis in decenti copia generatur, & non euacuatur, sed ob cumulationem ita fit copiosa. Si fiat vitio lienis, vel iecoris, vel vesicæ fellæ: sic distinguendum. Nam si vitio hepatis: erunt signa obstructionis. Si vitio lienis: præter id quod nigra erit iëteritia, aderunt signa indicantia vitia lienis: ut, si colligatur excrementum melancholicum, quia non attrahitur à liene, ob eius frigiditatem: cognoscetur è signis propriis frigidi lienis: & tactu nullus percipietur in liene tumor. Si colligatur excrementum melancholicum, quia lien non suscipit: percipietur tensio, & quandoque tumor, ac durities in liene, pro diuersa mala dispositione lienis. Si colligatur vitio vesicæ fellis: cognoscetur è colore citrino: deinde quia feces non sunt citrinæ, sed albicantes. Si vero fiat ratione qualitatis: præter id quod ægri acrimoniâ persentient, adiecit etiam febris. Sed aduertendum in febribus hunc materiæ fluxum aliquando criticum, aliquando symptomaticum esse. Criticus est: quando prægressa sunt coctionis signa, æger facile perfert, febris minuitur. Si symptomaticus: opposita fiunt. Si denique materia fuerit venefica: cognoscetur è signis veneni, sed potissimum color ad viridem vergit, mutatur pulsus: nam licet venenum non statim petat cor, breui tamen tempore fertur in cor.

Præsidia tantum sumuntur ab efficiente: à colore enim non sumitur indicatio; neque iëterus niger albo remedio, tãquam
Indicatio-
nes.
 contrariio

contrario curari potest. Bilis ergo excrementitia, vt toto genere præter naturam est, indicat eradicans: verum vt hæc materia eradicetur, ratione cutis indicatur laxans, rarefaciens. Indicationes in hoc malo non sumuntur à subiecto: ideo dum rarefaciens medicamentum indicatur à densitate cutis, cutis non est subiectum icteri, sed habet rationem efficientis, sine qua non potest euacuari bilis, quia cutis sua densitate prohibet. Præterea, cum hæc materia generetur in cute, vel aliunde confluat: vt generatur in cute, & producitur à cute calidiori: cutis indicat refrigerans. Si autem fluit: si perpendamus motum, si est criticus, est adiuuandus: si autem symptomaticus, quia est ad locos decentes, nimirum ad partes cutaneas & ignobiles, neque tum est inhibendus. Quare indicatio sumitur à materia, prout vel grauat, vel irritat facultatem, id est prout peccat vel copia, vel qualitate. Si copia: respiciendum ad causam, ratione cuius adest bilis copiosa. Duplex est causa, alia generans, alia colligens. Generans, cum sit vitium calidum hepatis: indicat remedium refrigerans. Si colligens sit causa: colligitur vitio obstructionis iecoris, vel lienis, vel vesicæ felleæ: vnde pro discrimine vitiorum variæ sumi debent indicationes: verbi gratia, si colligatur ob frigiditatem lienis, oritur indicatio calefaciendi si ob tumorem scirrhum, refrigerandum, attenuandum, emolliendum. Si vero vitium sit in qualitate: si qualitas est euidentis, indicatur attemperans: si venefica, recondita: non indicat, quia non est nota eius essentia in veneno, sed potius requirit bezoarticum.

Prognost.

Vitium hoc non est contemnendum: nam quamuis prima facie ad decorationem pertinere videatur, nihilominus dum protrahitur, pertinet ad artem curandi, quia egreditur latitudinem sanitatis. Distinguitur ergo curatio ratione differentiarum. Quoad formales: cæteris paribus, ægrius remouetur icterus niger, quam citrinus. Quoad efficientem: si ab atra bile procedit, difficilius curatur, quam si à flaua. Præterea periculosior erit, si à materia putrida, si à venefica: & præsertim nisi illico occurramus. Quoad materiam: hæc sumitur vt fluit, vel non fluit. Si accipiat vt fluit: possumus salutem polliceri, quia totum calidius redditum, potest refrigerari. Si vero alia è parte icterus fiat, vt materia quæ fluit, fluat transmissa vel ob copiam, vel malam qualitatem: si ob copiam: vel quia generatur, vel quia colligitur: si generatur

copiosa

copiosa bilis ob errorem externum: possumus audacter salutem polliceri, vt cito etiam remoueatur. Si autem gignatur læsa facultate iecoris: varium erit prognosticum: vt quandoque etiam impossibile sit icterum remouere: verbi gratia si generetur copiosa bilis ob inflammationem, vel erysipelas, potissimum hepatis, vix fieri potest, vt homo restituatur. Si autem ob simplicem intemperiem calidiorē: non erit curatio difficilis. Sin autem copiosa sit materia, quia colligitur propter obstructionem vel lienis, vel hepatis, vel vesicæ fellæ: prout mala erit dispositio huius vel illius partis, ita prognosticandum: verbi gratia, si fiat ob scirrhum lienis, nemo salutem promitteret: si contingat ob constipationē vesicæ fellæ, quæ producat a calculis generatis in vesica fellis: quis salutem polliceretur? Quoad malam qualitatem: hæc est putrida, vel venefica: si putrida, vt in febribus, sitque hic motus criticus: optime sperandum: cōtra, si symptomaticus: vt colligitur comm. aph. 64. sect. 4. Si materia fuerit venefica: cito euanescit, si celerime occurramus. cap. 7. lib. 3. loc. affect.

*Curatio.
Phlebotomia.*

Vena, secundum Græcos, secanda est, si multitudo sit sanguinis, si dolor in iecore vel liene. Arabes probant venæ sectionem, vbi venæ sunt repletæ. Non igitur in omni ictero vena secanda, dum sanguis redundat, sed vbi peccatum sanguinis est vehemens. Licet autem icterus fiat à bile excrementitia: sanguis tamen in eo duobus modis peccare potest: vel vt habet rationem causæ sine qua non: quia in ictero non possumus occurrere materiæ fluxæ, neque fluxuæ, neque etiam generanti, nisi prius euacuetur sanguis: vel, vt habet rationem causæ principalis: quoties imminet, vt ob hepatis caliditatem sanguis cōuertatur in bilem excrementitiam. Sanguis autem est vacuandus non confertim, sed paulatim, & per vices: nam ob bilem redundantem, & quæ miscetur cum sanguine, fit, vt partes non bene alantur, sed vires euadant debiliores. Illico autem vena secanda, quia inter initia adest indicans, nec adest prohibens. Locus varius eligendus, pro varia sanguinis subsistentia. Galenus cap. 1. lib. 9. α. 767. secabat venam sub lingua, respiciens ad sanguinem subsistentem in capite. Auicennas cucurbitulam scarificatam applicabat lienī: vt huius beneficio attraheretur excrementum melancholicum à liene: & propter frigiditatem lienis, applicari potest cum magna flamma, vt fiat valida attractio.

Vacuātia.

Vomitoriis vtendum, quia & euacuatur corpus à materia, & fit reuulsio. Pro vomitorio licet vti decocto malua, cum succo raphani, cum agarico etiam non preparato, cum oxymelite. Licet etiam vti soluentibus aluum: & licet ascendere ad vehemē-
tiora, cap. vlt. lib. 5. loc. aff. verbi gratia, dactydim, helleborum
nigrum, item ad colocynthidem, ratione picuitæ: quia in ictero
quandoque sunt obstructions e copiosa & contumaci pi-
uita, vt necessarium sit ad valentiora confugere, vt ad troch.
albandal. sed virium habeatur ratio.

*Ad mate-
riam fluxu
ram.*

Quoad peculiaria medicamentis alia diriguntur ad mate-
riam fluxam, alia ad fluxuram. Quoad fluxuram: respiciunt
causam vel generantem, vel colligentem. Quoad genera-
tem: esse potest inmodica iecoris caliditas: vnde Rhasis pro-
bat succum endiniae, solatri, cum aqua hordei (aduertendum, non
semper opus esse calidis attenuantibus) vti solet etiam tro-
chiscus de caphura, cum succo granatorum: item frigidis astringen-
tibus, quia iecur ob caliditatem generat bilem. Vtebatur
succo granatorum, vt materia remedij vitalis, vt imminue-
retur caliditas hepatis. Quod de frigidis dictum, de aliis etiā
intelligendum. Si materia colligatur: confugiendum ad ea,
quae remouent causas, ob quas materia colligitur. Causae
sunt innumeræ: de quibus propriis capitibus. Sed quia ob-
structio solet esse frequens causa, & secundum vesicam fel-
leam, & secundum iecur atque lienem: exempli gratia vnum
medicamentum proponemus, cui in obstructione contu-
maci locus est: sc. limatura chalybis (in diebus canicularibus
opprime preparata ex aceto acerrimo, in quo sint decolla rad. altheae)

*Infusio li-
matura
chalybis.*

℞ j. al. anchusae, corpus cerui, agrimon. ceterach. fumar. pariatat.
ana ʒ ij. cinamomi ʒ j. vini ℥ xij. Vinum autem sit modo magnū
moda minus generosum, pro dispositione corporis: fiat infusio, &
desinentur sub radiis solaribus 8. dies. Dosis sit ab ʒ j. ad ℥ ss.

*Euacuātia
materiā
p̄ cute.*

Ratione materiz fluxae oportet vti balneo aqua dulcis, al-
terato cum malua, maierana, anetho, &c. quorum beneficio cu-
tis laxetur, aperiantur pori, attenuetur materia, atque ita in
cute existens euacuetur: ad quod apprime conducit sudato-
rium, quod hoc tempore in vsu est, pro faciliiori sudore eo-
rum, qui morbo Gallico laborant.

CAPVT XXII.

De Scirrho Iecoris.

SCI RRHVS Iecoris, est morbus compositus: & *Nomen.*
interdum succedit inflammationi. Intelligimus
autem hic per scirrhum, tum exquisitum, tum
non exquisitum, id est, & sensus expertem, &
participem. cap. 16. lib. 14. metho. Iecoris ergo scirrhus est tu-
mor præter naturam, frigidus, durus, & corpulentus. *Definitio.*
Dicitur tumor præter naturam, & proinde morbus in magnitu-
dine. Hic autem tumor est frigidus. com. 21. lib. 4. de rat. vict.
cap. 4. lib. 2. ad Glau. cap. 6. lib. 14. meth. cap. 8. lib. 8. 2. 702. Nam
cum hic tumor fiat à frigida materia, tumor etiam, seu effe-
ctus erit frigidus. Hinc colligitur, quod sit morbus, non tan-
tum in aucta magnitudine, sed etiam in intemperie frigida.
Et sic scirrhus distinguitur ab omni tumore præter naturam,
calido, nimirum ab inflammatione, erysipelate, cancro. Di-
citur etiam tumor durus, comm. 21. lib. 4. vict. ac. cap. 8. lib. 8.
2. 167. cap. 4. lib. 2. ad Glau. ubi ad curandum scirrhum pro-
bantur emollientia. Et sic distinguitur à tumore cedemato-
so. Postremo dicitur tumor corpulentus, apud Galenum do-
cis citatis, ubi vult, scirrhum causari à materia viscida, crassa,
corpulenta: ad differentiam tumoris flatulenti, seu vaporosi.
Quoad causas scirrhī internas: sit ē materia vel glutinosa, *Causa efficiens.*
vel crassa, vel simul & glutinosa & crassa: nam materia scir-
rhī peccat vel ratione crassitiei, vel visciditatis, vel ratione
viniſque. Quare scirrhus fieri potest, non tantum ē mate-
ria melancholica, sed etiam ē materia pituitosa: nam melan-
cholia crassa est, non viscida: pituita autem viscida est, & in-
terdum crassa. Nam Galē. cap. 4. lib. 2. de diff. feb. loquens de
febre putrida, pituitosa vult non totam materiam pituito-
sam exuri, sed ratione visciditatis nonnihil relinqui: at ma-
teria melancholica in febre quartana instat, ossis comburi-
tur, quia sicca est, non viscida. Quare cum fiat scirrhus ē vi-
scida materia: dicendum, non tantum fieri ē melancholia,
sed etiam ē pituita. Sed dubitatur: nam Galē. cap. 4. lib. 2. ad
Glau. & cap. 4. lib. 14. meth. ait, scirrhū succedere inflamma-
tioni, & comitari erysipelas: Quomodo igitur sit ē melācho-
lia, ē pituita? Responſio. Inflammatio degenerat in scirrhū,
quando sanguis crasseſcit, & acquirit naturam melancholicā.

Succedit etiam scirrhus erysipelati, non omni, sed quando Medici præter modum & importune refrigerantibus vtuntur: nam pars adeo redditur debilis, vt non tantum humores collecti crassescant, verum etiam proprium alimentum non possit regi, sed euadat viscidum & crassum: vnde scirrhus. Præterea sunt causæ externæ, quæ proponuntur cap. vlt. lib. de cib. bon. & mod. suc. & cap. 4. lib. 2. ad Glauc. vt sunt cibi crassi & visci, victus crassificans, vinum crassum. Præterea fieri potest ex causis non necessario occurrentibus, hoc est, ex errore medicorum, dum nesciunt recte tractare vel inflammationem, vel erysipelas.

Differentia.

Quoad differentias à loco affecto: iecur scirrhus afficitur secundum partem Simam, vel Gibbam. cap. 7. lib. 5. loc. affect. A materia, hæc est viscida, vel crassa, id est, Pituitosa, vel Melancholica.

Signa.

Scirrhus iecoris in genere, cognoscitur è sensu grauitatis, etiam si scirrhus exquisitus sit: pressu enim dolor sentitur, quia vicinæ partes sensitiuæ ob tumorem iecoris comprimuntur, & earum unitas soluitur. A gri melius decumbunt in latere dextro, quam sinistro: nam si in sinistro decumbant, tunc latus scirrhus derentum comprimit ventriculum, vnde fit dolor veluti contusiuus, ratione ponderis. Sensus grauitatis ob membranam inuestientem maxime adest, si scirrhus non est exquisitus: si exquisitus, non item, licet ob compressionem partes vicinæ doleant. Sed non tantum respiciendum aut dolorem, num alsit, nec ne: verum ad diuturnitatem & contumaciam affectus. Si enim non cedit remedijs, iudicandum, esse exquisitum scirrhum: & hic non est suscipiendus, quia non potest curari: at non exquisitus cedit remedijs. Adest autem sensus grauitatis sine febre, ad differentiam inflammationis: nam scirrhus est tumor frigidus: inflammationem iecoris necessario comitatur febris: scirrhum non necessario, sed contingenter. Insuper scirrhus hepatis cognoscitur è pulsû euidenter duriore, quia tumor hic multo durior est, quam tumor inflammationis. cap. 4. lib. 1. de prælag. puls. cap. 4. lib. 4. de prælag. puls. Secundum Auicennam quoque cognoscitur è lotio diminuto. E qualitate etiam mutata, visibili, & tangibili: è visibili: corpora emaciata conspiciuntur, quia non recto fit sanguificatio, neque etiam distributio: præterea color corporis mutatur, quod peculiare est, in affectibus iecoris & lienis. E tangibili: quia in regione iecoris tumor

tumor durus percipitur, præsertim si inflammatio fuerit in parte gibba, c. 7. l. 5. loc. aff. Aduertendum autem hunc tumorem durum euidentius percipi, quando patiens vel rectus manet; vel etiam decumbit in parte sinistra, quia magis descendit tumor ille infra costas, vnde magis conspicuus apparet. Notat Galenus hoc esse verum, nisi succedat hydrops: tunc enim venter aqua repletur, quæ impedimento est, quo minus tactu durum tumorem persentire queamus. Quoad differentias: num sit in parte gibba, vel lima; cognoscitur è cap. de inflam. iecoris. De signis etiam materiæ pituitosæ & melancholicæ, suo loco.

Cum scirrhus sit tumor frigidus præter naturam, vt ne- *Indicatio-*
cessario iecur afficiatur imbecillitate, & morbo in magni- *nes.*
tudine aucta: quoad imbecillitatem oritur indicatio corro-
borandi. Cum vero hæc imbecillitatis prodeat è frigida in-
temperie: corroboratio erit calefactio iecoris. Ratione ma-
gnitudinis, ratione materiæ, oritur indicatio remouendi ma-
teriam: quæ tamen indicatio non est utilis, cum non præscri-
bat remedium. Cum vero hæc materia interdum sit viscida,
interdum crassa, interdum viscida & crassa, semper autem
dura: propterea oritur indicatio interdum abstergendi, ali-
quando attenuandi: interdum simul abstergendi & attenuandi,
semper autem emolliendi: totius habita ratione c. 8. l. 8. x. r. o. x.
cap. 4. lib. 2. ad Glau. c. 4. lib. 14. metho. c. 6. lib. 5. de simp. med.

Hos scopos interdum absoluerè possumus, interdum ne- *Prognosti-*
quaquam. Scirrhus enim inter initia non exquisitus sanari *ca.*
potest, exquisitus nunquam c. 4. l. 2. ad Glau. adest enim frigi-
da illa intemperies, & adest durities, quæ nullis mollientibus
cedit. In scirrhus ergo exquisito, si concurrat fluxus ventris,
celeriter moriuntur: si non iungatur ille fluxus, aliquandiu
perdurant. Quare scirrhus iecoris ab initio est periculosus, &
difficiliter curatur: antiquus autem curari nullo modo potest.

Vena secunda non est, quia imminet hydrops: materia *Curatio.*
enim non est sanguinea, sed pituitosa, melancholica, crassa, *Materia.*
viscida: venæ sectio refrigeraret iecur, antea frigidum. Secun- *cheirurgi-*
dum Auicen. & Aetium vt possumus cucurbitulis scarifica- *ca.*
tis, quæ iecoris regioni applicentur. Licet etiam illis partibus
applicare vesicatoria, caustica medicamenta, cum Aetio, de
quibus alias: & vlcera diutius sunt aperta detinenda. Prius
autem totum expurgandum. Expedi etiam gratia reuul-
sionis cauteria affigere cruribus, dum crura non sunt tumida.

*Vacu-
torum cor-
pus.*

Sequuntur medicamenta. Suppositis preparantibus & lenientibus: abstinendum à soluentibus valentissimis, propter iecoris infirmitatem. Debilioribus ergo secundum Avicennam utendum, quæ euacuant pituitam, melancholiam. Si malum non cedit leuioribus: cogimur ad fortiora ascendere. Quare Galenus cap. 15. libr. 13. meth. utitur *clistere acerrimo, à centanto min. & colocynthide. Anigennas ad helieb. album as-
dit, qui valentissime per vomitum va-
uat.* Extremis morbis, extrema opponenda remedia.

Localia.

Topica sunt emollientia, dirigentia, attenuantia, corroborantia: cap. 4. libr. 2. ad Glauc. cap. 8. libr. 8. u. rōz. Vti ergo possumus *medulla ceruina, medulla vituli, adipe gallina, vituli, Anseris, bdelli, ammoniaco, thymiamate: item rad. albæ, malua-
tum cucumeris agrestis.* Hæc digerunt & emolliunt. Oportet etiam addere attenuantia: ut sunt *myrrha, calamintha, origa-
num, serpillum, aromata.* Corroborantia sunt *absinthium, myr-
balan, mastiche.* Quando ergo uti volumus emplastro, vel melle, *miscetur oleum mastichinum, oleum de absinthio, ut non tantum
emolliamus & digeramus, sed etiam corroboremus.* Optimum est, si pars affecta oblinatur *luto D. Bartholomæi, quia in
eo est maxima vis emolliendi.* Præterea permisceatur *lutum
D. Bartholomæi, cum luto D. Helena, vel D. Petri, quæ in collibus
Euganeis exsunt, prope Tuscium.* Sequens remedium, corpo-
re expurgato, mirabiliter emollit, digerit, roborat, quod ex-
pertum est sæpe: *R. pulpa colocynth. pariesitij radicis cucum.
agrestis patiem. j. & medicum absinthij: includantur sacculo, qui
assiduus detineatur in loco laço.*

*Interna re-
soluentia
& attenua-
tia.*

Quoad interna: Aetius pro dissoluendo tumore scirrhuso iecoris, maxime probat anagallidis succum ad 3 j. vel 3 iij. possumus etiam puluerem anagallidis exhibere. Dat cum mulsæ: & si febres non erunt vehementes, dabit cum oxymelte. Probat etiam, tanquam efficacissimum medicamentum, quod componitur e subina puluere, & e fece arida vini, id est e fece quæ reperitur in fundo dolij, præsertim in quo detentum fuit vinum dulce: datque ad quantita-
tem cochlearis, ad quantitatem drachmæ. Hoc se restituisse dicit, scirrhum, ubi hydrops imminuit. Probat etiam medicamen-
tum, quod parari potest ex equali portione sanguinæ, cossi, petroselinæ, eupatorij: dat 3 j. Vehementissimum pharmacum, secundum Aetium, est ammoniacum, cuius 3 j cum mastiche granis viij. exhiberi in quo poterit. Sed duo sunt medicamenta, quibus felicissime uti possumus in iecore, decoctum salsa pa-

riplia, quod parabitur cum medicamentis iecur respicientibus: ver-
bi gratia, cum agrimon. petrosel. rad. althaa, ratione emollitionis.
Alterum auxilium est usus chalybis, cuius limatura in substan-
tia exhibetur: modum autem præparandi & vtēdi, paulo post,
cap. 25. & 26. de lienis scirrho agentes, docebimus.

Vitus mediocris erit & attenuans: vt dicit Galenus, ab *Aetius c.*
initio lib. de atten. vict. eo enim vitia diuturna eradicantur. *11. l. 19. L.*
Hunc etiam probat Aetius. Potus erit similis. Interdum in *Mercat. c.*
cibis possumus concedere *amigdalas, pistacia*, secundum *Ac- 6. & 18. l.*
tium. Ager in latere dextro decumbat: secundum *Auicē- 2. de affect.*
nam, nam hic decubitus conducit ad dissoluendum tumorē
rem scirrhosum iecoris.

CAPVT XXIII.

De ulcere iecoris.



O e vitium Aetius nuncupat colliquamentum: *Definitio.*
quia emaciatur & veluti liquatur totum corpus.
Est autem vlcus iecoris, nil aliud, quam soluta-
vnitas iecoris, ex erosione producta. Potissimū
succedit inflammationi, quæ ad suppurationem producitur.
Potest etiam fieri citra inflammationem prægressam, ex a-
cribus succis. Interdum vidi iecor vlceratū, ratione affectus
gallici morbi, ratione mordacitatis materiæ.

Quoad differentias: affici potest iecur secundum partem *Differētia.*
Simam, vel Gibbam. Ab effeetrice causa: succedit Inflam-
mationi, vel Non.

Cognoscitur vitium hoc ex exeunte mutato, dū est puru- *Signa.*
lentum: & interdum adest aliquid sanguinis, aliquid mate-
riæ cruentæ. Hinc medici interdum decipiuntur, arbitantes
esse dysenteriam, quando materia saniosa, & sanguinea e-
greditur: ob cuius acredinem aliquis in intestinis perlen-
titur dolor. Sed inde discernitur: quia sensus quidam gra-
uitatis & punctionis etiam perlenitur in regione iecoris,
ob consensum membranæ. Et præsertim hæc deiectiones
apparent dum vlcus est in parte sima: nam si gibba pars fue-
rit exulcerata, indicia vlcusis potius petenda sunt è lotio,
quod erit purulentum, nec tamen aderunt signa vlcusis ve-
licæ, neque vlcusis renum. Quoad differentias ab efficien-
te: si præcessit inflammatio quæ suppurata fuit: euident
est, hoc vlcus succedere inflammationi, & fieri ratione

materiæ purulentæ. Si non præcessit inflammatio: originem duxit è succis acribus, vt dictum fuit in sermone de vlcerẽ ventriculi. Indicationes petendæ ex eodem loco.

Præfagia.

Vitium, secundum Aetium, est periculosissimum: ægri enim emaciantur. Est vitium incurabile: salutem polliceri non possumus: nam est vlcerata pars præcipua, quæ deperdita non potest regenerari, cū qua consentiunt partes principales: vnde fere omnes moriuntur.

Curatio.

Vena secanda non est, quia vires non possunt perferre, etiamsi sanguis redundauerit: Si enim vlcus succedat inflammationi, vires iam per præcedentem inflammationem sunt languidæ. Si autem vlcus non producat ex inflammatione, sed ortum ducat ex acri materiâ: hæc peccat in qualitate: vnde à natura sanguinis recedit, vt potius purgandum sit quam vena secanda. Medicamenta & Diætæ, petenda è c. de vlcere ventriculi. Aetius recurrit ad præsidia, quibus vtimur in vlcere pulmonis, renum, vesicæ. Vnde pro mundificatione vlceris, vti sero lactis caprini, cum mulsæ, vel cum saccharo, &c. Priuatim autem hoc est obseruandum, vt hepatica medicamenta permisceantur. Propterea Aetius permiscet *Cypheos medicamentum*: de quibus supra. cap. 17. & 20.

*Historia cuiusdam
vulceris iecoris.*

(*Patavij quidam deplorato iecoris vlcere laboravit, homo rotaturus vulceris bustus, alias, & nauticis laboribus additus. Huic Medicus tum temporis Venetus clarissimus, H. S. præter reliquorum Medicorum consilia, curavit abdominis partem in regione iecoris nouacula aperiri, ut plurimum puris per vulnus efflueret. Vnde postmodum bene curato vulnere homo superstes mansit: & triennio post, saltavit ac laboravit, nihil sentiens incommodi.*)

C A P V T XXIII.

De inflammatione Iecoris.

Definitio.



Subiectum.

Ictum hoc est tumor præter naturam sanguineus iecoris. Occupat autem iecur, & quatenus simile, & quatenus dissimulare. Vt simile: quia necessario adest intemperies calida. Vt dissimulare: quia adest tumor, morbus in magnitudine. Subiectum est iecur. cap. 7. l. 3. de loc. aff. vbi per iecur intelligimus carnem iecoris: nam materia sanguinea ingreditur porositates iecoris, & ita iecoris substantia tumida euadit. Et quamuis in hoc malo iecur interdum magis affligatur secundum

dum partem simam, interdum vero magis secundum partem gibbam: attamen iecur secundum partem utramque afficitur enim pars sima inflammatur, etiam gibba fit princeps inflammationis, & contra: ob partium connexum. Materia non tantum est sincerus sanguis, sed etiam pituitosus & melancholicus. Quæ materia sanguinea confluit in porositates iecoris, vel per modum Attractionis, ob dolorem, aut calorem: vel per modum Transmissionis, dum materia ad iecur transmittitur à Toto, vel Parte. Iecur autem suscipit ob imbecillitatem asciticam (natura enim iecur, ut partem principem, robustam condidit) obortam ob noxas, quas iecur perpeffum est.

Causa efficiens.

Differentiæ possunt sumi è loco affecto, & materia. Iecur enim afficitur magis, vel secundum partem Simam, vel Gibbam. Materia est Sanguis, vel Pituita, vel humor Biliolus, vel Melancholicus.

Signa triplicia proponemus. Primum indicantia inflammationem iecoris. Deinde, discernentia inflammationem iecoris, ab inflammationibus partium vicinarum, id est, membranae succingentis iecur, mesenterij, musculorum abdominis, qui in parte dextra resident, & notharum costarum partis dextræ: unde multi fuere decepti, credentes esse pleuritidem, cum tamen esset iecoris inflammatio. Tertio afferemus signa differentiarum. *De signis primi generis.* Inflammatio iecoris cognoscitur secundum Galenum cap. 7. libr. 5. loc. affect. cap. 4. 8. & 9. libr. 1. loc. affect. cap. 7. libr. 4. caus. pull. primum è sensu gravitatis in regione iecoris, & dextri hypochondrij: & interdum accidere ait Galenus, ut costæ in consensum ducantur: nam in quibusdam iecur annectitur costis per membranas aliquas, in quibus necessarium est, ut gravitatis sensus etiam costis communicetur: non autem in illis, in quibus membranae hæc desiderantur: in plerisque tamen reperiuntur illi nervi. Quare Galenus ait, id interdum accidere. Sed quia etiam in obstructione & scirrhus iecoris est sensus gravitatis, sciendum, in inflammatione, cum sensu gravitatis coniunctam esse febrem, quæ ilico cum sensu gravitatis oboritur: in obstructione autem & scirrhus, licet aliquando accadat febrem coniungi: præcessit tamen febrem sensus gravitatis. Et, si accadat (quod non est impossibile) ut eodem tempore in obstructione appareat gravitatis sensus, & febris oriatur: cognoscetis per alia signa. No-

Signa.

1.

Signa inflammationis iecoris, in genere.
1. *Sensus gravitatis.*

2. *Febris.*

3. *Molestia
decubitus
in latera.*

4. *Pulsus.*

*Galeni lo-
ca concilia-
tur.*

tandum dum Alexander dicit, febrem consequi tantum magnam inflammationem : eum non de omni febre loqui , sed de ardenti : alias in omni inflammatione , etiam exigua , necessario est febris. Præterea cognoscitur hoc vitium , quoniam grauitatis sensus affligit patientem , siue decumbat in latere dextro , siue sinistro : minus autem affligit , dum supinus decumbit : ratio est , dum enim æger in dextro latere decumbit , opprimitur iecur à pondere ventriculi , & intestinorum : dum decumbit in latere sinistro , tenditur iecur inflammatum , vnde consentit membrana , atque lien , & grauitatis sensus magis augetur. Hæc non fiunt , dum homo supinus iacet. Cognoscitur etiam è pulsu , cap. 7. libr. 4. caus. puls. Pulsus enim fit celerior , frequentior , inæqualis : item , durus , serratus , & vibrans. Ratio. Cum enim inflammationis ratione , quatenus est affectus calidus , augeatur necessitas euentandi calorem cordis : hinc fit celerior & frequentior pulsus : cui frequentia inæqualitas succedit. Deinde quia non modo est affectus calidus , sed etiam est morbus in magnitudine (tumor enim est) hinc fit durities in pulsu , ratione arteriarum quæ tenduntur. Et , cum non æqualis fiat tensio : hinc arteria corpus inæqualiter dilatatur , & pulsus non tantum est durus , sed etiam serratus. Et cum tendantur arteria ratione tumoris : id etiam accidit , vt vis pulsifica agens in arteriam , arteria corpus habeat non ita cedens , sed resistens : vnde fit pulsus vibrans. Sed dubitatur , si pulsus serratus indicat inflammationem iecoris : quomodo alias Galenus dixerit , eum esse perpetuum indicium pleuritidis ? Responsio. Pulsus inflammationum duobus modis perpendi potest : vel ratione inflammationis , vel ratione loci inflammati. Si consideretur pulsus ratione inflammationis : quatenus inflammatio est tumor , cum tendantur arteria , est pulsus durus , serratus. Et hoc modo intelligere oportet Galenum , vbi voluit , pulsus esse durum & serratum in inflammatione iecoris. Si consideretur pulsus ratione partis inflammatæ : si pars fuerit humida , laxa : si confusamus pulsus membri laxi , quando hoc membrum non est inflammatum , ad seipsum quando est inflammatum pulsus membri laxi non inflammati erit mollis : pulsus autem membri laxi inflammati , erit durus , ratione inflammationis. Sed si conferamus pulsus membri laxi inflammati , cum pulsu membri duri inflammati : pulsus membri laxi

Iaxi inflammati, in relatione ad pulsum membri duri inflau-
mati; erit mollis. Propterea Galenus, loquens de inflamma-
tione pulmonis, inquit, esse pulsum mollem, non quod in-
flammatione sit pulsus mollis, sed in relatione ad pulsum,
qui reperitur in inflammatione membri duri. Quare dum
inflammatur membrana succingens costas, cum sit corpus
multum membranofum, quod maxime tenditur ratione
inflammationis: hac de causa Galenus dixit, pulsum ferrinum
esse proprium pleuritidis: quia est maxime euident, ratione
loci affecti inflammati. Quare Galenus sibi non contradi-
cit. Ideoque, cum Galen. cap. 8. *κ. τέρτ.* dicat, iecur esse mem-
brum compagis humidioris: propterea in inflammatione
iecoris non potest esse pulsus ferrinus, si conferatur iecur
ad membrum durum: potest autem esse, si conferatur iecur
ad seipsum non inflammatum. E tali igitur pulsu cognosci-
tur iecoris inflammatio, & præsertim è pulsu febrili & du-
riori. Præterea secundum Galenum c. 7. lib. 5. loc. aff. cogno-
scitur, ex inappetentia, è cibi fastidio. E siti, quæ adino-
dum molesta est. Indicatur etiam ex alui excrementis co-
hibitis, nisi cum iecoris inflammatione sit coniuncta hepa-
tica affectio, quæ debilitas iecoris nuncupatur, in qua de-
iectiones similes sunt loturæ carnis. Dubitatur autem quo-
modo cum inflammatione iecoris possit coniungi hepatica
affectio: quæ prodic ex intemperie frigida iecoris. Respon-
sio. Non est impossibile, vt hepatica affectio prodeat ex in-
temperie calida: sicut enim fit ratione frigiditatis, quando
iecur non potest alimentum exacte separare: ita etiam fieri
potest ratione intemperiei calidæ, cuius ratione alimētum
iusto citius attrahitur à ventriculo ad iecur: & cum chylus
crudus attrahatur, non potest è toto vinci: vnde possunt fie-
ri deiectiones illæ. Aluus igitur stiptica est, nisi sit coniuncta
hepatica affectio. Indicatur etiam è lotio non copioso, se-
cundum Auicennam, quoniam aquositates absumuntur. Et
est lotium coloratum, ratione feruoris sanguinis, vel bilis.
Præterea indicari potest, è vomitu bilis flauæ vitellinæ, &
interdum æruginosæ: nam non est impossibile, vt in ieco-
ris inflammatione huiusmodi materiæ generentur. Insuper
significatur è mor. laci calore totius corporis, ratione febris
quæ adest: quamuis interdum, dum inflammatio est mali-
gna, extrema refrigerentur. Mutatur etiam color totius.
Et, lingua apparet rubicunda, deinde nigra.

5. A'roga-
tia.

6. Sitis.

7. Aluus
dura.

8. Lotium.

9. Vomitus

10. Calor
totius.11. Color
totius.12. Lingua
color.

Sequun

*II. Signa
diagnosti-
ca.
Inflamma-
tio tunica
iecoris.*

Sequuntur signa, distinguentia iecoris inflammationem, ab inflammationibus partium proximarum: nimirum membranae iecoris, mesenterij, musculorum abdominis, & pleurae, prout adhæret nothis costis dextrae partis. Inflammatio membranae hepar inuestientis, secundum Auicennam & Aetium, non difficulter distinguetur: ob dolorem insignem, qui non est in iecoris inflammatione: cum membrana iecur circumdans sit sensitiua, ad differentiam substantiae iecoris. Præterea pulsus erunt duriores: & febris erit admodum intensa: præsertim quia inflammatio occupans in membranam potius producitur à sanguine tenui, bilioso, feruido, quam à sanguine melancholico, & crasso.

*Mesenterij
inflamma-
tio.*

Quod si inflammatio occuparit mesenterium, è cap. 7. lib. 5. loc. affect. cognoscetur: quia præter id quod non erit facta mutatio in colore totius corporis, (non enim mutatur color ob inflammationem mesenterij, vt inflammato iecore) symptomata erunt remissiora: quia non inflammatur pars principalis. Præterea ipse excrementis alui primum, apparebit quædam tenuis sanies: dein procedente inflammatione, cum magis materia concoquetur, cum extremis exhibit materia quædam ad similitudinem puris, magis concocta: rationem reddit Galenus loco citato: nam dum inflammata est pars, quæ habet tegumentum à substantia aliqua tenui, etiam in initio inflammationis aliquid resudat: vt in ophthalmia obseruatur: quod tamen crudum est, quia inter initia morbi: at vero quod postea egreditur est magis concoctum. Si inflammati sint musculi abdominis partis dextrae, ita distinguetur: non enim erit color totius mutatus. Præterea si inflammatio occupauerit partem gibbam iecoris, tactu obseruabitur tumor rotundus, instar figuræ iecoris: contra sensim delitescet, si in musculis fuerit inflammatio. Insuper iecore inflammato, facile distinguetis, per tractantes cutim abdominis, non enim consentit cutis: contra, si inflammentur musculi, præcipue externi: imo, interdum apparebit cutis rubicunda, dum externi musculi sunt

*Pleuritis
dextra, ad
costas spu-
rias.*

inflammati. Si pleuram teneat inflammatio, prout spectat ad nothas costas dextri lateris: distinguetur à dolore, tussi, pulsu, colore corporis. cap. 9. lib. 2. loc. affect. E dolore: quia grauiter ægri læduntur, siue in latere dextro, siue in sinistro decumbant: faciliusque decumbunt supini inflammato iecore: non ita cruciantur symptomatis, vt grauitate, difficul-

tate

rate anhelitus, &c. Hoc non apparet, dum inflammatio est in pleura: nam prout inflammatio detinet vel internam, vel externam partem, ita etiam exacerbatur dolor, dum decumbit vel in parte dextra, vel in parte sinistra, ut cap. de pleuritide diximus: præterea potius est dolor pungitius, quam sensus grauitatis. E tussi etiam distinguuntur. In iecoris enim inflammatione tussis semper acida est, sine sputo, quia nulla materia corpulenta defluit ad pulmones: sit tamen tussis, non quod comprimantur pulmones, sed quia caliditas insignis impertitur pulmoni, unde excitatur tussis, quæ tamen acida est: In pleuritide est cum sputo: si non inter initia, saltem procedente malo. Item, in pleuritide pulsus est durus, ferrinus: in iecoris inflammatione mollis, si conferatur cum pulsu inflammationis pleuræ, ut supra diximus. Præterea distinguuntur ratione coloris in toto corpore: qui mutatur in interperie iecoris: non mutatur in pleura inflammata.

Quoad signa differētiarum: differentia sumuntur à loco aff. & materia inflammationis. Quoad locum affectum: è cap. 7. lib. 3. loc. affect. si fuerit inflammatio in parte gibba, tumor tactu apparebit, dum modo magna sit inflammatio: & nisi incumbentes muscoli sint impedimento; impediunt autem quando corpus non est gracile, sed carnosum & pingue: & propterea tunc necessarium est ad alia signa confugere. Possumus ergo distinguere è symptomatis: si enim symptomata, pertinentia ad partes thoracis, fuerint grauiora, quam symptomata quæ spectant ad intestina, ad ventriculum: dicendum, inflammationem occupare partem gibbam: Si opposito modo se habeant symptomata, ut grauiora sint, quæ spectant ad ventriculum: statuendum iecur esse inflammatum magis secundum partem sinistram.

Differentia desumptæ à materia, an sit sanguis, an pituita, an bilis, an succus melancholicus: cognoscuntur ex alibi positis. In præsentia hoc admonere liceat: è cap. 1. lib. 5. de affect. Si verbi gratia inflammatio oriatur è sanguine, ut sit erysipelas, vel particeps erysipelatis: sauiissima sunt symptomata, febris ardens: remissior autem erit febris, si fuerit succus pituitosus & melancholicus. Ex accessibus etiam materia inflammationis deprehendi potest, diligentia adhibeatur. Licet enim febris sit continua: at-

*III. Diff. 2
remissiarum
signa.*

tamen

tamen ægri interdum alternis diebus affliguntur, interdum singulis, interdum de quarto in quartum.

Indicationes.

Præsidia petantur e cap. de inflammatione ventriculi. Breuiter tamen sciendum, e cap. 8. lib. 13. meth. indicationes ratione inflammationis vel esse Curatrices, vel Præseruatrices. Curatrices sunt refrigeratio & euacuatio; quia in inflammatione est morbus in intemperie calida, unde refrigerandum est in materia & magnitudine, unde euacuandum. Dyscrasia calida, & magnitudo aucta sunt duo n. orbi: quia offendunt actiones similem & dissimilem. Intentiones autem præseruatrices, virtute quarum prohibere oportet, ne augeatur phlegmone: hæc diriguntur in materiam vel fluentem, vel Fluxuram. Ratione fluentis, oritur indicatio reprimendæ ratione fluxuræ in genere oritur indicatio reuellendæ: in specie autem, si fluxura sit materia per modum attractionis, oritur indicatio mitigandi dolorem, si id fiat ratione doloris: oritur indicatio refrigerandi, si attractio fiat ratione caloris. Si fluxio fiat per modum transmigrationis: probandum est iecur ne suscipiat: & mandanti etiam parti occurrendum, ne generet: prius tamen totius habenda ratio.

Prognosis.

Periculosus & lethalis est hic affectus: est enim intemperies, magnitudo aucta, detinetur pars præcipua, imminet hydrops secundum Auic. & atrophia, e lib. de puls. ad tyrones nam in hepatis phlegmone, iecur læditur, & ratione generationis sanguinis, & ratione distributionis. Verum ut periculi diuersitas deprehendatur, oportet considerare differentiās, & ea quæ consequuntur inflammationem iecoris. Si consideremus differentias, & primum desumptas à loc. aff. dicit Auic. deteriores esse inflammationem, dum occupat partem gibbam, quam quando detinet partem sinuam: ratio est, quia partes thoracis, & proinde nobiliores magis patiuntur dum inflammatur iecur secundum partem gibbam, ad differentiam inflammationis detinentis partem sinuam. Galen. cap. 7. lib. 3. loc. aff. testatur, grauiora esse symptomata, dum iecur læditur, dum partem sinuam inflammatur: ubi non aduersatur Auicem: non enim loquitur de omnibus symptomatis, sed speciatim de his quæ ad ventriculum, ut sunt sitis, inappetentia, nausea, & reliqua ventriculi symptomata, quæ magis molesta sunt. Sed non propterea illa inflammatio magis est periculosa: nam de etiam subdit Galen, inflammata parte conuexa, rursus magis molestare. Constitutum igitur sit, deteriores esse inflammacionem

tionem partis gibbæ. Quoad differentias à materia: non est ita periculosa inflammatio, quæ fit è sanguine: periculosior est, quæ fit è succo bilioso: quia erysipelas adest, & febris ardens, minaturque tabem, in lib. aduersus Iulian. in aphorismos. Nec periculo vacant illæ inflammationes, quæ fiunt è succo melancholico: facile enim degenerant in scirrhum, vbi res desperata. Si consideremus ea quæ consequuntur: Singultus in iecoris inflammatione, malum: aphor. sect. 7. rationem reddit Galen. cum alibi, tum alibi, tum in comm. nisi enim vehemens sit inflammatio, non ita afficitur ventriculus, vt fiat singultus: quare si adest singultus, praua est inflammatio. Similiter dum annectitur febris ardens, minatur tabem. Et secundum Auicennas dum coniungitur alui fluxus, homines moriuntur: & per alui fluxum, intelligimus fluxum symptomaticum, qui non fit cum tolerantiâ virium, vnde vires languidæ sint, necessario moriuntur ægri. Galen. enim cap. 5. lib. 10. meth. ait in inflammatione iecoris unicam esse spem salutis, nempe virium robur: vnde viribus languentibus ægri succumbunt.

Vena secunda est: quia affectus sanguineus. Quamprimum *Curatio.*
autem vena tundenda, secundum Auicennam: & quidem an- *Cheirurgia.*
te reprimentia: nam secus facile fiet scirrhus, & maxime intendetur inflammatio, si discutientia adhibeantur. Aëtius ait, secandam esse venam primo die, itemque secundo, & septimo, dum dolor molestat: innuens, primo die venam aperiendam: & si augetur inflammatio, si intendatur grauitatis sensus, dummodo sint permittentia, etiam septimo venam secari posse. Vacuandus autem sanguis non iteratis vicibus, sed confertim: nam in maximis inflammationibus nullum maius est præsidium, quam euacuare vsque ad animi defectum, aphor. 23. sect. 1. Secunda autem basilica dextri lateris; cap. 11. lib. 13. meth. quod etiam voluit Aristot. cap. 4. lib. 7. de histor. animal. Si hæc vena lateat: aliz venæ brachij tundantur. Quod si suppressi sint menses: aperiatis venas infernas. Si virtus non esset ita valida vt ferat venæ sectionem: applicabuntur cucurbitulæ scarificatæ cruribus: reuellunt enim à capite (libro de hirudine) multo magis à iecore, & præsertim inter initia. Secus autem dicendum de cucurbitulis, quæ applicantur parti affectæ, ratione euacuationis materiæ fluxæ & impactæ: suntque præsidium topicum.

pharmaceutic.

Communia medicamenta.

Medicamenta alia Communia, alia Propria. Communia sunt lenientia, præparantia, purgantia. Circa Lenientia notandum, interdum his vtendum per superius, interdum tantum clysmis vtendum. Si enim inflammatio partem gibbam occupat: licet vti lenientibus per superius: nam quâvis horum vis & potestas producat non tantum ad tenuia intestina, verum etiam ad mesaraicas, & ad portas iecoris: tamen locus inflammationis non irritatur, quia est in parte superiori gibba. Quare poteritis exhibere *mel rosatum solutivum, mannam: nec spernendi tamarindi*, vt simul educantur superfluitates, & mitigetur feruor inflammationis. At si inflammatio fuerit in parte sima: non debent exhiberi lenientia per superius, quia afficiuntur venæ mesaraicæ, maxime afficitur ventriculus, vitium est in parte proxima, in parte sima, quæ agitur à lenientibus: propterea clysmi sufficiunt, qui mediocres esse debent, in inflammatione pituitosa, è maluis & furfuribus, vel alio simili: si inflammatio fuerit feruidior, sit *ptisana hordeacea colata, decoctum hordei, sint refrigerantia, item oleum violaceum, cui additur ali- quid olei rosati completi*, ad corroborandas partes vicinas, partes iecoris.

2. Præparantia.

In præparantibus notandum: si inflammatio feruidior vtendum refrigerantibus, *cichoraceis, hepaticis, &c.* si non est ita feruens: vtendum *agrimonia, betonica, &c.* Potius autem conueniunt decocta, quam syrupi: & si syrupi exhibeantur, ita temperabuntur, vt mistum nō sit dulce. Alexander enim suadet, vt in iecoris inflammatione maxime vitemus dulcia. Aut ergo non exhibeantur syrupi, aut exhibeantur sine dulcibus.

3. Turgantia.

In Purgantibus animaduertendum, quænam iecoris pars sit inflammata. Si enim pars gibba inflammatur: non sunt exhibenda soluentia, secundum Auicennam, sed euacuantia per lotium. At, si pars sima est inflammata: vtendum euacuantibus per aluum. Si enim secus fecerimus, reddetur natura imbecillis, irritabitur præter rationem inflammatio. Et hoc sumpsisse potuit Auicenn. à Galen. cap. 15. lib. 13. methodi vbi vult, partem simam esse purgandam per aluum, gibbam per lotium. Quare, si pars gibba est inflammata: debemus exhibere lenientia, de quibus superius locuti sumus: non autem soluentia: quia materia illa euacuanda est per lotium: nisi fortasse natura tentaret euacuationem per aluum, & dimi-

& diminute: unde, apparentibus signis concoctionis; poteritis naturam adiuuare. Si inflammata fuerit pars sima: probat Galenus cap. 14. lib. 15. & 16. lib. 13. method. carthammum seu enicum, uriscam, radium polypodij, possumus miscere aliquid epithymi: & urgente necessitate inquit Galenus se exhibuisse verastrum nigrum, cum piasana hordeacea colata. Nos exhibere possumus rhabbarum, si redundaverit bilis: agaricum, si inflammatio sit picrosafa: si melancholica, senam, epithymum, polypodium, nigrum verastrum. Unde in praxi notandum, ad valentiora ascendendum esse, non in inflammatione biliosa, sed præsertim in melancholica: quia hæc potest degenerare in morbum incurabilem, nimirum in scirrhum. Quod si materia causans inflammationem resideat in parte gibba: occurrendum, secundum Galenum, daureticis, apso, petroselino, betonica, danco, asaro, asparagis, &c. de quibus in venum affectibus. Exhibenda autem sunt: hæc medicamenta, quando concocta est materia, non antequam (lib. 13. method.) qui inter initia purgare volunt, inflammationes reddunt pertinacissimas. Quare soluentia exhibeantur concocta materia: siue per superius exhibeantur, siue per inferius infundantur.

Præparata medicamenta sequuntur, dum inflammatio occupat partem simam. Hæc referuntur ad Materiam, & ad Iecur. Et sunt Reprimentia, ac Resoluentia. Reprimentia conveniunt & ratione materię, & ratione loci affecti: cap. 15. & 16. lib. 13. method. Materia enim feruens refrigeratur ope reprimentium: fluxa autem, sed nondum impacta, retrocedit, unde non augetur inflammatio. Conducunt etiam ratione loci affecti: iecur etenim inflammatum & calefactum exigit refrigerantia, qualia sunt reprimentia. Præterea iecur postulat roborantia, quibus tonus ipsius servetur: qualia sunt astringentia, & reprimentia. Reprimentia autem vel vere talia sunt, id est, frigida, vel calida. Frigida sunt, oleum rosatum omphacinum, oleum cydon, myrrinum, succus cydon. succus rubeus omphacinum, sumach, acetum, santali, diatrion santal, unguentum santalinum, unguentum Mes. Et quæ repriment citra refrigerationem: ut nuces cupressi, nuces quercus, masticho, oleum mastichinum, & oleum absinthij ascerbum maxime confert in affectibus hepatis. Hæc ergo repriment, tum refrigerando, tum circa refrigerationem: illis utendum in phlegmone fervente & biliosas, in pituitosa & melancholica, ne fiat scirrhus. Quoad modum: non debent actu frigida applicari iecori.

cap. 12. lib. 13. method. nisi esset erysipelas, & insignis feruor, vt monet Auicennas: tunc enim inter initia id fieri posset. Quoties tamen non est feruor summus, oportet moderate calida applicare. Neque sinceris vtendum reprimentibus, nisi fuerit erysipelas: quia non est periculum, vt fiat scirrhus. Secus autem dum inflammatio est pituitosa, vel melancholica. Quare cum reprimentibus miscenda etiam sunt aperientia & propterea tutius est, vti reprimentibus calidis, quam frigidis. Ratio autem quare attenuantia sint miscenda sumi potest è cap. 15. lib. 13. method. primum ratione materiæ, quæ non tantum fluida est, sed etiam fluxa, vnde & sensus grauitatis adest: egemus ergo non tantum reprimentibus, sed etiam attenuantibus, seu laxantibus. Deinde ratione loci affecti, nimirum iecoris: in quo tum substantia perpendi debet, tum situs. Quoad substantiam: iecur non est donatum substantia laxa & molli, vt cerebrum & pulmo: quare sincera reprimentia non ita possunt penetrare per crassam iecoris substantiam. Quoad situm iecoris: hoc viscus potius interna sede, quam externa est collocatum: ideo medicamenta non ita facile possunt perducì in locum profundiorē, & propterea egemus aperientibus: vnde *absinthium* est optimum præsidium: nam ratione partis amara est tenuis substantiæ testq; vehiculū partis crassæ, partis astringentis, ac reprimentis. Hinc Galenus *absinthium* in oleo decoquit vase duplici: & carnem *cydon.* decoquit in aqua, possumus etiam in vino decoquere: facta decoctione *absinthij* & *cydon.* accipis oleum, quod iam suscepit vim *absinthij*, & vinum quod suscepit oleum *cydonij* facultatem, quandoque etiam addit carnem *cydon.* omniaque simul mixta decoquit: postea accipis pulv. *myrobalan.* vbi gratia in inflammatione pituitosa pulv. *myrobal. chebul.* & pulv. *rad. irac.* vt non tantum reprimat, sed etiam attenuet, pro singulis vncis olei & aque, sumatur vtriusque pulueris ʒ. ss. Tandem misceat Galenus aliquid cera, verbi gratia ʒ. ij. Quoad quando: vtendum reprimentibus, non modo in primo, sed omni tempore, non quia assiduo materia fluat, sed ratione loci affecti iecoris. Quoad locum: medicamenta hæc applicanda regioni iecoris: non autem intro danda, quia habent vim astringendi. Forma potest esse vñctionis, linimenti, emplastrum, cerati.

Digeritio. Resoluentia quoque non erunt sincera, sed permixta cum reprimentibus: vnde vti possumus calefacientibus & siccantibus,

tibus, quæ proposuimus cap. de intemper. ventriculi: vt sunt, oleum *et* etus, oleum *irin*, decoctum *calamintha*, *hyssopi*, *pulegij*, &c. Notandum autem, & præsertim in inflammatione *melancholica*, vt permisceantur emollientia, ne fiat *scirrhus*: vt sunt *adipes*, *medulla*, de quibus cap. de *scirrho*.

Licet vero summo sit studio cauendum, ne phlegmone *suppuratio phlegmones* iecoris in suppurationem terminetur: cum inde vlcus relinquitur, fere immedicabile: attamen si è febris & doloris intensione, supputari materiam cognoscimus: hac quoque in parte natura deferenda non est, sed emollientibus & maturantibus iuuanda: *verbi gratia*, R. rad. *alth. fol. malua, flo. chamaemeli, ana. ss. j. farina hordei tantundem, sem. lini ʒ ss. bulliant: dein pistentur*: & add. pingued. gallina, quantum sufficit pro cataplasmate. Addi etiam possunt carica, fenugracum, oleum amygdal. vitelli ouorum, crocus, &c. itemque ad visceris tenum coma absinthij. Hinc abscessus rumpendus est, vlcusque tergendum ac glutinandum: quemadmodum cap. 4. & cap. 23. huius libri docuimus.

Victus quo tenuior, eo citius remouetur in phlegmone: *Diaeta* virium tamen habenda ratio. Improbantur *allium, malum punicum*: nam abstinendum est à cibo viscido, astringente, crasso, ne superfluitates in iecore detineantur, dum meatus angustantur à viscidis, vt ab allio: & ab astringentibus, vt est malum punicum. Abstinendum ab aperientibus, quæ acria sunt, quia irritant partem inflammata. Vitanda etiam aperientia dulcia: vt *manna syrupi*: quia iecur intumescit, nisi permisceantur amara, vel acida. Quare cauendum ab usu aromaticum, & acrium. Oportet autem vti detergentibus & aperientibus citra acrimoniam, citra dulcedinem: vnde Galenus probat *psisanum colasam*. Sed quia non omnes possunt perferre *psisanum*, præcipit Alexander, vt exhibeamus *panem tritum*, vel etiam *piscis*, præsertim dum inflammatio est feruidior, biliosa: cibus etiam miscet *amygdalas*, quæ non sunt valde dulces, & habent vim aliquam attenuandi, aperiendi. Cibi condiendi aceto, acetosa, endiuia, quia aperiunt & refrigerant: & si insignis est inflammatio, licet ascendere ad *lactucam*. A vino abstinendum. cap. ult. li. 4. meth. *Potus*.

Conuenit aqua hordei: item aqua alterata cum modico carnis: ubi virtus est debilis: sit inu longum, & alteratum endiuia, hepatica. Codex Aui. Optima autem est aqua hordei, quia refrigerat, abstergit, & cenna resti propterea minuit obstructions. Auicenna aquam hordei in tuitur.

inflammatione iecoris suspectam esse dicit. Sed puto codicē esse corruptum, & pro aqua hordei. legendam esse mullam: quod transcripsisse videtur à Gale. præsertim t. 14. l. 13. meth.

Ad hepatis conuersionem.

Si autem gibba iecoris pars sit inflammata: statim in prima visitatione, si alius non fluat, & sit inflammatio è sanguine. conuenit talis clyster. *℞. aqu. hordei. mulla ana lb ss. ol. viol. rosati. completi ana ʒ j. cassia extracta ʒ ss. omi. vitellum, misce pro clysmo.* Et eadem visitatione iubeatis, vt aperiatur vena basilica dextri brachij, & sanguis emittatur pro virium toleratia. Instituaturs victus tenuis, vt est *psisana, aqua hordei.* Ordinetur syrupus, quem bis in die accipiat. Et expedit, vt die sequente exhibeamus lenitiuum: quia non sufficit clysmus: sermo enim est de inflammatione partis gibbæ. Syrupus fit: *℞. Syrupum ros. sol. ʒ ij ss. manna rl. ʒ i ss. decocti tamarind. quantum sufficit. fiat potio brevis.* Facta euacuatione per clysmum, per venæ sectionem, per lenitiuum: reprimens fiat: *℞. ol. ros. completi, cydon. ana ʒ vj. de absinth. ʒ ij. pulu. santal. ʒ ij. cera ʒ ss. Misce pro linimento, quod applicetur regioni iecoris.*

CAPVT XXV.

De affectibus Lienis, in genere: & speciatim de Duro splenis tumore.

Iecoris & splenis affectuum discrimen.

1. Differentia ratione morborum, & causarum morborum.



VICENNAS, Paulus, Aetius, scribunt, curatio nem vitiorum lienis admodum affinem esse curationi vitiorum iecoris. Discrimen tamen est in parte Pathologica, Semeiotica, & Curatiua. Quoad pathologicam partem: lien magis obnoxius est morbis frigidis, iecur calidis: & proinde lien non ita facile afficitur inflammatione, minus erysipelate, quam hepar: frequen-
tius autem scirrhus, quia allicit sanguinem crassum & melancholicum, qui frigidus est: vnde lien ob leuem causam refrigeratur, & tumore scirrhuso afficitur. Lien à natura constitutus est, vt mundificet sanguinem à crasso, & melancholico excremento: vnde lien optime constitutus tum censetur, cum repperatus est, & liber ab obstructionibus, vt possit attrahere, & concoquere crassum sanguinem, huncq; in alimentum conuertere, & quod reliquum est expellere per venas in ventriculum, vt fames excitetur: postea hoc excrementum in naturaliter habentibus per intestina secedit. Quod si autem lien male affectus sit, colligitur succus melancholicus in cor

in corpore, qui non expurgatus facit nigrum icterum.

Quoad partem Semeioticam: in hac perpenduntur signa Diagnostica, & Prognostica. Quoad ea quæ præsentia indicant, è lib. 5. de loc. aff. discrimin est: quia, sicut affecto iecore, symptomata potius occupant partem dextram: ita affecto liene, sinistram. Insuper, quemadmodum in malis iecoris color, dum mutatur, fit citrinus: ita in malis lienis fit nigricans, quia abundat sanguis niger. Quoad prognostica: discrimin proponitur ab Aetio: Cæteris paribus malum hepatis est grauius malo lienis: quia iecur est pars præstantior. Vnde si inflammatur vtrumque viscus: inflammatio in hepate est periculosior, quam in liene. Quamuis enim ex Hippocrate morbi magis sint periculosi, qui non sunt proportionati cum parte affecta: præstantia tamen iecoris plus potest, quam dispositio in liene.

Quoad partem curatiuam: & quidem cheirurgiam: differentia est penes modum & locum. Quoad modum: in venæsectione amplius erit foramen, dum lien afficitur, quam dum hepar. Quoad locum: in malis iecoris tunditur basilica dextræ: in vitiis lienis aperitur basilica sinistri lateris: aut communis, si hæc non appareat: aut cephalica: aut, si & hæc lateat, vel etiam, si virtus non sit admodum robusta, saluatella sinistra, inter quartum & quintum digitum: secundum Alexandrum, Paulum, Auicennam & Galenum, cap. 2. li. 9. & 10. Quoad materiam medicinalem: discrimin est secundum vim medicamentorum: nam in cap. 17. lib. 13. meth. & cap. 5. lib. 2. ad Glau. causa lienis oportet vti vehementioribus, siue sint alterantia, siue vacuantia. Ratio sumitur è partis dignitate & sede: quia hepar est viscus magis excellens: ideo non fert adeo fortia: & sedes iecoris est in loco magis propinquo, lien in remotiore. Vtendum etiam vehementioribus gratia materiæ: quæ est frigida, crassa, terrestris, contumax. Cum ergo in malis lienis vti oporteat vehementioribus, quæ vires non ferunt: occurrendum est mitioribus, sed in maiori quantitate. Insuper cum Auicenna misceatis acetum, vt sit aliorum vehiculum. Quoad modum euacuandi: è Galeno, differentia est, quia iecur potest euacuari his, quæ euacuant per aluum, & per lotium: lien per aluum solum, quia non est via, per quam possit expurgari per vesicam. Nec tamen propterea in malis lienis prohibentur diuretica. Galenus enim respicit ad materiam coniunctam, fluxam, & existentem in

2. Signorum ratione, differentia.

Curationis discrimin.

1.

2.

3.

4.

liene: unde causa materiae antecedentis, ne fiat in lienem, & tumor eius augeatur, optimum est ut diureticis. Ultima differentia est ratione praesidij vitalis: in malis hepatis, utendum hepaticis: in lienis, splenicis, qualia sunt secundum Auiennem, ammoniacum, allium sylvestre, secundum Aetium quoque lien noctua, Cappares & asplenium non sunt splenica: nec absinthium & agrimonia sunt hepatica: sed differunt, quod alia sunt vehementiora: alia remissiora.

His igitur obseruatis: cognita iccoris affectuum natura, de splenis etiam vitiis facile statui poterit. Quare & nos hoc loco, breuitati consulentes, solum Splenis scirrhum, quo frequentius corripitur solet, tractabimus.

De scirrho Lienis.

Chirurgia.

Quoad materiam chirurgicam: Galenus cap. 2. li. 9. x. rōn. iubet, ut aperiatur vena post aurem sinistram, & extrahatur sanguis ad 3 ij. vel iij. quo oblinatur tumor. Fatetur Galenus hoc esse summum praesidium, agens à proprietate potius contraria, quā similis: ipse vocat naturalem contrarietatem: hā inimicitia est inter sanguinem extractum, & materiam tumoris. Circa materiam chirurgicam Aetius ascendit ad vesicatoria, ad cauteria: & vlcera diutius aperta detinet, ut materia egrediente per locos exulceratos tandem desinat tumor. Quare in tumore contumaci ad haec accedendum: prius tamen totum expurgari debet, & materia tumoris, quantum fieri potest, remoueri, nam mollior reddita promptius cedit.

Interna
attenuan-
ti. & emol-
lencia.

Quoad materiam medicinale: oportet ea uti intus & extra. Intrinsecus cum Aetio & Auienna utendum 3 ij. lienis equi puluerisati, & alij sylvestris: & bibatur post puluerem oxymelitis lb. β. ut pulvis deducatur ad lienem, materia attenuetur & detergatur. Allium contundatur, extrahatur succus, & vesicatorius in puluerem redigatur: huius pulueris recipe 3 j. ammoniaci dissoluti in aceto 3 β. (acetum sit in quo sint macerata rad. scilla: vel sit acetum scilliticum.) pulu. lienis equi, vel asini 3 ij. cum oxymelite scillitico parentur pilula, vel boli. Dentur. Et haec est unica dosis. Datur per quatuor vel quinque horas ante cibum: & ilico propinatur oxymelitis lb. β. Si quis non potest perferre oxymeli sincerum, detur dilutum: Verbi gratia, R. oxymelitis 3 ij. decocti scilla, tamarisci, seminum securidaca 3 iij. Detur per plures vices. Non improbo decoctum sarsae parilla: redditur efficacius, si in eo decoquantur scilla, & tamariscus: causa

causa emolliationis, potest etiā decoqui *radix albaea*: & ut fiat adhuc efficacius, potest in facta decoctione quater & saepius extingui *chalybs ignita*. Hoc decoctum salis chalybeatum detur mane & sero per quatuor dies: & ante decoctum dentur ʒij , vel ijj . pulueris, & duę vel tres pilulę superius descriptę. Idem seruetur in exhibēdis his pilulis, quod diximus in lue Venerea. Dabitur ante cibum syrupum. Cibus sit medicinalis, contrarius humori scirrhi. Probatur vinum chalybeatum, quod est valde efficax, non tantum ad absumendum tumorem lienis, sed etiā ad eradicandū materiam, quę causa est obstructionis in quacunque parte ventris inferioris. Hoc tantum discrimen notari debet: Si materia est in iecore, sunt adhibenda hepatica: si in liene, splenica: si in vtero, vterina. Vnde in tumore scirrholo lienis sit præscribatur: *ʒl. limatura chalybis lb. j.* (in diebus canicularibus sub radis solis hac limatura infundatur per tres aut plures dies in aceto acerrimo, in quo sint macerata rad. albaea, (pulu. ceterach, securidata, samarisci, core. rad. capp. ana ʒ ij . cariophyll. ʒ j . lienis equi, vel asini ʒ ij . vini generosi lb. xij . fiat infusio per dies octo vel decem, & in tempore calido destineatur vas sub radis solaribus: in frigido, in hypocausto: & vas vitreum saepe commoueatur in die: & post diem decimum hoc vinum detur. Dosis ab ʒ ij . ad ʒ viij . seruatis seruandis, de quibus alias. Dabitur enim per quinque horas ante prandium in lecto, & decumbat æger in latere sinistro: dormiat, si potest: deinde surgat, ambulet, si potest, per stadium, & ultra. In illis diebus aluius fluat sponte, vel arte.

*Limatura
chalybis.*

Oportet etiam præsidii extrinsecus emolliantibus vti. *Emollientia externa.* Fomentum prodest è maluis, albaea, rad. cucumeris sylvestris. Medicamentum etiam è medullis, è quibus diachylon conficitur. Efficaciora quædam proponam. Aetius sumit lapidem molarem, vel pyritem, redigit in laminam, vel puluerem. Si in laminam redigatur, oportet eam calefacere ope vaporum prodeuntium è fermento aceto scilicito. Præstat etiam applicare puluerem. Medicamentis hoc vti licet, post emolliationem aliquam: *ʒl. succi fol. belleb. alb. ʒ j. pulu. lapidis pyriti, vel molari ʒ ss. succi cucum. agrestis ʒ ij. ammoniaci dissoluti in aceto (in quo sit macerata medulla colocynth.) ʒ ij. ol. de capp. amygd. amar. ana ʒ ss. cera lota in decocto colocynthidis, vel albi veratri ʒ j. Misc. & applicetur.* Possumus etiam accipere partes æquales succi alij sylvestris, & succi albi veratri, cum oleo amygd. dulc. & amararum.

Diala. Viſtus ſit compar: nimirum medicinalis, qui matetiam illam abſumat. Ante pilulas igitur propoſitas probantur *poſne chalybeas*: *chalyſ* in aqua exſtinguatur, non in vino, quia amar eſcit, & dein aqua cum vino miſcenda. Et quia non ſemper licet dare aquam, ſed vinum ſincerum: poſſumus vti vino medicato e ceteraſh, tamarico. Adde poteſt aqua, fortior facta cha, be ignita & exſtincto.

CAPVT XXVI.

*De ſcirrho Lienis dilucida magis commentatio.**Definitio.*

Eneratur hoc malum, dum lien afficitur intemperie frigida, & in tumorem attollitur. c. 6. & 9. l. 14. meth. Scirrhus enim lienis eſt tumor frigidus lienis, productus ab humore indurato. Non

Cauſa efficiens.

recte definitur tumor durus: eſt enim accidens præter naturam & potius morbus, quam cauſa, aut ſymptomata. Cum ergo ſit morbus, erit in magnitudine aucta, & in frigida intemperie. Quia vbi eſt ſcirrhus, etiam non exquisitus: fieri non poteſt, vt pars affecta non labore morbo frigido. Euenire autè poteſt, vt magnitudo ſit parum aucta, & habeat potius rationem qualitatis mutatæ, quam morbi. Recte igitur diximus: eſſe tumorem frigidum: quia in omni ſcirrho, neceſſario eſt tumor, & frigida dyſcrasia. Formalis igitur cauſa claudit in ſe duplicem morbum. Efficiens cauſa eſt humor durus: ad differentiam ſtatus, nam ab hoc etiam duri tumores fiunt, vt in tympanite. Non ſufficit, vt humor ſit frigidus viſcidus: ſed etiam oportet, vt ſit durus. (ratione duritiei oritur indicatio emolliendi, qua non eſt curatiua, ſed præſeruatiua: quia reſpicit cauſam efficientem, nimirum humorem durum: quia autem ſcirrhum definiunt tumorem durum, vt durities habet rationem formæ: coguntur ſateri emolliuonem eſſe indicationem curatiuam: & ſic omnia confundunt.) Cauſa igitur efficiens eſt humor durus: vt diſtinguatur ab œdematè, & quocunque tumore non ſcirrholo. Talis humor poteſt eſſe Pituita & Melancholia: libro 8. x. r. cap. 4. libro 1. ad Glauc. capit. 4. libro 14. meth. Reliqui humores, vt Sanguis, & potiſſimum Flaua bilis, licet tenues ſint, nihilominus habent partes craſſas. Vnde etiam inflammatio, & interdum eryſipelas, degenerant in ſcirrhum, quando, ſcilicet humorum tenuiores portiones ab imperitiis medicis diſſoluuntur, vnde remanent craſſæ, induratae ſcirrhum faciunt.

A forma

A forma non sumuntur differentie, nisi secundum magnitudinem & minus: ut scirrhus maximus possit exquisitus censeri. Nisi forte quis dicat, eum esse morbum frigidum, & sic esse Magis vel Minus frigidum. Ratione tumoris, hic est Morbus, vel Qualitas mutata. Neque à subiecto sumuntur differentie: nisi dicamus, lienem affici vel magis, vel minus, secundum partem unam, quam alteram. Ab efficiente sumuntur differentie: humor enim durus plurimum est Melancholicus, interdum etiam Pituitosus, ræo Sanguis vel Bilis.

Ad tactum sentitur durities: & mutatur color secundum faciem. An sit exquisitus cognoscitur: quia dum digitis premitur, ægri non sentiunt dolorem. Facile etiam cognoscitur efficiens: verbi gratia, si erysipelas est prægressum, vel inflammatio: rationabile est, vel è sanguine, vel è bile crassiore promotum fuisse scirrhum. Sin minus: sunt signa pituitæ, vel melancholiæ dominantis: neque prægressum est erysipelas, vel inflammatio.

Indicatio tantum est calefaciendi: quia à forma sumitur indicatio curatiua: morbus est frigidus, ergo indicantur calefacientia. A morbo in magnitudine aucta non sumitur indicatio, quia hic morbus est ratione contemplabilis. A subiecto oritur indicatio vitalis: ratione caloris enim oritur indicatio moderate tum calefaciendi, tum astringendi. Ab efficiente sumitur indicatio præseruatoria: & cum hæc materia sit humor durus, emolliendum: &, quia materia dura, potest esse crassa, viscida, ideo detergendum, incidendum. Auferenda autem sunt impedimenta, quæ in causa sunt, ut non possint scopi propositi impleri: ideo toti prospiciendum.

Hisce scopis satisfacere arduum est: scirrhus enim est affectus contumax, & ratione loci affecti, & ratione materię. Quoad differentias formales: si scirrhus ita sit frigidus, ut sit exquisitus, non potest homo prorsus liberari. Quoad locum affectum: prout viæ magis vel minus obsidentur, vel secundum superficiem, vel secundum partes profundas: ita etiam maior & minor erit difficultas in cura. Ratione efficientis peior scirrhus est melancholia, quam à pituita: & quod duxior fuerit, eo cura difficilior. Licet autem scirrhus sit exquisitus: is tamen ita quoque imminui potest, ut homo diu possit viuere: dum scilicet ita occurrimus, ut iecur non trahatur in consensum: si enim iecur refrigeretur,

actum est: nam necessario subsequitur hydrops, deinde mors: unde scirrhus hepatis citius interficitur, quam lienis.

Curatio.

Vena secāda. Vena secāda est si sanguis redundet: & si virtus sit robusta. Quare inter initia scirrhi sanguis mittendus: tunc enim duo propositi scopi adesse possunt: Non autem quando est progressus, quia hydrops sequeretur. Secunda autem basilica sinistra: & si virtus non sit admodum constans, saluatella sinistra: vel aperiendæ hæmorrhoides.

Vesicatoria.

Vesicatoria probantur in scirrho contumaci, quatuor, vel quinque, & satis vehementia: hoc modo. R. pulv. canthar. 3 v. pulv. euphorbij, verat. nigri, veratri albi, ana ʒij. fermenti ʒij. aceti scill. parum. fiant pasta pro vesicatoriis (dum in febris malignis utimur vesicatoriis, sufficiant medicamenta vesicantia: quia postea fit attractio ratione doloris, & caloris, atque recepta, ratione imbecillitatis. At in scirrho lienis miscemus medicamenta, qua attrahunt non solum qualitate manifesta, sed etiam recēdita: nam euphorbium attrahit pituitam, helleborus niger melancholiam, albus melancholiam (& pituitam: unde, prout scirrhus est melancholicus, vel pituitosus, vel mistus, diversa medicamenta imponenda: plerumque tamen fit à succo melancholico, permixta cum pituitosa.) Applicanda vesicatoria, quando adest præsentia indicantis, nimirum materia scirrhi: & quando nil prohibet, ut est corporis repletio, & immoderata materię durities: unde totum corpus prius purgandum, & materia emollienda: post applicanda vesicatoria. Tandiu vesicatoriis utendum, quandiu adest præsentia indicantis, nisi aliud prohibeat. Virtus non permittit ut diutius seruentur, quam decem, aut quindecim dies: tunc enim claudantur, & post factam considerationem quiescant ægri per quindecim aut viginti dies, & postea rursus applicentur, quia non excipitur tantus dolor. *Ubi agendum* sumitur à substantia materiæ in liene: applicanda igitur abdomini sinistro, circa lienis sedem.

Cauteria.

Sed ob scirrhi contumaciam, etiam ad cauteria ascendendum, quæ sunt efficacissimum remedium: alias hydrops sequitur: non enim sufficit ol. de cappariis, nec diachylon à aceto materatum, quibus vulgo utuntur, citra emolumentum. Aetius & alij in affectibus iecoris ad cauteria ascendunt: ergo hæc lien, ut membrum minus præstans, nullo magis sustinet. Cauterio autem dupliciter uti possumus: primò ratione materiæ, quæ nondum causat, nec fouet scirrhum: &

tunc fonticuli excitabuntur in cruribus, potissimum in sinistro: Secundo, ratione materiæ, quæ actu causat scirrhum: de quibus nos potissimum loquimur. Cauteria ergo pro magnitudine tumoris, plura, vel pauciora inurentur. Et hæc proprie dicuntur cauteria, quorum beneficio fit euacuatio, non reuulsio: vnde crurum vlcera, non sunt proprie cauteria. Vrentur autem quando adest præsentia indicantis, id est, quando nihil aliis medicamentis & vesicatoriis non cedit. Cauteria autem diutius aperta teneri possunt quam vesicatoria. Et fiant ferro candenti, vel caustico. Applicentur regioni lienis. In vlcus immittatur pila ex ambra, cinere: potissimum è radice vel medulla arundinis, aut ebuli, & imponatur frequenter pulvis veratri nigri, si ager potest perferre, item veratri albi. Porro non confugiendum ad vesicatoria & cauteria, propter molestiam, nisi quando aliter fieri non potest.

Sequuntur peculiaria medicamenta, respicientia materiam à qua scirrhus producitur. Vti possumus purgantibus vehementibus: causa pituitæ medicamentis è colocynthide confectis, terna ex causa melancholiæ, sic qua fiunt ex belleb. nigro. Verum sup-
*Medica-
menta in-
terna ex-
tenuantia
splenem.*
posita totius purgatione, quoad peculiaria medicamenta, pulvis lienis asini satis efficax, est ad absorbendum materiam scirrhi, si intro assumatur à ʒss. ad ʒij. & ut perducatur ad lienem, addatur ʒiij. vel vj. vini albi, tenuis substantia, generosi: nisi febris prohibeat: sic enim prius occurrendum esset febri l. 9. n. vix. Primis diebus macerentur radices althææ, & capparum, cum febris ceterach. Eodem modo vti possumus pulvere hepatis lupi, cinere vesperilionum ad ʒij. cum aceto mulso, vel cum aceto scillitico. Et, cum liceat per plures dies exhibere: vel in aceto, vel mulso macerentur medicamenta iam propòsita. Obseruetur etiam, sicut in lue Venerea, ut singulis decem diebus aliquod medicamentum electiue ducens, vel pituitam, vel melancholiam, prout in corpore redundabit, exhibeatur. Prestabit etiam, ut alternis diebus administrentur clysteres ex albo veratro: horum enim beneficio, materia, quæ aliqua è parte funditur, attrahitur ad intestina. Dabuntur etiam pulueres à præstio, samarisco: magis prodeunt, si cum vino chalybeato exhibeantur. Antiqui hoc proponunt efficacissimū, quod tamen nunc non est in vñ. ʒ. semin. eruca ʒss. piperis, ammoniaci, spica, scolopendr. ana ʒij. arida cribrentur, ammoniacus autem dissoluatur in aceto scillitico: fiant pilule, quarum dosis à ʒss. ad ʒij. & exhibean

Lymatuea exhibeantur cum $\frac{3}{4}$ v. aceti vel mulsæ. Aëtius probat admirabile, quod nos hoc modo poterimus præscribere. *R. rad. capparum, tamarisci, limatura chalybis* preparat. ana $\frac{3}{4}$ vj. ammoniaci $\frac{3}{4}$ j. semin. securidacæ $\frac{1}{2}$ s. stachad. absinthi ana $\frac{3}{4}$ ij. scolopendr. $\frac{3}{4}$ x. fiant pilule : dosis à $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ iij. Est efficax propter chalybem : ut sufficiant $\frac{3}{4}$ iij. nec licet ascendere ad $\frac{3}{4}$ ij. Exhibeatur cum $\frac{1}{2}$ s. vel aceti, vel vini fortissimi. Medicamentum omnium efficacissimum, in scirrho valde contumaci : *R. li-*

Vinū chalybis
lun.

limatura chalybis $\frac{1}{2}$ j. maceretur in aceto acerrimo (in quo macerata sint radices alihæ, asparagi) & ponatur sub radiis solaribus : aceto, postea reiecto exsicceetur limatura, & redigatur in pulverem tenuissimum : huius ergo chalybis, ita preparati, *R. $\frac{1}{2}$ s. pul. securidacæ, guaiaci, sarsæ, ceterach, tamarisci, rad. capparum, serpilli, salis theriacalis* an. $\frac{3}{4}$ ij. vini, vel aceti, vel poscæ, $\frac{1}{2}$ xj. Imponentur hæc omnia in vase vitreo, & vas ponatur ad radios solares, vel in hypocausio, & frequenter in die concutatur, ut fiat optima commistio, idque per 10. 15. aut 20 dies. Dosīs ab $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ viij. pro materia & magnitudine scirrhi : vitium tamen ratione auspicandum à minima dosi, & sensim per mediocrem ad summam ascendendum. Actū calidum, non frigidum exhibeatur : quia sic indicat passio materiæ resistentis. Bibat autem patiens hoc medicamentum decumbens in lecto per horam, in latere sinistro : deinde surgat, ambulet, & se exerceat ad sudorem. Post integram corporis purgationem assumat, per quinque horas ante prandium : & per plures dies : donec omne illud vitium absumatur. Tota quantitas sit $\frac{1}{2}$ xij. vini : quia adest præsentia vitiū, & nihil prohibet.

Externa,
emolliētia,
& *extenuantia.*

Extrinsècus probantur emollientia, quæ conficiuntur ex ammoniaco, bdellio, adipibus, medullis. Unde existat dsachylon simplex, cum gummis : emplastrum de meliloto efficacissimum est. Lunum D. Bartholomæi efficacissimum est. Hinc ascendendum ad extenuantia, ut sunt stachys, cappares, tamarisci, nasturtium, myrrha : item ad fortiora, ut sunt sinapi, colocynthis, veratrum album & nigrum. Licet uti luto D. Petri, D. Helena, quæ magis resolvunt, quam emolliunt. Vti etiam possumus sacro cerato. Habemus etiam emplastrum cervinæ vocatum. Maximo probatur suffumigium o lapide melari, vel pyrrite : vel super lapidem ignitum proiciatur acetum, in quo macerata sint prædicta emollientia : & cum resolvere volumus, in aceto maceranda sunt discutientia proposita, petissimum dictamus. Cæterum, cum lica debeat succum melancholicum attrahere, concoquere, expellere :

pellere : opus est vt eius calor conseruetur : qui ab emollientibus dissipatur : quare his permiscenda sunt leuiter astringentia, vt *ol. mastichinũ, absinthium.* cap.2. lib.9. x. rón. Galenus tali vtitur medicamento : *℞. myrrha, manna thuris an. ʒij. sinapi, nasturtij an. ʒij. aceti scilicet quantum sufficit. Sinapi & nasturtium contundantur & cribrentur : manna thuris, & myrrha dissoluantur in aceto, & redigantur ad formam emplastri.* Hoc efficaciter scirrhum lienis dissoluit.

Victus debet esse mediocris, & moderate attenuans. Fiat *vinum medicatum* tempore vindemiæ, cum propositis medicamentis, & præsertim cum *ceterach, tamarisco.* Quidam habent pro secreto, si *vinum conseruetur in vase confecto de tamarisco :* & si *patiens bibat de cyatho, qui confectus sit de tamarisco.*

Dieta.

CAPVT XXVII.

De Renum Affectibus : & primum de Diabete.

RENES, quia sunt partes instrumentariæ, obnoxij sunt morbis in intemperie, in mala compositione, & soluta vnitæ. Nos igitur tractabimus de Diabete, Calculo renali, & Ulcere. Quibus cognitis : omnia alia renum vitia, facile curari poterunt. De diabete, quia rarissimus est affectus, breuiter & confuse Galenus loquitur, cap.3. lib.6. de loc. affect. cap. vlt. lib. de differenc. symptom. cap.12. lib.1. de crisi. Per diabetem autem intelligimus illud vitium, quo homines plurimum mingunt. redduntque lotium confertim & copiosum, vt biberunt : hocque malum dum progreditur, homines contabescunt. Intelligimus autem hic tam exquisitum, de quo Galen. locis citatis, (cuius auctoritate Medici decepti, sæpe ægros interficiunt) quam spurium. Generatur hoc malum, dum aliquid morbificum occurrit corpori, cuius ratione intus ita lædantur renes, vt sicut lotium confluit in renes, ita etiam egrediatur, & hinc mictio fiat copiosa. Diabetes igitur est exiens seorsum renum, dependens à laxa actione renum. Forma est exiens : ergo symptoma secundum. Hoc autem exiens

Renes quibus tenetur affectibus.

Nomen.

Generatio.

Definitio.
Forma.

exiens est materia serosa, aquosa: ad differentiam aliorum ex-
euntium, siue sit pus, siue sanguis, siue aliud quippiam. Quod
autem in diabete egreditur, est laticum: unde Auicenn. dicit
illos mingere sicut bibunt.

Subiectū.

Subiectum sunt renes, ad differentiam vesicæ: quemad-
modum optime declarat Galenus locis citatis, potissimum
cap. 3. lib. 6. de loc. aff. ubi euidenter asserit, quamuis copio-
sum lorium possit conspici, non modo in diabete, sed etiam
in aliis affectibus: in diabete tamen necessario vitium esse
secundum renes.

*Causa effi-
ciens.*

Addimus: dependens à læsa retentione renum. Cum enim
exiens mutatum sit symptoma secundum: necessario in
primum refertur, quod est actio læsa. Læsa autem hic est
non expulso, sed retentio. Porro retentio læditur, vel Læsa
facultate retentrice renum: vel ob Errorem externum. Di-
cimus retentionem lædi, læsa retentrice: propria enim ra-
tione, & immediate, nulla alia facultas læditur. Nec obstat,
quod Galenus dicit crudum, & nequaquam coctum lorium
emitti: hoc enim primaria ratione non spectat ad coctri-
cem, seu alteratricem: quæ conqueret sane, si detineretur:
quia autem non detinetur, ideo non alteratur: vitium igitur
in retentione est.

Læditur autem retentrix ob malam compositionem, ut
optime proponit Auicennas: inquit hoc malum fieri,
quando meatus, seu orificia nimis sunt aperta: ut morbus
immediatus, ratione cuius læditur retentio, sit morbus in
mala compositione. Et hinc Alexander dixit opus esse
astringentibus: quia cognouit malum esse in immoderata
apertione.

Causa immoderatæ huius reclusionis, est Interna, vel
Externa. Interna, est Humor, vel Serum. De humore lo-
quens Aëtius, dicit: diabetem fieri ab humoribus imbibi-
tis in renibus: ab humoribus acris, mordacibus, salis: qui
ob acrimoniam abraderè possunt, & recludere orificia valo-
rum. Altera causa interna est serum, seu lorium, quod ape-
rit orificia, tum quatenus impetu ad renes fluit, tum quatenus
est copiosum. Fluit autem lorium, seu serū, vel quia Attrahitur,
vel quia Transmittitur. Attractionem Galenus tetigit locis
citatis: transmissionis autem non meminit, ne vno quidem
verbo, unde Medici his adducti auctoritatibus crediderunt
nullum diabetem fieri per modum transmissionis: quod ta-
men est

men est falsissimum. Si lotium fluat, quia attrahitur ab immodica renum caliditate: est diabetes exquisitus, in quo refrigerare oportet. At vero etiam per modum transmissionis serum potest fluere: vbi potius calefacere oportet: & hic Diabetes nothus est.

Hanc speciem cognouit Arétæus: quid dixit, diabetem *cap. 2. li. 2.* aliquando fieri in morbis acutis, quando cum impetu materia aquosa fluit ad renes. Et hanc fluxionem etiam cognouit Auicennas: dum voluit, quandoque in diabete renes esse frigidiores: quando igitur renes sunt frigidi, tunc impossibile est fluxionem fieri per modum attractionis, sed fit per modum transmissionis, vt pars robusta transmittat ad debilem. Porro lotium aperit etiam orificia, ratione copię. Quare videndum, quibus de causis lotium fiat copiosum. Fit igitur copiosum, quando, generatur à iecore calidiores: vbi enim iecur calidius est, facile plus iusto funditur sanguis: quemadmodum fieri solet à diureticis calidis & siccis. Quod si contingat in toto etiam corpore immoderatam caliditatem exsuperare: adhuc copiosius lotium gignitur. Præterea multum fit serum, ob copiam potus: plurimum autem bibunt homines, interdum ob sitim, interdum ob prauam consuetudinem. Causa externa, quæ potest orificia vasorum relaxare, possunt esse Assumpta, vel Applicata. Assumpta: vt immodicus vsus diureticorum, vt diasetyrionis, quo iam homines vtuntur, vt sint ad Venerem efficaces, sed postea mingunt. Applicata possunt esse, dum renibus applicantur iusto calidiora, & potissimum quæ laxant: vt immodicus vsus balnei aquæ dulcis, & immoderata applicatio relaxantium.

Quoad formam, & locum affectum: differentia tantum *Differētia.* est secundum Magis & Minus. Quoad causam efficientem hæc est Interna, vel Externa. Interna. Humor, vel Lotium. Lotiū, quatenus vel Imperu fluit, vel Copiosum est. Imperu fluens, vel Attractum, in legitimo diabete, vel Transmissum, vt in spurio. Copiosum lotium generatur, vel à Caliditate iecoris, aut totius: vel ratione Copiosi potus. Causa externa, vel Assumpta est, vel Applicata.

Malo hoc imminente, secundum Auicennam, & Græcos, exsiccatur os & labia: lotium præter consuetudinem *Signa in genere.* in maiori copia emittitur. Et quo magis progreditur malum

eo euidentius cognoscitur. Nam patientes emaciantur, & tandem tabidi euadunt: quia dum lotium per corpus non perducitur, sed ilico per vesicam excernitur, deficit το τ
 τρεφῆς ὅχρημα.

*Signa diffi-
 rentia.*

Quoad differentias: Num apertio orificiorum excitata sit à causa interna, vel externa: cognoscitur ex ægro & assidentibus: verbi gratia, fatebuntur se vlos esse diureticis, balneo aquæ dulcis, longo tempore, & præsertim secundum renes: tunc enim statuendum, malum à causa externa esse ortum: Sin minus hæc affuerint: ab interna. Cum autem causa interna sit humor, vel lotium: si humor imbibitus sit & impactus: patientes circa renes gravitatem percipiunt, & tristem sensum, qui oritur à lassitudine & acrimonia humorum. Si causa fuerit lotiunt, nulla aderit gravitas: nam sicut lotium fluit, ita egreditur, non retinetur, nec facit gravitatem. Cæterum, cum serum sit in causa, ratione tum impetus, tum copiz: Quoad impetum: cognoscendum est, an materia serosa fluat attracta, an potius transmissa. Si fluat per attractionem: ægri sentiunt caliditatem circa renum regionem, conqueruntur de festuore renum: calida applicata nocent, frigida iuuant, & hoc malum potissimum corripit iuvenes calidi temperamenti, & qui calidos habent renes. Si fluat transmissa: non aderit incendium in renibus: fierique potest, ut post morbos acutos hoc malum fuerit subsecutum, transmissa sc. ad renes materia: præterea frigida nocent, calida iuuant: observaturque hoc malum, in temperamentis frigidis, in senibus, & ætate decrepitis. Lotium autem copiosum, si generetur è copiosa portione, cognoscitur ex ægro: si ob immodicam sitim bibere cogantur, idem ex ægro intelligitur. Quod si homines copiosa portione non utantur, & tamen copiosum lotium gignatur: iudicandum est huius causam esse internam: quæ si fuerit iecoris immoderata caliditas, cognoscetur hæc è propriis signis: si autem totius corporis immodica sit caliditas, etiam hæc propriis indicabitur signis.

*Indicatio-
 nes.*

Præsidia in hoc malo tantum sumuntur ab efficiente: possuntque esse tum curatoria, tum præservatoria: licet alias à causa efficiente tantum præservatoriæ sumantur indicationes. Quare sciendum, causam efficientem diabetis duplicem esse: aliam proximam, aliam remotam. Proxima est immodica apertio orificiorum: quæ, licet statuatur causa efficiens diabetis,

diabetis, est tamen morbus, quem immediate sequitur laesa retentio: oritur ergo indicatio adstringendi, secundum Alexandrū. Remotior causa, seu materia, quæ vere est effectrix, est humor, vel lotium. Humor indicat sui euacuationem. Lotium fluit vel attractum, vel transmissum. Quatenus ergo impetum habet in renes: indicat sui reuulsionem, deriuationem: quatenus attrahitur: oportet refrigerare, secundum Alexandrum, cum attractio illa fiat ab immodico renum colore. Si lotium fluit transmissum: oportet potius calefacere, quia pars suscipit ob imbecillitatem. Si sumatur lotiū, quatenus copiosum est: si gignatur ob caliditatem totius, vel hepatis: oritur indicatio refrigerandi totum & iecur. Sin homo ob sitim plurimum bibere cogatur: siti occurrendum. A causa externa, non sumitur indicatio.

Malum hoc periculosum est: nisi enim occurratur, celeriter homines tæbe moriuntur. Inter initia leui negotio expugnari potest: in progressu autē, vt plurimum redditur inexpugnabile, quia vires fiunt languidæ. Sed pro differentiæ ratione, variat periculum: verbi gratia, si immodica apertio originem traxerit à causa externa, leuiori negotio tollitur, quam si ab interna: nec enim ita facile humores interni impacti euacuari possunt. Item si lotium profluat attractum, facilius curatur, quam transmissum: præsertim quia hoc malum, transmissio sc. lotio, senes corripit. Non est impossibilis curatio, si copiosum gignatur lotium ob caliditatem iecoris, aut totius: hæc enim remitti potest: item si fiat ob sitim, confugiendum ad caput de siti.

Prognostica.

Auicennas & Græci inter initia moderate sanguinem detrahunt: si malum sit inueteratum, nequaquam. Sanguis in hoc malo peccare potest potissimum vt causa sine qua non: nec enim renibus occurrere possumus, priusquam totum sit euacuatum. Non ergo in omni diabete sanguis mittendus: sed quando sanguis peccat, toto sc. repleto. Monet autem Auicennas, sanguinem moderate esse detrahendū: licet fieri possit, vt in magna copia peccet: nam vires magnam vacationem non permittunt: quia ob defectum vehiculi alimentati, corpus non nutritur, vt debebat, vnde necessario vires debilitantur: & quamuis ab initio forsan nondum debilitatæ sint: medicus tamen in venæ sectione non modo præsentis, sed etiam futuras vires respicere debet. Si malum inueteratum est, nullo pacto vena secanda: non quod malum in-

Curatio, venæ sectio.

ueteratum hoc prohibeat: sed quia vires debilitatz prohibent, quarum signum est malum inueteratum.

*Medica-
menta.*

*1. Lenien-
tia.*

Græci adhibent *castiam cum tamarindu: v. p. ℞. flo. cass. recens extr. 3 vj. pulpa tamarind. 3 v. misc. fiat bolus.* Notandum non imponi magnam quantitatem tamarindorum: quia institutum est aluum lepiscere, & mitigare impetum materiz biliosæ. Quare male nonnulli plurimos pulueres miscent, *liquintia; sem. melon. anisi, &c.* sic enim medicamentum fieret diureticum, à quo inter initia cauendum. Auicenna hoc medicamentum quidem proponit: & præterea clysmos moderate refrigerantes, *ex hordeo, lacte, & sere lactis, ol. viol. fol. viol. mal. & similibus:* histamen non semper utendum est. Imo probatur interdum maxime vsus huius medicamenti: *℞. mel. ros. fol. 3 v. iuris pulli parum, misc. fiat potio.* Si patiens nolit potionem: potestis exhibere *castiam cum myrobal. chebul. emblic.* ut proxima pituita euacuetur. Quod ea de causa admoneo: nam si fuerit exquisitus diabetes, in quo lotium fluat attractum: cum iecur sit feruidum: oportet uti lenientibus supra propositis. Sed si fuerit nothus, in quo fluit lotium potiss. transmissum, cum ætati senili plurimum accadat, cauendum à refrigerantibus.

*2. Præpa-
rantia.*

Quod de lenientibus dixi, idem de reliquis intelligi volo. In diabete ergo exquisito, refrigerantia ita præscribantur: *℞. fol. cich. endiu. hepatica, ana p. β. aqua bord. ℥β. fiat decoctio ad consumpt. quintæ partis: huius decocti ℞. 3 iij. (accipio in magna copia, ratione sitis) Syrupi ros. 3 β. misc. pro potu.* In diabete a notho, cum in ventriculo, & reliquis partibus exsuperet pituita, ut in senili ætate, præsertim decrepita: utendum est *melle, nbn syrupo, rosato: non aqua hordei, sed potius confecta e menseba: verbi gratia. Recipe mellis ros. oxymel. simp. ana 3 vj. cum aquis vel decoctis appropriatis, fiat potus.* Quoad euacuantia: euacuandum per aluum, vomitum, lotium, sudorem. Per aluum, in exquisito diabete, hoc modo *℞. pulu. rhei 3 iij. pulp. tamarind. flo. cassia ana 3 iij. cum saccharo fiat bolus.* In pituitosa materia euacuanda: *℞. agar. trochiscati 3 iij. pul. myrob. chebul. emblic. ana 3 ij. cum melle ros. fiat pil. vel bolus.* Quoad euacuuantia per vomitum: in exquisito diabete expedit copiosam frigidam præbere, ad ℥β. iij. post hanc exhibitam illico excitare expultricem ad vomitum, penna oleo intincta, vel simili. Aduertendum illico opus esse post exhibitam frigidam incitare expultricem: nam secus aqua descenderet ad renes, & non prouocaretur vomitus: hic adiuvat, tum gratia reuulsionis, tum quia sitim miti-

*3. Vacuan-
tia.*

gat.

gat. In diabete non exquisito, exhibeantur *oxymelitis sin.* ꝓ. 3 ij. cum iuris pulli tepidi 3 ix. Sudor prouocari potest, non his quæ assumuntur, quia materia adduceretur in renes, sed his quæ applicantur: utpote instrumēto quod est in cōmuni vsu, in curatione luis Gallicæ: eo a. tēpore, quo hoc instrumento utimur (de diabete hoc intelligatur, nō de aliis affectibus) renes inungeimus, in diabete exquisito, unguento rosaceo: in spurio, oleo mastichino, cum puluere nucū cupressi. Euacuantibus per lotiū utimur in hoc affectu, nō propter euacuationē totius, sed ut renes repleti euacuentur: nō enim his utimur, si renes nō sunt repleti. In diabete exquisito, hoc vtēdū: R. emuls. sem. melon. cucur. b. citruli, anguria, ana 3 vj. seri lactis optime depurati lb iij. misce. In diabete notho: R. fol. ceterach, rad. asparagi ana ꝓ. 3. iuris cicuri rub. lb j. 3. fiat decoctio ad cōsumptionē tertia partis: post expressionem, R. huius decocti 3 x. pulu. ceterach 3 j. misce.

Quoad alterantia: in diabete exquisito frigida conueniūt. 4. Alterā: Possumus ergo exhibere aquas B. Virginis, aquas Veronenses, ad 11a. lb vj. viij. vel x. item serum lactis ad lb iij. vel v. Lices exhibere saccharū violatū, cum st. nymph. &c. Renibus applicari possunt, infrigidans Galeni, ol. viol. & expertus sum, mirum in modum prodesse. Applicatio scil. magnorum nymphae prodest, quæ (ut frigida sint) sape renouabuntur: vel folia ipsa refrigeranda sunt cum spongia, in aqua frigida madefacta. In diabete non exquisito, ut possumus conserua è betonica, ut perducatur ad renes, conserua dianthos, licetque ad magnas antidotos ascendere. Applicare licet oleum mastichin. de spica. Foveri possunt renes spongia è vino madefacta. Ut hinc appareat maximum esse discrimen inter nothum & exquisitum diabetem.

Tandem adstringentia proponenda sunt, quibus in omni 5. Adstrin- diabete locus datur, quatenus sit ab immodica meatuū aper- gentia. tione. In exquisito igitur diabete R. troch. de spod. de balaust. ana 3 j. sacchari ros. antiqui 3 ij. pulu. ceterach, ut sit vehiculum, 3 3. cum omphacio fiat electar. Dosis sit 3 3. Vrgente necessitate, quia interdum imminet syncope, licet ascendere ad theriacam recentem, ad Philom. Rom. nam secus obirent. Extrinsicus applicare potestis ol. ros. non modo completum, sed etiam omphacium: verbi gratia R. ol. omphacini ros. 3 j. pulu. balaust. gall. immatur. cort. gran. ana 3 j. cera 3 j. misce. In spurio diabete, adstringentia erunt moderatiora: R. pulu. mastich. boli Arm. ana 3 j. sacchari confecti è mentha 3 j. & gratia vehiculi, conserua betonica 3 3. cum syrupo de mentha, fiat electar. cuius dosis à 3 ij.

ad iij. vel iij. prout indicantis actio erit vehemens. Extrinsecus applicandum oleum mastichinum, cum pulu. cupressi. Et in ingenti necessitate, ascendatis ad unguentum Comitis, & unguentum de corticibus castanearum, & dissolvatis cum oleo mastichino.

CAPVT XXVIII.

De calculo Renum.

Generatio.



ALCVLVVS renalis, seu potius vitium calculosum, renale dicitur ad differentiam vitij calculosi vesicæ. Generatur hoc vitium, dum calculus in renibus genitus, ita lædit renes, vt non possint amplius recte operari: vnde vi calculi geniti, renes morbo

Definitio.

afficiuntur. Quare hoc vitium calculosum nihil aliud est, quam morbus renum, procedens à calculo, in renibus genito.

Forma.

Forma huius vitij, nim. calculi, est morbus, vbi intelligimus & solutam vnitatem, & malam compositionem: & hæc quatenus pertinet ad numerum, & ad malam conformationem: quæ, cum in se claudat superficiem, figuram, meatus, cavitates: præsertim intelligimus vitium in meatibus. Quare hoc vitium calculosum potest esse morbus in soluta vnitatem,

Subiectum.

item in numero, item in via, in angustia. Subiectum, sunt renes: non calculus: quia morbi subiectum semper est pars viva.

Causa efficiens.

Causa effectrix est calculus. Porro calculum tres illos morbos excitare posse, demonstrandum est. Morbum igitur in via lapis potest producere: si enim sanguis, v.g. ob sui copiam & crassiciem potest in causa esse obstructionis: certe & calculus renum meatus angustare & cōstipare potest. Præterea, quatenus calculus adhæret renibus, est morbus in numero, toto genere præter naturam: sicut in manu sex digitos habente, est etiam morbus in numero, non tamen toto genere præter naturam (hic manus est subiectum morbi: morbus est accidens, nim. numerus: causa efficiens, est substantia, nim. sextus digitus: nec enim quisquam sanus digitum morbum esse dixerit, licet Ferrius & Argenterius Gale. hoc ascribunt, quod digitus sit morbus, cum tamen hoc ne somnianserit quidem Galenus.) Quare dum calculus est in renibus, est morbus in numero, quia renes morbo afficiuntur: sicut enim calculus obstruens est in causa, vt renes afficiantur morbo in vnitatem etiam calculus renes numero præter naturam afficiens, est in causa, vt renes afficiantur morbo in numero. Sed dicet aliquis: cur sanguis, qui in

Dubium soluitur.

phle

phlegmone causa est auctæ magnitudinis, non etiam est in causa numeri aucti: sicut enim calculus parti adhæret, ut aliquid præter naturam, ac superfluum: ita etiam sanguis parti adhæret inflammatæ: id quod etiam de pituita, & alio humore dici posset? Attamen Gale. in his non statuit morbum in numero: sed tantum ratione sexti digiti, ratione calculi & lumbricorum, ratione membranæ in suffusione? Respōdendum: partem viuente affici morbo in numero, quando parti viuenti adhæret materia, quæ non amplius est humor: veluti est sextus digitus, membrana, calculus, vermes, imo etiam pus, nam existente pure in aliqua parte, pars ista detinetur morbo in numero. Hoc autē non est dicendum de sanguine, & aliis humoribus: qui in causâ quidem esse possunt auctæ magnitudinis, non autem aucti numeri: cum partis rationem subire nequeant. Constitutum igitur sit, calculum in rene existentē, esse causam efficientē morbi: qui morbus varius est, modo angustia, modo numerus auctus, modo soluta vnitas: prout calculus vario modo renes afficit. Morbus in via, & numero, est ratione contemplabilis: at morbus in soluta vnitate, est ex usu: in illis saltem ad calculum respiciendum est: in hoc, non tantum ad calculum, sed etiam ad solutam vnitatem. Quare cum sibi præcipuum locum vendicat calculus, ut causa efficiens: diligēter eius natura est attendenda. ē Gale. c. 17. l. 3. fac. alim. ca. 2. li. de cib. bon. & mod. succi. c. 4. l. 14. meth. com. 15. sect. 3. lib. 6. epid. Cum autem calculus sit substantia, dicendū de ipsius materia, & causa generante: Materia lapidis est pituita: quæ sola ob suam humiditatem & viscositatem in causâ esse potest, ut partes vniantur, & vnitæ in calculum degenerent. Hæc pituita vel sola est, vel cum alia materia commista: quæ quandoque est pus viscidum: licet posset etiam alia materia esse: vnde Galenus locis citatis proponit sanguinem melancholicum, flauum, rufum. Causa hanc materiam generans, (nondum dico de causa generante lapidem) multiplex esse potest, & in pluribus corporis partibus residere: in hepate, renibus, ventriculo: modo in pluribus, modo in paucioribus partibus. Declaro. Residet in renibus: cum verbi gratia renum inflammatio degenerat in pus, in abscessum. Quandoq; causa generans residet in iecore: ut dum calculus sit materia sanguinea, biliosa, melancholica: & potissimum hoc fit in iecore, vel læsa facultate, vel ob errorē externum: additur facultas, ob intem-

De calculi natura.

Materia.

Causa generans materiam.

periem calidam:errores autē externi desumendi sunt ē mī-
la victus ratione. In ventriculo residet causa generans pitui-
tam: quæ & ipsa generatur laxa facultate ob intemperiem
frigidam:vel ob errorem externum. Quæ omnes materiæ
genitæ fluunt in renes:quandoque Attractæ, ob renum cali-
ditatem: quandoque Transmissæ ob renum frigiditatem.

*Causa gene-
rans calculi.*

Causa generans calculum nihil aliud est, quam calor capite
decimoseptimo, libro tertio de facultat. alimentorum, vbi
proponitur calor intensus & ardens: sed potest etiam esse ca-
lor non admodum ardens, vt proponitur comment. aph. vlt.
sect. 3. Calor vehemens & ardens præcipuus residet in renibus:
non principalis autem, & quandoque famulans in iecore. Ca-
lor iecoris intensus, subministrat & disponit materiam, vt
postea in renibus facile mutetur in lapidem: vt calor renum
sit principalis, qui vltimam formam dat materiæ. Quare cal-
culus generatur à caliditate renum, quamuis hæc caliditas
non sit adeo vehemens, producit tamen calculum: sed hoc
sit longo tempore: ad differentiam calculi, qui à calore inten-
so cito generatur, eo quod summa vi partes renes absu-
muntur, vt remaneant crassæ, ac cito materia lapidescat. Fer-
nelius addit calculosam constitutionem: insinuans, præter
calorem aliam esse causam: quod tamen est falsum. Sane re-
periuntur quædam indiuidua, admodum obnoxia renali cal-
culo: licet nec ventriculum habeant admodum frigidum, nec
renes admodum calidos: vt fatendum sit, renes horum indi-
uiduorum ita esse constitutos, secundum proportionem, quæ
est domicilium facultatis alteratricis (hæc enim in loco est)
vt facultas alteratrix, mediante calore renum, quo ceu in-
strumento vtitur, calculos gignat, & ad hos gignendum sit
efficacissima. Deceptus ergo est Fernelius, credens propor-
tionem esse causam efficientem: hæc enim proportione, tan-
tum est domicilium facultatis alteratricis, quæ calore, ceu
organo: lapides gignit. Quare inter causas instrumentales,
præter propositas, nullas alias referre licet.

Differentiæ.

Quoad differentias à forma: morbus calculosus vel est in
Angustia, vel in Numero, vel in Soluta vniuersitate. Quoad sub-
iectum: vitium est in Vtroque rene, vel Altero tantum. Ra-
tione efficientis: differentia sumuntur à calculo, & à causis
calculi. A calculo: vt est Paruus, vel Magnus: Vnus est Multi-
plex: Læuis seu æqualis, vel Asper seu æqualis. Quoad causā,
hæc est Materia vel Generās. Materia vel est Sola Pituita, vel
pituita

pituita permista cum alia materia, quæ est vel pus, vel alius humor. Causa generans hanc materiam, vel est Venter frigidus, vel Hepar calidius, vel etiam renes inflammatione affecti, vt materiam purulentam gignant. Causa generans calculum, est causa vel Subministrans, vt immodica iecoris caliditas: vel Principalis, vt renum caliditas, siue intensa, siue remissa, siue organum sit debile, siue robustum.

In genere hoc malum cognoscitur, è cont. §. sect. i. libr. 6. *Signa in genere.* epid. è dolore grauatio in regione renum. Quod si dolor interdum non tantum grauatiuus sit, sed etiam intensus, ac pūgens: non pertinet ad generalia calculi signa, sed est signū certæ alicuius differentię. Augetur dolor (secundum Galenum) post cibum, vbi descendit intra ventriculum, quia comprimuntur renes. Imminuitur dolor, post deiectionem alui, quia fit illa compressio. Præterea stupor sentitur circa femora & crura. Lotium primo redditur crassum, deinde, cum retinetur materia, redditur aquosum ac tenue: quandoque tinguntur arenulæ, quandoque etiam calculi. Ideoque hoc lotio apparente, facile distinguitur dolor renum, à dolore colico. c. i. l. 6. loc. aff. Quoad differentias formales: si adest angustia: non ita copiosum redditur lotium: si morbus in numero, & in soluta vnitate: acerbissimus est dolor, & cum lotio non nihil sanguinis egreditur. An alter ren, an vterque affectus sit: cognoscitur è sede doloris. Quoad differentias ab efficiente magnus calculus cognoscitur è vehementia doloris, qui indies intenditur, cum augeatur calculus: dolor acerbissimus est, vixque potest fieri, quin solvatur vnitas. Non egredietur sanguis, si lapis non fuerit asper. Materia è qua, facile cognoscitur: v. g. pituita permista cum pure, cognoscitur: quia est prægressa inflammatio, quæ perducta est ad supurationem. Si permistus fuerit sanguis, cognoscitur è domino sanguinis, vel huius, vel illius: & præsertim è colore arenularum, si eliciantur: qui modo cinereus est, modo rubicundus, modo flauus. A qua causa gignatur hæc materia: cognoscitur è signis indicantibus, vel caliditate hepatis, vel frigiditate ventriculi. Facile etiam cognoscitur causa, à qua generatur calculus, an sit calor renum intensus, vel remissus: aderunt signa caliditatis in regione renum. Vtrum autem calor renum sit organum facultatis, quæ fouetur à proportionem nativæ, à domicilio nativo: cognoscitur inde, quod patientes ob leuissimam causam generant calculos.

*Indicatio-
nes, in cal-
culo iñ ge-
nito.*

Quoad præsidia: Hippoc. inquit: quiescere non conducit, sed exerceri, non repleri: iuvenes veratro purgare, poplitem incidere, per vrinas vacuare, attenuare, ac mollire. Non facit mentionem refrigerationis renum, nec remotionis causarū, producentium calculos. Quare sciendum, Hippocra. his verbis respexisse ad indicationes & remedia, causa calculi geniti: non autem causa calculi, vt potest generari. Nos, respicere oportet ad calculum, vtroque modo acceptum. Quoad calculum genitum: considerauit Hippoc. eum esse toto genere præter naturam, ideoque euacuandum. Et quia in renibus reperitur, non potest eradicari, nisi per ea, quæ renes euacuant: ideo dicit, vrinaria euacuare. Porro in corpore patiente nonnulla reperiuntur, quæ hanc calculi eradicationem impediunt: quorum alia ad totum corpus, alia ad renes pertinent. Hippoc. ad hæc ambo respexit. Impedimentum totius est repletio: cui nisi occurramus, calculum euacuare nō possumus. Repletio fit, vel à sanguine: vel ab alio succo. Quoad sanguinem: Hipp. poplitem incidit. Quoad succum recedentem à natura sanguinis: dicit, iuvenes purgare veratro: & quia hæc materia euacuanda cruda est, dicit esse concoquendum: additque non oportere repleri, nec quiescere, sed exerceri: vt scilicet hoc modo crudi humores (quemadmodum Galenus in comm. monet) ad maturationem & coctionem perducantur. Impedimentum ad renes pertinens, duplex est, materię crassities: & viarum angustia: ideo Hippocrates attenuat, & emollit. Quod si calculus in renibus genitus non sit, sed immineat, ne gignatur: indicationes sumendæ sunt, à materia, à causa generante tum materiam, tum calculum. Ratione materię e qua si verbi gratia fuerit pituita, hæc euacuanda, ac diuertenda, ne fluat in renes: idemque de omni alia materia statuendum. Causa generans materiam, si verbi gratia, fuerit iecur calidius, refrigerandum, si ventriculus frigidior, generans pituitam, calefaciendum: & sic de reliquis. Causa generans calculum, est calor renum: qui vel est organū simpliciter facultatis, tunc oritur indicatio refrigerandi: vel est organum facultatis summæ actiuitatis, hæc autem summæ est actiuitatis ratione sui domicilij, suæ proportionis, quæ non indicat, sed requirit tantum præsidium renale.

*Prognosti-
ca.*

In genere malum hoc est satis insensum, quia dolorificū: postea malū est vehemens saltem ratione resistentiæ. Quod si calculus renalis diu perduret: vitium sit incurabile, & comitatur

mitatur

mitatur vsque ad mortem. Periculum tamen variat, pro vi differentiarum, & pro vi ac dispositione corporis affecti: verbi gratia, si corpus affectum vires habeat imbecilles: vitium magis est periculosum, sicut in corporibus gracilibus. Quoad differentias formales: si morbus fuerit in angustia, vel numero: prognosticum sumitur ab efficiente causa, non à morbo, qui non est ex vsu. Quod si fuerit soluta vnitatis: morbus curatu est difficillimus. Ratione subiecti: multo perius est, si ambo renes afficiantur. Ratione causæ efficientis, malum peius, si calculus maior, asperior, oblongus peior, quam rotundus: sic enim & maiorem infert dolorem, & difficilius euacuatur. Ratione materiæ: quæ: si hæc fuerit viscidior, copiosior, difficilior est remotio. Quoad causam, quæ materiam generat, siue sit calor iecoris, siue frigus ventriculi: recurrendum ad propria capita: eo supposito, si intemperies non in habitudine sit, sed in habitu, fieri vix posse, vt homines à calculo præseruentur. Quoad causam, quæ calculum generat: si simpliciter fuerit caliditas partis: aliquo modo salutem polliceri potestis: at si calor renum sit in habitu (quod maius est) si sit organum facultatis summæ actiuitatis: vix fieri potest, vt è toto præseruentur, veluti contingit illis agris, qui à calculosis orti sunt parentibus: id tamen his præstari potest, ne tam frequenter, neque ita vehementer à calculo lædantur.

Si sanguis sit copiosus: est emittendus. com. 5. sect. 1. libr. 6. *Curatio.*
 epid. Sanguis hic aliquando habet rationem causæ principalis: aliquando, sine qua non. Causæ principalis rationem habet, quando verbi gratia calculus vel producit, vel produci potest, ob inflammationem renum: aut si fiat, vel fieri queat è pituita, vna cum sanguine. Quod si sanguis his modis non concurrat, interim tamen copiosus sit, habet rationem causæ sine qua non: quia nec calculus, nec pituitosa materia euacuari potest, nisi sanguis copiosior existens fuerit eductus. Quia ergo sanguis in hoc malo est vehemens: remedio etiam vehementi opus est, nimirum venæsectione. Verum non oportet sanguinem vacuare in ea copia, in qua peccat, v.g. si peccet ratione copię ad tb j. non debet tb j. educi, licet sanguis ita indicet: virtus enim hanc quantitatem prohibet: quia dum adest calculus, dolor affligit: & calculus suapte natura est malum diuturnum. Cur vero Galenus tantum emittit quantum peccat? Quia nimirum respi-

cit ad calculum, nondum actu genitum: tunc enim potest sanguis vacuari ea copia, quæ indicatur: quia virtus non prohibet. De usu. Hippocrates aperit venam poplitis: Galenus vel hanc ipsam, vel eam quæ ad malleolos decurrit. cap. 11. lib. 13. meth. Sed tamen in praxi etiam cubiti venas aperiri oportet. Vbi agendum enim sumitur à sanguinis subsistentia: & quia sanguis quandoque subsistit in partibus iecoris: necesse est aperire venas cubiti: si autem subsistat circa renes, & internas partes: vena poplitis, vel malleolorum tundenda. Cucurbitula etiam non scarificata locum habent: quæ (quatenus tantum ad calculum respicimus) primum applicandæ renibus, sensim postea deorsum progrediendo ad inguina, ut sic calculus in vesicam descendat: & hoc indicat subsistentia calculi, præsertim, quatenus obtinet prædictam positionem.

Cucurbitula.

Pharmacia.

Trallianus probat myrrum, gratia euacuationis calculi: dubitatur tamen, qua ratione tuto uti queamus medicamento hoc astringente, ad expellendum calculum? (*Myrrum non legitur in quibusdam Tralliani codicibus. Hic facultatibus constat contrariis: non solum enim astringit, sed etiam acrimoniam quandam habet admixtam. cap. 18. lib. 2. de alim. facult. propter partes quasdam tennes & calidas ut Galenus in fine lib. 7. de simpl. medicam. fac. asserit. Et hinc Dioscorides urinam circa myrrum prodidit memoria. cap. 118. lib. 1. de mat. med. ut etiam Auenennas cap. 446. tractat. 2. lib. 2. & Aetius cap. 152. lib. 3. Interim notandum, astringentia contra calculum & urinae difficultates adhiberi tum coniuncta diureticis, ut hæc in renibus eo diutius detineantur, tum per se aliquando sola, ut renibus robur addatur; huius generis sunt spongiosa seu pilule, quæ virgæ rosæ caninae annascuntur, glandes, lentiscus, rubus, &c. quæ lotio promouendo apta esse monet Dioscorides.) sed ut in methodice progrediamur: materię medicinales respicere debent, materiam è qua fit calculus: calculum ipsum, intemperaturas: proportionem. De remediis, quibus utendum gratia materię è qua, sæpe dictum est, siue vacuet pituitam, siue alios humores: id tantum notetur: si calculus sit genitus, vehementiora esse adhibenda: si nondum genitus, mediocria. Quare suppositis lenientibus, præparatibus & purgantibus: loquemur de iis, quibus utimur gratia calculi iam geniti.*

1. Ad materiam calculi.

2. Remedia ad calculum iam genitum.

Post generalia igitur euacuantia probantur medicamenta lapidem comminuentia: euacuantia lapidem comminutum item deferentia has materias remedium: remoranti, quæ sunt in causa, ut medicamenta frangentia diu in renibus inorentur:

morentur, lapis enim cōtractio est motus, seu actio, quæ non fit in instanti, probantur etiam oblinentia, vt lapis iam contractus leuiori negotio per vias transire queat: tandem prosunt dissoluentia flatus. quia dum calculus est genitus, saepe oboriuntur flatus, qui nisi dissoluantur, dolor geminatur à lapide, & à flatu. Cōminuūt, secundū Græcos, manifesta qualitate, ciceres extractum è ciceribus viridibus: vel, si desint virides, uti possumus exsiccatis, coctis, & postea contusis, ut extrahatur succus, & est efficax ad frangendum calculum tenuē (fateor enim me nescire, quæ calculum in vesica frangere queant.) Probantur polytrichū, capill. Vener. acetum scillit. quod est efficacissimum, asparagi radices & semina, in id autem sylvestres asparagi sunt efficacia iores: betonica, semen althææ, cappares: & admirabile est medicamentū, quod conficitur è granis ficuum: licet etiā ut sem. graminis, sed sem. ficuum est efficacius. Probatur lapis iudaicus, cortex lauri, cardamō. pulegiū, fructus palinvi, saxifragia valde laudatur, sed vereor ut legitima habeatur. Prodest vitrum combustum, oleum amygd. amar. & cōsulo, ut urgente necessitate exhibeatur hoc oleum, quia non tantum lapidem frangit, sed etiam oblini, laxat, & aperit vias. Probatur oleum abietinum. Terebinthina plurimum tribuo, maxime Cypria. Extremitates poly montani, quibusdā pro secreto sunt, fueruntque ex Istria aduēta, quibus ego renales calculos euacuavi, interdum integros, interdum contractos. Radicibus ononidis feliciter usus sum: quæ nonnullis secreta sunt. Cōminuentia lapides tota forma, describuntur ab Aetio, & reliquis. Probatur ergo lapis qui reperitur in spongia, lapis etiam vesica in pulvere exhibitus, cinis scorpionum, cinis scarabaeorum, cinis testium ouorum, & præsertim eorum, è quibus sunt exclusi pulli, cinis lumbricorū terrestrium, & leporis decollati, cicada arida trita, sang. hirci, si optime sit cōfectus, sang. galli decrepiti, eodem modo cōfectus ut hircinus. Aliqui pro secreto habens, ossa capitis laci piscis puluerisata, dentes apri, pulueri è stercore murini. Inter compolita, est de, de cicerib. de cicadib. de lepore combusto: licetque etiā parare magis anidotos. Quæ autem possunt euacuare lapidē iam contractum, sunt diuretica, vt apium, pestosel. fenic. Sequuntur ea, quæ efficiunt, vt medicamēta diutius persistāt in renibus, vt polypod. nuc. pineæ, spongiola, & capitula sylvest. ros. myrtus. vnde Alex. composuit medicamentum è myrto. Oblinentia sunt passula, amygd. dulces, althæa. Inter dissoluētia flatus, probantur diuretica proposita: quæ cum calida sint, tenuisque substantiæ, possunt flatus discutere: vnde reliquis medicamentis permiscere possunt, semina apij, anethi, dauci, feniculi.

Frāgentia

Terebinthi
na insignes
habet vi-
res leniēdi
& deter-
gendi par-
tes urina-
riæ: omniū
pene & ve-
terum &
recentiorū
suffragio:
maxime
G. Fallopij,
Io. Crato-
ni, & Fr.
Valleriola.
Diuretica.
Destinētia,
Oblinētia.
Carminā-
tia.

Vtendi ratio.

Alexander c.4.l.9. composuit medicamentum, quod vocavit manum Dei, ob præstantiam in lapide frangendo: fit de myrrha, myrio, &c. Efficax hoc est Recipe pulv. betonica, sem. ficuum, cinerum scarab. cicadarum, leporis combusti ana ʒj. hac sunt basis: adde, pulveris sanguinis hirci, qui etiam concurrens ad basin: deinde pulveris ros. rubr. ana ʒj. (rosa faciunt, ut basis diutius in renibus moretur.) sem. althæa ʒjss. obliniunt: conseru. de beton. ʒj. cum aceto scissico fiat electarium. Dosis à ʒij. ad ʒjss. Quoties post huiusmodi apozema exhibetur, est efficacissimum. Si è toto renalem calculum velis comminuere, & expellere: oportet medicamentum exhibere in potione, & in magna quantitate, cuius beneficio confectum medicamentum ad renes perducitur, lapidemque euacuat. Hoc autem medicamentum est conficiendum è decocto cicerum: Recipe decocti cinerum rub. lbjss. in quo macera per horas 4. vel 5. ononidis ʒvj. & polij montani. P. ʒss. & post infusionem, oportet fieri decoctionem ad tertiam partem, ut lbj. maneat, exhibeatur illico post exhibitum medicamentum, à nobis modo propositum, detur actum calidum. Tempus: quando adest præsentia indicantis, & nihil prohibet: quod prohibet, est materia replens totum: unde necesse est primum vacuare validis purgantibus, de quibus diximus. Item, quod prohibet, est viarum angustia: quare ante hæc medicamenta extrinsecus utendum est us vntionibus, quæ vias laxant & molliunt: è maluis, alth. ol. amygd. scorpion. butyro: optimum etiam est sedere in balneo aqua dulci, alterato cum malua, alibæa. Quoniam item non ita cito calculus frangi potest: ideo non sufficit hoc medicamentum vna vice, & die exhibere, sed pluries: spatio enim quinque, sex, aut septem dierum lapis frangitur & comminutæ partes singulis diebus excernuntur. Quod si medicamentum in promptu non sit: è tempore hoc patetur: R. sang. hirci ʒj. pulv. ceter. ʒss. cum syrup. cap. Vener. vel ros. (propter moram & permanentiam) fiant boli, vel pilula.

3. Alterantia.

Quoad causam generantem materiam, è qua fit lapis: est ventriculi frigiditas, iecoris caliditas: de quibus loco proprio. Quoad causam generantem calculum: ratione intemperiei calidæ renum, vel iecoris, probatur refrigerans, ut serum lactis caprini, aqua refrigerantes.

4. Renum proportio.
nem speciantia.

Renum proportionem respiciunt, magna antidoti: quidam pro secreto habent renes suillos exsiccatos, & in pulverem redactos: licet ergo exhiberi ʒj. huius pulveris, cum ʒss. theriaca, & fiat bolus cum syrupo capil. Veneri.

Abstinen

Abstinendum in victu ab his quæ conficiuntur è *passa & lacte*. Quoad inanitionem: saluberrimum est, vt corpus mundum seruetur: & potissimum vt fiat euacuatio per vomitum vt assuescant ægri ad vomitum: sic enim non aggregatur materia, è qua lapides generantur.

CAPVT XXIX.

De Vlcere Renum.



Vlcus renale nihil aliud est, quam vnitas soluta cum deperdita substantia renum, producta à materia corrodente. Forma est soluta vnitas, cum diminuta substantia: ad differentiam vulneris, in quo sæpe tantum est soluta vnitas, l. 4. meth. ab initio. Subiectum sunt renes. Efficiens est materia abradens: ad differentiam vulneris compositi, in quo & vnitas soluta est, & ablata portio substantiæ: sed vulneris causa incidens est, vlcereis abradens: comment. aphor. 75. sect. 4. cap. 2. lib. 6. loc. aff. E quibus locis etiam colligitur, quod hæc materia possit esse sanguis, pituita, bilis vtraque, & materia purulenta. Sanguis esse non potest, nisi habeat vim corrodendi, ideoque non est sanguis quocumque modo acceptus, sed vt reperitur extra venas & arterias: dum enim sanguis vasa egreditur, & retinetur in renibus, ita acris euadit, vt abradat. Exit autem extra vasa sanguis, vel per diapedesin, quod contingit, dum sanguis iusto est tenuior: vel per anastomosin, siue fiat à copia sanguinis, siue ab impetente, id est, à sanguine, qui magno impetu mouetur, siue etiam ab acriori sanguine: vel per diæresin, quæ fit potissimum à calculo: potest quidem fieri ob alias causas quæ abradunt, sed etiam fieri potest à calculo renali, non sane: (vt quidam putant) quod calculus immediata sit vlcereis causa, nec enim mordax est calculus: sed quia contundit, & ob inæqualitatem vnitatem soluit: dum autem soluit vnitatem vasorum, egreditur sanguis, qui postea putrescens, & euadens mordax, vlcereis causa est immediata. Idem dicendum de pituita falsa, de bile flaua, de atra, sed adusta, quæ causa est vlcereis cancriosi & atrabilarij, quod raro contingit. Fit etiam vlcus à materia purulenta, quæ interdum generatur in renibus: interdum extra eos, supra renes, non infra. Dico autem supra: nam cum inflammatio alicuius partis degenerat in ab-

Definitio.

Causa efficiens.

scissum:

scellum:quoties abscessus disumpitur,ad inducendum vlcus necessarium est,vt abscessus sit in superiori parte,vt per hunc situm materia purulenta in renes descendat:& nisi expurgetur materia purulenta: necessario sit vlcus renum.Et quod dictum est de inflammatione partium supernarum, idem dicendum de inflammatione renum.

*Differen-
tia.*

Vlcus porro renum à forma dicitur Magnū, vel Paruum. A subiecto, afficitur ren vel Vterque,vel Alteruter:item,vel secundum Superficiem,vel secundum Profundum.Causa efficiens est Sanguis,Pituita, Bilis flaua, Bilis atra, vel Purulenta materia.

Signa.

Vlcus renum, vt in genere sit cognoscendum, docetur cap.3.l.6.loc.aff.& comment. 75.76.sect.4. aph. Primum indicatur è pure, quod per plures dies mingitur: nam si per pauciores dies excernatur, fieri potest, vt procedat ab abscessu, citra renum exulcerationē. Indicatur è dolore citra lumbos. Item, si cum pure excernantur arenulae, & portio renū, sed hoc rarissimum est:& si cum pure egrediantur carunculae veluti capilli: præterea indicatur è pure, non admodum foetente, quia in renibus est calor, qui magis aptus est ad incrassandum succos, quam calore vesicæ: item, pus est satis permixtum cum lotio, ob longitudinem viæ: secus autem apparet in vlcere vesicæ: præterea facilis sit mictio, quæ non ita facilis est in vlcere vesicæ. Nō indicatur à febre: quia febris nō necessario comitatur vlcus renum: cum pus non detineatur sed euacuetur. Quoad differentias formales: an vlcus magnū sit, vel paruum, cognoscitur è copia puris è vehementia & debilitate symptomatū. Num vterque ren affectus sit, vel vnus tantū: facile patiens ostendet. Vtrum autem vlcus sit, vel secūdm superficiem, vel secūdm profundū, ita cognoscitur: quia si secūdm partes profundas: copiosum erit pus, & sanguis cum pure egredietur. Quoad causas efficientes, an sit sanguis, an pituita, an bilis flaua, vel atra: cognoscitur è propriis signis. Si autem fuerit pus: cognoscitur è signis indicantibus progressam inflammationem, progressum abscessum.

*Indicatio-
nes.*

In vlcere oritur duplex indicatio: vniendi nimirum & regenerandi carnes. Hæc autem præstari nequeunt, nisi remoueantur impedimēta: quæ sunt, mala renum constitutio, & externus error. Impedimenta, quæ pertinent ad constitutionem renum, sunt vel intēperies, & oritur indicatio qui con-

trarium

præsum alterandi: vel tumor, & oritur indicatio materiæ tumoris euacuandi. Quoad errorem externum, vel est Cōmunis, vel Proprius. Communis est, qui communiter impedire potest & vnionem, & regenerationem carnis: est nihil aliud quā sanguis peccans: si ergo hic peccet copia, est imminuendus: si motu, reuellendus; si qualitate, alterandus. Error proprius est, qui respicit priuatam regenerationē carnis: estque excrementum, quod in generatione carnis prouenit: & hoc cum duplex sit, tenue indicat moderate siccans: crassum, detergens. Error proprius in agglutinatione, & vnione, nō est sanguis, non excrementum, sed materia alimentalis, & humiditas rorida, quin imo etiam apposita, quæ sui præsentia impedit vnionem; atque ob id non modo indicat siccans remedium: sed magis siccans.

Vlcus renū in genere satis est periculosum: com. aph. 6. sect. 6. nam pars vlcere affecta quiescere deberet: renes vero assiduo operātur. Augetur periculum: præterquā enim quod renes assiduo trahunt materiā serosam, accedit etiam quod illa materia sit acris, vt potius faciat ad vlceris incrementum quam decrementum. Admonet autem Galen. magis periculosum esse vlcus vesicæ: quia ægrius agglutinari potest, propter substantiam membraneam. Quoad differentias formales: quo maius vlcus, eo periculosius. Item magis est periculosum si vterque ren afficiatur: & quidem si secundum partes magis profundas. Quoad causam efficientē pro varia vi causarum, varie prædicendū. Si est ab atra bile, actum est, quia vlcus est cancrosum. Secus statuendum, si minus prauæ fuerint materiæ. Respicendū etiam ad vires: si infirmæ sint, vt in gracilibus, in senili ætate: spes salutis est exigua.

Prognostica.

Cheirurgica prætermittam: quia de cōmuni euacuatione sepe dixi. Lenientia, præparantia, & purgantia etiam supponenda sunt. Peculiariora autem sunt Euacuantia, & Agglutinantia. In vlcere igitur renum, post corporis expurgationē, illico confugiendum ad medicamenta, quæ possunt renes mundare, ab excremento tum tenui, tum crasso. Maxime probatur aqua saccharata: & si contingat, vt corpus perferat calida medicamenta, loco aqua saccharata, vi possumus mulsam verebinthina. Si vlcus fiat à pituita salsa ratione visciditatis vti possumus valido medicamento detergente, quia vlcus cito sanandum, nam secus incurabile euadit. Si saccharum non sufficit: exhibeatur mulsam: quod si caliditas, vel renū, vel corporis

Curatio.

Detergentia renos.

prohi

prohibeat : non propterea abstinendum est à mulsa, sed tunc potestis uti mulsa ratione magis deluta: si enim caliditas non prohibeat, imponatis melin maiori quantitate: si prohibeat, in minori: *¶* addatis semina melonum : hoc modo : Recipe mulsa aquosa lb j. emuls. sem. melon. ℥ iij. Si caliditas non prohibeat, potestis uti mulsa meraciori: additis ceterach, & ascendatis ad feniculum, & cito expurgetis renes. Ideo etiam probamus serum lactis: detur ad lb iij. & ut sit efficacia, addantur emuls. sem. melon. ℥ ij. si nonnihil mellis addideritis, erit efficacia. Sic etiam terebinthina liquore convenienti nonies vel decies lauari debet, ut acrimoniam deponat.

*Consolidā-
tia vlcus.*


Quando vlcus est mundum redditum, festinare oportet ad agglutinantia: quæ conficiuntur ex amylo, tragacantha, bolo Arm. *¶* in casu maxime probatur terra sigillata : præterea medicamenta sunt conficienda ex acacia, è succo barba hircina, sanguine draconis. Sed notandum, quia error in hac cura est causa mortis: ut illico post mundificationem, hoc, vel simile, conficiatur: R. tragacantha, boli Arm. terra sigill. farina amyli, ana ℥ j. cum syrupo cap. Vers. seu cum emuls. sem. melon. fiat pasta. Dosis à ℥ j. ad ℥ ij. & post deuoratum hoc medicamentum illico exhibeantur, aqua bordei ℥ vj. an. ℥ viij. cum emuls. sem. melon. ℥ j. ut hoc sc. medicamentum sit vehiculum agglutinantis. Et ubi exhibueritis quotidie per vj. aut viij. dies continuos: conficiatis aliud medicamentum, quod sit magis siccans, & magis vniens. Recipe tragacanth. terra sig. sang. dracon. ana ℥ j. acacia ℥ j. cum emuls. sem. melon. fiat pasta: dosis ℥ j. cum aliquo diuretico. Ut autem medicamenta agglutinantia efficacius agant: prodest ut commorentur in renibus: ad quod adsequendum præstat, si renibus applicentur, quæ habent vim nonnihil adstringendi & siccandi, veluti est emplastrum confectum è rosis, è myrto, cydoniis, è lentibus, sanguine dracon. bolo. Arm. mastich. &c.

Externa.

Dietā.

Cibi erunt detergentes, & mundificantes: vnde parentur ex hordeo sem. melon. è ciceribus &c. Tempore a. agglutinationis condiendi cibi consolidā, oryza & vii. possumus pedibus vitulinis, & aliis id genus, in quibus est vis agglutinandi, & adstringendi.

De affectibus Vesicae urinariae: ac primum de Mictione Imminuta, & Ablata.

 **P**VS vesicae est mictio: quae functio, etsi sit voluntaria, non tamē primum est voluntaria, nam membrum ut agens (non ut afficitur) non modo est membrum voluntarium, sed etiam naturale. Respiratio est functio è toto voluntaria: etsi enim concurrat pulmo, qui est naturae instrumentum: pulmo tamen non concurrat ut agens, sed ut passum. Vesica autem ad mictionem concurrat ut agens, quae non afficitur, sed operatur. Ideo de hac frustratione propria agemus. Mictio fit hoc modo: Lotium primum sensim propellitur à renibus in vasa urinaria, à quibus vesica trahit lotium fibris rectis. At quando Galenus ait, vesicam non trahere lotium, ita est intelligendus: quod vesica non attrahat à renibus, sed renes propellant in vesicam per vasa urinaria, & ex his vasibus vesica trahat per fibras. Detinetur autem lotium in vesica, ne continuo homines mingere cogantur: detinetur autem tempore decenti, per fibras obliquas, & per muscolum qui cervicem astringit: postea naturaliter expellitur, ab expultrice vesicae, per fibras transversas: cui expulsionis opē fert musculus cervicis, dum non constringitur, sed potius laxatur: opem etiam ferunt abdominis musculi simul cum septo transverso. Porro *Mictio nā sit actio voluntaria.* prae-
ter naturam fit mictio, quando recessus est à mictione naturali: qui esse solet, cum mictio aufertur, Imminuitur, *Mictio naturalis valet.* prae-
ter naturam. Cum aufertur, fit lotij suppressio, *Differtia mictionis prae-
ter naturam.* si imminuitur, & cum difficultate egreditur in parva copia, *Differtia mictionis prae-
ter naturam.* si deprauatur, fit lotij incontinentia, ardor lotij, *Differtia mictionis prae-
ter naturam.* spargis, stillicidium cum ardore, dolore: veraeque autem hae noxae referuntur ad mictionem vel diminutam, vel depravatam.

De Ischuria.

Ischuria est functio ablata vesicae, dependens à frustratione expultricis lotij. In praesentia causas mictionis imminutae, praetermittam: sunt enim eadem cum causis ablatae: sed differunt secundum magis & minus. Causae ablatae mictionis, proponuntur à Galeno cap. 1. li. 1. de loc. aff. c. 2. l. 3. de caus. sympt. cap. 4. lib. 6. loc. aff. sermo autem est, non tantum de

*Facultas
vesicae la-
befacta.*

*Facultas
vesicae im-
pedita.*

actione laxa, de primo symptomate : sed etiam de exeunte, quia detinetur, quod egredi deberet. Aufertur autem mictio, vel Laxa facultate, expultrice, vel ob Errorem externum. Læditur facultas, vel quia Laxa factatur, vel quia Impeditur. Per laxam facultatem intelligimus morbum, vel in vesica, vel in musculis cervicis ipsius vesicæ. Quoad vesicam: læditur expultrix, vel quia labefactatur, vel quia impeditur. *Intelligimus hic expultricem, quæ lotium expellit : non quæ propellit excrementa tertie coctionis, tum tenuia, tum crassa, quæ sunt excrementa nutritionis vesicæ.* Labefactatur ob quamlibet intemperiem insignem, & potissimum humidiores, ac frigidiores; cuius causæ possunt esse opiata, & alia refrigerantia: nam dum fit mictio secundum naturam, oportet ut vesicæ corpus contrahatur per transversas fibras, alias non fit mictio. Detinetur igitur lotium, si contingat ut ea sit constitutio in vesica, ut non possit constringi : & hoc interdum fit ob errorem externum, tum, ratione lotij copiosi: uti illis accidit, qui cum magnatibus conuersantur : qui, licet minguendi appetitus adsit, detinent tamen lotium : & hoc in tanta copia augetur, ut vesica non possit amplius contrahi : Fit etiam hoc interdum ob frigidam intemperiem, coniunctam cum humiditate, siue siccitate: quæ in causa sunt, ut vesicæ corpus constringi nequeat. Expultrix vero non labefactatur, sed, impeditur ob morbum in mala compositione, nimirum in magnitudine aucta, & potissimum in angustia cervicis, seu colli vesicæ. Dum vesica inflammatur, lotium supprimitur impedita facultate : fit autem in vesica phlegmone, sicut in alijs partibus. Est enim vitium in angustia : quæ varia esse potest, sicut varia esse potest materia: quæ angustiam reddit meatum cervicis vesicæ : potest esse sanguis concretus, pus crassum, calculus renum, vel vesicæ, caro, tuberculum carnosum: quod vitium accidit post gonorrhœam, post vlcus, dum enim vlcus perducitur ad cicatricem, solet nutrimentum suscipere, & ita caro aucta, solet foramen obturare: potest causa esse tuberculum inflammatorium, quod facile perducitur ad suppurationem : potest esse tuberculum pituitosum, quod non ita facile cedit suppurantibus: fieri etiam potest, ut angustia procedat à materia pituitosa, crassa. His de causis angustus redditur meatus, potissimum ob constipationem & obstructionem: interdum etiam ob compressionem, cum ratione humoris existentis in ceruice, meatus

ille internus comprimitur. Insuper læditur etiam facultas *Facultas* musculi cervicis: & læditur hæc, quando musculus attingitur *musculi* morbo, ut dum afficitur convulsione, propter phlegmonem; *cervicis, la-* aut repletionem: item dum afficitur tumore, & proinde mor- *befacta.* bo aucto in magnitudine: interdum in immodica siccitate: *Error ex-* & ratione huius convulsione ita constringitur, ut non possit *ternus.* respirari. Præterea concurrat error externus: qui petendus est è causis modo Internis, modo Externis. Internæ causæ possunt esse inflammatio, tumor in partibus vicinis, ut in recto intestino: & huius ratione ita comprimitur cæuix vesicæ, ut non fiat mictio. propter angustiam. Idem fit, si renes laborent morbo in mala compositione, ut non possit transire lotium: & hæc dicitur lotij suppressio non exquisita, sed notitia: quia non est morbus in vesica, sed renibus. Sic etiã si vas urinale rumpatur, urina non descendit. Internis causis etiam materia morbi annumeratur, ut dum lotium copiosum est in causâ ablatae mictionis: quia ita extenditur vesica, ut non possit constringi. Colligitur autem lotium copiosum in vesica, quia patiens non sentit vesicam repleti, eo quod sensus tactus in vesica otatur. Otatur autem vis sensitiva, quia vel non suscipitur, vel non transmittitur. Non suscipitur, dum noxa est in nervis vesicæ, ut non possint viam animalem suscipere: Non transmittitur, cum est vitium in supernis partibus nervi: vel potius homo aliis negotiis est occupatus. Error è causa externa sumi potest: dum homo plus iusto bibit, & copiosum generat lotium: quod ubi detinetur, est in causa ut vesica non contrahatur.

Mictio aufertur vel imminuitur: quod patiens facile manifestabit. Num autem auferatur læsa facultate, vel ob errorem externum: distinguitur è signis indicantibus morbos vel vesicæ: vel musculi: nam hisce aliquo morbo correptis, erit mictio ablata læsa facultate. Morbus autem vesicæ & musculi, ita distinguetur. Si est in vesica: potest esse intemperies, & mala compositio. Si fuerit intemperies: est in causa, ut expultrix non possit contrahere corpus vesicæ: ideoque oportet ut manibus contrahatis vesicam, & cum ex hac compressa redditur lotium, dicendum, esse labefactatam expultricem: sin minus, impeditam, ut si fuerit angustia in ceruice, nimirum constipatio, vel compressio, è calculo, vel ex alia materia. Si morbus fuerit in musculis cervicis: licet comprimat vesica, non tamen fiet mictio.

Signa.

Præterea etiam cognoscitur læsa facultas, si non assint indicia erroris externi. Porro impeditur facultas vel Vesicæ, vel Musculi. Si musculi erunt indicia convulsivæ, si signa hæc non sunt, dicendum, impeditam esse facultatem vesicæ expultricem. Cum vero à morbis multis, possit impediri: è propriis indiciis morbi cognoscantur: verbi gratia, si fuerit calculus: sentient ægri molestiam, dolorem circa pubem, & potissimum dum equitant, dum per loca inæqualia ambulant: ratione etiam tristis sensus, qui excitatur à calculo, ægri, præsertim pueri, frequenter scalpunt pudenda, potissimum in perinæo, cap. 1. lib. 1. de loc. aff. præterea sunt signa calculi, & præcessit mictio arenularum. Si vero fuerit inflammatio: per sentiunt ardorem in toto vesicæ corpore, comitatur febris, ita ut hæc inflammatio sit magni momenti. Si materia fuerit carnosæ: prægressa sunt ulceris signa, præcessit gonorrhœa. Si fuerit sanguinis grumus: præcessit sanguinis mictio: huic si lotij suppressio succedat, probabile est angustiam prodire à sanguine grumoso: insuper sunt animi deliquia, & refrigerantur extrema, quæ fiunt dum sanguis grumosus detinetur. Si obstructio fiat ab alia materia, ut pituitosa, purulenta: sunt propria indicia: à materia purulenta, verbi gratia, si præcessit abscessus circa renes: unde, si pus cum lotio egrediatur, & postea mictio auferatur: signum est, mictionem auferri à crasso illo pure. Si præcessit externa causa, cognoscitur ex ægri & aliorum relatu: sin minus, causa est interna. Cæterum, in suppressione lotij error externus, dum sumitur à causa interna, nimirum à vitio renum in angustia, ita cognoscitur: loca affecta oportet tangere, num tumor sit circa regionem vesicæ, qui adest, dum vesica est repleta: præterea interrogandi ægri, an assit voluntas mingendi: si enim vitium sit in renibus, ut lotium non pertranseat, non adest voluntas mingendi, & ita citra rationem est, uti syringe.

*Indicatio-
nes.*

A functione læsa non sumuntur præsidia. Quare si lotium supprimatur labefactata facultate, oportet vesicam calefacere, si ob frigidam intemperiem labefactatur. Impeditur facultas, ob morbos vesicæ, & musculi. Morbi vesicæ non sunt ex usu: idque ad materias respiciendum est. Si materia est calculus, euacuandus: si caro, tollenda: si pituita, tollenda. Si musculus convulsione afficitur: si ex inanitione, humidandum: si è repletionem, euacuandum. Si fiat ab errore externo,

terno, siue sumatur à causa interna, siue externa: quia causa est ex usu, dummodo sit praesens & perseveret, est remouenda.

His scopis interdum facile, quandoque difficulter, aliquando etiam nullo modo possumus satisfacere. Si enim ablata sit mictio; labefactata facultate ob intemperiem frigidam: facile potest vesica comprimi, ut reddatur lotium: & hæc frigida intemperies potest tolli à calore, idque non difficulter omnino. Facile etiam malum tollitur, si ab errore externo oriatur: si enim verbi gratia collecta sit vrina ob negotium: manibus compressa vesica, liberat. At periculosum est malum, si fiat ratione inflammationis, ratione tumoris carnosus, ratione grumosi sanguinis: prout enim materia est magis rebellis, ita augetur difficultas: ut actum fere sit in conuulsione ex inanitione, quæ febribus ardentibus solet succedere, nam isti è lotij suppressione celerrime moriuntur.

In hoc malo confugiendum ad venæ sectionem, ad syringem. Venæ sectio locum habet: si sanguis peccet: ut in inflammatione ceruicis vesicæ: hic quidam decepti, dum putant esse affectum intestinorum, vtuntur clysmis carminatiuis. Circa Syringem notandum: Si suppressio lotij fiat renum vitio, ut vrina non descendat: frustra vtimur syringe. Si in vesica lotium detinetur: neque tum semper ea vtendum: & præsertim dum supprimitur ob inflammationem, quia soluitur vnitas: non enim potest syrinx immitti, nisi dilatetur ceruix, quia tumor intus impedit. Si non affuerit inflammatio: optimum erit ad syringem confugere: & possumus etiam eius loco immittere candelam paruam, oblitam ol. communis, vel amygdalino.

Si lædatur mictio ob calculum vesicæ: opus est perforare ceruicem, & lapidem extrahere: quod tuto & feliciter fit à medicis prudentibus: adest enim præsentia indicantis, & nil prohibet. Hæc perforatio interdum est necessaria, dum lotium supprimitur è concreto sanguine: non semper tamen, sed cum sanguis retinetur, & non cedit aliis remediis: prius tamen alia auxilia tentanda.

Medicamenta varia esse possunt, pro varietate causæ: nos circa præcipuas causas digrediemur. Si ergo auferatur mictio à calculo: iam diximus de remediis calculi. Si fuerit grumus sanguinis: necesse est ad valentiora confugere: vnde datur decoctum nymph. origani, & addatis ʒ ij. oxymellis scillitici. Si his non resoluatur sanguinis grumus: confugiendum ad

lixivium, in potu dando ʒ vij. vel viij. & syrupi cap. Ven. ʒ j. ve ʒ j. emuls. sem. melon. & ʒ j. calcis viue, vt vult Aetius. Vrgente necessitate non improbantur cantharides: non est abs re vti extrinsecus, & immittere per syringem. Vel medicamenta parentur ex aqua maris, & muria, de lixiuio acerrimo, & calce: satius est iis vti extrinsecus, deinde intrinsecus. Vti etiam possumus nonnullis, quæ occulta qualitate iuuant: vt est vesica danula puluerisata, à ʒ j. ad ij. cum aliquo diuretico. Commendatur etiam puluis cancrorum fluminalium, & marinorum in eadem quantitate.

CAPVT XXXI.

*Iterum de suppressione seu retentione lotij paulo
luculentius agitur.*

Causæ.

I. Angustia.

SUPPRESSIONE vrinæ fit, læsa facultate expultrice, aut ob Errorē externum. Si læsa facultate, vel Labefactatur, vel Impeditur. Si impeditur: est Cōpressio, Constipatio, Subsidentia, vel Obstructio. Cōpressio est, dum foramen colli vesicæ ita angustatur, vt expultrix lotium expellere nequeat. Hæc cōpressio fit à tumore siue calido, siue frigido, vicinarum partium, nimirum intestini recti, & in mulieribus vteri. Constipatio fit à multis causis: à tumore, non partium vicinarum, sed qui occupat collum vesicæ, siue sit tumor inflammatorius, siue frigidus: fit etiam constipatio à calculo, in renibus, aut vesica genito, qui protrusus ad orificium ceruicis vesicæ, meatum ita occludit, vt lotium supprimatur: præterea fit à tuberculo (tumor est morbus in magnitudine aucta, secundum propriam substantiam ceruicis vesicæ: tuberculum autem est parvus tumor, qui non obsidet substantiam ceruicis, sed meatum, cuius partibus adhæret) tuberculum autem triplex esse potest, nimirum carnosum, quod fit post vlcus, & præsertim post vlcus, quod sequitur gonorrhœam: item calculosum, quod fit lentum & crassa & lenta materia: item phlegmonosum, de quo com. aphor. 82. section. 4. cuius causa est materia sanguinea. Subsidentia fit, quando aliqua cum violentia subidet meatus ceruicis: id quod fit ab immodica siccitate, vt aliquando in febribus ardentibus: potest etiam fieri propter conuulsionē, vt Galenus statuit, commentar. 17. section. 3. libro primo, prophet.

prophet. Obstructio fit ab humore (angustia enim à pure ta-
cta, potius est constipatio, quam obstructio, si exacte loqui
volumus.) Humor hic est sanguis, vel Pituita. Sanguis: quo-

2. *Intem-
peries.*

ties grumescit: alias enim fluit, nō retinetur: neque obstruit.
Est præterea pituita lenta & crassa. Labefactatur facultas ob-

3. *Urina nē
mis repleta
vesicam.*

Intemperiem potissimum frigidam, cuius ratione vesica
constringi nequit. Frustratur etiam facultas expultrix ob
errorem externum: quia nihil aliud est, quam lotium co-
piosum: cum scilicet vesica adeo repletur lotio, ut expul-
trix nequeat contrahere vesicam, quamvis nullum sit vitium
in musculis, vel ceruice. Et ideo lotium hoc copiosum, ut
causa immediata frustrationis facultatis, cum nō sit morbus,
est error externus. Repletur autem vesica lotio copioso, no-
bis vel Inuitis, vel Volentibus. Inuitis quidem nobis: dum vis
animalis sensifica, vel non Suscipitur, vel non Trāsmittitur
ut in vesica non sit sensus præsentis lotij (Miror Alimmarum,
& alios, qui putant, facultatem contrāctricam, differre ab expul-
trici.) Non suscipitur facultas animalis, dum in nervis ad ve-

sicam pertinentibus est angustia: cum ergo facultas non sen-
tiat lotium, hoc nobis inuitis multiplicatur. Hæc autem po-
test vocari paralytis vesicæ (est alia etiam paralytis in vesica,
spectans ad cervicis musculum: cum huius motus ita aufertur, ut
non fiat suppressio, sed incontinentia lotij: at de hæc paralyti iam
non loquimur, sed de illa, quæ spectat ad nervos vesicæ; quorum be-
neficio vesica, naturaliter habens, se repleri lotio sentit, et ad expel-
lendum insurgit.) Non transmittitur sensus ad vesicam, in deli-
riis, phrenitide, lethargo. Interdum lotium aggregatur, no-
bis volentibus: stimulamur enim ad mictionem, sed mingē-
re nolumus, quia negotiis sumus occupati.

Differentiæ nō sumuntur à forma, neque à materia. Quo-
ad causam efficientem: lotij suppressio fit, vel Læsa facultate,
vel ob errorem externum. Læsa facultas, Labefactatur vel
Impeditur. Impeditur ob compressionem, constipationem,
subidentiam, vel obstructionem. Error externus, est lotium
copiosum, quod aceruatur nobis Inuitis, vel volentibus.

In genere hoc malum facile cognoscitur: quia homi-
nes mingere nequeunt. Distinguendum autem est, cum
supprimatur lotium, ob læsam vesicam, vel quia malum sit
in renibus: altera enim propria suppressio est, altera impro-
pria. Suppressio propria est, quando adest desiderium min-
gendi: præterea circa vesicæ regionem est dolor ac tensio.

Signa.

Hæc non assunt, si malum pertinet ad renes: tunc enim lotium in vesicam non fluit. Quoad differentias à causa efficiente. Si labefactatur facultas: signa assunt frigiditatis, præcessere causæ refrigerantes, verbi gratia, dum medici ad vesicæ inflammationem curandum vsi sunt nimis refrigerantibus: cognoscitur etiam, quia hoc symptoma fit paulatim, & non subito: paulatim enim fit intemperies: præterea cognoscitur, quia, si vesica manibus comprimatur, patiens mingit. Si facultas impediatur ob angustiam: angustia in genere indicatur inde: quod, licet manibus vesica comprimatur, homo tamen non mingit. In specie, compressio noscitur è signis indicantibus tumorem vicinarum partium, nimirum vteri, intestini recti. Constipationis causa varia est: si, verbi gratia, fuerit lapis, vrina repente supprimitur & ratio est, quia calculus potest repente impetum habere in cervicis meatum: præterea, si homo commoveatur, si supinus decumbat, mingit: quia fieri potest, ut lapis descendat, & relinquat meatum cervicis: item in pudendis ægri sentiunt pruritum, ut frequenter scalpant pudenda: fieri etiam potest, ut prægressa sint calculi renalis indicia, & descenderit calculus à renibus per vasa urinaria in vesicam, neque extra vesicam egressus sit calculus: pathognomonicum & perpetuum signum calculi in vesica est ardor lotij, semper enim minguit cum dolore. Si interdum contingat, ut sit suspicio vel falsæ pituitæ, vel lotij acrioris, ut ardor urinæ ex his causis prodire videatur: possumus distinguere ex arenulis, seu calculis alias excretis: & tandem beneficio syringis. Si constipatio fiat à tumore: tactu sentitur tenigentia, &, cum tumor possit esse calidus, vel frigidus: calidus tumor & inflammatio cognoscitur è vehementi dolore, è sensu caliditatis, è febris: frigidus, contra. Tuberculum cognoscitur immisione candelæ: nec enim tactu hoc deprehenditur, cum sit intra meatum: sed candelæ immisione evidens impedimentum sentitur. Tuberculum autem carnosum esse iudicabitur, si præcesserit gonorrhœa, ad quam vlcus sit subsecutum. Callosum cognoscitur è duritie, quæ in candelæ immisione sentitur: assunt signa pituitæ: præcessit non suppressio lotij, sed difficultas mingendi. Phlegmonosum cognoscitur è dolore, & calore. Constipatio à pure fieri cognoscitur, quia post abscessum ex aliqua parte egressum est pus: vnde si succedat, lotij suppressio, iudicandum è retento pure produci. Subsidèriam fieri

fieri è siccitate, cognoscitur, è febris ardente, siccitate totius. Si fiat è conuulsione, hanc oculis potestis percipere. Obstructio, si fiat à sanguine: cognoscitur, quia sanguis præcessit in lotio: & cum retinetur sanguis, quia grumescit, non modo supprimitur lotium, sed etiam pulsus fit debilis, fit syncope, vt totum corpus refrigeretur, quia sanguis extra proprium locum existens, non modo vertitur in grumum, sed etiam quodammodo materiam veneficam acquirit. Si obstructio fiat à pituita: cognoscitur, quia ante suppressionem egressa est materia pituitosa, quæ postea detinetur, & causat obstructionem. Error externus cognoscitur, quia malum subito fit: &, si vesica manibus comprimatur, hæc compressio iuuat. Vtrum autem lotium copiosum sit collectum, nobis inuitis, aut volentibus: facile cognoscitur.

Præsidia sumuntur ab efficiente causa suppressionis: pos- *Indicatio-*
suntque esse curatiua, & præseruatiua. Si efficiens est mor- *nes.*
bus, sunt curatiua: sin minus, præseruatiua, quæ tamen in arte curatrice, ratione finis vniuersalis, possunt nuncupari curatoria. Si ergo facultas labefactatur ob intemperiem frigidam: oritur indicatio calefaciendi. Si impediatur facultas ob angustiam, siue sit compressio, cõstipatio, &c. nulla sumitur indicatio curatiua ex vsu, sed omnis est præseruatoria, quæ sumitur à causa angustiae: verbi gratia, si angustia fiat ob sanguinis grumũ, indicatur eradicans, dissoluens. Quoad errorẽ externum, si fiat nobis inuitis: excitanda est virtus sensifica, quæ sopita est, euacuanda materia, quæ replet nervos, &c.

Prognosi-
ca.

Suppressio lotij in genere est vitium periculosum, nisi enim occurramus, sunt dolores, conuulsiones, tremores, desipientia: quia partes principales in consensum trahuntur, & cito etiam ægri moriuntur. Quoad differentias: Si facultas labefactatur: tollitur quidem suppressio lotij, per vesicæ compressionem, sed non tollitur causa: quia calefacienda est frigida vesica: quod consequi possumus, sed non ita facile, præsertim si intemperies frigida fuerit in habitu. Si impediatur facultas, & primum per compressionem: oportet perpen-
dere vim, & vehementiam tumorum vicinarum par-
tium. Quoad constipationem, si fuerit tumor inflamma-
torius: vitium satis periculosum. Si tumor frigidus: vix adi-
mitur lōgo temporis spatio. Si fuerit vesicæ lapis: transponi-
tur, sed non potest frangi, sicut calculus renalis, ideoque

ad sectionem confugiendum. Si tuberculum fuerit, siue carnosum, siue callosum: impossibile est, integram curam explere, sed minuere tantum possumus: locus enim est reconditus, medicamēta abluuntur, causa morbifica resistit. Si tuberculum fuerit phlegmonosum: quandoque suppuratur, & fit ruptio, vnde homines liberantur. Si pus fuerit: potest euacuari: sed vlcus, ægre consolidatur, & pro vario statu vlcus, & pro vario loco. Si fuerit subsidēria, & fiat ratione siccitatis: maxime difficulter malum hoc remoueri potest. Si conuulsio ex inanitione, actum est: si à repletionē: difficulter curatur. Si conuulsio non proportionata ad materiam: potestis polliceri salutem, quia materia potest euacuari. Si fuerit obstructio: si à pituita: curari potest: si à sanguinis grumo: maxima est difficultas: vnde Gal. è tali causa vnum tantum vidit curatū, c. 3. l. 6. l. aff. nam sequitur maior putredo, & tandem mors: ideoque in hac suppressione maxime festinandum. Quoad errorem externum: Si lotium colligatur copiosum nobis inuitis, in paralyti neruorum, malum est incurabile, quia locus nimis profundus. Si fiat è phrenitide & lethargo: videantur propria cap. Si nobis volentibus, facile & sponte curatur.

*Curatio.
Cheirurgia.*

Quoad metērias præsidiorum: probatur venæ sectio, si sanguis peccet, vel ut causa principalis, ut in phlegmone cervicis vesicæ: vel ut causa sine qua non, habens rationem impedimenti, ut si sit copiosus in toto, impetu commotus, in forma peccans. Notetur circa *quando*. Si sanguis habet rationem causæ principalis: vena secanda actu exsistente symptomate, id est, lotij suppressione: nam si voluerimus uti vel synange, vel relaxantibus, vel diureticis: interficiemus ægros. Sed si sanguis habet rationem causæ sine qua non: vacuandus est extra accessione. Licet etiam confugere ad sectionem in peritonæo. In calculo non improbatur candela, neque syrinx: hac tamen in phlegmone non vtendum, quia hac præsentē non possumus pertransire in vesicam, & augemus phlegmonem. Manu etiam comprimere licet vesicam: quia, nisi sit angustia, tolletur lotij suppressio.

*Medicamēta
ad symptoma alicui
affligens.*

Medicamenta totius supponam. Propria, vel respiciunt causas, ut vlcus inflammationem, calculum, &c. de quibus suis locis: vel Symptoma, quorum vltus est actu, exsistente lotij suppressione: de quibus pauca afferimus. Quare nisi sit inflammatio, probatur *medicamentum confectum ex amomo, acore, ammoniaco, aniso, & ajaro, & amygdali amaro, dant*

ceste.

casto, myrrha, rubia tinctorum, sabina, virga aurea, quam aliqui habent pro secreto. Si reliqua non conferant, licet ascendere ad cantharides, quia agitur de vita: verbi gratia, si aliter non possumus, licet hoc vti medicamento: R. integrum cantharidem (quia ale alexiteria sunt ventris) pulueris vesicae danula, id est, musclic pulueris cancerorum finitissimum & marinorum ana ℥j. cum syrupo cap. Venor. fiant pilulae. Post pilulas exhibentis cicorum rubrorum ℥iij. vel v. ℥i. succi raphani ℥ij. Licet etiam vti compositis illis medicamentis: elect. Iustino de ciceribus. Denique omnia lapidem fragentia vsui sunt, actu existente suppressione: dummodo non sit inflammatio. Probatum etiam extrinsecus applicata. Nisi ergo sit phlegmone, hoc vtamur: R. bacc. lauri ℥ss. anethi, fol. malua parietaria ana P. f. succi raphani farina cicer. rubrorum, butyri, adipis anatis, ol. de scorpion. ana ℥ss. ol. lol. alb. ℥j. misc. Haec & alia huius generis applicentur super pinxum, & secundum regionem intestini recti. Et his partibus applicetur vesica bubula, his oleis semiplena. Probatum infessum in balneo aqua dulci, cum malua, alibaa, &c. & magis prodest infessum in oleo communi, ut partes relaxentur, & lotium possit permeare. Multum possunt dyssenteres: quibus ego interdum solis lotij suppressionem curavi, cum aliis non cederet: fiant è laxantibus, emollientibus. Potissimum praestat vsus medicamentorum quae per os assumuntur, tempore infessionis. Ratione symptomatis, accipere possumus cimicem vinentem, & mittere in foramen glandis, ut vis opita excitetur. Si horum copia non sit: imponatis aliquid salis. Et his addatur diligens viuendi ratio: quae potius causas respicit, quam symptomata seu praesentem suppressionem.

CAPVT XXXII.

De mictione deprauata.

Deprauata mictio dicitur Stranguria, & vrinæ causa. stillicidium. Fit vel Lassa facultate, vel ob Errorem externum. Læditur facultas, ob morbum Vesicæ, vel Musculi. Vesicæ morbus primum est vicus: tunc enim non detinetur lotium, sed fit mictio cū difficultate, & ardore. Deinde alius vesicæ morbus est, qui inducitur à calculo, nō quidem angustante meatū ceruicis, sic enim potius esset cōstipatio & mictio ablata, vel imminuta: Ted

sed quatenus est morbus in numero: hic enim numerus auctus sui præsentia est in causa, ut cum difficultate & dolore fiat mictio, ac potissimum ægri torquentur circa finem mictionis. Musculi morbus est paralytis: unde musculo laxato, præter voluntatem lotium egreditur. Insuper hæc actio læditur ob errorem externum: qui est desumendus è causis Internis & Externis. Internæ, sunt mala, non vesicæ, non musculi, sed veginarū partium: ut si fuerit tumor, inflammatio, non in parte inferiori, sed super vesicā, semper comprimitur vesicæ corpus, ut deprauata fiat mictio: quod utro gerentibus contingit. Adhæc concurrit materia acris, & lotium acre permistum cum acre materia, cum salsa pituita, cum sanie, cum materia biliosa: nam dum iusto acrior redditur urina, cogitur homo iusto frequentius mingere, & ideo deprauatur mictio. E causis externis potest error desumi, quatenus redditur lotium acre: nam mordax fit lotium, modo ob feruorem iecoris, renum: modo ob prauum victum & potum vsunque frequentem ciborum & potuum acrium.

Signa.

Num autem mictio deprauata procedat à læsa facultate, & ob errorem externum, sic cognoscitur: Si enim lædatur facultas: adest vel vlcus in vesica, vel paralytis. Si sit vlcus: lotium redditur cum dolore, per sentitur acrimonia, mordacitas, & interdum ingreditur sanies, quæ ab ulcere procedit. Si fiat à paralyti: fit mictio sine dolore, citra voluntatem. Si fiat ob errorem externum: si causa sit interna: erunt signa caliditatis hepatis & renum, salsæ pituitæ, bilis, neque in vinendi ratione error est commissus. Quod si post agrumina copiosa, post aromata fiat ardor urinae, & mictio corrumpatur: procul dubio corrumpitur ob errorem externum, qui fit à causa externa.

Indicationes.

Præsidia sumuntur à causis lædentibus facultatem, & ab errore externo: verbi gratia, in ulcere sunt indicationes viceris, de quibus cap. de ulcere ventriculi. Error externus, qui præsens est remouendus.

Consideranda autem hic est vis causarum & morborum: verbi gratia, si ob lotium acre deprauatur mictio, quod sit tale redditum à causa primitiua: facile tollitur vitium: difficilius autem à caliditate renum & iecoris: & adhuc difficilius si ex ulcere: nec tamen credendum vesicæ vlcus omnino non posse curari: nam si diligentes eritis, antequam ligat radices, non erit impossibile. Est etiā magna difficultas,

vbi paralyfis est in causa, quia est vitium satis rebelle. lib. 1. de loc. aff. Et sic discurrendum per morbos & causas.

Medicamentis variis vtendum, pro differentia causarum: *Curatio.* verbi gratia, si fiat à paralyfi, calorificis vtendum. Si ex vlcere: vtendum iis, de quibus in vlcere ventriculi est dictum. Differentia tamen est, quia in vlcere vesicæ, medicamenta immittere possumus per syringem. Debent autem parari & sero lactis cum saccharo, & primo detergentia, deinde siccantia moderate. Medicamentum paratur & sarcocolla, & thure, & tragacantha. De agglutinâtibus alibi egimus. Gal. 1. 14. meth. *Appro-* proponit medicamenta, quæ competunt parti vlcerata. Por- *priata.* ro in mictione deprauata, & potissimum in lotij incontinen- tia, secundum Auicem. & Paul. vt possumus quibusdam à proprietate iuuantibus: vt est puluis paratus à gutture gallina, puluis & vesica suilla, &c. quidam hoc pro secreto habent, potissimū in pueris, qui non possunt retinere lotium. Est & puluis testiculi leporis, cerebri eiusdem: quibus vti licet à 3j. ad 3ij. Et ut ha- materia in vesicam perducantur, miscenda sunt diuretica.

CAPVT XXXIII.

De partium Genitalium vitiis: & primum
De Gonorrhœa.

MEMBRA generationi destinata, affici solent *Definitio.* gonorrhœa. cap. vlt. lib. 6. loc. aff. cap. 10. l. 14. de vl. part. c. 4. l. 3. de caus. sym. Est autē hoc vitium in quo fluit semen. Huius ergo seminis fluxus, est exiens mutatum seminis, assiduo per colem egrediētis. Est autem exiens mutatum, non toto genere præter naturam, ratione materiæ exeuntis: quia per colem secundum naturæ leges solet egredi. Est autem præter naturam, quia intempe- stive egreditur, nobis inuitis, assiduo. Hoc symptoma secun- *Causa.* dum, refertur in actionem læsam retentricem, quæ pertinet ad vasa spermatica: nam si intus præter naturam semen de- tineretur, non fieret gonorrhœa. Hæc autem actio læditur vel Læsa facultate, vel ob Errorē externum. Læditur fa- *I.* cultas retentrix vasorum seminalium, quia vel Labefactatur, vel Impeditur. Labefactatur ob intemperiem quamlibet in- signem, & potissimū humidiores, vi cuius ita laxantur vasa, vt seminalis materia non detineatur. Hæc autem humida intempe

11.

intemperies, potest esse vel simplex, vel coniuncta cum caliditate. Impeditur facultas, ob malam compositionem: ob immodicam apertionem vasorum: siue fiat ex immodico coitu, siue ab immodico exercitio & motu. Læditur vero ob errorē externum, ob vitium seminis: quod sane vitium, vel est in Quantitate, vel Qualitate. In quanto: cum est copiosum, siue ex intermissa Venere, siue e copiosis cibis. Peccatū est in qualitate vel Manifesta, vel Recondita. Si in manifesta: vel Prima, vel Secunda. In prima: cum semen est calidius, mordax: siue tale sit à iecore calidiore, siue ab assumptis acribus & calidis. In secunda qualitate est etiam vitium: dum semen est redditum vel tenuius, vel putridum. Redditur tenuius: quia non concoquitur, sed crudum permanet, siue e frigidityte vasorum, siue iecoris & ventriculi, siue e frigidis assumptis: nam dum crudum permanet, est etiam fluxile, & liquidum, vt non detineri possit. Peccatum in secunda qualitate potius comitante formam, quam materiam, est, dum semen putrescit: quod fit, quando concurrente extraneo calore à natura non potest regi. Qualitas recondita est, dum semen afficitur virulentia gallica, quæ expultricem irritat, vt non possit detineri: potest etiam ea virulētia esse, qualis viget in leprosis, & elephātiēdis.

Differētia.

Actio hic læditur, vel Læsa facultate, vel ob Errorē externum. Et, dum semen egreditur, modo exit pene Flaccido existente, modo Extenso. Nec hoc aduersatur Galeno. Dum enim hoc vitium sincerum est, semen exit pene flaccido existente: at si gonorrhœa coniunctum habeat aliud vitium, vt priapismum, egreditur semen pene extenso.

Signa.

Facillime vitium hoc in genere cognoscitur, quia assiduo semē egreditur. Quoad differentias: Labefactata facultas cognoscitur e signis superflue humiditatis, e prægressis causis humectantibus, vt sunt, potus frigida, balnea aquæ dulcis. Et, si coniuncta sit frigiditas: adest sensus frigidi, nulla adest mordacitas: secus, si adest caliditas. Impedita facultas cognoscitur, quia prægressa est immodica Venus & intemperstiva: præcessit immodicum exercitium: nec sunt indicia culpata seminis. Si lædatur actio ob errorē externum: opposita erunt signa. Et primo, si semen copiosum sit in causa, exit semen non infectum, non iusto liquidius, non mali odoris, non vitiosi coloris, sine acrimonia. Si vitium sit in qualitate manifesta: & quidem in prima, dum calidius est: non exit citra dolorem, est citrinum & biliosum, assunt indicia

biliosi

biliosi ventriculi & iecoris, præcessit vsus calidorum. Si qualitas secunda est tenuitas: exit aquosum, sine sensu caliditatis: assunt indicia cruditatis in iecore, testibus, & ventriculo. Si sit putridum: cognoscitur è foetore, ex indiciis putredinis, & cum morfu egreditur. Si est qualitas recondita: sunt signa luis Venereæ, lepræ, elephantiascos.

Si hoc malum fiat labefactata facultate: oportet exsiccare, *Indicatio* modo calefacere, modo refrigerare. Si impedita: oportet *nes.* currere reclusis meatibus, est astringendum. Si ob errorem externum: si semen sit copiosum, oportet minuere: si calidius, refrigerare: si tenuius, crassefacere: si putridum, refrigerare & siccare. Si recondita sit qualitas: dentur alexipharmaca, aduersantia illi virulentie.

In genere hoc malum non est contemnendum: aduersatur *Prognostica.* enim individuo, quia æger contabescit: & speciei cõseruationi, quia hæc corpora infœcunda euadunt. Quoad differentias: Si malum procedat à labefactata facultate: tolli potest exsiccando, & refrigerando. Si fiat impedita facultate: illa apertio curari potest astringentibus. Si fiat ob errorem externum: facile occurrimus seminis copie: & possumus calidius refrigerare: difficilius est malum, si semen tenuius sit & crudum: tunc enim tanta est imbecillitas partium, vt difficulter possimus partem intemperatam ad naturalem crasin reducere. Difficiliter etiam putredini, & virulento semini possumus occurrere: præsertim si virulentia gallica sit, vel elephantica.

Si sanguis redundat, vena secanda: sed parce demendus *Curatio.* sanguis, quia in hoc malo egreditur semen, quod est reliquum vltimi alimenti.

Remediorum materiae variae sunt, pro causarum varietate. Dum enim labefactatur facultas ob humiditatem, si coniuncta sit caliditas: oportet vti refrigerantibus & siccantibus, & vna astringentibus, tum intus, tum extra. V. g. R. sacchari antiqui ros. 3 j. coral. alb. 3 β. sansal. ciurin. 3 β. cydon. 3 β. Detur duob. vicibus. Regio inter testes & anum inungatur, ol. ros. comp. omphacino, myrtino, pro singulis olei uncis, addatis 3 β. pulueris refrigerantis & exsiccantis, vt balaust. malicorii: & pro qualibet vncia olei, addatis cere 3 j. vel 3 ij. ad consistentiã. Si cū humiditate sit coniuncta frigiditas: occurrendū est calidis & siccis: parëtur igitur medicamēta mastiche, nucis cupressi, amēsha, thuris, vino astringente. Horum vltus, intus & extra. Si lædatur actio impedita

1.

2.

3.

- impedita facultate, ob immodicam vasorum apertionem: propositis uti licet: non ea tamen ratione, qua refrigerant & exsiccant, sed potius ut astringunt. Si vero ob errorem externum lædatur actio: si vitium seminis sit in quanto: oportet iis uti, quæ copioso semini aduersantur: vnde conficiatur medicamentum *è semine cammabis sylvestris, è semine filii, lactuca, foliorum nymphae, seminis. & fol. calamintib. perichlymeni:* sed horum seminum sit moderatus usus, quia non solum imminuunt semen, sed etiam reddunt infecundum. Si vero
5. peccatum sit qualitate euidenti, vel prima, vel secunda: si in prima hoc sit dum semen est calidius: vnde utendum refrigerantibus, intus & extra: pareretur ergo medicamentum non tantum *è rosis, & cichoraceis, sed etiam è lactuca, è refrigerantibus potissimum hepar & renes:* vnde quidam utuntur *medicamento parato ex aqua rosacea, succo limonis, & albumine oui.* In gonorrhœa calida licet etiam uti *aquis, quæ sunt subsalsæ, ut B. Virginis, & Teltutij, nam refrigerant. Nec improbandus usus feri lactis caprini.* Extra etiam refrigerantia sunt adhibenda renibus: possumus igitur inungere *unguento ros. Mes. refrigerante Galeni.* Licet applicare folia frigida viridia *nymphae:* & in hac gonorrhœa (non in omni) confert gestare *laminam plumbeam, perforatam tamen.* Si vitium sit in qualitate secunda, hæc respicit vel materiam, vel formam: materiam, dum semen est tenue: formam, dum est putridum. Tenue, frigidum & crude, producitur ob frigiditatem, ratione cuius non potest corrigi: ob id, si deperit refrigerantia, licet crasse faciât, magis tamē lædūt: Si dentur astringentia, interficiunt. Oportet ergo uti calorisficis, corroborantibus calorem: ut calor maxime redditus robustus, concoquat semen, quod concoctum redditur crassum. Vnde in hac gonorrhœa calorisficis utendum, intus, & extra: talia sunt *aqua Aponenses, & alia remedia.* Si semen sit putridum, non est astringendum, quod alij faciunt: non utendum aqua ros. cum albo oui, sed refrigerantibus & exsiccantibus citra astrictionem: vnde medicamentum parabitur *ex aqua acetosa, succo limonis, & succo acidi cieri immaturi:* ut siccando, refrigerando, & aperiendo occurratur putredini: conueniunt ea, quæ febribus putridis (putredo per euentationem minuitur: astringentibus augetur) Si virulentum fuerit semen: oportet alexipharmacis occurrere, tum communibus, quibus utimur in omni materia virulenta & deleteria, ut sunt magna antidota: tum determi

determinatis, verbi gratia si virulentia sit elephantica, præstat vsus salis theriacalis intus, & extra vsus olei Asperini.

CAPVT XXXIIII.

De Impotentia coeundi.

Coe vitium est laxa facultas, quæ pertinet ad membra destinata generationi. Actio hæc varie lædi potest: & , vt læsionis modi intelligantur, oportet videre, quomodo secundum naturam fiat coitus. Secundum Galenum ad coitum duo sunt necessaria: *Coius naturalis.* *Erectio co-*
 colis erectio, & seminis eiactio. Ad erectionem tria sunt *lis.*
 necessaria: spiritus, sanguis, & instrumentum motui voluntario destinatum, musculi scilicet colis. Hæc autem tria ita se habere debent. Spiritus vitalis oportet vt sit copiosus, non crassus. Quidam obiciunt: in coitu non tantum colis erigitur, sed ita erectus permanet: Ergo hoc fit ob crassum spiritum. Errant: nam hoc fit ob copiam: quia continuo suggeritur copiosus spiritus, & purus. Sanguis & ipse est necessarius, vt huius opera nutriatur & foveatur colis, & nõ gracilescat, si solum spiritum copiosum & purum suscipiat. Spiritus procedit ex arteriis: sanguis è venis. Oportet etiam vt musculi recte sint constituti: qui vim animale[m] susceptam, ita foveant ac retineant, vt optima organa animalis facultatis. Ad seminis eiactationem tria sunt necessaria: primo, vt bo- *Seminis eiactio.*
 num semen generetur: secundo, vt hoc genitum transmittatur ad penem, in illas vesiculas, & ibi detineatur: tertio oportet vt ingrediatur meatum vrinarium, & per illum expellatur in vterum. Quare, quoad seminis generationem: vt optimum in testibus generetur, oportet vt producat ex optimo sanguine: & vasa seminalia sint aperta, vt per ea sanguis in testes deferatur, & in his acquiratur optima proportio, & temperatura decens. Vt autem semen genitum deferatur in vesiculas dictas, prope penem: oportet, vt semen genitum non sit crassius, & viæ sint apertæ. Tandem, vt fiat eiactio: oportet vt meatus colis sint reclusi, & meatus vrinarius apertus, colis musculi optime constituti, quia hi etiam tum ad erectionem, tum ad eiactationem concurrunt. *Causa im-*
 Ex his est concludendum: impotentiam coeundi noxam *potentia*
 esse, vel secundum Erectionem, vel secundum Eiactationem. Erectio lædi potest, vel Laxa facultate, vel ob Errorem *dispositi-*
onem.

externum. Læditur facultas, quoties morbus est in Cole, vel in Musculis. Morbus in cole est intemperies, & potissimum frigida: item frigida & sicca, vt in senili ætate, & in athleticis, in quibus partes istæ afficiuntur intemperie frigida, ob immodicum otium. In musculis vitium est, cum afficiuntur paralyti. Error externus est causa ablatæ erectionis, dum est defectus vel secundum Spiritum, vel secundum Sanguinem. Spiritus autem variis modis solent deficere: & potissimum, quia vel non generantur, vel non deferuntur. Non generantur, dum corpus est frigidum, potissimum vero cor: vnde qui cor frigidum habent, non sunt apti huic negotio. Si non deferuntur: hoc potest esse, quia aliquis meatus occlusus est: vel quia spiritus in alias partes auocantur, vt accidit illis, qui præ nimio timore afficiuntur, & moriuntur. Vnde etiam si corpus sit refertum spiritu vitali copioso: si afficiantur timore, facile est, vt spiritus non deferatur in colē, sed in alias partes remotas, vt etiam ob immodicam lætitiā fieri solet. Insuper est vitium in sanguine, dum non gignitur, quantum opus est, in frigido corpore, in ætate senili. Ratione etiam imaginationis nimis agitantur & commouentur spiritus, vt in penem non confluant: & ob id impotentia oritur. Eiaculatio etiam læditur vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læditur facultas ob morbum, non solum colis, sed etiam testium, & meatuum prodeuntium à testibus in colē, quia omnes istæ partes conducunt ad eiaculationem: in qua est necessaria generatio seminis, & eius transmissio. Vnde, quoad testes, non generatur semen læsa facultate, id est, otiante proportionē, vt in pueris: sed hæc non est impotentia præter naturam, sed è naturæ legibus, quia hæc proportio non viger, nisi in florente ætate. Quare potissima causa est intemperies: & potest esse qualibet. Eiaculatio igitur seminis lædi potest vel læsa facultate, vel ob errorem externum. Læditur facultas, cum morbus detinet vel vasa, vel testes: quæ vasa à testibus in colē deferuntur, vel in musculos. Et esse possunt morbi in intemperie & mala compositione, & potissimum in via: sic intemperies frigidior est in causa, vt semen non emittatur, quia non generatur. Si penis afficiatur angustia, mala compositione: functio læditur, læsa facultate seu potius impedita. Error externus petendus est ex improbo sanguine, cuius vitio non potest probum semen generari: de cuius sanguinis causis alias diximus.

siue simpliciter deficiat, siue sit vitiosus. Impotentia igitur *Definitio.*
coeundi, est actio ablata colis, famulantis generationi, non
citra violentiam oborta.

Coeundi difficultas, seu impotentia oritur, vel læsa *Differentia.*
Erectione virgæ, vel ablata seminis Eiaculatione. Et utra-
que functio lædi potest Læsa facultate, vel ob Errorem ex-
ternum.

In genere hoc vitium facile cognoscitur è relatu patien- *Signa.*
tis, è facie: ubi barbam albicantem conspicitis, impotentes
dixeritis. Quoad differentias: an fiat, quia non erigitur colis,
vel quia non fit eiaculatio: patiens dicet. Si contingat hoc vi-
tium, quia non erigitur colis: distinguendum, an hoc fiat læ-
sa facultate, vel ob errorem externum: si enim, verbi gratia,
colis satis flaccidus, frigidus, & exsanguis conspiciatur: pro-
cul dubio hoc fit læsa facultate. Si contra, vitium est in toto,
secundum iecur & cor.

Eodem modo, si ablata sit eiaculatio seminis, propter fa-
cultatem, vel errorem externum: cognoscitur, quia aderunt
signa morborum, aderit indicium testium frigidorum, an-
gustix: ut, si post gonorrhœam fiat vlcus in cole, & vlcus
deducatur ad cicatricem, deinde Impediatur eiaculatio: non
fit hoc ob aliam causam, quam quod propter cicatritem pori
colis fuere occlusi: & sic de reliquis. Contra vero si vitium
fuerit in errore externo: verbi gratia si patiens fuerit frigidi
ventriculi, si emaciatus, ut non gignatur semen: tunc enim
impeditur seminis eiaculatio ob errorem externum.

Scopi sumuntur à morbis ex usu, & ab erroribus exter- *Indicatio-*
nis: verbi gratia si malum oriatur ob frigidam intemperiem *nes.*
colis: calefaciendum, &c.

Prout autem malorum vis magis & minus vehemens *Prognosi-*
fuerit, ita vario modo prædicendum: verbi gratia, si malum *ca.*
fit ob frigiditatem colis, testium: non est desperandum de cu-
ratione. Si procedat à cicatrice: actum est. Et sic per causas
discurrendum.

Adhibenda ea sunt, quæ à proprietate conferunt, id est, *Generatio.*
quæ spiritus viuificant, & semen producant copiosum: ut
secundum Auicennam venter & cauda scisci, pudendum ari-
dum cernis, radix orchios, id est, testiculi maioris canis, & alia
semelia.

Vena non audenter secetur: quia copia spirituum maxima *Vena sectio.*
in coitu egemus, ideoque etiam sanguine copioso. Ratione

igitur huius affectus non est secunda vena: licet quandoque ratione alterius affectus secari possit, veluti si fiat coeundi impotentia ab obstructione: occurrendum est deobstruentibus, & calefacientibus: vbi, si totum sanguine refertum sit, sanguis primo est euacuandus valido auxilio, quia morbus magnus imminet, quia ratione medicamentorum calidorum, quæ deberent exhiberi, imminet inflammatio, aut febris: ideo tunc secanda est vena.

*Medica-
menta.*

Quoad medicamenta, peculiaria tantum proponemus: causarum seruatō ordine. Impotentia coeundi sit, vel quia virga non erigitur, vel quia semen non eiacularur in vterū. Virga non erigitur, ratione vel spirituum, vel colis, vel musculorum. Quoad spiritus, deficient vel simpliciter, vel secundū quid. Si simplex sit defectus, sunt reparandi: vbi vtendum duplicibus remediis, secundum Galenum cap. vlt. lib. 6. loc. aff. primō restituentibus & reparantibus spiritus, deinde producentibus flatu, ratione quorum fieri possit erectio. Generantia spiritus, sunt tum cibi, tum medicamenta corroborantia & calefacientia cor: de quibus in affectibus cordis. Speciatim vero hic notandum, vt sint odorata: qualia sunt *diamoschu, diathon*. Extrinsecus etiam præter inunctiones ab aliis propositas ratione coitus, confici potest *sacculus è serice, in quo ponatur gossipium, cui inuolutum sit aliquid moschi: ambræ, Zibethi*. Hoc auxilium cor reddit calidum, & respicit spiritus. Flatu producentia proponuntur à Galeno lib. 7. simp. quæ sunt calida & humida: vt maior radix testiculi canis, minor enim est acida, gracilis, ac destituitur humiditate flatulenta: contra maior, seu inferior plena est illa humiditate. Huius generis sunt *faba, cuceres, semina eruca, urtica, rapi, pastinaca, cerebellum passeris, virga cerni arida, radix enula, bacca hedera*: inter composita *diasatyron*. Quidam, vt Macarobus, pro secreto habent *cepas frictas cum butyro*. Sed ab his abstinendum, quantum fieri potest, quia sunt in causa pessimi odoris, & malæ respirationis. Si sit vitium spirituum secundum quid: hoc erit, vel ratione viarum, vel ratione motus spiritus. Si ratione viarum, vel erunt obstructæ, vel nimis latæ. Si obstructæ: erit occurrendum deobstruentibus: vnde conducit *diasatyron*, & proposita medicamenta, quæ exhibentur cum *galanga*, & aliis deobstruentibus. Ius cicero maxime confert. Si apertæ nimis erunt viæ: vtendum testiculo canino, cerebello passeris: sed hic vtendum cum astringentibus, cum succo ros. cydoniorum. Extrinsecus foueri debent partes

partes in frigidantes *Galenus, aqua rosacea*. Si autem defectus sit spirituum secundum quid ratione motus: Si spiritus dilatantur: præcipiatis, vt ante coitum abluatur os *aqua rosacea*: & cordis regio madescat ex *aqua rosacea*: vt fiat refrigeratio, & concentratio spirituum, ne dilatentur. Si defectus sit spirituum; quia concentrantur, nomine timoris, aut curæ: remoueat omnis timor, & cura. Si vitium sit ratione sanguinis: hoc erit in substantia, quantitate, vel qualitate. Quoad substantiæ vitium: si sanguis sit putridus, & corpus cacochymum: epicrasi vtendum: & tunc abstinendum à coitu, vt sanguis corrigatur, & semen generetur. Quoad vitium quantitatis: Si defectus sit sanguinis simpliciter: vtendum cibus, de quibus postea. Si fuerit defectus secundum quid: vel est ratione attractricis colis. Si sit ratione viarum obstructarum: vtendum deobstruentibus, valentioribus, quam supra ad arteriarum obstructions vñ fuimus: & quandoque ascendendum ad caput, & magnas inflectiones. Si vitium sit ratione attractricis colis, quæ languida est ac debilis: cum Aetio calefaciendum, humectandum: vnde vsus esse potest olei *carophyllorum*, cui addantur oleum recens *amygd.* adeps *suillus recens*, ambræ pro odore: & inungatur colis. Si vitium sit in musculis: vtendum medicamentis respicientibus paralyfin; vt materia discutiatur. Et hæc medicamenta non solum administranda sunt peni, sed etiam perinæ, & circa os sacrum: quia nerui & viæ ab illis partibus proueniunt. Conueniunt autem stillicidia *aqua Aponensis* circa illud os sacrum: quia excalesciunt; & deobstruunt.

Si vitium sit, quia semen non eiacularur: vt semen emittatur, primum requiritur, vt generetur: ad quod hæc tria sunt necessaria: materia, viæ, agens. Quoad materiam: debet esse sanguis bonus, qui generatur ratione ciborum. Si igitur producat sanguis frigidior: calefaciendum hepar, & ventriculus. Si in viis sit vitium, quia obstruuntur: deobstruendum.

Quoad vitium agentis: si defectus sit natiuus: aut nil, aut parum effici potest: & tunc est potius calefaciendum. Si vitium sit accititium: pro diuersitate affectuum in illis partibus, diuersis est vtendum præliis. Si sit scirrhus. emollientibus agendum. Si egrediatur semen, sed non deferatur ad penem: calefacientibus opus est. Aetius testatur quendam

noctu eiecisse semen, non autem in coitu: ratio: quia semen est crassum, & e parte frigidum: vnde noctu, cum calor vigeat in interioribus, aperta sunt vasa seminaria, & eiectum semen: tempore autem coitus, cum externae partes sint calidiores, internae frigidiores, vasa, ratione frigiditatis, aperiri non potuerunt, nec semen eiaculari. Hunc se curasse Aetius gloriatur calefacientibus, & cum castorio. Si oriatu vitium, quia semen non peruenit ad fistulam, cum hoc fiat ob cicatricem: si dura est cicatrix, & inueterata, nihil agendum: si recens, intromittatur *candela cerea, oblita cum medulla cervina, vel bouis, cum adipe, addaturque moschus, ambræ, &c.* Si vitium sit in languida expultrice: si obstruēti sunt nerui: conueniunt deobstruentia, vt in paralyfi. Si autem fiat ratione paralyseos illorum musculorum: conueniunt ea quae tollunt paralyfin.

Diaeta.

Cibus & potus medicamentis respondeant. Quare si defectus est sanguinis & spirituum, profunt ea, quae gignunt sanguinem copiosum, & spiritus: vt caro pullorum, caponum, phasianorum, oua sorbilia, testes gallorum. Si flatus sunt gignendi: prodest cibus cum iure cicerum, cum eruca, cum seminibus pastinace, rapa, cum hormino. Si opus sit semine magis acri, ad facultatem quasi sopitam irritandum: sunt pisces ostreacei, legumina. Cibi etiam aromatibus condiendi. Vnde monachi hoc habent pro secreto: accipiunt columbos & decoquunt cum macere: sic etiam capones decoquunt, vt cum his sint magis strenui ad coitum. Habetis carduos artischoccos appellatos, quos potestis edere cum modico piperis albi, & modico salis. Cum semen frigidum est, & expultrix debilis: quaerendi sunt cibi varij, pro diuersitate causarum. Condiuntur cibi modo melle, modo lacte, modo butyro: vnde conferunt oua frigida, cum butyro: cepa frigida cum saccharo, & etiam cum vino. Compositio sequens optima est: eo tamen obseruato, vt fiat varia decoctio, cum variis, pro diuersitate causarum: R. pinearum, amygd. dul. pistaciorum an. ʒ j. dactylorum ping. castanearum, cunctan. an. ʒ ʒ. testiculi maioris canini, id est, radicis maioris scabios, cerebri passerum, an. ʒ ij. cauda scinci ʒ ij ʒ sem. anisi, feniculi, urtica: eruca, pastinace, an. ʒ ʒ. Decoquantur omnia, vel in lacte, vel in vino dulci, seu antiquo, seu musto, praecipue cum flatu multiplicare volumus: vel decoctio fiat cum melle, & saccharo: in fine decoctionis adde piperis albi, Zingiberis, galanga, an. ʒ j. moschi ʒ ʒ. Misce, & fiat confectio: qua potestis vti tribus, vel

Vel quatuor diebus ante coitum, ad quantitatem $\frac{3}{4}$ β. vel $\frac{3}{4}$ j. non modo semel, sed vel bis in die. Potus respondeat. *Vinum Potus.* optimum fit, cum est defectus spirituum vel sanguinis. Mustum flatu multiplicat. Quoad animi accidentia: fugiantur tristitia: absint spectacula, colloquia, lectiones rerum Venerearum.

CAPVT XXXV.

De Priapismo, vel Satyriasi.

PRIAPISMVS est colis affectus, admodum periculosus, & molestus, capite vltim. libro 6. de loc. affect. capit. 1. libr. 2. metho. capit. 4. libro tertio, de symptom. caus. Per priapismum autem Galenus intelligit affectum, in quo penis præter voluntatem erectus permanet. Paulus ait, hoc affectu virgam pati tensionem inuitam, citra palpitationem: si autem cum tensione, alsic etiam palpitatione, tunc vocat Satyriasi. Sed apud Galenum, siue sit palpitatione, siue non, modo penis tensio sit inuita, dicitur Priapismus, vel Satyriasis. Quidam definiunt, quod sit erectio virgæ inuita: quæ nominis saltem declaratio est, non definitio, ac si diceremus, indumentum esse vestimentum. Priapismus igitur est actio deprauata facultatis motricis inuitæ colis, dependens à tumore permanente vaporoso. Forma est actio deprauata: quia fit erectio, quæ fieri non deberet: estque inuita. & præter voluntatem. Cum autem omne symptoma referatur in morbum: hoc refertur in tumorem permanentem colis: per quam particulam distinguitur ab eo tumore penis, qui est affectus in compositione, in magnitudine aucta, quæ fit tempore coitus: talis enim tumor & erectio non permanet, sed perit post coitum.

Nomen.

Definitio.

Hic autem tumor non est inflammatorius, nec scirrhusus, sed flatulentus, & vaporosus, qui pendet à materia vaporosa. Vapor hic duplex esse potest: vel Spirituosus & vitificus, vel Flatulentus, qui in neruo colis detinetur. Crebrius fit priapismus à spiritu, quam à flatu. c. vlt. l. 6. loc. aff.

Causa efficiens.

Fit autem tum à spiritu, tum à flatu, ratione horum vel Copiæ, vel Qualitatis. Fit enim priapismus, quando arteriæ ad colē deuenientes, secundum sua orificia aperiantur, vnde maxima

Arteriarum visum.

noctu eiecisse semen, non autem in coituratione: quia semen est crassum, & e parte frigidum: unde noctu, cum calor vigeat in interioribus, aperta sunt vasa seminaria, & eiectum semen: tempore autem coitus, cum externae partes sint calidiores, internae frigidiores, vasa, ratione frigiditatis, aperiri non potuerunt, nec semen circulari. Hunc se curasse Aetius gloriatur calefacientibus, & cum castorio. Si oriatur vitium, quia semen non peruenit ad fistulam, cum hoc fiat ob cicatricem: si dura est cicatrix, & inueterata, nihil agendum: si recens, intromittatur *candela cerea, oblita cum medulla ceruina, vel bouis, cum adipe, addaturque moschi, ambra, &c.* Si vitium sit in languida expultrice: si obstructi sunt nervi: conueniunt deobstruentia, vt in paralyfi. Si autem fiat ratione paralyticos illorum musculorum: conueniunt ea quae tollunt paralyfin.

Diat.

Cibus & potus medicamentis respondeant. Quare si defectus est sanguinis & spirituum, profunt ea, quae gignunt sanguinem copiosum, & spiritus: vt caro pullorum, caponum, phasianorum, ova sorbilia, testes gallorum. Si flatus sunt gignendi: prodest *cibus cum iure cicero, cum eruca, cum seminibus pastinaca, rapa, cum hormino.* Si opus sit semine magis acri, ad facultatem quasi sopitam irritandum: sunt pisces ostreae, legumina. Cibi etiam aromatibus condiendi. Vnde monachi hoc habent pro secreto: accipiunt columbos & decoquunt cum macere: sic etiam capones decoquunt, vt cum his sint magis strenui ad coitum. Habetis carduos artischoccos appellatos, quos potestis edere cum modico piperis albi, & modico salis. Cum semen frigidum est, & expultrix debilis: querendi sunt cibi varij, pro diuersitate causarum. Condiuntur cibi modo melle, modo lacte, modo butyro: vnde conferunt *oua frigida, cum butyro: cepa frigida cum saccharo, & etiam cum vino.* Compositio sequens optima est: eo tamen obseruato, vt fiat varia decoctio, cum variis, pro diuersitate causarum: R. *pinearum, amygd. dul. pistaciorum an. ʒ j. dactylorum ping. castandarum, auelan. an. ʒ ʒ. testiculi maioris canini, id est, radium maioris orchios, cerebri passerum, an. ʒ ij. cauda scinci ʒ ij ʒ. sem. anisi, feniculi, urticae, eruae, pastinaca, an. ʒ ʒ. Decoquantur omnia, vel in lacte, vel in vino dulci, seu antiquo, seu musto, praecipue cum flatus multiplicare volumus: vel decoctio fiat cum melle, & saccharo: in fine decoctionis adde piperis albi, Zingiberis, galanga, an. ʒ j. moschi ʒ ʒ. Misce, & fiat confectio: qua potestis vni tribus, vel*

Vel quatuor diebus ante coitum, ad quantitatem $\frac{3}{4}$ β. vel $\frac{3}{4}$ j. non modo semel, sed vel bis in die. Potus respondeat. Vinum Potus. optimum sit, cum est defectus spirituum vel sanguinis. Mustum flatum multiplicat. Quoad animi accidentia: fugiantur tristitia: absint spectacula, colloquia, lectiones rerum Venerearum.

CAPVT XXXV.

De Priapismo, vel Satyriasi.



PRIAPISMVS est colis affectus, admodum periculosus, & molestus, capite vltim. libro 6. de loc. affect. capit. 2. libr. 2. metho. capit. 4. libro tertio, de symptom. caus. Per priapismum autem Galenus intelligit affectum, in quo penis præter voluntatem erectus permanet. Paulus ait, hoc affectu virgam pati tensionem inuitam, citra palpitationem: si autem cum tensione absit etiam palpitationem, tunc vocat Satyriasi. Sed apud Galenum, siue sit palpitationem, siue non, modo penis tensio sit inuita, dicitur Priapismus, vel Satyriasis. Quidam definiunt, quod sit erectio virgæ inuita: quæ nominis saltem declaratio est, non definitio, ac si diceremus, indumentum esse vestimentum. Priapismus igitur est actio deprauata facultatis morricis inuitæ colis, dependens à tumore permanente vaporoso. Forma est actio deprauata: quia sit erectio, quæ fieri non deberet: estque inuita, & præter voluntatem. Cum autem omne symptoma referatur in morbum: hoc refertur in tumorem permanentem colis: per quam particulam distinguitur ab eo tumore penis, qui est affectus in compositione, in magnitudine aucta, quæ sit tempore coitus: talis enim tumor & erectio non permanet, sed perit post coitum.

Nomen.

Definitio.

Hic autem tumor non est inflammatorius, nec scirrhusus, sed flatulentus, & vaporosus, qui pendet à materia vaporosa. Vapor hic duplex esse poreit: vel Spirituosus & viuificus, vel Flatulentus, qui in neruo colis derinetur. Crebrius sit priapismus à spiritu, quam à flatu. c. vlt. l. 6. loc. aff.

Causa efficiens.

Fit autem tum à spiritu, tum à flatu, ratione horum vel Copiæ, vel Qualitatis. Fit enim priapismus, quando arteriæ ad colē deuenientes, secundum sua orificia aperiantur, vnde maxima

Arteriærū visum.

copia spiritus procumbit in neruum fistularem colis. Ad hanc igitur nimiam apertionein orificiorum, cum ad vitium principale respiciens Gal. refert priapismum in morbum arteriarum. Nos autem ad tumorem eum referimus, respicientes ad vitium proximum. Si ergo copiosiores sunt spiritus & semen, ut plus iusto aperiantur orificia arteriarum: in tumescit penis: quod accedit iis, qui soliti sunt uti Venere, & postea interiniferunt. Ideo in athletis non periculum de priapismo, licet habeant robustum corpus: nec enim generant semen copiosum, licet abstineant a Venere. Sic igitur priapismus a spiritibus fit, ratione copiae. Accedit etiam hoc ratione qualitatis, cum semen redditum est acre: ut ratione acrimoniae & tenuitatis, aperiantur orificia arteriarum, quibus apertis, spiritus in illas pariter confluunt, & causant priapismum: quod illis accedit, qui patiuntur gonorrhoeam, e semine acriori, & qui utuntur acri victus ratione. Fit etiam hoc vitium ratione flatuum aperientium orificia arteriarum & venarum: quibus apertis, erumpunt spiritus, una cum flatu, ut fiat priapismus. Et hoc dicit Galenus accidisse illi, qui non consuetus erat se cingere, & deinde se cinxit: in eo enim flatus multiplicati sunt, ob aperta arteriarum orificia. Ob has causas tumor fit in priapismo ratione spirituum.

*Colis vi-
rium.*

Fit etiam a flatibus, qui generantur in ipso neruo fistulari: & dupliciter generari possunt: primo ratione imbecillitatis colis, secundo ratione materiae. Ratione imbecillitatis generantur: cum partis illius calor redditur debiliior. Ratione materiae: si ab aucto penis calore, attrahatur materia cruda & frigida, quae neque a fortiori partis calore elaborari possit. Unde flatu non tantum generantur a calore debili, sed etiam fortiori, quia materia mala resistit calori. Hinc colligit Auiicennas hoc vitium fieri in iunioribus, non pueris, nec senibus, quando delinquant in victus ratione: ob id ratione alimenti non possunt undiqueque boni flatu generari: ratione autem caloris fortis potest fieri tensio ob nimiam laxitatem partis: in senibus autem fieri nequit, ob frigiditatem magnam.

*Dubia qua-
dan.*

Sed oritur dubitatio: cum priapismus sit erectio penis inuita: quomodo Galenus capite ultimo, libro sexto, loc. affect. dixerit, priapismum fieri e concepta libidine? Notandum, desiderium libidinis posse esse, nobis volentibus, &
nobis

nobis inuitis. In priapismo ergo est erectio virgæ, sine desiderio libidinis, vel cum desiderio, nobis tamen inuitis. Dubitatur etiam: quare Galenus dicat priapismum esse symptoma. capite 4. libro 3. de causis symptomatum. capite ultimo. lib. 6. loc. aff. contra autem, esse tumorem & morbum, c. 7. & 8. l. 14. meth. Hæc enim contradictio esse videtur. Responsio. Si priapismus, consideretur, formaliter est symptoma: si effectiue, est morbus, quatenus hoc symptoma dependet à tumore, vt à causa efficiente. Galenus ergo cap. 4. lib. 3. de causis symptomatum. dicit priapismum esse symptoma, quia loquitur de causis symptomatum: at libr. 14. meth. considerat priapismum, vt morbum, quia ibi docet indicationes & artem curatiuam, nullæ autem indicationes proprie sumuntur à symptomate. Alia difficultas est: nam c. ult. lib. 6. loc. aff. inquit Galenus, se vnum vidisse, qui sit passus priapismum è flatibus: duos tamen curauit. Responsio. Flatus possunt dupliciter generari, vel vitio agentis, ob debilem calorem colis: vel vitio materiæ flatulentæ. Si considerentur flatus quatenus producuntur vitio agentis: hic priapismus rarissime fieri potest: quia partes cum sunt frigida, non ita facile possunt tendi. Si vero flatus generentur ratione materiæ: priapismus frequenter fieri potest: de quo Galenus loquitur, duos se curasse dicens.

Priapismus fit vitio vel Arteriarum, vel Colis. Si vitio arteriarum: fit à spiritu, quia officia vasorum aperiuuntur, vel ob semen copiosum, vel ob acre, vel ob flatulentum. Si vitio colis fiat: fit ratione flatuum, qui generantur, aut ratione Partis, ob debilem calorem, aut ratione Materiæ. Hinc Paulus dicit, priapismum esse vitium necessario compositum, quia non est semper inflatio adiuncta. Præterea est vitium vehemens secundum quid, non simpliciter: ratione partis, habentis consensum cum principibus partibus: est vitium acutum, & diuturnum: vnde Paulus cucurbitulas admoendas esse dicit: non autem est diuturnum è propria natura: sed cum adest inflatio: vnde diuturnitas est ratione inflationis, non ratione priapismi. Præterea est vitium particulare & determinatum, si consideretur ratione symptomatis: est enim actio deprauata colis, erectio inuita: at si consideretur ratione morbi, id est, tumoris, non est vitium determinatum, sed indeterminatum, quia etiam potest alias partes occupare.

Diffusio

Signa.

Priapismus in genere facile cognoscitur: quia colis rigidus permanet, citra desiderium libidinis, neque tumor ita delitescit, est enim rubicundior. Differentiæ distinguuntur e cap. ult. lib. 6. de locis affect. Si nulla sit palpitatio in cole, & maxime lædatur à medicamentis calidis: dicendum, esse priapismum e vapore confluentem. Contra, si pendeat à materia flatulenta, quæ genita sit in cole: aderit palpitatio, & inuabitur à calidis, flatusque dissoluentibus. Quod si cognoscatur priapismus factus esse, ex affluente materia vaporosa: confluit hæc materia, quia orificia arteriarum aperiuntur, vel ob seminis copiam, vel ob eiusdem acrimoniam, vel ob flatus impetu quodam in illas partes erumpentes. Si sit e copia seminis: præcessit abstinencia à coitu: præcessere causæ & cibi semen generantes. Si sit e seminis acrimonia: præcessere indicia seminis acrioris, cibi acres, conditi aromatibus, & quibus sanguis fuit redditus acrior, & sic etiam semen: præterea est feruor in renibus. Si fiat e flatibus: cognoscitur, quia homines præter consuetudinem cincti fuerunt: cuius ligaturæ causa flatus fuerunt detenti: postea soluto ligamento cum impetu prorumpunt in illas partes, e quo impetu aperiuntur orificia arteriarum, ut flatus illi deueniant in partes colis, & tensionem faciant. Si vitium pendeat e materia flatulenta, quæ genita fuit in pene: cognoscitur e palpitatione. Si flatus generatus sit ob partis debilitatem, nimirum ob colis intemperiem, seu calorem debilem: tunc præcessit pigritia ad coitum. Si autem malum sit e vitio materiæ, adest potius caliditas in pene, ita ut ratione insignis caloris facta fuerit attractio materiæ, quæ cruda est & mala e propria natura, ut neque ab insigni calore possit elaborari.

Alij existimant, cinctura cōprimens lumbos ca- d. fieri.

Indicationes.

Priapismus dependet à tumore vaporoso, cuius ratione periculum inflammationis imminet: ad quam prohibendam, oritur indicatio refrigerandi colem. Quoad vaporem, non considerata inflammatione: perpendi debet vapor qui actu est in cole, & qui non est actu in cole. Ratione vaporis, actu existentis in cole, adest indicatio illum absumendi, & dissoluedi. Quoad prohibitionem, ne rursus vapor in cole reperiatur, nullæ sunt indicationes: quia (ut diximus) hic vapor vel affluit, vel in cole generatur. Affluit, ob apertionem orificiorum vasorum: prouidendum igitur, ne orificia magis aperiuntur, cum autem apertio procedat à copioso semine:

semine: semen copiosum genitum, vacuandum per coitum: & ne amplius gignatur in tanta copia, occurrendum cibis, non generatibus semen copiosum. Si pendeat à semine acriter temporaneum. Si à minimo impetu spirituum & flatuum: ille impetus est tollendus: ideo partes cinctæ & ligatæ sunt dissoluendæ. Si generatur flatus in cole, ratione agentis, id est, caloris debilis: est indicatio calefaciendi. Si ratione materiæ, quia tunc concurrat calor auctior, refrigerandum: ratione autem materiæ crudæ, crassæ, frigidæ: calefaciendum, extenuandum, incidendum.

An autem his possimus satisfacere, colligitur è Galeno, *Prognostici* cap. ultimo, lib. 6. loc. affect. cap. 7. lib. 14. meth. Licet enim *ca.* hoc vitium curationem admittat, non tamen est sine periculo. Hinc Aëtius inquit esse malum maxime periculosum, cum procedat è copioso semine, quia quandoque fiunt convulsiones insignes, syncope, refrigerationes partium, tandemque mors.

Ad imminuentem phlegmonem arcendum, probatur venæsectio: omnes secant venam cubiti, non inferiorem. In hoc enim affectu capimus indicationem venæsectionis potius à repletionem totius, quam partis affectæ: quia in priapismo illo, qui est sine inflammatione, oritur hoc vitium à materia vaporosa, quæ non euacuatur per venæsectionem: ideo venæsectio respicit euacuationem totius: unde eligendus locus, per quem commodè totum vacuari potest: hic autem locus est superior, ideoque commodè vena cubiti secari potest. Accedit quod hoc etiam fit ratione multitudinis sanguinis, pendentis à iecore: unde per venas superiores reucllitur sanguis, & inflammatio imminens tollitur. Si esset inflammatio in pudendo: conueniret venæsectio inferior. Interdum conuenit cucurbitula scarificata, coli admodum, non ratione priapismi, sed ratione inflammationis, quæ aliquando priapismo est coniuncta. In tali igitur casu, in declinatione, toto expurgato, potest admodum cucurbitula: sed est remedium admodum molestum: ideo melius erit uti aliis.

Curatio.
Venæsectio

Cucurbitula.

Quoad medicamenta communia: probatur usus soluentium, cum horum ratione fluxiones causentur, ad partes coli vicinas. c. 9. lib. 9. x. rōx. c. 8. l. 14. meth. Et sic multo magis improbanz diuretica. Vomitoria maxime conueniunt. In iis autē qui non facile vomunt, uti possumus soluētibus, sed

Medicamenta.
Vacuatiua.

sed ea sunt leuiora : vt *mel ros. sol. syr. ros. sol. fena, ad melaucha-*
Alteratia. liam : rheum, ad bilem : agaricus ad pisnitam. Quoad peculia-
 ria : Galen. proponit refrigerantia , calefacientia , & at-
 tenuantia. Quidam autem dicunt, non ita libere calidis esse
 vtendum, quod vim habeant aperiendi orificia arteriarum;
 vt malum augeatur. Nos pro Galeni defensione dicimus:
 vtendum esse calidis, sed frigidis admistis. Præterea concedo
 si priapismus fiat à vapore confluyente, quod non cūueniant:
 attamen non improbantur in priapismo , qui sit è vapore,
 genito in parte, ratione materiae : quæ tamen medicamenta
 calida sint moderate. Si igitur priapismus fiat ratione vapo-
 ris confluentis: vtendum refrigerantibus, vt est *oleum ompha-*
cinum : & *ratione penetrationis additur aliquid aceti, vel aliquid*
succi polygani. His refrigerantibus possumus inhibere phle-
 gmonem, & impetum spirituum, & claudere orificia arteria-
 rum. Sed præter hæc respiciendum ad causas seminis copiosi;
 ad acrimoniam seminis, ad impetum spirituum. Vnde Pau-
 lus ait, priapismi curam coincidere cum cura gonorrhœæ:
 quia ratione seminis copiosi, vtendum est propositis in go-
 norrhœa è copioso semine. Idem dicendum de acri semine.
 Ratione spirituum, impetum facientium, oportet resoluerè:
 & præcipue curare, vt cincturæ laxentur. Ratione vaporis
 iam influxi in penem, vtendum resoluentibus temperatis;
 quæ non excedant primum caliditatis gradum : vnde pro-
 dest *fomentum è chamamelo, sem. lini, foliis malua, meliloti.* Fla-
 tus proprie dicti, indigerent valentioribus : sed ad spiritus;
 qui non sunt veri flatus, his propositis vtendum. Si materia
 genita sit in cole, & quidem vitio agentis : tunc vtendum
 calefacientibus : excepto principio: quia in principio occur-
 rendum temperatis, vt *ut oleo rosac. completo,* quo inhibeatur
 inflammatio. Deinde cum calidis & extenuantibus progredi-
 endum : tunc enim non est periculum, vt aperiant magis
 orificia vasorum, quia in hoc priapismo non sunt aperta: vn-
 de vtendum *oleis chamameli, ruta, lil. alborum, cum aromatibus:*
 & *fomentis è chamamelo, è foliis & baccis lauri, è feniculo, ani-*
so. Si autem ratione materiae flatus oriatur in pene : medica-
 mentis totum respicientibus occurrendum, ne materia gi-
 gnatur. Ratione materiae impactæ, vtendum calefacienti-
 bus, & extenuantibus. Et quia temperies partis calidior est,
 ideo vtendum moderate refrigerantibus : & in hoc casu
 vtendum moderatis, vt *fomento è chamamelo, è malua.* Si nia-

xime vrgeat caliditas partium : moderate refrigerantia adhibenda, secundum Galenum, vt *ol. ros. completum*, nec ascendendum ad lactucam. Medicamentis etiam remisse calfacientibus, extenuanda est ac dissoluenda materia, quia tunc non adest periculum inflammationis : temperatis igitur vtendum, & sensim ad validiora ascendendum, vt *ad rutam, anisum, feniculum*. Hæc sunt medicamenta extrinseca. Intrinsecus conueniunt, proposita in gonorrhœa.

Victus sit tenuis, quia morbus acutus. Modo sit calefaciens & extenuans : modo refrigerans & crassefaciens. Refrigerans quidem, si priapismus sit è spiritu confluente, vbi officina claudenda : item cum pendet à semine acriori. Calefaciens autem, cum pendet à flutu, genito in cole, ob frigiditatem, cum debilitate colis. Tali victu vtendum quamprimum, & post purgationem corporis. De potu idem dicendum : qui modo sit refrigerans, & crassefaciens, vt *potus vini austeri* : modo calefaciens, & extenuans, vt *vinum dulce*. Hoc accipiat de declinatione : nam inter initia à vino abstinendum, cum immineat inflammatio. Dieta.



PRACTICÆ
MEDICINÆ,
 LIBER QVARTVS.



DE VTERI AFFECTIBVS, SEV
 MORBIS MVLTIEBRIBVS.

CAPVT I.

*Vitiōrum matricis enumeratio : & primum de
 Mensibus præter naturam cohibitis.*

*Divisio
 partium
 corporis hu-
 mani.*



ARTES corporis humani, aliæ
 conferunt ad conseruationem Indi-
 uidui, aliæ ad conseruationem Spe-
 ciei. Quæ ad indiuidui conseruatio-
 nem conferunt, aliæ conferunt ad
 Vitam, aliæ ad Bene viuere. Quæ ad
 vitam, sunt Cerebrum, Cor & Ie-
 cur. Quæ ad bene viuere, sunt Ocu-
 li, Aures, Nares. Quæ ad conserua-

tionem speciei conferunt, sunt Testes & Pudenda: in scæmi-
 nis est Matrix, seu uterus. Galen. ab init. lib. 14. de vs. part.

*Vterus qui-
 bus affe-
 ctibus præ-
 hendatur.*

In præsentia nos de vteri vitiis agemus. Accipitur autem
 uterus duobus modis: primo, vt est pars viuens, conueniens
 cum aliis partibus viuentibus: secundo, vt est pars viuens,
 sed destinata. Si primo modo accipiat uter, capitur vt
 instrumentum alicuius facultatis: nam secus non potest esse

pars

pars viuens. Vt autem uterus est organum facultatis, potest esse organum simile, vel dissimile. Quare uterus obnoxius est morbo in intemperie, in soluta unitate, & in mala compositione: quatenus scilicet consideratur, vt pars viuens, sed indifferens. Si autem secundo modo accipiat, vt pars determinata; secundum hanc rationem respicit conseruationem speciei, non autem indiuidui. Et hoc modo uterus destinatus est purgationi menstruum, conceptioni, atque partui. Quare loquimur de læsa purgatione, de læsa conceptione, & de læsa parturitione. Quod si vteri functiones lædantur: hoc fit læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læsa facultate: propter morbos. Vnde si dixerim de his læsis actionibus, necessarium etiam erit, vt dicam de omnibus morbis vteri. Nam quātum læsam vteri purgationē menstruam attinet: hæc purgatio læditur, vel quia Aufertur, vel quia Imminuitur, vel quia Corruptitur. Si aufertur, huius ratione dicendum est de suppressis mensibus. Si imminuitur, dicendum de imminutis mensibus. Si deprauatur, bifariam hoc contingit: primo, quia sanguis egreditur: secundo, quia alia materia à sanguine egreditur. Si primo modo, corruptitur purgatio, vel ratione copię, vel ratione modi exeundi. Si ratione copię, huius causa dicemus de profluuiio mensium. Si peccatum est penes modum, huius gratia loquimur de stillicidio mensium. Si autem corruptitur purgatio, quia egreditur alia materia à sanguine: agendum erit de coloribus mensium: id est, de profluuiio albo vterino. Et hæc vitia sunt læsæ purgationis. Conceptio, vel Aufertur, vel Imminuitur, vel corruptitur. Causa ablatae conceptionis, loquimur de sterilitate. Causa imminutæ conceptionis, agemus de tarda & rara conceptione. Merito deprauatæ conceptionis, loquimur de foetu imbecilli, de mola, de monstro. Parturio potest Auferrī, Imminui, aut Corrupti. Gratia ablatae parturitionis, loquimur ad abortu: Causa imminutæ, loquimur de tarda parturitione. Causa corruptę, de difficultate partus, cum foetus aliquando editur mortuus, dolore acerbissimo: vel secundinæ relinquuntur. Et hi sunt particulares vteri affectus: quatenus matrix speciei conseruationem spectat: Si vero consideretur ratione indiuidui: communia vitia sunt præfocatio, inflammatio, vlcus, &c. De quibus ordine deinceps loquimur.

*Purgatio-
nis men-
struæ vi-
tia.*

*Conceptio-
nis vitia.
Parturi-
tionis vi-
tia.*

Communia.

De suppressis mensibus, id est de Purgatione ablata.

Nomen. Suppressorum mensium causa vehementior est : imminutorum minus vehemens. Quare suppressio & imminutio differunt tantum secundum magis & minus. Voco potius menses suppressos, quam suppressionem mensium. Suppressio enim est actio laesa, at menses suppressi, sunt excrementum mutatum. Rectius vitium hoc donatur nomine excrementi, quam actionis : quia excrementum refertur in

Definitio. actionem, & eam sequitur : non contra. Menses ergo præter naturam suppressi nihil aliud sunt quam excrementum sanguinolentum cohibitum præter naturam vteri, dependentis ab expulsionione ablata. Forma, est excrementum sanguinolentum præter naturam cohibitum. Dicitur excrementum : quia in præsentia formaliter sermo est de symptoma, quod non est actio laesa, non qualitas mutata. Est autem symptoma secundum, quod sequitur primum, nimirum actionem laesam. Unde actio laesa habet rationem causæ efficientis, symptoma habet rationem effectus, seu operis.

Excrementum. Hoc autem opus potest esse duplex : Vel enim egreditur, quod non deberet egredi, & est exiens, vel non egreditur, quod deberet egredi, & non est exiens, sed excrementum. Quapropter in definitione dixi esse excrementum, ad

Sanguinolentum. differentiam exeuntis. Hoc autem excrementum est sanguinolentum. Dixi, præter naturam : ad differentiam excrementi sanguinolenti, quod non egreditur quidem, non est tamen vitiosum, non est symptoma, quia præter naturam non detinetur, veluti sanguis menstruus, qui non effluit, tempore gestationis fœtus : tempore etiam, quo mulieres lac exhibent : hic, licet detineatur, non est tamen præter naturam, nec est vitium, de quo loquimur. Dixi, præter naturam cohibitum : in hoc enim malo sanguis non semper detinetur in vtero : quandoque in vtero, quandoque in reliquo corpore : quandoque fluit ad vterum, quandoque non : Et, si fluit, quandoque transmittitur in alias partes. Dum ergo dicimus excrementum cohibitum : hæc vox est generica, cuiuslibet suppressioni sanguinis præter naturam conueniens, siue reperiatur in venis vteri, siue non reperiatur. Unde ex his facile colligi potest, excrementum sanguinis præter naturam cohibitum, nihil aliud esse, quàm corpus quoddam, quod

quod recedit à sanguine menstruo secundum naturam se habente. Tenenda igitur est natura sanguinis menstrui secundum naturam.

Quare sanguis menstrui est excrementum sanguineum, *Sanguis*
genitum à calore foeminae, propter speciei conseruationem. *menstruus*
Dicitur excrementum: quia hic sanguis nec quantitate, nec *secundum*
qualitate prodest foeminae: nec enim eo nutritur. l. de atra *naturam,*
bile. Est ergo quid superuacaneum: uile tamen, gratia spe- *quid.*
ciei: quia secundum Auicennam tres sunt partes huius san-
guinis, duae benignae, una maligna. Altera benigna conuer-
titur in alimentum foetus: altera in lac mutatur: maligna de-
tinetur in utero, ad tempus usque partus. Causa efficiens, est
calor foeminae, remissior quam calor maris cap. 5. lib. 2. de
sem. cap. 6. lib. 14. de usu part. Foemina enim omnis natura
frigidior est mare bene constituto: unde foemina non potest
esse amphidexia, quod contingit in corpore robusto, calidio-
re, cuiusmodi non potest esse foemina. comm. aph. 43. sect. 7.

Cur autem calor foeminae, & non maris, aptus esse possit ad
generationem sanguinis menstrui, patet à Galeno, loco ci-
tato. & cap. 2. lib. 3. de caus. puls. nam ad generandum sangui-
nem excrementitium superfluum, opus est quidem calore
generante, non autem dissipante ac dissolvente: talis est re-
missior, seu mitior: intensus quippe dissipat. Quare statutum
sit generari hunc sanguinem à calore foeminae, id est, debi-
liori. Neque obstat, licet Hippocrates lib. de morb. mul. vi-
deatur asserere, foeminam esse calidiorē mare: unde & Ga-
lenus lib. 3. de caus. puls. dicit, foeminis pulsus esse frequen-
tiores. Dicit Hippocrates, foeminas esse calidiores, quia san-
guinem habent calidiorē: & esse calidiores uiris, quia ha-
bent sanguinem calidiorē uiris: ita ut sanguis non pendeat
à caliditate foeminae: sed contra caliditas foeminae pendeat à
caliditate sanguinis: nec enim dicit Hippocrates: foeminam
ideo habere sanguinem calidiorē, quia foemina est cali-
dior: insinuat enim caliditatem non natiuam, sed ascititiam,
pendentem à sanguine calidiorē. excrementitio ac super-
fluo. Quia igitur sanguis foeminae est calidior, & hic magis
redundat in foemina, quam in masculo: ideo, quoad, asciti-
ciam caliditatem foemina est calidior mare: licet hic calidior
sit illa, quoad caliditatem natiuam. Et haec etiam de causa,
pulsus foeminis est frequentior. Causa finalis generationis

*Quomodo
foemina di-
catur cali-
dior mare.*

preterea sanguis exsuperare nequeat, lib. 14. vsu par: In mediis ætatibus copiosior generatur sanguis, vnde venæ sunt amplæ: & propterea expedit pro salute fœminæ, vt hoc tempore effluat. Cur autem singulis mensibus effluit hic sanguis? vt Hippoc. ait lib. de septim. & octim. partu. Quia non conueniebat assiduo fluere, sed per intervalla mediocria. Licet enim sanguis ille secundum aliquas portiones sit benignus, secundum aliquas tamen est satis noxius: ideoque diu detineri non potest, citra noxam fœminæ. Cum ergo fœmina statui quodammodo possit parvus mundus: non fuit abs re, vt secundum motus Lunæ, & proinde quolibet mense, sanguis hic egrederetur. Egreditur autem secundum leges naturæ in debita quantitate, & per aliquot dies. Debita mensura, ex Hippocrate, est quantitas lbj β. dies sunt tres: quatuor fœminæ etiam sanæ, per pauciores interdum dies purgentur: id quod contingit pro copia & qualitate sanguinis: prout enim sanguis est copiosior, ita etiam in maiori quantitate effluit, & per plures dies: sic calidior, tenuior, paucioribus diebus effluit: contra, frigidior, crassior.

Cur singulis mensibus sanguis hic effluat.

Quantum egredietur sanguinis menstrui & quantum.

Ex his colligitur, tunc menses esse præter naturam suppressos quando in fœmina sanguis non fluit, sed detinetur ab anno decimotertio ad quinquagesimum, dummodo non sit vtero gerens, dummodo non lactet infantem. His non existentibus, si sanguis non effluat: morbosum est, & præter naturam. Quare in definitione, ratione causæ formalis, rectè diximus: mensium suppressionem violentam esse excrementum sanguinis cohibitum præter naturam. Subiectum est vterus: vnde diximus, esse excrementum vteri: ad differentiam sanguinis, qui per alios ductus effluit, per os, per nates.

Suppressi menses præter naturam.

Subiectis.

Quoad causam efficientem, diximus, dependere ab expulsionem ablata. Malum hoc, est symptoma secundum, nimirum excrementum, quod sequitur primum, nimirum actionem læsam, id est, expulsionem ablatam. Dum enim menses secundum naturam se habent, egreditur hoc excrementum, & proinde ab expultrice expellitur: contra, si præter naturam se habent menses, & cohibeantur, necessarium est, expultricem frustrari, ita vt actio auferatur, quia in præsentia loquimur de mēsis e toto suppressis. Porro laeditur actio, id est, auferetur expulsio, quia frustratur expultrix.

Causa efficiens mensium suppressionem, est ablata expulsio.

*Laesio fa-
cultatis ex
pulvericis,
ob vteri
morbos.*

Frustratur expultrix, vel Laesa facultate, vel ob Errorem exter-
num. Laesio facultatis nil aliud est, quam morbus: de qui-
bus morbis loquitur Galenus com. aph. 28. & 57. sect. 5. cap. 4.
lib. 3. de symp. caus. Morbi vteri, alij Proprij sunt, qui pro sub-
iecto per se habent corpus vteri; alij non Proprij, qui occu-
pant ligamenta, ceruicem vteri, venas & vasa, quæ potissi-
mum ad collum vteri pertinent. Notandum autem nos in
præsentia loqui de qualibet suppressione mensium violenta,
præter naturam. Multis enim modis fieri potest, ut sanguis
non erumpat. Primo, si fluit quidem in vteri regionem, sed
ob impedimentum in vtero, non egreditur, sed retinetur.
Secundo, si sanguis à toto quidem transmittitur in vterum,
sed is ab vtero non recipitur, verum transmittitur in alias
partes: vnde egreditur non per vterum, sed interdum per na-
res, interdum per os, interdum per alias vias. Tertio, si non
fluit, nec transmittitur in vterum. De his ergo omnibus
mensium suppressionibus loquemur in genere, non tantum
causa sanitatis fœminæ, sed etiam causa conseruationis spe-
ciei: dum enim sanguis in vterum fluit, sed non euacuatur,
est in causa, ut morbo corripatur fœmina: dum vero san-
guis non egreditur per vterum, sed per os, vel nares, vel
etiam si omnino non fluit, licet hoc non afferat fœminæ de-
trimentum, nocet tamen conseruationi speciei, quia turba-
tur conceptio. His ita constitutis, morbus, qui causa est sup-
pressionis mensium, interdum est mala compositio, ut ex-
cludatur soluta vnitās, & intemperies: interdum est intem-
peries. Si enim menses supprimantur, quia sanguis recipitur
quidem in vtero, sed propter impedimentum non potest
effluere: tunc locum habet tantum mala compositio. Si au-
tem menses supprimantur, quia sanguis in alias partes trans-
mittitur, excipitur quidem soluta vnitās, sed non intempe-
ries: nam si menses supprimantur, quia sanguis fluens in vte-
rum propter impedimentum aliquod nō egreditur, hoc non
potest prouenire à soluta vnitāte, quia soluta vnitās est po-
tius in causa, ut magis effluat sanguis. Neq; etiam intēperies
est proponenda: nulla enim dyscrasia immediate, id est, citra
alium morbum, potest esse in causa, ut sanguis detineatur.
Intemperies autē potest esse causa alterius morbi, qui mor-
bus nihil aliud est, quam mala compositio, morbus in via,
qui in genese potest vocari angustia. Hæc angustia, quatenus
pertinet ad poros vteri, vocatur densitas: ut pertinet ad orifi-
cia

*Retentio
sanguinis
qui in vte-
rum iam
influxit.*

ſcia vaſorum vteri, retinet nomen generis & dicitur anguſtia. Denſitas ſit à frigido: cum frigido autem interdum iungitur ſiccitas, interdum humiditas, aliquando neutrum. Denſus ſit vterus, ſi cum frigido vel neutrum iungatur, vel humiditas: Durus ſit, ſi annectitur ſiccitas. Denſitas eſt morbus in via: durities non eſt morbus, ſed ſymptoma, qualitas mutata, producta non ab intemperie propoſita tantum, ſed etiam à materia frigida pituitoſa, à materia melancholica. Præterea producitur denſitas à cauſa externa, maxime à frigidis medicamentis applicatis, à frigidiore aëre, dum præſertim vterus frigido aëri occurrat tempore menſium, tempore partus, hoc enim tempore vterus facillime patitur. Anguſtia, quæ cauſa eſt ſuppreſſorum menſium, multiplex eſſe poteſt: nimirum obſtruſtio, coaleſcentia, conſtipatio, compreſſio, & ſubſidentia. Obſtruſtio producitur à materia craſſa, copioſa, viſcida. Coaleſcentia ſit poſt vteri vlcera, quæ, dum ad cicatricem perducuntur, ſit vt vaſa coaleſcant. Conſtipatio fieri ſolet ob carnem annatam, ob pelliculam ab Actio propoſitam, quæ vteri os claudit. Compreſſio fieri poteſt à tumoribus vicinarum partium, & ab omento pinguiori reddito. Subſidentia euenit, quoties vterus loco mouetur, ſiue diſtorqueatur ad latera, ſiue occultetur ſub rectum inteſtinum. Hi ſunt morbi, ob quos ſupprimuntur menſes, eo quod ſanguis influxus detinetur in vtero, & non poteſt expelli. Sequuntur morbi, vi quorum ſanguis per vterum non egreditur, non quia detinetur in vtero, ſed quia ab vtero in alias regiones expellitur: vnde interdum contingit ſputum ſanguinis, interdum fluxus narium, interdum quippiam aliud. Proinde è Galeno cap. 4. lib. 3. de ſymp. cauſ. & comm. aph. 37. ſect. 5. hic morbus nihil aliud eſt, quam robur vaſorum vteri. Hoc autem robur, eſt morbus, quia ratione huius læditur expulſrix: ergo eſt noxium robur. Hic autem morbus nil aliud eſt, quam intemperies calida & ſicca: quia dum frigida & humida matrix euadit, redditur impotens ad expellendum: potens autem & robuſta euadit pars per caliditatem & ſiccitatem. Hoc robur, hic morbus calidus & ſiccus vteri, eſt naturalis, vel aſciticus. Hæc de læſione facultatis. Error externus nihil aliud eſt quam ſanguis. Huius vitium varium. In quantitate enim vel Deſicit, vel Exſuperat. Deſicit propter febres, & diuturnos morbos, propter inedia, inſigne motus, exercitia inſignia: vnde, quia menſes non erumpunt,

*Denſitas
vteri.*

Anguſtia.

*Si ſanguis
ad alias
partes pro
pellatur ab
vtero.*

Error externus.

fœmina concipere nequit. Exsuperat sanguis ob copiosos cibos, ob otium, & reliquas causas, quæ possunt plethoram gignere. In qualitate peccat sanguis, dum est frigidior, vici-dior, crassior. Secundum motum peccat sanguis, dum impetum habet non in vterum, sed in alias partes.

Differētia.

Differētiæ sumuntur à Forma, & causâ Efficiente. Idem enim semper est subiectum, seu locus affectus, id est, vterus. In definitione diximus menses suppressos esse sanguineum excrementum, cohibitum præter naturam. Cohibitum est, vel quia Non detinetur in vtero; vel quia Detinetur. Quoad causam efficientem: expultrix frustratur vel Lassa facultate, vel ob Errorem externum. Et, si lassa facultate: ob morbum, qui est vel densitas, vel obstructio, vel coalescentia, vel constipatio, vel compressio, vel subsidētia: vel morbus calidus, vel frigidus. Si ob errorem externum: hic est sanguis, qui peccat qualitate, quantitate, vel motu.

*Signa.
Signa differētiarū
à forma.*

Vitium hoc in genere facile cognoscitur: dum scilicet intra decimum tertium & quinquagesimum annum, menses non apparent: nec conceptionis allunt indicia. Quoad differētiās à forma: intelligendum, num sanguis cohibeatur, vel quia retineatur, vel quia non retineatur. Si non retineatur: non est dolor in vtero, non sunt symptomata vterum affligentia: sed potius adest vel fluxus sanguinis parium, vel sputum sanguinis: unde non apparent mēies, quia sanguis cohibetur: ita tamen ut non retineatur in vtero. Si in vtero retineatur: ex Hippoc. de morb. mul. & l. de natura pueri, indicatur ē dolor in imo ventre, ē dolor in lumbis: ratio est, quia sanguis hic retentus continuum soluit, & proinde dolorem efficit. Unde ex Hipp. l. c. non fit dolor, quamvis tempore gestationis fœtus & imprægnationis sanguis detineatur in vtero: quoniam sanguis, qui tempore gestationis fœtus in vtero detinetur, non soluit continuum: dum autem præter naturam supprimuntur menses, sanguis soluit continuum. Ratio est: nam tempore, quo fœtus in vtero detinetur, & tempore quo fœtus lactatur, sanguis confluit in vterum citra impetum: quia assiduo fluit, singulis horis, sed paulatim, ac lentissimè, citra violentiam: unde continuum nō soluitur. At, dum supprimuntur menses præter naturam non influit assiduo, sed in corpore generatur, acervatur, & tempore mēstrum à natura confertim & cū impetu in vterum impellitur: ut ob hanc violentiā solvatur vntas, & tunc oboritur

tur dolor. Præterea indicatur è febre, ex horrore: dum enim sanguis præter naturam detinetur, excrementitius est, non regitur, sed putrescit: com. aph. 61. li. 5. vnde oboritur febris, & quandoque à natura ad extimas, & sensitiuas partes materia protrahitur, vt subsequantur horrores: quæ sane non eueniunt, dum sanguis non retinetur, & per os, narese, effluit. Indicatur etiam è delitio, vt Hippoc. tradit lib. de morbis mul. nam dum sanguis præter naturam detinetur, fiunt evaporationes in caput: vnde deliria, eaque diuersa, pro discrimine sanguinis qui detinetur: talis enim vapor, qualis minera. Indicatur etiam è lacte: si enim mulier, quæ nec peperit, nec vtero gerit, lac habet, indicium est mensium suppressorum: apho. 39. sectio. 5. Generatur autem lac in mensium suppressione, quia sanguis fluens in vterum, cum non possit expelli, in vtero detinetur, & secundum aliquam sui partem potest deduci in mammas, per venas mammarias, communes vtero cum mammis. Quod si sanguis etiam fluat ad mammas, per venas proprias mammarum, non per communes: convertitur in alimentum mammarum: vel, si exsuperet, non mutatur in lac, sed oboritur tumor, inflammatio. Generatur autem lac in mammis à proprietate mammarum, è sanguine aliquantisper elaborato in venis vteri & mammarum communibus: nam in his venis (ad differentiam propriarum venarum) est proprietas, beneficio cuius sanguis potest à maminis in lac conuertri. Sicut enim chylus præparatur in venis mesaraicis, & spiritus animalis in plexu reciformi: ita lac in venis mammaris. Quare si non sint signa gestationis vteri, & mulier non peperit: tunc lactis præsentia indicant mensium suppressionem. Quoad sanguinem, vt detinetur propter morbos: & proinde quoad cognitionem differentiarum, quæ capiuntur à causa efficiente: primum cognoscere oportet, an frustretur expultrix læsa facultate, vel ob errorem extenum: id quod cognoscitur è præsentia, vel absentia vnius aut alterius: verbi gratia, si fuerint signa erroris externi, non sit à morbo: contra, si non sint erroris externi indicia. Oportet autem scire signa cuiuslibet causæ efficientis. Densitas cognoscitur, quia prægressæ sunt causæ refrigerantes, exposita fuit mulier frigidiori aeri. Obstructio cognoscitur è signis indicantibus sanguinem crassum, viscidum. Coalescentia deprehenditur, quia necessario prægressum est vlcus. Compressio cognoscitur, quia vel assunt

Signa differentiarum à causa efficiente.

Morborum signa.

tumores vicinarum partium (quorum propria sunt signa) vel omentum est redditum pinguius, vt in admodum obesis. Constipationem obstetrices cognoscunt, siue sit caruncula, siue pellicula. Subsidentia facile cognoscitur : siue enim ad latera, siue sub intestinum rectum reuoluatur vterus, præter id quod feminæ præsentiant, obstetrices etiam facile obseruant. Quoad robur, id est, morbum calidum & siccū: cognoscitur, quia feminæ quodammodo sunt viriles, habent vocē grauiorem, sunt calidiores, hirsutæ, caliditas circa vterum per sentitur, pars illa facile excādescit. Errorem etiam externum facile possumus cognoscere : siue sanguis peccet copia, siue qualitate, siue motu. Si enim copia peccet, v.g. si deficiat: mulier est emaciata, prægressi sunt, vel etiam afflunt morbi, vt febris quartana, vi quorum morborum sanguis necessario deficit. Contraria apparent, si sanguis exsuperet. De qualitate, dictum alias. Quoad motum, an confluat in hanc vel illam partem, noscitur e signis propriis.

Indicationes.

Morbi quid indicent.

Præsidia vtilia sumuntur à causa efficiente, & à loco affecto. Causa efficiens est frustratio expultricis: quæ potest frustrari ob morbum, & ob errorem externum. Morbus multiplex esse potest, nimirum densitas, obstructio, coalescentia, constipatio, compressio, subsidentia, & robur. Densitas cum quodammodo pendeat à causa refrigerante: ob id indicat præsidium calefaciens. Et, si cum densitate coniuncta sit durities: erit indicatio non modo calefaciendi, sed etiam humectandi, emolliendi. Obstructio non indicat vtile: vtilis autem indicatio sumitur à causa, id est, à materia, quæ vt copiosa, indicat imminuens, vt crassa, attenuans, vt viscida, detergens. Coalescentia nihil aliud indicat, quam remedium siccans, dissipans illam cicatricem. Constipatio, cum fiat vel à carne, vel à pellicula: indicat remedium extirpans carnem, pelliculam seu membranam. Compressio si fiat à tumore: quid indicet tumor patet e doctrina de tumore ventriculi. Si fuerit pinguedo: indicat exsiccans. Subsidentia indicat remedium, quod restituat vterum in propriam sedem. Robur in viragine, indicat humectans & relaxans. Error externus est sanguis: hic copia peccans, si exsuperat, indicat minuens: si deficiat, addens. Si peccat qualitate: sanguis frigidior indicat calefaciens: crassior attenuans, &c. Si peccat motu: indicat reuellens, retrahens ad partes inferiores. Quoad locum affectum: præsidia sumuntur à proportionem vteri, à calore vteri, &

Error externus quid indicet.

Locus affectus quid indicet.

ri, &

ri, & quandoque à sensu vteri. Proportio seruanda est, pro conseruatione partim indiuidui, scilicet fœminæ, partim, & potissimum speciei: vnde requiritur interdum præsidium, quod à proprietate, & qualitate recondita suffragatur vtero. A calore indicatur remedium calorificum, conseruans calidū. Calor quidem conseruatur à calido, & ab astringente, cuius vi calor nō dissoluitur, sed vnitur: ventriculi calor, indicat remedium astringens: at calor vteri, potius calidum indicat, quia purgatio, seu fluxus sanguinis menstrui astringentibus prohiberetur. Sensus vteri interdum exquisitus est, vt non possit perferre medicamenta acria: & sic vterus indicat mitigans. Hoc mitigans remedium, est præseruatorium: vterinum & calorificum, sunt remedia vitalia.

Malum hoc in genere non est despiciendū: nam quamuis interdum non obstitit fœminæ: detrimentum tamē affert conseruationi speciei, quia turbatur conceptio. Quoad formam: hæc est excrementum sanguineum præter naturam cohibituūque vel quia non detinetur in vtero, vel quia detinetur. Malignius autem & periculosius est illud excrementum, quod retinetur in puerperio, tempore fœtus: vt ait Gal. con. 73. sect. 3. l. 3. epid. ratio est: quia tempore gestationis vteri, benignior portio sanguinis vertitur in alimentum fœtus, aliqua portio etiam benigna demittitur in mammas, & conuertitur in lac: pessima illa portio remanet in vtero, & relinquitur, vt tēpore partus expurgetur. Si ergo detineatur: pessima est retentio, & pene deleteria: quæ retenta purgatio sæpius fœminas interficit. Menstrua autem purgatio minoris est discriminis, si cohibetur quidē, sed non suscipitur. Et hoc proponit Hippoc. aph. 33 sect. 5. inquiens: in suppressione mēsum, fluxum sanguinis narium bonum esse: ratio est, quia sanguis, quamuis non egrediatur per vterum, non retinetur tamen in vtero, sed per nares egreditur: & id non simpliciter est bonum, sed ratione fœminæ: non autem ratione conceptionis, quia nisi recte fluant menses, aboletur conceptio. At si sanguis suppressatur, ita vt in vtero suscipiatur: tunc hæc suppressio est multo peior, quam dum suppressitur, non tamen suscipitur. Si enim sanguis intus retentus suppressitur, peius est, quoniam succedunt vitia, vel secundum vterum, vel secundum totum corpus, vel secundum viscera. Declaro, ex aph. 57. sect. 5. & c. 5 l. 6. loc. affect. Dum supprimuntur menses, & materia detinetur: progressu temporis materia tumo-

Prognostica.

Prognostica differētiar. à forma.

rem efficit, vt & circa illa tumores obseruentur, quia definietur materia. Totum etiam quandoque afficitur, cum Galen. com. 1. sect. 1. l. 6. Epid. c. 9. l. 4. de prælag. è puls. nam vi huius suppressionis corpora febre afficiuntur: quandoque etiam hydrope, morbo valde periculoso. Præterea etiam viscera afficiuntur, dum detinetur hic sanguis: si. n. petat mammas, succedit furor, & lædatur pars princeps: nimirum cerebrum, aph. 40. sectio. 5. quod non semper, sed quandoque contingit: imo raro id accidit, secundum Gal. in com. quia sanguis suppressus est admodum feruens, vt non possit regi calore mamarum, & non possit in lac conuerti: quo fit, vt sanguis hic feruens euaporet in caput, & furorem efficiat. Ex his constat quid prædicendum sit merito differentiarum, quæ capiuntur à forma. Considerari etiam debet subiectum, vterus. Si enim foemina non peperit, deterior est mensium suppressio, quam si peperit. l. 1. de morb. mul. nam vterus in foemina quæ nondum peperit, non est ita solitus impleri: quare, si repleatur ob sanguinem menstruum, eo magis affligitur. Cõtra, si mulier peperit, quia solitus est vterus impleri, nõ ita afficitur. Quare, quod proponitur ab Hippo. de prognostico, referendũ est ad vterum, ad locum affectum. Causa efficiens, est morbus, vel error externus. Cæteris paribus, deterior est affectio, si fiat ratione morbi, sed non semper: nam si v. g. contingat vt supprimantur menses ob defectum sanguinis, qui deficiat ob febre m hecticam: ob phthisin: nulla est spes salutis, quamuis hæc suppressio fiat ob errorem externũ. Quoad morbos: hi possunt esse natiui, vel ascitici: c. vlt. l. 3. sym. caus. Cæteris paribus, peior est suppressio, quæ procedit à morbo nativo. Sed præterea cum morbus possit esse multiplex: quoad densitatem: non est impossibile hanc remouere, licet. n. calefacere: verum difficilius euadit negotium, si cum densitate coniuncta est durities. Quoad obstructionem: facilius remouetur malum, si fiat à materia copiosa, quam si crassa, aut viscida. Quoad coalescentiã: impossibilis est curatio: non possunt deleri cicatrices. Quoad constipationem: curari potest: nam & caro adiecta, & pellicula potest abscindi. Quoad compressionem: si fiat à tumore: pro discrimine tumoris varium est prognosticum, vt diximus in doctrina de tumore ventriculi. Si procedat à pinguedine: potestis præsentem pinguedinem facile absumere. Sed si à principiis generationis ortum habuerit pinguedo: sæpe huiusmodi foeminae steriles

Progn. differencia ab efficiente causa.

steriles permanent, quia menses supprimuntur. Quoad sub-
sidentiam: potest uterus in pristinam sedem reduci: nisi
forte malum originem ducat à fractis vinculis, quia tunc
actum est. Si fuerit robur: curari potest: quia non est impos-
sibile refrigerare & humectare, & imminuere robur illud
conceptioni, infensum. Hippoc. l. i. de morb. mul. ait, si men-
sium suppressio perseveret per sex menses, & non remouea-
tur ante sextum mensem: non esse possibile, vt foemina re-
stituatur. Sed refragatur experientia, & Gal. com. 29. sect. 3.
lib. 6. epid. Responsio: Hippocrates loquitur de foemina quæ
patitur delirium, anxietates, obmutescentiam, aut defectum
insignem, sitim, & alia id genus sæua symptomata: fieri enim
tunc non potest, vt malum hoc ultra sex menses produca-
tur, quia non possunt adeo sæua symptomata tolerari. Si au-
tem menses supprimantur, neque hæc symptomata fiant:
mensium suppressio, perdurans ultra sex menses, potest ta-
men amoueri. Quod de morbo dictum est, idem de errore
externo dicendum: si enim verbi gratia, menses supprimantur
ob copiosum sanguinem, non est difficile: maior est difficul-
tas ob defectum, ob qualitatem, ob impetum.

Galenus loc. citato gloriatur se curasse mulierem illā ve- *curatio.*
næ sectione: cui, licet emaciata, venæ tamen fuerunt reple- *vena se-*
tæ: ideo Galen. venā secuit, & sanguinem eduxit ultra lb̄ iij. *ctio.*
nā dū hoc malum non fit è defectu sanguinis, sed ex redun-
dantia, vena est secanda, quia sanguis in hoc casu habet ra-
tionem vehementis: nam licet quandoque non noceat mu-
lieri, habet tamen rationē vehemētis: quia prohibet conce-
ptionē. *usus.* Quoad quantum agendum: si redundet sanguis ad
lb̄ iij. est etiam rationi cōsentaneum vt in hac quātitate edu-
catur. Sed Gal. l. c. euacuat sanguinem secundū hanc rationē,
vt tribus vicibus sanguinē educat: prima vice lb̄ j. secunda
lb̄ i. tertia 3 viij. Hic Galen. insinuat rectam administrationē
sectionis venæ, penes quantitatem: vult enim Gal. secandam
esse venam non vnica vice, sed pluribus, quia sanguis ille in
foemina redundans, non erat summæ actionis, quia actu non
efficiebat morbum, sed poterat efficere, & præsertim in sce-
mina emaciata, in qua vires quidem erant validæ secundum
solida, non tamen secundum carnosum genus. Tutius
ergo erat vacationem partiri, & ratione virtutis, & po-
tissimū ratione sanguinis quia actio non erat summa. *quo-*
modo. Foramen non fiat angustum, quia sanguis menstruus
est crassus.

est crassus, vt difficulter egrediatur per foramen angustum. Et hoc de modo. Quoad *tempus*: in suppressione mensium, Medici fere omnes hoc obseruāt, vt venam aperiant prope tempus mensium, per 3. aut 4. dies ante tempus mensium. Galen. interdum venam aperit indifferenter quolibet tempore, interdum per 3. aut 4. dies ante menses. c. 11. & 18. lib. de cura per venæ sectionem. Medici etiam per 10. aut 15. dies ante tempus mensium secant venam brachij. Quare sciendū, quando agendū sumi à præsentia indicantis, id est, à sanguine. In suppressione mensium adest præsentia indicantis, & prope tempus mensium, procul ab eo. Dum menses supprimuntur: sanguis in corpore redundat omni tempore. Cur igitur vena inferior secatur prope tempus mensium: vena superior alio tempore? Responsio. Sanguis in hoc malo dupliciter à medicis perpenditur: primo, vt quiescit: secundo, vt mouetur. Quiescit, procul à tempore statuto mensium: mouetur autem prope tempus mensium. Licet igitur semper adest præsentia sanguinis: tamē sanguinis præsentia, vt cōsequitur sanguinis essentiam, vt mouetur: hæc præsentia nō est semper, sed locum habet prope tempus mensium, quia eo tempore mouetur sanguis: at sanguinis præsentia, vt consequitur essentiam sanguinis quiescentis: hæc præsentia locum habet, non in imminetibus mensibus, sed procul à tempore mensium. Galenus ergo respiciēs ad præsentiam motus, id est, ad sanguinem, quatenus mouetur: secatur venam per 3. aut 4. dies ante tempus mensium, quia tunc sanguis agitari incipit: & si negligentia, vel incertia medici non fuerit vena secta per 3. aut 4. dies ante menses, licet etiam eo tēpore, quo menses incipiunt, venam secare: potius tamen secundum Galen. ante mensium tempus vena aperienda. Galenus etiam cap. 5. l. 9. meth. eo tempore quo menses diminute fluunt, venam aperit: quia tunc adest præsentia sanguinis, vt mouetur. Nec propterea improbandi sunt practicautes, dum venas alio etiam tempore aperiunt: quia adest præsentia sanguinis quiescentis. Quoad *ubi agendum*: Galen. c. 11. lib. 3. meth. & c. 11. ac 18. lib. de cur. per venæ sectionem probat sectionem venæ infernæ. Aëtius secatur venam non modo pedis, sed etiam brachij. Vbi agendum, indicatur à subsistentia sanguinis, quæ duplex est in supereffusione mensium: alia cōsequitur essentiam sanguinis vt mouetur, alia vt quiescit. Si respiciamus ad subsistentiam sanguinis qui mouetur: venæ infernæ secandæ sunt:

& huc

& huc auctores illi respexerūt:secant enim venam vel tempore mensium,vel prope menses:vnde patet eos tunc loqui de venæ sectione,vt respicit sanguinem qui mouetur. Si vero respiciamus ad sanguinis subsistentiam, vt consequitur sanguinem quiescentem,sanguis quiescit supra iecur in toto corpore: ideoque ad vacuandum sanguinem superfluum quiescentem,vena brachij secanda,per quam prompte & facile sanguis euacuatur.

Quoad Cucurbitulas,& primum scarificatas: Galen.c.3.l. de cur.per venæ sectionem,inquit,aduertendum esse,an mulieres sint vel nigre,& graciles,vel albæ & carnosæ.Si enim nigre sint & graciles,venam esse secandam: si albæ & carnosæ, cucurbitulas scarificatas esse applicandas.Venæ sectio est materia remedij vehementis,vacuantis sanguinē quemcumque,id est,crassum & tenuem. Cucurbitulæ autem scarificatæ sunt materia remedij debilis, vacuantis sanguinem potissimum tenuem.His ita positis, si fœmina nigra & gracilis patiatur mēsiū suppressionē,probatur venę sectio, & interdum cucurbitulæ scarificatæ:si autem fœmina alba & carnosa,non probatur venæ sectio,sed solū cucurbitulæ scarificatæ.In nigra enim fœmina redundat sanguis crassus,qui potest vel venam sectam euacuari: adest indicatio,nihil est quod prohibet:vnde Galen.recte probat venæ sectionem.Si tamen contingat nigram fœminam esse debilem,vt venę sectio ob virtutis imbecillitatem prohibeatur: licet cucurbitulas scarificatas applicare.Neque hoc aduersatur Galeno: is enim in nigra probat venæ sectionem seruatis seruandis, id est, dum non assunt prohibentia,nimirum virtutis debilitas. Si sanguis suppressitur in fœminis albis,indicat sui vacuationem;virtus etiam potest esse robusta:nec enim fœmina alba semper est ita debilis, vt prohibeat venæ sectionem,præsertim quia fœmina alba,aliis morbis laborans, sustinet venæ sectionem brachij, in qua virtus magis robusta requiritur, quam in sectione venæ pedum. Quod si ergo virtus potest esse robusta,cur Galen.venæ sectionem improbat?Hoc proposuit Galenus,quia cognouit adesse indicans, sed præterea etiam adesse prohibens, quod est,non quidem virtus totius, quæ robusta esse potest, sed exilitas venarū:in alba enim fœmina,venæ sunt angustæ,latentes & profundæ, præsertim secundū cruravnde vena aperiri non potest. Sed etiam Gal. loquens de sectione venarum cubiti, in affectibus iecoris,

Cucurbitula, primum scarificata.

dicat

non sanguinei. Quare in mensium suppressione non potest probari materia deriuans; magis enim menses supprimerentur: si. n. materia deriuans remoratur fluxum mēsiū, ergo non conuenit in suppressione. At Hipp. aph. 33. sect. 5. ait in suppressione mēsiū, si sanguis fluat ē naribus, bonum; & Galen. in com. ait, non tantum bonū esse sanguinis euacuationem per nares, sed etiam per aluum, & proinde per hæmorrhoides. Ergo hirudines probari videntur. Ego huius sum sententiæ, dum menses sunt suppressi, & præsertim eo tempore quo menses fluere deberent, nequaquam hirudinibus dari locum, potius enim per deriuationem prohiberetur fluxus, quam adiuuaretur. Notandum igitur, si respiciamus ad conceptionem & conseruationem speciei, ad quam ordinatus mensium fluxus requiritur, non probari hirudines. Et huc respexit Galenus: volens enim vxorē Boethi fecundā reddere, vsus est remēdiis deriuantibus, ad adimēdum illud muliebri profluuium, quod erat in causa sterilitatis. Si respiciamus salutem foeminae, non conceptionem, expedit vt applicentur hirudines, vt sanguis euacuetur, sicut enim prodest foeminae, vt sanguis educatur per nares, ita etiam prodest, vt per hæmorrhoides euacuetur, si per vterum fieri nequeat.

Sequitur materia medicinalis: quæ respicit Locū affectum, & Causam efficientem. De medicamentis locum affectum respicientibus, agemus in sermōne de laesa conceptione. Causa efficiens, est Morbus, vel Error externus. Non agemus hic de medicamentis remouentibus morbos: siue enim sit intemperies, siue tumor, &c. medicamenta peti possunt ē doctrina affectum ventriculi. Error autem externus, licet multiplex esse queat, nos tamen loquēmur de medicamentis quæ respiciunt sanguinem, vt est crassior, viscidior, immobilis, & sic loquēmur de medicamentis prouocantibus menses. Quia autem non tuto licet vti prouocantibus menses, nisi corpus expurgeretur: ob id quædam monebimus circa lenientia & purgantia. De præparantibus enim sæpe alias dictum fuit. Quoad lenientia, Galen. c. 18. l. de euacuatione per venæ sectionem, & c. 3. l. 8. 2. r. a. potissimum probat species hieræ simplicis: quia non modo habent vim leniendi aluum, expurgandi primas superfluitates, ratione aloes, sed etiam prouocandi menses, ratione armarū. Quare interdū exhibitione specierum hieræ & alijs lubrica redditur, & sanguis etiam per vterum effluit. Quoad quādo agendum, Gal. exhibet hieram illico

Medicamentis

ta.

3. 1. 8

I.
Lenientia.

post

2.
Purgatio.

*Ipsaque
Paulus hic
vtrum do-
sin perfe-
ctam sta-
uit 3β. c.
8. lib. 6.*

7. lib. 6.

post balneum, & eo tempore, quo scēminæ virtute balnei ca-
liditatem percipiunt. Ne tamen scēmina sit repleta: quia tūc
vi balnei vteri partes laxæ euadent, vterusque replebitur, &
succedet inflammatio. Hieræ igitur species eo tempore pro-
bantur, quo adest præsentia indicantis, & nil prohibet: san-
guis suppressus indicat: repletio totius prohibet. Quare to-
tum prius expurgandum. Ergo inter ipia ad leniendam
alium detur hiera, prætermissio balneo: corpore autem ex-
purgato, licet vti speciebus hieræ ilico post balneum. Quoad
soluentia: præctici proponunt magnas hieras, ut *Hermetis*,
Archigenis, *Logadij*, *Rufi*: quibus tamen non indifferenter
vtendum. Si enim in corpore scēminæ exsuperat non tan-
tum pituita, sed etiam bilis flaua, vel atra: licet vti omnibus
hieris propositis, excepta hiera *Rufi*, præsertim sola, quæ
probat in succo pituitoso: priores enim hieræ non mo-
do recipiunt *colocynthidem*, sed etiam *veratrum nigrum*, &
scammonium, & propterea his vtendum, dum omnes succi
exsuperant: efficacissima est hiera *Hermetis*, quæ colo-
cynthidem, helleborum, & scammonium in maiori quan-
titate suscipit. Hieræ *Rufi*, seu *diacolocynthidos*, probatur
dum sola pituita exsuperat. Quoad rectam administrationem,
& primum quoad quantum agendum, summa dosi, secundum
Act. cap. iii. lib. 3. est 3β. minima 3j. *Paulus* cap. 71. lib. 3. mo-
net summam dosin esse 3ij. minimam 3jβ. Vt autem pateat,
quinam auctor sit imitandus: sciendum medicamentorum
dosi esse summam, mediam, & minimam, pro varia condi-
tione actiopis principaliter indicantis, id est, succi peccantis:
summa enim actio indicat summam dosin. Sed hoc modo
non dirimitur lis inter *Paulum* & *Actium*. Quare tutius
imitari possumus *Paulum*: cum hæc medicamenta solutiu
sint violenta. Quod si *Actij* partes tueri placeat: dicendum
sermonem de hieris magnis duplicem esse posse: loquimur
enim de pharmacis aut fermentatis, aut non fermentatis.
Per fermentationem medicamenta secundum suas vires non
parum restringuntur: ideoque *Actius* respicit ad hieras fer-
mentatas, quarum vires refractæ sunt, vt summa dosi esse
debeat 3β. *Paulus* autem respicit ad hieras recens confectas,
in quibus cum medicamenta proprias vires seruant, tutius
summa dosi statuitur 3ij. Hoc verum esse, testatur *theria-
ca*, quæ recens stupefacit, antiqua vigilias excitat, ob opium
fermentatione refractum.

Quoad

Quoad quando agendum. Hippocrates purgans mulieres suppressionem patientes, monet aduertendum esse, an purgatio fiat per vomitum, vel per aluum. Si fiat per vomitum, ante pharmacum non adhibet vtero fomentum: si per aluum, antequam pharmacum propinet, fomentum vtero adhibet. Dum enim per vomitum euacuatio est instituenda, materia mouetur sursum, & fomentum quod vtero admouetur, est in causa, vt materia deorsum impetum habeat: fomentum enim vt habet vim laxandi: sui presentia prohibet, quo minus vti liceat vomitorio. Quare recte statuit Hippocrates dum exhibetur vomitorium, nequaquam fomentum esse adhibendum. Dum autem per aluum vacuare volumus, adest presentia indicantis, materia noxia, quæ deorsum mouetur: quem motum etiam adiuuat fomentum, quatenus in causa est, vt materia deorsum moueatur, quemadmodum etiam pharmacum: vnde natura non defatigatur duplici & contrario motu. Sed quare Hippocrates primo vitur fomento, deinde pharmaco purgante? quia fomento vterus laxus redditur, quæ laxitas est in causa, vt etiam materia purganda fundatur, non ita hæreat, & ob id facilius à pharmaco attrahatur. Et quia hieras magnas non modo ingrediuntur soluentia, sed etiam aromata: sit vt non modo fiat purgatio per aluum, sed quandoque etiam menses prouocentur: & præsertim si adhibeatur fomentum laxans vterum.

Sequuntur medicamenta prouocantia menses, & ea quæ sunt vehicula. Menses ducentia, sunt tenuis substantiæ: eaq; vel Calida, quæ validiora sunt: vel Frigida, quæ imbecilliora. Frigidis interdum propter febres, vel alios affectus calidos est vtendum: vt sunt capilli Veneris, virides semen, polysstichum, & potissimum radices oxalidis syluestris, nam domestica oxalidis radices menses cient debilitat. Calida probat Hippocrates in libro de superfluitatib. quorum alia sunt vehementissima, alia minus vehementia. Vehementissima extremis morbis competunt: vt alumen Aegyptiacum, cantharides, colocynthis, elaterium, flos ariæ, lac fœcus, tishymalus, album veratrum, euphorbium. Hoc tempore morbi non curantur, quia medici sunt nimis timidi, nec vsurpant præterquam pulegium & capillum Veneris. Minus fortia ab eodem Hippocrate probantur, lib. 1. de morb. mul. vt myrrha (vnde Rhases probat trochiscos de myrrha:) item piper, sal, scirpium & gladiolus, cuius succus mirabilis est.

ſatis vehemens, non vehementiſſimum. In libro autem de ſuper-
ſtatione pariter inter minus fortia ab Hippocrate proba-
tur radix ari, ariemiſia, bulbus ciclamini, cuius & radice & ſo-
lis uti licet: item cardamomum, caſtorium, nigrum, pepus, ſcilla:
unde trochiſci à ſcilla à plerique laudantur: item ſapiſagria, cha-
pſia. Galenus cap. 18. lib. de curatione per venæ ſectiōnem, ſi-
militer inter minus fortia probat ſabinam, diſtammum Creſi-
cum. Atque addit chlaſpi, nigellam, feniculum, daucum, petroſeli-
num. Mediocritia ſunt ſecundum Hippocratem, ſemen anethi,
cupreſſus: non autem exiſteantur bacca cupreſſi. Galenus loco
citato probat calamintum, pulgrium, apium, petroſelinum. Huius
ſunt farina, cappares, chamadris, betonica, rubia, ſcordium, aſa-
rum, peonia, bacca fraxini: probatur etiam reſtus uſus foliorum
& radicum mercurialis, quod mirabile eſt medicamentum.

*Rubia a-
ſiringit:
quod inſi-
ris obſer-
uatur
medici.*

*O' Xipha
eorum que
meſes pro-
mouent.*

Vehiculi rationem habent dulcia & odorata: Inter dulcia
utendum ſaccharo, melle, vino dulci, liquiritia, paſſili, malua, &
althea. Odoratis etiā vterus delectatur: vnde practici miſcent
ambram, moſchum, gallum moſchatum, & aromata: nam aroma-
tum ratione ſuauiſ odoris. ſunt vehiculum reliquorum,
tūm propria ratione meſes poſſunt prouocare ob calidita-
tem & tenuem ſubſtantiam.

*Reſta ad-
ministra-
tio eorum
que men-
ſes ducunt.*

Hactenus de medicamentis cientibus meſes: dicendum
de reſta eorum adminiſtratione. Quoad quantum agendum:
pro varia actione principaliter indicantis ſanguinis ſup-
preſſi, varia doſis probatur. Si enim ſumma ſit actio, medica-
menta in ſumma doſi ſunt adminiſtranda: vnde Rhafis præ-
ſcribit: trochiſci de myrra ℥ iij. decocti ſeminiſi ſiniperi ℥ viij.
ſiat potio. Hæc eſt ſumma doſis: noſtro enim tempore tro-
chiſci dantur ad ℥ ſi. vel ad ℥ j. vnde vitia non curantur.
Quod ſi decoctum à ſeminibus inſiperi paretur cum melle, vel
ſaccharo, adhuc efficacius erit medicamentum, quia minus
difficulter permeabit ad vias vteri. Hippocrates in libro
de ſuperſtatione probat hoc medicamentum: ℞. ſede minu-
tium concife, que pinguis ſit, nam quo pinguior, eo melior, ℥ j. ſem.
apij, cumini æthiop. an. ℥ ſi. churis ℥ ij. coquantur è vino odo-
rato dulci. Doſis ſit moderata. Galenus lib. 2. de antidot. præſcri-
bit: ℞. diſtami Creſici ℥ j. poly montani ℥ j. piperis longi ℥ ij.
rute ſylueſtris ℥ ij. ſcordij ℥ j. ſi. ſiat puluis tenuiſſimus: ℞. pulueris
huius ℥ j. melle ℥ viij. ſiat potio. Et hæc etiam eſt magna doſis.
Merito autem proponitur vinum mulſum, quia ratione dul-
cedinis facile permeat ad vias vteri. Non propono libros de
medicinis

medicinis facile parabilibus, quia sunt suspecti, licet quædam in iis reperiantur efficacissima remedia. *Modus agendi* varius probatur, pro varia conditione passionis sanguinis suppressi. Galenus cap. 18. lib. de curat. per venæsectionem, probat ut medicamenta redigantur in puluerō tenuissimum: sic enim administrata medicamenta efficacius agunt in sanguinem, ut sanguis non ita resistat, sed magis cedat. Galenus etiam com. aph. 36. sect. 5. & alibi probat, linimenta, fomenta, pessaria, & suffumigia. Præ omnibus autem modis probantur suffumigia, aph. 28. sect. 5. sic enim medicamentum efficacissime agit, & ipse etiam suffitus aromatum muliebricia ducit, & maxime confert, dummodo non assit grauitas capitis: hebescit enim vis medicamentorum in transitu, dum exhibetur forma pulueris, potionis, pilularum, boli, antequam perducantur in vterum, quod non fit, si modo suffumigij administrantur. Præterea hæc medicamenta, quæ in potu vel bolo exhibentur, cum sint calida (nam menses ducentia sunt calida) sæpe transitu suo lædunt iecur calidius, ideoque tutius magis conuenit suffumigium: quia sæpe menses supprimuntur ob sanguinis crassitiem, qui crassus sanguis generatur in iecore calido. Anteponitur etiam hic modus reliquis, secundum Galenum: quia reperiuntur quædam fœminæ, quæ non permittunt clysteres, pessaria, admittunt autem suffumigia. Suffumigium etiam magis penetrat. Est ergo hic modus vtilissimus, & nihil est quod prohibeat, præterquam capitis imbecillitas: sunt enim fœminæ, quibus cerebrum facile turbatur ab aromatibus. In administrando autem suffumigio duo notanda, secundum Galenum: primo, ut cingantur fœminæ: deinde, ut fumus per cannulam ascendat in ceruicem vteri: ita enim suffumigium non facile petit caput. *Quoad quando agendum*, secundum Hippocratem, menses ducentia sunt administranda post corporis purgationem: materia enim totum replēs, prohibet: quia euocans menses vel non posset permeare: vel, si posset permeare, secum duceret materiam totum replentem, cum detrimento fœminæ. Et debent hæc medicamenta administrari per plures dies, ante prandium, per quinque horas, & illico post balneum. Per plures dies exhibet Hippocrates: quia sanguis suppressus ob crassitiem & visciditatem ita est contumax, ut diu sit præsens: quare, cum per plures dies perseueret præsentia sanguinis, per plures etiam

dies medicamenta sunt administranda. Exhibet etiam Hippocrates per quinque horas ante prandium, quia cibi præsentia prohibet: mortiferum enim est menses ducentia, & quidem valida exhibere, nisi ventriculus cibi sit vacuus, vel cibus exacte sit concoctus: alias enim chylus crudus, vi medicamentorum menses ducentium, traheretur in venas, in iecur, in vterum: unde mensēs magis supprimerentur, Illico à balneo Galenus administrat, quia illico à balneo non adest præsentia prohibentis: (nam suppono balneum administrari post purgationē totius, ieiuno & vacuo ventriculo:) & adest permittens, quod coindicat hoc medicamentum, nimirum laxitas vteri: quia laxus vterus facile admittit hæc medicamenta: laxatque cutem vi balnei. Hippocrates autem incipit à leuioribus, & postea fortibus vritur: deinde rursus leuioribus, & mox fortioribus, & c. quæ vicissitudine quadam continuat. Respicit enim ad sanguinem suppressum vehementem: & proinde ad indicantia & remedia vehementia. Nam si malum esset debile, non liceret vti vehementioribus, sed debilioribus tantum: quia debet esse proportio inter medicamenta & affectus præter naturam. Vritur autem permutatis vicibus, primum debilibus, deinde fortibus, & c. quia respicit non modo ad præsentiam indicantis, sed etiam ad præsentiam prohibentis, ad virtutem, quæ interdum prohibet, interdum permittit. Dum medicamēta fortia sunt adhibenda, natura, seu virtus ea non facile sustinet, nisi aliquantisper assuecat: quare primum mitiora sunt exhibenda: & progressu temporis fortiora, dum non amplius adest prohibens: tunc enim adest præsentia indicantis vehementissimi, & virtus assueta permittit. Post fortia Hippocrates rursus vritur debilibus: quod bisariam fieri potest, primo, vt in debilibus istis permaneamus vsque ad remotionem mali: deinde, vt iis non insistamus vsque ad finem mali, sed aliquo tempore leuibus vtamur, postea rursus fortioribus. Et hic vterque modus in praxi obseruandus est: non tamen indifferenter. Si enim contingat, vt post fortia medicamenta maxime imminuatur vehementia affectus morbifici, & sanguis debilis reddatur: tunc sufficit post fortia vti debilibus, ad finem mali: quia adest præsentia indicantis debilis, non vehementis. At si contingat, vt post fortia sanguis adhuc vehementiam conseruet: necessarium est vicissim vti debilibus & fortibus: debilibus quidem vtendum, quia virtus non per-

mittit

mittit assiduum vsum vehementium: potest enim eum aliquandiu perferre, sed non longo tempore. Quare gratia virtutis prohibentis non possumus perseverare in vehementibus: sed cogimur vti debilibus. Quia autem perseverat vehementia indicantis: dum natura aliquod robur accepit, rursus, secundum Hippocratem, fortibus vti licet, quia nō adest præsentia prohibentis. Quoad *vbi agendum*. Hęc medicamēta possunt per os exhiberi, & extra applicari circa regionem vteri, pro indicantis subsistentia. Medicamenta fortissima, vt *euphorbium, elaterium, squama aris, succus silymali*, non sunt exhibenda, sed applicanda. Licet enim vbi agēdum indicetur, à subsistentia sanguinis: virtus tamen quandoque permittit, quandoq; prohibet. Virtus oris ventriculi, & partium infernarum prohibet, vt nequaquam hęc sint per os exhibenda: virtus autem vteri, & præsertim secundum partes cutaneas, permittit. Odorata vero applicanda, non naribus, quia hoc indicantis subsistentia requirit: sanguis enim, qui inclinationem habet ad partes infernas, indicat remedium adiuvās, non reuellens: dulcia ergo, quia attrahūt ad infernas partes, iccirco partibus infernis applicanda sunt, non naribus.

Victu attenuante Galenus plerosq; liberavit. *com. aph. 36. Diata. sect. 5.* quod accipiendum, non de qualibet suppressione mensium, sed de illa, quæ sit à crasso & viscido sanguine. Quisnā sit hic victus, alias dictum est. Iam notandum circa condimenta: quamvis in *aceto vis* sit attenuandi, id tamen vitandum esse, quantum fieri potest, quia insensum est partibus nervosis, & vtero: *com. 39. lib. 3. vict. ac.* Quare cibi vel non condiendi sunt aceto, vel exiguo, nec admodū potenti. Condiendi autem sunt cibi dulcibus, quorum virtute ciborum facultas facile perducitur ad vterum. Sed dulcibus his tātum vtendum vt condimentis, & vehiculis, non vt cibo, id est in parua copia: nam fœminæ quæ hoc malum patiuntur, frequenter obnoxie sunt iecoris, lienis, & viscerum obstructionibus: quæ à dulcibus copiosis magis obstruuntur, & in tumorem attolluntur. Quoad *quando agendum*: Galenus cap. 18. lib. de cur. per venæ sectionem, probat victum attenuantē, per 8. vel 9. dies ante tempus statutum mensium. Indicans enim, nimirum sanguis præter naturā cohibitus per 8. vel 9. dies ante statutum tempus mensium, indicat propellendum esse sanguinem ad vterum, vt egrediatur. *Indicās hoc loco non est virtus, quæ indifferenter præsens est, & his diebus, & aliis, sed*

sanguis suppressus. Vnde hoc tempore sanguis adest, qui impetum habet in vterum, qui impetus naturalis est, sed imminutus, & proinde adiuuandus: quare indicat remedium adiuuans hunc motum, cuius materia est victus attenuans, quo vtendum hoc tempore, quia adest praesentia sanguinis, qui impetum habet in vterum, sed diminutum.

CAPVT II.

De immoderato sanguinis per vterum profluvio.

Generatio.

Definitio.



D generationem huius vitij necessarium est, vt aliquod noxium occurrat venis vteri: vi cuius vteri venae non possint sanguinem continere, vnde per vterum effluit in maiori copia, quā decet. Profluvium ergo sanguinis immoderatum, est exiens sanguinolentum immoderatum vteri, dependens à laxa retentione venarum vteri. Forma est exiens sanguinolentum immoderatum. Exiens dicitur: ad differentiam excrementi quod detinetur: sanguinolentum dicitur: ad differentiam exeuntis, quod non est sanguis, vt fit in profluvio vterino & muliebri, vbi egreditur materia à sanguine diuersa. Dicitur immoderatum: quia sanguis egreditur in maiori quantitate, quam decet: ad differentiam profluvij sanguinis secundum naturam, in quo est exiens sanguinolentum, sed moderatum: item hoc dicitur ad differentiam profluvij praeter naturam, vt est stillicidium mensium, & stillicidium sanguinis per vterum: egreditur enim exiens sanguinolentum, sed in minima copia.

Causa efficiens.

Causa efficiens, laxa retentio vasorum vteri. Quamuis autem per terminos formae & subiecti, definitum satis limitatum videtur: causam tamen efficientem etiam apponi necessarium fuit, quia scilicet malum hoc distinguitur ab eo fluxu sanguinolento & immoderato per vterum, qui interdum fit, dum menses suppressi sunt imminuti per duos aut tres menses, & postea quarto mense, v. g. praeter consuetum naturae ordinem sanguis per vterum effluit in maxima quantitate, id est in maiori, quam deceat pro consuetudine mulieris, vt si v. g. solita sit foemina singulo mense euacuare sanguinem ab fb j β . euacuet ad fb iij . Hoc sane est exiens sanguinolentum immoderatum vteri, sed aliam habet efficientem causam, nim. robustam expultricem venarum vteris, cui, secundum naturae leges, cedit retentrix. At nostri mali propositi causa

causa efficiens, est laxa retentio. Laxatur a retentio necessario ob laxationē facultatis, id est ob morbos, nō ob errorē externū. c. vlt. l. de diff. sympt. c. 2. l. 3. de caus. sym. c. 2. l. 5. meth. sicut, etiam docuimus in fluxu sanguinis narium. & de spūto sang. Morbus est triplex, diapedesis, anastomosis, diæresis: & proinde in via, in ineatu, in soluta vnitare. Fiunt a. hi morbi quandoque ob noxas præcipuas vteri, quandoque ob vitium, quod principaliter pertinet vel ad totum corpus, vel ad sanguinē: vnde merito dicit Galen. profluuium hoc fieri vel vitio Vteri, vel Totius, vel Sanguinis: com. aph. 17. sect. 5. quia nō respicit ad vitia cōmunia immediata, sed ad vitia principalia, ad vitium in quod medicus consilium dirigere debet. Quoad vitia vteri, potiss. locū habet anastomosis. & diæresis. Anastomosis, id est reclusio orificiorum venarum fit ob immoderatum vsum balnei relaxantis, ob fomentum relaxans vtero adhibiturum, quandoque etiam ob immoderatum coitum. Diæresis & soluta vnitatis, vt monet Hip. l. 1. de mor. mul. fieri solet in difficultate partus: nam vasa quandoque disrumpuntur, quandoque etiam in partu aliquid noxium relinquitur in vtero, quod putrescens, acre & mordicans euadit, vt solutam vnitatem, imo vlcus efficiat: vnde, si venæ abradantur, hoc malum producit. Quoad vitia totius, vi malorum totius, vterus secundum venas affici potest quolibet morbo, ē propositis, sc. anastomosi, diæresi, diapedesi. id est immodica laxitate & raritate tunicarum venarum. Nam dum totum afficitur, vt prauo sanguine repleatur (quod potiss. fit, vbi fœmina male habet secundum ventriculum, vbi iecur languet) fieri potest vt in toto colligatur vitiosus sanguis, qui, cum à toto detineri nequeat, protruditur advteri vasa: vnde, si tenuis est, fit diapedesis: si copiosus & impetuosus, fit anastomosis: si acris & mordax, diæresis. Quoad vitium sanguinis: pariter à sanguine vitioso, citra totius languorem, omnes hi morbi oriri possunt. Si enim sanguis fuerit tenuior, per diapedesin effluit: si copiosus, per anastomosin: si acris, salsus, mordax, per diæresin, quia ab hoc sanguine vnitatis soluitur.

Quoad differentias, quæ sumuntur à forma: exiens hoc sanguinis variū esse potest, prout variū est, quod egreditur. Variū a. esse solet, præsertim in ratione mixti, & proinde secundum Substantiam, & Qualitatem. Secundum Substantiam, seu formam, vel est Putridum, vel Non putridum, Secundum qualitatem: hæc est Recondita, vel Euidens: &

Differētia.

secundum euentem, exiens hoc vel est calidum, vel frigidum, vel tenuius, vel crassius: vel huius, vel illius odoris, coloris. A subiecto non sumuntur differentie: nam idem est locus affectus: nisi quis forte dicat, venas vteri affectas esse, vel dextras, vel sinistras. A causa efficiente: malum hoc fit ob noxiam vel Totius, vel Sanguinis.

Signa in genere.

Malum hoc in genere facile cognoscitur: quia oculis sanguis egrediens conspicitur, & quidem in magna copia. Porro secundum Galeaum cap. 5. l. 6. loc. affect. profluuium sanguinis copiosum interdum est noxium, de quo nos hic loquimur: interdum salutare, quod fit à robusta expultrice. Distinguuntur autem è mala tolerantia fœminæ: quæ cognoscitur, tum è Galeno loc. c. tum è mutatione coloris fœminæ, qui fœtus est: item è tumore pedum, ynde & hydrops imminet, item è læsione appetitus, è læsa coctione. Hippocrates lib. 2. de morb. mul. addit, nos hoc malum cognoscere, è colore exeuntis rubro: ad differentiam profluuij muliebris, quod non est rubicundum, sed alterius coloris. Et quia in profluuiio muliebri interdum materia egreditur colore rubicundo donata: nam sanguis vteri rubicundus est: ideo Hippocrates addit, præter rubrum colorem necessario materiam egredientem grumescere: ichor autem non grumescit. Quoad differentias formales: ex odore sanguis putridus, non putrido distinguitur: aliæ qualitates è colore percipiuntur.

Signa diff.

Differentias à loco mulier significabit: num scilicet malum sit in parte dextra, vel sinistra. Quoad differentias à causa efficiente: oportet cognoscere, an sit diapedesis, anastomosis, vel diarexis. Diapedesis cognoscitur, quia sanguis fluit citra dolorem, & est tenuis, aquosus, vt vix concresecat, præterea in exigua quantitate egreditur, sed per plures dies: ynde hac ratione profluuium est immoderatum, quia copiosus sanguis egreditur, cuius signum est, quod fœminæ non perferunt. Anastomosis cognoscitur, quia sanguis egreditur sine dolore, confertim, & sanguis exiens euidenter concresecit. Diarexis cognoscitur, quia sanguis cum dolore effluit, suntque signa euidentia solutæ unitatis. Verum cū sanguis effluat propter morbos, propter læsionem retētricis: dictumque sit hæc mala fieri ob præcipuum vitium vel vteri, vel totius, vel sanguinis: hæc vitia principalia ita cognoscentur. Si enim præcipuum vitium ad vterum pertineat: id cognoscetur, v. g. ex ictu, è plaga secundum vterum, è fomentis relaxantibus vtero

adhibitis

adhibitis, & reliquis causis prægressis, iam propositis. Si vero princeps malum spectet ad totum: id cognoscetur è malo colore totius, & inappetentia, è læsis coctionibus. Notandū autem hæc signa quandoque indicare hoc profluuium in genere: quandoque vero indicare profluuium, vt sit vitio totius. Si primo modo, calor fœdus totius, & reliqua proposita vitia non præcesserunt, sed fuerunt subsequuta: verbi gratia color fœdus totius corporis subsequitur profluuium sanguinis immoderatum, vt hydrops etiam immineat. Sed si hæc signa præcedant profluuium hoc immoderatum: tunc sunt indicia huius profluuij non in genere, sed vt sit vitio totius. Si denique malum præcipuum referatur in sanguinem: cognoscetur sanguis vel copiosior, vel tenuior, vel etiā acrior, e propriis signis: de quibus alias.

Præsidia sumuntur à virtute, & à causa efficiente. Quid. n. locus affectus, seu vterus indicet, dicemus in læsa conceptione. Quoad virtutem: sermo est in præsentia de profluuiio immoderato, quod necessario est contra tolerantiam virtutis, quia calor dissoluitur. Profluuium ergo hoc, vt immoderatum, ratione virtutis, ratione caloris qui dissipatur, indicat remedium concentrans, adstringens, cuius beneficio vniatur calor, qui plus isto dissoluitur. Præsidia etiam haurienda sunt à morbo: idque dupliciter: primo, vt est talis morbus, & vt potiss. fit à tali causa: vnde diapedesis, indicat condensans: anastomosis, adstringens, obferans: diarexis, si simplex, agglutinans: si mista, id est si cavitatem habet annexam, indicat remedium nutriens. Quatenus a hæc mala sunt vel ab vtero, vel à toto, vel à sanguine: aliæ oriuntur indicationes. Vitium vteri varium, varia indicat: verbi gratia si morbi hi procedant à materia putrescente, exsistente in vtero: hæc materia eradicanda. Si fiat vitio totius: oritur indicatio roborandi ventriculum, iecur: horum viscerum intemperiem corrigendo per contrarium. Si fiat vitio sanguinis: varia est indicatio: si enim tenuis sit sanguis, indicatur crassefaciens: si acrior, attemperans: Si peccat secundum motum seu impetum: morus simpliciter indicat remedium, beneficio cuius quiescat. Impetus a. ad vterum indicat reuellens. Nihil dico de sanguine copioso: quia cum profluuium sit superfluum, non adest copia, sed potius penuria sanguinis.

Malum hoc in genere non est despiciendum: quia noxam affert, & speciei, & individuo. Speciei: quia turbat cœceptionē,

Indicationes.

Prognosis.
ca.

dum eam prohibet, vel si forte fœmina conceperit, solet esse in causa abortus. Nocet etiam indiuiduo fœminæ, secundum Hippocratem, aph. 57. sect. 5. & Galenum cap. 9. lib. 4. de prælag. pul. fœminæ enim cachexia afficiuntur, hydrope, patiuntur animi defectus, conuulsiones. Si animi defectus fiat in profluvio sanguinis immoderato, est symptoma admodum insensum fœminæ. Si autem eueniat fœminis, ut contingere solet, præ timore nimio, non debemus usque adeo exhorrescere: modo non fiat ob longam euacuationem. Cōuulsio etiam pessima est, ut colligitur e com. aph. 56. sect. 5. ubi ait: dum conuulsiones fiunt, quando pars nervosa afficitur, has conuulsiones non esse usque adeo lethales, quia cerebrum facile compatitur: at, si pars affecta non sit nervosa, & vi huius succedat conuulsio, pessima hæc est, quia cerebrum ducitur in consensum cum parte non nervosa, ob vehementiam affectuum. Quia igitur uterus non est mēbrum nervosum, sed membraneum fit, ut dum utero affecto subsequuntur conuulsiones, hæc sint lethales. Quoad differentias formales, vitium est maioris periculi, si quod egreditur est putridum, virulentum, acre. Quoad differētiās à loco affecto: maius adest periculum, si uterus secundum omnes partes afficiatur. Ab efficiente: maius est periculum, si fiat ob diarræsin: minus, si ob diapedesin. Cum autem hæc mala fiant quandoque ob vitium uteri, quandoque totius, quandoque sanguinis: facile est perpendere vim horum vitiorum: de quibus alias diximus.

*Curatio.
Phlebotomia.*

Rhasis venam secat: itemque Aetius. Rhasis respicit ad profluvium immoderatum, ut sanguis copia non peccet. Et proinde in sermone de indicationibus, nihil diximus de imminutione sanguinis. Venæ sectio est materia remedij vehementis, sed reuulsorij, indicati à sanguine, peccante, non qualitate, sed impetu: & ita impetu, ut vitium hoc sit vehemens, cuius gratia necesse sit confugere ad materiam remedij vacuantis reuulsorij vehementis: quod nil aliud est, quam venæ sectio. Quoad usum: circa quando, duo sunt obseruanda: Primum, quod Rhasis venam secat non vno die, sed pluribus. Hic non loquitur de quantitate discreta, quia non respicit ad sanguinem ut copia peccet, sed ut peccat motu. Quatenus ergo peccat secundum motum: eius præsentia (quæ indicat quando agendum) est perpendenda: quæ cum perseveret plures dies, propterea etiam Rhasis per plures dies secat. Secundo notandum,

dum, quod Rhafis ait, per hebdomadā vtendum esse adstringentibus, & tunc, si profluuiū crescat, non esse secandā venā: at, si non crescat, secandā esse venam. Rhafis ergo primū vtitur adstringētibus, postea venā secat. Aëtius cōtra, primum secat venā, postea vtitur adstringētibus: nam si primo adstringentia vsurpentur, noxa creatur scēminē, vt hydrops & alia mala immineant. Respōlio. Vteq; auctor respexit ad præsentiā indicantis. Rhafis quidē respexit ad profluuium immoderatum sanguinis, in quo sanguis in maiori copia, quā decet, est egressus: vt in sanguine peccatū sit solū secundū motum, non a. secundū qualitātē: in quo malo adest præsētia caloris indicantis, qui calor dissoluitur: vt necessarium sit vti adstringentibus, beneficio quorū non modo occurrimus calori, sed etiam motui sanguinis, quia adstringentia possunt cōpescere impetū sanguinis. Quare perseuerāte hac præsētia indicantis, licet progredi medicamētis adstringentibus. His si nō cedat sanguis suo impetu: hic impetus, hoc peccatū in motu est vsque adeo vehemēs, vt indicet remediū reuulsorium vehemens, cuius materia est venæ sectio. Rhafis igitur, dum adest hęc præsētia indicantis, & malum non cedit adstringentibus, eo tempore probat venæ sectionē. Aëtius vero respexit ad superflūū sanguinis, quod non modo immoderatū est, sed immoderatū euadere pōtest. Quod sane imminet ratione & impetus, & copię sanguinis. Ideoque merito copię nō esset tantum, immo maxime periculosum, ante venæ sectionē adstringere: quia peccatum in copia magis potest ad indicandum euacuationem, quā calor ad adstringēdum. In praxi ergo ita procedendū. Si obseruetur sanguinis egressus in maiori copia, quā decet, imitandus est Rhafis: at, si immineat immoderatū profluuiū: (quod cognoscitur, quia superiorū simile quippiam contingit:) sequendus est Aëtius, quia copiosus sanguis nō est adstringētibus in corpore detinendus. Quoad locum: secandæ sunt venæ cubiti: quia talis est subsistentia indicantis, & præsertim vt subsequitur motum sanguinis.

Quoad Cucurbitulas: Hippocr. has applicat nō modo spatulis, sed etiā crurib. Aëtius etiā scapulis. Cucurbitulę scarificatę, in hoc malo, sunt materia remedij indicati ā sanguine, vt peccat, non copia, sed motu potius. Quare sunt materia remedij & reuulsorij, & deriuatorij. Cucurbitulę vt reuellentes, sunt applicandę scapulis: sic n. sanguis descendēs sursum trahitur. Cucurbitulę a. vt deriuantes applicandę sunt cruribus:

Cucurbitula.

cruribus: nam caua vena descendit in lumbos, & in duos ramos diuiditur, qui per crura descendunt, à quibus quædam venæ deducuntur in vterum: ideoque per has fit deriuatio. Auicenn. hac in parte imitatus est Galen. qui c. 8. l. de præcogn. in profluuium muliebri (non sanguinis) probat euacuationem per lotiū, per sedem: & proinde probat remedium deriuatorium. Cucurbitulæ non scarificatæ probantur magnæ, & cum flamma copiosa admotæ mammis. l. 2. de morb. mul. aph. 50. sect. 5. c. 19. l. 13. meth. quia huiusmodi cucurbitulæ sunt materia remedij reuulsorij, indicati à sanguine, vt impetū habet in vterum. Recte a. modo iam declarato administrantur. Nam cum summa sit actio sanguinis, qui impetum habet in vterum: iccirco magnæ probantur cucurbitulæ. Et, cum summa sit resistentia: probantur cum magna flamma. Præterea probantur ea ratione, vt modo applicentur vni parti, modo alteri, prout præsentia sanguinis magis impetū habet secundum vnā partem, quam secundū alteram. Tandem applicantur māmīs, vel potius sub mammis, merito subsistentiæ sanguinis, vt peccat secundū motum: siquidem cōmunes sunt hæ venæ & māmīs, & vtero: vnde sanguinē promte ad superiores partes trahunt, vt ita coerceatur motus sanguinis ad vterū factus. Sed prohibere solet virtus respirationi destinata. Quare, si eueniat, vt dum applicantur hæ cucurbitulæ, lædatur respiratio. (vt monet Galenus:) non sunt his partibus applicandæ. Sed hoc loco occurrit difficultas: quia superius dictū est, è mente Hippoc. & aliorū, probari in hoc malo cucurbitulas, que scarificatæ cruribus applicantur. Cur ergo cucurbitulæ non scarificatæ, cruribus, & ipsæ applicantur? Responsio. Quia scarificatæ non modo attrahunt sanguinē per modum deriuationis, sed etiā euacuant. Cucurbitulæ a. non scarificatæ attrahunt, non euacuant, & propterea non applicantur cruribus. Ligaturæ sunt materia reuulsorij præsidij. Quoad vbi: Gal. c. 14. l. 1. ad Glauc. In hoc malo iubet esse ligandos artus supernos brachij: faciendæque plures & fortes ligaturas, quia summa est resistentia sanguinis. Plures probat: vt significet, quando, administrantur ligaturæ, non esse partes ligatas detinendas per horam: alias mortuæ quæ euaderent: ideo per vices ligare & soluere oportet. Sic ergo Galen. brachiorū ligaturas probat. Hippocr. vero l. 2. de morb. quem secuti sunt Auicenn. Paulus, Aëtius probat ligaturas & secundum brachiū, & secundū crura supra genua. Cur igitur Gal.

tantum

Ligatura.

tantum applicat partibus supernis, Hippoc. supernis & infernis? Responsio. Vbi agendum indicatur à subsistentia principaliter indicantis, id est sanguinis, motu peccantis. Huius a. duplex esse potest subsistentia, altera supra vterū, quæ consequitur sanguinē, vt mouetur à supra ad infra, id est ad vterū: merito cuius probantur ligaturæ in brachiis, vt sanguis qui mouetur in vterū, ad superna retrahatur. Altera subsistentia est infra vterū, quæ cōsequitur essentiam indicantis sanguinem pariter vt peccat secundū motum, qui est à partibus infernis, ad partes supernas, id est à femoribus ad vterū: & tunc ligatura supra genu est administranda, vt retrahatur sanguis ascendens, vt per has ligaturas descendat: sicuti potiss. dum foeminæ sanguine reperiūtur refertæ secundū femur. Concordia a. Galeni & Hippoc. facile patebit à quæstione sequēti, de *quando agendum*. Gal. igitur applicat ligaturas brachio, eo tempore quo his solis vtitur ligaturis. Hippocr. eodem tempore & hora vtitur ligaturis & secundum brachia, & secundum coxas. Horum ratio talis est: Quando agēdum sumitur à præsētia indicantis: dum sanguis mouetur à supra ad infra, habet impetū ad vterum: reuellendum ergo nisi aliquid prohibeat, hoc est tempus opportunum. Hippocr. a. & ipse respexit ad indicantia quando agendum. Vnde, dum adest hoc profluuiū, adest impetus sanguinis ad vterū, id est à supra ad infra. Sed dum ligaturæ administrantur, id fieri solēt, vt sanguis existens infra vterū, impetum habeat ad vterum, moueatur ab infra ad supra: & propterea Hippoc. nō ligat coxas tantum (nec enim posset defendi.) sed ligat coxas eo tempore, quo etiam ligat brachia: vt beneficio duplicis ligaturæ eodem tēpore cohibeat vtrumque motum ad vterū, siue sit à supra ad infra, siue ab infra ad supra. In praxi ergo obseruandum, vt dum ligantur coxæ supra gēua, primum ligentur partes supernæ, deinde infernæ: & primum etiam dissoluantur ligaturæ cozarum, posteriori tempore ligaturæ brachiorum. Oportet a. vt ligaturæ secundum brachia sint fortiores ligaturis partium infernarum. Et à dictis ratio est in promptu: primum n. sunt ligandi artus superni, quia nisi ligentur, non adest præsētia indicantis ligaturas partium infernarum. Et ob eandem rationem primum etiam dissoluere oportet ligaturas partium infernarum. Et quia efficacior est impetus à supra ad infra, quam ab infra ad supra, ideo ligaturæ partium superiorum debent esse fortiores.

*Pharma-
cea.*

Quoad materias medicinales, nihil dicemus de respicientibus totum. Loquemur tantum de materia medicinali gratia sanguinis, morborum vteri, & virtutis. De his medicamentis breuiter agemus, quia omnia similem viam & facultatem habent. Quantum ad sanguinem: is peccat in hoc malo sui tenuitate, acrimonia, impetu. Vnde in hoc malo vtendum fomentis refrigerantibus, crassefacientibus, & proinde astringentibus. Merito autem morborum vteri: cum vteri viae sint plus iusto peruiæ: pariter probantur medicamenta crassefacientia, refrigerantia, & proinde astringentia. Gratia virtutis, vt dissipatur calor, egemus calefacientibus & astringentibus. Quare agendum de medicamentis frigidis & astringentibus. Hæc autem duplicia sunt: alia quidem crassefacientia citra stupefactionem; alia crassefacientia & simul stupefacientia. Crassefacientia citra stupefactionem, possunt esse materiae remedij indicati à sanguine, & à morbo, & à virtute. At crassefacientia cum stupefactione, nequaquam possunt esse materiae remedij indicati à virtute, quoniam virtus potius prohibet, cum debilis est. Crassefacientia citra stupefactionem, crassefaciunt & astringunt, vel sine lentore, vel cum lentore. Quæ crassefaciunt citra lentorem, probantur præsertim in anastomosis: quæ cum lentore, in diæresi. Quoad priora, Hippocr. lib. 2. de morb. mul. probat corallum, cernu- ceru, santallos, gallas immaturas, rosas, myrtum, messili la. sorba, malisorbi, roga immatura, & omnia acerba. Quæ crassefaciunt vnde cum lentore, sunt symphytum, tragacantha, arabe, trochisci de arabe sine opio, bolus arn. plantago, albumen oui, pedes vitulini, farina citra fermentum. Quoad usum, & primo quoad dosin, probatur dosi modo minor: pro actione morbi principaliter indicantis. Quoad modum: vti licet, quandoque forma linimenti, quandoque forma infusus, pulu. boli, portionis. Quoad quando: sunt administranda, dum adest præsentia indicantis, & nihil prohibet: prohibet autem materia obstruens viscera. & præsertim dum hæc medicamenta per os exhibentur. Vbi. Possunt autem hæc medicamenta exhiberi, & applicari. Quoad ea quæ exhibentur: Hippocr. l. 2. de morb. mul. exhibet ʒj. mororum rubi siccatorum cum ʒj. pasta, id est, farina sine fermento. Et dum Hippocratis propositum erat adhuc magis crassefacere, ascendebat ad maiorem dosin, respiciens ad maiorem vehementiam actionis sanguinis. Vnde morbo imminente permiscebat ʒj. pasta, & exhibebat

*Medica-
menta a-
stringentia.*

*I. Astringentia & mer. s. n. via simpli-
citer.*

cum vino nigro astringente, nisi esset febris: quia ubi febris, loco vini aqua usi oportet. Præterea Hippoc. exhibebat malum punicum decoctum cum vino proposito, dum non erat febris. Probatur etiam inter alia semen pomæ granatæ contritum, & exhibebat cum polenta, id est, cum farina confecta è viridi bordeo affato. Virgente necessitate, idem Hippocrates exhibebat ꝑ. stercoris muli, quod comburebat & conterebat, exhibebatque cum vino astringente. Sic probabat spongiam, eamque cōtritā cum vino exhibebat (hoc fœminæ habent pro secreto) Licet etiam exhibere saccharum rosaceum antiquum, diacydonium, diamorum à ꝑ. ad ꝑ. Galen. hoc exhibet. ꝑ. cera. balau. ana ꝑ. x. gummi ꝑ. ꝑ. excipiantur albo oui, & exhibeantur cum aqua & vini ꝑ. vii. Auicennas hoc probat: ꝑ. mummie, terra sigillat. boli Armen. orientalis, gallarum immaturarum, sang. drac. gallie mosibata, aluminis ana ꝑ. ꝑ. capbura ꝑ. ii. Soluantur syrupo myrtino. Gallia vititur tanquam vehiculo, est enim calida, sicca, tenuis substantiæ: nec cohibet menses sed potius prouocat: & si confectatur cum basi medicamēti, quæ constituitur è crasse facientibus, & adstringentibus in ea est proportione, quæ seruanda est in recta medicamentorū compositione. Dubitatur autem cur alumen proponatur. Per alumen igitur non intelligitur crudum alumen, sed combustū, quod sæpe etiam extinctum sit in lacte chalybeato, vel in sero lactis chalybeati: beneficio enim huius præparationis non est amplius mordax & abradens, sed habet vim astringendi citra omne detrimentum. Quoad externa: Hippoc. lib. 2. de morb. mul. potissimum probat piscā cum foliis rosarum: huius loco etiam uti possumus vino astringente. Præfici applicant unguentum Hippocratis dictū unguentum Comissæ, unguentū de castaneis. Possunt autē externa medicamēta administrari forma inunctionis, fomenti. Pectini etiam actu frigida applicari possunt, ea tamen frigiditate, ut fœmina horrore non afficiatur: qui modus indicatur à passione indicantis, nimirum sanguinis fluentis: qui cum vehementer resistat, efficacius requirit medicamentum, quale est, si actu frigidum applicetur. Sed præterea probantur astringentia, quæ habent vim stupefaciendi, quæ conficiuntur ex opio: unde probantur trochisci de Carabe cum opio, & magis probantur descripti à Rhase, quam à Alesue, quia illi recipiunt opium in minori quantitate. Hæc exhibentur. Hippocras. etiam applicat medicamentum confectum ex hyascyamo & cicuta. Hæc materiæ indicatur à sanguine, sed nō facile permittitur à virtute uteri: nam

Externa.

2. Astringentia narcot.

nam calor vteri indicat calidum: vt periculum sit, ne plus iusto hebescat, propter frigidiora medicamenta. Quare miscenda sunt, quæ ob crassitudinem substantiæ astringunt: ob caliditatem autem calorem seruant, ne ita stupefacientibus lædatur: vt *massiche, mentha, bacca cupressi, &c.*

Dieta. Victum crassefacientem probat Hippo. qui indicatur à sanguine tenuiore, & plus iusto fluxili. Probat autem *cibum assum, & panem assatum sub cineribus.* Hic modus agendi, indicatur à sanguinis passione, vt scilicet cibus crassefaciens magis crassefiat. In lue Gallica exhibetur panis assatus, ea ratione, vt virulentia gallica valenter siccetur. Neque obstat, quod habet aliquam vim crassefaciendi. Licet n. in lue non sit vtendum crassefacientibus, sed attenuantibus, & euacuantibus materiam per sudorem, per insensibilem transpirationem: vt tamen pane proposito causa vehementis exsiccationis: & impedimento, scilicet crassitie, occurrimus decocto guaiaci, farfa parillæ, &c. quibus materia satis attenuatur, euocatur ac dissipatur.

Panis assatus in morbo Gallico.

CAPVT III.

De Stillicidio mensium.

Nomen.



RER mensium stillicidium intelligimus fluxum sanguis, dum sit stillatim, & è necessitate cum dolore, vt monet Aetius. Doloris enim causa peculiare caput huic malo donatur: alias sufficeret ea quæ proposita fuere in sermone de suppressione & profusio mensium. Generatur hoc malum, dum sanguis cum impetu fuit in vterum, & eo cum impetu, vt soluat continuum, & hinc dolor excitetur, & stillatim egrediatur sanguis: quia sanguis suo impetu ita agit in vterum, vt necessario expultrix proprio munere frustretur. Quare stillicidium mentium est exiens sanguinolentum stillatitium vteri, dependens à frustratione expultricis venarum vteri. Dicitur exiens: ad differentiam excrementi, quod detinetur. Sanguinolentum, ad differentiam exeuntis, quod non est sanguis. Stillatitium: ad differentiam exeuntis sanguinei, quod non stillatim egreditur, sed in magna copia.

Causa efficiens.

Quoad causam efficientem: diximus, dependere à frustratione expultricis vasorum vteri, vt hoc malum distingueretur à profusio mensium, quod fit per diapedesin: hoc enim fit, dum sanguis stillatim & sensum egreditur, sed sine dolore,

dolore, ob frustrationē retentricis. Inquirenda igitur est causa, ob quam expultrix frustratur, Aetius cap. proprio inquit, quandoque esse causas specie diuersas, id est angustiam multiplicem, virium debilitatem, sanguinis multitudinem, sanguinem pituitosum, & sanguinem seculentum. Huius numeri ratio talis est. Expultrix frustratur, vel quia Læditur facultas, vel ob Errorem externū. Læsis facultatis est morbus. Facultas autem læditur, si vel Labefactatur, vel Impeditur. Labefactatur ob quamlibet intemperiem immodicam. Nam quoad calidā, secundum Auic. licet expulsio fiat à calido per se, quemadmodū à frigido per accidens: verumtamen intensior requiritur caliditas in concoctione, quam expulsionē: vt immoderata caliditas expultricē possit labefactare. Sed præterea intemperies frigida potest esse in causa: nam licet frigiditas adiuuet expulsionem, hoc tamen sit secundario & per accidens, vt potius conferat ad reddendū idoneum mīstum, quam ad viuificandum facultatem: vnde intemperies frigida facultatem labefactare potest. Præterea cum expulsio fiat potius à sicco, quam humido: gratia humiditatis intemperies potest expultricem labefactare. Sicca etiam in causa esse potest: nam licet à sicco fiat expulsio, siccitas tamē magis fauet retentrici: vnde siccitas valentior potest facultatem expultricem labefactare. Constat ergo labefactari expultricem ob intemperiem. Ad quæ vitia respiciens Aetius, proposuit debilitatem virium. Si vero expultrix impediatur: impeditur ob morbum in mala compositione, ob angustiam: quæ esse potest coalescentia, constipatio, compressio, subsidencia, & obstructio: has omnes insinuans Aetius, proponit angustiam multiplicem. Porro frustratur expultrix ob errorem externum: qui nil aliud est, quam sanguis: qui peccat vel Copia, vel Qualitate. Quoad copiam, Aetius proponit sanguinis multitudinem. Sanguis qualitate peccans, potest esse viscidus, vel crassus: ille pituitosus, hic seculentus.

Sufficit autem differentias sumere ab efficiente causa. Fit *Differentia.* ergo hoc malum, quia vel Læditur facultas, vel aliquis Error committitur. Læditur facultas, vel quia Labefactatur, vel Impeditur. Error adest, quia sanguis peccat Copia vel Qualitate.

Malum hoc in genere facile cognoscitur: stillatim enim *Signa.* egreditur sanguis, & cum dolore. De signis differentiarum in suppressione mensium diximus.

Indicationes.

Quoad præsidia: sufficit hæc haurire à dolore: reliqua enim tradita sunt in mensium suppressione & profluuiio. Quare præsidia sunt sumenda à dolore, & à causis doloris: de quibus alibi diximus.

Prognostica.

Idem de prognostico statuendum, quod in mensibus suppressionis dictum est: oportet enim perpendere vim morborum & sanguinis.

Curatio.

Aetius proponit materias, quæ potissimum respiciunt dolorem. Vnde quoad materiam cheirurgicam, hanc proponit ratione causæ doloris, quia per materiam cheirurgicam remouetur dolor, ob remotionem causæ. Aetius ergo proponit sectionem venæ, cucurbitulas scarificatas, & non scarifi-

phlebotom.

catas, hirudines & ligaturas. Quoad venæsectionem, ait: si dolor perseveret post fomenta, secandam esse cubiti venam, & sanguinem pro virium ratione detrahendum: deinde rursus fomenta esse iteranda. His verbis Aetius proponit, tum necessitatem venæsectionis, tum rectam administrationem. Quoad necessitatem venæsectionis: proponit venæsectionem, respiciens, non modo ad remedium genericum, sed etiam specificum. Quoad remedium genericum: id quod indicat remedium vehemens, vacuans sanguinem, nihil aliud est, quam sanguis, vi vehementi affectus; quam vehementiam exprimens Aetius inquit, si post fomenta dolor non minuitur, venam esse secandam: hinc epim evidens fit, sanguinem esse vehementem, qui non cedit fomentis. Remediū specificum insinuat, dum ait, sanguinem esse vacuandū, pro virium ratione. Hoc in loco non respicit ad vsum, id est, ad quantum agendum, sed ad remedium specificum: sicut enim sanguis ut vehemens, indicat vehemens remedium: ita sanguis, ut copiosus, indicat remedium vacuans sanguinem in magna copia. Hoc in loco iubet Aetius, sanguinem esse vacuandum in ea quantitate, quæ requiritur pro virium ratione: hoc enim remedium specificum indicatur à copia sanguinis: coindicatur & permittitur à viribus. In aliquibus morbis magis potest sanguinis copia, quam virtus: in quibusdam contra. Prudentissimus Aetius cognoscens in stillicidio mensium circa quantitatem sanguinis euacuandi, magis ad vires quam ad copiam sanguinis esse respiciendum, quia in hoc malo sanguis stillatim egreditur: ob id dixit, sanguinem esse vacuandum, pro ratione virium. Præterea proponit rectam administrationem, & præsertim quando & ubi agendum: quia

quia reliqua nota sunt. *Quando?* lubet esse secandam venam post fomenta: unde proponit fomenta sectioni venæ: & rursum post venam sectam vitur fomentis. Nam quando agendum, sumitur à præsentia indicantis. Nonne ante fomenta aderat præsentia sanguinis? Si post fomenta adest præsentia sanguinis: multo magis ante fomenta. Imitatus est Aetius Senem, qui lib. 2. de rat. vict. ait, in pleuritide dolorem fomentis esse sedandum: & si non cedat fomentis, venam esse secandam: utebatur enim fomentis, ut cognosceret an materia esset copiosa, necne: & proinde, an indicans esset vehemens, necne. Sic Aetius, ut cognoscat, an sanguis, causa doloris stillicidij, sit vehemens, necne: vitur fomentis: & ubi per fomenta cognoscit, sanguinem esse vehementem, dum scilicet non cedit fomentis, statim ad venæ sectionem confugit: & post venam sectam, cum refracta est vehementia indicantis, fomentis vitur. *Quoad ubi:* secatur venam cubiti: talis enim est sanguinis subsistentia, qui consequitur impetum sanguinis à supra ad infra.

Cucurbitulas etiam probat Aetius, si malum non cedit fomentis: quarum tres aut quatuor, citra scarificationem, petiini & inguinibus applicat: & si dolor perseveret, etiam cum scarificatione, ita ut immoderata sanguinis quantitas euacuetur. His verbis proponit auctor cucurbitularum necessitatem & usum. *Quoad necessitatem:* duo proponit: primum, cum dicit, cucurbitulas esse recensendas inter validiora auxilia: cognovit enim cucurbitulas esse materias remedium & discutientis, & deriuantis: & proinde euacuantis tum sensibiliter, tum insensibiliter. Cucurbitulæ enim scarificatione sensibiliter euacuant. Cum ergo malum non cedit fomentis: patet doloris causam ita esse vehementem, ut ad validiora sit accedendum: non quidem validiora, ratione venæ sectionis, sed ratione fomentorum. Alterum circa necessitatem tangit Aetius, dum ait: immoderatam sanguinis quantitatem esse euacuandam, quia in hoc malo licet non euacuetur sanguis in multa copia, ex aliqua tamen parte euacuetur, ut sufficiat moderata sanguinis euacuatio: & ob id per cucurbitulas sanguis detrahendus non ad libras, sed ad uncias. *Quoad usum:* & primum quantum agendum: applicandæ sunt modo tres modo quatuor cucurbitulæ: prout enim maior est sanguinis actio: pro eo pluribus vel paucioribus cucurbitulis utendum, *Quoad modum:* applicandæ sunt

Cucurbitulae.

interdum cum, interdum sine scarificatione: prout varia est passio sanguinis: si enim sanguis facile cedat, probantur non scarificatæ: si maior sit resistentia sanguinis, probantur scarificatæ. Eo autem tempore probantur quo adest præsentia indicantis, quam præsentiam significant fomenta, dum his sanguis non cedit. In praxi notandum, ante fomenta quandoque adesse præsentiam indicantis: cum insignis est dolor. Tutius autem est primum uti fomentis, deinde cucurbitulis. Licet vtero ante fomenta absit præsentia sanguinis: quia tamen per cucurbitulas euacuatur sanguis potius tenuis, quam crassus: dum sanguis crassus est, sua crassitie prohibet usum cucurbitularum: ad crassum enim sanguinem fundendum & attenuandum, expedit uti fomentis: post quem usum adest præsentia sanguinis, neque crassities amplius prohibet, quia non adest. Quoad *ubi*: applicat pectini & inguinibus, propter subsistentiam sanguinis, dolorem in vtero excitantis.

Hirudines.

Post cucurbitulas, ait Aetius, hirudines pectini & inguinibus esse applicandas: quia æque iuuant ad attrahendum, atq; cucurbitulæ. His verbis Aetius proponit hirudinum necessitatem, & potissimum quando agendum. Necessitatem: cum inquit, æque iuuare ad attrahendum, ac cucurbitulas: dum enim sanguis sui vehementia perseverat, ad excitandum dolorem: est necessarium etiam confugere ad hirudines, quæ æque trahunt ac cucurbitulæ, non simpliciter, sed dum adhibentur post cucurbitulas scarificatas. Hoc ergo in praxi obseruandum, ut post applicationem cucurbitularum scarificatarum, non rursus applicentur cucurbitulæ, ne intensior dolor excitetur. Ut autem sanguis euacuetur, optimum est, ut hirudines applicentur aliquibus foraminibus: ita enim copiosus sanguis egredietur sine dolore, qui metuendus esset, si rursus applicarentur cucurbitulæ. Pauci hoc obseruant, quia pauci intelligunt Aetium. Quoad *quando agendum*: applicandæ sunt hirudines post cucurbitulas: quia post eas adest præsentia indicantis: & nihil prohibet.

Ligatura.

Postremo probat Aetius, ut fasciis ligentur extremitates infernæ, & supernæ: nam harum beneficio coerceatur impetus sanguinis in vterum, siue motus sit à supra ad infra, siue contra.

*Phlegma-
xim.*

Medicamenta proponit Aetius, quæ referuntur ad dolorem, tum quatenus symptoma est, tum quatenus à sanguine, tanquam à causa, excitatur. Quoad priora medicamenta, à dolore

dolore indicatur frigidum & humidum. Sed de materia frigida & stupefaciente nihil meminit Aetius, quia non probatur: in mensium profluuium probatur, quia in stillicidio materia non euacuatur ut opus est: unde opiatum non est utendum. Sat ergo fuit Aetio, proponere medicamenta humectantia, beneficio quorum mitigatur dolor. Vnde potissimum probat lanam succidam, cum vino & oleo rosaceo: Probat vesicam semplex, nam medicamentis humectantibus: verbi gratia; oleo sesamino, amygd. dul. l. l. alb. decocto malua, alib. fenigraci, meliloti, &c. Sic probatur usus butyri, medullarum, adipis, potissimum vitulini, galinacei, suilli: quorum beneficio hebescit aliqua e parte calor & acuties. Quae causam doloris respiciunt, sunt resoluentia: unde Aetius propositis medicamentis addit rutam, artemisiam, matricariam, semen lini, anethi: addit etiam terebinthinam oleo liquatam. Et urgente necessitate ascendit ad eneathismata, ad epithemata, ad sinapismos, ut sinapi & euphorbia etiam utatur, ad causam doloris eradicandum. Et haec applicat partibus propositis. Praeterea probat medicamentum e pyrethro, & staphide agria confectum, in quibus est vis calefaciendi, attenuandi, exsiccandi, & dissoluendi. Sufficiat monere circa modum. Aetius inquit, balnea naturalia calida esse applicanda, & aquam marinam frigidam esse adhibendam. Modus indicatur a passione indicantis. Cognouit Aetius, talem esse passionem sanguinis, ut difficulter cedat resoluentibus. Quare balnea sulphurea, ut effi-

*Anodyna
humectan-
tia.*

Resoluentia.

Viscus.

Quoad dietam: cauendum est ab acribus & flatulentis: acria enim dolore exacerbant: & flatulenta, & proinde crassa atque viscida, sunt in causa, ut cum maiori difficultate sanguis egrediatur. Quorum utrumque cauendum in hoc modo.

CAPVT IIII.

De profluuiio albo.



Itium hoc dicitur profluuium album, muliebre, *Nomen.* vterinum. Hippoc. aph. 36. sect. 5. appellat menses decolores: quia menses colorati sunt menses rubri: hi autem fluores non seruant colorem de-

centem. Et Gal. c. ult. l. 3. de sym. caus. sub eodem nomine profluuij albi claudit & profluuium muliebre, & profluuiū vterinum. De omnibus igitur his malis hoc in capite dicendum.

Generatio.

Generatur hoc malum, quando materia morbifica excrementitia in venis vteri existens, ita irritat expultricem, vt hæc materia per vterū egrediatur. Malū ergo hoc est exiens excrementitium venarum vteri, procedēs à frustratione expultricis vteri. Exiens dicitur, ad differentiam excrementi quod non excernitur, sed retinetur. Excrementitium, ad differentiam sanguinis, qui est exiens alimentale, quod dum in corpore retinetur, potest in alimentum conuerti. Secus autē statuendum est de exeunte in profluuiio albo, quod est exiens excrementitium. Hoc exiens cum Galeno c. 5. l. 6. loc. aff. non modo potest esse humor, sed etiam ichor. Humor scilicet pituitosus, biliosus, melancholicus, & atrabilaris. Sanguis autē non proponitur: quia in hoc malo primaria ratione nō egreditur, licet quandoque per viam consecutionis aliqua portio egredi possit. Quoad ichorem: potest esse quilibet ichor: nam Gal. l. cit. proponit ichorem aquosum, subpallidum, & rubrū: aquosus est ichor pituitæ: subpallidus, humoris melancholicus: ruber, sanguinis & bilis, quia ichor bilis subruber est. Constitutū ergo ut hoc exiens excrementitiū esse & humorē, & ichorē. Subiectū, sunt venæ vtericæ: ad differentiam aliorum vasorum: verbi gratia, ad differentiam vasorum seminalium, vt distinguatur hoc vitium à gonorrhœa. Præterea per venas distinguimus hæc mala à meatu vesicæ, vt hoc malum distinguatur à profluuiio lotij, arenularum. Diximus vteri: vt hoc exiens distingueretur ab exeunte per venas, non vteri, sed aliarum partium.

Subiectū.

Causa efficiens.

Quoad causam efficientem, diximus: procedens à frustratione expultricis. Vt per hanc particulam distingueretur hoc malum à profluuiio sanguinis: qui, licet ratione foetus posset habere rationem alimenti, non excrementi: ratione tamen foeminae rationem habet excrementi: vt sit exiens excrementitium venarum vteri: sed hoc non procedit à frustratione facultatis expultricis, verum à retentricis frustratione. At exiens in albo profluuiio, procedit à frustratione expultricis. Inquirendum ergo quam ob causam frustratur facultas expultrix. Dicimus eam frustrari non læsa facultate, id est non ob morbum, vt colligitur ex Hippoc. lib. 1. de morb. mul. & c. 5. l. 6. loc. aff. vbi inquit, profluuium muliebre fieri,

vtero

utero nequaquam affecto. Si uterus non afficitur: certe locū nō habet læsio facultatis, sed solum error externus. Nec obstat, licet idem Gal. loc. citato dicat, in profluuiū vterino affici vterum: nam morbus, quo uterus afficitur in profluuiū vterino, nō est morbus pertinens ad expultricem, sed ad alteratricem: Cōstitutum ergo sit, fieri ob errorem externum: qui nil aliud est, quam materia excrementitia, à nobis proposita. Hæc materia, vt colligitur è t. 5. l. 6. loc. aff. & c. ult. l. 3. de caus. sym. generatur quandoque In vtero, quandoque Extra vterum. In vtero, in profluuiū vterino: quia frustratur cōcoctrix, quandoque ob morbum, i. intemperie, frigidam, quæ etiam humiditatem coniunctam potest habere: quandoque ob errorem externum, i. ob sanguinem crudū, qui detinetur in acerbulis vteri, i. in orificiis venarū vteri, vt sanguis sic pituitosus & crudus redditus, sui copia aggrauet expultricem, & ita egrediatur. Extra vterum generatur ad eundem modum, vel Læsa facultate, vel ob Errorem externum. Læsa facultate: ob morbum quandoque ipsius capitis: vt interdum fiat profluuiū album à capite refrigerato, humectato: quandoque ob morbum ventriculi frigidū & siccum, & præsertim in profluuiū pituitoso: quandoque ob morbum iecoris, cum iecur afficitur morbo calidiore: vt sanguis biliosus melæcholicus, & similes ichores producantur. Sed præterea hi succi, hæc excrementa possunt generari, ob frustrationē alteratricis, propter errorem externum, id est, ob prauam viuendi rationem: quæ, prout varia est, ita solet esse causa, vt varij succi generentur. v. g. si diæta fuerit pituitosa, mulier vsa fuerit cibis pituitosis, potu aquæ: sanguis iure producitur pituitosus. Sic si vescatur cibus calidioribus, bibat vinum meracius: generantur succi acriores, biliosi, atrabilarij.

Quoad differentias formales: Cum hoc malum sit exiens, *Differētia.* excrementitium: differentiz sunt penes Essentiam, & penes Vitium. Penes essentiam: vt sit Humor, vel Ichor. Si humor, vel pituita, vel bilis flaua, vel atra. Peccatum est in, qualitate, quantitate, vel motu. In præsentia admonere sufficiat penes motum: ex aphor. 36. sectio. 5. hoc excrementum, vt alsiduo mouetur facere profluuium perpetuum: vt per interualla mouetur, facere profluuium per interualla: & hoc est vitium, quod vocant menses decolores, modo anticipantes, modo postponentes. Quoad differentias à subiecto: venæ vteri vel sunt Corporis vteri, vel Ceruicis vteri. Quoad causam

efficientem : ab hac prodeunt differentia illæ , qua dicitur profluuium Muliebre , vel Vterinum : muliebre id dicitur , in quo excrementum generatur extra vterum : vterinum , in quo excrementum generatur in vtero.

Signa in genere.

Distinguitur hoc profluuium , ab mensium profluuium immoderato , his tribus : nimirum substantia , colore , & motu illius quod egreditur . Quoad substantiam : in profluuiio sanguinis excrementum substantiam habet , quæ concrescit : at in malo nostro proposito , id quod effluit , non concrescit . Quoad colorem : is exacte rubicundus est in profluuiio , de quo supra diximus : in hoc . autem malo color non est rubor , vnde profluuium album vocatur . Et , si contingat , cum excrementis egredi aliquam sanguinis portionem , non tamen color erit ruber : vnde Hippoc. vocat menses decolores , quia hoc excrementum destituitur illo rubicundo colore . Quoad motum : profluuium sanguinis menstrui non est ita perpetuum , quæadmodum profluuium muliebre , quod per annos etiam aliquot continuo durat : in super menses decolores , non seruant certas periodos , sed incertas . Ex his malum hoc in genere

Signa differentiarum à forma.

cognoscitur . Quoad signa differentiarum formalium : oportet perpendere materiam penes speciem , & vitium . Species est ichor , vel humor : cuius dignotio traditur l. i. de morb. mul. nam si v. g. sit ichor : cognoscitur materiam egredi tenuem , & veluti aqueam , si substantia spectetur : si humor , exiens obinet substantiam crassiorem , instar mellis . Species ichoris ita deprehenditur : si pituitosus sit , erit excrementum albicans : si melancholicus , subpallidum : si biliosus , subrubrum , flauescens cum materia quæ egreditur apparebit , si sit ichor sanguinis , colorem rubicundum referet , nullus tamen grumus apparebit , non concrescet , quia non est sanguis , sed eius ichor . Si fuerit humor : oculis conspicietis quisnam sit : & signa aderunt huius vel illius prædominantis . Sed notandum , quod aliquando vna cum humoribus aliqua portio sanguinis egreditur , quæ ita humorum colorem turbat , vt primo intuitu non ita euidenter liceat peccantem humorem cognoscere . Attamen secundum Hippocr. l. i. de morb. mul. & secundum Aetium , hi succi deprehendentur , si panni infecti seruentur per diē , deinde vero simplici lotioni abluantur , postea in umbra siccantur : nam lotura sanguinis portio abluitur , & humor derelinquitur , qui vario modo pannum tingit , vt modo albicans conspiciatur , ratione pituitæ : modo citerinus ,

ratio

ratione, bilis: modo nigricans, ob melancholiam. Quoad differentias à subiecto: num egrediatur materia per venas corporis vteri, vel potius cervicis: ita distinguetur: dum materia egreditur per venas cervicis, non solet esse admodum copiosa, quemadmodum effluit per venas vteri, quia copiosiores sunt: secundo, dum materia egreditur per venas vteri, post conceptum, tempore gestationis vteri, profluuium cessat, at si materia fluat per venas cervicis vteri, etiam post conceptum, tempore gestationis vteri, profluuium illud perseverat. Quoad differentias causæ efficientis, oportet cognoscere, an excrementum gignatur vel in vtero, vel extra, id est, an profluuium sit muliebre, an potius vterinum. Distinguentur, primum ratione copiarum: nam dum materia generatur extra vterum, copiosa est, & copia etiam in profluuiio muliebri excernitur: si gignatur in vtero, non est ad modum copiosa, licet ex Hippo. sententia assiduo putrida materia descēdat. Secundo distingui poterunt è signis, indicantibus vitia, vel totius, vel alicuius partis non ignobilis, ut iecoris, ventericuli, cerebri: si enim assint signa indicantia vitia partium extra vterum: dicendum, materiam generari extra vterum: si contra vterus perpeßus sit aliquam contusionem vel corruptionem: statuendum potius materiam generari in vtero, profluuium esse vterinum. Tertio inter nosci poterunt per colorem: nam si materia gignatur in vtero, color materię erit albus: si extra vterum, non erit ita albus: ratio est, quia cum materia cōfluat in vterum per venas supra vterum, vix fieri potest, ob sanguinis præsentiam, quin illius excrementi color nonnihil mutetur. Quarto distinguentur: nam si profluuium fuerit muliebre, id est, materia gignatur extra vterum, post fluxum mensium secundum naturam, profluuium muliebre minuetur, quia hoc excrementum tempore statuto vna cum sanguine menstruo est euacuaturn, ut cum cessauerint menses, non videatur esse profluuium adeo copiosum, quemadmodum ante menses: oppositum est, si profluuium fuerit vterinum, si materia gignatur in vtero: nam cum hæc materia relideat in orificiis venarū, hæc nihil aliud est, quam succus quidam pituitosus, & proinde viscidus: vnde tempore mensium humores viscidi à sanguine menstruo agitantur, sed propter visciditatem non ita facile effluunt. Dum vero menses cessant, materia hæc iam commota, & aliqua è parte externa ab expultrice expellitur, ut merito post menses hoc profluuium augeatur.

Signa differentiarum à subiecto.

Signa differentiarum à causæ efficiente.

Indicationes.

Quoad præsidia: suppositis vitalibus, ea sumenda sunt ex indicantibus ex vñu, & proinde ab excremento. Galenus c. 8. lib. de præcognit. loquitur tantum de profluuiio muliebri: quo cruciebatur vxor Boëthi. Nos ea ad omne profluuium, tum muliebri, tum vterinũ, transferre possumus. Sunt ergo desumenda præsidia ab excremento, vt perpendi potest penes qualitatem, copiam, motum, atque vt ab agente morbifico producitur. Penes copiam: indicatur minuens, vacuans: quod præsidium etiam cognouit Hippoc. aph. 36. sect. 5. vbi ait: vbi sceminae patiuntur menses decolores, purgatione indigent. Merito qualitatis: alterans per contrarium. Causa motus, indicatur deriuans, reuellens: & proinde indicatur remedium euacuans per lotium, per sedem, merito præsidij deriuantis: gratia autem reuellentis, indicatur remediũ euacuans per sudorem, indicatur vomitorium. Galen. non inuenit vomitorij: quia non respicit ad quodlibet profluuium, sed ad indiuiduum, mulierem quæ habet ventriculum imbecillem, vnde non potest vomitorijs vti. Ea autem ratione qua excrementum producitur: pro vario generante, varia oriuntur præsidia: verbi gratia si producatur excrementum à cerebro frigido & humido, oritur indicatio calefaciendi & siccandi cerebrum: si calido iecore, refrigerandi.

Prognostica.

Scopi propositi maiori è parte possunt expleri: nec tamen vitium contemnendũ est, quia obest conceptioni: & si quandoque concipiat mulier, potest euenire facile vt fiat abortus. Pro discrimine tamen differentiarum malum est magis vel minus periculosum. Hippoc. aph. 36. sect. 5. insinuare videtur, deterius esse hoc malum, si portiones alimentales in excrementa mutantur, & effluant.

Curatio.
Vena sect.

Vena secanda non est in profluuiio muliebri: sed potest secari in profluuiio vterino: quia in profluuiio muliebri extra vterum in toto corpore redundat succus vitiosus, recedens à natura sanguinis: vt locum habeat purgatio. At in profluuiio vteri, causa mali est excrementitia, maxime recedens à natura sanguinis. Sed fieri potest, vt, licet hoc excrementum redundet in vtero, nihilominus in toto corpore redundet sanguis: & cum hic habeat rationem causæ sine qua non, & proinde sit vehemens, sit vt venæ sectio administrari possit.

Materia medica.
les.

I.

Vacuãtia.

Medicamenta sunt triplicia: Vacuantia: Alterantia partes, quæ succos improbos producant: Corroborantia virtutem, quæ sunt astringentia. Vacuantia, vacuant materiam existẽtem

tem Extra vterū, vel Intra. Priora euacuant per aluū, per lo- ^{1. Vacuā-}
 rium, per cutim, per vomitum. Quoad vacuantia per aluum, ^{per aluū}
 Galenus cap. 8. lib. de præcogn. probat medicamenta quæ
 vacuant aquam. Nec tamen conceditur vsus elaterij, quod
 strenue aquositatem educit: nam fœmina mollissimum &
 laxum habet ventriculū, qui vsū elaterij ferre nequit.
 Quod si occurrat mulier robustū habens vētriculū, nec
 tamen huic esset exhibendum elaterium: supposito, quod
 profluuiū procedat ab ichore pituitoso: vti enim possu-
 mus medicamento hydragogo, sed non vehementissimo,
 quale est elaterium, quia hæc materia aquosa non residet in
 cavitāte abdominis, ē qua in aluum non sunt manifesti du-
 ctus, vt in hydrope, sed in venis: nam per venas affluit, non
 in cavitatem abdominis, sed in venas vteri. vnde prompte
 vacuari potest. Præterea quia materia est tenuis & fluxilis,
 facile potest educi. Vnde laudantur *ebulus, brassica silue-*
stris, soldanella, quibus materia peccans per lotium & aluum
 euacuatur.

Probantur etiam quæ per lotium euacuant, deriuando: vt ^{2. Diure-}
apium, asarum, aqua incollā, & exhibita, quibus abluuntur re- ^{tica.}
 nes, & vesica. Hæc tamen, si alio modo administrētur, men-
 ses cient: nimirum si exhibeantur cum dulcibus, *melle &*
saccharo, quorum virtute ad vterum deducuntur: quia de cau-
 sa Galen. cap. 3. lib. 8. κ. ρ. π. ad prouocandos menses probat
heram, sed cum mulsā, cuius dulcedine medicamentum pro
 vehiculo vtitur. Notandum tamen, *apium, & asarum*, non
 exhibenda esse in quolibet profluuiū muliebri decolori: sed
 etiam alia multum diuersa, pro varia fœminæ constitutio-
 ne. Si enim malum oriatur ob redundantem succum non
 aquosum, sed pituosum: exhibebitur *agaricus*, non *succus*
ireos: si ob succum biliosum: dabitur *rhobarbarum*. Idem sta-
 tuendum de diureticis. Galenus enim in vxore Boëthi pro-
 bat *apium (et) asarum*, vere diuretica, id est, calida, sicca, &
 tenuis substantiæ: quia illa fœmina habebat ventriculū im-
 becillum, & totum corpus erat frigidum, ac humidum. Ac
 si biliosa sit fœmina, in qua exsuperent succi acres: vti possu-
 mus diureticis improprie dictis, id est, quæ non ob caliditatē,
 sed ob substantiæ tenuitatem potius lotium promouent, vt
 sunt *semina frigida maiora (et) minora*.

Quoad ea quæ per cutim euacuant, Galen. loc. cit. inquit,
 se iussisse, vt fœmina quæ patiebatur profluuiū muliebri ^{3. Vacuā-}
 aquosum ^{tia per cu-}
 tim.

aquosum, primo fricaretur mollissimo linteo, deinde asperissimo. Vtitur ergo primū frictione molli, deinde aspera: post hanc vngit corpus solo melle multum cocto, & frigido actu, ea frigiditate, quam præ se fert aqua fontis æstiuo tempore. Hic duo sunt declaranda. Primum necessitas propositarum materialium. Deinde modus: & præsertim penes id quod adhibet mel coctum, & actu frigidum. Quoad primum: Frictio mollis, est materia remedij euacuantis per cutim, qua pori aperiuntur: frictio aspera, est materia remedij alterantis, siccantis totum corpus, quod in illa fœmina erat iusto humidius: mollis enim frictio cutim rarefacit: dura, asperaque coagit & siccatur, lib. 2. de tuend. valetud. Probat deinde mel sincerum, tanquam materiam remedij alterantis, id est, calefacientis & siccantis totum corpus illius fœminæ, quæ erat frigida & humida: & recte probat citra picem & resinam: hæc enim calidiora noxam inferre possunt, humiditatem prædominantem liquando, quæ postea maiore impetu in vterum fluere posset. Hac ergo de causa Galenus mel solum probat. Quoad rectam administrationem mellis: probat Galenus mel multum coctum, & frigidum actu, ea frigiditate, quæ est in aqua fontis æstiuo tempore. Modus indicatur à passione indicantis. Institutum Galeni erat, corpus humidius siccari: ita ut indicabat nimia mollities, nimia humiditas. Quare cum difficulter illa fœmina pateretur, cum summæ esset resistentiæ: medicamentum siccans ita erat administrandum, ut vehementer exsiccaret. Mel autem quo magis coquitur, eo magis crassescit, & proinde eo magis coagit, siccatur: ut recte probetur mel multum coctum. Probatur autem potius actu frigidum, quam calidum: quia sic indicat passio humiditatis, nimirum prompta liquatio, quam ex usu arenæ Galen. cognouerat. Si ergo mel administraretur actu frigidum, prohibetur liquatio: quæ etiam ob asperas frictiones imminebat. Quare artificiose Galenus est progressus: ut merito dignus fuerit quadringentis aureis.

4. Vomito-
ria.

Quoad euacuantia per vomitum: hæc non proponuntur à Galeno loco citato: quia mulier imbecillum habebat ventriculum & totum corpus: non autem decet per partem imbecillam vacuare. Si fœminæ sint, quæ facile vomant, ita ut ventriculus vomitoria perferat: danda sunt vomitoria, quia euacuant per modum reuulsionis.

Vsus va-
cuantium.

Quoad rectam administrationem vacuantium medica-
mento

mentorū: Galen. loc. citat. probat, vt primo die exhibeatur medicamentum purgans aquam: secūdo die, diureticum: tertio die rursus aquam ducens, sed in minori dosi, quam primo die: deinde à quarto die, ad decimum quintum exhibet diuretica, interdum autem interponit, quæ per aluum euacuant. Vnde his diebus quotidie per horam ante prandium & ante cœnam fricat corpus primum sindone molli, deinde aspera, & postremo melle vngit. Quare hinc colligitur, Galenum primo euacuare per aluum, secundo per lotium, tertio per cutim, deinde permutatis vicibus modo hoc, modo illo vacationis genere vti. His verbis insinuat Galenus *quando agendum*. Cognouit in illa scœmina magis posse præsentiam materiæ aquosæ, quæ debebat per aluum euacuari: & proinde primo vitur medicamentis aquam euacuantibus. Secundo cognouit magis posse præsentiam materiæ, quæ circa reur residet in venis emulgentibus circa renes: quam potest præsentia materiæ, quæ ad totam cutim spectat: & ob id ante euacuantia per cutim, probat diuretica. Tertio die rursus exhibet medicamentum aquam ducens: quia cum non liceat primo die totam materiam per aluum vacuare, repetenda fuit euacuatio, in minori tamen dosi die tertio, in maiori die primo: ratio est, quia primo die vt maior erat copia materiæ, ita actio erat vehementior, quæ proinde maiorem dosin indicabat. Quarto die Galen. per cutim euacuat, deinde etiam totum roborat, quia magis potest præsentia materiæ, quam præsentia imbecillitatis: quare primum vitur frictione molli, deinde aspera, postremo inunctione. His autem vitur ante prædium, & ante cœnam: quia cibus sui præsentia prohibet. A quarto denique vsque ad quintumdecimum per vices modo vno, modo altero vitur medicamento: prout adest præsentia vel huius, vel illius indicantis.

Tandem quoad euacuantia, probantur ea quæ vacuant materiam in vtero existentem. Vnde Hippocr. lib. de morb. mul. in profluuiū vteri muliebri, ad euacuandū materiam in vtero, probat vt lauetur vterus succo ficuum immaturarum & siluestrinum. Probat etiam medicamentum paratum è sicca resina, è foliis tamarisci, è semine lini, quæ in vino edebat, & cum adipe anserino per clysterem infundebat: quo medicamento administrato, Hippocrates vterum aceto colluebat. Anicen. probat clysteres confectos è decocto ireos, & brassica. Et pessaria etiam parari possunt, è medulla cucumeris siluestris, & aliis, de quibus in suppressis mensibus

*S. Vacuanti-
a in vte-
ro conten-
tam mate-
riam.*

mentibus egimus, quæ vim habent attenuandi & detergendi.

II. Probantur etiam medicamenta quæ respiciunt causam, à
Medica- qua generantur succi propositi excrementitij: de quibus ali-
menta re- bi. Prout enim varium est produciens, pro eo variis utèdum
spicientis medicamentis: ut, si à ventriculo frigido & humido produ-
causam ge- catur: probatur calefacientia & exsuccantia, *aqua sulphurea,*
nerantem *guaiaci decoctum,* & quæ sunt proposita in malis ventriculi.
succos. Si produciens sit iecur calidum: probatur frigida, *aqua refri-*
gerantes, aqua B. Virginis,

III. Postremo probantur astringentia, quibus virtus vteri corroboratur. Vnde ab Auicenna & Paulo probantur medicamenta, quæ etiam conferunt in profluuium sanguinis immoderato. Hippocrates probat medicamentum confectum e resis, myrto, rubo. Et propter calorem vteri, qui calida indicat, probat medicamentum confectum à masticho, mentha, sture, foliis cupressi, foliis viridibus oliuæ, & hæc administrat, vel cum cera, vel cum farina lentium, vel etiam cum vino acerbo. Præterea Hippocrates urgente necessitate ascendit ad medicamentum, quod sit vel ex aqua, vel è vino astringente, alterato cum balsamo, gallis, malicorio, myrto: & ratione caloris vteri, iuncum odoratum addit: quia non est tutum frigidis vti sinceris. Aëtius in hoc malo probat medicamentum, quod ceu medicina delectabilis Aspatia vulgo dicitur, estque in communi vfu apud meretrices: si enim femina sese abluat frequenter hoc medicamento, veluti virgo videtur: Sumuntur galla immatura, per obdium in aqua nacerantur: deinde in hanc aquam lacta immittitur, & ea non exprimitur, sed siccatur, & frequenter applicatur. Circa ubi agendum, notare oportet, medicamentis astringentibus, non vtendum esse per os, ne in visceribus obstruções excitentur: vel saltem desistendum à vehementer astringentibus. Hippocrates autem hæc applicat pestinè: quia principale indicans in vtero subsistentiam habet. Quoad quando agendum: in hoc morbo, siue sit profluuium vteri, siue muliebre, hæc non adhibenda sunt eo tempore, quo secundum naturæ leges menses effluunt: quia sanguis menstruus, vt mouetur & egreditur per vterum, sui præsentia prohibet administrationem horum astringentium.

Viſus. Diata medicamentis respondeat. Hippoc. l. 2. de morb. mul. probat, lac bubulū copioſum vocis emulſum. Qui tamen ci- bus non indifferenter eſt exhibendus. Si enim ſcēmina ob proſuum redditā ſit emaciata, lac probatur, quia non mo- do ali-

do aliqua è parte crassefacit, sed etiam vehementer nutrit, & præsertim si multa copia exhibetur. Quod si emaciata non sit, & præsertim si obstructions absint: ab usu lactis abstinendum.

CAPVT V.

De vitiis circa conceptionem: & primum de Sterilitate; ad quam rectius intelligendam fœcunditatis natura prius explicatur.



Abolutis vitiis, pertinentibus ad Purgationem mensium: dicendum modo de vitiis, quæ pertinere videntur ad Conceptionē. Quæ cum multifariam lædi possit, de quolibet vitio dicendum: & præcipue de Sterilitate, de Monstro, de Mola. Sed quoniam rectū est index suimet & obliqui: necessum est, vt primum digrediamur circa conceptionem secundum naturam. Vbi tria explicabimus: primo modum, secundum quem fit conceptio: deinde essentiam conceptionis: tertio, signa quibus distinguimus fœminas fœcundas à sterilibus.

Ad conceptionem celebrandum necessarium est, vt masculina fœmina, non citra oblectationem, coniungatur, vt ab utroque fiat ei aculatio seminis fœcundi, partim quidem in vterum, partim in vteri ceruicem: ea tamen ratione, vt, quæ seminis portio conicitur in ceruicem, ab vteri attractrice in vterum attrahatur, à retentrice ita retineatur, vt ob vteri claudatur, & his peractis exacte vtrumque semen misceatur, & beneficio facultatis, seu proprietatis conceptricis vteri, vis illa in semine existens, quodammodo sopita, excitetur, vt exporrecta fœtum formet, & efficiat.

Quoad essentiam: Conceptio secundum naturam nihil aliud est, quam alteratio seminis fœcundi, procedens ab alteratione vteri, propter speciei conseruationem. Quoad formā dicitur alteratio secundum naturam: quatenus enim à facultate prodit, nō est opus, sed actio: quæ nō est animalis, non vitalis, sed naturalis, quatenus actio naturalis potest esse attractio, retentio, expulsio. Hac ergo alteratione actio est distincta à reliquis functionibus. Subiectum est semen fœcundum, nimirū id quod alteratur: quo hæc alteratio distinguitur ab illa quæ est sanguinis, alimenti. Causa efficiēs est alteratio vteri

Transitio.

Modus conceptionis secundum naturam.

Essentia conceptionis qua definitione explicatur.

uteri ad differentiam alterationis quæ fit ab alteratrice aliarum partium, verbi gratia testium. Et quia alteratrix uteri duplex est, priuata & communis: vt pateret, hoc in loco concurrere, non priuatam, sed communem: additum est, propter speciei conseruationem: nam priuata alteratrix, agens in alimentum, ita alterat alimentum, vt nutriatur & conseruetur uterus, vt conseruetur fœmina. At alteratrix dum agit propter conseruationem speciei: illa quidem à Medicis potest nuncupari conceptrix, quæ excitat viuificam facultatem, in semine sopitam, beneficio proportionis uteri, quam sibi præscribit ac limitat hæc proprietas, facultas hæc conceptrix: sicut sanguificatrix ad sanguificandum concurret beneficio proportionis iecoris, quam sibi præscribit & limitat sanguificatrix, opem tamen ferente calido.

Semen fœ-
cundū quid.
& quibus
cōstet par-
tibus.

Sed pro exacta explicatione definitionis, duo à nobis tradenda sunt: primum, quid sit semen fœcundum: deinde, quæ eius sit vis, seu quomodo fœtus formetur. Semen ergo nihil aliud est, quam mistum ex excremento utili, & spiritu, procedens à mare & fœmina, in utero permistum. Semen fœcundum est mistum: quia eius substantia non est simplex, sed mista è spiritu, & excremento vitali utili. Spiritum proponit Philosophus cap. 3. lib. 2. de gen. animal. vbi vult, in semine esse spiritum, qui semen fœcundum faciat, & proportionem respondeat τὸν τοῦ ἀσπυρ πύχην: eius enim calor non absorbit, sed potius generat & conseruat. Hoc etiam fatetur Galenus cap. 4. & 8. lib. 1. de sem. & Hipper. lib. de genit. quod semen fœcundum plenum sit spiritu, & potissimum vitali: vnde fit, vt illi qui nimium Veneri indulgēt, peius habeant è minima seminis emissionem: quam è copioso sanguinis fluxu, seu per os, seu per nares: non alia de causa, quam quod cum seminis emissionem spiritus vitalis dissipatur. Altera seminis portio est excrementum utile: per quod intelligimus cum Philosopho reliquias vltimi alimenti, id est, sanguinis. Nam primum alimentum est cibus, secundum chylus, tertium & vltimum sanguis. Errant igitur, qui per vltimum alimentum intelligunt humiditates alimentales: siue enim vltimum alimentum statuatur humiditas rorida, siue apposita, siue agglutinata: hæ humiditates non possunt amplius regredi tempore coitus: id quod multo minus de assimilata cogitandum est: quia in vasis seminariis circa principia euidenter

evidenter conspicitur sanguis, qui postea in semen mutatur: unde in coitu immoderato etiam sanguis eiaculatur. Per excrementum ergo utile intelligimus sanguinem: qui habet rationem excrementi, id est, superuacanei. Cum autem semen constitutum sit è spiritu & sanguine: & proinde è materia vaporosa, & corpulenta humida: necessario sequitur, semen esse spumofum, vt testatur Galenus cap. 5. lib. 1. de sem. cap. 9. lib. 14. vsu part. assunt enim causæ spumæ, nimirum materia vaporosa & humida, calor & motus. Procedit semen à mare & foemina, mediate vel immediate: immediate, quando à testibus procedit: mediate, quando ab aliis partibus. Necessarium autem fuit, semen tum à mare, tum à foemina prodire: semen enim foecundum debet esse calidum, quam caliditatem semini non potest tribuere calor foeminæ, qui debilis est, propter conseruationem & augmentum foetus, vt scilicet foemina copiosorem sanguinem produceret, quem procul dubio calor foeminæ auctior assumeret. Interim tamen muliebri semen, ad calorem illum spermatis maris contemperandum, requiritur: vt nimirum copulato & prorsus confuso vtroque semine, *neque utrumque*, & conueniens generationi moderatio oboriantur. Procedit autem semen (teste Hippocrate libro de generatione & Galeno cap. 4. & 5. lib. 2. de semi.) à toto corpore, & à præcipuis partibus: mutilati enim liberos non mutilatos procreant. Ratione utilis excrementi, semen procedit à toto: ratione spiritus, à principalibus partibus, maxime à corde. Nam quoad sanguinem, vt habet rationem utilis excrementi, si procedit ab vna tantum parte, aut à paucioribus: partes illæ summum detrimentum percipiunt, quia sanguine nimis priuantur: at, minus incommodum sentiunt, dum sanguis non ab vna tantum parte, sed à toto procedit. Huc respiciens Hippocrates dicit, semen prodire à toto, ab omnibus partibus, & ab omni humore, id est, à sanguine, in toto corpore contento. Quoad spiritum: non erat opus, vt à toto procederet, sed tantum à principalibus partibus. Nam vim eam accipit spiritus in virtute principum partium: vt licet sanguis procedat à corpore mutilato, nihilominus liberi procreentur integri, quia in spiritu, vt procedit à principe parte, est vis, qua integre potest foetus produci. Constat ergo qua ratione semen mediate procedat à mare & foemina. Immediate à testibus oritur, cap. 14. lib. 15. & penult. *testibus.*

A sexu vtroque semen emittitur.

Semen vnde de decidatur.

Elaboratio seminis in

libro primo, de semin. capite quarto, libro secundo, de semin. nam semen ultimam perfectionem à testibus acquirit: quia in valis seminariis aliqua vis est generandi semen: non tamen fecundum generatur, nisi ultimam perfectionem acquirit in substantia testium. Vnde Galenus dicit, si quis summa cum dexteritate nequaquam lædens vasa seminaria, nec superiorem membranam, retrahat testes, gigni semen, sed non fecundum: nam proprietas seminalis non modo in testibus residet, sed in omni parte corporis spermatica: differentia autem est, quia in testibus est vis summæ actiuitatis, in reliquis partibus minoris actiuitatis. In reliquis autem partibus generari semen facile è Galeno probatur: seminales enim partes è semine aluntur & conseruantur, quod semen non in testibus generatur (alias tori transmitteretur semen à testibus) sed in singulis corporis partibus, in quibus tamen vis gignendi semen remissa est, vt tantum seminis generetur, quantum sufficit ad conseruationem illius partis indiuiduæ. Hinc recte Galenus ait, deperditam substantiam arteriæ non posse reparari: at substantiam deperditæ venæ, (quamuis & hæc sit pars spermatica) interdum reparari posse: ratio est, quia arteria tunicas sextuplo crassiores habet, ad cuius restaurationem copioso semine opus est, quod non potest generare vis illa seminalis arteriæ. Vena autem tunicam habet tenuem, quæ non eget adeo copioso sanguine: vnde si patiens sit robustus, valido calore donatus, qualis est calor nutritius qui viget in pueris: fieri potest, vt portio deperditæ reparetur. In testibus autem summa vis est generandi seminis: quam cognouit Hippocrates text. vigesimo septimo, sect. 4. lib. 6. epidem. & Galen. cap. penult. lib. 1. de semin. In parastatis quidem etiam semen gignitur, sed id fecundum non est, nisi commisceatur cum semine, quod generatur in legitima testium substantia: sicuti etiam semen feminæ fecundum non est, nisi cum virili misceatur. Summa autem vi testes donati sunt, non præter rationem: nam ad conceptionem opus est semine copioso, crasso, lento & albicante, vt tota interior vteri superficies oblinatur, cap. 4. lib. 1. de semin. quare ad generandum semen copiosum, crassum, lentum, necessarium fuit, vt summa vis inesset testibus. Deinde, quia semen fit è sanguine, è materia rubra, quæ necessario alba debet euadere: necesse est, vt strenue sanguis concoquatur, quod fieri non potest, nisi virtus testium

fit robustissima. Licet autem summa sit vis in testibus: non est tamen adeo insignis ut semper producat semen æque fecundum, ut colligitur è cap. tertio, libro 2. de semi. idè in secunda eiaculatione & reliquis, minus fecundum generatur, & semper minus lentum, & magis tenue. Constat ergo semen fecundum esse mistum è spiritu & excremento vtili, procedens à mare & foemina.

Postremo diximus, semen maris & foeminae exacte in utero misceri: quia respiciunt vnum finem, nimirum generationem vel maris, vel foeminae. cap. 11. lib. 14. vñ par. com. 11. lib. 1. de natu. hum. cap. 4. lib. 2.

*Confusio
seminis
vtriusque.*

Porro ad conceptionem recte celebrandam, requiruntur quædam communia mari & foeminae: quædam priuata, quæ foeminam potissimum respiciunt. Communia sunt, Generatio seminis, Eiactio seminis & Voluptas. Priuata, quæ tantum foeminae competunt, sunt seminis Attractio & Retentio. Ad generationem seminis opus est determinata complexione, & ætate vtriusque. Quoad complexionem: cum Gal. aph. 63. sect. 5. locum habet temperies, ubi viget calor, id est, instrumentum generationis seminis & sanguinis: unde corpora temperata, vel parum recedentia, ut calida & humida, maxime referta sunt sanguine & semine. At intemperies intentia, & potissimum similis in utroque sexu, in causa est ut auferantur actiones. Remissa intemperies potest semen generare, præsertim si dissimilis, id est, si foemina sit frigidior, mas iusto calidior, vel contra: nam in hac combinatione fit seminis mistio ea ratione, ut alterum semen remittat vitium alterius. Quoad ætatem, mulier sit ætatis florentis, cap. 2. lib. 2. de san. tuen. c. 4. l. 14. de vñ par. quia in priori ætate, ubi corpora maxime augentur, est defectus seminis, alimentum in postremis ætatibus desideratur agens, calor, qui potest semen fecundum reddere. Plato in lib. de rep. suadet, ut mas cum foemina coniungatur ab anno trigésimo, ad quadragesimum. Quoad seminis eiactationem: sciendum, quomodo fiat, & quo tempore. De primo, Galenus comment. aph. 63. sect. 5. dicit, non eiaculari semen quia à spiritu propellatur, sed potius quia comprimatur tensione valorum. Non propellitur à spiritu, quia hic ita permixtus est cum materia seminali, ut & ipse spiritus egeat propulsione. Spiritus ergo non propellit, sed vna cum excremento propellitur: quia totum illud mistum eliditur, & expulsum: nam tensione

*Generatio
seminis.*

*Eiactio
seminis.*

vasorum fit hæc eiaculario & à mare, & à fœmina. A mare, ea ratione & modo, vt compellatur in ceruicem vteri: vnde maris virga esse debet recta, & longitudinis decentis. Fœmina autem eiacularur semen, non modo in ceruicem, sed etiã in fundum vteri, per apices, id est, per cornua vteri. cap. 13. lib. de sectione vteri. Quo fit, vt tempore imprægnationis semen illud quod eiacularur in ceruicem, egrediatur, nisi fiat superfœtatio: quod autem eiacularur per cornua in fundum vteri, residet vsque ad tempus partus, circa tunicam intestinale, vel allantoidem dictam. Quoad tempus eiacularionis, è Galeno, cap. 7. lib. 1. de semi. probatur eiaculario quæ fit eodem tempore: ita enim fit exacta mistio, & semen vnũ ab altero fouetur. Oritur autem difficultas, quia Hippocrates lib. de natur. pueri, videtur asserere, tempus eiacularionis esse vel incipientibus, vel cessantibus mensibus, non autem tempore mensium: rationem insinuassee videtur Galenus, capite vltimo libro de diff. vuluæ: nam dum menses fluunt, facile fieri potest, vt sanguine menstruo semen contamine- tur. At videtur eadem esse ratio, dum menses incipiunt fluere, quia tunc natura insurgit ad expellendum in vterum sanguinem, tempore vnus mensis collectum: quod si tum fiat seminis eiaculario, obruitur à sanguine. Crediderim ergo Hippocratem ita esse intelligendum, conceptioni fœminam non esse idoneam, nisi menses fluere incipiant: nam cui menses nunquam fluxere, concipere nequit, quia non potest semen adhærere. Quare expectandum, donec in fœmina appareant menses: & si inceperunt, & ea etiam vice rursus cessarunt: vti licet coniunctione, gratia conceptionis: tunc enim ratione inæqualitatis, quæ in orificiis vasorum reperitur, ilico post menses, semen facilius adhæret.

*Voluptas
in usu ver-
nerca.*

Quoad voluptatem: ad hanc efficiendam concurrunt materia serosa: cap. 9. lib. 14. de vsu part. & præter hanc concurrunt etiam humores, qui est similis spermati: qui generatur in illis locis prope collum ceruicis, quos parastatas vocant: vt hæ partes sensu exquisito donatæ, ob summam cognationem, insigni voluptate afficiantur: at, si contingat, has materias, ob causas morbificas, plus iusto atrores euadere, soluitur vnitas, & dolor sequitur. Aduertendum tamen, talem materiam, quæ est similis spermati, in fœminis fœcundam non esse: vt merito in coitu eiacleetur in ceruicem, &

non

non ingrediatur vterum, quia non attrahitur ab vteri attractione: in viris vero, qui calidiores sunt, hæc materia seminalis, cum reliquis permista, reddit semen fecundum. Hæc ergo de causa dixit Hippocrates, lib. de genit. voluptatem insigniorem esse in mare: licet femina duplici ratione afficiatur voluptate, quatenus semen tum ei aculatur, tum suscipit. Hæc de communibus mari & femina.

Prius, erant attractio, & retentio seminis. Ratione attractionis: expedit ut os vteri recludatur, & vterus sit bene constitutus. Quoad retentionem: oportet ut semen detineatur in vtero, & hæreat: cap. 3. li. 14. vsu part. & lib. de superfœt. Quare expedit, ut virtus retentrix sit robusta, ut os vteri claudatur. Et necessarium est, ut sit prægressa euacuatio mēstruorum, ut semen adhæreat, & contineatur. Ex his patet, quid sit semen fecundum.

Quoad vim huius seminis: Galenus cap. 10. lib. 1. de sem. ait: Semen fecundum esse principium vegetabile, quod beneficio conceptionis deducitur de potentia in actum: quod vegetabile principium, è semine, tanquam è materia determinata, venas, arterias, nervos, & reliquas corporis partes efficit. Quare hic cognoscendum, primo, quomodo adhæc efficiendum concurrat semen fecundum. Secundo, quomodo formet. Tertio, quomodo fœtum conseruet & augeat. Quarto, quæ sit causa similitudinis & dissimilitudinis inter liberos & parentes. E sententia Hippocratis, ita referente Galeno cap. 1. lib. 1. de sem. concurrat semen, & ut agens, & ut passum, seu materia è qua fit fœtus. Spiritus seminis, cui vis est summa, rationem habet agentis. Altera autem seminis pars, nimirum excrementum vtile, habet rationem materiz. Nec aduersatur Gale. dum c. 2. li. 1. de sem. ait, sanguinem menstruum esse materiam, semen esse agens: ibi enim vult, semen magis obrinere rationem agentis, menstruum materiz. Præterea semen femina hoc in primis præstat, ut vniuersum vterum madefaciat: non enim potest tanta esse copia seminis maris, ut vndique corpus vteri contingat. c. 7. li. 1. de sem. c. 1. & 4. lib. 2. de sem. c. 11. lib. 14. vsu part. Semen item femina est id, è quo producitur allantoides tunica. Postremo semen femina est alimentum seminis virilis.

Secundo explicandum, quomodo formetur fœtus. In semine, ut subiecto, residet principium vegetabile, quod est facultatis naturalis, non vitalis, non animalis. c. 10. lib. 1. de sem.

*In ferne-
lium.*

*cap. 3. l. 1.
de facult.
nat.*

Hoc tamen vegetabile principium, non est temperamen-
tum: quia qualitates sunt organa, hoc autem vegetabile
principium est quid superius. cap. ult. lib. 2. de temperam. Nō
voluit Galenus, ut quidam imaginantur, hoc principium es-
se diuinum: Si enim est vegetabile, est etiam mortale & cor-
ruptibile: non ergo diuinum. Statuit tamen esse supra cal-
frig. &c. quia hæc sunt organa, illud autem habet rationem
agentis principalis, quod sane merito anteponendum est or-
gano, licet utraque ad effectum producendum concurrant.
Statuendum ergo formari foetum, quia in semine resider
hoc principium vegetabile. Vnde sciendum hoc loco, e qua
materia hoc vegetabile principium, quod semini est tribu-
tum, mediantibus spiritibus producat foetum. Dicendum
cum Hippocrate ab initio libri de natura foetus, produci e se-
mine viri & foeminae, & e puriore portione sanguinis men-
strui: ratio est, quia hæc materia spiritu & humore constant,
ut beneficio vtriusque fiat, ut principium vegetale ex his
formet foetum. Sed aduertendum, non indifferenter iis ma-
teriis uti principium vegetale: primum enim generantur
involucra, deinde producitur foetus. Involucra tria sunt:
primum est *xuqior*, quod generatur e parte impuriore semi-
nis viri & foeminae: & est illud involucrum, in quod pertin-
gunt vasa imbecilliora. Alterum est membrana allantoides,
quæ producitur e semine foeminae, cap. 6. & 10. lib. 1. de sem.
cap. 4. lib. 2. de sem. Tertium dicitur *aprior*, quod producitur e
semine adhuc magis impuro: & cum membrana hæc proxi-
ma sit foetui, dicitur ab aliquibus indutium: & generatur in
omnibus (nam inter capacitatem amnii & allantoidis colligitur
humiditas, usque ad tempus partus: cuius contactu foetus laderetur,
nisi hæc interueniret membrana) non in quibuldam tantum, ut
obstetrices statuunt: interdum simul cum chorio egreditur:
interdum autem chorion ita adhæret utero, ut cum foetu
tantum egrediatur membrana amnios. Quoad formatio-
nem foetus: sciendum e Galeno cap. 8. lib. 1. de sem. iecur ge-
nerari e sanguine venoso, cor ex arteriali, cerebrum e solo
semine. Vbi Gal. ita intelligendus est: cerebrum gigni e so-
lo semine, reliqua autem principalia viscera, non e solo semi-
ne, sed etiam e sanguine vel venoso, sed arterioso. Non au-
tem omnes partes foetus simul generantur: sed prius id,
quod melius est ratione foetus: ut primum iecur, deinde cor,
post cerebrum: foetus enim primo eget nutritione, postremo

motu. Eodem tempore viscera præcipua generari incipiunt, sed vnum prius perficitur altero. Vnde quatuor tempora fœtus licet concipere, e. g. l. de sem. Primum est, dum adhuc apparet semen & genitura dicitur: secundum, dum conspicitur substantia carnea: tertium, quando absoluta sunt tria viscera, nondum tamen perfecti artus, & adhuc dicitur fœtus: quartum, quando artus sunt absoluti, & Hippocrati dicitur infans. Tempus fœtus (ex Hippocrate l. de septimestri partu) longissimum est dierum quadraginta duorum: potest autem esse minus longum, quia mas perficitur spatio triginta dierum, fœmina vt plurimum spatio quadraginta duorum dierum: & hoc probat Hippoc. l. de nat. pueri: sumpta ratione à genitura, à purgatione, & ab ortu. A genitura: quia semen fœminæ est minus calidum, & magis humidum: vt ibid non tam cito possit concrelescere, & ratione remissionis caloris, non ita cito possit efformari. A purgatione: quia experientia sæpe est comprobatum, dum fœmina parit matrem, purgari in triginta diebus: dum autem fœmina nascitur, purgationem durare ad 42. dies. Abortus hoc etiam manifestum facit: quia si est fœminæ abortus, non est fœmina perfecta, nisi post 36. dies, circa diem 42. si autem fiat abortus maris, & fiat post triginta dies, observabitur fœtus perfectus. Tempus autem infantis, cum Hippocrate lib. de nat. pueri tale est: si fuerit mas, mouetur mense tertio: si fœmina, quatuor: mas enim fit è sanguine calidiori, & proinde principium est efficacius, & reddit infantem idoneum ad suscipiendum motum in breuiori tempore. Hinc etiam colligi potest, cur fœtus quandoque vnicus sit quandoque multiplex. Si enim semen sit continuum, non diuisum, vnus est fœtus: si diuidatur, multiplex esse potest. In brutis autem potius diuiditur: quia matrix brutorum, cellulas habet euidenter separatas: in fœmina autem huiusmodi cellulae, non conspiciuntur: apparent solum duo obtusi anguli, vnde interdum separatur semen, vt multiplicetur fœtus. Multiplices autem fœtus interdum iisdem inuolucris teguntur, interdum separatis: iisdem, si idem fuerit sexus: quia tunc maxima est similitudo in semine, ratione cuius fit, vt idem inuolucrum sufficiat: contra fit, si dissimilitudo sit in sexu, vt cum mas & fœmina producantur.

Tertio propositum est loqui de alimento fœtus: quod est sanguis, & lac. Sanguinem proposuit Hippocrates l. de nat. fœtus.

*De conser-
uatione seu
alimento
fœtus.*

pueri, & Galenus cap. 6. l. 1. de sem. est enim purior & inculpata portio sanguinis menstrui, qui gratia nutritionis foetus confluit in vterum, sed nō eo modo, quo sanguis menstruus tempore menstruorum: tunc enim confluit potissimum per inodum transmissionis, vt expultrix insurgat ad expellendum, nec attractrix aliqua ē parte concurrat: at dum nutritur foetus, assiduo confluit, & potissimum attractus confluit à facultate attractrice foetus. Subiectum huius facultatis attractricis est semen: quod Galenus dicit nutriri, non tamen est vera nutritio. Statutum ergo sit, foetum sanguine nutriri. Sed præterea nutritur lacte. cap. 4. libro decimoquarto. de vsu part. com. aphor. 37. sect. 5. nam interdum foetus tam copioso eget alimento, vt sanguis non sufficiat, præsertim quia foetus nutritur sanguine dulcissimo & purissimo: vnde cum sanguis deficiat, merito tanquam simili nutritur lacte. Et hoc præcipue fit mensibus postremis, quibus foetus est magnus, & copioso eget alimento.

*Quibus de
causis na-
ti parenti-
bus similes
vel dissimi-
les sint.*

1.

2.

Postremo, proposuimus explicare causam similitudinis, & dissimilitudinis. Similitudo consideratur secundum speciem, sexum, & effigiem: cap. 2. & 5. lib. 2. de sem. Quoad similitudinem speciei: cum foetus fiat ē semine maris & foeminae, & sanguine menstruo: spiritusque concurrat, & spiritus potissimum pendeat ē substantia materiae, & hæc dominetur in foemina (nam præter semen adest sanguis menstruus) sit rationabiliter, vt foetus sequatur secundum speciem foeminam: vnde ex oue & hirco, nascitur ouis: ē capra & ariete, caper. Sexus, sequitur semen robustum, secundum Hippocratē lib. de genitura. Si vir non admodum robustus, rem habeat cum foemina non robusta, generabitur foemina: si autem cum foemina robusta, licet maris semen non sit robustum, ita tamen semen foeminae aget in semen maris, vt ex hoc semine producat mas. Sic eadem foemina cum vno viro producit marem; cum alio foeminam: prout mas habet semen magis vel minus robustum. Si ergo semen emittitur robustum & calidum, siue maris, siue foeminae, generatur mas: si non robustum, foemina. Hinc mas producit, dum sit conceptio in dextra matrice, & dum mas est robustior secundum dextram testem. Et hæc omnia oriuntur ex vnica causa, quia in parte dextra est maior caliditas, & producit semen robustius. In dextro enim latere positū est iecur, & propterea in illa parte venæ laxiores & completiores deducuntur. Sic

etiam

etiam semen maris robustius & calidius, procedit à teste dextro. Hippocrates lib. de superfœt. Galenus cap. 5. lib. 1. de sem. Hinc secundum Hippocratem, mas concipitur, si testiculus sinister stringatur arcte, quantum citra dolorem fieri potest, ut cum impetu prodeat semen à dextro teste.

Cur autem gemelli modo sint mares, modo fœminæ, modo mas & fœmina: nulla alia est ratio, quam semen: si enim semē maris & fœminæ sit robustum, vterque fœtus erit masculus: si amborum semen sit imbecillum, vterque erit fœmina. Si autem maris semen sit robustum, fœminæ imbecillum: euenire potest, ut semē imbecillum, vincatur à robusto semine maris, & ita vterque fœtus erit masculus. Si semen maris sit imbecillum, & fœminæ robustum, & semen maris vincatur à semine fœminæ: rursus vterque fœtus erit masculus. Si robustum semen vincatur ab imbecillo alterius: (quia interdum robur est exiguum, imbecillitas autem intensa) tunc vterque fœtus erit fœmina. Quod si maris semen sit varium, ut aliqua portio sit summe robusta, aliqua imbecilla: si quidem semen in prima eiaculatione est robustius: fieri solet, ut merito portionis robustioris generetur mas: merito imbecillioris, fœmina: vnde alter gemellorum est mas, & alter fœmina. Aliquando in postrema eiaculatione adeo imbecillum est semen, ut fœmina concipiat fœtum duplicem, quorum alter mas est, alter monstrosus, & quandoque etiā mola: & hinc testata est experientia, fœminā peperisse simul & fœtum integrum, & monstrum: & quādoque post fœtum integrum, in utero māsisse molam. Hoc iis euenire solet qui plus iusto Veneri indulgent. Quoad similitudinem effigiei: explicandum, primo, cur infans interdum magis sit similis matri, interdum patri. Secundo, cur secundum aliquas partes infans sit similis patri, secundum aliquas matri. Tertio, cur infans quādoque sit maxime dissimilis. Quoad primum: huius causa recenseri videtur ab Hippocrate, in lib. de aere, & aquis: ubi causam transfert in vim seminis, & vim menstruorum, quatenus in his est spiritus, qui à toto procedit. Si ergo semen fœminæ sit robustius, fœtus magis similis est matri: si contra, patri. Et licet plerunque semen maris sit efficacius: nihilominus præter semen fœminæ, ad est etiam vis in sanguine menstruo: vnde si contingat fœminam esse robustam, & refertam sanguine probo spiritali, sit ut fœtus maxime assimiletur matri. Quoad secundum: cur fœtus secundum

aliquas partes magis sit similis patri, secundum aliquas matrem causa est vis seminis secundum partem spiritalem. Hippocrates lib. de genitur. cap. 1. lib. 2. de sem. Cum ergo semen procedat à toto, ab hac vel illa parte, vt à capite, à thorace, &c. si foemina sit robustior mare, secundum caput, mas autē sit melius constitutus secundum thoracem, quam foemina: infans secundum caput magis assimilatur matri, secundum thoracem magis patri assimilatur: ratio, quia semen à foemina procedens, procedit à capite robusto, & proinde à portione seminis, in qua est vis efficacior, quam in portione seminis maris. Quoad postremum: sciendum, cur foetus dissimilis gignatur. Causa autem refertur in vim seminis, vt procedit à capite forti, & fixa imaginationi destinato: nam ob vigentem imaginationem tanta vis semini tribuitur, vt concipiatur foetus, qui prae se ferat figuram illius imaginationis. Est autem duplex imaginatio: altera, concurrit tempore coitus, altera post coitum. Tēpore coitus est vis seminis, vt procedit à capite: post coitum, locum habet, non in patre, sed in matre tantum, quoties mater obiectum aliquod concipit, vt causa illius fortis imaginationis vis tribuatur, non semini sed sanguini menstruo, & potissimum primis diebus.

Signa foecunditatis.

1. In femina.

His explicatis, cognoscendum est, num foemina sit foecunda, vel sterilis. Secundum Hippocratem lib. de superfoet. & aphorif. 59. & 62. sect. 5. primum foeminam lauare oportet, post menstruas purgationes, & galbanum igne coctum utero applicare, & foeminae ventri alligare: deinde post 6. aut 8. horas oportet experiri, an in vertice foeminae appareat odor galbani: nec ne: si appareat, foemina est foecunda. Idem explorabat Hippocrates suffumigiis è myrrha, aromatis: foeminam ita ligabat, vt non posset per infernas partes suffumigium euaporare: & si ad os odor perducebatur, dicebat, foeminam esse foecundam: sin minus, sterilem: nam dum odor galbani perducitur ad caput, signum est, utrum non esse dyscratum, nec obstructum, nec durum.

2. In mare.

Num mas foecundus sit: ex vrina & semine cognoscitur. In vrina maris, secundum Auicennam, hordeum est macerandum, deinde hordeum illud sepiendum: & si germinet, indicium est foecundi maris. Probat etiam, vt in vrinam immittatur sulfur virgum, & vrina aliquandiu seruetur: si enim putrescente vrina generetur vermis, statuendum est virum illum esse foecundum: sin minus, sterilem. Addit etiam

Auicennas,

Auicennas, præcipiendum esse, vt mas mingat super lactucam, quæ si non exarescat, indicat marem fecundum. Quoad semen, cum Auicenna & Arist. cap. 6. lib. 3. de gen. animal. si maris semen proiciatur in aquam, & descendat: mas fecundus est quia semen crassum & ponderosum, bonum.

Num autem aptitudo sit ad procreandum mares, vel feminas, ita cognoscitur, e comm. 27. sect. 4. lib. 6. epid. nam in mare, in ætate adolescentiæ dexter testiculus prius turget, & mamma in feminis: dextra enim pars, vt robustior & calidior, maxime confert ad generandum marem: præterea qui sunt calido temperamento, potius mares procreant.

Cognoscitur autem feminam concepisse, e cap. 2. lib. 1. de sem. & cap. 3. lib. 3. facult. natural. quia femina in coitu quodammodo persentit utrum conuelli & retrahi: quia sic attractio, & retentio seminis: nec enim fieri potest conceptio, nisi attrahatur & retineatur semen. Mas etiam conceptionem aliqua e parte, sed raro, potest animaduertere: sentit enim mas in coitu pudendum ab utero retrahi, ac si à cucurbitula retraheretur. Obstetrices os sentiunt clausum, citra tamen duritiem: ubi enim durities, oclusio est morbosa. Præterea aphor. 41. sect. 5. si post assumptam mulsam, femina in ventre tormina sentiat, facta est conceptio; quia ob utrum clausum, status qui excitatur à mulla, non habent liberum exitum. Imprægnatio etiam cognoscitur ex angustia oris uteri. (aphor. 54. sect. 5.) quæ etiam perseverat: nam si non dureret, hic abortus. Præterea indicatur e vertigine, dolore lumborum, e cibi fastidio, e nausea, vomitu, pica, e vitiis noxisque ventriculi, quia hic compatitur in gestatione uterideinde e suppressione mēsum: vnde adest corporis grauitas, languor, desidia: quæ tamen symptomata apparēt citra horrorem & febrē aph. 61. sect. 3. c. 7. l. 1. de sympt. caus. c. 5. l. 6. Inc. aff. Interdum tamen & prægnantibus menses fluunt: aliquando etiam albicantes menses: quia materia hæc egreditur per venas non uteri, sed cervicis uteri, & maxima cū utilitate fœtus. Ex Hipp. 1. de nat. pueri, indicatur fœtus in utero e motu quem feminæ in utero sentiunt, citra dolorem, quia non fit à flatu. Præterea vbera intumescunt, quia lacte replentur. Item, cum Hipp. lib. de superfœt. indicatur oculis albidis: quia dum fœtus est in utero, sanguis copiosus, & spiritus copiosus confluunt in utrum, vt reliquæ partes non ita spiritu abundant. Addit Auicennas, vrinam: quæ in principio

Num quis aptus sit ad procreationem maris, vel femina.

Facta conceptionis signa.

cipio decolorata est, in vltimis mensibus colorariorem fieri: in postremis enim mensibus ob magnitudinem foetus comprimuntur vasa, viscera, plus iusto vnitur calor, & ita lotium magis coloratum euadit.

Signa sexum indi-
cantia.

Quoad signa sexum indicantia, Hipp. ad distinguendum foetum masculinum à foeminino, l. de superfoet. dicit: masculinum indicari, si mamma dextra magis turgeat, & prius turgescere incipiat, quam sinistra: significatur enim foetū residere in vteri dextro. Præterea mutatio percipitur in oculis: si enim à statu naturali maior sit facta mutatio in dextro: indicatur masculus. Sic & è colore: è com. aph. 42. sect. 5. si foemina gerat masculum, magis est colorata: quia virtute caliditatis maris, totum foeminæ corpus magis incalescit, & bene coloratū euadit: hilarior quoque est mulier, & ad omnia magis prompta: dum progredi incipit, dextrum pedem proponit; pulsus dextra manus validior: Quod si tamen foemina in victu delinquat: potius decolorata euadit. Indicatur etiam masculus è motu validiore. Hoc tamen signum fallax est, si foetus masculus sit imbecillis: nam tūc cum impetu moueri non potest: signa autē tunc assunt foetus imbecilli: de quibus suo loco. Potissimum autem foeminæ obseruabunt motum in dextra parte. Indicatur etiam è lacte, secundum Hippocr. lib. de steril. si enim lac proiectum supra folia condensetur, masculum indicat, quia vegetum calorem significat.

Signa nu-
meri fo-
etus.

Oportet etiam cognoscere an in vtero foetus sit vnus, vel multiplex. Gemelli assunt, si venter præter consuetudinem intumuerit. Solet etiam accidere, vt mulier duos foetus gerens, vnum pariat: & nisi obstetrix sit diligens, alter foetus relinquatur in vtero: tuncque periculū est, ne mulier pereat. Hinc igitur iubet Auicen. vt inspiciatur prioris infantis umbilicus: & si appareat ruga, vel nodus, statuendum; adhuc alium foetum restare in vtero. Si gemelli assint, qui eodem tempore concepti sint: eodem etiam tempore pariuntur. Cognoscuntur eodem tempore esse concepti, si os vteri prorsus fuerit clausum: nam in superfoetatione non exacte clauditur. Hoc etiam deprehenditur, quia post primam conceptionem, non fuere signa nouæ conceptionis.

De Sterilitate.

Ergo quoad conceptionem morbosam: primum agendum *Generatio.* de conceptione ablata, quæ Sterilitas dicitur. Generatur, quia

quia aliquid morbificum occurrit vtero, vi cuius ita frustratur conceptrix, vt prorsus aboleatur conceptio. Hoc ergo *Definitio?* malum nil aliud est, quam functio ablata vteri, dependens à frustratione conceptricis. Forma est functio ablata: nimirum symptoma, quod neque est effectus, neque opus, sed actio ablata. Causa efficiens, est frustratio conceptricis. *Causa efficiens.* Frustratur facultas, vel quia læditur, vel ob Errorem externum. Læditur necessario ob morbum vteri: quia hæc facultas pro subiecto habet partem viuentem, nimirum vterum. Facultas læditur, quia Labefactatur, vel Impeditur, cap. 1. lib. 3. de symp. caus. Labefactatur ob intemperiem: impeditur ob malam compositionem, & solutam vnitatem. Intemperies potest esse quælibet, si sit insignis: aphor. 61. sect. 5. Frigida intemperies bifariam concurrere solet, primo immediate, & hinc statui potest morbus: secundo mediate, id est, per medium morbum in mala compositione, vt aliqua è parte intemperies frigida habeat locum causæ morbificæ. Declaro. Frigida intemperies est causa immediata sterilitatis, dum ita agit in semen, vt, cum in conceptione conceptrix vis in semine existens excolatur, contra frigiditate vis seminis magis sopiatur, & etiam extinguatur. Mediate autem concurrat, dum ob intemperiem frigidam vteri corpus densum euadit. Calida intemperies semen torrefacit & exurit: vt vis in semine existens dissipetur. Humida intemperies vim seminis obruit: vnde ob insignem humiditatem retentrix læditur, vt semen non contineatur. Sicca intemperies absumit pabulum caloris, qui est instrumentum conceptricis: vnde, dissipato pabulo, calor dissoluitur, & conceptrix otatur. Hæc intemperantix sunt in causa sterilitatis, dum sunt intensæ. Et interdum sunt Natiux: interdum Ascititix.

Quoad malam compositionem, hæc est mala conformatio, magnitudo vitiosa, vitiosus situs, Mala conformatio, est *Mala compositio.* superficies vteri lævis, non aspera: & hæc vel natua, vel ascititia: natua, quando fœminæ tempore etiam statuto non fruuntur menstrua purgatione: vnde, cum non aperiantur orificia vasorum, vterus secundum internam superficiem est adeo lævis, vt non possit semen continere, & proinde non fieri possit conceptus. Ascititia fieri solet post vlcera, quæ ad cicatricem perducuntur. Sed hæc læuitas, non ita potest causa esse sterilitatis, vt prior: quia non pertinet ad totum vterum, sed ad vnicam tantum partem exiguam, quia

quia vlcus vteri magnum curationem non admittit. Præterea, quoad conformationem: est vitium in meatibus: nimium vel immodica apertio, nam dum os vteri nimis est reclusum, semen contineri nequit: secundum Hippocratem lib. de genit. vel angustia, & potissimum compressio: quandoque etiam constipatio. Compressio recensetur ab Hippocrate, lib. de superfec. & lib. de natur. mul. & aphorism. 46. sectio. 5. & fit ob immodicam pinguedinem omenti. Constipatio est, quando membrana annascitur ori. Præterea morbus est in meatibus, non modo oris vteri, sed etiam vasorum vteri, quæ vel feminis sunt, vel alimenti, id est, sanguinis. Si fuerint vasa feminis, quandoque nimium recluduntur, ut fieri solet in gonorrhœa, ut immodico fluxu seminis virile semen corrumpatur, nec possit hære. Vitium est etiam, si hæc vasa nimium occludantur: quia attractrix vteri, non potest semen muliebri attrahere, ob angustiam & constrictionem illorum vasorum. Quoad vasa alimenti, pariter vel recluduntur, vel angustantur. Si recludantur conceptio aboletur: quia ob assiduum influxum sanguinis, semen hære non potest. Quod si nimis angustentur, neque tunc potest hære: quia desiderantur cotyledones.

2. Quoad magnitudinem: est morbus in magnitudine potius aucta, ut est tumor quilibet vterum occupans, siue sit inflammatio, siue erysipelas, siue carbunculus, cancer, œdema, scirrhus, siue etiam tumor statulentus, siue aquosus, ut contingit in hydrope vteri: de quibus in malis ventriculi diximus. Hi tumores vel occupant sedem vteri, vel Cervicem: & si fundus sit affectus, semen non detinetur, sed effluit: si occupetur vterus secundum cervicem, semen non attrahitur. Notandum autem circa statulentum tumorem & aquosum: falsum esse, horum tumorum, vel materierum, à quibus hi tumores producuntur, vnicam esse sedem: nam quandoque materia in vtero colligitur: quandoque in vesicis, quæ præter naturam in vtero generantur (quia si in iecore generantur, multo magis in vtero: ut Aetius non sit reprehendendus) & quandoque hæc materiæ colliguntur inter vteri tunicas: ut colligere licet ex Hippocrate, in lib. de nat. mul. interdum etiam hæc materiæ in vteri capacitatē continentur, ore vteri ocluso.

3. Præterea est vitium in vitioso situ, cum Hippocr. in lib. de steril. qui situs potest esse vitiosus & sursum, & deorsum.

Deorsum,

Deorsum, quando sit procidentia vteri, secundum dextram, & sinistram partem. Causam situs vitiosi, & præsertim sursum, Galenus cap. 3. lib. 6 loc. affect. dicit, esse repletionem, & proinde tensionem ligamentorum, ut in suppressione mensesium. Fernellius voluit causam esse laxitatem ligamentorum, non tensionem: dum enim ligamenta laxantur, vterus liberum habet motum, & proinde noxia fugit, iucunda persequitur. Hæc erroris plena sunt: nam dum foemina patiuntur vteri procidentiam, & ascensum: situs stabilis est, qui mutari non potest, siue iucunda, siue iniucunda adhibeantur, nisi præsidia habeant vim euacuandi.

Aduersatur etiam Hippocrati: qui voluit in ascensu vteri conceptionem aboleri, quod vterus non possit moueri, ita ut nequeat semen attrahere. Id quidem verum est, quandoque fieri posse, ut vterus modo in vnam partem, modo in aliam moueatur. Sed hic situs non est stabilis, quia non pendet à repletionem ligamentorum. Statuendum ergo cum Galeno, si tendantur ligamenta, sursum attolli vterum: ut, si æqualiter repleantur, attollatur sursum vterus, nec magis ad dextram, quam sinistram vergat: at, si repleantur vincula dextræ partis, vterus situm habet in dextra parte, & in eam mouetur. Et hoc vitium ab Hippocrate vocatur distortio vteri, quando magis declinat ad alterutrum latus. Vteri situs deorsum vocatur descensus vteri: & si maxime descendat, vocatur prolapsus, procidentia. Hoc vitium fit laxatis ligamentis, minus in descensu, magis in procidentia, ut euenire solet in difficili partu. Impeditur etiam facultas ratione vlcus, vi cuius semen nequaquam detineri potest, ut proinde aboleatur conceptio.

Alia vero è parte frustatur conceprix ob errorem externum: qui potissimum petendus est à semine, quia conceptio secundum naturam celebratur, cum conceprix agit in semen fecundum. Quare error externus est desumendus à vitioso semine. In semine oportet perpendere & Generationem, & Ejaculationem.

Quoad generationem seminis: vitium est ratione causæ quâdoque Internæ, quâdoque Externæ. Interna, est mala totius corporis dispositio: unde hydropicæ vix possunt concipere. Quoad externam causam: Hippocrates in lib. de genitur. proponit sectionem arteriarum post aures: tunc enim

vltim.

Error externus.

1.

cerebrum,

cerebrum copioso spiritu priuatur, quo fit vt à cerebro non demittatur semen fecundum, quod tamen ratione spiritus agentis necessario procedere debet à partibus principibus, & proinde à cerebro. Præterea inter externas causas recensere licet ebrietatem: nam copiosi spiritu petunt potius caput, quam internas partes.

2.

Quoad eiaculationem seminis: vitium est penes causas Externas, & Internas. Internæ, sunt vitia, quæ pertinent ad testes, & potissimum maris, & ad penem maris, & ad vasa seminaria maris & foeminae. Vitium testium proponit Hippocrates aphorism. 61. section. 3. Galenus eum aphorismum Hippocrate indignum arbitratur. Sed non intellexit. Cum enim in aphorismo 62. Hippocrates proposuisset causas sterilitatis è parte foeminae, quæ spectabant ad dyscrasias vteri in 63. inquit, similiter in maribus: innuens, sicut vteri dyscrasia est in causa sterilitatis, ita dyscrasias testium maris esse causas sterilitatis: proponit enim quatuor dyscrasias, primo humidam, non totius hominis (in hoc enim fuit deceptus Galenus) sed testium maris. Si enim in 62. aphorismo locutus est de intemperie non totius foeminae: sed tantum vteri: fuit pariter necessarium, vt in hoc aphorismo loqueretur de intemperie non totius maris, sed tantum testiculorum. Respiciens ad humidam intemperiem, ait, sterilitatem fieri, quoniam propter corporis testium raritatem spiritus extra fertur, vt semen non transmittatur ad os vteri. Quoad siccam intemperiem, ait, aboleri conceptionem, quia propter spissitudinem humoris non exit foras. Ob testium frigidam intemperiem, semen non incalescit, sed torpidum euadit, vnde ad os vteri transmitti nequit, sed colligitur in testibus. Ob caliditatem semen plus iusto torretur, cogitur & crassescit, vt nequeat eiaculari.

Quoad vasa seminaria, vitium est in angustia, vi cuius semen non potest eiaculari. Hæc autem angustia, siue sit obstructio, siue compressio, occupat vasa, non prope vterum, non vt inferuntur in vterum: quia angustia in vasis vbi vtero inferuntur, est morbus vteri, de quo diximus antea.

Quoad vitia penis: est angustia, vi cuius impeditur seminis eiaculatio: est quandoque longitudo immodica, vi cuius diutius moratur semen, antequam in vterum transmittatur. Hanc eandem noxam patitur semen, propter obliquitatem penis. Ob breuitatem etiam immodicam, non potest semen eiaculari.

ejaculari, vt, decet. Quoad externas causas: error est intem-
pore ejaculationis: nam nisi ejaculatio vtriusque ferme fiat
eodem tempore, non fit conceptio. Et hoc obseruant perfidi
homines, qui concumbentes nolunt conceptionem fieri.
Error etiam potest fieri ab externa causa, vt ab odio: hoc
enim si adest, vix fieri potest conceptio.

Quoad differentias à causa efficiente. Fit sterilitas & au-
fertur conceptio, vel Læsa facultate, vel ob Errorem exter-
num. Si læsa facultate: vel Labefactata ob intemperie vteri,
vel Impedita ob malam compositionem, vel ob solutam vni-
tatem. Si autem ob errorem externum: hic desumendus est
è seminis vel Generatione, vel Ejaculatione.

Signa morborum vteri, intemperierum, tumoris, peti pos-
sunt è malis ventriculi. Malum autem hoc in genere non
difficile noscitur, è signis conceptionis, antea traditis. Cum
Hippocrate aph. 59. & 62. sect. 5. facile cognoscuntur intem-
perantiæ vteri, præsertim è suffumigiis aromaticum.

In præsentia sufficit præsidia proponere, quæ respiciunt
vterum secundum eius proportionē, quæ requiritur vterum
remedium. Calor vteri, indicat calorisicū, vniens & con-
seruans calorem vteri. Præseruatoria autem respiciunt idē
proportionem & calorem vteri, sed sensum vteri exquisi-
tum: hic indicat obtundens sensum: quia non dirigitur ad
conseruationem, veluti vitale, sed ad destructionem. De præ-
sidiis quæ sumuntur à morbo, id est, à dyscrasia, mala com-
positione, vlcere, item à semine: alias suo loco agitur, illa ni-
hil. Vitium hoc non est contemnendum, quia agitur de spe-
ciei discrimine. Pro vi morborum & causarum, quandoque
bene sperandum est: aliquando prorsus desperandum. Et hoc
loco digrediendum esset circa vim intemperierum, circa
vim tumoris & solutæ vnitatis. Quorum prognostica è ma-
lis ventriculi petenda.

Hippocrates in lib. de superfc. probat in foeminis venæse-
ctionē, bis in anno, secundū manus & pedes: nam respexit ad
principale indicans, ad foeminas quæ nō cōcipiunt, quia san-
guis in corpore exsuperat. Cum ergo malū persequeret: expē-
dit bis in anno venam secare. Et cum redundet in toto cor-
pore, nec impetum habeat in vterum: recte probatur sectio
venarum brachij, & pedum. Vnde vulgares errant, qui asse-
runt foeminas steriles euadere, si iis vena pedis pertundatur.
Quod est contra Hippocratis, rationem, & experientiam.

**Reborans
uterum.**

Vnicum proponam medicamentum, quod ex iis componitur, quæ proportionem, & calorem vteri respiciunt: *De rad. maioris testiculi, id est, satyrj, dentis apri, testiculorum vulpi, apri, matricis suilla fecunda, coaguli leporis, ana 3 j. macerentur in lacte muliebri fecunda: silevis, hormini, crysini, eruca, salvia, pastinaca sylvestris, ana 3 ij. (Et hæc basin constituunt.) Ad infantia addantur: baco, iuniperi, xyloal, gallia moschata, cyperi, caryophyll, ana 3 β. succi seu liquoris nucis muschatae 3 ij. (huius ratione medicamentum facile perducitur in uterum.) Conserva à floribus citri 3 iij. Cum syrupo de corticibus citri, fiat electarium; cuius dosis à 3 j. ad 3 β.*

CAPVT VI.

De Monstro.

Nomen.



Ormatrix, dum foetus formate natus, dupliciter errat: vel enim formatio deprauatur, & fit Monstrum: vel aufertur, & fit Mola. Monstrum autem hic dicimus, quod raro accidit, & recedit ab effectibus consuetis, non ad bonum, sed ad malum, turpe, deforme. Generatur, quia aliquid noxium vtero occurrit, ut cuius necessarium est, tractio formatricis deprauetur. Monstrum ergo est animal in vtero genitum, à deprauata formatrice. Animal dicitur: ad differentiam molæ, quæ non vivit vitâ animalis. In vtero ad differentiam animalium, quæ in aliis partibus generantur. A deprauata formatrice: ad differentiam animalis, non monstri: ad differentiam foetus probi & inculpati. Monstrum enim est opus quoddam contra naturam: quare necesse est, ut consequatur aliquâ actionem læsam, quæ nihil aliud esse potest, quam formatio deprauata. Læditur actio, quia facultas læditur. Hoc ergo loco formatrix frustratur. Facultas frustrari potest læsa facultate, vel ob errorem externum. De hoc autem diu anceps fui: nam ubi læsio facultatis, ibi necessario morbus: & ubi morbus, ibi necessario subiectum pars vivens, quia morbus & sanitas sunt passionēs corporis vivētis. Facultas formatrix, nō videtur pro subiecto habere vterū: quia hic est subiectū conceptricis: Si autē formatricis subiectū sit semen, cū sanguine menstruohæc, quia contenta sunt, non vivunt, & propterea non possunt esse subiectum morbi. Quare, si formatrix frustratur, statuendū frustrari tantum ob errorem externum.

Causa efficiens.

Ætiologia, de subiecto formatricis.

Pro veritate dicimus, formatricis subiectum inter initia, & potissimum ante sextum diem, non esse viuens: vnde Hippocrates genituram appellat, non fœtum: post hos dies, licet fœtus non sit formatus, quia non perficitur ante triginta dies, imo fœmina non nisi post triginta sex dies formatur: igitur post sextum diem, cum fœtus incipiat viuere vita plantæ, est subiectum formatricis, est subiectum viuens.

Et secundum hanc rationem statuere licet; formatricem lædi vel frustrari ob morbum, qui est morbus fœtus, non vteri: & quidem fœtus, vt viuit vita plantæ, non animalis. Sed cognoscendum est, quod vitium esse possit in facultate formatrici. Quidam igitur voluerunt, monstrum esse erratum non ratione agentis vniuersalis, sed particularis: vt proinde aliqui dixerint, vitium esse & errorem ratione materis, vt refert Philosophus text. 82. lib. 2. physicæ acroaseos, & cap. 4. lib. 4. de gen. anim. quidam dixerunt monstrum esse errorem naturæ: quemadmodum enim errores fiunt in arte, ita etiam in natura. Galenus cap. 9. lib. de cau. morb. cap. 2. lib. 2. de diebus decret. videtur asserere, monstrum esse errorem naturæ. Ego statuo agens nec vniuersale, nec particulare errare posse: & proinde monstrum non esse errorem naturæ siue vniuersalis, siue particularis. Proprium vegetabile, vis formatrix in semine residens, quæ est agens particulare, dirigitur ab agente vniuersali, ab intelligentia non errante: & cum hæc vis formatrix agat in materiam, secundum dispositionem materis: necessarium est, vt opus & effectum producat, ita vt nequaquam aberretimo aberraret, si, agens in materiam certo modo dispositam, efformaret quid præter dispositionem illius materis. Sed hoc efficere non potest: igitur natura nec vniuersalis, nec particularis potest aberrare. Sed cur ab Aristotele & Medicis monstrum statuitur inter errores externos? Per errores, intelligunt effectus noxios.

*Formatrix
ladiur ob
ineptam
materiam
didit.*

Porro monstrositas & praua efformatio potest esse duplex: primo, secundum speciem: deinde secundum compositionem tantum. Secundum speciem: quando fœminæ concipiunt animalia bruta, & serpentes quandoque pariunt. Vnde hæc conformatio diuersa est ab illa, in qua editur fœtus, humanus, sed qui caput habet vitulinum: quod caput, vt colligitur è Philosopho, non est caput vituli, sed humanum, licet figuram habeat vituli. Sed quandoque, vt dixi,

*Monstrum
duplex.*

generantur animalia, quæ prorsus & vere sunt extra speciem humanam. Datur etiam aliud monstrum, in quo non est dissimilitudo secundum speciem: dum scilicet fœtus humanus est, sed solum secundum compositionem. Quoad causas monstrorum: Monstrum secundum speciem semper fit ob errorem externum, non ob morbum. Cum autem error externus capiatur à semine, à sanguine, & utero: vitium potissimum pendendum est à semine: quod vitium duplex est: primum, quando forminae attrahunt semen bestiarum: sed quandoque etiam fieri potest è vi seminis, quæ imprimitur ob fortem imaginationem: interdum enim tantum potest imaginatio, qua parentes bestias concipiunt, ut semini per spiritus tanta fiat impressio, ut bestia formentur. In eadem autem specie, quandoque potest frustrari facultas ob morbum post primos dies, ob intemperiem, & præsertim frigidam: nam cum vis formatrix egeat calore robusto ad formandum fœtum: si fœtus nondum efformatus iusto sit frigidior, facile formatur fœtus monstruosus.

*Monstrum
secundum
speciem.*

*Monstrum
secundum
compositionem.*

I.

2.

3.

Quoad monstrum secundum compositionem: fieri solet monstrum, quia error est in compositione, id est, in conformatione, magnitudine, numero, situ. Quoad malam conformationem: quandoque inæquales sunt partes, quia semen est iusto crassius, est intemperatum: quo fit, ut etiam ob intemperiem & inæqualitatem male figuretur fœtus. Et hoc testatur Galenus cap. 14. 15. art. med. ubi vult rationi consonum esse, figuram ob materiae vitium, & ob potentia imbecillitatem, vitari: non quod hoc accadat errore formatricis: sed per potentia imbecillitatem insinuauit calorem debilem. Cum Hippocrate etiam in lib. de genit. figura quandoque, sed rarissime vitari potest, causa vteri: quando uterus inæqualis est, & potissimum secundum substantiam. Fit etiam error quandoque in magnitudine aucta, quandoque imminuta: aucta, cum materia sanguinis est iusto copiosior, & præsertim, si cum copia est connexa praua materiae qualitas. Fit error in magnitudine imminuta, è defectu seminis, sanguinis, è parte vteri: sed hoc rarissimum est, quia uterus est extensibilis. Aduertendum autem, vel totum fœtum esse paruum, si simpliciter deficiat sanguis, vel magis secundum vnum membrum, prout semen procedit à parte imbecilli: ut reperiuntur fœtus, qui exiguas habent partes, veluti parentes. Præterea est vitium in numero deficiente & excedente:

dente: Deficiente: dum est error in sanguine: nam ubi hæ materix deficiunt, fieri potest, ut fœtus fiat aliqua parte orbatus. Notandum cum Hippocrate in lib. de semestri partu, nasci pueros aliqua parte orbatos, sed propter abscessum, qui fœtum afficit octavo mense, sed non est vitium formationis, vis enim formatrix perdurat ad quadragessimum secundum diem.

Postremum vitium circa monstrum est vitiosus situs. Quandoque enim fit, ut iecur locetur in parte sinistra, lien in dextra. Philosophus causam reddens, cap. 4. lib. 4. de gen. animal. dicit, non aliam esse causam, nisi quia cum impetu materia ad indecentes locos defertur: ut, si portio sanguinis, è qua confici debet iecur, propellatur in sinistram partem, fit monstrum, in quo est vitium secundum situm.

4.

Differentiæ sumi possunt à forma, & causa efficiente. A forma: ut animal hoc monstrosum vitiosum est redditum secundum malam compositionem, id est, secundum confirmationem, magnitudinem, numerum, & situm. Quoad causam efficientem. Formatric frustratur vel læsa facultate, id est, ob vitium sanguinis, vel seminis, vel quandoque etiam vteri.

Differentia.

Monstrum in genere oculis conspicitur: ut & differentiæ à forma. Efficientis causæ differentiæ, cognoscuntur è signis indicantibus vitia parentum, vel è parte seminis, vel è parte sanguinis menstruui, vel è parte vteri.

Signa.

Quoad præsidia: in monstro genito vitium tollendum est: verbi gratia, sextus digitus. Deinde prohibendum est, ne monstrum generetur: quod consequimur, adimendo vitia è parte vel seminis, vel sanguinis, vel vteri: verbi gratia, si immineat monstri generatio à frigidiori semine, orietur indicatio calefaciendi corpus, ut gignatur semen non ita frigidum, &c.

Indicationes.

Utrumque autem præstare est possibile, & quandoque impossibile. Quantum ad inhibitionem generationis novi monstri: si immineat ex imaginatione parentum, è mala viuendi ratione, possumus polliceri inhibitionem. Si autem immineat ob intemperies antiquas parentum, ob prauitatem vteri, & inæqualitatem substantiæ vteri: impossibile est, ut aliquid boni polliceamur. Pariter, quoad monstrum iam genitum: si sextus digitus sit, facile potest amputari. Si mala conceptio secundum nervos opticos, secundum meatum

Prognosis.

auditorium, vt infantes nascantur surdi, cecitatum est. Ex his facile potestis colligere, quandoque scopos facile posse absolui, quandoque nequaquam.

Curatio.

Materiæ sunt variz: causa sexti digiti, confugiendum ad materiam cheirurgicam. Ad inhibitionem generationis noui monstri, si imminet è mala viuendi ratione, bona victus ratio constituenda. Et sic de reliquis.

CAPVT VII.

De Mola.

Nomen.



ER Molam exquisitam intelligimus carnem quandam rudem, informem, quæ est vita prædita, ad differentiam tumoris durioris vteri, quem aliqui medici, sed inproprie nuncupant molam.

Generatio.

Generatur, quando aliquid morbificum vtero occurrit, vi cuius, quod concipitur, formari nequaquam potest, vt idoneum sit ad formam animalis suscipiendum. Mola igitur est caro præter naturam in vtero genita, procedens à formatione ablata. Est caro præter naturam quia officit, licet vita sit prædita. cap. 13. l. 14. meth. Diximus, in vtero: ad differentiam carnis, quæ potest in aliis corporis partibus generari. Tandem

Definitio.

diximus, procedere à formatione ablata, ad differentiam molæ nothæ, id est, tumoris duri, quem Aetius vocat molam, qui non procedit à formatione ablata. Porro formatio hæc aboletur, secundum Hippoc. lib. de morbis mul. ob crassam genituram: non enim mola gignitur citra permissionem seminis maris, c. 7. l. 14. vlt. part. Quod si quandoque virgines pariant molam: non est mola exquisita. Quare genitura crassa est in causa: nam huius ratione ea fit conceptio, vt vis formatrix, principium illud vegetale, quodammodo obruatur, vt non possit formare. Hoc etiam Aristot. lib. 4. de gen. animal. proponit: vbi vult molæ causam esse humorem cōcoctum difficilem: qui nihil aliud est, quam crassus succus, vel humor.

Causa efficiens.

Auicennas proponit multitudinem materiæ, à qua scilicet vegetale principium obruitur. Præterea addit in causa molæ esse coitum, in quo matrix comprehendit aquam mulieris, & extendit eam cum nutrimento, & propter defectum virtutis masculinæ non fit conceptio, vt fœtus formari possit. Per quæ verba voluit significare, defectum non tantum è parte sanguinis menstrui, sed etiam è parte seminis: dixit enim fieri propter defectum virtutis masculini, id est, seminis maris.

Mola

Mola ergo est morbus in numero aucto, quod vitium sit ratione formatricis ablata: frustratur autem formatrix ob errorem externum, id est, ob vitium Seminis, vel Sanguinis.

De differentiis.

Differentiæ sumendæ sunt à loco, & causa efficiēte. A loco: vt residet in vtero, secundum Vnam, vel Alteram partem. Ab efficiente: vt sit vitio Seminis vel Sanguinis, maris aut foeminae.

Differentia

De Signis.

Mola in genere indicatur, cum Hippocr. de morb. mul. è tumore ventris inferioris, qui minor est, quam in muliere vterum gerēte, sed tumor producitur ad eam magnitudinē, ad quam producitur, dum mulier foetum gerit, vsque ad octauum mensem. Licet ergo tumor sit minor, est tamen cū maiore sensu grauitatis, quam quando foeminae foetum gerunt: quia foetus ratione portionis serosæ, in qua innatat, nō est ita ponderosus, vt mola: præsertim, quia est substantia factis crassa, dura, & grauis. Præterea indicatur, quia non adest in ventre conspicuus motus: infans enim moueri incipit, inas tertio, foeniella quarto mense: quō exacto, si venter intumescat, & motus non perferatur, coniciendum est, adesse molam. Hoc etiam cognoscitur, si dum mulieres mouentur de latere in latus, sentiunt, propter descensum materiam illam moueri: sed citra motum sui corporis nullum animaduertunt motum. Addit Hipocrate. mammas tumidas euadere, sed lac non adesse: dum enim mola adest, ita refrigeratur vterus, vt vbera in cōsensum trahantur, vt nequaquā possint sanguinem in lac conuertere: & hoc est euidentissimum signum molæ. Præterea etiam cognoscitur, quia procedente tempore foeminae sentiunt aliquem dolorem in imo ventre, quem non sentiunt, dum vtero gerunt. Quoad signa differentiarum: num pars vteri dextra vel sinistra sit affecta: indicabit hoxa, quæ in vna magis quam altera parte sentietur. Vtrum fiat vitio patris, vel matris: cognoscitur è signis indicantibus vitia patris, vel matris.

Signa.

1.

2.

3.

4.

5.

De Indicationibus.

Mola, vt substantia toto genere præter naturam, indicat eradicans. c. 13. l. 24. meth. Sed quia non cedit remedio eradicanti ob duritiem, & crassitiem, indicat molliens, & attenuas.

Indicationes.

Et quia histudo vti non possumus, nisi totius rationem habuerimus:circo toti prospiciendum.

De Prognosticis.

Prognostica.

Secundum Philosophum cap.7.lib.4.gen. animal.& Hippocrilib.1.de morb. mul.interdum durat quinque aut plures annos:sape autem quatuor menses.Et potissimum bene est sperandum,si non vnica est mola,sed plures:nam, si vnica: magis hæret,& ad maiorem magnitudinem perducitur,ita vt,secundum Paulum, periculum immineat hydropis.Secundum Hippocratem, si mola est antiqua: curatio nonnisi cum prædictione suscipienda.

De Curatione.

*Curatio.
Cheirurgia.*

Quoad materias: Auicennas secat venam cubiti & pedis: quia scilicet sanguis redundat in femina, & habet virgentis rationem:nam cum oporteat admodum calidis vti, posset fieri ad vterum attractio à toto, vnde in vtero excitaretur inflammatio: Per venæsectionem etiam adimitur alimentum molæ, quæ sanguine nutritur. Et cum per phlebotomiam moueatur mola, non ita resistit expultrici. Secantur autem venæ supernæ & infernæ, propter sanguinis subsistentiam supra & infra vterum.Hippocrates l.1. de morb. mul. probat cucurbitam scarificatam, applicatam vtero, ad laterum molitudinem,& probat detractionem copiosi sanguinis:quia respicit sanguinem circa vterum existentem, qui assiduo attrahitur à mola pro nutritione:quo fit, vt cum copiosus sanguis attrahatur, copiosus sit euacuandus: & præsertim quia medici est institutum, ne mola nutriatur, sed priuetur sanguine. Applicatur vtero ad laterum molitudinem, propter sanguinis subsistentiam circa vterum.

Medicamentosa.


De Medicamentis.

Præsuppositis medicamentis totum respicientibus, descendimus ad priuata: quibus non vtendum, si absit prohibens, id est, materia replens totum.Mollientia ergo, verbi gratia, fomenti forma parentur ex althea, malua, & rad. cucum. & pulueris. grossis, & pinguedinibus, adipibus: Hoc tempore expedit etiam vitæ, id detinere emplastrum diachylon cum gummis, de meluloto, quæ est, menses postini perituro, & postiori etiam parti applicetur.Probanducientia. tur etiam attenuantia: quæ ob caliditatem, & tenuem substantiam,

stantiam, tum materiam crassam attenuant, tum expultricem irritant ad expellendum. Vnde ab Hippocrate lib. 1. de morb. mul. similiter probantur & assumpta, & applicata. Exhibebitur ergo *distamni Cretici*, & *castorium cum vino*; verbi gratia, *R. castorij 3 ss. distamni Cretici 3 ss. cum vino odorato dulci exhibeantur*, ut vis medicamentorum promptius perducatur ad vterum. Aetius etiam probat *odoramentum à ruta & aceto*. Aui-cennas probat quæ abortum efficiunt: unde licet applicare *fel bouinum, cum filice femina*. Hippocrates lib. 1. de morb. mul. probat *clysmum ex acribus*, id est, ex iis quæ possunt menses prouocare. Quare cū Hippocrate lib. 2. de morb. mul. ablue-re licet vterum, & in eum infundere *uriam cum succo gladioli & aceto*. Et, ut vnico verbo dicam, conferunt quæ fuere proposita in suppressione mensium.

CAPVT VIII.

De abortu: ubi etiam de partu secundum naturam agitur.



SEQVNTVR vitia quæ pertinent ad læsam parturitionem: ut Abortus, & Partus difficultas. *Partus de-*
 Ut autem hæc intelligantur, dicendum de partu *finis.*
 secundum naturam: Partus est expulsio infantis in caput, tempestiue procedens ab expulsionem vteri, concurrentibus infante & matre, cum vtriûsque salute, propter speciei conseruationem. Diximus, esse expulsionem infantis in caput, cum Hippocrate in l. de nat. pueri, & de septimestri partu: siquidem dum infans egreditur secundum caput, nullum patitur detrimentum in reliquis corporis partibus. Non ergo est naturalis partus, si egrediatur non secundum caput, sed secundum brachia, pedes, vel alias partes. Diximus tēpe- *Forma.*
 stiue tempus enim partus est ut plurimum à septimo mense ad vndecimum. c. 7. l. 7. de nat. animal. Sæpe autem decipiuntur mulieres (ait Aristo.) quia fieri potest, ut vterus repleatur flatu, & supprimantur menses tantum, nec tamen mulier sit prægnans: & post hoc tempus euenire potest, ut eripant menses, & mulier cum viro coniungatur, & concipiat: ut tempus conceptionis sit hoc postremum, non prius. Licet autem opportunum tempus sit à septimo ad vndecimum, sæpius tamen fœminæ pariūt nono mense, minus frequēter septimo, *Tempus.*

Famine

*cur nō sem
per eodem
tempore pa-
riant.*

rarius decimo, rarissime vndecimo. Excluditur octauus mensis: quia foetus octimestris non viuit. Quamuis secundum Aristot. c. 4. l. 7. de nat. animal. foetus octimestris quandoque sit vitalis, praesertim in Aethiopia, & potissimum in foeminis fecundis. Explicandum autem cur foemina diuersis temporibus pariat. Et primum videtur contradictio esse in verbis Aristotelis: nam cap. 10. l. 4. de gen. animal. ait, equae foeminae non idem esse tempus pariendi, sed interdum citius, interdum serius parere. At libr. 7. de hist. animal. statuit, soli foeminae humanae contingere, vt diuerso tempore pariat, non autem brutis. Ita est intelligendus Philosophus vt, si sermo sit de eadem vnaque foemina equa, semper eodem mēse pariat: at, si de pluribus equabus loquamur, vna equa vno mēse parit, alia alio. Cur autem bruta vno mense pariunt, homo diuersis? Statuendum cum Philosopho cap. 10. l. 4. de nat. animal. debitam magnitudinem esse in causa, vt fiat parturitio: quae debita magnitudo citius producit in foetu masculino, quam foeminino, beneficio caloris: quod habetur etiam c. 4. libr. 7. de nat. animal. Magnitudinem autem statutam esse causam parturitionis, inde colligitur: quia dum foetus est adeptus decentem magnitudinem, vt illius beneficio possit propria munia obire, non amplius vtero includi debet: & proinde egreditur. Praeterea cum Hippocrate in lib. de natur. pueri. cum foetus est affecutus debitam magnitudinem, eget copioso alimento, vt conseruetur: at cum deficit alimentum, calcitrat, & disruptis inuolucris egreditur. Quia ergo determinata haec magnitudo foetus, in brutis eodem tempore producit: in homine, non eodem tempore: fit vt sola bruta eodem tempore pariant. Cur autem decēs illa magnitudo in brutis solis eodem tempore acquiratur, in causa est similis viuendi ratio: homo enim maximam in viuendi ratione dissimilitudinem cōmittit: ideo mulieres diuerso tempore pariunt. Quæritur etiam, cur octimestris foetus non sit vitalis? Non potest causa transferri in solum motum, quod foetus mense octauo moueatur: nam si septimo est parturitio, sexto est motus: si decimo, mense nono est motus. Quare potius cum Hippocrate libr. de septimest. partu statuendum, causam esse, quia octauus mensis efficit vnum quadragenariis. Tria enim sunt quadragenaria, in quibus vitæ periculum subit foetus. Primum est in primo mense, vnde tunc facile fit abortus: Alterum in octauo mense: Tertium post

*Octimestris
partus, nō
est vitalis.*

post partum. Cum igitur in octauo mense sit secundum quadragenarium, & proinde sit tempus, quod discrimen fœtui afferre potest, & eo tempore fœtus laboret: si tunc fœtus egrediatur, vitalis esse non potest, quia non potest pati periculum secundi quadragenarij, & etiam tertij. Nec Aristoteles medicis repugnat: non enim dicit octimestrem partum simpliciter esse vitalem, sed tantum in fœcundis, quæ concipiunt fœtus robustissimos, qui possunt perferre violentiam vtriusque quadragenarij.

Diximus postea in finitione partus: quod fiat ab expultrice vteri. Galen. enim cap. 3. lib. 3. de facult. natur. inquit, os matricis aperiri, vt etiam ait, cap. 9. de diff. vuluæ, & cap. 7. lib. 15. vfu part. Concurrit autem infans, & mater: infans, calcitrando, & disrumpendo inuolucra, secundum Hippocr. lib. de natur. puer. & com. 1. sect. 1. lib. 6. epid. Quoad matrem: non tantum concurrit vteri expultrix, sed etiam mulier voluntarie concurrit per musculos abdominis, cap. 3. lib. 3. facult. natural. Hinc obstetrices fœminas parturientes hortantur ad expellendum fœtum.

Causa efficiens partum.

Diximus, cum vtriusque salute: nam secus non esset partus secundum naturam. Et quoad matrem, partus est cum eius salute, si bene purgetur, ea tamen ratione, vt inulco copiosior sit purgatio primis diebus: vt, si partus est maris, sufficiat purgatio, à 20. die, vsque ad 30. si ergo eritis apud has fœminas, post 30. diem, si peperit marem, non debetis tentare purgationem, quia iam purgata est. At si partus fuerit fœminæ, purgatio fit à 25. die, ad 42. Quo vero ad salutem pueri: cum Hippoc. lib. de octim. partu, sit partus cum salute pueri, dum partus est facilis: periculum enim imminet ne pereat, si partus sit difficilis, quia infans extra vterum mutat aërem, alimentum, indumentum, vmbilicum; nam intra vterum omnes partes erant occlusæ præter vmbilicum, contra post partum occlusus est tantum vmbilicus.

Causa finalis.

De Abortu.

Partus qui non fit secundum naturam, est Abortus, vel Difficilis partus. Per abortum cum Hippocrate lib. de morb. muli. intelligimus illud vitium, in quo perditur fœtus: siue egrediatur, siue in vtero detineatur. Generatur dum aliquid morbosum occurrit vtero, vi cuius expultrix ad expellendum insurgit. Abortus ergo est partus præter naturam

Nomen.

Definitio.

fœtus

foetus immaturi, procedens ab expulsiōe vteri læsa. Dicitur partus præter naturam, quia potest esse hæc actio læsa, & actio præter naturam, vel ablata, vel corrupta. Ablata: dum foetus perditur, & in vtero detinetur, vt non possit excludi: vnde medici quandoque coguntur deuenire ad ferrum. Corripitur autem, quoties excluditur foetus immaturus: ad differentiam partus difficilis, in quo tempestiue excluditur

Causa efficiens.

1. foetus maturus & perfectus. Causa efficiens est læsa expultrix vteri: nam in abortu expultrix irritatur, cap. 12. lib. 3. facult. natural. Læditur autem expulsio, primum ob molem foetus, secundo ob pondus, tertio ob morsum. Moles immodica, ita grauatur expultricem, vt ad expellendum insurgat: sic etiam pondus: licet enim foetus non sit assecutus insignem molem, potest tamen esse ponderosus ratione virtutis, & ob id aggrauare expultricem. Morsus etiam ob mordacitatem & acrimoniam potest expultricem irritare. Porro causa abortus est vel in Fœmina, vel in Vtero, vel in Fœtu. Quoad fœminam aliæ causæ sunt Internæ, aliæ Externæ. Internæ sunt morbi: nam dum fœmina vtero gerens morbis corripitur, facile in consensum trahitur vterus, & expultrix ad expellendum irritatur. com. 7. sect. 2. lib. epid. Hi autem morbi plures esse possunt secundum Galenum com. aph. 55. sect. 5. vt febris, pro cuius vi, magis vel minus ab ortus periculum impendit. Præterea, ex aph. 17. sect. 7. tenesmus solet esse causa abortus: nam vi doloris in recto intestino, & vi inanis illius cupiditatis excernendi, maxime compatitur vterus. Sic conuulsio est causa abortus: quia irritatur & totum corpus, & vterus, com. 30. sect. 3. lib. 1. epid. Quoad causas externas: est aer hyemis australis pluuiosæ, ver siccum & aquilonium: tunc enim facile fit abortus: aph. 12. sect. 3. nam per præcedentem aeris constitutionem laxatur & repletur vterus: & si succedat constitutio sicca & frigida, vix fieri potest, vt non fiat expressio foetus, & proinde abortus. Auicenna. addit aerem balnei. Gal. aphor. 44. sect. 5. proponit cibi paruitatem & prauitatem: dum enim foetus alimento destituitur, perditur: & ob prauum alimentum, male nutritur, vnde redundant praua excrementa, quorum vi fit morsus. Idem dicendum de motu immodico, de superflua inanitione: nam immoderata euacuatio est causa abortus. aph. 31. & 34. sect. 5. & proinde etiam profluuium sanguinis, menses superflui, immodicus motus, & immoderata animi accidentia, vt ira, timor, tristitia.

Tandem

Tandem sunt causæ externæ, non necessario occurrentes, venæ sectio, medicamenta male administrata. Explicandum etiam, quomodo hoc vitium contingat ratione vteri. Cum Gal. ergo, aph. 43. sect. 5. vteri erysipelas solet esse causa abortus, nam in consensum ducuntur partes principes, præsertim iecur, ut gignatur vitiosus sanguis, vi cuius perditur foetus. Sic etiam vteri inflammatio & vlcus. Item mucus acetabulorum, aphor. 45. sect. 5. & lib. 2. de morb. mul. unde potissimum fit abortus 2. & 3. mense: nam in primo mense non multum ponderat foetus: post tertium vero mensem mucus acetabulorum absuitur, ut tunc non immineat abortus. Causa etiam abortus esse solet immodica paruitas vteri, cum Hipp. in lib. de superfœt. nam dum vterus est iusto minor, & foetus ad quandam magnitudinem productus est: cum nequeat amplius augeri, ob vteri paruitatem, necesse est, ut perdatur. Postremo fit etiam abortus ratione foetus, cap. 3. 1. & 12. lib. 3. facult. natural. dum semen patris vel matris vitiosum est.

Quoad differentias à forma: abortus est partus præter naturam vel Ablatus, quando foetus non excluditur: vel Corruptus, quando foetus excluditur, sed immaturus. Quoad efficien. abortus fit, vitio Mulieris, Vteri, vel Foetus.

Imminens abortus cognoscitur è fragilitate matris, aph. 44. sect. 5. cum enim mater cinaciata est, eget copioso aliment. to, ut non sufficiat alimentum pro matre & foetu, unde abortus imminet. Indicatur etiam imminens abortus è fragilitate mammarum, præsertim si fragilitas repente inuadit: aph. 37. sect. 5. c. 8. l. 14. vs. p. Hipp. dicit, aph. 35. sect. 5. quæ corrupturæ sunt foetus, his mammae extenuantur: si vero tursus duræ fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit, & non corrumpent foetum. Dum enim gracilescunt mammae: significant defectum alimenti, unde foetus corrumpitur: quod si contingat, mammas rursus intumescentes: cum materia morbifica deserat vterum, & petat mammas, & alias etiam corporis partes: hinc dolor occupat vel mammas, vel alias partes: materia scilicet morbifica vterum relinquente: unde foeminae non abortiunt.

Præsens abortus cognoscitur, quia prægressa est fragilitas mammarum, & obstetrices oculis abortum cōspiciunt. Oportet autem obstetrices esse diligentes: nam interdum contingit, ut foemina vtero gerens expellat per verum sanguinem

Differentia.

Signa imminens abortus.

Signa præsens abortus.

guinem copiosum, & imprudentes obstetrices imaginantur foeminam commisisse abortum, quod tamen falsum est: non enim factus tunc est abortus, sed imminet: & dum imminet, prohibere oportet, quod sit astringentibus: si autem factus est, laxantibus occurrendum. Quare obstetrices diligenter intueri debent materiam quæ egreditur, an sit sanguis, an caro, an genitura, an foetus: quia dum sit ablutio cum aqua: facile conspiciunt, an sit factus abortus, nec ne. Quoad signa differentiarum, & primum à forma: partus corruptus cognoscitur, quia foetus immaturus egreditur. Si autem parturitus sit ablata, id est, foetus mortuus detineatur in utero, cognoscitur cum Aetio & Hippoc. lib. de superfoet. & lib. 1. de morb. mul. primum è motu, quia foeminae non percipiunt amplius motum: vel si motus aliquis est, instar lapidis mouetur, ut in mola, quatenus mulier de latere in latus se conuertit. Præterea quæ per uterum egrediuntur, impenſe corrupta sunt & foetida, subsequitur febris, oculi subfusi, destituti spiritu animali, dolor adest, & in pectore persentitur frigiditas. Quoad differentias à causa efficiente: siue hoc malum fiat vitio foeminae, siue vitio uteri, siue foetus: cognoscitur è propriis signis.

Indicationes.

Quoad præſidia: aduertendum, an factus sit abortus, an potius imminet. Si factus est: foetus detinetur, vel excluditur. Si detinetur: expellendus, tanquam aliquid toto genere præter naturam. Si expellatur: indicat remedium adiuuans, ut facile & cito expellatur. Deinde, cum imminet, ob vitium vel foeminae, vel uteri, vel foetus: his vitiis est occurrendum. De indicationibus horum morborum alibi.

Prognostica.

Secundum Hippocratem lib. 1. de morb. mul. abortus peior est partu, id est, foemina magis patitur in abortu, quam in partu, ut non raro moriatur. Et hæc fuit sententia Hippocratis commentar. 7. secti. 2. lib. 3. epid. & com. 1. sect. 1. libr. 6. epid. ratio est, quia intempestive ad expellendum insurgit, coacta à causa morbifica, & sæpe deleteria. Periculum autem pro vi differentiarum variat. In maiori ergo discrimine versatur foemina, dum foetus mortuus in utero detinetur: nisi enim à natura expellatur, vel ope prudentis medici: necessario foemina moritur. Si excludatur: non est tantum periculum. Sic quoad differentias à causa efficiente pro varia earum vi, vario modo prognosticandum: verbi gratia, prout febris erit deterior, ita etiam maius periculum portendet.

tendat. Si fiat ob erysipelas : vix fieri potest , vt non pereat , & necessario etiam succedit abortus & mors . Si fiat ob vteri paruitatem : perditur quidem fœtus ; sed mulier propterea non perit . Si fiat ob mucorem acetabulorum : neque tum fœmina perit : & hoc vitium possumus amouere .

Quoad materias : venæ sectio quandoque probatur , verbi gratia , si mulier sit corrupta febris , merito febris sanguis vacuandus . Quandoque etiam fieri solet vt fiat abortus , cum fœmina sanguine nimis abundat , quo fit , vt cum impetu decumbens in vterum , sit in causa , vt fiat abortus , vñdo venæ sectio probatur . Quandoque fuit secta vena cum maxima vtilitate , vt fuerit fœmina præseruata ab ortu . Expedi potissimum primis mensibus venam secare : quia adest præsentia indicâtis , id est sanguinis copiosi : quo etiam tempore fœtus non eget adeo copioso alimento . Neque primis mensibus adest prohibens , vt postremis : in his enim virtus fœtus non ita permittit , non ita coindicat . Atque tutum est venas supernas petundere , quia sanguis supra iecur subsistit : præsentia abortus imminet , si fiat impetus sanguinis à supra ad infra . Præterea , quandoque opus est ferro & manuali operatione ad extrahendum fœtum mortuum , quemadmodum docet Aëtius . Ad hæc autem confugiendum : quoties ope medicamentorum non potest egredi fœtus mortuus : de quibus medicamentis loquemur in partus difficultate .

Quoad medicamenta : primum animaduertere oportet , an fœtus obierit . Cum Hippoc. lib. 1. de morb. mul. oportet fouere vterum oleo biliorum alborum , malua , althæa , radicibus tum cumeris agrestis , & addere oportet butyrum , adipem , medullas , vt è toto , quantum fieri potest , vterus laxetur : quia secundum hunc modum facile excluditur fœtus mortuus . Sed præterea cum Hippocrate etiam applicare oportet proposita in suppressione mensium . Ita cum Hippocrate purgationes per os exhibendæ : vñde ascendendum est ad *helleborum nigrum* . *claterium cum myrrha* : *℞. claterij ḡ ij. ant. iij. myrris ʒss.* Necesse est etiam confugere ad sternutatoria : vt expediat narius immittere *struthium* , *nigellam* , *claterium* : per sternutamenta enim fœtus excludi potest . Si de medicamentis , quæ possunt fœtum mortuum expellere , dicendum sequenti capite . Si excludatur fœtus , sed immutatus : cum Hippocrate in libro de exsectione fœtus , si non secundum caput exeat , oportet retundere fœtum , vt in caput descendat .

*Generatio.
Phlebot.*

*Medica-
menta.
Ad exclu-
dendū fœ-
tum.
1.*

Si

Si a. fiat exclusio: in primis animaduertere oportet, an actu excludantur, an vero ne intempestiue excutiat metus sit: dum enim actu excluditur: cum Auicenna abstinendum ab adstringentibus, & oportet vti laxantibus: ne quod fieri non raro solet, relinquatur in vtero membranæ, vel excrementa praua tempore perperij: vnde, si adstringentibus vtetur, peribit sine dubio fœmina. Ob id Auicennas improbans adstringentia proponit *suffumigium* è *bdekkio*, *hyssopo*, *origano*, è *sinapi*: vnde & excluditur fœtus, & excrementa expurgantur felicissime. Si fœtus non sit mortuus, neque tamen excludatur, sed immineat abortus, & fœtus regredietur: tunc est saluberrimum vti adstringentibus: quorum beneficio efficitur ne mulier abortiat, sed fœtum conseruet. Et ideo cum Auicenna & reliquis probantur *trochisci de carabe*, *de spodio*, probantur *saccharum rosatum antiquum*, cum *boli Arm.* & adstringentibus, de quibus in fluxu immoderato diximus. Secretum quoque mulieribus est Italicis ad prohibendum abortum, grauidis propinare in *ous* *sexbili puluerem ceci infestory*, paucis *massiches* addito. Extra etiam obstetrices, dum hoc periculum animaduertunt applicabunt dorso *unguentum è castoreo*, *unguentum Hippocrat.* Aliqui imaginantur (quod ego ignoro) *adamantem gestatum in digito*, præseruare fœminas ab abortu: quemadmodum etiam *Dioscor.* & *Ætius* dicunt, *lapidem acutem* idem præstare, si ad sinistrum brachium alligetur. Sed ego magis probo adstringentia.

Postremo animaduertere oportet, dum non est abortus factus, sed periculū imminet, non tamen ita præsentaneum: num mulier vtero gerat, vel non. Si gerit: probantur moderate adstringentia, vt roborentur ligamenta. Si non gerit, & alias grauida abortiuit: optimum est præsequare. Vnde prout abortus committitur vel vitio fœminæ, vel vteri, vel fœtus, id est seminis parētum: ita occurrendum variis medicamentis, prout varia causa est abortus, de quibus in proprio cap. vbi gratia: si mulier abortiat propter mucorem acetabulorum, oportet, antequam vtero gerat, acetabula siccare, & euacuare muscositates illas, de quarum euacuatione supra diximus. Ideo propriis capp. hæc medicamenta sunt proponenda.

Ad prohibendum abortum.

Ut trahatur de qua abortire solent.

De Pariendi difficultate.



PARTUS difficultatem intelligimus vitium, in quo foetus maturus non expellitur, vt opus est.

Gignitur hoc malum, quia vtero aliquid morbi-
ficū occurrit, vi cuius vteri expultrix frustratur.

Partus ergo difficilis est partus præter naturam maturi foetus, procedens à læsa expulsionē vteri. Partus autem præter naturam dicitur tribus modis: primo, quia parturitio aufer-
tur, id est, quando foetus maturus non excluditur, sed detine-
tur in vtero: secundo quia minuitur, quoties longiori tēpore
fit, quam fieri deberet: tertio quia deprauatur: quoties fit eū
dolore iusto acerbiorē, & vt plurimum cum noxa vteri. Di-
ctum est maturi: ad differentiam abortus, in quo est foetus
immaturus. Procedit autē à læsa expulsionē. Frustratur au-
tem expultrix, vel quia Læditur, vel ob Errorem externum.

Læditur, ob morbos vteri. Error externus, est vitium Fœmi-
næ, Foetus, vel Membranarū. Quoad morbos vteri: primū est
immodica siccitas, vi cuius foetus non potest facile excludi,
quemadmodū opus esset. Præterea est angustia, id est, mor-
bus in viâ: tumor vteri, id est morbus in magnitudine aucta;
item paruitas vteri, secundum Auic. Et tandem potest esse
vltus, soluta vnitas. Ob hos igitur vteri morbos, læditur vteri
expultrix, vt partus fiat cum difficultate. Quoad vitia fœmi-
næ: ea pertinent vel ad Totum corpus, vel ad Partem deter-
minatam.

Totius, ex aph. 55. sect. 5. est febris: quæ si
adeſt tēpore partus, hunc reddit difficilem. Sed præterea
in causa est habitus fœminæ obesus. Item ætas maturior,
ante 14. annum: siquidē tunc viæ sunt adeo angustæ, vt par-
tus fiat difficilis. Sic etiā seniores, vt post 40. annum diffi-
culter pariunt, ob virium imbecillitatem. Præterea cum
Hippoc. lib. de nat. pu. mulier partui non assueta, parit cum
difficultate: vt etiā mollis ac delicata, quæ noxas & dolo-
res non facile tolerare potest: item quæ non facile parturire
potest. Partes etiā, quæ vtero vicinæ sunt: laboriosum red-
dunt partum: verbi gratia, si vesica calculo afficiatur: si hæ-
morrhoides tumeant: si intestina sint repleta flatibus: si læsi
sint musculi abdominis. Quoad vitia foetus: si moriatur, est
causa difficultatis partus: quia ad sui exitum nil potest con-
ferre, eo quod non viuit. Quoad foetum viuentem: si perpen-

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Causa efficiens.

1.

2.

3.

damus sexum: in partu fœminæ maior est difficultas, quia mas robustior est fœmina. Quoad vim fœtus: si imbecillis fuerit, siue mas, siue fœmina, est in causa difficultatis partus. Secundum Hippoc. namque lib.1. de morb. mul. fœtus robustus, & proinde valide calcitrans, facile excluditur. Quoad magnitudinem: magnus fœtus est causa difficultatis partus, quia ægre excluditur. Fœtus etiam iusto minor, quia non habet iustum pondus, potest esse causa difficultatis partus: licet maior fœtus sit causa maioris difficultatis quàm minor. Quoad fœtus quantitatem discretam: cæteris paribus, fœtus duplex, id est gemelli, sunt in causa difficilis partus, præsertim si accidar, vt vterque eodem tempore in vteri ceruicem decumbat. Quod deniq; ad figuram: si fœtus fuerit biceps, cum difficultate excluditur. Si mala fuerit figura, vt in caput non descendat: necessario est causa difficilis partus. Quoad membranas inuoluentes fœtum: si crassiores fuerint, difficile pariunt fœminæ: ob crassitiem enim immodicam, non facile possunt expelli. Tenuiores etiã causa sunt difficultatis partus: quia citius quam par est disrumpuntur, vt aquositas iusto citius egrediatur, quæ sui præsentia lubricando est in causa, vt fœtus cum facilitate egrediatur: vnde hæc postea dum effluit, partum non potest iuuare. Hi ergo errores desumpti sunt à causis internis. Quoad causas externas: est æris immoderatus excessus, inedia, timor, coitus tempore imprægnationis, vt statuit Hippocrates libro de superfœt. Et quoad causas fortuitas: difficilis est partus propter imperitas obstetrices, propter adstringentia quæ vtero applicantur, propter odoramenta, quæ naribus applicantur. Ob has ergo causas læditur expulsio vteri.

Differētia.

Differentiæ sumi possunt à forma & causa efficiente. Quoad formam: actio aufertur, quando fœtus maturus moritur in vtero: vel Imminuitur, vel Deprauatur: idque Læsa facultate, aut ob Errorem externum.

Signa.

Imminens partus difficultas indicatur, si purgamenta egrediuntur ante partum: secundum Hippoc. in lib. de exsecutione fœtus. Præsens facile cognoscitur: nam secundum Arist. lib.7. de hist. anim. dolor magis affigit circa posteriora, quam anteriora. Differentiæ è propriis indiciis facileprehenduntur. Nam differentias formales quod attinet: quibus signis cognoscatur fœtus mortuus in vtero, declarauimus. Quoad differentias à causa effc. dicendum esset de signis
mor

borum vteri: fœminar, & partium vteri: quæ patent. Causa externa per se manifesta est.

Præsidia sumuntur à causis, ob quas frustratur expultrix: *Indicatio-
ves.* ut sunt morbi vteri, morbi totius fœminæ, febris, vitia vicinarum partium, calculus vesicæ, tumor hæmorrhoidum, & alij affectus, de quibus suis locis.

Vitiū hoc magni est momenti: nam facile accidere potest, *Prognosti-
ca.* ut huius ratione fœmina sputo sanguinis, & phthisi corripitur, præsertim si difficultas fiat partus, & purgatio prohibeatur, si ob partus difficultatem vterus inflammetur, ut dicit Hippoc. com. 85. sect. 3. l. 3. epid. Bene autem sperandum est, si fœmina sternutarit. aph. 35. sect. 5. Quoad differentias formales: satis perniciosum est, si fœtus immaturus moriatur. Circa differentias à causa efficiente facile digredi possumus.

Quoad materiam cheirurgicam: Hippocrates lib. 1. de *Curatio.
Chei-
rur-
gia.* morb. mul. si mulier erat sanguinea, secabat venam in malæolis, quia institutum erat Hippocratis, sanguini illi copioso impetum dare in vterum, ut beneficio illius impetus extruderetur fœtus. Aetius fœtum mortuum ferro iubet extrahi, si se non cedit medicamentis, quæ ibi præscribit.

Medicamenta secundum Paulum probantur laxatitia, quibus via aperiuntur: ut facilius egrediatur fœtus: & ideo probat *Medica-
menta.*

oleum dulce calidum, oleum lil alborum, amygd. decoctum malæ, althææ, hydreleum, ut inde fiat infusio: ita enim facile excluditur fœtus. Sufficit nunc proponere medicamenta, quibus *1.*

utendum, ubi mortuus est fœtus: non enim facile admittendum, ut cheirurgi ad ferrum confugiant. Hippocrates ergo *2.*

lib. 1. de morb. mul. exhibet elaterium, cum rapunculo, verbi gratia ḡ ij. vel ij. exhibet cantharides integras, quia alæ sunt alexite-
ria venteris, scilicet * unam cantharidem, cum castorei ḡ j. & cymini

Aethiopici ḡ β. Et ad eandem intentionem probat per superius & inferius, quæ menses valide prouocare possunt. Sequenti medicamēto sæpe fœtus mortuus exclusus est: pul.

sabina, calamintæ montana cinamom. diſſamni cresic. myrrhæ, castorei ana ḡ β. croci ḡ vj. decocti cicerum rub. 3 vj. syrup. de capill.

ven. 3 ij. Misco & fiat potio. Tutius hoc est, quam quod ex elaterio, vel cætharidibus constat. Si fiat partus difficultas vitio membranarum: si crassiores sint, iubet Aetius, ut obstetrix

summa cum dexteritate membranas laceret: & si tenuiores fuerint, iubet Gale. c. 3. l. 19. vsu part. ut in vterū aliquid liquidum immittatur, cuius beneficio partes lubricæ euadunt: cū

* imo exignam cantharidis portionē: ait enim, carduagidos pun-
gior.

3-

4-

humor egressus sit, ob nimiam membranarum tenuitatem, Idem Aetius probat albumen oui, cum decocto malua, aut fannigraci, aut cremore ptisana, aut cum oleo amygdal. dulc. Secundum Auicena. à proprietate conferunt lapis magnes detentus in sinistra manu. Expedi etiam suffire vterum cum ungula asini vel equi. Probatum etiam suffumigium paratum cum oculis piscis salini. Applicant etiam corallum in coxa dextra: & quandoque alligant femori lapidem aditum.

CAPVT X.

De Præfocatione ab utero.

Transitio,



Nomen.

Definitio

Altimari

et aliorum,

Auctoris

definitio,

Præfocatio. Aetius de particularibus vteri affectibus diximus: restant vicia vteri communia, quæ sunt præfocatio, inflammatio, vlcus. Cum autem è doctrina de affectibus ventriculi & iecoris pateat quid agendum sit in vlcere & inflammatione vteri: his omisissis, tantum circa vteri præfocationem digrediemur. Galenus cap. 5. lib. 6. loc. aff. mulieres præfocatione detentas, vocat hystericas, id est, secundum vterum affectas. Dicitur autem præfocatio, quia hæ mulieres strangulari & suffocari videntur. Cõmuniter hoc malum definire solent: quod præfocatio vteri sit intemperies frigida vteri, dependens a venenata qualitate. Verum impossibile est, in vteri præfocatione esse intemperiem frigidam, è Galeni sententia. Nam cap. 7. lib. 3. de loc. aff. dicit, id quod cito fit, & cito desinit, non posse referri in intemperiem: hoc ea ratione dicit, vt probet epilepsiam non posse referri in intemperiem. Et hoc etiam de præfocatione statui potest, quæ cito fit, & cito desinit: desinit enim, & interficit aliquot horarum spatio. Præterea si referretur præfocatio vteri in intemperiem vteri: certe hæc esset insignis intemperies: quia ratione huius præfocationis totum corpus mulieris refrigeratur, ita vt mortis imaginem præbeat: quod fieri non posset, nisi insignis esset illa dyscrasia: Quod si hæc esset insignis dyscrasia: non posset tolli, nisi medicamenta calida applicarentur vtero: at Galen. cap. 5. lib. 6. de loc. aff. dicit, curari præfocationem vteri, siue fiat è retento semine, siue è sanguine menstruo, nullo prorsus adhibito auxilio ratione corporis vteri. Ergo non potest esse intemperies vteri. Ego affectum hunc sic definiendum puto: quod præfocatio vteri, sit refrigeratio totius corporis & vteri,

& vteri, dependens à veneno frigido, propter obstructionem vasorum, ad vterum pertinentium. Dicitur refrigeratio totius corporis: quia ita secundum totum refrigerantur mulieres, ut mori videantur. Dicitur etiam refrigeratio vteri: quoniam frigiditas totius corporis, in vteri strangulatu provenit à frigiditate vteri. Cum refrigerationem dico: nolo intemperiem: refrigeratio enim est symptoma & affectio: intemperies est morbus. Quare ego præfocationem vteri non refero in dyscrasiam frigidam, tanquam in morbum vteri: sed in refrigerationem, id est, qualitatem mutatam tangibilem, & proinde in symptoma. Dependet autem hæc refrigeratio à veneno frigido. Et hoc symptoma refertur in morbum in mala compositione, in via, nimirum in obstructionem vasorum ad vterum pertinentium. Hæc autem obstructio secundum Galenum, fit è retento semine, vel sanguine menstruo. Nam vidua quædam, ut Galenus refert, quæ à coitu abstinerat, quamvis menses ipsi fluebant, incidit in vteri strangulatum: à quo postea conualuit, ubi post colorificam admota partibus inferioribus, & per contrectationem illarum partium, excretum fuit copiosum semen. Unde patet, etiam è retento semine fieri præfocationem. Differentia tamen est inter præfocationem causatam è semine, & causatam è sanguine menstruo. Dum enim fit è retento semine, & non retrahitur uterus ad latera; vel ad partes superiores: at, dum fit è sanguine menstruo: retrahitur uterus vel sursum, vel ad latera: quia venæ ad vterum delatæ replentur & humectantur, & proinde replentur vincula illa, quibus dorso vterus alligatur: unde ratione huius humectationis ac repletionis illa vincula retrahuntur ac abbreviuntur, & hinc uterus retrahitur. Constitutum ergo sit, præfocationem vteri fieri ex obstructione vasorum deuenientium ad vterum, quæ vasa continent semen & sanguinem menstruum: quibus retentis sequitur refrigeratio tum vteri, tum totius corporis; & inde hæc præfocatio.

Causa efficiens.

Sed contra sentire videntur Hippocrates & Aetius. Nam Hippocrates libro primo de morb. mul. dicit, vteri præfocationem fieri, quando venæ inaniuntur, & siccatur vterus. Responso. Vasa vteri sunt duplicia: alia deferunt materias ad vterum, semen scilicet & sanguinem menstruum: aliæ autem sunt venæ propriæ vteri. Præfocatio vteri fit, quia venenum frigidum generatur, propter obstructionem va-

forum, non vteri, sed vasorum ad vterum pertinentium. Dum igitur vasa materias deferentia ad vterum, obstruuntur: certum est quod tunc venæ vteri inaniuntur, vnde siccat vterus, qui antea irrigabatur & humectabatur ratione tum sanguinis menstrui, tum seminis. Inaniuntur autem venæ vteri, quoniam obstruuntur vasa deferentia materias ad vterum. Et sic explicandus est citatus Hippocratis locus. Præterea Hippocrates ibidem ait, fieri vteri præfocationem in prægnantibus è nimio labore, è cibi fastidio: vterum enim ratione laboris incallescere: & fœtum alimento priuari, propter inappetentiam. Hinc videtur vteri præfocatio potius consistere in caliditate, quam in frigiditate. Responsio. Hippocrates vult significare, ratione caloris & laboris vterum incallescere, & calefactum attrahere. Cum autem assit cibi fastidium, dum mulieres comedunt citra appetentiam: plurimæ superfluitates colliguntur, & alimentum bonum est paucum: iuxta illud, Quod sapit, nutrit: hæc autem superfluitates attrahuntur ab vtero, ratione caliditatis: vnde vasa replentur, quibus repletis fit obstructio, & his obstructis fit præfocatio. Quare præfocatio refertur in obstructionem non autem in dyscrasiam frigidam. Aetius etiam nobis contrariari videtur: qui dicit, fieri præfocationem, dum vterus refrigeratur mensibus prodeuntibus. Admodum difficile est intelligere, quid per hæc verba velit Aetius. Nam si statuit, vteri præfocationem fieri è sanguine menstruo prodeunte, eo quod ratione mensium immodice prodeuntium, vterus refrigeratur: quomodo igitur fit præfocatio è menstruo sanguine retento? Responsio. Dum adest præfocatio vteri: coniungitur etiam syncope, vel saltem animi defectus. Aetius ergo respiciens ad syncopem, quæ fieri potest ob affectum vterum: cognouit syncopen non modo fieri posse in suppressione mensium, sed etiam è profluvio mensium: nam si fiat euacuatio sanguinis vel per vterum, vel per aliam quamcunque partem: si sit immodica: potest syncopen producere. Ideo dicendum, quod illa præfocatio, de qua loquitur Aetius, non est vera præfocatio: dum enim est vera præfocatio, secundum Hippocrat. lib. 2. de morb. & secundum omnes medicos naribus odorata admota, maxime nocent: fœtida autem inferioribus partibus admota obsunt. Quare in præfocatione odorata adhibenda sunt partibus inferioribus, fœtida naribus. At hæc ita fieri nequeunt, in mensium profluvio:

fluuium: dum enim cum hoc est syncope, odorata naribus, foetida imis partibus sunt admouenda. Quare penitus contraria est ratio curationis. Sermo igitur est de syncope, quæ fit, dum mulier afficitur obstructione vasorum, ad vterum pertinentium, quæ pendere potest, è retentione vel sanguinis menstrui, vel seminis, vel etiam à nimio fluxu sanguinis menstrui. Et ob id Aetius non loquitur de vera præfocatione vteri, sed de coniuncta cum syncope, quæ ab utraque causa dicta prouenire potest.

Præcipuæ differentię proponuntur à Galeno cap. 5. libr. 6. *Differentiæ.* loc. aff. Fit enim vteri præfocatio ob retentum vel Semen, vel Sanguinem menstruum. Quoad communes differentias: præfocatio est vitium solubile: præterea est vitium vehemens & simpliciter, & secundum quid. Simpliciter quidem, quia est magnus recessus. Secundum quid vero: quoniam est affectio in parte cõsentiente cum partibus principibus. Præterea est vitium chronicum, instar morbi comitialis, sed ratione totius morbi. Est autem exacte peracutum, ratione accessionis: quoniam breui spatio potest interficere. Est præterea vitium commune, & indeterminatum, quia adest obstructio in illis vasibus: quæ est morbus indifferens, quoniam alias etiã partes occupare potest:

Cognoscitur autem mulier præfocata, quoniam repente *Signa.* & ilico affligitur, & insigniter, quandoque obmutescit, quandoque in syncopen labitur, quandoque leipothymia oboritur quandoque fiunt conuulsiones, quandoque epilepsia. Distinguendum autem, num epilepsia, vel syncope fiat vitio cordis. vel cerebri, vel vteri: & ictirco recurrendum ad signa indicantia malas affectiones harum vel illarum partium. Dum cognouimus vteri præfocationem: oportet videre an ille strangulatus proueniat è retento semine, vel menstruo. Galenus dicit, multo deteriorem esse eum, qui fit è retento semine: vnde pulsus deficit, & inspiratio non solum læditur, sed etiam aufertur, quia calor in corpore mulieris exiguus permanet, quia scilicet refrigeratur totum corpus, quia refrigeratur vterus, propter obstructionem vasorum deferentium semen ad vterum: semen autem illud in venenũ conuertitur: quod (pro more venenorum etiam aliorum, vt scorpij, viperæ, &c. silico vim suam veneficam toti corpori communicat. Dum igitur fit tanta refrigeratio corporis, vt exiguus calor in eo permaneat: potest etiam respiratio auferri, manente

tamen vita:remanet autem transpiratio, quamvis respiratio auferatur: illa quippe efficere potest pro vitæ sustentatione in hoc casu, quoniam corporis calor exiguus per transpirationem satis euentari potest, nec maiori eget ventilatione: Hinc decipiuntur practici illi, qui (vt experiuntur an mulier præfocata sit mortua, nec ne:) ori mulieris hysterice solent apponere flocculos lanæ, qui si non moueantur, dicunt esse mortuam. Et thoraci poculum aqua plenum imponunt: & aqua non moueatur, mortuam dicunt propter ablatam diaphragmatis actionem, quæ ad respirationem necessaria est. Sed hi decipiuntur: quia signa proposita non indicant ablationem vitæ, sed ablatam respirationem, cum qua tamen vita stare potest, quoniam permanet transpiratio. Quare si præfocatio fit è retento semine, grauiora sunt symptomata, quam vbi fit è retento sanguine menstruo. Aliud signum est apud Galenum & Auicennam: quando enim strangulatus fit ob retentum sanguinem menstruum: vterus conuertitur vel sursum, vel ad latera: id quod sensibilibet interdum ab obstetricibus obseruatur. Dum autem fit è retento semine, talis conuersio non obseruatur. Præterea si fiat ob semen retentum: indicatur ex intermissa solita Venere. Notandum autem, Galenum reprehendere illos, qui dicunt, strangulatum fieri ob vteri commotionem. Ideoque Hippocrates dum libro secundo, de morbo mulat. attestatur, vterum ad præcordia ascendere, non vult, eum vere ascendere, sed vim illam veneficam, & insigniter refrigerantem, communicari præcordiis, & hinc toti corpori: vnde, si communicatur cordi, fit syncope, si cerebro, fit epilepsia. Quod hoc verum sit, inde patet: quia dicit, vterum descendere ad coxas, non secundum proprium corpus, sed secundum vim: Sic etiam dicendum, quod secundum vim ad præcordia ascendat.

Indicationes.

In præsentì vteri strangulatu, oritur indicatio exobstruendi, & prohibendi, ne obstructio magis augeatur: vnde oritur indicatio reuellendi. Ratione vero imminentis præfocationis, oritur indicatio euacuandi, tum sanguinem menstruum, tum semen: & oritur indicatio prohibendi, ne hæc retineantur. Et denique totius ratio habenda.

Prognostica.

Affectus hic vehementissimus est, qui aliquando paucorum horarum spatio interficit. Optimum autem est, vt, si mulier præfocata mortua esse videatur, seruetur triuim,

id est,

id est, horas 72. & si tunc corpus sc̃teat, mors cognoscitur: si enim insignis est affectio: interdum videntur mortuæ mulieres, & tamen reuiuiscunt. Sæuior est affectio, si fiat à retento semine, quam si à sanguine menstruo: tum ob causam antedictam, tum ob angustiam temporis. Malum peius est, si coniuncta est syncope. Si assunt sternutationes; bonum: aphorif. 35. sect. 5. Quare præfocatio est vitium admodum periculosum: quod tamen curationem quandoque admittit, si nullus committatur error: alias in principio maximus fit progressus, si negligentius tractetur.

Quoad cheirurgiã. In præfocatione actu existente, si fuerit è retento semine, non conuenit venam secare, quia tunc non adest indicatio vacuandi sanguinem: quod etiam statuit Auicennas. Si vero strangulatus pendeat è retento sanguine menstruo: sanguis euacuandus. Et, cum præfocatio sit morbus vehemens, non secundum quid, sed simpliciter: ideo valido auxilio sanguis debet euacuari, scilicet per venæsectionem, dummodo ætas & vires permittant. De viribus dubitatur: quia in strangulatu adest syncope, nimirum præceps vitium lapsus. Videamus igitur, num in hoc vitio ita consistent vires, vt admittant venæsectionem. Galenus cap. 3. lib. 10. meth. & cap. 3. libr. 12. meth. ait, vires consistere in spiritibus, carnosò genere, & solidis particulis. In præfocatione vires sunt languidæ, ratione spirituum: possunt autem validæ esse ratione carnosì generis, quoniam non omnes hystericæ sunt excarnes: possunt etiam esse validæ vires in solidis particulis. Sed obiiciat quis, Galenum capit. 5. 12. meth. dicere, vires esse validas in solidis particulis, quando solidæ partes sunt bene temperatæ: at in præfocatione vteri non possunt esse bene temperatæ, quia adest refrigeratio in toto corpore, & pròinde in solidis particulis. Huic dubitationi satisfacit Galenus cap. 2. libr. 3. de prælag. è puls. vbi ait, cor vel incaluisse, vel incalescere: si cor incaluit, languidæ sunt vires: si incalescit, possunt esse validæ. At præfocatio vteri est affectio, id est refrigeratio: non autem est intemperies: & ob id non est in facto esse: non ergo est frigiditas, seu frigida dyscrasia, cuius ratione vires constare nequeant in solidis, sed refrigeratio. Quare vires constant, quoad solidas partes, & quandoque etiam quoad carnosum genus: quamuis deficient ratione spirituum. Ideo in præfocatione à sanguine menstruo, vena secari potest. Hinc Galenus com.

*Curatio.
Cheirurgia.*

23. & 24. li. 4. de vict. rat. secatur venam *ἐν τῇ ῥητῇ φλεβῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς*, ubi patiens obmutuit, & est carentia pulsus, ac proinde syncope: unde in syncope etiam acuta existente, licet venam secare, ut cap. 9. lib. 2. docuimus. Auicenna. reprobatur phlebotomia: sed ibi loquitur de præfocatione & retento semine: probatur autem in eo strangulatu, in quo uterus retrahitur: si enim ad dextram retrahatur, saphenam dextram secatur: si ad sinistram, aperitur saphenam sinistram: si sursum retrahatur, utramque saphenam rudit. Retrahitur autem uterus, ad harum aliquam positionem, ubi fit præfocatio ob retentionem sanguinis menstrui: Et, dum adest retractio, tum actu adest syncope, & præfocatio. Quare Auicenna in præfocatione actu existente secatur venam: Et recte: quia imminet calor suffocatio, cuius præsentaneum remedium est venæsectio. Diebus elapsis præfui curationi mulieris, quæ in die octies correpta fuit uteri strangulatu: & noluit admittere venæsectionem alter medicus, qui aderat. Inuito tamen illo medico, secta fuit vena: & ipsa statim euasit. Quare audacter in tali casu ad venæsectionem accedendum: alias mulieribus per eundem esset. Quod si venæsectioni aliqua de causa non sit locus: accedendum ad cucurbitulas scarificatas. Auicenna capit. prop. docet, quando magis uti possimus cucurbitulis, & quando magis venæsectione: quem hac de re consulitis.

*Medicamentorum genera-
lia.* Inter initia præfocationis, optimum est uti aliquo euacuante, electiue educente: ut si utamur suppositorio acri. Et male faciunt illi, qui statim ab initio deueniunt ad frictiones, & odora menta, siue hæc sint odorata, siue fœtida: quoniam oportet prius totum vacuare, & potissimum uteri partes. Et, si opus sit venæsectione, ad hanc statim deueniendum, euacuato prius corpore, cum aliquo suppositorio. Deinde accedendum ad frictiones.

Specialia. Quod id medicamenta peculiaria in paroxysmo non possumus dare *conyzam, castorium, sulphur colinum, & alia* quæ proponuntur ab Hippocrate, lib. 2. de morb. mul. Verum quidem est, quod ad præseruationem uti liceat aperientibus, & prouocantibus menses: de quibus suo loco. Sed ubi est accessio, non est possibile ea exhibere: nam mulieres hystericae non possunt deglutire, cum veluti mortuæ iaceant. Vi ergo aperietur os, & infundetur *castorium*, quod ratione fœtoris con-ducit. Tempore autem præfocationis, si fit & retento

semine

femine: obſtetrices ſumant *Dombacem, vel lanam, imbutam oleis rerum aromaticarum, ut oleo cariophyllorum, moſcho, ambra, Zibetho*, eamque penitus in pudenda ponant. Quinetiam contrectando partes illas agitent, ut ſemen proiiciatur: ut Gale- nus refert cap. 5 lib. 6. loc. affect. Si mulier viro deſponſata fuerit, vir penem inungat *oleis prædictis, vel Zibetho, &c.* & cum ea coëat: hac enim ratione, partibus illis commotis, mulier expergeſceri poteſt, & ſemen emittere, vnde liberetur. Si præſociatio fit è retento ſanguine menſtruo: tempore acceſſionis licet uti *radice cyclaminis, & ſanſibus mercuriales.* In omni cauſa inunguntur pudenda & partes vteri, rebus odoratis: naribus vero apponentur ingrata, ut ſunt *aſa fatida, galbanum, caſtorium*, & alia foetida, quæ ſunt in com- muni uſu.

CAPVT XI.

Appendix: qua diſſeritur, in humano genere vir- ginitatem non poſſe certis & indu- biis notis aſtrui.



Robabilia ſigna virginittatis in mare ſumuntur e mutatione odoris & vocis: in ſcœmina, ex hy- mene, & venarum congerie, quibus os cervicis vteri affici conſuevit.

Quoad odorem: ante coitum putant ſimilem ſeruari: at poſt deſolationem, eum mutari ad inſuauem & hircinum.

Odoris mu- ratio.

Veram nos ſtatuiſmus in pubertate hanc odoris mutatio- nem accidere, quod ſemen eo tempore gignatur. Dum enim

Cauſa 1.

ſemen procreatur, ſpiritus vitales largius quam antea in reſtes diſfunduntur, reliquum autem corpus eos pauciores habet, ideoque natura, ſpirituum copioſorum ope deſtituta,

humores & excrementa non ita ſuperat, ut antea: vnde ne- ceſſario odoris mutatio. Deinde vis ſeminis generatrix, an- te ſeminis generationem quali ſopita, eo tempore quo ſe-

Cauſa 2.

men producit, ita excitatur, ut ſemen gignat, & vim ſuam, id eſt, qualitatem quæſam realem toti corpori imper- tiatur: vnde humores & excrementa corporis, à priſtina odoris bonitate deſciſcunt, caroque vniuerſa ſimilem affe- ctionem contrahit. Hinc caſtratorum animalium carnes iucundiores: non caſtratorum inſuaues, ſiue Venerem

exerceant,

exerceant, siue non : quamuis euidentior sit in iis mutatio, quæ Venere vtuntur. Quia igitur odoris mutatio sit ; quoniam semen gignitur : ab ea non potest vllum signum certum virginitatis, vel deflorationis sumi.

*Vocis mu-
tatio.*

Vocis mutatio duplex est : vel enim vox pura, seu sonora in impuram, seu raucam mutatur, vel acuta in grauem. In pubertate igitur, non è coitu, sed ob seminis generationem, vocis puritas non retinerur. Cum enim vox sit sonus aëris efflati, dependens à glottide mota: sit vt vox sonora fiat, dum aër efflatus à pura glottide percutitur. At in seminis generatione vtrumque desideratur : vnde vox impuritatis sit patriceps, quia spiritus deficiunt, & vis illa seminalis toti, & proinde etiam laryngi impertitur. Acutæ vocis causa immediata, est aër velociter impulsus : tarde agitatus, aër est causa grauis vocis. Quare in pubertate vox sit grauior, non è coitu necessario, sed è constitutione laryngis, & generatione seminis : è constitutione laryngis, quia instrumenti angustia, vt in pueris, est causa vocis acutæ, eo quod aër velociter impellitur : at in pubertate instrumenta fiunt ampliora, vnde aër tam velociter moueri nequit. E seminis generatione : quia spiritus vitales in testes decumbunt; minoreque copia ad reliquas corporis partes deferuntur, vnde aër minori imperu agitur. Quare è vocis mutatione, nõ sumitur certum indicium virginitatis, aut deflorationis.

*Hymen :
vide Co-
lumbum,
(¶) Parai.*

Quoad fœminas : & primum quoad Hymenem, huius causa efficiens est facultas generatrix, quæ cum semine parentum in vterum deducitur. Materia è qua, sunt portiones fibrosæ & membranossæ, pertinentes vt plurimum ad os ceruicis: (nati secundum Aëtium in quibusdam fœminis in ipsius pudendi labiis solet hæc membrana generari : in quibusdam etiam citrà vteri osculum) quæ ita extenduntur, luxuriante facultate genetrice, vt membrana hæc producat. Finalis causa huius membranæ nulla est, quia eius generatio non est necessaria : cum aliquando generetur, aliquando non: vt omnes anatomici fatentur. Et Aëtius hanc membranulam inter morbus recenset : tantum abest, vt vtilem eam existimet. Præterea, cum fœtu in lucem edito, naturæ etiam materias seminales gignat (vt patet in tumoribus folliculis donatis, pterypio, & Sebel) non mirum est, si tempore formationis fœtus pars aliqua etiam non necessaria procreetur. Ergo absentia hymenis, non arguit mulierem esse

*cap. 96.
lib. 26.*

esse defloratam: nec præsentia certum est virginitatis indicium: nam si foramen sit amplius, seminis ingressus non impeditur, maxime si virile pudendum non admodum vastum, muliebrem autem perampulum sit.

*Venarum
congeries.*

Quod venarum congeriem attinet, non negamus fieri posse, ut circa os cervicis venulæ nonnihil extēdantur. Cum enim hoc fiat in vitio, quod Arabes Sebel vocant (in quo venosa substantia ita extenditur, venulæque inuicem ita inferuntur, ut ex iis veluti panniculus quidam efformari videatur) non mirandum, si in generatione foetus, facultas illa generatrix luxurians, è venulis ad os cervicis attinentibus, formet contextum quendam venarum, quibus disruptis sanguis effluat. Sed neque harum venarum generatio est perpetua: unde nec latentibus his venulis, necessario violata est virginitas: nec apparentibus, necessario est integra: potest enim euenire, ut hæ venulæ in congressu sanguinem non emittant, si scilicet venarum cumulus sit exiguus, pudendum foeminae vastum, virile paruulum.

Quamobrem defloratio, vel natura tegi, vel arte ita occultari potest, ut interdum etiam periti Medici & obstetriges fallantur.



PRACTICÆ
 MEDICINÆ,
 LIBER QUINTVS.



DE ARTHRITIDE, ET
 LVE VENEREA.

SECTIO PRIOR.

De Articulorum doloribus.

Nomen.



PER arthritidem intelligimus dolorem cuiuslibet articuli, quemlibetque dolorem articulare, secundum com. aphor. 35. sect. 6. & dirigitur hæc vox ad cheiragram, ad podagram, ad gonagrā, ad dolorem coxendicum, & denique ad omnes articulorum dolores. Desumpta est vox ab actione læsa, quia dolo vocatur: & à loco affecto, quia dicitur articularis: hic a. dolor intelligitur, prout fit à materia, non à simplici qualitate.

Verumtamen ita de hoc dolore loquemur, ut etiam pateat quid agendum sit, si dolor à simplici qualitate oriatur. *Generatio.* Generatio huius mali insinuatur à Galeno com. aph. 49. sect. 6. Materia enim fluens ad articulos, necesse est, ut ligamenta repleat: non enim fit dolor articularis, si sola articulorum

cavitas

cavitas repleatur, neque sufficit, vt solum afficiatur *repleatur*:
 necessarium ergo est repleri ligamēta, quæ repleta, dū com-
 primunt tendines, & reliquas neruofas partes vicinas, soluunt
 continuum, cōprimendo, vnde dolor, oritur. Proinde dolor
 articularis, est tristis sensatio partium neruofarū articularū,
 dependens à solutione vnitatis, facta à cōpressionē ligamen-
 torum. Causa formalis est tristis sensatio: quæ in doctrina
 de dolore capitis explicatur. Subiectum sunt partes neruofæ
 articularum, id est nerui, tendines, periostion: non ligamēta,
 quæ non sentiunt, quāuis hæc subiectum sint causæ efficien-
 tis. Diximus articularum: ad differentiam aliarum partium.
 Per articulum (secundum Galen. c. 9. lib. 12. de vsu p.) intelli-
 gimus ossium compositionē, factam propter motum volun-
 tarium, ad quā constitutionē articularum concurrunt ossa,
 cartilagine, membranæ, ligamēta, tendines, nerui, caro mu-
 sculosa, vasa, cutis, ipsaque membrana carnosæ. At subiectum
 huius doloris, sunt solæ partes sensitiuæ, id est nerui, tēdines,
 membranæ. Causa efficiens huius doloris, est solutio vnitatis,
 dependens à compressionē ligamentorum: vt colligitur
 è cap. 80. art. med. & cap. 1. lib. 10. *κ. ρ. α.* vbi communis causa
 doloris articularis statuitur tensio. Porro materiæ tenden-
 tis subiectū, sunt ligamenta: si enim partes neruofæ. i. nerui,
 tendines, replerētur fierent conuulsiones: vnde Paulus c. 78.
 lib. 3. ait, non esse inflammationem inter internodia, sed circa
 articulos, quia ibi resident ligamēta: hoc a. non est perpetuū,
 quia interdum replētur ossium cavitates, interdum materia
 residet inter os & periostium. Vitium ergo hoc ad ligamen-
 ta pertinens, potest dici morbus in aucta magnitudine, tu-
 mor: item si ossium cavitates replentur, potest statui mor-
 bus in cavitare. Ad ligamentorum a repletionem requirun-
 tur tria, humoris Copia, humoris Motus, & articularum
 Imbecillitas: com. aph. 28. sect. 6. Primum ergo de humore
 copioso duo explicanda: vnum, quænam sit hic humor: alter-
 um, quæ eius causa. Humor occupans articulos, principa-
 lis causa doloris, est Sanguis, vel pituita: non bilis: hæc
 enim adeo mordax est, vt potius vlceræ excitet: quam tu-
 mores: non melancholia: quæ in magna copia non gene-
 ratur, & præterea adeo crassa, vt vix aliquid reperiat quod
 eius vehiculum esse queat, vnde à sola melancholia, vel
 non fit dolor articularis, vel rarissime. Porro Sanguis vel
 Sincerus esse potest, vel Permistus cum bile, cum pituita,
 cum

Definitio.

Subiect.

*Causa ef-
ficiens.*

*Ligamēta
repleri in
arthritis.*

*Vnde fiat
ligamento-
rum reple-
tio.*

*1.
Humoris
replentis.
Species.*

το ο χηπερ.

Causa hu-
moris replē-
tur,

2.
Caus. mo-
tus humo-
rum.

3.
Imbecilli-
tas articu-
lorum.

cum melancholia: ut bilis, pituita, melancholia habeant rationem humoris principalis, sed non sinceri, verum permixti, ita ut sanguis tamen prædominetur. Pituita, potest esse sincera, vel permixta sanguini, bili, melancholiz ita tamen, ut pituita perdominetur. Hi ergo humores duo rationem habent causæ principalis, in dolore articulorum. Vehiculum autem horum humorum multiplex esse potest: interdum est serum, id est extremum tenuum, primæ coctionis: interdum ichor, id est materia præter naturam reddita, genita est tenuiore parte humoris: potest quoque esse bilis flaua. Hæc doloris sunt causæ: plurimum quidem pituita, interdum tamen etiam alij succi, ut sanguis, à quo fit dolor articulorum inflammatorius. Causa huius humoris, qui est arthriticis auctor, Generans est vel Colligens. Generans patet ex alibi dictis: nam quivis humor generatur ab aliquo agente ex aliqua materia: verbi gratia sanguis generatur à iecore calidiore, è bono & copioso chylo: pituita à frigiditate ventriculi, è cibis pituitosis &c. Causa colligens, est suppressa aliqua consueta vacuatio: unde aphoris. 19 sect. 6. dicitur *χρὴν ἡ ποδαγρία, ὡς καὶ τὰ καλαμύνια ἐν τῇ ἐκλίπῃ*. Hinc etiam sæpe arthritidis oritur, dum vacuatio per nares supprimitur. Hactenus de humore copioso. Cæterum causæ quæ faciunt ut humor moveatur, sunt humoris Copia, Qualitas. Expultricis robur, Viarum amplitudo. Dum enim humor iusto est copiosior, aggravat facultatem, ut ad expellendum insurgat. Qualitas noxia expultricem irritat. Robur etiam expultricis requiritur: nisi enim pars, in qua reperitur materia, robustam obtineat expultricem, non expellit, non transmittit. Viarum etiam angustia, transitum impedit. Viæ autem per quas hæc materia induetur, sunt vasa, id est venæ, arteriæ, præterea spatia media inter cutem & carnem, ut statuit Fernelius, sed non hæc sola, ut ipse male arbitrarur. Viæ redduntur laxiores, è balneo aquæ dulcis, cap. vlt. lib. 11. meth. Articulorum imbecillitas est Natiua, vel Ascititia. Natiua: quæ à principio generationis adest, & hæc impressa est fœtui, vel tempore conceptionis, vel post. Tempore conceptionis: cum patiens est ortus è pravo semine parentum qui articulos habuere imbecillos. Post conceptionem: cum imbecillitas in utero à matre contrahitur, quæ pravo utitur alimento, cuius vi ligamenta evadūt laxa, frigida, humida, & proinde admodum apta ad suscipiendum superfluitates. Imbecillitas ascititia

origi

oriri potest à causis, quæ agunt posteaquam patiens in lucem editus est: & hæc sunt Internæ causæ, vel Externæ. Internæ: vt humores: verbi gratia si quis copiosam gignat pituitam, vt alimentum euadat pituitosum, hoc decumbens in articulos, potest ossa & ligamenta humidiora & frigidiora reddere. Externæ causæ, vel Necessario occurrunt, vel Non necessario. Necessario: vt viuendi ratio, cuius vi partes articulorum laxantur, refrigerantur, humectantur: vt aer frigidus, cibus pituitosus, potus plus iusto frigidior, vinum copiosum (nam dum non regitur à natura, refrigerat, & maxime articulis officit) somnus immoderatus, meridianus, immoderata repletio & potissimum immoderata inanitio, vnde Venus arthritidem causat: similiter & quies immodica, & motus immoderatus intempestiuus, tum corporis, tum animi: hæc omnia in causa sunt, vt partes articulorum laxæ reddantur, com. aph. 16. 20. 22. & vlt. sect. 3. & comm. aph. 28. 29. 30. 49. 55. sect. 6. & cap. 5. lib. 1. de alim. fac. lib. de cibis bon. & mal. succ. cap. vlt. lib. 11. meth. cap. 4. lib. 14. meth. cap. penult. li. 10. x. 767. Non necessario occurrentes causæ sunt: vt si quis articulis applicet refrigerantia, versetur in locis frigidis & humidis, illegitime balneo aquæ quicquid utatur.

Differentiæ sumuntur à forma, subiecto, & causa efficien. *Differentia.*
 te. Forma est tristis sensatio: quæ modo Magis, modo Minus est molesta. Subiectum sunt partes articulorum, vel Omnium, & dicitur arthritis, dolor articularis: vel Quorundam: ynde, si occupat articulos manuum dicitur cheiragra: si pedum, podagra: si genu, gonagra: si coxas, *coxitis* dicitur. Causa efficiens, est humor Copiosus, Mobilis, & Articulorum imbecillitas. Humor, est Sanguis, vel Pituita: sanguis aut Solus, aut cum pituita, vel bile, vel rarissime cum melancholia: pituita vel sincera, vel mista cum sanguine, bile, aut rarissime cum melancholia. Copia huius humoris, vel est Maior, vel Minor. Mobilitas: mouetur humor, vel per Transmissionem, vel per Collectionem quandoque: semper tamen locum habet transmissio, vt è superioribus patet. Articulorum imbecillitas, vel est Natiua, vel Ascititia: natiua, tempore conceptionis, vel post: ascititia, à causis internis, vel externis, & his aut necessario, aut non necessario occurrentibus.

In genere arthritis pater: nam æger de dolore circa articulos conqueritur. Hic autem dolor distinguitur ab eo qui non fit à materia, & qui vere articularis non est: quia in ar-

Signa generalia.

Specialia.

thritide necessario sunt signa humoris redundantis: de quibus suo loco. Differentiæ à forma facile patent: num dolor magis vel minus sit intensus. Differentiæ à subiecto: num

Sanguinis.

afficiantur articuli omnes, vel saltem aliqui: demonstrabunt ægri. Differentiæ à causa effeðrice: Si est sanguis sincerus, exluperans, citra aliorum ammissionem: cognoscitur è calore satis miti: non enim ita mordax est, vt calor bilis flauæ, aut pituitæ salsæ: est tamen satis copiosus, si conferatur cum pituita influente, in qua fere nullus apparet calor: partes etiã tunc sunt rubentes: tumor est satis insignis: corpus est temperamenti calidioris & humidioris: habitus carnosus: ætas florens: tempus veris: patiens vsus est optimis & copiosis cibis: suppressa esse potest consueta vacuatio, vt per nases, &c.

Pituita.

Si est pituita: calor est exiguus: color albicans: tumor mollis, præsertim inter initia: temporis enim progressu, pituita in tophos degenerat: tandem pituitæ aderunt signa, quæ alibi traduntur. Quoad permistos humores: si sanguis cum pituita fuerit mistus: calor est mediocris, non ita intensus: rubedo moderata, vergens ad albedinem: color subrubeus potius, quam rubeus: tumor mediocris: signa vtriusq; humoris dominantis. Verbi gratia, si ventriculus sit frigidus, aut simul caput: & calor cum humiditate abundet in iecore, vt gignatur copiosus sanguis. Si sanguis sit cum bile mistus: calor erit intensior, mordacior: rubedo cum flauedine quadam: & signa erunt vtriusque humoris redundantis. Si sit mistus cum melancholia: calor erit remissus: rubedo modo vergens ad flauedinem, albedinem, sed habens quandam obscuritatem: & signa aderunt vtriusque humoris. Si pituita cum sanguine permista fuerit: calor erit satis remissus: color albicans, cum exigua quadam rubedine, sed magis ad albedinem declinabit, quia prædominatur pituita: aderunt signa vtriusque humoris. Si pituita sit cum bile: calor non erit remissus, quia bilis est acris: color albicans, sed aliqua è parte pallescens, vt est color paleæ: aderunt signa humoris vtriusque. Idem statuendum de melancholia: color enim ad nigredinem & opacitatem verget. Quoad motum: si humor mouetur per solam transmissionem: tum in parte ad articulos pertinente, non præcessit aliquis dolor, vel calor, antequam articularis obortus est dolor. At si prægressus sit dolor vel calor, quorum ratione sit attractio: facile patet, humorem fluere, non tantum per modum transmissionis, sed etiam attractionis

Actus.

De imbecillitate articulorum, num sit nativa, an astititia: & *Imbecilli-
tas art.*
illa è semine, an alimento matris, hæc, sitne è causis internis
vel externis: facile referre poterunt ægri & astantes.

Cum autem hoc malum sit tristis sensatio, quæ dependet *Indicatio-
nes.*
à materia, replente ligamenta: necessario indicationes vtilis
ab his tribus tantum sumuntur: nimirum à tristi sensatione,
à materia, & à ligamentorum imbecillitate. Tristis sensatio,
indicat anodynum, quod est triplex: primum frigidū: deinde
humidum moderate & viscidum: tertio calidum in primo, &
tenuis substantiæ: cap. 19. simpl. lib 5. Hoc scilicet indicatur
à dolore, quatenus consideratur ratione receptionis: nam si
iudicium spectemus, tristis sensatio indicat remedium, quod
mentem ad alia auertat. Quoad materiam: ratione speciei, si
sanguis sit in causa, scopi diriguntur ad sanguinem: si pitui-
ta, ad pituitam, &c. Ratione virij, in qualibet materia, per-
pendimus copiam, motum, causam generantem & collig-
gentem. Copia indicat minuens. Motus, ni quid obstat, in-
dicat auertens: si nimirum sit præter naturam & inutilis:
quod si dolor articulorum fiat à materia, quæ per viam
crisis mouetur, vt quandoque in febribus putridis malignis
accidit: hic motus non est inhibendus. Causa generans indi-
cat contrarium: verbi gratia, si caput gignat pituitam, ob
intemperiem frigidam & humidam: indicat calfaciens &
siccans. Causa colligens, indicat contrarium: verbi gratia, si
menses sint suppressi, ratione materiæ obstruentis: oportet
materiei occurrere, si sit crassa, attenuando, si viscida deter-
gendo. Ligamenta cum suscipiant, ob frigiditatem, humi-
ditatem, laxitatem: indicant calida, sicca, densantia. De vir-
tute indicante nihil dico: quia communis est omnium
morborum.

De Arthritide in genere statui non potest, num sit facilis, *Prognosti-
ca.*
vel difficilis curationis: sed differentias lustrare oportet. Ale-
xander ait. podagram cognitam, non difficulter tolli: quod
de recenti verum est: nam nodosa cognoscitur: est tamen
incurabilis. Forma huius mali est tristis sensatio: ergo vbi do-
lor seu tristis sensatio intēsiōr, athritis est magis periculosa:
est enim vehementia secundum essentiam, & interdū etiam
ratione facultatis, cum dolor cōcitat animi deliquiū. Quoad *A forma.
A subie-
cto.*
subiectum: hinc nulla oriuntur prognostica. Nam quantum
ad articulum, vt est magis vel minus præstans: pertinet ad
vehementiam dignitatis, ac proinde ad differentias à causa

efficiente: quatenus ratione articuli affecti, maior vel minor est vehementia: vnde articulus solum rationem habet signi. Quoad articulum, vt est dexter, vel sinister: arthritidis in parte sinistra difficilius curatur, secundum Auic. hoc vero non pertinet ad locum affectum, sed ad virtutem, magis in dextro, minus in sinistro robustam. Si perpendimus subiectum, quatenus nervi sunt subiectum tritis sensationis: nec hoc quidem spectat ad locum affectum, sed ad virtutem robustiorem, vel imbecilliore: nam *ὑαγροσία*, est signum virtutis debilis. Denique subiecta materiae replentis, id est, ligamenta, non ad locum affectum spectant, sed ad causam efficientem, vt infra patebit. Porro causa effectrix, est humor, & articulorum imbecillitas. Humor si copiosior, crassior, viscidior, durior, ita vt thphi generentur: malum primo est difficilius, post incurabile. Humoris motus diuturnior, difficiliorem reddit curationem. Augetur difficultas, si motus non tantum sit per modum transmissionis, sed etiam per modum attractionis. Quoad causam generantem: curatio est difficilior, si maior est vehementia essentiae: verbi gratia, si cerebri intemperies, generans pituitam, aut ventriculi frigiditas, sit in habitu; minus est periculi, si in habitudine. Quoad causas colligentes: curatio est difficilior, si insignis essentiae adest vehementia: verbi gratia, si materia obstruens sit admodum copiosa, crassa, viscida, vt vacuari nequeat: sicut interdum sit in suppressis menses. Quantum ad imbecillitatem articulorum: difficulter curatur nativitate, ascititia, si frigus & humor est in habitu.

Auicenna. Quoad virtutem: difficilior est curatio, si patiens afficitur secundum partem sinistram, si aetas senilis, si corpus emaciatum, & exquisiti sensus: in his enim corporibus virtus est debilior. Auicennas ait, difficilem esse curationem in corpore pingui: est enim & haec materia signum virtutis debilis: sic etiam in emaciato: at in carnoso corpore robusta est virtus.

Curatio.
Venasectio.

Ad curationem progrediamur: & primum ad materiam chirurgicam: Sanguis e li. 10. n. 767. c. 2. in arthritide vacuandus est, si rationem habet causae principalis, vel sine qua non. Circa quando agendum: Vena aperienda tempore veris: adest enim indicans & permittens. Aptius inquit statim esse secandam venam: Auicennas, non statim: ne humor commoueat, vt fluat. Aetius scilicet respexit arthritidem imminente: cum enim quis quotannis per intervalla corripitur arthritide, verbi gratia, in fine veris: non expectabimus finem veris.

sed

sed statim, antequam malum accedat, venam aperiemus: adest enim indicans, sanguinis copia, quæ nisi educeretur; tempore consueto veniente, flueret, doloremque efficeret: unde tum nihil prohibet phlebotomiam. Auicennas autem respexit ad dolorem actu præsentem, cum materia iam est in motu: adest quidem indicans; sed prohibet materia, quæ cœpit moueri: nam per venæ sectionem omnes corporis humores commouentur. Interim victus ratione & aliis, de quibus suo loco, id efficiendum (sed moderate tamen) ut ne ita fluat humor: & dum non amplius fluit, vena secanda. *ubi*
agendum: pro varia subsistentia, variz venæ tundendæ: si ergo sanguis exsuperas existat in toto corpore, verbi gratia, in ischiade, possumus & infernas, & supernas venas aperire. Cucurbitulæ possunt administrari, ratione totius & partis. *Cucurbitula.*
 Ratione totius: pro varia subsistentia sanguinis, variis partibus possunt applicari: ut dorso, cruribus, &c. Ratione partis: cucurbitulæ scarificatæ sunt applicandæ loco affecto: verbi gratia, in dolore coxendicij, coxendici, & cum copiosa flamma: secundum Gale. lib. 10. n. 767. ut vacuatio fiat sanguinis iam fluxi. Venam possumus secare, & cucurbitulas administrare dorso & cruribus, ratione totius, ante exhibitionem pharmaceuticæ: at materia in toto existens, prohibet loco affecto cucurbitas applicari. Cauteria non sunt locis affectis affigenda, sed robustioribus, ut per hæc loca materia peccans euacuetur. Utendum est cauteriis corpore euacuato, antequam arthritis sit reddita cophæa: tunc enim frustra adhiberentur. Pluribus locis applicanda: verbi gratia, in coxendicis dolore; non vni parti candens ferrum applicandum, sed 4. 5. 6. aut 7. locis: sic enim extirpari potest dolor arthriticus, & hominès à claudicatione præseruatur: aph. 60. sect. 8.

Medicamenta respicere debent Materiam, Partem & Dolorem. Materiam respicientia, sunt Lenientia, Præparantia & Euacuantia. Lenientia variant, pro ratione superfluitatis. Si enim hæc sit in ventriculo, conuenit leniens vomitorium: *Medicamenta respicientia materiam.*
 ut hoc: *℞. succi raphani ʒ ij. oxymelitis simpl. ʒ j. iuris ping. & non salis ʒ viij. Misc. pro vomitorio.* Notandum, Auicennam in arthritis non probare acetum & oxymeli: his tamen in vomitorio uti licet: nec enim tunc penetrat acetum, sed pituitam in ventriculo incidit, & abstergit: at in syrupo & electuario prohibetur. Clysteres lenientes, fiant è leuioribus, etiā in dolore coxendicis: nam licet in hoc probentur clysmi

acriores, & centaurio minori, & colocynthide. non tamen admittendi sunt interna initia, ante venæsectionem; & leuem euacuationem: nam vi istorum, in dolore coxendico, facile ad locum affectum materia attrahitur. Per os etiam exhiberi possunt lenientia, quæ aluum subducunt, eaque varia.

*Præparan-
tia.*

Vacuātia.

*1. clyst. li-
nūs.*

Præparantia etiam pro materiæ ratione varia sunt: de quibus alibi. Id notandum: ab aceto abstinendum esse.

Probantur vacuantia à remotis partibus, tum Sensibiliter, tum Insensibiliter. Quæ sensibiliter vacuāt, sunt varia: prout materia euacuanda est, vel pituita, vel melancholia, vel bilis. Notandum vero secundum Auicennā arthritide phlegmatica, præter agaricū & colocynthidem, rhabarbarum esse misendum: cholera enim facit currere phlegma: vnde probantur pilula cochiae: si melancholia peccet, fiant cochia cū helleb. Maxime etiā valēt pil. de hermodact. Mesua: quadā affectæ sunt malignitate, sed oportet vt castigetur: & non tantū pituitam vacuāt, sed vias etiā angustant, vt homines ab aliis paroxysmis præseruentur. Formula talis erit: *π. de hermod. 3 j. cochiarum, mastichin. ana 3 j. cum syr. de beton fiant pil. num. v.* Non improbat̃ur vomitoria: vnde in pertinaci arthritide, & tichiade, *antimonio* uti possumus, & clystis acribus. Hic tamē circa quādo agendum obseruetur, vt hæc soluētia non exhibeantur, nisi fluxus materiæ iā cessauerit: quia soluētia humores magis exagitāt.

*2. ad idias.
Interna.*

Sunt etiā vsurpanda quæ insensibiliter euacuant, tū Intus, tū Extra. Intra corpus varia dari possunt, pro vario humoris dominio: si enim humor exsuperans est calidus: exhibeatur decoctum salis parillæ, guaiaci, china, cū cichoraceis: quia oportet attenuare, discutere, & rarefacere, sine caliditate. Si humor sit frigidus ac pituitosus, vt plerumque: detur decoctum guaiaci, cassiafras, cum iua, stachade, saluia, betonicis: probatur antiqua antidoti, aquæ sulphurea, & similia calefacientia, ac attenuantia, de quibus in lue ventrea agemus, & alibi. Alexander medicus senior, ad materiam pituitosā proponit medicamentū efficacissimum: quod vocat Diacorallium: *π. corallij, non nostri marini* (habet enim vim astringendi: at hic aperientibus opus est) sed anagallidis 3 ij. hac insignem habet vim attenuandi & absumendi humores pituitosos, calidoque innato partium animalis est amica: addo myrrhæ 3 iij. quæ valde detergit, & ad remota penetrat, menses valide mouet: caryophil. 3 β. raphōtici 3 j. quod mirabiliter detergit. folij 3 β. raro bonū inuenitur: ego bis tantū vidi: eius loco impone- mus gardi indica 3 vj. vel 3 j. rad. pœonia 3 j. aristoloch. rot. longa,

*dia uogal
lis. lib. ij.
usile natu
ris humi-
dis.*

*ſiſa ʒ ij. ſpica nardi ʒ iiij. fiat pulvis tenuiſſimus: & exhibeatur ʒ j. ſummo mane, ante cibū per 6. horas, cū tepida ʒ v. Medicamētum hoc calefacit, ſiccāt, attenuat, detergit, incidit pituitā, calefacit ligamēta, propter odorata reſtaurat ſpiritus. Quia plus iuſto eſt calidū: exhibetur cū tepida, ne nimium corpus exurat. Alex. quotidie exhibet, per 100. dies, intermittit dies 30. ruruſum exhibet 100. dies, deinde intermittit 30. dies: poſtea ruruſum exhibet, nō quotidie, ſed dieb. alternis per 160. dies. Hodie hoc medicamentū nō eſt in vſu: vnde mirū nō eſt, arthritidē curari nō poſſe, quia antiquorū pręcepta nō obſervātur. Exhibetur per centū dies, quia indicans diu perſeuerat: 30. dieb. intermittitur, propter virtutē: poſtea virtute roborata, ruruſum exhibetur: denique rōe & indicātis, & virtutis, alternis diebus exhibetur, &c. Locū ſaltē habet in dolore pituitoſo, vetuſto, & non tophaceo: vt Alexāder ſtatuit. Datur per 6. horas ante cibū: quia natura nō poteſt eodē tēpore & cibum regere, & adeo efficax medicamentum: diſtributio ergo huius medicamenti ſit ſpatio horarū 6. vel 7. & 8. ſi ægri ferre tandiu ſatnē queant. Datur cum tepida: vt melius pēnetret. Diacoral. omnibus anteponendum eſt: ad eundem tamen ſcopum facit *terebinthina Cypria, & caſtorium*. Hęc de iis quę intro dantur.*

Extrinſecus, pro vacuatione applicantur Emollientia, Digredientia, aliquando Reprimētia, ſed raro. Reprimētib. non licet vtī in iſchiade: quia materia nō cedit: in reliquis articulis, & pręſertim, ſi fluxio ſit materię calidę, vtī poſſumus, ſecundū Alexandrū, medicamento è cortice malorū punicorū, è rhoe, è farina hordei, cocta in vino aſtiero: pro ſingulis vnciis farina, imponere poſſumus pulueris ʒ ſ. Si materia ſit frigida: addantur ſolia *terebinthi, cupreſſi*. Emollientib. potiſſimum vtendū in dolore antiquo: quia probabile eſt, materiā aliquo modo duram eſſe redditam. Loco igitur affecto applicare poſſumus, ſecundū Gal. c. 2. l. 10. *κ. ρ. ο. n. ammomiātum, aceto diſſolutum, cum cera: ſumentur enim hac in portione aequali, addetur 24. croci pars; poſſunt etiā addi medulla, adipēs, vſ pates cuiuſvis*. Emolliens efficaçiſſimum, quo & in arthritide, & in quolibet affectu à duriore materia vtī licet, proponitur à Gal. c. 2. l. 9. *κ. ρ. ο. n.* Nos ſic pręſcribemus: *R. bdellij, adipis vitulini, ammoniaci thymiamatis, iridis anæ ʒ ij. opopanacis, galbani, iburis, ſtor. roriſmar. ſtyracis, an. ʒ j. piperis ʒ j. ol. inniperini ʒ j. & ʒ ij. ſ. vini quantum ſufficit, fiat emplāſtrum*. Oportet medicamenta arida cōtundere & cribrare: ammoniacū autē opopanacem, & thus, diſſoluere in vino:

Externa.
Reprimētia.

Emollientia.

Digerim.

huic medicamento miscentur piperi & alia attenuantia, ad digerentia, ut sint emollientium vehiculum. Ad emolliendum etiam materias duras, maxime probatè *casum antiquum*, decoctus cum iure è carnis suilla salta: ut lura etià sint imponenda, quale *S. Bartholomai*. Digerentia calidiora sunt emollientibus, tenuiorisque substantiæ, c. 1. l. 9. n. rōm. Efficax erit medicamentum, compositum è cera, lota in vino, siue decocto lauri: præterea è pipere, ex oleo antiquo: (quod efficacissimū est: ut quandoque cognouerim pertinacissimas materias sublatas esse, eo oleo, quod Brixie reperitur.) Probantur etià quæ, conficiuntur ex antipigmento, alumine scissili, calce viva, myrrha, ruta, lauro, abrotano, resina terebinthina, castorio, sulphure vino, iberide: licet ascendere ad sinapi, & thapsiā. Inter digerentia valida sunt, euphorbiā, succum cucumeris agrestis, utriusque veratrum, colocynthi, lac tichymalorū. Veteres etiā ad ferrum ignitum ascendebant. His non utendum, nisi post emollientia, & post exactissimam purgationem. Detineantur ad 4. aut 6. horas: ante & post prodest *usum balnearum sulphureorum*, quia sic materia illa prorsus tollitur. Laudantur etiam sulfumigia. Hæc probantur ratione materię morbificæ.

II.

Roboran-
tia partem
Exsiccā-
tie.

Ratione partis, Auicennas probat ossa humana, redacta in puluerem: nos, si non humana, saltem brutorum ossa, in insigni articulo-
rum dolore, puluerisata, exhibebimus cum antidoti: præsertim si à pituita ortus sit dolor. Probatum etiam ad partes illas roborandum, oleum mastichinum salitum, vinum austerum, vinacea, quæ modice densant.

III.

Anody-
na.

Postremo, medicamenta dolorem respicientia, sunt: oleum anethinum, scænumgræcum, cum melle, vino: ouum integrum cum vino, cum lacte chalybeato, cum furfuribus in lacte decoctis, ens vitellus, cum oleo rosaceo: semina psylli, macerata in aqua, ut euadant viscida, quæ debent misceri cum farina hordei: Licet uti succo hordeaceo, seu cremore ptisana. Virgente dolore, ubi leipothyimia imminet, ascendere licet ad succum solani, lactucam, semper vinum, & farinam hordeaceam. Tandem etiam exhibere possumus philonium, vel quid proportionem respondens, ut sunt magna antidoti, sed recentes. Opio extrinsecus interdum uti licet, si dolor est intensissimus, & intemperies calida, & natura calidior, & dolor coxendicis: sed opium esto exiguum, cum croco: verbi gratia opy ḡ ij. croci ḡ iij. cum posca, vel farina hordeacea.

Diala.

Victus ad proportionem respondere debet: alius in pituitosa materia, alius in reliquis: & pro potu, uti licet molicato.

P O S T E

POSTERIOR QVINTI
LIBRI SECTIO:
DE MORBO GALLICO.

CAPVT I.

De Nomine, Definitione, & Causis virulentia
Gallica, seu Luis Venerea.



PE LUEM VENEREAM intelligimus id quod
habet rationem causa efficientis, non autem effe-
ctus, vt febrem, &c. In humano corpore ea
primum generari nequit, sed extrinsecus
accedit, & corpus hominis ingrediens, con-
tactu id suam in substantiam mutare potest:
hinc licet ab initio exigua sit: sensum tamen, dum corpus in
suam substantiam vertit, augetur.

Lues ergo venerea, est excrementum prater naturam à toto
genere, potens multisariam ledere hominem genus ex humana
substantia, à simili.

Dicitur primo excrementum, id est, contentum excremen-
titium: ad differentiam continentis, & ad differentiam con-
tenti alimentalis: nam etiamsi interdum continens, id est, ca-
ro, vel os, &c. interdum etiam alimentum, id est, sanguis, ma-
teria fiat luis: necesse tamen est, vt tunc & continens, & con-
tentum alimentale in excrementum degeneret.

Secundo, dicitur prater naturam, id est, excrementum pro-
fus inutile, & morbificum: ad differentiam excrementi na-
turalis, seu secundum naturam.

Tertio, dicitur à toto genere, ad differentiam excrementi,
quodd quidem prater naturam est, sed non à toto genere, vt
bilis excrementitia morbifica: at materia luis venerea, cum
necessario sit purrida, patet, quod toto genere sit prater na-
turam. Porro hæc luis materia secundum Speciem potest ef-

Nomen.

Generatio.

Definitio.

Ex cremē-
tum.

Prater na-
turam.

Toto gene-
re.

Specie ex-
crementi
venerei.

se quodlibet excrementum in corpore hominis: nimirum sanguis, pituita, bilis, utraque, ichor, serum, lac, semen, sanies, dum scilicet vitia, cet in hanc virulentiam degenerant. Hoc autem excrementum in omni lue necessario præter naturam est secundum hæc 4. vitia, scilicet secundum formā, putredinē, caliditatem, lentorem. Primum enim forma luis certa sui proportionē aduersaria est humano corpori: vnde non nisi alexipharmacis deleri potest. Hinc tamen non sequitur, quod sit morbus nouus, à proprietate occulta: omnis enim morbus, aut mala dyscrasia, aut mala compositio, aut soluta vnitas: interim causa morbi noua generari potest, quæ tamen non nisi modo dicto morbos inducere potest. Materia luis etiam est putrida: nisi enim putredo adesset, non esset malum contagiosum, vt passim in problematis Aristot. testatur. Quod si vapores ab hac materia putrida eleuentur, & cor petant (quod tamen sit rarissimū, febris excitatur. Tum hæc virulentia est calida: vnde in corpore exustiones apparent: & hinc ægri dolores ac febres sentiunt, si materia sit copiosa. Hoc tamen notandū, non quod ipsa luis materia esse virulentam: dum enim sunt verbi gratia tumores duriores, vel è crassa pituita, vel è melancholia huius materia virulenta, sæpenumero beneficio medicamentorum dissipatur, remanet vero frigida, quæ non est virulenta: vnde & mor ille non amplius est Gallicus. Postremo hæc materia necessario aliquid lentioris habet: vt enim vitium fiat contagiosum, oportet validam fieri actionem & impressionem: quæ cum iusto fiat tempore, mora opus est, & lentore.

*Effectus
luis.*

*Causæ mor-
bificæ.*

Quarto, in definitione dictum est: *potens multifariam ledere hominem*. Vbi duo sunt declaranda: primum, quod duplex sit hæc læsio: deinde, quid in homine lædatur: totumne, an pars? Lues igitur venerea, producit causas morbificas, morbos, & symptomata. Quoad causas: dū hæc lues agit in corpore, producit materias morbificas, primum calefaciendo, deinde putrefaciendo, tandem mutando id quod in corpore est, in materiam virulentā. Lues enim hæc summæ est actiuitatis: eiusque actiones omnes à forma, ceu præcipuo agente, procedunt: quæ tamen forma agit mediantibus instrumentis: sic per caliditatem, calefacit: si diu actio perseueret, materia non modo redditur calidior, sed etiā corrumpitur, & ita alteratur, vt putrescat: id quod præcipue fit ratione lentoris, cuius gratia diu agens virulentia, tandem causas morbificas, toto genere præter naturā efficit. Quoad morbos: lues pro-

ducit

ducit dyscrasias, tum cōmunes, tum determinatas: cōmunes, ut febres: si enim virulentia hæc agat in spiritus, eosque feruidiores reddat (quod fieri potest) ephemerę oriuntur: si fuligines emittat putridas, ut accendātur cordis humores, sunt putridę: si caliditas impertiatur solidis, sit hectica. Hinc experientia testatur, interdum homines febre correptos, curari non potuisse, nisi beneficio alexipharmaci. Intēperiem etiam determinatam producit: si enim lues satis est feruida, inque iecore viget, calidā in hoc dyscrasiam excitat. Producit etiam morbos in mala cōpositione: ut obstructiones, tumores, veluti sunt bubones, gummata, verrucę, pustulę, &c. Bubones, sunt tumores inflammatorij circa partes adenosas inguinum: sunt sanguine, sed permixto cum lue venerea. Gummata, sunt tumores duriores, qui sunt à materia crassa, sed semper mixta cum lue venerea: & hæc si mordacitatis expers est, gummata sunt sine ulcere: si vero sit mordax, gummata sunt cum exfione & exulceratione, itemque ossis correfione. Verrucę sunt, tumores admodum duri: sunt è materia dura, exigua. Pustulę sunt è materia tenui, acris & mordaci: unde sæpe exulcerationem coniunctam habent. Sedenim lues nō modo hos in aucta magnitudine morbos producit, verū alios etiam in numero diminuto: vnde in-
im accidit casus dentium: interdū aliqua pars corporis perditur, ut nasus, &c. Denique luis vi, morbi in soluta vni-
excitantur. i. vlcera, quę tamen vna etiā morbi sunt in magnitudine imminuta. Si vlcus occupat penem, vocant cariein: si pedes, manus, & partes ani, vocant rhagades: in reliquis partibus, simpliciter dicūtur vlcera. Symptomata à lue plurima producantur: potissimum dolores, qui varias corporis partes occupant: tinnitus aurium admodū rebellis: gonorrhœa, cum lues agit in vasa seminaria: depilatio, seu glabrities, cum lues petit pilorum radices, id est, quādo lues permiscetur fuligini, à qua fouentur & generantur pili.

Sympto-
mata,

Hæc de effectis luis. Sequitur ut tradamus, quidnam in hominē à lue venerea ledatur: totumne an pars? Dicimus ergo subiectum effectus ipsius virulentię, posse esse & Totum, & quamlibet corporis Partem. Nam febris, quę luis est affectus, totius corporis vitium est, vnde & cordis: hæc enim lues summę est actiuitatis, & contraria non vni parti, sed omnibus & toti humanę naturę: non solum facultati naturali, ut quidam nugantur. Subiectum vero non effectus luis, sed ipsius virulentię, in quo propria luis substan-

De sede
luis Vene-
reæ.

substantiam, ceu in fomite, & principali domicilio reperitur; potest esse pars multiplex: frequentius tamen iecur affici solet, quia hoc malum plerumque oritur ob Veneris vsum, in quo, ratione motus & caloris, pori illius partis recluduntur, vt lues promptum habeat in iecur transitum. Sed hoc non est perpetuum: lues enim etiam aliam corporis partem petere potest (*omne enim agens, in passum proximum agit*) vnde interdum cerebrum patitur, dum capitis oboriuntur dolores, dum item facultas animalis, & principalis, & non principalis languet: interdum afficitur ventriculus, vel lien: possunt etiam reliquæ corporis partes esse putridæ, præter solum cor; ob calorem, densitatem, & robur, nequaquam præcipua luis sedes esse potest.

Causa effi.

Quinto, in definitione dictum est: *genitum ex humana substantia*. Materia enim è qua, est substantia hominis: per quam & contenta, & contiaentia intelliguntur (*Spiritus in lue Gallica excluduntur: quia possunt pati & alterari non autem putrescere: vt c. 39. lib. 6. de febribus, demonstrauimus.*) Contenta sunt succi corporis, tum alimentales, tum excrementitij, vt ichor, serum, lac, semen, &c. Continetia, sunt partes tum sanguineæ, vt carnosæ, pingues, adiposæ: tum spermaticæ, vt ossa, &c.

Postremo, in definitione dictum est: *genitum à simili*, id est à lue venerea; quæ in partem vicinam, quam tangit, alterando agit: vt colligitur è cap. 99. art. med. Hæc ergo lues quæ rationem habet efficientis, extrinsecus accedit: non enim hæc sponte in corpore humano generari potest, vt venenû: (*nil facit ad curationem; si quis immodicâ diligentia, primum luis auctorem, inquirere velit: idem enim esset, ac si quis querere vellet, ouumne prius sit genitum, an galinæ.*) De modis igitur, quibus hæc virulentia hominis accidit, plenius disseramus. Homo nondum infectus, luem accipit, vel In vtero, vel Extra vterum. In vtero, dupliciter: vel è Semine parentum infectorum, maxime si laborent gonorrhœa Gallica: hoc enim semen degenerat in calidum innatum pessimum, vnde lues summe maligna: vel ex Alimento, vt si mater lue sit infecta, vel post conceptum inficiatur, sic enim sanguinem, lue infectû, foetui subministrat. Quod si homo suscipiat virulentiam extra vterum: suscipit Per cōcubitum, vel Citra. E concubitu accidit vt plurimum: eo enim pori aperiuntur, partes incalescunt, & virulentia illa facile in vaporem vertitur, qui corporis partes ingreditur. Citra concubitum etiam fit: vt si puer

puer lac sugat, è nutrice infecta: item, si puer infectus lac sugat è nutrice non infecta, eo contactu nutricem potest inficere: sic & per osculum hoc potest contingere, vnde scæmina scæminam inficere potest: per linteamina etiam sudore venereo, vel sanie infecta, lues conferri potest, si quis in iis dormiat: non enim hoc est impossibile.


CAPVT II.

De differentiis.

Vtlibet lues, homini contraria est secundum formam: alia tamen Magis, alia Minus. Interdum maius est vitium secundum formam, quam secundum caliditatem, interdum contra: præterea, interdum est minus vitium secundum putredinem, quam secundum caliditatem: interdum est intensius vitium secundum lentorem, quam secundum alias qualitates. Differentia ab effectis: lues potest producere, vel Causas, vel Morbos, vel Symptomata. Causas producit, vel solum Alterando, vel etiam Corruptendo. Morbus, est Intemperies, Mala compositio, vel Soluta vnitas. Symptoma est, vel actio iuxta, vel Exiens mutatum, vel Qualitas mutata. Ratio subiecti, afficitur vel Totum, vt in febribus: vel Pars, vt in reliquis vitiis, potissimum tamen hepar. Materia è qua, est Contentum, vel Continens. Causa efficiens consideratur vel penes Substantiam & essentiam, vel penes Originem: quantum ad essentiam, est differentia secundum Magis & Minus, alia efficacior, alia, &c. Quoad originem, extrinsecus accedit, idque vel In vtero, vel Extra vterum.

Differentia.

CAPVT III.

De Signis.

Ignis luis, alia sunt Generalia, alia Specialia. Generalia, indicant luem vel Manifestā, vel in corpore Latitantem. Si manifeste agat lues: indicatur ex effectis, quæ sunt Symptomata, & Morbi. Symptomata sunt dolor pruriginosus, ob luis acrimoniam: præterea dolor ulcerosus (pruriginosus) & stellas magis ad partes

Signa generalia luis iam in corpore agentis.

partes extimas : ulcerosus ad intimas : cum enim materia lues sit viscida & lenta, non ita fluxilis : plurima eius portio in partibus intimis detinetur, & dolorem ulcerosum facit. Indicatur etiam è dolore, qui potissimum circa vesperam cruciari incipit : hæc enim est hora, in qua moveri incipit materia melancholica, quæ sæpenumero in lue Venerea adest, cum sit materia putrida, calida, & exusta : per noctem ergo dolor intenditur, quia humor exustus non ita facile tum diffiatur, ob frigus noctis, porosque clausos : ob Lunæ etiam, quæ humoribus dominatur, operationem : tum quod natura quietior materiam tunc digerere nititur, ut Auenennas docet cap. 4. tract. 1. fen. 2. lib. 4. Potest vero & alius humor cum lue interdum permixtus esse, qui de die magis affligat. Sæpe magis cruciantur partes intermediae : nam lues proprius agit in partes carnosas, in musculos, quàm in tendines, in ligamēta, inque partes ad articulos spectantes. Indicatur etiā è gonorrhœa, non tamen qualibet, nam quædam gonorrhœa, citra luem Gallicam curari potest : sed satis fortēte, quia lues est putrida : color ipsius vergit ad liuiditatem, interdum ad nigredinem : nam lues est materia exusta : non est cum tolerantia ægrotantis : materia enim seminalis, quæ partium spermaticarum alimentum esse debebat, ob prauitatem egreditur : contra gonorrhœa è copioso semine orta, sit cum tolerantia : maximeque lues indicatur, si gonorrhœam non præcessit coitus immoderatus, quem alias citra luis suspicionem gonorrhœa sequi potest. Indicatur etiam è casu pilorum, siue congenitorum, siue postgenitorum, siue omnium : lues enim sua malignitate & acrimonia pilorum radices abradit ; permixtaque fuliginibus, è quibus pili generantur, facit ut hæc nequaquam idoneum sint pilorum alimentum.

Indicatur præterea è febre, quæ solet circa vesperam exacerbari : causa è dictis patet. Indicatur è tumoribus, bubonibus, &c. e casu dentium : præsertim si non fuerit prægressum venenum, quod potuerit gingiuas abradere. Indicatur è carie, e scissuris in manibus, e pedibus, & circa anum. Præterea è prægressis causis : verbi gratia, si prægressus sit coitus, siue alię causæ, de quibus supra. Indicatur etiam è iuuantibus : quando vitium, siue sit febris, siue aliud, non cedit nisi alexipharmacis.

Quod si lues, in corpore latitans : annos enim aliquos nonnunquam

Signa generantur, non nisi gallici latetis.

numquam delinescis: ob exiguam copiam non agat: cognosci debet, & Ante curationem, & Post curationem. Ante curationem, prudens medicus obseruabit, num caries ilico sit orta post coitum, necne. Quibusdam enim qui mane vtuntur venere, circa vesperam caries erumpit: & tunc conii-ciendum est, luem adhæsisse peni in coitu, & hunc exulce-rasse, non autem penetrasse in corpus: & hi non sunt cru-ciandi decocto guaiaci. Quidam vero non ilico post coitum corripuntur carie, sed demum post triginta vel quadraginta dies, & tunc statuendum est in corpore latitare luem, & è coitu vapores in iecur, inque partes intimas penetrasse: de-inde post aliquot dies, luem transmissam esse ad penem, & vlculcula excitasse. Post curationem etiam cognoscendum est, num lues è toto sit victa, necne. Indicatur autem lati-rare adhuc virulentia, si caries quidem curata est, sed cum difficultate: idque magis, si post vlceris curationem rema-neat aliquis tumor, & durities. Præterea si gonorrhœa sit, citra immoderatum coitum: signum est, vasa imbecillia es-sesse facta, non ob nimium coitum, sed potius ob maligni-tatem materiæ venereæ. Insuper lues post curationem re-licta esse cognoscitur, si effecta, hoc est, morbi & sympto-mata non prorsus abolentur: item, si homo post concubi-tum, etiam si coitu vtatur summa cum prudentia, vlcera ta-men in pene accipiat: signum enim est relictæ luis. Idem cognoscitur, si cura non fuit diligens, & si breuis: verbi gra-tia, per 15. dies. &c.

*Num lues
è toto sit
curata.*

Sequuntur iam signa specialia differentiarum. Differen-tiæ formales sumuntur ab excremento lædente secundum magis & minus, penes formam, quantitatem, putredinem, caliditatem, lentorem: quæ omnes differentiæ cognoscen-dæ sunt. Quoad formam: cognoscendum an sit summæ actiuitatis, necne? Summæ autem est actiuitatis, si patiens infelix vnico tantum congressu infectionem est lucratus: item, si citra coitum: præterea, si cito incipit lædere: sic enim noui quosdam, qui post mensem à contracta lue, sym-ptomatis fuere afflicti læuissimis: summæ etiam actiuita-tis signum est, si non adest tolerantia. Exigua actiuitas con-trariis arguitur. Quoad vitium secundum quantitatem: co-gnoscitur lues vehemens, si totū corpus, pluresve eius par-tes occuparit: contra, si pauciores. Quoad putredinem: insi-gnis putredo cognoscitur è gonorrhœa admodum fœtente, ex vlce

*Signa spe-
cialia.*

Forma.

ex vlceribus foetentibus, è putrida febre. Caliditas valde vehemens cognoscitur, à doloribus acerbis, ex ardore in gonorrhœa, è pruritu, è feruore in locis affectis, siue sint vlcera, siue alia vitia. Lentor vehementior iudicatur, pro symptomatum perseverantia: licet enim symptomata sint exigua, difficulter tamen cedunt, ratione lentoris.

Effectorii.

Differentiæ ab effectis, num scilicet lues excitavit morbos, an symptomata: & quales sint morbi, qualiave symptomata: cognoscuntur è propriis signis: verbi gratia, si sit febris, cognoscitur è signis febris: si bubo, è signis bubonis, &c.

Subiecti.

Differentiæ à subiecto. Subiectum, vel affectui luis, vel ipsi lue subiicitur. Effectui subiicitur totum corpus, aut pars corporis. Totum subijci effectui, cognoscitur è febre, eque macie totius: partem vero è vitis determinatis, vt, si gonorrhœa asit, cognoscitur locus affectus. Subiectum ipsius virulentiae, est pars interna vel externa. Externa, oculis conspicitur. Interna potest esse ventriculus, iecur, lien, cerebrum, & in foeminis vterus. Si est ventriculus: lues forsitan ex osculo infectæ excitata est, præsertim si ilico homo bibit, vel comedit: tunc etiam vitia luis è chylo potissimum emanant: & querela est de læsa *χλῶσι*, circa ventriculum. Iecur luis fomes esse cognoscitur, si malum originem duxit è coitu: si bubo sit circa inguen dextrum: si etiam reliqua symptomata magis pertinent ad dextram partem: potissimum si sanguificatio læsa est: *que tunc leditur, non læsa facultate, sed ob errorem externum, id est, ob præsentiam luis: quamvis interdum etiam possit coniungi morbus iecinoris: sed hoc extra propositum.* Si lien sit fomes, cognoscitur è lienis tumore, è bubone in inguine sinistro, reliqua etiam symptomata sinistram partem magis vexant: præterea indicatur è mali contumacia: si enim lien male habet, non potest expurgari excrementum melancholicum: quod vbi lue inficitur, æger rime extirpari potest. Si cerebrum luis est domicilium (quod ego aliquando obseruavi) malum incipit è pannis infectis applicatis capiti: præterea cognoscitur è dolore, & reliquis noxis, quæ primum occupant caput: hinc è doloribus articularibus, dum potissimum hi dolores à capite procedunt lue affecto. Vterus denique fomes luis esse cognoscitur è suppreßis mensibus, vel etiam nimium fluentibus post coitum, è gonorrhœa, ex vteri doloribus, è molestia circa mammæ, quæ

quæ vtero consentiunt, è carie circa pudenda.

Differentiæ à materia è qua. Hæc materia est Contētum, *Signa differentiæ.*
 vel Continens. Si est contentum alimentale: cognoscitur è *à materia*
 difficili tolerantia, quia corpus non nutritur, cum alimen-
 tum sit infectum: si autem sit excrementitium, non ita dif-
 ficilis est tolerantia: quæ autem sint excrementa, id est, num
 sint biliosa, pituitosa, vel melancholica: cognoscitur è pro-
 priis signis: verbi gratia, si sit materia melancholica, signa
 aderunt dominantis melancholiæ, & malum erit contuma-
 cissimum. Quoad continentia, num sit pars carnosæ, an pin-
 guis, an seminalis, vt ossa: facile cognoscitur.

Quoad causam efficientem: cognoscendum est, an lues *Signa cau-
 sa efficien-
 tis.*
 originem duxerit vel in vtero, vel extra vterum: quod è rela-
 tione assidentium & patientis facile cognoscitur. Si enim
 infans verbi gratia, in lucem editus, corripitur hac lue, nec
 aliquid extrinsecus contigerit: tunc sane in vtero contracta
 erit lues. Num vero orta sit è semine, an vero post conce-
 ptionem ex alimento matris: facile sciri potest: nam si pa-
 rentes fuerunt infecti lue venerea, è semine malum est con-
 tractum. Si extra vterum: facile cognoscitur, an per coitum,
 an causa lactis, an causa nutricis, an per pannos: è relatione
 assidentium & ægrotorum.

CAPVT IIII.

De præsidiis.



Tiam si lues aliqua è parte experientia, & sine *Indicatio-
 nes.*
 methodo curatur, plurimum tamen per indica-
 tiones, & methodum amouetur. Præsidia ergo
 desumenda sunt è luis essentia, nimirum ab ex-
 cremento, à læsione, ab homine: non à causa efficiente, quæ
 externa est: nec à materia è qua: si enim hæc iam in luem
 mutata est, sufficit indicationes sumere à lue genita, id est, ab
 excremento venereo: si vero in luem nondum est conuersa,
 huic occurrimus, dum tori providemus: verbi gratia, si fiat
 ex humore, humor est euacuandus. Sufficit ergo à tribus, in
 definitione propositis, petere indicationes. Quoad excre-
 mentum: quatenus toto genere est præter naturam, indicat
 remedium eradicans, id est, prorsus euacuans: c. 6. li. 13. meth. *I. Ab ex-
 cremento.*
 Quatenus autem obtinet proportionē, quæ est domicilium
 formæ contrariæ, indicat alexipharmacum. Ratione putre-

- his: si excrementum hoc putrefactum est, ea quoq; de cau-
sa toto genere est præter naturam, & eradicans indicat: si
vero tum demum putrescit, indicat refrigerans & siccas:
nam calor extraneus, & humiditas, causæ sunt putredinis.
Ratione caliditatis, indicat frigidum. Quatenus lentum ex-
crementum, indicat detergens. Hæc sunt vitia, quæ necessa-
rio insunt excremento. Interdum vero euenit, vt excremen-
tum hoc sit crassum: vnde attenuans indicat: interdum est
durum, vt in lue melancholica contingere potest: tunc indi-
cat emolliēs. Quoad læsiones: variae indicationes sumi pos-
sunt, pro varia læsione: de quibus in proprijs capitibus: verbi
gratia, si læsis fuerit febris: oriuntur indicationes febriles,
&c. quas in curatione harum læsonum non negligemus.
3. *Ab ho-* Quoad hominem, indicationes sunt sumendæ, vt homo se-
nib. cundum varias partes est sedes luis venereæ: interdum scilicet
secundum ventriculū, quandoque secundum iecur, lie-
nem, cerebrum, vterum. Horum igitur viscerum calidum
innatum, ratione crasseos, indicat calidum: ratione substan-
tiæ, indicat alimentum. Proportio horum viscerum, requirit
simile: vt hepar hepaticum, &c. Totum autem corpus huma-
num, ratione virtutis indicat alimentum. Cæterum, cum nō
possimus occurrere, vel virulentæ, vel læsioni, vel homini,
siue secundum totum, siue secundum partem, nisi toti sit
prospectum: ideo toti occurrimus, idque varie, pro varia to-
tius constitutione: dum enim corpora sunt impura, nec ale-
xipharmacis, nec topicis, nec alimentis occurrendum.

CAPVT V.

De presagiis.

Prognosti-

ca.

Doctrina prædictionum dependet à vi Rerū præ-
ter naturam, & à virtute. Quoad res præter na-
turam: considerare oportet vehementiam & luis,
& symptomatum. Quoad luem, sat est, si digre-
diamur circa vehementiam luis genitæ, non generantis: luis
enim generans, est signum vehementiæ luis genitæ: vt si
quis accipiat luem à vehementer infecta: tunc affectio vhe-
mens in foemina, est signum vehementiæ luis genitæ in ho-
mine. Quantum ergo ad vehementiam, ratione dignitatis:
hæc desumitur à nobilitate partium: minor enim est vhe-
mentia, si luis obsideat lienem, intensior si ventriculū,
adhuc

adhuc intensior si iecur, adhuc magis, si cerebrum: & in for-
 minis intensior est, si vterum, quam si lienem detineat. Ve-
 hementia ratione essentia maior est. prout luis forma est
 maioris actiuitatis (quod vt cognoscatur, docuimus) item,
 prout lues magis est putrida, calida, lenta, crassa, duratitem, si
 excrementum prodiit à materia melancholica, vel à mate-
 ria alimentali: in hac enim maior est recessus à naturali sta-
 tu. Vehementia facultatis locum habet, si lues adeo sit in-
 tensa, vt oboriantur conuulsiones, leiporhymia, pulsuum
 infirmitas, syncope, & proinde difficilis tolerantia: hoc po-
 tissimum fit, si virulentia sit alimentalis, & si partes sint ex-
 quisi sensus. Quoad luis effectum singulis triplicem hanc
 vehementiam cōsiderare oportet, siue sint morbi, siue sym-
 ptomata: vt febris, dyscrasia iecoris calida, obstructio, tumo-
 res, casus dentium, vlcera: verbi gratia, si in lue sit vlcus pul-
 monis, suprema est vehementia ratione dignitatis, &c. Quan-
 tum ad virtutem: bene sperandum, si ea est robusta, id est, si
 corpus est boni temperamenti, boni habitus, in florente æta-
 te, & facile sustinere potest præsidiorum materias: contra,
 si virtus debilis.

CAPVT VI.

De parte curationis cheirurgica.

N curatione luis curabilis, primum dicendum de *τὰ χεῖρουργ*
 materia cheirurgica, ratione totius. Probatum er- *γυνά.*
 go venæ sectio, si sanguis habet rationē, vel cau- *Phleboto-*
 sã principalis, vel causã sine qua non. Causã *miã.*
 principalis rationem habet: dum lues generatur è sanguine:
 dum præterea corpus lue affectum, morbo sanguineo, vt
 inflammatione laborat. Rationem habet causã sine qua non:
 si hæc & reliqua mala, non sint orta è sanguine, sed ex alia
 materia. *vsu.* Ea autem copia sanguinis detrahenda est, quæ
 peccat: & conferim, si vires permittant: citissime enim lues
 extirpanda, & proinde si sanguis hoc impediat, sane con-
 fertim est euacuandus, dummodo vires non prohibeant:
 vel etiam ipsa lues, inguina petens. Nam experientia com-
 probatum est, interdum per bubones supputatos & apertos,
 luem è toto esse extirpatam, vt non opus fuerit alia medi-
 catione. Morus ergo luis ad inguina, prohibet venæ sectio-
 nem. Hinc medicus prudens, si inguina videt intumescere,

nullam euacuationem molietur: sed obseruabit, num tumor ad maturationem deueniat, necne. Si producitur ad maturationem beneficio vel naturæ, vel medicamentorum, de quibus suo loco: permittendum est, vt locus aperiatur. Quod si è loco aperto sanies egrediatur: summa prudentia medicus animaduertet, num hæc vacuatio per inguina, sit futura sufficiens, necne. Sufficiente cognosceret: si malum sit recens, si non coniuncta alia symptomata, si copiosa effluat materia. Quod si ex oppositis iudicetur vacuationem per inguina nõ sufficere: eodem tempore vena secanda est: nec enim lues tunc prohibet. Ne tamen materiæ impetus tollatur: id animaduertendum, vt varix secentur venæ pro varia subsistentia. Si enim subsistentia fuerit in capite: secanda est cephalica, modo dextra, modo sinistra, prout affectio dextram, vel sinistram partem occupare videbitur. Si in ventriculo, aut iecore: basilica dextri lateris aperienda: si in liene: basilica lateris sinistri: si in vtero: saphena tundenda. Quod si bubo sit præsens: si adest spes suppurationis, infimas venas secare oportet: si spes suppurationis nulla restet, respiciendum est ad subsistentiam circa iecur, & basilica dextra secanda.

Cauteria.

Quoad Fonticulos, ratione totius: si lues sit contumax, nec medicamentis cedat: non improbatur vsus fonticulorũ, quo lues perpetuo euacuetur. De loco: si fomes fuerit caput: excitentur vlcera in brachijs: si iecur, ventriculus, lien, vterus: in cruribus.

CAPVT VII.

De medicamentis communibus, ratione totius.

*in Capita
xv. l. x. a:
primum re
spicientia
TOTVM.
Lenientia.*



Ateria medicinalis, respicit vel Totum, vel Luis virulentiam vel Effectus, id est, morbos & symptomata. Medicamenta quæ respiciunt totum, sunt Lenientia, Præparantia & Purgantia. Roborantia hic non habent locum: quia hæc respiciunt fomitem, & locum determinatum. Lenientia debent esse varia, prout varia est superfluitas. Si ergo lues est calidior & biliosa: caueodum ab hiera: contra si lues sit pituitosa, si ventriculus, & primi ductus pituita repleti, licet vti *specibus hiera*.

*Præparan-
tia.*

Præparantia quoque variant, pro varietate materiæ præparandæ: hæc tamen simul respicere debent vitia luis, secundum

dura formam, putredinem, caliditatem, lentorem, & interdum etiam duritiem: præstat enim eodem tempore ad exitum præparare materias, & virulentas, & non virulentas. Sic ergo propter formam luis, si materia præparanda sit calida: cum syrupis misceri possunt, *acetosa: vel acidum citri, vel quinquefolium, vel capillus Veneris, vel sonchus*: si materia sit frigida: potius miscenda sunt, *melissa, cortex citri, sem. citri*. Propter luis putredinem permisceri possunt, *acetosa, acidum citri, acetum, adiantum*: & hæc potissimum, si materia præparanda fuerit calida: quod si non sit insigniter calida: siccis licet occurrere, etiam si non sint frigida, ut est *agrimonia, ceterach*. Propter caliditatem virulentia, permiscere oportet *cichoracea*: quod si adhuc sit calidior, permiscere licet *viola*: si adhuc intensior calor, *Lactucam & nymphaam* miscebimus. Ratione lentoris, permiscendum est *hordenum, oxymeli simplex*: si viscidior materia, licet ascendere ad *oxymeli compositum, ad hyssopum, præbium*. Hæc cum vim habeant attenuandi, etiam materiae crassiori occurrunt. Si materia sit dura: permisceri debent, quæ conficiuntur è pomis, *boragine, buglosso, liquiritia, althæa, malua*. Ex his variae remediorum formulæ præscribi possunt: verbi gratia, si materia calidior sit præparanda, & annexa sit luis durities. *R. Syr. de succo acetosa, acetosi simpl. de liquiritia, ana ʒ ij. aquæ hordeacea, alterata cum acetosa, endiuia, boragina, & althæa ʒ viij. v. vel vj.* Hic decocti quantitas multum superat quantitatem syruporum, quia materia præparanda est calida: ideoque dulcia, quæ facile bitescunt & calorem concipiunt, parce miscemus.

Purgantia varia esse debent, pro diuersitate succi purgandi. Quoniam ergo in lue venerea, ob caliditatem, & exustionem, potissimum vigent succi atrii: maxime probantur medicamenta, confecta è *polypodio, epithymo, helleboro nigro*: unde practici commodè pilulas cocticias cum helleboro exhibent. Notandum autem in lue opus esse purgatione diligenti & exacta: cum enim lues hæc per omnes regiones euacuetur: maxime, in vaporem versa, per poros cutis: sane humores in corpore existentes, & hanc luis vacationem impediētes, diligenter sunt educendi. Bene ergo faciunt illi practici, qui etiam syrupis compositis vtuntur, & repetita purgatione: laudantur etiam illi, qui singulis decem diebus, dum patiens decocto vritur, purgantia exhibent. Syrupi compositi hæc potest esse formula: *R. Syr. de fumar. cōpos. de polypodio ana ʒ j β. decocti*

boraginis, herdei, endiu, & iij. Mijc. pro Symplo. Si desideretur syr. comp. magis efficax: addantur decocto, sena & y. Hi autem syr. p̄comp̄siti, exhibendi sunt post primam purgationem, id est inter primam & vltimam purgationem, vt sit interval- lum 3. aut 10. dierum, Exhibeantur diebus alternis interme- diis vero diebus, propter caliditatem purgantium & luis, po- teritis exhibere decocta à refrigerantibus, e cichoraceis, & si- milibus. Si enim corpus ægre ferat medicamenta calida, ex- pediat alternis diebus vti ferro lactis. Præterea eod̄ die quo pur- gans sumitur, decoctum ligni intermittendum est: ne natu- ra eodem tempore diuersis motibus affigatur.

CAPV. T. VIII.

De medicamentis Gallico morbo propriis: tum Al-
terantibus, tum Vacuantibus: & primo
de eorum viribus.

Medicamē
ta respiciē
tia Luem.
Alterantia
& vacuā-
tia.

Dictum hætenus est de medicamentis totū respi-
cientibus: sequuntur ea quæ respiciunt luem: &
hæc sunt Alterantia, aut Vacuantia. Alterantia,
alterant qualitate Recondita, vel Euidente. Si re-
condita: respiciunt luis peccatum secundum formam: si eu-
dente: aduersantur lui, vt peccat secundum patredinem, cali-
ditatem, lentorem, & quandoque duritiam. Vacuantia, va-
cuant, vel impellendo expultricem, vel roborando expultri-
cem, vel attrahendo, idque aut ratione coloris, aut ratione si-
militudinis. Quæ attrahant ratione similitudinis, inimica
sunt homini, & amica lui: ideoque us non est vtendum, nisi
summa sit necessitas: potius autem reliquis vtendum. Potro
materie alterantes & vacuantes, sunt: guaiacum, sulfas, china,
sessifera, hydragregum & antimonium.

Guaiacū.

Guaiacum, secundum formam simile est naturæ humanæ:
est simile facultati alteratrici, facitque vt hæc melius agat in
materiis moribundis: simile etiam est facultati expultrici.
Calidum & fixum est in gradu secundo: tenue est, ita tamē,
vt certum particeps sit alicuius crassitiei, ad differentiam sal-
setis etiam pingue, acre, & hēt odoratum. Ex his faculta-
tes guaiaci facile colligi possunt: quia enim formam habet
naturæ humanæ similem, sua alteratione ita roborat altera-
tricem (non enim luem alterat) vt alteratrix robusta reddi-
ta, adimat luis actum secundum vt licet non euacuetur luis,

opera

operari tamen nequeat: sicut & adamas magneti actum secundum adimit. Præterea guaiacum per formam suam; ita roborat expultricem, vt luem expellat (guaiacum non expellit.) Tum guaiacum propter calorem, habet vim resoluendi, & imminuendi luem: per siccitatem corrigit putredinem: per tenuitatem attenuat: per amaritudinem emollit, quoniam etiam nutrit; per amaritudinem abstergit: per acrimoniam irritat expultricem: per suauem odorem, spiritus reficit. Notandum autem corticem esse sicciores, & magis conferre quam lignum, si lues est vehementioris putredinis: in reliquis lignum est anteponeudum cortici.

Salsa parilla secundum formam similis est naturæ humanæ: in qualitatibus actiuis est temperata, nequaquam calida: quia nec salia est, nec amara, nec odorata, & quod magis, nec dulcis: vt hinc pateat, si à temperie recedat, potius ad frigidum vergere: sicca autem est in fine secundi, id est, in tertio secundi gradus mansione: nam euidentissime siccatur, vt ad tertium pene gradum accedere videatur. Præterea est medicamentum tenuissimum, & quidem ita tenue, vt nullius astringtionis sit participes, ad differentiam guaiaci: habet enim omnes partes tenuissimas & vniiformes. Caret pinguedine, amaritudine, acrimonia: odoris etiam expers est. Ex his facultates salis colligi possunt: Secundum formam, salia postponenda est guaiaco: licet enim forma vtriusque similis sit naturæ humanæ: guaiaci tamen forma maioris est actiuitatis: & facultatem naturalem magis roborat. Quoad temperiem, salia in qualitatibus actiuis magis est efficax, & magis luis caliditatem castigat, quam guaiacum: imo guaiaci calor, potius auget calorem luis. Ratione siccitatis, salia magis iuuat, quam guaiacum, quia magis corrigit luis putredinem, est enim siccior. Salia etiam propter tenuitatem guaiaco est anteponeuda: citius enim luem penetrat, vt sit vehiculum ligni: vnde quidam recte in doloribus Gallicis intensioribus, potius occurrunt salia, quam guaiaco. Quatenus autem expers est astringtionis: nocet calido ventriculi innato, videlicet dissipando: vnde quidam nugantur saliam inimicam esse ventriculo ratione formæ. Quatenus caret pinguedine: non emollit, nec nutrit. Prout caret amaritudine & acrimonia: nec abstergit, nec irritat expultricem: vt & sic guaiaco sit postponenda. Postremo cum sit citra odorem: spiritus non recreat.

China. China secundum formam similis est naturæ humanæ, quamuis sit postponenda guaiaco. In actiuis qualitatibus est temperata, quia nec salsa, nec amara, nec acris, subobscura tamen dulcedine donata videtur, quæ cum salsa careat, sit vt minus ad frigidum vergat china, quam salsa. Sicca est in primo: vnde corpora emaciata eam melius ferunt. Tenuis est: ita tamen vt etiam alicuius densitatis sit particeps, ad differentiam salis. Est pinguis (dum bona est) citra amaritudinem, acrimoniam & odorem. Hinc ratione formæ, guaiacum est valentius alexipharmacum, quam china: salsa tamen & china, æquales esse videntur. China per intemperiem in actiuis qualitatibus, corrigit luis caliditatem: minus tamen quam salsa. Per siccitatem corrigit luis putredinem: sed minus quam guaiacum, minus etiam quam salsa. Propter consistentiam minus penetrat, quam salsa: quæ tenuitate vincit reliqua omnia. Per pinguedinem magis emollit, & magis nutrit: vt hac ratione omnibus reliquis alexipharmacis anteponatur. Quatenus amaritudine, acrimonia & odore caret: postponenda est ligno.

Sassafras. Sassafras, secundum formam, est medicamentum simile naturæ humanæ: calidum & siccum in fine secundi, tenue, non pingue, leuiter amarum, acrius ligno, & ligno etiam odoratius. Minus ergo roborat facultatem naturalem, quam guaiacum: quia ratione formæ amicum est naturæ humanæ: non tamen ita vt guaiacum. Par caliditatem resoluunt: sed nocet augendo calorem luis. Per siccitatem strenue corrigit putredinem. Per tenuitatem attenuat, & penetrat. Cum autem pinguedine careat, non alit, nec emollit. Per amaritudinem detergit, sed minus quam guaiacum. Per acrimoniam irritat expultricem. Per odorem, spiritus reficit. Ratione ergo siccitatis & odoris, ligno anteponitur.

Hydrargyrum. Hydrargyrum venenum est, & secundum formam humanæ naturæ aduersatur. Secundum temperiem frigidum est, non siccum. Id imprimis explicandum, quæ ratione luem venenissimam effe-
fractio est ream euacuet. Non id facit per modum attractionis: licet
prædictis enim applicetur & iungatur cruribus: per os tamen sit euacuatio. Statuendum ergo quod fiat per modum impulsio-
Sapo autem (non enim datur tertium.) Expultricem ergo partium facul-
virtus non tatem, hydrargyro vel roborari, vel irritari necesse est: hy-
admittit. drargyrum autem quia venenum est, non roborat, sed irritat: similia roborant, vt guaiacum, &c. Si ergo hydrargyrum & facul

facultati expultrici infensum est, & potissimum nervosis partibus, propter temperamentum frigidum, quo facultas ipsius, seu instrumento, calidum innatum exiguum nervorum, facile oppugnare potest. Hinc practici in malis nervorum, non vtuntur hydrargyro ad luem Veneris expugnandum. Hinc etiam omnes artifices, qui hydrargyrum tractant, licet natura robusti sint, necessario tamen secundum nervos afficiuntur, & vt plurimum post 3. vel 4. annos, tremoribus, & aliis nervorum noxis corripuntur. Cum ergo hydrargyrum, expultrici potissimum nervorum maxime sit infensum, nervique à cerebro ducāt originem: sit vt hydrargyrum sua forma, mediante frigiditate, ita agat in nervos, vt cerebrum compatiatur. Vi scilicet frigiditatis hydrargyri, lues ad caput sursum impellitur, per modum repercussionis: & dum sic perducitur in caput, non in substantiam cerebri: cerebrum, ob suum robur, non permittit suscipi frigidum: vnde expultrix cerebri (quæ sanitatis tempore cerebri excrementa crassa per os euacuat) valde irritata surgit, & non sensim, sed magno impetu, materiam ad fauces, ad venas linguæ, & ad gingivas propellit, vt per os excernatur: vnde etiam tumor illarum partium sequitur.

Antimonium vehementer purgat, per vomitum & feces. *Stribium.*
sum: sed quantum ego experientia colligere potui, rarissime luem superat. Vt, mea sententia, ab eius usu in lue prorsus sit desistendum.

CAPVT IX.

De usu guaiaci:

RERRO edocendum videtur, quomodo & Guaiacum, & Hydrargyrum vsurpari debeant. De Guaiaco quinque dicenda: primum, quomodo cū reliquis medicamentis miscendum: secundo, quæ debeat esse quantitas: tertio, quis modus: quarto, quando hoc medicamentum sit exhibendum: quinto, vbi administrandum. Quæ ergo cum ligno permiscantur, vel sunt Adiuuantia, quæ faciunt, vt guaiacum cito vincet luem: vel Corrigentia, quæ faciunt, vt tuto & cum iucunditate vincat. Adiuuantia, sunt Alexipharmaca, vel Non sunt: & vtraque respiciunt aut Luē, aut Subiectū luis. In lue, varia sunt vitia. Formæ luis, ita aduersatur ligni forma, vt ad roborādum simpliciter ex-

usus prædictor. medicamentorum.

I.

Quæ cum ligno sint permiscenda.

Adiuuantia alexipharmaca.

I. Ratione luit.

China.

China secundum formam similiſt naturæ humanæ, quamuis ſit poſtponenda guaiaco. In actiuis qualitatibus eſt temperata, quia nec ſalfa, nec amara, nec acris, ſubobſcura tamen dulcedine donata videtur, quæ cum ſalfa careat, ſit vt minus ad frigidum vergat china, quam ſalfa. Sicca eſt in primis: vnde corpora emaciata eam melius ferunt. Tenuis eſt: ita tamen vt etiam alicuius denſitatis ſit particeps, ad differentiam ſalfæ. Eſt pinguis (dum bona eſt) citra amaritudinem, acrimoniam & odorem. Hinc ratione formæ, guaiacum eſt valentius alexipharmacum, quam china: ſalfa tamen & china, æquales eſſe videntur. China per intemperiem in actiuis qualitatibus, corrigit luis caliditatem: minus tamen quam ſalfa. Per ſiccitatem corrigit luis putredinem: ſed minus quam guaiacum, minus etiam quam ſalfa. Propter conſiſtentiam minus penetrat, quam ſalfa: quæ tenuitate vincit reliqua omnia. Per pinguedinem magis emollit, & magis nutrit: vt hac ratione omnibus reliquis alexipharmacis anteponatur. Quatenus amaritudine, acrimonia & odore caret: poſtponenda eſt ligno.

Saffaſras.

Saffaſras, ſecundum formam, eſt medicamentum ſimile naturæ humanæ: calidum & ſiccum in fine ſecundi, tenue, non pingue. Leuiter amarum, acrius ligno, & ligno etiam odoratiſſimum. Minus ergo roborat facultatem naturalem, quam guaiacum: quia ratione formæ amicum eſt naturæ humanæ: non tamen ita vt guaiacum. Par caliditatem reſoluit: ſed nocet augendo calorem luis. Per ſiccitatem ſtrenue corrigit putredinem. Per tenuitatem attenuat, & penetrat. Cum autem pinguedine careat, non alit, nec emollit. Per amaritudinem detergit, ſed minus quam guaiacum. Per acrimoniam irritat expulſtricem. Per odorem, ſpiritus reſcit. Ratione ergo ſiccitatis & odoris, ligno anteponitur.

Hydrargy-

Hydrargyrum venenum eſt, & ſecundum formam humanæ naturæ ad lue naturæ aduerſatur. Secundum temperiem frigidum eſt, non ſiccum. Id imprimis explicandum, quæ ratione lue venenoliſſimæ eſt. ream euacuet. Non id facit per modum attractionis: licet ſi acius eſt enim applicetur & iungatur cruribus: per os tamen ſit euacuat. Statuendum ergo quod fiat per modum impulſionis. Sæpe autem (non enim datur tertium.) Expulſtricem ergo partium facultatem, hydrargyro vel roborari, vel irritari. neceſſe eſt: hydrargyrum autem quia venenum eſt, non roborat, ſed irritat: ſimilia roborant, vt guaiacum, &c. Si ergo hydrargyrum & facult

facultati expultrici infensum est, & potissimum nervosis partibus, propter temperamentum frigidum, quo facultas ipsius, seu instrumento, calidum innatum exiguum nervorum, facile oppugnare potest. Hinc practici in malis nervorum, non vtuntur hydrargyro ad luem. Veneris expugnandum. Hinc etiam omnes artifices, qui hydrargyrum tractant, licet natura robusti sint, necessario tamen secundum nervos afficiuntur, & vt plurimum post 3. vel 4. annos, tremoribus, & aliis nervorum noxis corripuntur. Cum ergo hydrargyrum, expultrici potissimum nervorum maxime sit infensum, neruique à cerebro ducāt originem: fit vt hydrargyrum sua forma, mediante frigiditate, ita agat in nervos, vt cerebrum compatiatur. Vi scilicet frigiditatis hydrargyri, lues ad caput sursum impellitur, per modum repercussionis: & dum sic perducitur in caput, non in substantiam cerebri: cerebrum, ob suum robur, non permittit suscipi frigidum: vnde expultrix cerebri (quæ sanitatis tempore cerebri extremēta crassa per os euacuat) valde irritata surgit, & non sensim, sed magno impetu, materiam ad fauces, ad venas linguæ, & ad gingivas propellit, vt per os excernatur: vnde etiam tumor harum partium sequitur.

Antimonium vehementer purgat, per vomitum & secesum: sed quantum ego experientia colligere potui, rarissime luem superat. Vt, mea sententia, ab eius usu in lue prorsus sit desistendum.

Stibium.

CAPVT IX.

De usu guaiaci.

usus prædictor. medicamentorum.

RORO edocendum videtur, quomodo & Guaiacum, & Hydrargyrum vsurpari debeant. De Guaiaco quinque dicenda: primum, quomodo cū reliquis medicamentis miscendum: secundo, quæ debeat esse quantitas: tertio, quis modus: quarto, quando hoc medicamentum sit exhibendum: quinto, vbi administrandum. Quæ ergo cum ligno permiscantur, vel sunt Adiuuantia, quæ faciunt, vt guaiacum cito vincet luem: vel Corrigentia, quæ faciunt, vt tuto & cum iucunditate vincat. Adiuuantia, sunt Alexipharmaca, vel Non sunt: & vtraque respiciunt aut Luē, aut Subiectū luis. In lue, varia sunt vitia. Formæ luis, ita aduersatur ligni forma, vt ad roborandum simpliciter ex-

1. Quæ cum ligno sint permiscenda.
Adiuuantia alexipharmaca.
1. Ratione luis.

pultricem, quo lue[m] expellat, cæteris alexipharmacis non habeat opus: nil enim maioris est actiuitatis, quam guaiacum. Sed quatenus euacuatio non fit simpliciter, verum ad loca determinata: varia misceri possunt iuuantia, prout expultrix euacuationem tentat, eaque diminuta est. Si enim natura tēdet vacnationem diminutam per aluum: possunt lenientia, & leuiter soluentia misceri, vt scilicet cum decocto exhibeantur, *mellis ros. sol. vel syr. de polypod. 3. ij* Nec est, vt quis dicat, hunc esse motum contrarium: falsissimum enim est, quod nonnulli pro axiomate habent, guaiacum expellere lue[m] per sudorem: roborat quippe expultricem cuiuslibet partis, & proinde etiam expultricem ventriculi, ac intestinorum. Quod si ex alio conclusa, & sudore, cognoscamus expultricem ad partes cutaneas expellere: non debemus soluentia cum guaiaco miscere, sed sudorifera: *ut cardum benedictum*. Sic causa lotij, sunt miscenda *sem. melon. adiantum, capillus Veneris, ceterach, fenic. anisum*. Et hæc de vitio luis secundum formam. Ratione putredinis: cum guaiaco misceri possunt, ipsius cortex, *salsa, sassafras*. Ratione caloris, lentoris, interdum etiam crassitie, ac duritie, diligentes nos esse oportet. Ob luis calorem, miscetur *salsa & china*. Ob lentorem, guaiacum non eget mistione cæterorum: magis enim reliquis est amarum. Ob crassitiem, quæ interdum adest, miscetur *salsa & sassafras*. Ob duritiem miscetur *china*. Hæc de adiuuantibus, lue[m] respicientibus. Quoad subiectum luis: si hoc sit proximum, verbi gratia ventriculus, aut iecur: guaiacum non eget aliis: sed tenuitate propria, in luis sedem permeare potest: at si remotum sit subiectum, miscetur *salsa & sassafras*: vt si lues in capite sedem habeat. Hæc de adiuuantibus alexipharmacis.

2. Ratione
subiecti.

Adiuuan-
tia, nō alexi-
pharma-
ca.

1.

Sunt vero & alia adiuuantia. nō alexipharmaca, quæ spectant vel Lue[m], vel Subiectum luis. In lue hic non consideramus formam: quia hæc sola alexipharmaca respiciunt. Propter putredinē igitur, cum alexipharmacis possunt misceri *quinquefolium & adiantum*. Si lues sit calidior: miscerimus *cichorium, endiuia, cichoracea, feniculum*. Si intēsa sit visciditas: amariora miscenda, *vt scordium & prunium* (male fit, quod hæc non sint apud omnes in vsu.) Ob crassitiē misceritur *radix filicis maris*, quæ maxime attenuat. Ratione duritie, cū alexiteriis decoquenda *glycyrrhiza, althæa, malua, &c.* Hæc etiam vel adiuuantia, quod quidē non miscetur cum de-

cotto; sed permiscetur cum guaiaco, dum in pulvere datur.

Cæterum iuuantia non alexipharmaca, quæ subiectum luis spectant: pro huius varietate variant. Si enim luis subiectum sit ventriculus: miscebunt cum alexipharmacis, *orian-drum, myrrha, absinthium*: quod ars medendi docet. quantumvis apud pleròsque non sit in usu. Si iecur sit sedes: & sit calidius quod sæpe contingit: miscebimus *cichoracea, hepaticam, & quam communem*, nec improbantur aqua destillata organis *vitæ*: si autem frigidius sit, ut interdum contingit (imminet enim quandoque hydrops) miscebimus *agrimoniæ*, & loco aquæ vinum. Quidam enim lue affecti, obiere hydrope, aliisve morbis, ob medicorum negligentiam. Si lien sit sedes: miscebuntur *ceterachis, phyllis, cappares*: possumus etiam in lienis tumore, cum decocto guaiaci miscere vini *chalybeati semunciam*. Si cæcæum sit sedes: miscebimus *besonicam, maiora-milla, Racheadem, fuluiam, hyssopum, odorata, ut portionem cinamomi*, & nisi quid prohibeat, etiam vinum: nam & in oculorum dolore, secundum Hippocratem, vinum meracum prodest, quia producit ut ad caput. Si vterus sit sedes: miscebimus *adianum, masticarivum, artemisiam, origanum, pulegium*: & nisi quid sit quod calida prohibeat, etiam *myrrha utemur*, *em-bulo, quo supra ammoniaco*.

Hæc de adiuuantibus. Corrigen-tia respiciunt noxas, quæ e guaiaco imminet. Forma eius, cum sit similis, non indiget aliquò corrigente. Ratione caloris, si lues sit calidior, ut si sit febris, vel calida iecoris intemperies: miscebimus *sal-sem, chinam, item aquam, cichoracea, hordeum, &c.* quæ guaiaci calorem attemperant. Siccitas guaiaci prodest ratione putredinis: nocere autem potest in lue melancholica, si patiens siccio-rem habet ventriculum, si patiens secundum totum corpus sit exsiccatus, quod non semel obseruavi: corrigi ergo debet permistione *buglossi, boraginis, malvæ, possimum carne pulli, vituli, vel caponis*. Ratione tenuitatis, & pinguedinis, non potest nocere: & proinde hac ratione non eget corrigente. Si patiens ipsius amaritudinem perferre nequeat: miscebuntur *fassula, liquiritia*. Acrimonia eget corrigentibus quæ in caliditate iam proposita sunt. Ratione odoris, non eget corrigente. Et sic patet, quomodo cum guaiaco reliqua medicamenta sint miscenda.

Corrigen-tia.

Formula.
Guaiac.

decoctum
cui aqua.

Porro formula: medicamentorum contra luem, triplici-ter componi possunt: cū Aqua, cū iure, & cū Vino, cū aqua lim.

lim. ℞. guaiaci, seu scobis guaiaci lbjss. corticis guaiaci, salsa, ana ℥ijss. aquæ fontis lb xij. fiat infusio per diem naturalem: deinde fiat decoctio, ad consumptionem dimidiij, pro syrupo. Deinde ℞. quod residuum est, è colatura primi decocti, aqua lb xvij. fiat infusio per tres vel quatuor horas, & fiat decoctio ad consumptionem tertiae partis, pro potu. Reliqua adiuuantia, vel corrigentia, si iudicanda sint: simul cum alexipharmacis decoqui possunt, antequam fiat decoctio pro portione: ita tamen, ut quæ longiorem coctionem non ferre possunt, circa decoctionis finem imponantur: si contra, à principio. Hinc cum sit decocti colatura, passulæ imponendæ sunt in petia, ut exprimendo decoctum transeat per passulas.

*Cautio de
ingratis,
decocto per
miscēdis.*

1.

Si vero quæ miscentur sint ingrata: tunc duplex seruari modus potest. Primum enim si illa ingrata sint herbæ potissimum virides, quæ corruptionis syrapi causa esse possunt, ut borago, bugt. melissa, endiu. coqui debent cum portione syrapi, non cum toto decocto. Guaiacum enim decoctum coquitur ad remanentiam librarum vj. quæ in triduum sufficiunt: quo tempore facile decoctum putresceret, si herbæ virides simul essent incoctæ. Proinde è sex libris decocti, possumus sumere lb j. & dum, verbi gratia, mane hoc decoctum calefit, ut exhibeatur, possunt herbæ imponi. Alter modus hic est: Si ingrata miscenda, non sint causa putrefactionis decocti, veluti herbæ exsiccatae: tunc coquatur guaiacum in lb xij. aquæ, ad consumptionem lb iij. ut videlicet supersint lb viij. non vj. postea fiat colatura. Hunc sumatur residuum guaiaci, salis, & reliquorum alexipharmacorum: atque cum aqua fiat potio. Denique accipiantur illæ lb ix. quæ erant præparatae pro syrupo (non pro potu) illisque imponantur herbæ illæ ingratae, & fiat decoctio ad consumptionem tertiae partis: tunc enim remanebunt lb vj. quibus uti oportet pro syrupo. Sic ergo, dum potio medicamenta illa ingrata non suscipit, iucunda parari potest. Hæc de decocto cum aqua.

2.

*Decoctio
guaiaci cū
iure.*

At vero cum iure sic præscribitur: ℞. guaiaci, cibus, ana ℥ijss. salsa ℥ij. aqua lb vj. fiat infusio per 24. horas: deinde addo carnis pulli ℥j. fiat decoctio ad consumm. medietatis. Potus præscribendus, ut supra: ℞. quod residuum est: aqua lb x. fiat decoctio ad consumm. lb iij. pro potu.

Hic notandum, & alexipharmacorum & aquæ, minorem esse quantitatem in hac recepta, quam in præcedente: quia facile corrumpitur ratione carnis ita ut tempore calidiore,

Et saltem quantitate sit hoc medicamentum præscribendum, quæ vnum in diem sufficiat.

Secundo notandum, cum in carnis usu, respiciamus ad corporis maciem: salsa (utpote plus iusto siccantis) minorem esse dosin : quæ de causa etiam guaiacum non excedit dosin chinæ: quæ, ut pinguior, guaiaco hic est anteposenda.

Tertio obseruandum : cum quidam ægri non possint iure pro potu uti: carnem esse post potum demum incoquendam : ut etiam prius de herbis iniucundis dictum est. Ceterum aduertere etiam oportet, non esse faciendam decoctionem in iure : nam cum opus sit longa decoctione, syrupus, vel decoctum illud, falsum euaderet.

Cum vino alexipharmaca ita exhiberi poterunt : *℞. guaiaci ℥ ix. corticis ℥ iij. salsa, sassaparilla an. ℥ ij. aqu. tt. xij. post infusionem sufficientis aqua fiat decoctio ad consumptionem duarum tertiarum, ut scilicet remaneat lb iij. Deinde adde vini generosi lb iij. & fiat levis decoctio (vinum enim non debet diu coqui) deinde cola, exprimendo, pro syrupo. Pro potu: ℞. quod residuum est, decoquantur in aqua lb xvj ad consumptionem dimidij : deinde addantur vini lb liij. Misceantur pro potu.*

*Decoctio
guaiaci cum
vino.*

Hæc sufficiant de mistione guaiaci, & cum alexipharmacis, & cum aliis medicamentis. Vnde etiam patet, quæ ratione salsa & china, cum reliquis misceri queant : verbi gratia, de salsa : *℞. salsa lb β. coriandri ℥ β. aqua, lb x. fiat decoctio ad consumptionem dimidij, pro syrupo.* Hic coriandrum corrigit salsam : quæ cum omnis sit expers astringentis, ventriculo nocet.

*Formula
salsa exhibenda.*

Alterum, quod supra explicandum proposuimus, est de quantitate. Syrupi ergo dosis est ab ℥ iij. ad lb j. Errant qui & mane & sero decocti ℥ vij. exhibent : maior enim dari quantitas debet ante prandium, quam ante cœnam: si mane dantur ℥ vij. ante cœnam dabuntur ℥ v. Ratio est, quia inter prandium & syrupum vespertinum est minus interuallum, quam inter cœnam & syrupum matutinum: verbi gratia, syrupum exhibemus hora 10. prandium est hora 14. secundum syrupum hora 11. cœnæ hora 14. vnde spatium est horarum decem. Dosis autē pulueris guaiaci & reliquorum, est à ℥ j. ad ℥ iij hoc modo : *℞. pulueris guaiaci, salsa an. ℥ ij. betonice ℥ j. cum Gru. de beton. fiant pilula : quæ duabus vicibus exhiberi possunt.* Betonica hic imponitur : quia supponimus fomitem & subiectum luis venereæ esse caput.

*I I. Dosis
syrupi.*

*Dosis pul-
ueris.*

Tertium

**III. Modus
vendi.**

Tertium explicandorum caput, est de modo vendi. Si lues passio requirat, vt guaiacum efficaciter agat: non modo in forma liquida, sed etiam consistente exhibere oportet: ideo simul pilular, vel electaria e guaiaco confecta, exhibeantur cum decocto. Præstat etiam tunc actu calidum exhibere decoctum: sic enim melius prouocat sudorem, melius penetrat, melius venas ingreditur, melius agit in facultatem alteratricem, & expultricem. Circa sudorem notandum, vt prouocetur *vel pannis calidis, vel cucurbitis repletis aqua*, quæ sub axillis applicentur: res certa est: aqua commode decoquitur cum residuo potionis: licet *vel regulis, hypocaustis vulgaris: maxime etiam probatur nonum illud instrumentum ligneum*. Experientia compertum habeo, melius alio modo quosdam sudare, quam alio: propterea varios pono modos. Quod si lues sit melancholica, & corpus aliqua e parte vergat ad siccitatem: præstat sudorẽ prouocare *aqua dulci*, quæ actu sit calida. In primis autem tenendum; vt non statim post assumptum decoctum, sed per horam post, sudor prouocetur: necesse enim est, medicamentum aliquantisper in ventriculo morari, vt deducatur ad actum. Id etiam obseruandum, vt panni, qui inficiuntur sudore, non simpliciter siccantur sub radiis Solis, ignisve beneficio, sed necessarium est lauare, vt lues illa per sudorem extracta, è toto deleatur.

**III. Quã-
do agẽdũ.**

**Electaria
in malo
cõsumaci.**

**Electaria
calidum.**

Quarto, quoad Quando agendum: sciendum, decoctum dari debere, dum est præsentia luis, & nihil prohibet. Lues præsens esse potest, per 30. 40. 60. aut plures etiam dies: ad minimum ergo decoctum exhiberi debet per 40. dies: Quod si lues perseveret, nos etiam in decoctis perseverabimus: sed post dies 30. sufficit semel in die exhibere: post 60. dies, si summe pertinax sit malum, impossibile est tamdiu homines in cubiculis detineri: vnde singulo mane exhibebimus quoddam electarium, per horas 4. ante prandium.

Si ergo corpus sit calidius, vel iecoris calidioris: *℞. Salsa ʒij. ligni guaiaci ʒss. pulu. sonchi ʒij. hepatis lupi ʒj. conserua cicchoracea lb ʒss. cum syrupo de sicchoride, fiat electarium: dosis a ʒij. ad ʒj.* Hic salsa & lignum, respiciunt luem: sonchus, cicchorium, hepar lupi, respiciunt iecur calidum: hoc enim electarium potissimum probatur in lue venerea, cuius fomes est iecur. Conserua in hoc medicamento imponitur ad lb ʒss. nam pro qualibet pulueris drachma, conseruæ vncia esse

esse debet: sunt autem 3 xxx. ergo & vnciæ conseruæ erunt triginta, id est lbijß. Si corpus sit frigidius: *℞. guaiaci lbjß. corticum ligni salse an. 3ß. pulueris agrimonie 3vj. hepatis lupi, mihridatij antiqui, cytheos an. 3 iij. conserua e folijs viridibus agrimonie lbij. cum syrup. de agrimon. fiat electarium: cuius dosis, vt supra.* *Electariū calidius.*

Hæc de luis præsentia. Prohibere autem possunt vsum decocti, Materia morbilica. Cibi copia, & Virtus. Materia enim morbilica prius est vacuanda, & purgandum corpus, deinde alexipharmaca danda. Quamuis autem corpus mundatum sit: cum tamen alia subinde generentur excrementa: nisi liberaliter natura vacuet, nos eam iuuabimus clysmis, imo etiam soluētibus exhibendo singulis decem diebus aliquod soluens, de quo suo loco diximus.

Deinde cibi copiosi præsentia prohibet: dandum ergo decoctum, per 4. vel saltem per 3 horas ante cibum. Virtus prohibet, non ratione qualitatis (nam calidum innatum potius iuuatur à caliditate alexipharmacorum) sed ratione suæ substantiæ, quæ dissoluitur, si iusto diutius decoctum exhibeatur, sique in aëre calidiori. Falluntur ergo qui optimum exhibendi decocti tempus esse putant in media æstate: virtus enim non potest perferre dissolutionem & aëris calidi, & guaiaci: potissimum quia decoctum dari non potest, nisi patiens solventibus vtatur, quæ & ipsa calidum dissipant. Aër frigidior, quamuis sudorem inhibere videatur ratione qualitatis: potest tamen calidis corrigi, ne tanta fiat *quæ in præsentia* dissolutio, quanta in æstate: præterea etiam non semper sudor prouocandus in vfu ligni, sed facultatis expultricis motus attendendus: alexipharmaca quippe, omnium partium expultricem roborant. Temperatus quidem aër, ad ligni vsum, commodissimus est: minus tamen virtus æstate, quam aliis temporibus sustinere potest.

Quinto, vbi agendum, indicatur à luis subsistentia. Si enim lues sit in partibus internis, per os medicamentum exhibendum. Si in crure, cruri applicandum remedium, &c.

Hæc igitur de guaiaci vfu dicta sufficiant.

CAP.

*De Preparatione & vsu Argenti viui ad morbum
Gallicum, formâ inunctionis, &
suffitus.*

*Hydrargy-
ri prepara-
tio.
Adiuan-
tia.*



Corrigiua.

*Inunctio
magis tuta
est suffu-
migo.*

I lues iam dictis medicamentis vinci nequit, summa urgente necessitate, ad *Hydrargyrum* cōfugiendum. Hoc eger adiuvante, & corrigente. Ratione formæ *hydrargyrum* non eget simili iuvante; est enim forma venefica, quæ non augenda: nec tamen oportet ea addere, quæ formam habent prorsus dissimilem: hæc enim non adiuvant, sed impediunt. Iuvantia ergo non à tota forma, sed manifestis qualitatibus *hydrargyrum* iuvabunt: tales qualitates sunt, tenuitas, acrimonia, amaritudo. Per tenuitatem ammistoxū, vis *hydrargyri* penetrat: frigida enim opus habent penetratione. Amara iuvat, ut fiat luis deterfio. Acria irritant expultricem. Huiusmodi sunt *castorium*, *baccæ lauri*, *baccæ iuniperi*, horumque olea. Datur etiam adiuvans per crassitiem, nimirum *cera*, quæ sua consistentia facit, ne *hydrargyrum* fluat, sed magis curi hæreat, & efficacius agat: ne tamen *cera* lædat, potest abluī decocto *baccarum lauri*, vel *præstij*. Corrigentia non solum qualitate manifesta, sed etiam tota forma concurrunt: ut *salina hominis ieiuni*, qua *hydrargyrum* exstingui solet: præterea *antidoti*, *theriaca* & *mithridatium*. Frigiditatem *hydrargyri* corrigunt, calida, pingua, odorata: *Hydrargyrum* enim frigidum eget calidis, quæ vim resoluendi habent, ut magis penetret: talia sunt, olea è *baccis lauri*, & *baccis iuniperi*, vinum, *theriaca*, *mithridatium*. Pingua miscenda sunt, ne è violenta *hydrargyri* actione, & vsu horum medicamentorum, nervi plus iusto siccantur, aut etiam partes motui voluntario destinatae, quæ copioso egent humore obtinente: hoc præstat *axungia suilla*: præterquam quod sua consistentia facit, ut permaneat *hydrargyrum*. Denique odorata sunt permiscenda, ut *aromata* & præsertim *crocus*: spiritus enim ratione veneni facile læduntur, quos odore grato *crocus* reficit: petit etiam caput (vnde eum in capitis dolore fugiendum suadet *Galenus*, cap. 1. lib. 2. x. rōx.) & proinde *hydrargyri* quoque adiuvans & vehiculum est, quod caput petere in curatione volumus. Hæc copia mediocri cum *hydrargyro* miscenda, ne eius

ne eius vim extinguant. Notandum autem medicos vti inunctione & suffumigio. Suffumigiū, quia partes perit spiritales, minus est tutum: potest tamen usurpari, si patiens sit robustus secundum thoracem, seu pulmones, & malum sit pertinacissimum: suffumigium enim efficacius est inunctione: quia vapores per os naresque inspirati, cerebrum petunt, vt ad expulsionem insurgat. Formula inunctionis hæc esse potest: *R. hydrargyri salina ieiuni exstincti lb̄ ss. Axungia suilla ℥ iij. misce summa cum diligentia per horam: deinde adde olei laurini, & iunipero, viperini ana ℥ j. misce per semihoram: post, adde pulu. castorij ℥ iij. baccarum iuniperi, baccarum lauri, ana ℥ ij. Et hic puluis sensim miscendo aspergatur: dein adde croci ℥ ss. cera lota vino maluatico ℥ j. misce per duas horas. Suffumigium erit huiusmodi: *R. hydrargyri præcipitati, sublimati, sandaracha Grecorum, turpimenti, ana ℥ ss. baccarum lauri, baccarum iuniperi, ana ℥ iij. cum resina terebinthina, diluta in decocto baccarum lauri, fiat pasta pro suffumigio.**

*Inunctio-
nis formu-
la.*

*Suffumigij
formula.*

Hæc de hydrargyri compositione: sequitur recta eius administratio: Primo ergo, quoad *Quantum agendum*: è propo- sita inunctione sumenda, modo vncia vna, modo duæ, modo tres, prout actio luis est vehementior. *De modo.* Oportet hoc medicamentum actu esse calidum: debetque inunctio fieri fricando, ab inferis ad superna: sic enim per poros vis medicamenti facilius ingreditur: contraria frictione pori potius clauduntur: frictio fiet cheirothecis, non manibus nudis. Calidius autem medicamentum erit, frictioque vehementior, quo luis passio est difficilior. Vt vero penetret medicamen- tum, necesse est, vt actu calidum seruetur: quare partibus inunctis applicabuntur petiæ lineæ, & intus immittenda stupa, confecta è cannabe. Quoad *quando*: si præsens est lues, & nil prohibeat: inunctio fieri debet semel, bis, ter, &c. non tamen ultra septem vices: si enim tum non exspuit, nulla spes restat. Per luein præsentem, intelligimus eam, quæ si- mul cum præsentia indicat, id est, quæ nondum cedit, nec euacuatur: quod si enim quis exspuere incipiat, post secun- dam inunctionem, sufficit ter inungere: quia illa lues etti præsens sit, expurgatur tamen, neque noua eget inunctione: Prohibere potest inunctionem, materia totum replens cor- pus, quæ facit, vt hydrargyri vis permeare nequeat: vnde in artubus manet, & interdum, ad vsque medullam osium ingreditur: Prius ergo corpus purgare oportet, & efficere, vt

*vsus hy-
drargyri.
Quantum.
Quomodo.*

Quando.

*Quid pro-
hibeat inū-
ctionem.*

quotidie fluat aluus. Prohibet etiam materia replens ventri-
culum: vnde vinctio fieri debet per quatuor horas ante pran-
dium, priore cibo bene concocto: Hinc recte practici quo-
tidie clysmis vtuntur si æger non excernit. Prohibet de-
nique virtus debilis, & secundum partes, & secundum to-
tum. Secundum partes: dum, verbi gratia, adest vlcus, aut
morbus aliquis in partibus oris: quod si harum partium af-
fectus aliquis non amplius præsens sit, sed prægressus, si
quidem ortum traxit e lue venerea, vt vlcus linguæ, oris,
labiorum, non prohibet inunctionem, quia non adest imbe-
cillitas, quæ prohibeat: si vero quis, non detentus lue vene-
rea, obnoxius sit anginae, & postea lue corripiatur: nequa-
quam est inungendus, excitaretur enim angina. Nervi-
orum quoque virtus inunctionem prohibet: si enim lue affecti, vel
laborent, vel saltem obnoxij sint stupori, paralyfi, vel dolo-
ribus articulorum (qui tamen non sint gallici) prohibetur
inunctione: alias enim e toto vis nervorum adimeretur. Virtus
totius prohibet, quando adest febris, siue sit venerea, siue
non. Si patiens non febricitet, facta autem inunctione fe-
bris sequatur: non est pergendum. Macies prohibet, ceu si-
gnum virtutis debilis secundum totum: item pulsus debilis;
item, si patiens est puer, non enim ferre potest inunctionem,
adestque nervorum infirmitas: senes etiam eam non queunt
ferre. Quoad *ubi agendum*, oportet inungere artus, citra arti-
culos, inter articulum & articulum.

Vbi.

*Quid post
inunctionē
faciendum,
si euacua-
tio sequa-
tur.*

Facta inunctione (ne hæc noceat) videndum, num eua-
cuatio succedat, nec ne. Si succedat: patiens iubebitur *aurum*
faciendum, *detinere in ore*: hydrargyrum enim ab expultrice capitis in os
si euacua- protulsum, auro adharet, ob *expultrice* quandam, vnde oris
tie sequa- partes non ita inficit. Præterea, quia vi huius inunctionis,
tur. totus aer cubiculi inficitur: ne hunc prauum aërem æger
inspiret, odoratis corrigendus est, vt potius ad calidum
vergat: partesque inunctæ testæ atque calidæ seruentur,
quemadmodum dictum est. Dum vacuatio facta est me-
diocris, cognoscimus hydrargyrum penetrasse: proinde
artibus occurrendum, ne partes nervosæ afficiantur: abluant-
ur artus *vino maluatico*, vel quotidie, vel saltem alternis
diebus. At si copiosior facta sit euacuatio, artus fouēdi *vino*,
Artus ut cum lacte aliterat, *potiorandi.* coniungendi etiam artus sunt melle, vna cum casto-
rio, vel oleo de castorio. Tandem absoluta purgatione, probatur
salutem secundum totum corpus, ex aqua communi, alterata cum

salvia,

folia, beton, calamintha mont. ina, dictamn. Cre. erit balneum
 ita calidum, vt sudet æger. Si forte corpus sit ficcius: vngan-
 tur artus oleo de castorio, confetto in duplici vase, cum vino Con-
 sulo etiam, vs oleo additis magnas antidotos, imitatione. Gale-
 ni, qui post opij administrationem calidis vitur, vt vitium,
 ab opio excitatum, delectat. Idem quoque de suffumigio est
 statuendum. Hac inunctione, quæ hydrargyri nocumentum
 corrigit, non solum vngendi artus, secundum articulos, par-
 tesque reliquas, sed etiam spinæ medulla, & vertebræ. Hac
 de causa etiam assumendæ sunt magna antidoti, cum consensu
capitalibus, & foliis auri. Verbi gratia, ℞. mithrid. antiqui ℥ ij. fol.
auri N. iij. conserua è floribus rosmar. beton. ana ℥ j. cum sy-
 rupo de cortibus citri, fiat electarium: cuius dosis ℥ ij. vel iij. Quod
 si oris partes ob vacationem afficiantur, vt oris sequantur
 vlcera: tunc è cornu cerni scabiosa, quinq. folio, virga aurea, &
foliis auri, paratur puluis, qui partibus ulceratis applicetur. Si vl-
 cus ita aperiatur, vt sanguis copiosus effluat, è cuius effluxu
 immodico, periculum immineat: sumatur puluis rosarum, cum
 puluere myrtillorum & sumach, ad 3 ss. excipiantur succo plau-
 ginis, & intra os immittantur. Hæc de medicamentis, quæ ad-
 ministranda sunt, cum vacuatio per os succedit.

Si autem non fiat euacuatio: vtendum est medicamentis, Si non se-
 quæ hydrargyrum è corpore trahant: vnde probatur medi-
 camentum, cuius virtute copiosus erumpat sudor: tale est
hypocistum, & balneum. ita actu calidum, vt sudorem prouo-
 cet. Vt autem sudor efficaciter magis proiciatur, aqua bal-
 nei alteranda est medicamentis calidiss, de quibus supra, po-
 tissimum calamintha mont. cardus sancto, dictamn. Cre. Balneum
 sæpius est repetendum. Qui balnea non ferunt: iis artus
 inungantur (quamuis etiam post balneum probetur inun-
 ctio artuum, vertebrarum, & omnium articulorum) cum oleis
 de castorio, de costo, in duplici vase decoctis, cum vino & rebus iam
 propositis calidis & aromatibus: decoquantur ad vini consumptio-
 nem: post colaturam, misceatur cera lora vino maluatico generosa
 addantur folia auri: formula erit talis: ℞. oleorum de castorio, de
 costo, ana ℥ iij. vini aromatici lb ss. dictamni Cre. calamintha mon-
 tana, cardus sancti, guaiaci, ana 3 iij. cinnamomi, macis, ana 3 j.
 urgente necessitate sinapi 3 ij. contundenda contundantur crasso
 modo, & fiat infusio per duodecim horas: deinde fiat coctio in vase
 duplici, ad consumptionem vini: postea cola, & serua hoc oleum in
 vase vitreo. Deinde recipe huius olei 3 j ss. fol. auri N. iij. ceræ

lota vino generoso 3 iij. Misce ad ignem, & sufficiat pro unica vice.
 Inunctio cum hoc oleo, est præstantissima, ideoque sæpius
 iteranda: antequam autem fiat, partes inungendæ, potissi-
 mum articuli, foveantur *vino maluatico* calente, vt roboretur
 calidum innatum, iam aliqua è parte male affectum vi hy-
 drargyri: post fotum & siccationem fiat inunctio. Hæc de
 materia medicinali, respiciente & Totum corpus, & Luis
 virulentiam.

CAPVT XI.

De curatione symptomaticorum luis Gallicæ
affectuum.

*Medicamē-
 ta respi-
 cienda Ef-
 fecta luis.*



Vperest, vt dicamus de medicamentis, quæ Mor-
 bos, & Symptomata, seu effecta luis veneræ
 respiciunt. Inter morbos recensuimus febres, ca-
 sum dentium, bubones, gummata, verrucas, pu-
 stulas, carnes, osium corruptionem, vlcera reliqua, rhagadas.
 Inter symptomata: dolores, tinnitum, gonorrhœam, depi-
 lationem.

Febris.

Febris ergo si non sit Gallica, vt si è guaiaci decocto
 subsequatur febris: primum febrî occurrendum intermisso
 decocto: vt in febrium doctrina proposuimus. At si febris sit
 ob luem venefica: lues primum tollenda: tunc enim febris
 tolli non potest, nisi exhibeantur alexipharmaca. Hic autem
 cum totius, tum luis habenda est ratio. Non enim tuto lui
 occurrere possumus, nisi prius totum sit expurgatum, & fe-
 bris remota. Ratione totius ergo primum secunda vena, nisi
 febris sit hectica. Cæterum, febris gratia, omnia quæ adhi-
 bentur erunt mediocria: Verbi gratia, si febris sit putrida,
 non vtemur pilulis cochis cum helleboro, quibus vteremur, nisi
 coniuncta esset febris, &c. Ratione luis, alexipharmaca de-
 bent esse mitiora, dum adest febris, quæ à lue prodit, præser-
 tim si sit hectica: in qua hectica non improbo salsam, sed magis
 probo chinam, quia non ita siccatur & miscere oportet cichora-
 cea, buglossum, lactucam, & praterea carnem: non licet uti cortice,
 non guaiaco, non saffra. Existente etiam hac febre, sudorem
 prouocare non licet, quia virtus non permittit, sed requiri-
 tur balneum moderate calidum: licetque totum inungere,
oleis amygd. violaceo: permista aliqua portione decocti, vel salsa, vel
china, imo etiam guaiaci, sed in parua copia. Ratio est: nam be-
 neficio

beneficio balnei fit attractio alimenti ad partem: beneficio visciditatis fit appositio alimenti, & agglutinatio: à moderata caliditate olei amygdalini, & frigiditate olei violacei, in-temperies febrilis corrigitur, vt fiat assimilatio: vi guaiaci, medicamenta penetrant ad ossa, caliditas guaiaci luem euocat, guaiacum roborat expultricem, vt sic eodem tempore & lues & febris amoueantur. Hic occurrit dubium: cum *Dubium.* enim alexipharmaca lvi sint aduersa: si guaiacum partibus externis applicetur, videri posset, luem ad interiora retrocedere? Responsio: alexipharmaca roborant facultatem expultricem, quæ, si, verbi gratia, in capite vlcerato existat, luem expellit per locos decentes, non intro, sed foras: vnde practici in vlceribus, & malis externis, recte cum medicamentis reliquis alexipharmaca miscent: sed rationem forsitan ignorant.

Quoad casum dentium: oportet detergere materiam illam, quæ in causa est, vt gingiuarum abradantur. Maxime igitur *Casus den-* probatur oleum è sulphure, cum oxymelice scillitico, & puluere *tium.* guaiaci: postea etiam roborare & astringere oportet: vnde probatur medicamentum compositum è mastiche, nucibus cupressi, gallis immaturis, puluere plantagin. ros. hypocistid. probatur etiam vinum austerum, cum aqua rosa, & succo plantagin. & modico vel guaiaci, vel reliquorum alexipharmacorum.

Bubones celerrime ad suppurationem sunt producendi: si *Bubones.* perducere nequeunt, per illam partem molienda est luis euacuatio, licet bubo non moliatur. Si ergo in inguine appareat tumor: natura iuuanda est, applicata ventosa, cum flamma, citra scarificationem: deinde apertio procuranda cum althea, adipe susillo, farina hordei seu frumenti, oleo lil. alb. amygd. dulcium: ex his fiat cataplasma: vel applicetur diachylon magnum. Si materia suppuretur: non expectanda est integra & absoluta suppuratio, sed apostema immaturum est aperiendum, vt quam citissime egrediatur virulentia: & facta apertione, foramen diu (per dies quadraginta, vel etiam sexaginta) apertum detineatur, turunda, parata cum melle (&) alexipharmacis. Quod si præsentem tumorem, materia admodum sit rebellis, nec suppurari incipiat: causticum applicandum: deinde, si eschara virtute butyri corrumpatur ac putrescat, ea amota (vt in fonticulis fieri solet) imponenda est pilula, confecta è cicere, vel potius è medulla sambuci: aut conficiatur pilula è cera, non simplici, sed diligenter lota in decocto guaiaci, cui permista sit portio

sinapi, colocynthidis, si lues videatur pituitosa: portio scammonij, si biliosa: veratri, si melancholica. Non solum autem hoc decocto ceram lauare licet: sed etiam puluerem de propositis parare possumus, & cum cera hac tota conficere pilulam, quae sanè medicamentum efficacissimum.

Gummate.

Materia gummatum est dura & crassa: eget mollientibus & attenuantibus: si ergo exhibentur medicamenta, cum decocto miscebimus alibam, & salsam augetimus. Extra applicabimus medullas, adipem emollientes, ammoniacum, bdellium, radices alibae, radices cucumeris agrestis, sed cum alexipharmacis: probatur etiam diachylon cum gummis: probatur cascus antiquus cum axungia suilla, ut liceat etiam colocynthidem & veratrum imponere. Urgente necessitate ad praecipitatum oportet confugere, & ad apertionem cum caustico: locusque teneatur apertus.

Verruca.

Verrucæ, si ligaturam admittant, ligandæ serico: & cum per ligaturam verruca est exstirpata, radici etiam prospiciendum: vnde radix verrucæ madefacienda est aqua alterata cum alumine & cortice guaiaci. Si verruca sit plena, eamque habeat conformationem, ut non possit ligari: imitantes Aetium, primum admovebimus ammoniacum cum aceto, deinde aquam ardentem, in qua macerata sint alibae, ad emollitionem, guaiacum, quin & (usu exigente) praecipitatum, squamam aris calæ exstincta cum oleo viperino: quidam addunt puluerem verrucæ pro maximo secreto: addi etiam potest sal mineralis. Quia autem ob horum medicamentorum caliditatem, phlegmones mininet periculum: ideo ad arcendum inflammationem, circumscribere, & supra proposita medicamenta admoveatur unguentum de cerussa.

Pustula in ore.

Pustulae, si oris partes affligunt: illae partes fouendae sunt decocto guaiaci, quod patiens assumit: si dolor illis sit iunctus: prodest serum lactis chalybeatum: siccat enim, & dolorem mitigat. Si pustulae serpant: sero chalybeato addantur plantago, rosa. Si feritor annexus sit: sero chalybeato addantur hordeum & lactuca. Si pustulae sint putrilaginosae: addantur sero lactis, si scabiosa, cornu cervi, alumen roche: ut pro quavis feri uncia, misceantur scabiosa & reliquorum, m. g. v. ad x. Si pustulae in aliis sint partibus: locus affectus oblinendus est spuma decocti de guaiaco, possumus etiam addere scabiosam & aristolochiam rotundam: si contumaces sint pustulae: ascendendum ad praecipitatum: si dolor urget, addendum sauum hircinum, serum lactis chalybeatum.

In aliis partibus.

hybeatum. Verum huiusmodi pustulæ sæpe decocti solius virtute extirpantur.

In carie, oportet siccare, cum pulvere tutie, cum pulvere li- *Caries.*
thargyri, cum pulvere corr. guaiaci: superponitur unguentum è tur-
ria. Si plurimæ sint sordes, imponatur *Aegyptiacum*, oleum è
chalcantho, potissimum probatur præsipitatum, superponatur un-
guentum de cerussa, ne oboriatur inflammatio. Post mundifica-
tionem, sufficit petia, madefacta in guaiaco, & unguentum de tutia.

Quoad corruptionem ossium: quamprimum ad fortiora *Ossis cor-*
veniendo. Si ergo os corruptum est detectum: uti oportet *ruptio.*
oleo è sulphure, è chalcantho, ferro candenti, si citra periculum
potest administrari: ne autem oboriatur inflammatio, im-
ponatur unguentum de cerussa, quod magis probo, quam linimentum
simplex, quia recipit solatrum, calido innato maxime aduer-
sum. Vbi extirpata est lues: oportet replere, agglutinare, ci-
catrice obducere.

Quantum ad reliqua vlcera, pari ratione curantur: id po- *Ulcera.*
tissimum obseruandum, ut cum reliquis medicamentis iun-
gantur alexipharmaca, quorum beneficio expultrix loci af-
fecti roboratur, ut virulentiam expellat.

Rhagades sæpe adimuntur beneficio decocti: si non cedant, *Rhagades*
fouendæ partes guaiaco, scabiosa, scordio, quinquefolio: si duri- *sen fissura.*
ties annexa est, addatur althæa, malua, calx exstincta cum adipe
gellina, ammoniaco. Si admodum vehemens sit lues, ut non ce-
dat: probatur inunctio ex hydrargyro, qualis proposita fuit: po-
test adhiberi præsipitatum: licet suffumigare partes affectas;
volas manuum & pedum. Potestis etiam hoc uti, quod admo-
dum est efficax: *℞. hydrargyri salina exstincti ʒ ij. pulv. guaiaci ʒ*
ij. scabiosa, s. ordij ana ʒ j. cera lota decocto scordij ʒ ij. misce pro
linimento.

Quoad dolorem: ratione Luis, oportet uti alexipharmacis: *Dolores.*
in internis medicamentis, augenda est dosi salia: extra, ra-
tione Luis, partes fouendæ guaiaco, quod ad roborandum ex-
pultricem efficacius est, quam salia. Ratione Doloris, opor-
tet occurrere dolori, & respicere tum ad causam, tum ad do-
lorem, ut habet rationem symptomatis. Quoad interna igi-
tur: china dosi augenda, magis enim potest ad mitigandum
dolorem, quam salia & guaiacum: permiscenda etiam althæa,
malua, quandoque ascendendum ad *Mithridatum recens*, in
quo *sc. opij viget facultas*. Extra parti dolenti applicetur medi-
camentum cōfectum ex *athetho, malua, althæa, melisero sanuigræo.*

Respectu doloris, non luis, probatur medicamentum, paratum ex adipibus, è lacte cum pane: probatur etiam omentum vituli vel castrati, quod sit calefactum cum propositis medicamentis: nequaquam autem opium in partibus externis usurpandum.

Tinnitus.

In tinnitu aurium, corpore & capite expurgato, vtendum oleo destillato e guaiaco, cum adipe anserino: probatur Elixir cum oleo amygd. amar. Vehementioribus vti oportet, quia aures sustineant medicamenta fortissima, & quia malum pertinacissimum: his ergo medicamentis per aliquot menses vtendum.

Gonor-

rhæa galli-
ca.

Gonorrhæa si non cedit decocto guaiaci post viginti dies: aliis vtendum. Intus, R. sem. lactuca, viticæ, cannabis, ana ℥ ij. pulu. salsa ℥ j. conserua è nymphæa ℥ ij. è betonica ℥ j. cum syrupo de capill. Veneris, fiat electarium, cuius dosis à ℥ j. ad ℥ ss. ante syrupum matutinum. Hic betonica & capil. Veneris, vsurpatur pro vehiculo reliquorum. Extra oportet peritonæo applicare medicamentum, confectum ex oleo masticebino, quod sit decoctum in vase duplici, cum vino austero, addito thure, additis nucibus expressis, & gallis: facta decoctione, per expressionem fiat olei colatura. Ad singulas huius olei uncias, addatur cera ℥ j ss. tota vino austero potissimum alterato cum guaiaco.

Depilatio

& pruritus.

In depilatione, abradantur pili Luna crescente: & nihil prius applicetur primis quindecim diebus, quibus decoctum bibitur, licet vtgeant ægri: sæpe enim solius decocti vi resurgunt pili. Post dies quindecim potest aliquid applicari: id tamen non sit astringens, ne lues cohibeatur. Vtemur aliquo roborante, crassæ substantiæ, sine astringente: vnde caput abluatur lixiuo moderato, confecto cum abrotano, cum furfuribus: potestis ascendere ad radices cannarum, eas in lixiuo decoquendo: potest etiam incoqui scabiosa, fumarina. Si ægros exerceat pruritus, addatur bordeum. Si coniuncta sit ariditas, addatur malua. Hæc autem inundatio in depilatione probatur: R. olei amygd. dul. ℥ j. decocti, guaiaci ℥ ij. abrotani ℥ j. thapsiæ ℥ ss. fiat decoctio in duplici vase, ad consumptionem decocti: deinde cola, & adde faui mellis ℥ ss. oui vitellum, olei è caryophyllis non destillati. ℥ j ss. Misce. Efficacissimum etiam est oleum è fano mellis, oleum è vitellis ouorum. Semper tamen miscenda sunt alexipharmaca. Hæc de medicamentis.

De victu ratione in lue Venerea.

Sequitur Dieta. Aer probatur calidus, in cubiculo propter sudorem, ac διαπονή ἀδελαν. Errant ergo, qui ægris permittunt, vt cubiculo egrediantur: impeditur enim transpiratio. Victus, tempore purgationis sit mediocris, & potius vergat ad pleniorē: pro statu corporis debet esse medicinalis, vt in corpore bilioso refrigerans, & c. potus vinum aquosum. Contra, si corpus sit frigidius, vt in senili ætate, tempore frigido, ante purgationem sit vini potus, victus non refrigerans. Tempore autem medicationis, quo decoctum assumitur, & quo hydrargyrum administratur, alia opus est victus ratione. Quoad decoctum: cibus circa primos & vltimos dies, minus tenuis esse debet: nec de extremo in extremum est transeundum sine medio: tempore autem interiecto abstinere oportet à carnibus: vt si æger decoctum sumat per quadraginta dies: decem primis & postremis diebus caro conceditur: per viginti dies medios non conceditur, nisi vires sint debiles, vt in hecticis. Probatur tunc amygd. dulces, passula, pistacia. Panis interdum conuenit mediocriter coctus: si ventriculus est debilis, si corpus obstructionibus obnoxium, si corpus emaciatur & hecticum, si lues sit melancholica. Aliquando panis assatus, seu bis coctus dari potest. Licet hic à Galeno vbi de alimentorum purorum facultatibus agit, capit. 2. libr. 1. exigui nutrimenti, & difficilis coctionis statuatur. Vnde & à nonnullis, sed immerito, damnatur: cum hoc loco non saltemimenti, sed etiam medicinæ gerat vicem. Proinde si ventriculus sit robustus: si non sit periculum obstructionum: si corpus non sit emaciatur: si lues maiori è parte sit pituitosa: non modo panis biscoctus prodest: sed interdum etiam prodest panem conficere cum aqua, alterata alexipharmacis: item dare pitulas ex alexipharmacis ilico ante cibum, vt sic alimentum è toto reddatur medicinale. & aduersarium lue veneræ. Non semper ergo reprehendi debent, qui in lue panem biscoctum, seu assatum exhibent. Carnibus etiam modo assis vtendum, modo elixis: his in lue melancholica, illis in pituitosa. Quoad modum: Cibis alterantibus, modo calidis, modo frigidis vtendum: pro varia corpo-

Aer.

Cibus & potus, tempore purgationis.

Victus, tempore quo decoctum assumitur.

*Victus, et
pore usus
hydrargy-
ri.*

Somnus.

Euacuatio.

Exercitium.

Conclusio.

ris ægri constitutione. Cibus in prandio parcior, quam in
cœnatio est, quia bis in die (v. upum exhibere oportet, vn-
de propter maius intervallum, inter cœnam & syrupum
matutinum, cibus maiori quantitate assumi potest. Potus
est *secundum decoctum*, quod modo paratur cum aqua, modo
cum vino, modo cum carnis iure. Hæc observanda; dum ex-
hibetur decoctum. Cum hydrargyri inunctionem ammini-
stramus, eo tempore, quo homo potest masticare, dentur
carnes, panis, vinum aquosum, non forte (vt quidam nebulones)
post inunctionem enim imminet oris inflammatio. Dum ve-
ro homo masticare non potest, detur *consusum, destillatum*,
vitetur vinum, quia actu est inflammatio, estque periculum
ne patientes suffocentur: dum incipiunt masticare, possu-
mus exhibere *carnem, vinum*. Quoad *somnum*, dormiant ægri
per horam post assumptum syrupum, nec ilico sudent. *Motus* tum cor-
poris, tum animi, sint potius citra mediocritatem: *ὅτι γὰρ ἡ
ψὸς ἔδεικται*, aphor. 16. sectio. 2.

Et hæc dicta sint de luis venereæ curatione: quæ licet ma-
lum sit pertinacissimum, è toto tamen expugnari potest, si
quæ attulimus, studiose peragantur. Nec vos laborum
ac diligentiae pœniteat, in malo hoc frequenti &
peræque lucrosissimo: dixerim quippe citra
inconstantiam, me è Gallicæ luis cura-
tione ultra octodecim millia
coronatorum lucra-
tum esse.

PRACTI



PRACTICÆ
 MEDICINÆ,
 LIBER SEXTVS.



DE FEBRIBVS IN GENERE
ET SPECIE.

C A P V T I.

*De Febris essentia & signis, in genere: ubi quadam
ea de re dubia solvuntur.*



In doctrina febrium Auicennam sequemur, in
prima sen libri Quarti. Agit autem primum de
Febri in genere. 2. de Ephemera, 3. de Putridis.
4. de Hecticis. 5. de Pettilentibus. 6. de Variolis
& morbillis. 7. de Febribus apostematum. 8. de Febribus
positis. 9. de Recidiva.

Method.
Anicen.

(generalis.1.

Febriu
doctri
est vel

specia-
lis: Fe-
bris est

ria

Complex
Con

principiis
Sy
posi

non pe-
stilens
orta è

conten-
tis

tenuiorib.
Epheme-
ra. 2.
crassiorib.
Putrida 3.
b. Hæctic. 4.
bris. 5.
tätia febr. 6.

Symptomática. 7.

Composita. 8.

Recidiva. 9.

Febris

Definitio. Febris est calor extraneus accensus in corde.

Modus generationis. Generatur autem febris dum causa calefaciens corpori occurrit, & in cor agit, ut cor ponat in calefacto esse, vel secundum spiritus, vel secundum humores, vel secundum solida. Dum enim aliquod horum in calefacto esse positum est: calidum insitum cordis redditur igneum: eaque caliditas calidi ignei communicatur spiritui vitali, sanguini, per venas & arterias: hincque partibus similaribus totius corporis ita confertur, ut hæ non modo secundum calidum insitum, sed etiam secundum temperiem afficiantur: temperies enim degenerat in intemperiem igneam: unde & naturales totius actiones læduntur, labefacta alteratrice ob morbum calidum. Calor autem igneus generatur in corde, vel Labefactata alteratrice cordis, in hectica: vel ob Errorem externum, in reliquis febribus: excipitur solum febris pestilens, in qua cordis solida substantia morbo afficitur.

*Explicatio
definitionis.*

Febris est calor. Cum in corde sint quatuor substantiæ: spiritus vitalis, sanguis, solida substantia, & calidum innatum: Auicennas hic per calorem, intelligit eum, qui ad substantiam calidi innati pertinet: non ad spiritum vitalem, sanguinem, aut solida: Loquitur enim de febre in genere, id est, de calore in facto esse, in omni febre. Calor autem hic est accidens, non substantia: quia calor febrilis communicatur è corde toti corpori: substantia autem calidi innati (cui calor ille igneus ceu subiecto inhæret) non deserit cor: proinde sola ipsius qualitas corpori communicatur.

Calor præter naturam.

Extraneus. Nec enim hic calor est secundum naturam: remanet tamen semper aliquis gradus calidi naturalis.

In corde omnis febris.

Accensus. Id est, non imminutus est calor, sed auctus. Ita tamen ut semper gradus caliditatis secundum naturam supersit: alias enim homo vivere non posset, si vinculum animæ, id est, calidum innatum, toto genere esset præter naturam. Hinc Auerrhoes cap. 3. lib. 3. collectan. ait, febrem esse calorem compositum è naturali & extraneo.

In corde. Licet enim calidum innatum in qualibet sit corporis parte: non tamen est febris, nisi calor toti corpori communicetur: quod à nulla parte fieri potest, præterquam à corde. Per cor autem intelligit partes cordis viuentes: non spiritus aut sanguinem, sed solidam cordis substantiam. In omni enim febre accensus est calor nativus cordis, & positus in calefacto esse: at solida cordis substantia in quadam febre

febre solum incalescit : in quadam vero penitus in calefacto esse, vt in hectica.

Pergit Auicennas. *Et procedens à corde, mediantibus spiritu & sanguine, per venas & arterias, in totum corpus.* Quoniam febris est morbus communis totius corporis : non sufficit dicere, quod febris sit calor accensus in corde : sed addendum, communicari vniuerso corpori : idque per spiritum & sanguinem : repente, non paulatim, per partem post partem : quæ transmissionis modum Galenus cap. 2. lib. de caus. morb. attingit. Hinc etiam Galenus cap. 7. lib. 1. de cris. ait febrem esse passionem venosi generis : quod non ratione febrium putridarum dictum est, vt multi perperam sentiunt : sed in genere, ratione omnis febris.

Addit : *Et inflammatur in ea inflammatione : non vt caliditas ira & laboris, cum non ultimatur : sed ita, vt sit impressa, & noceat operationibus naturalibus.* Calor cordis toti corpori celeriter impertitur, duobus modis : primum, vt calor præter naturam toti impertiatur, qui non sit morbosus, sed adhuc persistat intra limites sanitatis ; vt in ira : secundo, vt calor sit morbosus, ultimus, operationem lædens, vt in febris. Cum autem febris sit intemperies totius : necesse est primum lædi functiones naturales, quarum organum præcipuum est temperamentum, quod ad partes similes pertinet.

E dictis ergo tota erit febris definitio : quod sit calor præter naturam, accensus in corde, & hinc ad totum procedens, lædens operationes naturales.

Restant proprietates, quæ febris naturam consequuntur : eas igitur è definitione deducemus. Febris est calor igneus cordis : necessario igitur sequitur respiratio frequens : & exspiratio calida. Quatenus hic calor per arterias communicatur : pulsus sequitur celer. Prout fertur per venas : sequitur aliqua in lotio mutatio, vt ad flauum vergat colorem : nisi aliquid hoc prohibeat, nimirum crudorum succorum exuperantia, aut offensio meatuum vrinæ, aut assumpta. Tâdem quatenus hic calor impertitur toti : sequitur calor mordax. Hæc ergo signa possunt esse febris in genere.

Objectiones quædam deliuntur.

A. negat. I. *Contra totam finitionem.* In accidentis perfecta definitione, debet esse causa formalis, loco generis: subiectum, & causa efficiens, loco differentie. At ab Avicenna causa efficiens loco generis ponitur, non loco differentie: nam calor igneus in corde accensus est causa efficiens febris: formalis autem causa, est intemperies calida totius: ut cor sit subiectum causa efficientis, totum corpus subiectum causa formalis. Peccavit ergo Avicennas. **Responsio.**

Febris finitio formalis. Avicennas hic non tradit formalem definitionem, in qua prior lex locum habet, sed causalem: respicit enim tanquam Medicus, ad id quod magis indicat. Hinc tamen facile definitio formalis colligi potest: Febris est intemperies calida totius, ladens actiones naturales, producta à calore igneo cordis.

Omnis febris in causa languere subsistit. II. *Contra partes definitionis.* Num febris sit calor? In febris synopali statuit Avicennas pulsum esse tardum & rærum: quod friguitatem cordis arguit? **Responsio.** Si febris cum syncope inquitur: pulsum ab utraque mutari oportet: & magis à syncope, quia hæc febre est multo vehementior. Præterea in febricitantibus mori propinquum, respiratio solet esse frigida. **Responsio:** hoc fit ob cordis refrigerationem: & proinde etiam pulmones refrigerantur. Circa mortem autem affectus febrilis (sicut omnes etiam alij affectus) mutatur in frigidum, & cor frigida intemperie afficitur: tex. penult. sect. 4. lib. 6. epid. etiam si febris ardentissima præcesserit. Hinc Galenus ait in tumoribus calidis, si partes liuidæ fiant, tum degenerare in frigidos, cap. 2. lib. 2. ad Glauco.

Gradus caloris in febre. Quatuor etiam num calor in febre sit unica qualitas, an multiplex: cum sit secundum naturam, & conseruans: item præter naturam, & destruens? **Responsio:** Febris est vna calida intemperies calidi innati cordis: quæ tamen conflata est in pluribus gradibus: quorum quidam sunt præter, quidam secundum naturam: illi destruunt, hi conseruant & concoquunt. Vnde etiam medici duos habent scopos, nimirum cõseruationem gradus secundum naturam, & destructionem grad. præter naturam.

Num cor sit subiectum causæ efficiens. Dubitatur, num cor sit subiectum causæ efficientis, ut c. 4. lib. 1. de differ. feb. statuitur. Contra enim facere videtur, quod lib. 11. meth. dicitur, in omni febre cor affici simili intemperie, cum ea febre, in qua cor primo afficitur. At ubi cor primum est calefactum, est morbus in corde. Si ergo in reliquis febribus est similis affectus: in omni febre est morbus in corde: & proinde cor subiectum, est causa formalis, non efficiens? **Responsio.** Cum solida cordis substantia affici

afficitur, intemperies calida morboſa eſt, vt in toto: at in reliquis febribus ſimilis eſt intemperies, ſcilicet in qualitate, nō in eo, vt ſit morboſa: licet enim actiones cordis, vt pulſus, &c. in iis lædantur, id tamen non ſit ob morbum, ſed ob errorem externum, id eſt, ob calidum innatum igneum: quod innatum igneum, numeratur inter errores externos, quia eſt extra partis conſtitutionem.

Ambigitur, num totum corpus ſit ſubiectum febris? Si enim partes ſimilares totius ſunt in calefacto eſſe, & non in fieri: ſequi videtur omnem febrem eſſe hecticam? Reſponſio. Caliditas morboſa in facto eſſe, vel in habitu eſt, vt in Hectica: vel in habitudine vt in Ephemeris & Putridis. Et proinde licet in omni febre partes ſolidæ ſint in calefacto eſſe: quia tamen iſta caliditas, non ſemper eſt in habitu: non inde euinci poteſt omnem febrem eſſe hecticam. Vnde etiam Galenus, cap. 1. lib. 8. meth. febrem *ἐκλυὴν* & *ἀκλυὴν* diſtinguit. *Secunda ratio contra idem.* eſt, c. 5. lib. de inæqual. intemperie, In putridis, ait, ſolidæ non ſunt calidæ in facto eſſe: alias enim actio cuiuslibet particula laderetur, cum tamen quadam actiones non læduntur, vt conſtat.

Num totū corpus ſit ſubiectum febris.

Alia ratio ſoluitur.

Reſponſio. In hecticis febrib. eſt intemperies æqualis: vnde in his æqualiter læditur actio omnium particularum corporis: quia morbus ſcilicet in omni corporis parte exiſtit. In ephemera autē & putrida, eſt intemperies inæqualis: Non ratione diuerſarum qualitatum, quando eodem tempore, corpus ſecundum aliquas partes calidum eſt, ſecundum aliquas frigidum, aut partim ſiccum, partim humidum, cap. 6. lib. de cauſ. morb. ſed ratione eiſdem qualitatis calidæ, quæ in vna parte intenſior eſt, quam in alia, & in vna parte morboſa eſſe poteſt, in alia non morboſa. Et proinde in aliqua parte eſt ſanitas, in aliqua morbus: vnde in his febrib. quarundam, non omnium actionum, ſequitur læſio. Hinc ſit in ephemeris & putridis eſſe dolorem, quoniam vna pars violenter in reliquam agit: nullum, autem eſſe dolorem in hecticis, quia violenta & dolorifica actio non ſit ab æquali, ſed à proportionem maioris inæqualitatis. Vnde concluditur, totum corpus febrī ſubiectum eſſe: ita tamen, vt modo æqualiter, modo inæqualiter ſit affectum.

Vocatur etiam in diſceptationem, num febris affectus ſit tantum calidus: an vero calidus & ſiccus ſimul: id eſt, num ſit affectus neceſſario ſimplex, an compoſitus? Et videtur compoſitus: quia conueniunt refrigerantia & humectantia, cap. ult. lib. 8. meth. & c. 1. lib. 9. meth. Num febr. affectus ſit ſiccus.

quia etiam expreſſe id aſſeritur com. aphor. 16. ſect. 1. & cap. 3. lib. 1.

de temper. Responſio: febris neceſſario eſt morbus calidus, interdum etiam ſiccus: nec enim in ephemera, febris eſt morbus ſiccus: nam tum ſiccus dicitur morbus, cum ſiccitas eſt in facto eſſe: quæ ſane difficillime remouetur: at facile pellitur ephemera. Hinc Galenus cap. 2. lib. de cauſ. morb. febres re- cenſet inter morbos calidos ſimplices. Hinc etiam cap. 1. lib. 6. de loc. aff. idem ait, in febribus cauſis iecur affici dyſcrasia calida, ſæpe etiam ſicca, non tamẽ ſemper. Febris enim ſemper eſt calidum vitium, in facto eſſe, & caliditate morboſa: eſt etiam vitium ſiccũ, ſed non ſemper in facto eſſe, hec ſemper ſiccitate morboſa. Omnis quidem febris indicat refrigerans & humectans: ſed refrigerans ſemper eſt indicatum curatorium: humectans, eſt curatorium, ſi ſiccitas eſt morboſa, præſeruatorium vero, ſi non eſt morboſa ſiccitas.

CAPVT II.

De Cauſis februm primitiuis.

Αἴτια πρῶ-
τα τῶν κλι-
νῶν.




*Quomodo
his cauſis
febris exci-
tetur, ca. 2
lib. de cau-
mor. cap. 3.
lib. 1. de
diff. feb.*

Auſæ primitiuæ febris, eſt cap. 3. lib. 1. de diff. febr. vel Neceſſario, vel Non neceſſario occurrunt. *Neceſſario occurrunt*, ſex res non naturales: vt ſunt aër, cibus & potus, ſomnus & vigilia, inanitio & repletio, motus & quies, animi accidentia. Quantum ad aërem: Galenus ait, febres fieri propter frigiditatem, propter ardorem Solis, propter aerem peſtilentem, propter aerem corporis febricitantis, quem expirat, vt in febre peſtilenti, in phthiſi. Reſpiciens ad cibus, & quidem ipſius copiam: propoſuit capulam: reſpiciens ad qualitatem, propoſuit prauos cibos. Reſpiciens ad potum: propoſuit ebrietatem, Ratione ſomni & vigiliarum: vigilias propoſuit. Ratione inanitionis & repletionis: propoſuit cruditatem. Ratione motus: propoſuit laborem. Ratione quietis: propoſuit exercitia ſolita intermiſſa. Ratione animi affectuũ: propoſuit iram & trititiam. Cauſæ non neceſſario occurrentes, ſunt medicamẽta, venena, materiæ cheirurgicæ, præter rationem uſurpata. ab his ergo cauſis calor in corde præter naturam excitatur, ratione vel Motus, vel Caloris. Et trititia quidem à ſolo motu: ex ira, à motu, & à calore. Porro motus pertinet vel ad Animam, vt in ira, trititia: vel ad Corpus, vt in labore: motu animi primũ cor incaleſcit, deinde corpus: motu corporis, primum muſculi incaleſcunt, deinde cor: & calor ille muſculo

musculorum non est febris, nisi quatenus cordi communi-
catus, ab hoc in vniuersum corpus deriuatur. *Calor*, seu causa
calefaciens, vel Ingreditur corpus, vel Non ingreditur. In-
grediens substantia calida, calorem sane auget: vt sunt cibi,
portiones, medicamenta, venena calida. Calefaciens autem
citra motum, & citra ingressum in corpus, vel Extrinsecus
adharet corpori, vt contactus Solis, ignis, medicamenti ca-
lidi: vel iam in corpore reperitur: & hoc vel detinet calidum,
ne effluat: vel propter putredinem, calorem auget: quæ ma-
teria putrescens, si calorem simplicem cordi communicat,
producit ephemeram: si vaporem putridum, generat putri-
dam. Et hinc apparet, quomodo s. modi generationis calo-
ris, a Galeno propositi (*nimirum motus: adhæsiō rei calide, de-
tentiō calidi effluxus, mistiō calide substantiæ, putredo*) dichotomia
Platonica comprehendī queant.

CAPVT III.

*De Diuisione febrium: & primum de Diffe-
rentiis Principalibus.*

 Vicennas duobus modis febres diuidit, primum *Diuisio ve-*
secundum Aliorum sententiam, deinde secun- *terum, in*
dum Propriam. Alij enim diuidebant febres in *Principa-*
Principales, quæ non ab alio morbo oriuntur, & *les, & Ac-*
in Accidentales, quas falso putabant non esse morbos, sed *cidentales.*
saltem symptomata. Reiecit hanc diuisionem Auicenn: quia
omnis febris est morbus: deinde quia non est essentialis. A
Gale. tamen admittitur, aph. 66. & 73. sect. 4. & aph. 42. sect. 7.
Quia negari non potest, alias febres esse principales, alias
non principales, vt quæ sequuntur inflammationes & ob-
structiones partium. Improbatur eadē ca. 5. lib. de diff. morb.
quia non est petita à principalibus differentiis. Admittit ta-
men Auicennas febres accidentales, tanquam morbos: &
ait, febres abscessuum, & obstructionum esse accidentales.
Quod tamen postremum absurdum videtur. *Si enim febris ex*
obstructione orta, est accidentalis: tum omnis putrida est accidenta-
lis, quia pendet & fouetur ab obstructione, cap. 9. lib. 1. metho. Re-
sponsio. Obstructio vasorum, si consideratur extra viscera,
febrem principalem excitat: si intra viscera, est accidentalis
febris, quæ ab obstructione, & morbo alicuius visceris fo-
uetur: & hæc febris correspondet febri apostematis.

Obiectio cō-
tra Aui-
cennam.

Divisiones - Postea Auicennas diuidit febres è mēte propria: primum
Auicenna. per differentias principales, deinde per non principales. In
 quibus omnibus secundum Galenum ca. 1. lib. 1. de diff. febr.
 & cap. 1. lib. 1. ad Glauc. procedendum à summo genere, per
 subalterna, ad specialissima. Principales differentiae à febris
 essentia sunt desumendae, quatenus scilicet est febris: non
 principales autem à febre, quatenus est morbus.

Principa- Principales erēt differentiae sumuntur à febris essentia, id est, à
les diffi- calore: quò lib. 1. de diff. feb. trib. modis capitur: primum ut secundum
renia, à magis & minus differt: secundo, ut differt ratione subiecti. Tercio,
calore. ut differt ratione modi ipsius motus. Quia enim tribus modis
 quodlibet vitium vehemens dici potest: propterea his tribus
 modis Galenus distinxit calorem. Prima vehementia, est
 essentia eius, quod est praeter naturam: in qua essentia per-
 pendimus recessum à naturali statu: vnde quo maior est re-
 cessus, eo vitium est vehementius: Ratione huius vehemen-
 tia Galenus calorem febrilem distinxit secundum magis &
 minus. Hinc febris ardens est vehemens: quia calor inten-
 sus, & magnus recessus à statu naturali. Hæctica est debilis,
 quia calor debilis: Alia vehementia est dignitatis: quæ etsi ex
 alio etiam desumi possit, pertinet tamen hic ad subiectum:
 quo enim pars subiecta, in qua vitium residet, est obliuio-
 r: eo vitium vehementius. Sic inflammatio in pede est debilis,
 in hepate vehemens. Hac etiam ratione calor febrilis distin-
 guitur, prout viget, vel in spiritibus vitalibus cordis, vel in
 humoribus, vel in partibus solidis. Hinc hæctica vehementior
 est putrida & ephemera. Tertia vehementia est facultatis
 corpus regentis: ut si dolor sit insignis, est vehementia essen-
 tia: & quidem si sit in ore ventriculi, est vehementia digni-
 tatis: & si coniuncta est syncope, est vehementia facultatis.
 Et hinc differunt febres secundum modum motus caloris:
 qui modus motus nil est aliud, quam transitus velox aut
 tardus de vno subiecto in aliud. Sic in hæctica, calor febrilis
 agens in solidam cordis substantiam: progressu temporis
 potest etiam in humores & spiritus agere. Et in ephemera,
 calor primum agens in spiritus: potest etiam in humores &
 solidam substantiam agere. Hic igitur modus motus vel est
 Velox, cum calor transit à subiecto crasso ad tenue: vel Tar-
 dus, si à subiecto tenui ad crassum transit. Hinc hæctica reli-
 quis est vehementior, ratione facultatis corpus regentis, ra-
 tione modi motus, quia transitus sit velocior, à solidis, ad
 spiritus

spiritus & humores. Nec tamen hinc sequitur omnem hecticam necessario ephemeram & putridam habere coniunctam: quia hectica febris sua vehementia agit in spiritus & humores, non ut cor ponat in calefacto esse (tunc enim febres ephemeræ & putridæ orirentur) sed ut spiritus & humores à facultate regi nequeant, quod indicant, syncope, exustio spirituum, pulsus inæqualitas.

Ad hæc fundamenta reuocari possunt febrium diuisiones ab Hippocrate institutæ, text. 29. sect. 1. lib. 6. epidem. *Febres alia manni mordaces, alia mites.* Hæ differentię pertinent ad calorem maiorem, vnde febris mordax: & minorem, vnde mitis. Tactus enim hic ad calorem, id est, febris essentiam nos deducit. Deinde *febres alia sunt arida, saluginosa, πυρρὴ γώδης, id est, statu plena, tactus humida.* Hic auctor respexit ad vehementiam dignitatis, id est, ad differentiam caloris à subiecto. Per febres enim aridas, intelligit hecticas. Per saluginosas intelligit putridas: humoribus enim accensis, sit effluxus ad partes cutaneas, vnde quasi calida quædam tangi videntur. Per *πυρρὴ γώδης*, intelligit pestilentes, quas aspectu horribiles esse dicit. Per humectas, intelligit ephemeræ, quę in spiritu, id est, substantia vaporosa consistunt. *Præterea ait Hippocrates, alias febres esse valde rubras, alias liuidas, &c.* Et hoc ait ratione facultatis corpus regentis: calor enim hic signū est vehementię facultatis regentis. Febres enim rubrę sunt, in quibus licet sanguinem vacuare ad animi deliquium, quia vires tolerant, non concidunt. Febris ergo hæc rubra, non est vehemens, sed debilis, ratione facultatis regentis. Liuidę sunt febres, in quibus est defectus sanguinis & calidi innati, ut sunt febres in syncope.

Et hætenus de differentiis principalibus. Sequitur ut agamus de differentiis minus principalibus: prius tamen generalia quædam de MORBO præmittemus.

CAPVT IIII.

De morbi definitione generalia quædam proponuntur ad sequentem doctrinam scitu necessaria.



Voniam differentię febrium non principales, seu communiore, sumuntur à morbo in genere, locus hic postulat, paucis morbi naturam ut explicemus: quoniam ferme omnes hætenus mul-

Definitio morbi triplex esse potest. tum hac in re sunt hallucinati. Definitio igitur morbi triplex esse potest: quia ad operationem edendum tria concurrunt. Primum *facultas, qua corpus operatur*: & hoc præcipuum est. Deinde *suppositum, quod operatur*: unde non pupilla, non vitæ Tres cause videt, sed oculus. Tertio *instrumentum, cum quo, seu quo mediata operatio* facultas agit: & hoc licet multiplex esse possit, præcipuum tamen locum obtinet constitutio, id est, intemperies, compositio, & vnitas: reliqua omnia, quæ extra constitutionem sunt, habent rationem erroris externi. Quod si ergo hæc tria, *Tam sanitatem, quæ morbi tribus consistat.* id est, facultas, suppositum & constitutio bene se habeant: tum bona sit actio; si male, actio læditur. Et sicut ad bonam actionem necesse est, ut omnia tria bene habeant: ita ad malam, omnia tria male habeant, necesse est. Differentia tamen est: quia in sanitate requiritur non tantum facultas bona, & suppositum bene dispositum: sed etiam quælibet constitutio bona, id est, temperies, compositio & vnitas: at in morbo ut lædatur operatio, est quidem necessarium, ut male habeat facultas, ut male disponatur suppositum, ut non bona sit constitutio: non tamen requiritur, ut quælibet constitutio reddatur mala, sed sufficit ad malam operationem, vel intemperies, vel mala compositio, vel soluta vnitas. Si igitur respicimus ad facultatem: definitur morbus, *lesio facultatis, seu impotentia agendi*: & hac ratione omnis morbus erit in secunda qualitatis specie.

3. Finitio.

1.

2.

Si respicimus ad offensam suppositi: *morbis est dispositio præter naturam, lædens operationes*: qua ratione omnis morbus est in prima specie qualitatis. Si respicimus ad constitutionem: *morbis est constitutio præter naturam, lædens operationes*: & hoc modo morbus non potest ad certum genus reuocari, quia constitutio non est genus vniuocum, sed analogum, cuius analogata in diuersis reponuntur generibus: ut intemperies ad qualitatem refertur, magnitudo ad quantitatis predicamentum. Hinc ergo colligitur morbum esse læsionem facultatis: dispositionem præter naturam: & constitutionem præter naturam.

Deinceps morbi materia & forma inuestiganda. Sicut enim morbi forma & materia substantiæ compositæ sunt materia & forma, id est, ex potentia & actu: ita etiam accidentia sunt materia constant & forma. Et sicut materia & forma substantiæ, etiam ipsæ sunt substantiæ: ita materia & forma accidentium, sunt accidentia. E substantia enim & accidente non potest fieri vnum per se. Morbi igitur materia (non in qua, id est, subiectum, sed est lesio facta de qua, id est, causa, que est imperfectio: cum prior materia in qua, accidit

accidentibus tribuat perfectionem) seu potentia, est læsio facultatis (*non enim est causa formalis*). Ratio est, quia hæc potentia perficienda est: ac dependet immediate à mala dispositione subiecti: & dispositio suppositi, habet rationem potentiae, respectu constitutionis: ut constitutio mala in morbo sit forma, bona in sanitate. Constitutio autem mala est forma: quia perficit, & veluti dat esse dispositioni præter naturam, & læsioni facultatis: ut, quamprimum ponitur constitutio præter naturam, necessario etiam ponatur dispositio præter naturam, & læsio facultatis. Et propterea constitutio est id, quod primo & per se lædit actionem: est enim præcipuum instrumentum, & immediatum: ex hac deinde necessario dependet dispositio præter naturam: ex hac rursus necessario dependet læsio facultatis. Facultas quidem principaliter concurrat ad actionem obeundum: non tamen immediate, sed mediante instrumento, nimirum constitutione.

Licet igitur dictum sit, morbum tribus modis posse definiri: potissimum tamen per constitutionem definiri debet: hæc enim est forma & actus. Et sic etiam Galenus in lib. de diff. morb. definit morbum. *Constitutio ergo morbi genus est, nimirum actus, seu perfectio, tum dispositionis præter naturam, tum læsionis facultatis. Addit præter naturam: ad differentiam constitutionis secundum naturam: non ad differentiam dispositionis præter naturam, aut læsionis facultatis. Alij etiam addunt in morbi finitione: primo & per se lædens operationes: Quod ineptissimum. Si enim hæc particulae sunt distinguentes & determinantes genus: oportet esse aliam dispositionem præter naturam, quæ non primo læderet operationes: itemque aliam, quæ nec primo, nec per se læderet actiones: quod tamen falsum est: quia omnis constitutio præter naturam, primum & per se lædit operationem. Neque est quod aliquis dicat: in hydropse lædi sanguificationem à morbo frigido iecoris, quem, verbi gratia, produxerit frigidus lienis morbus: & propterea sanguificationem non immediate à morbo frigido lienis esse læsam? Responsio. Constitutio hic non sumitur pro morbo, sed pro causa alterius morbi: nam pro morbo, immediate læditur actio lienis, non hepatis. Galenus nunquam ait, morbum esse constitutionem primo & per se lædentem operationes: licet dicat, esse affectum primo & per se lædentem, &c. Affectus enim vox generalis est, potestque esse error externus, causa morbifica.*

Morbus per constitutionem definitus.

Præter naturam.

Περιστολή γὰρ τῶν ὁριστικῶν λέξεων ἐστὶν ἡ πρώτη, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς ὁριστικῆς λέξεως ἀπορρέουσα.

Obiectio.

*Vera mor-
bi differe-
ntia: in fini-
tione sur-
panda.*

1.

2.

3.

*Morbica
sa interior
officiis du-
plex.*

*Perfecta
morbi defi-
nitio.*

Quare ita morbus definiendus est, quod sit constitutio præ-
ter naturam, lædens sensibiliter operationes. Et hæc differentia est
necessaria: Constitutio enim est quædā præter naturam, quæ
tamē intra latitudinem sanitatis substituit: unde etiā c. 4. l. 4. de
temp. intēperies datur & sanitatis, & ægritudinis. A diectione

igitur illa constitutio nō morbosa, præter tamen naturam, re-
mouetur: vt etiā docet Gal c. 8. & c. 88. art. paru. & c. vlt. l. 1. de
fac. nat. Præterea explicata definitione morbi formali: quia
tamen forma hæc est accidens, quod aliqua perfectione eget,
quæ subiectū est ideo ad hoc addendum in definitione, quod
morbus sit constitutio præter naturam sensibiliter lædens
operationes corporis vite prædicti. Tandē etiā, in finitione acci-
dentiū requiritur causa efficiens, ad differentiā formæ sub-
stantialis, hæc enim materię inest sine vllō medio, nec pen-
det ab externa aliqua causa, vt simul sit essentia & causa rei
in substantia. Accidens vero producitur ab externa causa,
quæ ab essentia accidentis diuersa est: nec igitur minus ac-
quiescit in cognitione quiditatis accidentis, nisi etiam co-
gnoscat causam quiditatis, quæ est causa efficiens. Duplex
autem morbi causa efficiens: antecedens, & continens.
Antecedens est, quæ producit constitutionem ex vñ: ita
vt causa remota, constitutio tamen iam producta non sta-
tim remoueat: vt pituita in ventriculo excitans dyscra-
siam, frigidam: hic licet humor frigidus remoueat, mor-
bus tamen frigidus manet, & est ex vñ: opus enim est præ-
terea calidis medicamentis. Continens, seu continua causa,
est quæ producit constitutionem non ex vñ: ita vt causa
hac remota, sponte effectum cedat: sic enim inflammatio est
morbus, nimirum aucta magnitudo, quæ tamen ita produ-
citur à sanguine, vt hoc euacuato, sponte tumor dissipetur,
nec præterea quicquam sit agendum.

Absolutissima ergo hæc erit morbi definitio: *Morbū est
constitutio præter naturam, lædens sensibiliter operationes corporis
viventis, producta à causa morbifica.*

CAPVT V.

*Differentie
communes.
I. Constitu-
tio præter
naturam.*

De minus principalibus, seu communibus Februm differentiis.



In proposita morbi definitione tria continentur,
Forma, Subiectum, & Causa efficiens: à quibus
cōmunes febris differentie sumi possunt. Quā-
tum igitur attinet constitutionem, præter natu-
ram

nam, laudentem actiones: duo communia locum habent: primum, vt constitutio Est: deinde, vt constitutio Agit. Si perpendimus constitutionem vt Est: tunc vel perpendimus Tempus, in quo est: vel Modum secundum quem est. Si tempus: Febres alia Nouæ, alia Antiquæ. Modum consideramus vel Citra relationem ad alias res præter naturam, vel Cum relatione. Si citra relationem: Febris dicitur esse in Habitu, vel in Habitudoine: quæ differentiæ ponuntur cap. 1. lib. 8. meth. Si modus essendi cum relatione perpenditur: Febris alia dicitur Simplex, alia Composita: cap. 3. lib. 1. de differ. febr. Compositæ febres rursus, vel ipsæ sunt inter se compositæ: vel cum aliis rebus præter naturam: cap. 14. l. 1. ad Glaucl. Si inuicem componuntur: tunc vel hecticæ sunt cum ephemeris, vel cum aliis putridis: vt in speciali doctrina febrium compositarum dicitur. Aliæ res præter naturam, quæ cum febribus nonnunquam coniunguntur, sunt vel morbus, vt dyscrasia, mala compositio, soluta vnitas: vel symptoma. (Galenus cap. 4. lib. 3. de cris. ait, cum acutis morbis necessario coniungi vel febris, synochus, vel continuas biliosas. Vbi loquitur de morbis acutis secundum propriam naturam, qui habent materiam velocis motus, vel sanguinem, vel bilem: non autem loquitur de acutis relatione loci & partis affecta, vt est apoplexia, qua non necessario febrem habet adiunctam, cum tamen sit morbus acutissimus.) Symptoma autem, quod cum febre coniungitur, non est quodlibet, sed vehemens tantum, & quod rationem habet causæ, tex. 69. lib. 4. de vict. acut. & vtile indicat: vt si cum febre bis, aut semel appareat singultus, non statim dicendum, hanc febrem esse coniunctam cum singultu: oportet enim vt aliquantisper perseveret. Sic coniungitur febris cum actione læsa, vt cum paralyfi, cum syncope: aut cum exeunte mutato, vt cum fluxu alui, cum suppressione menses: aut cum qualitate mutata, vt cum insigni frigiditate: vnde & Auicennas in hoc cap. ait, febres alias esse calidas, alias frigidas. Hæc de constitutione, prout est.

Quantum ad constitutionem, quatenus agit: in hac operatione consideramus vel Tempus, vel Vehementiam. Si tempus: febris est brevis, vel longa. Si vim actionis, febris est Salubris, vel Insalubris.

Ratione subiecti, id est, corporis humani viuientis, febris est Proportionata, vt causus in corpore calido & sicco: vel Non proportionata, vt causus in corpore frigido & humido.

Quantum ad causam effectricem, quæ secundum propriam naturam agit, sumuntur differentiæ, vel à propria natura, seu idea causæ, vel à læsione ipsius causæ. Quantum ad ideam, causa efficiens, vel est Febris, vel quid Aliud à febre. Vnde etiam illæ differentiæ, quod Febris dicitur Incipiens, vel Non incipiens: verbi gratia, si febris hæctica fiat è calidioribus medicamentis, est hæctica incipiens: si fiat è putrida, aut ex ephemera, dicitur febris hæctica non incipiens. Quoad læsionem causæ: dicius causam antecedentem ita lædere, vt læsio vel sit Communis, vel Non Communis: vnde febres dicuntur Populares, vel Sporadicæ. Et communes subdividuntur: quia sunt vel Endemiæ, vel Epidemiæ: hæc quādo læsio communis fit in tota regione: illæ quādo in certa vrbet. cap. 1. 3. 4. lib. 1. de differ. febr. & circa initium lib. 1. epidem.

CAPVT VI.

Soluntur quadam dubia, circa diuisionem februm.

Synochus putredinis expers, ad ephemeræ pertinet.



Varitur, num præter tria prima februm genera, detur quartum. Videtur enim, primum synochus non putris, ad nullam trium primarum specierum referri posse: nam putrida non est: nec etiam ephemera, quia ultra diem durat? Responso: è c. 1. & 2. lib. meth. ephemera bifariam sumi potest: primum vt ephemera est & re, & nomine: calefacti enim sunt spiritus, si rem spectes: & diem non excedit, nomen si vrgeas: secundo, vt est ephemera re, non nomine: & huiusmodi est synochus sine putredine, quæ sit ob sanguinis feruorem, quo spiritus cordis inflammatur.

Pestis est putrida.

Istud etiam agitur, pestis quo referenda sit: cum à quibusdā febris à tota substantia dicatur? Responso: pestis est putrida: differt autem à putrida non pestilenti ratione causæ antecedentis, non ratione formæ: quia causa antecedens in pestilenti febre, est venefica, quæ à materia reliquarum putridarum differt per excellentiam putredinis, quæ excellentia facit, vt hæc materia euadat venefica.

Chylus in ventriculo putrescens, facit febrem putridam.

Quidam etiam aiunt, chylum, in ventriculo putrescentem, exci- tare febrem? Respōderi autem potest, febrem illam esse putridam: chylum enim putrefacto, vapores putres cor petunt: vnde de cordis humores ponuntur in calefacto esse: & sic fit putrida.

Dubita

Dubatur, num febris vehemens, maligna, mali minoris, & insalubris, coincidat, nec ne? Hoc vt soluatur, scire oportet, quid nam sit vitium vehemens malignum, mali moris, insalubre. Vitium igitur vehemens est vitium præter naturam, vehementer agens in virtutem. Vehementia autem est triplex. *Vehementia triplex.*

cap. 15. & 16. lib. de cūstit. art. & c. 12. l. 7. meth. Essentia, Dignitatis, Facultatis. Ratio numeri est: nam dum vitium vehementer agit in facultatem, facultas vel Resistit, vel Cedit. Si resistit: vitium lædit vel simpliciter, vnde oritur vehementia essentia: vel in respectu ad præstantiam actionis: vnde vehementia dignitatis ortum trahit. Et hæc vehementia dignitatis duplex est: aut enim respicimus Præcipuum facultatis instrumentum, quod est temperies: aut Partem, in qua sit actio: priori modo vehemens est dyscrasia: posteriori: vitium partis magis præstantis. Si facultas cedit: oritur vehementia ratione facultatis: vt si tumor paruus sit in ventriculo, cum syncope: hic tumor ratione essentia est debilis, magnitudo enim modice elata est: ratione dignitatis est vehemens, quia est in parte, quæ proximum habet consensum cum parte principe: ratione facultatis etiam vehemens est, quia inflammatio ita lædit, vt excitet syncopen. Per facultatem autem intelligimus & eam quæ totum corpus, & eam quæ partem determinatam regit. Totum corpus regens facultas, ad tria præcipue viscera pertinet, cerebrum nimirum, cor, & hepar: item ad cōmunia organa, nervos scilicet, arterias & venas. Signa autem vehemētia ratione facultatis, pulchre explicat Galenus cap. 14. lib. 1. ad Glauc. Vehementia enim facult. animalis cognoscitur è motu voluntario debilitato, item è delirio, quoties nimirum hæc vitio fiunt ob cerebri intempericiem: si enim motus imminuatur ob angustiam, vt in epilepsia, paralyti &c. tunc motus ablati non est signum vehemētia facultatis. Vehementia facultatis vitalis cognoscitur è pulsu debili. Vehementia fac. naturalis è reiectione sanguinis, primum tenuioris: deinde etiam crassioris. Alia etiam est vehementia facultatis quæ partem regit determinatam: vnde humorem malignum proponit Galenus, qui erodit, & putrefacit: vt abrasio partis signum sit vehemētia facultatis regentis partem determinatam. Porro vehementia non tantum pertinet ad morbum, sed etiam ad causam morbificam, & ad symptomata: non enim morbus tantum vehementer lædit, sed etiam causa & symptoma, vt colligitur è cap.

*Vehementia
etiā in cau-
sis & sym-
ptomatis lo-
cū habet.*

9.l. 8. meth. Vehementiam morborum proponit Gal. c.12.l. 7. meth. & c.3.l.1. de crisibus, vbi morbi magnitudinē & mores proponit: per magnitudinē morbi, intelligit vehementiā essentia & dignitatis, per mores intelligit vehementiā facultatis. Si causa morbi tripliciter vehemens est, c.12.l. 7 meth. & com. aph. 43. sect. 4. nā potest & magis recedere à naturali statu, & esse in parte præstanti, & lædere facultatem. Idem de symptomatis est statuendum: vt si dolor insignis in ore sit ventriculi, excitans syncopen.

*Maligni-
tas, & na-
xōdosa.*

Vitium malignum vocatur, à Galeno interdum, quod vehemens est ratione essentia, interdū, & magis proprie, quod vehemens est, ratione facultatis. Vitium mali moris etiam proprie intelligitur, quod vehemens est ratione facultatis.

*Nō semper
hectica a-
liis febribus succe-
dit.*

Quæritur, num, hectica incipiens detur: cum semper spiritus prius & humores, quam solida calefieri queant. Sciendum ergo, posse interdum hecticam statim ab initio prehendere: nam pro maiori vel minori resistentia passi, quandoque vnum, quandoque alterum afficitur: si enim in corde humor sit frigidus, & solida calida: tum probabile est, solida prius affici, à causa calefaciente: cap. 1. 7. & 8. libr. de diff. febr. cap. 5. libr. 10. meth. At hoc raro fit.

CAPVT VII.

De corporibus preparatis ad febres.

*Apti ad fe-
bres.*



Alenus ad febrem putridam disposita esse ait corpora calida & humida, ad ephemeram, calida & sicca. c. 7. l. 8. meth. Et his cap. 8. libr. 8. meth. addit corpora calida tantum, & sicca tantum, vt potest in quibus spiritus facile inflammatur: demum & corpora temperata, quæ symbolica sunt, contra, quam frigida & humida. frigidaque & sicca: postremo addit, reliqua temperamenta non ita facile vexari tentarique febribus. Corpora autem frigida & humida, item frigida & sicca, non facile febribus corripiuntur, quia frigidum maxime resistit causæ calefacienti. Dubitatur autem, quomodo aphorism. 16. sectio. 3. dici videatur, corpora frigida & humida maxime febribus esse obnoxia: Responso, Ibi humida tantum proponuntur: quæ absque dubio satis sunt obnoxia febribus putridis. Videatur commentar. 22. sect. 3. libr. 3. epidem.

CAPVT VII.

De Horis, seu Temporibus februm.

Athenus de Idea & Magnitudine febris: sequitur de eius Motu, qui cognosci nequit, sine temporum & horarum doctrina: vnde iam de temporibus febrium dicendi locus esse videtur. Proponemus igitur primum essentiam temporum: secundo differentias: tertio rationem tempora cognoscendi, vt appareat in quibus febribus reperiuntur.

Tempus sumitur dupliciter, è cap. 35. lib. ad Thrasylbulum: *Tempus* primo pro tempore materie remedij, id est, pro quando *quid.* agendum: deinde pro parte ipsius morbi, de quo iam loquimur. Hoc tempus definitur à Galeno cap. 35. & 37. l. ad Thrasylb. quod sit *motio causarum in corpore febricitante.* Vbi notandum tempus duobus modis accipi posse, nim. secundum suum esse vel formale, vel materiale. Secundum esse formale, tempus non est motus, sed numerus motus secundum prius & posterius, numeratur enim ab anima, à qua ita dependet, vt extra eam esse non possit. Secundum esse materiale dependet à cōtinuitate & successione, & proinde à motu: & sic esse suum non in anima habet, sed extra animam, vt sit quippiam reale extra animam. Et hoc postremo modo Galenus definiuit. Per causas autem in hac definitione Galen. intelligit id omne, quod habet vim agendi & lædendi: vt est non tantum causa morbigifica, sed etiam morbus & symptoma, in quibus omnibus tempus locum habet.

De temporum differentiis, dierumque medicorum computatione.

Tempora sunt 4. vt docetur cap. 2. lib. 1. de totius morbi temporibus: nim. Principium, Augmentum, Status, Declinatio. Et hæc tempora, vel sunt Vniuersalia, seu communia, quæ perpenduntur ratione totius febris: vel Particularia, seu determinata, quæ perpenduntur in accessionibus, seu periodis febrium. Tempora igitur vniuersalia pertinent ad tria, quoniam etiam tria sunt præter naturam: ad febrem, causam febris, & symptomata, quia hæc tria habent rationem lædentiis. Vnde apparet tempora non sumi ratione intensiōis & remissionis rerum præter naturam: nam in omni hectica à principio ad finem, febris parua, remissa & æqualis permanet, nec

*Temporū
febris par-
tisio.*

*Tempora
definiuntur
actione fe-
bris & na-
tura.*

nec intenditur. Oportet igitur vt tempora capiantur ab actione febris: *vt principium* febris sit, dum febris agere incipit, & eo tempore actio est ita remissa, & læsio ita exigua, vt natura nondum reagat. *Augmentum* est, dum febris magis lædit, ita vt virtus reagere incipiat. *Status* est, dum summa est actio inter febrem & naturam. *Declinatio* est, dum im-

Febris quo minuitur actio & læsio febris, ita vt virtus superet. Dum di-
instrumē- citur febris agere: per febrem intelligitur, vel causa effi-
to agat. ciens, vt calor accensus in corde: vel causa formalis, vt dys-
crasia calida partium similiarium viuentium totius corporis.

Natura vt Sic etiam virtus, seu natura, seu facultas, in reagendo du-
reagat. duplici vtitur instrumento: nimirum ratione cordis & cau-
sæ efficientis, vtitur calido innato cordis: rationis formæ,
vtitur temperie partium similiarium corporis. Pugna igitur
febris & naturæ, est inter gradus caloris secundum naturam,
& caloris præter naturam: in declinatione enim, verbi gra-
tia, ita incipit natura, vt prorsus deleantur omnes gradus
præter naturam, & causa efficiētis febris, & causæ formalis.

Vnde prin- *Quæritur autem vnde incipere debeamus numerare dies febris,*
cipium nu- Respondendum è cap. 3. lib. 5. Actij, numerandos esse dies, ab
merationis illo tempore, quo sensibilibiter læduntur operationes, id est,
dierum sit quo patiens eget decubitu, non autem quo decumbit: mul-
potendum. ti enim licet egeant decubitu, non tamen decumbunt.

Dies me- Porro de *die medicorum* notandum est, eum esse breuiorem
dicorum. vulgari: nam 20. dies vulgares, constituunt medicos dies
21. Galen. enim, cap. 9. lib. 3. de diebus decretoriis, ait, mensem
lunarem esse coniungendum cum mense apparitionis: quia
corpora febricitantia potissimum afficiuntur secundum mu-
tationem pertinentem ad hos menses. At mensis lunaris ha-
bet dies 27. horas 8. mensis apparitionis habet dies 26. ho-
ras 12. Ideo si duo hi menses vniantur, fiunt D. 53. H. 20. vt
vnus mensis habeat dimidium, nimirum D. 26. H. 22. Septe-
narius igitur medicorum absoluitur spatio 6. dierum vulga-
rium, & hor. 17. $\frac{1}{2}$: vt tres septenarij medici, absoluantur
diebus 20. vulgaribus, & hor. 47. dies enim med eus constat
horis vulgaribus 227. id est, scrup. primis 517. ita vit à singu-
lulis diebus vulgaribus paulo plus vna hora sit detrahen-
dum.

D. med.

D.med. D.vulg. D.med. H.

21—sunt 20.—Ergo 1.continet 22.51.25".

24. H.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 88 \quad 3 \quad 23 \\
 488 \quad (H. 22. 8+6-60-368 \\
 22+ \quad 2+7-1-77 \quad (51' \&c. \\
 3
 \end{array}$$

Principium febris totius (non paroxysmi) tribus modis dicitur, cap. 19. lib. 1. cris. primum pro morbi insultu: secundo pro tribus primis diebus, sicut accipiebat Thessalus: tertio pro quarta morbi parte, sicut nos in praesentia capimus. Hoc principium determinatur per cruditatem, materia enim cruda in virtutem agit, virtus autem seu calor non reagit. Et quidem si cruditas est exacta (cap. 17. lib. 1. cris.) prima principij pars est: si non exacta, id est, si aliqua leuicula sit coctio, est secunda pars principij. *Augmentum* est, quando natura euidenter agit in materiam morificam, id est, quando coctio euidenter apparet, ita ut humores vel coquantur, vel corrumpantur: tunc enim pugna est euident inter materiam & calorem. *Status* est, dum summa est pugna inter naturam & materiam, ut tum perfecta sit vel coctio, vel corruptio. *Declinatio* est, quando materia non modo exacte cocta est, sed etiam aliqua e parte euacuata: ad declinationem enim tantum pertinet materia concocta, nequaquam autem corrupta.

Obiecti autem hic posset, cur Galen. dicat lib. 3 de cris. in declinatione materiam esse coctam: parum tamen materia superesse, quando nondum sit cocta?

Responsio. In statu est necessarium, ut materia sit exacte cocta: non tamen necessarium est, ut semper tota sit exacte cocta: quia non semper est homogenea, alia enim tenuior, alia crassior est: sufficit igitur ad constituendum statum, ut materia perfecte sit cocta secundum maiorem sui partem. Morbus interim non redditur periculosus ratione materiae, seu portionis nondum coctae, quia est declinatio: sed potest tamen excitare nouum morbum, a quo periculum imminet: sic enim a reliquiis recidiunt fiunt. Et haec de temporibus

ribus vniuersalibus, quæ pertinent ad totam febrem, & ad materiam totius febris, & ad symptomata, quæ comitantur febrem à principio vsque ad finem, prout symptomata incipiunt, augentur, consistunt, & declinant.

Particul. Particularia tempora, non pertinent ad totam febrem, sed
tempora. ad periodos. *Periodus autem est tempus intensiōis & remissio-*
Periodus. *nis, cum febris ad eodem ad idem redit: vt, febris incipit verbi*
gratia hora 16. & redibit ergo hora 16. Et, febris incipit cum
rigore: redibit ergo cum rigore. In periodo autem clauditur
Typus. *Typus: qui nil aliud est, quam ordo intensiōis & remissionis com-*
prehensus à periodo. Typus autem est Primus, vel Secundus:
consistens, vel Mobilis: Simplex, vel Compositus. Primus ty-
pus est, quando in periodo brevis est accessio, & longa re-
missio; secundus contra: vt v. g. typus primus sit quatridia-
nus, à quo brevis accessio, longa remissio: typus secundus,
sit quotidianus, &c. Typus consistens est, qui seruat eandem
horam: Mobilis contra, qui vel anticipat, vel postponit. Sim-
plex est, qui pertinet ad vnicam tantum febris speciem; com-
positus, contra.

Tempora vniuersalia in singulis febribus declarantur.

Tempora Non a. eadem temporum ratio est in omnibus febribus.
febr. inter- Nam in febrib. materia quandoque mouetur à venis extra
mittentibus, venas: quandoque non mouetur, sed quiescit. *In febribus igitur*
in quibus *intermittentibus, in quibus primum materia mouetur de loco ad*
materia de *locum, sunt 6. tempora (cap. 4. & 6. l. de morb. temp.) nimi-*
loco ad. loci *rum principium, inæqualitas, incrementum, status, de-*
mouetur. *clinatio, & integritas, seu interuallum. Tota enim periodus*
diuiditur in accersionem, quæ pars est deterior: & remissio-
nem, quæ benignior: ad accersionem pertinent 4. priora
3. princi- *tempora: ad remissionem duo posteriora. Principium est,*
pium. *quando materia incipit moueri, & natura nondum coepit*
agere in materiam. Hallucinatus ergo fuit Fernelius, & recte
ab Altimaro reprehenditur, quod dixit, rigorem esse prin-
cipium accersionis: est n. tantum signum principii: quo-
niam si ad est frigus, vel rigor, est principium periodi: c. 3.
& 4. l. de tot. morb. temp. Quod si rigor esset principium:
tunc in omni principio accersionis necessario esset febris:
quod tamen falsum est. Nec tamen Altimarus recte loqui-
tur, qui voluit rigorem non esse principium febris, sed accer-
tionis.

fionis. Nam Galē. t. 39. l. 4. acut. viēt. inquit: dum frigus est, nō oportet cibare, nam febris imminet: si imminet: nondum igitur eius principium. Et in l. de inæq. intemperie ait: rigorem esse, dum materia nondum putruit: quod si materia nondum est putrida, febris etiam nondum est. Sic 2. c. 10. l. meth. ait, febrem inuadere cū horrore: si principium febris est cum horrore: ergo horror non est principium. Inæqualitas, seu *ἀνισότης* est, quando materia incipit putrescere, ita vt putridę fuligines cor petant, calorque febrilis extra cor diffundatur: & dum expanditur febrilis calor, natura aggrediatur pugnam aduersus materiam. Augmētum est, cum calor æqualiter est expansus per omnes partes, gradus vero intenditur, virtus reagit in materiam morbificam. Status est cum in calore febrili omnibus modis est æqualitas, id est, quando calor & expansus est per omnes partes, & seruat eundem gradum. Declinatio est quando est inæqualitas in calore secundum gradum, id est, calor minuitur, & natura vincit: & proinde ē Galen. penult. text. lib. x. de ratione viēt. ob victoriam naturę calor febrilis deserit cor, & inuadit extrema, ac pedes: propterea cibandus eo tempore est, calore ad pedes descendente. Integritas seu interuallum est, quando febris non adest. Hęc tamen 6. tempora, ad 4. possunt restringi: nam inæqualitas secundum partem priorem reducitur ad principium, secundum posteriorem, ad augmentum. Integritas vero non est tempus febris, sed periodi: & propterea Galen. cap. xi. lib. i. ad Glauc. admittebat, vt patientes quartanam febrem in interuallo propria obirent munera, seque exercerent: quod nō esset morbi eo tempore. Et hęc de febre intermittente, in qua materia mouetur de loco ad locum.

Datur vero etiam febris intermittens, in qua materia non mouetur de loco ad locum, sed retinetur in parte. Galenus enim cap. vi. lib. 2. de diff. feb. ait, interdum in corporis parte esse imbecillitatem, vt non modo generentur superfluitates, sed etiam vt hęc expelli nequeant: necessario igitur putrescunt: & propterea fit febris putrida: quę deducitur ad intermissionem, euacuata materia. Quia vero adhuc persistit, imbecillitas in parte: necessario adhuc regenerantur superfluitates: quę cum non possunt expelli, putrescunt, & aliam accessionem generant. In his ergo febribus principium est, cum superfluitas incipit putrescere, & tum in parte calor incēditur ratione putredinis, cuius caloris vi ad hanc partem fit fluxio

à reliquis

2. Inæqualitas.

3. Augmētum.

4. Status.

5. Declinatio.

6. Integritas.

Tempora febr. intermittētiū, in quibus materia non mouetur de loco ad locum.

1.

2.

2. à reliquis partibus : & proinde hoc tempore partes reliquæ, priuatæ calore & sanguinè, refrigerantur : vt hæc , refrigeratio sit priuatiua, non positiua. Augmentum est, cum à materia putrida fuligines putridæ cor petunt, ita vt accensi sint humores cordis ; & calidum innatum cordis sit redditum igneum : vnde calor febrilis in totum transmissus est : & hoc tempore natura in febrem agit , & natura partis agit in materiam. Status est , dum ad summum feruoris perducta est materia , & summa est pugna inter calorem & materiam.
4. Declinatio est , si natura superat , & euacuatur materia in hac victoria : & hoc quidem specie sudoris , si materia est tenuior, expultrix robustior, pori cutis rariores : si contra, euacuatio sit forma vaporis. Facta euacuatione non est amplius febris, sed integritas.

Tempora febris cōtinuæ. Continue febres ad integritatem nunquam deueniunt. Et hæc vel non habent tempora particularia , vel habent. Non habent tempora particularia, in quibus materia non mouetur, sed putrescit in magnis vasis , citra motum : & hæc absoluuntur vnica tantum accessione , nec habent periodos. Habent autem tempora particularia ex febres continuæ, in quibus materia mouetur : & motus est in venis. Motus vero hic, vel est ad venas remotissimas, & tunc quinque illa tempora, princip. inæqualitas, &c. satis sunt euidentia & distincta : vel ad venas non ita remotas, & tunc tempora non ita sunt distincta, sed principium, inæqualitas , & augmentum confunduntur.

Tempora febris hēctica.

Porro in febribus hēctici temporibus perpendenda sunt tantum ratione essentia febris : non autem ratione symptomatum, quia cum febris hēctica suapte natura sit debilis, debilia etiam sunt symptomata , vt horum tempora non sint perpendenda : nec etiam ratione materiae tempora sunt perpendenda, quia hēctica non fouetur à materia propria , vt tertiana. Deſumenda igitur tempora ab essentia , non ratione gradus febris, qui semper idem est : sed ratione actionis in humiditatem roridam cordis : cap. 9. lib. 1. de diff. febr. Principium ergo est, dum calor febrilis ita agit in humiditatem roridam cordis. Augmentum est, quando incipit consumi : & hoc tempore natura incipit reagere. In statu est, summa pugna, & facta est consumptio humiditatis roridæ, quæ fieri potest in hac febre salubri. Declinatio est, quando humiditas rorida incipit restaurari, propterea quod natura vincit.

vincit. In hac ergo febre virtus seu id quod agit, non est humiditas rorida (hæc enim patitur, consumitur, restauratur) sed facultas naturalis residens in corde, quæ calido innato cordis, & temperamento cordis, utitur pro instrumentis, secundum gradus naturales. Febris autem essentia, per gradus non naturales aduersatur humiditati roridæ, inflammando & consumendo.

In febre ephamera, quæ & re & nomine talis est, non possunt sumi tempora à materia, quia nulla est: nec à symptomatibus, quia hæc satis sunt debilia: nec ab essentia seu forma ephemeræ, quæ est morbus calidus in toto, non habens permanentiam ex usu. Capienda ergo sunt tempora ephemeræ ab eius essentia, quatenus hæc pertinet non ad causam formalem, sed ad efficientem: causa autem efficiens, erat spiritus vitalis, primo in corde accensus, qui calidum cordis reddit igneum: tempora ergo capi debent, ab hoc calore igneo reddito ut, vel incipit, vel augetur, vel consistit, vel superatur.

Tempora febris ephemeræ exquisita.

In febre, quæ re tantum, non autem nomine est ephamera, id est in syncho non putri, tempora capiuntur ab essentia, à materia, & à symptomatibus: & ab essentia, tum ratione formæ, tum ratione causæ efficientis: ut è superius dictis patet. A materia: quatenus hæc febris producitur ab excrementis ichorosis, à sanguine calidiore non putrefacto. A symptomatibus: dum hæc incipiunt, intenduntur, consistunt, & remittunt. Et hæc de temporibus vniuersalibus in febribus salubribus.

Tempora synochi impuriæ.

In febribus in salubribus & lethaliibus, non reperiuntur omnia tempora: non enim in iis est declinatio, quia in declinatione nemo moritur. Habent ergo interdum tria tempora: interdum duo: quandoque vnum tantum: prout mors fit vel in principio, vel augmento, vel statu: cap. 1. lib. de tot. morb. temp. In principio quidem fit mors, si febris sit valde vehemens, & virtus maxime imbecilla: si autem non sit tanta vehementia, nec tanta virtutis imbecillitas: æger in augmento moritur: si adhuc minor in statu: cap. 1. lib. 1. de crisiibus.

Tempora vniuersalia febrium in salubrium.

De temporibus febrium particularibus.

Et hætenus dictum sit, quomodo tempora vniuersalia in febribus reperiuntur. Deinceps docendum, quomodo particularia reperiuntur, & in salubribus, & in insalubribus. Quoad salubres: & primum quoad hecéticas: in his non reperiuntur tempora particularia. In ephemeris autem aliqui-

*Tempora
particula-
ria in fe-
bribus sa-
lubribus.*

bus reperiuntur: etiam si multi non sine maximo errore hoc negent: in quibusdam enim sunt accessiones non duæ tantum, sed etiam vsque ad septem. cap. 3. lib. 10. metho. necesse ergo est, vt in his etiam sint tempora particularia, quæ pertinent ad materiam morbosicam. Quoad putridas febres, hæc sunt Intermitteutes. vel Continuae. In intermitteutibus reperiuntur sexta tempora. Continuae vel sunt Continentes, vel Continuae proportionatae. Continentes non habent tempora particularia, sed tantum vniuersalia: quia vna tantum accessione absoluuntur. Continuae proportionatae, si materia putrescit in venis remotissimis, habent quinque tempora particularia: si in venis non ita remotis, quatuor.

*Tempora
particula-
ria in fe-
bribus in-
salubri-
bus.*

Quantum ad febres *insalubres*: hæc possunt habere tempora quatuor, vel tria, duo, vel vnum, vt docetur cap. 9. lib. 3. de cris. Occidunt enim potiss. in principio, dum materia est vel copiosior, vel crassior; vel coniuncta est magna inflammatio: occidunt etiam in augmento & statu, dum vehementia rerum præter naturam est mitior: occidunt denique in declinatione, propter virtutis imbecillitatem: quæ quamuis potuerit resistere vehementiæ rerum præter naturam per tria tempora, ob imbecillitatem tamen dissoluitur habitus, id est substantia calidi ignati, vnde mors in declinatione.

Dubia quadam circa febrium tempora discutiuntur.

*Quando
coincidunt
tempora
vniuersa-
lia, ab es-
sentia, cau-
sa, & sym-
ptomati-
bus sum-
pta.*

Quæritur autem de temporibus cum Vniuersalibus, cum Particularibus, num coincidunt ea, quæ à materia, Symptomatibus, & essentia sumuntur? Hoc ad curationem multum facit. De vniuersalibus. Si conferatur essentia febris, cum materia, quæ fuit in causa febris, & cum symptomatibus pathognomonici: tum tempora coincidunt: vt eodem tempore sit principium ratione essentiae, ratione materiae, & ratione symptomatum. Ratio est: nam quoad materiam: ab hac efficitur & fouetur febris, vt dum vis materiae est debilis, etiam febris sit debilis. Hic tamen notandum, paritatem esse seruandam. ratione copiae materiae, & essentiae ipsius febris: nam in synocho decrescente ratione materiae non est declinatio, sicuti ratione febris, quæ decrescit: & ratio est, quia non seruatur paritas materiae, cum hæc euacuetur: non tamen est declinatio ratione materiae, quia materia non est concocta & victa.

Quoad symptomata pathognomonica: horum etiam tempora coincidunt cum essentia febris: quia febrem, vt vmbra corpus

corpus sequuntur. *Obiectio.* Quomodo igitur ait Galenus com. 19. aph. sect. 2. in statu fortiora esse symptomata: morbum a. siquidem lubris sit, mitiorem? *Responsio:* in statu morbus est vehementior, ratione essentia: & sic etiam symptomata in statu sunt vehementia, ratione essentia: sed ratione facultatis regentis, fieri potest ut symptomata tunc sint initia. Sic etiam t. ult. lib. 3. de vict. acut. dicit, affectum esse mitiorem, id est debilem, scilicet ratione facultatis: symptomata autem fortiora, id est intensiora, scilicet ratione essentia.

Quod si vero conferatur febris, cum materia noua, & symptomatibus non pathognomonicis: tempora non coincidunt. Ratio est: nam materia noua agere incipit, dum morbus est in augmento: similiter symptomata non necessario dependent à febre, ut propterea non habeant idein tempus.

Similiter statuendum est de temporibus particularibus, quod ratione essentia non coincidunt: nam materia in accessione primum facit rigorem, antequam febrem efficiat: proinde aliud est tempus febris, aliud materia.

Controuertitur etiam, num in omni febre salubri reperiantur quatuor tempora. *Responsio.* Affirmatur à Galeno cap. 1. li. de tot. morb. temporibus: & cap 7 & 17. li. 1. de cris: ita ut etiam in detruncatione colli reperiantur. *Obicitur autem quod Galenus cap. 2. lib. de tot. morb. temp. ait, quia in instanti generantur, ut febris, cavere ex principio?* At respondendum, principium essentia, non capiendum à febre, ut generatur: producitur enim veluti in instanti: sed ab essentia febris, ut est genita febris, ita ut incipiat agere: hoc enim est principium. *Obicitur etiam à cap. 47. lib. ad Thras. acutos morbos, quamprimum inuadunt, ad summum ascendere, & proinde cavere augmento?* Respondendum, è cap. 4. lib. de morb. temp. in morbis salubribus 4. reperiri tempora, sed non semper ex usu, quia interdum celeritate pertranscunt, nec satis semper perdurant: ut contingit in acutis. *Obicitur denique, ex eodem loco proxime citato, nim. cap. 47. lib. ad Thras. morbos qui indicantur, cavere declinatione?* Respondendum: omnes morbos salubres habere quatuor tempora, nisi præsidio vel naturæ, vel artis tollantur: vnde Galenus cap. 9. lib. 3. de cris. ait, morbos carere declinatione ob crises repentinas.

Quæritur, num mors contingere possit in declinatione uniuersali. Negatur cap. 5. & 9. lib. de cris. vnde & Hippocrates aph. 45. sect. 2. lib. 1. epid. ait, coctionem polliceri securitatem: & *Nū quis mori queat, in declinatione uniuersali.*

ratio est, quia natura superat, & victrix est. *Obiicitur tamen: homo potest mori in declinatione particulari. Et etiam in vniuersali. Responso consequentia: nam virtus est fortior in principio vniuersali, in quo est declinatio particulari.* Responso. In declinatione vniuersali, natura iam victrix est, & superauit: non agit & superat. Contra vero in particulari declinatione materia morbifica ratione totius vincendum est victa. Notandum autem hoc loco, quod si materia sit heterogenea: tum ratione portionis crudæ, mortem posse contingere, etiam in declinatione vniuersali: non tamen fit mors in declinatione huius morbi, sed in alio tempore morbi noui subsequenter, seu recidiuæ. *Obiicitur etiam è text. 67 lib. 3. prognostic. in peripneumonia non sufficere coctionem, sed etiam expuitione opus esse: posse enim ægrum mori, etiam facta coctione, id est, in declinatione, nisi expuatur.* Responso. Periculum mortis non impendet ratione huius morbi, sed alterius succedentis: materia enim excrementitia, licet cocta sit, nisi expuatur, corrumpitur, nouumque facit morbum, in quo (ante tamen noui huius morbi declinationem) æger moritur. *Obiicitur etiam è cap. 4. lib. de temp. tot. morbi: in detractione ceruicis reperiri quatuor tempora, & tamen esse mortem?* Respondeo. Ratione detractionis sunt quatuor tempora, hic enim (quia motus fit successiue) incipit & desinit: at ratione solutæ unitatis præter naturam, hæc in principio interficit. *Obiicitur denique è cap. 4. lib. 9. meth. in syncho decresciente hominem posse mori?* Responso. In syncho decresciente est declinatio, sed ratione febris essentialis, non autem ratione materiz: hæc potest esse in principio, augmento. Sicut etiam Auicenn. ait, hominem posse mori in declinatione variolarum: quia est declinatio ratione variolarum, non tamen ratione morbi & febris.

Signa temporum Vniuersalium.

- Signa temporum vniuersalium potissimum referuntur ab Auicenn. ad Statum. Proponuntur autem duodecim.
1. *Species morbi.* 1. *Idea, seu species morbi,* quæ potissimum per motum significat statum futurum; velox enim motus, significat statum cito futurum: tardus, tardum. Diximus ideam potissimum significare per motum: nam significat etiam per vehementiam: vt febris vehemens secundum essentiam: qualis est ardens, significat cito statum futurum. Sic morbus vehemens
- ratione

tatione dignitatis, vt inflammatio pulmonum; indicat cito statum futurum. Sic morbus vehemens ratione facultatis regentis, vt febris pestilens, significat cito futurum statum.

II. Signum est motus agnitudo, ratione accessionum: paroxysmi enim breues, significant statum proximum: longi, longinquum. Quod si febris prorsus nullos habeat paroxysmos, vt continua: indicatur status omnino proximus. *III. Signum est Figura:* Si enim facies, vna cum hypochondriis cito extenuetur: tum indicatur febris acuta, & velocis motus: si autem corpus non minuitur: secundum comment. aphor. 28. sect. 2. signum est longitudinis: quia hoc fit ob cutem densam, aut humorem crassum. Notandum, hoc signum in febre tantum vehemēti locum habere: nam in ephamera, licet hæc breuis sit, non tamen mutatur figura.

III. Signum est virtus: si enim virtus cito fiat debilissima: dicatur morbus acutus, & velocis motus. *V. Signum est tempus anni, & ætas:* si enim hæc vergant ad caliditatem: indicant materiam calidam, & breuitatem morbi: si ad frigiditatem: contra. Huc etiam pertinet calī status, regio, consuetudo, institutum vite. Eadem etiam ratio est mensis, ac diei. Aëtius enim cap. 162. sermo. 3. li. 1. mensem lunarem diuidit in quatuor septimanas: e quibus prima à nouilunio assimilatur veri, & febres quæ in ea incipiunt, non sunt admodum longæ: altera assimilatur æstati, & febres huius sunt breuiores: tertia quæ incipit à plenilunio, assimilatur autumnō, & febres parit longiores: quarta assimilatur hyemi, & febres huius adhuc longiores. Sic & dies aphor. 15. sect. 1. lib. 6. epid. diuiditur in quatuor partes: in tempus matutinū, quod veri assimilatur: in meridiem, quæ æstati: in vesperam, quæ autumnō: in noctem, quæ hyemi. Hinc nocturnæ febres sunt longiores diurnis, quia nox assimilatur hyemi: quod verum est ratione humorum, interdiu enim mouentur humores calidiores, noctu frigidiore. At ratione præsidiorum, diurnæ febres sunt diuturniores nocturnis, secundum apho. 6. sect. 3. lib. 1. epid. quia materiæ præsidiorum noctu non commode administrari possunt. Vt enim hoc signum valeat, oportet esse paritatem in copia & quantitate materiæ: nam si æstate febris fiat à materia copiosa & frigida: hyeme, à non copiosa & calida: tum certe febris hyemalis erit breuior. Oportet etiam febres esse eiusdem speciei: vt febris biliosa æstiuā, breuior est biliosa hyemali: fieri tamen potest vt biliosa

hyemalis, sit breuior quotidiana æstiuæ. Oportet etiam febrem fieri à materia: nam simplex intemperies calida, sine materia dubio procul longior est in æstate, quam in hyeme. Postremo oportet materiam esse excrementitiæ, non alimentalem: nam materiam alimentalis in hyeme citius concoquitur.

6. *pulsus.*

7. *rigor.*

V l. signum, est pulsus frequens, velox, magnus: indicatur febris acuta, & velocis motus. *V l l. Signum est rigor:* Si enim febres incipiunt cum rigore, sunt longiores: rigor enim significat materiam esse minus vehementem, ratione facultatis, quia computruerit extra venas. Rigoris autem absentia, significat materiam putrescere in venis, & vehementiorem esse, ratione dignitatis, & ratione facultatis, ideoque breuior: ratione dignitatis, quia materia est in venis: ratione facultatis, quia facultas non potest expellere extra venas. Rigor etiam præsens, si sit breuior, febrem indicat breuiorem: est enim à materia pauca.

8. *hora accessio-
nis.*

*V l l. signum est hora accessio-
nis:* Si enim febris incipit eadem hora, significatur longa: Si anticipat: siquidem anticipatio est inæqualis, significatur augmentum, si æqualis, status. Si postponit, indicatur declinatio. Locum autem habet non quælibet anticipatio, sed quæ effatu digna est: cap. j. lib. i. de cris.

9. *vehementia
symptomatum.*

I X. signum, vehementia symptomatum in accessionibus: si enim symptomate intenduntur, significatur augmentum: si remittuntur, declinatio: symptomatum enim vehementia: indicat vehementiam materiæ morbificæ, & hunc motum velocem.

10. *duratio
accessionis.*

X. signum, longitudo & breuitas accessionum: Si enim accessio posterior, longior est priori, indicatur augmentum: si contra, declinatio.

11. *dispositio
euacuationis.*

X l. dispositio euacuationis: Si enim in priori accessione fiat euacuatio per sudorem, & succedens accessio sit vel æque longa cum priori, vel etiam longior: indicatur febris longa, & materia copiosa.

12. *coctio
& cruditas
urinae.*


X l l. signum, coctio & cruditas, in urina. In lotio ergo sunt signa cruditatis, coctionis, vel corruptionis: eaque debilia, euidencia, vel perfecta. In cruda urina, substantia est tenuis: color albus, nulla contenta. In coctione debili, lotium tenue: color ab albo ad rufum vergens, contentum aliquod in lotio. In euidenti coctione, lotium aliquam habet crassitiem:

sitiem: color magis accedit ad rufum: in vrina conspicitur nebula. In coctione perfecta, lotium habet mediocrem crassitiem: colorem rufum, vel subflauum; rufum in corporibus temperatis, subflauum in calidioribus biliosis: hypostasis lotij alba, laevis, æqualis. Debilis corruptio significatur lotio tenui: colore subnigro: contentum nullum adest. Corruptio euidentis si sit, lotium è parte euadit crassum: nigredo augetur: nebula conspicitur, non albicans, quemadmodum in coctione, sed liuescens, & subnigricans. Si perfecta est corruptio: tota lotij substantia est nigra, & cum sedimento nigro. Ex his igitur signis coctionis & cruditatis Galenus cap. 16:

lib. 1. de cris. pronuntiat: si vrina aquosa permaneat, indi-

tari statum longinquum: significat enim materiam maximam cum difficultate concoqui.

Quod si autem post cruditatem appareant signa coctionis, bonum: si corruptionis, lethale. Methodus autem Auicennæ Semeiotica, hæc est.



*Sequitur designis indicantibus tempora
particularia.*

Principium indicatur è pulsu coarctato, propter materiam *Principij*
suffocantem: vt pulsus ita coarctus, sit tardus secundum dia- *signa.*
stolem, rarus secundum internam quietem, quæ diastolem
præcedit: præterea velox secundum systolen, & frequens
secundum externam quietem, quæ systolen præcedit. Maior
n. necessitas est in expellendo, quam in attrahendo: & pro-
pterea velocitas ac frequentia magis pertinet ad systolen.
Secundo indicatur principium particulare, è colore plum-
beo, subliuido, frigore extremorum, pedum, manuum, na-
rium, &c. calor enim cum spiritu & sanguine, ad partes inte-
riores reuocatur. Tertio indicatur è pigrizia: nam partes mo-
tui voluntario destinatae, sensuque tactus præditæ, aliqua è
parte molestantur à materia morbifica: & eo magis, quo
magis, quo magis mouentur. Quarto indicatur princi-
pium ex angustia, id est, tristitia & dolore: idque propter ri-
gorem horroremque. Quinto, indicatur è somno profundo:
inter initia facile dormiunt ægri: dum enim calor ad cor re-
trahitur, cerebrum aliquantisper refrigeratur. Sexto indi-
catur, quod ægri vix palpebras alleuare possunt: quia, vt in
tertio dictum est signo, materia mouetur extra, & partes mo-
lestat. Septimo indicatur, quod in ore saliuæ exsuperat: nam in
principio accessions sit concussio, rigor & horror, secun-
dum partes oris: cuius ratione materia saliuæ exprimitur,
quæ residet in glandulis circa linguæ radicem. Octauo, tus-
sis molestat plerumque: quia tenuis portio illius humiditatis
salialis ad principium tracheæ protruditur: vnde tussis sic-
ca. Nono, æger in principio & statu, magis cruciatur, quam in
augmento: nam in incremento nec calor est summus, vt in
statu: nec ita cōcētratur, sicuti in principio. Et hæc sunt signa
principij particularis *presentis*. Ad præcognoscendum autem
principium particulare *futurum*: obseruare oportet horam
præcedētis paroxysmi: vt si secundus paroxysmus anticipet
per horas, probabile est tertium paroxysmum posse anticipa-
re per duas horas: cap. 7. lib. 1. de diff. febr. *Augmentum* indi-
catur è pulsu magno, frequenti, & calore expanso ad omnes *Augmenti*
partes. *Status* indicatur è summo calore, eoque consistente, *Status si-*
qui nec augeatur, nec minuatur: item, è vehementia sym- *signa.*
ptomatum: & è pulsu maiori, veloci, frequentiori, quam fue-

Declinatio nt antea. *Declinatio* indicatur è remisso calore : pulsus penè
nis signa ad naturalē accedit: adest sudor, & tandem febris eradicator
tum vera, & hæc quidē vera sunt in declinatione salubri. Interdum ve-
rum falsa. ro etiam in declinatione mortali, est quædam dispositio, si-
 milis dispositioni salubri: hæc tamen à salubri distingui-
 tur è pulsu, capite nono, libro tertio, de cris. Si enim
 calor febrilis remittit: pulsus tamen ad naturalem non
 accedit (vt in salutari declinatione) sed contra fit de-
 bilis, magisque inæqualis, ac inordinatus: cum declina-
 tio est læthalis.

CAPVT IX.

*De ephemera febre.**Nomen.*

Definitio.
Modus ge-
nerationis.

Ephemera sæpe, in morbos graues & incurabiles
 transeunt, si negligatur earum curatio: c.vlt.lib.
 octauo, meth. c.2. lib.1. ad Glau. Vocantur eph-
 mera, quoniam non pertranseunt diem: com.
 aphor. 55. sect. 4. & cap. 2. libr. 10. meth. quippe cum calor ipsa-
 rum in substantia tantum spiritiuosa subsistat. Ephemera au-
 tem est febris producta à spiritibus vitalibus præter naturam
 excafactis. Modus generationis est talis: Causa calefaciens
 primum in calefacto esse constituit spiritus vitales, in corde
 existentes: Licet enim interdum causa calefaciens sit pri-
 mitiua, quæ alia parte prius calefaciat, quam cor: quemad-
 modum radij Solares primum calefaciunt caput: illa tamen
 caliditas, à parte excafacta impertitur cordi, vt spiritus vita-
 les cordis imprimis ponantur in calefacto esse: vnde calidum
 cordis innatum redditur igneum: hincque toti calor com-
 municatur.

De causis ephemerarum.

Causa eph-
mera.

De causis ephemeræ Galenus diligenter loquitur, c.2. l.1.
 ad Glau. & c.vlt. lib.2. de cris. & c.2. atque 5. lib.8. meth. Causa
 igitur morbifica, vel per Motum, vel per Calorem, vel per
 Vtrunque agit: vt supra c.2. diximus. Per calorem agens vel
 Actu, vel Potetia: item, per Se, vel ex Accidente. Et hæc cau-
 sa est Primitiua, vel Antecedens: pertinetque (cap. 85. art.
 par.) ad assumenda, facienda, retinenda, extrinsecus occur-
 rentia. Assumenda excedunt copia, vel qualitate. Facienda ex-
 cedunt, vel deficiunt. Extrinsecus occurrentia hic perpen-
 duntur, quatenus nimis calefaciunt. Quæ retinentur: itea vel
 euacuantur cum debeant retineri: vel retinentur, cum de-
 beant

beant euacuari. Adhæc ergo capita respiciens Auicennas: quantum ad faciendâ: proponit laborem, iram, tristitiam. Quoad assumenda: crapulam, ebrietatem, &c. Quoad extrinsecus occurrentia: dolorem, apostema externum, id est, bubonem. Quoad retinenda: obstructionem, quæ tamen adeo magna non est, vt in putridis febribus. Notandum autem, quod ait, proprium esse ephemerarum, non fieri à causa antecedente, sed à primitiua. Id quod Galen. cap. 7. lib. 1. de differ. febr. non quidem proprium, sed inseparabile facit ephemeræ. Hoc tamen videtur dubium esse: nam Galenus cap. 4. lib. 8. meth. proponit ephemeram ex obstructione, quæ non fit à causa externa, sed ab antecedente. Et binc cap. 1. lib. 9. meth. & cap. 2. lib. 10. meth. ait, solui unica die, vt fit & re & nomine ephmera. Responsio. Ephmera, vel re & nomine talis est, vel re tantum. Re & nomine, quando diem non transcendit, calorque in spiritibus est accensus. Hæc duplex est: altera exacte exquisita, altera non exacte exquisita. Exacte exquisita est, quæ Galenus cap. ult. lib. 8. meth. & cap. 8. lib. 5. meth. ait, non esse in fieri, sed in facto esse, vt hectica, id est, non foueri à causa interna. Non exacte exquisita est, quæ fit ex obstructione ita exigua, vt diem non pertranseat: & hæc à causa antecedenti fieri potest. Ephmera re tantum, est febris synochus sine putredine calor enim eius accensus est in spiritibus: sed tamē diem transit: & hæc quoque fieri potest à causa antecedente. Loquitur ergo Auicennas, de exquisita exacte.

Num ephmera causam habeat antecedentem.

De signis ephemerarum.

Auicennas septem proponit signa. I. est, quod ephmera exacte exquisita non fit à causa antecedente, sed à primitiua. II. signum est, quod non incipit cum coarctatione pulsus, vt putrida: quia in ephmera non fit concentratio caloris & sanguinis, sicuti in putridis. Præterea, vt plurimum: (non tamen semper:) inuadit sine rigore, pigritia, somno, &c. quæ in inuasionibus aliarum febrium apparent: Causa huius est: quod non adest materia, quæ per partes sensitiuas mouetur, vt in putridis. III. signum est calor mitis, parum mordax. cap. 7. lib. 1. de diff. febr. residet enim in subiecto vaporoso. Et hic in quibusdam ephemeris, primo contactu mitis apparet, vt in ephmera ab ebrietate: in quibusdam, vt in ephmera ex ardore solis, cutis calor primum apparet mordax, deinde

*1. Causa.
2. Modus inuadendi.
3. Caliditas.*

IIII. Vrina.

deinde fit mitis, quoniam procedit è spiritibus. *IIII.* signum est, quod in vrina primo die apparet concoctio, vrinaque rufa est, seu bene colorata. cap. 7. lib. 1. diff. febr. cap. 2. lib. 1. ad Glau. cap. 13. lib. 2. de crisi bus.

De natura lotij in genere.

Vt autem horum symptomatum ratio reddi possit, lotij natura paucis explicanda. Lotium igitur est excrementum tenue, genitum è portione aquosa eorum quæ per os sunt assumpta.

Vrina formam recipit renis.

Est igitur serosum hoc & aquosum excrementum chylificationis: & conficitur in ventriculo: formam autem vrinæ, vt nimirum dicatur excrementum sanguinis, suscipit in venis cauæ ultra sinum iecoris, non in venis portæ ad cauum

Calor vrinae.

iecoris. In venis autem, dum coquunt, duplex segregatur excrementum: alterum tenue, crassum alterum. Tenue, est bilis excrementitia, quæ genita in iecinoris parte fina, non fuit expurgata per vesicam felleam: & propterea in venas perducta, beneficio caloris venarum miscetur cum excremento seroso: vt hoc, licet in ventriculo album fuerit genitum, in venis tamen cauæ, ob mixtionem bilis excrementitiæ,

Hypostasis vrinae.

reddatur coloratum, subflauum, subrufum. Crassum excrementum venarum, est portio; quæ non exacte miscetur cum excremento seroso: & propterea degenerat in contentum,

Vrina optima.

nebulam, hypostasin: Quod si ergo nullum sit vitium in assumptis, in ventriculo, in hepate, in venis: generatur lotium optimum: substantia eius mediocriter erit crassa: color vel subrufus in frigidioribus corporibus, vel subflauus in calidioribus: sedimentum album, læue, æquale. Optimum etiam mingitur lotium iam generatum, si nullum sit vitium in partibus per quas pertransit, vt in renibus, in vesica, in meatu vrinatio.

Ratio redditur vrina in ephemera.

His ergo sic breuiter explicatis: cum in ephemera vitium fit in spiritibus, non reliquis partibus: recte dixit Galenus, vrinam in ephemeris similem esse naturali, vt exigua admodum sit mutatio: magis tamen esse coloratam, quam secundum naturam, quia calor febrilis per venas diffunditur. Hoc autem verum de ephemera, quatenus est ephemera: si enim aliquid connectatur, quod lædat partes prius propositas: mutatio etiam in vrina fiet: vt si ephemera sit è cruditate, lotium euadet crassius.

V. pulsus.

V. Signum est pulsus bonus, sine signis inflammationis, non inæqualis in vna arteriæ compulsionem, vel leuiter saltè inæqualis; qui soluta febre statim ad naturalem redeat: id quod

quod proprium & inseparabile est ephemerarum, cap. 2. lic. 1. ad Glau. Addit Gal. c. 7. lib. 3. de prælag. è puls. pulsuum ephemeræ mutari in magnitudine, celeritate, & crebritate, vt fiat magnus atque vehemens. Præterea ait cap. 7. li. 1. de diff. febr. inseparabile & proprium esse ephemeræ, quod pulsus ad magnitudinem & celeritatem effatu dignam accedit, quod frequentia à proportionem deficit secundum exteriorem quietem, vt nullo modo systole ad celeritatem tendat, vel (si hoc aliquando contingat) ita leuiter, vt vix percipiatur. Pulsus etiam ephemeræ dicitur æqualis, mollis, ordinatus c. 13. l. 2. de cris.

Vt autem tum hac, tum quæ in reliquis febribus de pulsuum affectionibus, recte intelligi queant: doctrina pulsuum paulo altius repetenda fuerit. Quare docebimus quid pulsus, quot eius differentiarum, quæ differentiarum causæ, & quomodo cognoscantur.

Pulsus est motus dilatationis & contractionis arteriarum, procedens à vi pulsifica, vt seruetur calor insitus partium. Per partes, intelligo omnes, excepto corde: sic enim Galen. cap. 10. lib. 16. de vsu part. ait, arterias propterea inferi partibus, vt seruent caloris symmetriam in omnibus præterquam in corde: id quod arteriæ motu efficiunt: cuius beneficio calidum innatum nec dissoluitur, nec suffocatur, nec ignescit.

Ex his differentiarum pulsuum facile patent. Pulsus enim vel consideratur Absolute, vel Respectiue, collatione ad alios pulsus facta. Si absolute consideratur, differentiarum sumi possunt, à Forma, à Subiecto, & à Causa efficiente (non à fine, qui semper est vnicus) Forma pulsus, est motus geminus, scilicet dilatationis, & contractionis, in tempore factus. Quatenus ergo pulsus fit in tempore: pulsus est vel Moderatus, qui fit in tempore moderato: vel Immoderatus, qui fit in tempore non moderato: & hic est Velox, aut Tardus. Quatenus motus est geminus, necesse est intermediâ esse quietem: hinc pulsus vel est Moderatus secundum quietem, vel Immoderatus, prout quies vel moderata est, vel immoderata: & Immoderatus secundum quietem, est Rarus, vel Frequens. Rarus est, cum inter quietem & quietem est longum interuallum: frequens, si breue, Subiectum pulsus sunt arteriæ. Arteria autem duobus modis potest considerari: primo, vt Corpus: secundo, vt Genitum à facultate generatrice. Arteria, vt corpus considerata, tribus constat dimensionibus,

*Digressio
ad genera-
lem doctri-
nam de
PULSIBVS.
BVS.
Pulsus
quid.*

*Differen-
tia pulsus.*

1. à Forma.

*Tempus
motus.*

Quies.

*2. A Sub-
iecto.*

tionibus,

*Dimensio
arteria.*

tionibus. Dimensiones autem vel Seortim considerantur: Longitudo, Latitudo, Profunditas, seu altitudo: vel Coniunctim. Ratione longitudinis, pulsus est Moderatus, vel Immoderatus: & hic Longus, vel Brevis. Ratione latitudinis, pulsus est Moderatus, vel Immoderatus: & hic Latus, vel Angustus. Ratione profunditatis, pulsus est Moderatus, vel Immoderatus: & hic Altus, vel Humilis. Si dimensiones simul sumantur: cum pulsus, vel est Moderatus secundum corpus & quantitatem arteriarum, vel Immoderatus: & hic Magnus, vel Paruus. Secundo modo arteria consideratur ut corpus genitum à facultate generatrice. Generatrix autem agit per Alteratricem, aut per Formatricem. Si per alteratricem: tunc tribuit arteriarum Temperiem, & Consequentia temperiem. A temperie non sumuntur pulsus differentiae: nisi quis velit dicere, pulsus esse Calidum, aut Frigidum. Consequuntur temperiem

*Arteria
durities &
mollities.*

*Arteria
cavitas.*

*3. A causa
efficiente.*

durities, & mollities: unde pulsus vel Moderatus dicitur secundum id quod temperiem consequitur, vel Immoderatus: & hic Durus, vel Mollis. Formatrix porro arteriam efficit vel magis, vel minus cavam: unde pulsus vel Moderatus secundum cavitatem, vel Immoderatus: & hic Plenus, vel Vacuus. Causa effectrix pulsus est facultas naturalis: attractrix quidem, in dilatatione arteriarum: expultrix vero in contractione. Et hae facultates concurrunt, ut influunt à corde, adiuvante tamen calido infuso ipsarum arteriarum. Hinc ergo pulsus, vel est Moderatus secundum facultatem seu causam efficientem, vel Immoderatus: & hic Vehemens, vel Debilis. Haec de pulsu absolute considerato. In pulsu autem respectively considerato, perpendimus Aequalitatem, Ordinem, & Rhythmum seu proportionem. Hinc pulsus Aequalis, vel Inaequalis: Ordinatus, vel Inordinatus: *notetur, inaequalitatem comprehendi posse, & in uno pulsu, & in pluribus: ordinem autem necessario in pluribus, non in uno tantum.* Proportionatus, vel Improportionatus.

*Pulsus re-
late consi-
derati.*

Sequitur, ut de causis differentiarum pulsus agamus. E pulsus finitione patet, ad producendum pulsus tria concurrere: nempe facultatem, instrumentum, & usum: haec enim tria si eundem servant statum, pulsus non mutantur: contra autem mutatur pulsus, si haec tria mutantur. Facultas autem mutatur, quando idem robur non servat instrumentum mutatur, si non sit aequè obediens facultati: usus mutatur, si vel excedat, vel deficiat. Causae autem mutantes facultatem, in-

strumentum,

strumentum, vel vsum, sunt Naturales, vel Non naturales. Naturales mutant iam proposita citra violētiam. Nō naturales mutant cum violentia: & hæc vel Intra sanitatis limites adhuc consistunt: quæ mutant cum quadam violentia, sed leuiore: vel Excedunt latitudinem sanitatis, & morbosæ sunt; quæ magna violentia mutant, vt pulsus fiant naturalibus dissimillimi. Naturales causæ sunt, ætas, habitus corporis gracilis, vel quadratus, gestatio vteri, &c. Non naturales causæ, intra tamen sanitatis latitudinem, sunt cibus largior, parcior: potus copiosior, magis exiguus, calidior, frigidior: balneum calidius, frigidius: exercitatio cum virtutis tolerantia, &c. Morbificæ causæ pulsus mutant, vim vitalem Dissoluunt, aut Grauant. Dissoluunt: inedia, morbi prauitas, syncope; dolor, vacuatio. Grauant: causa morbifica, & organorum tumor. Ex his differentiarum propositarum causas facile reddere possumus. Primum enim quoad differentias à forma: velox pulsus fit, si vsus excedat, id est, si calor intendatur, si augeatur copia vaporis fuliginosi aut fumosi: calor respicit diastolen, vapor systolen. Frequens eandem habet causam, nempe calorem & vaporem: in hoc tamen facultas non est ita robusta, vt in veloci: hinc frequentia supplet, quia magnitudine & velocitate non potest. Rarus contra, è lege oppositorum fit, si vsus deficit, & facultas non est vegeta. Quoad differentias à subiecto: in pulsu à dimensionibus sufficit scire, causas pulsus magni & parui. Magnus fit, si arteria est mollis, facultas robusta, vsus excellens: paruus cōtra. Durus fit, si arteria est durior; mollis, si mollior. Plenus fit, si facultas est robusta, arteria capax, & particeps spiritus sanguinisque copiosi. Quoad differentias à causa efficiente: Vehemens fit, si facultas sit robusta: debilis contra. Pulsus relate sumptorū causæ etiā reddi possunt è dictis. Inæqualis enim fit pulsus, si arteria angusta, in signis durities, vel mollities: facultas admodum imbecillis, vel resoluta, vel suffocata. Vtus solus, citra mutationem in arteria, & facultate, vix potest pulsus inæqualem reddere: nisi mutatio fiat à contrario, vt dum adest ira simul cum timore. Inordinatus fit à causis pulsus inæqualem producētibus, sed iis maioribus & efficacioribus. Improportionatus pulsus, vel sine rhythmo, fit ab vsu mutato. Rhythmus autem nil aliud est, quam proportio quædam inter diastolen & systolen, secundum motum, ac secundum quietem. Differentia autem magna est, inter pulsus inæqualem

*Causa differentiarū
pulsuum.*

pulsibus compositis : quod neque inæqualis est, neque inordinatus. Myurus, vel meiuurus, id est, decurtatus, seu mutilus, est paruus & debilis : & hic duplex est : Reciprocus, & Non reciprocus. Meiuurus reciprocus est, dum reuertitur, magnus : & huius causa est facultas minus debilis : Nō reciprocus est, cum paruus existens, manet paruus : & huius causa est facultas imbecillior : ideoque hic peior est, quam reciprocus. Deficiens est pulsus, qui prorsus euanescit : vnde minor est & imbecillior meiuuro : Et si contingat, vt pulsus deficiens sit non reciprocus : deterrimus est. Serrinus est, in quo digitus videtur à terra secari, cap. 10. lib. 2. de cris. sit per inflammationem loci neruosi. Vndosus est pulsus, in quo arteria in modum vnde assurgit inæqualiter : vt modo sit altus, modo humilis, non admodum magnus & vehemens : Huius causa est vitium, quod pertinet ad instrumentum, non ad facultatem. Vermiculans, præter ictum instar vnde est admodum creber, paruus, debilis : Huius causa est virtus imbecillis. Formicans peior est vermiculante : & propterea est crebrior, minor, debilior, & annexam habet tarditatem : indicium est virtutis admodum prostratæ. Conuulsius est inæqualis in sede arteriæ, vt arteria solum ex vtrisque terminis conuelli videatur, veluti quædam eorda intensa : vnde est pulsus durus & paruus. Vibratus est inæqualis in sede arteriæ : partes tamen arteriæ quædam sursum, quædam deorsum mouentur, vt hic pulsus magis inæqualis sit, quam conuulsius. Intermittens est inæqualis, & potissimum in raritate : huius causa est facultas, potius oppressa, quam resoluta. Intercurrens est inæqualis in crebritate : huius causa est facultas oppressa, sed minus quam in intermittente pulsu. Caprisans (ita dictus, quod capras imitetur) est, in quo dum motum arteriarum desisse putamus, è tempore velocius quam prius mouentur : vt sit inæqualis potissimum secundum velocitatem & vehementiam : cuius causa est facultas oppressa.

Ex his ergo quæ hætenus dicta sunt, facile rationem reddere possumus pulsum in ephemeris. Primum ergo dictum fuit, pulsum esse naturalem, & inæqualitatis expertem : in ephamera enim non est putredo, non est materia facultati noxia : vt si aliqua sit inæqualitas in vno pulsu, est quod distole velocior existit : & hæc tamen inæqualitas omnino est exigua, & soluta febre prorsus euanescit. Dictum etiam est, pulsum mutari ad magnitudinem, celeritatem, & crebri-

*Redditur
ratio pul-
sum in
diarrit fe-
bribus.*

tatem. At oppositum videtur asserere Gal. cap. ult. lib. 2. de cris. ubi ait, commune esse omnibus ephemeris, pulsus ad paruitatem & frequentiam promoueri, & nonnunquam ad magnitudinem. Vbi sic legere oportet Galenum: quod commune sit ephemeris, pulsus ad magnitudinem & celeritatem promoueri: nonnunquam tamen ad frequentiam: sicut etiam scripsit c. 7. li. 1. de diff. febr. Nam in ephemeris in solo vsu est excessus, magis ratione caloris, quam vaporis: vt propterea in ephemeris pulsus primum mutetur ratione magnitudinis, secundo ratione velocitatis, tertio interdum, sed non semper, ratione frequentiae, quando scilicet in ephemera summus est excessus, & virtus non est admodum robusta (notetur autem quod velocitas & frequentia pertineant ad diastolen.) Cur autem pulsus in ephemera sit æqualis, mollis, ordinatus: è iam dictis euidens est. Durus tamen interdum esse potest, non per se, sed ratione annexi: vt si ephemera fiat à causa vehementer siccante: cap. 7. lib. 1. de diff. febr. Hinc patet ephemeram indicari è pulsu fere naturali, aliquantisper velociori, frequenti, magno, nō duro, vehemēti, vix inæquali & ordinato.

6. *Idea febris.*

V I. signum ephemeræ, est species seu idea febris: ab initio enim leuiter toleratur diaria augmentum non pertransit duas horas: in statu non est insignis feruor, nec vehementia symptomata: desinit spatio vigintiquatuor horarum, cum modico sudore, aut rore, aut vapore. Dubitatur autem quomodo ephemera terminetur per sudorem: cum in hac febre non sit materia, seu humor? Responso: Serosum excrementum, tertie coctionis, quod vehiculum est sanguinis, in sano corpore insensibiliter transpirat: at in ephemera mutatur in sudorem,

7. *Alteratio inueniens, & lãdens.*

rorem, vel vaporem. V I I. signum est alteratio (quæ fit ab extrinsecis occurrentibus) modo iuuans, modo lædens: vulgo hæc signa vocant iuuantia & lædentia: attamen proprie à iuuantibus & lædentibus non capiuntur signa, sed ab alteratione. Indicatur ergo ephemera è balneo, si iuuat, ita vt non succedat horror insoluta: ad differentiam putridarum: cap. 2. lib. 1. ad Glau. ratio est, quoniam in ephemera non sunt humores, qui balneo liquentur, & hinc in partes sensitiuas fluant.

De transitu Diariae in alias febres.

Ephemera in alias febres.

Ceterum oportet etiam cognoscere, quomodo ephemera in alias febres permutetur. Id autem fit ob errorē medici,

vel ægræ c.2.li.1.ad Glauç.maxime ob diætã,cãmq; non tam largã,quã tenuiorem.Cõpus enim calidũ & sic- cum, laborans ephẽmera, si vtatur inediã: tunc ephẽmera, secundũ Auicẽ.transit in hẽcticã incensiuã,id est,quẽ vehemens est,non quidẽ ratione essẽtiã(quia hẽtica est debilis & pusilla,vt supra diximus)sed ratione facultatis,quã in corpore calido & sicco non resistit,sed cedit, vt celerrimẽ fiat marasmus torridus.Hẽtica autẽ fit ob inediã: quia hæc materiã acriorem,calidiorẽ,& sicciorẽ reddit: nam per inediã,cum calidũ innatũ, quod nunquã est otiosũ, non queat agere in alimẽtum abiens, agit in obiectũ præfens,nimirũ in sanguinẽ, & excrementũ, vt propterea hoc obiectũ reddatur acius, & bilis pallida,vertatur in flauã, flaua in vitellinã: & lotium hinc redditur magis coloratũ,tempore inediã ca.12.li.1.de crisc.1.li.14.meth.c.1.li.de venã sect.ad Erasist.In alias etiã febres mutatur ephẽmera, si non adhibeamus materiã aperiẽtes:nam quia prohibetur transpiratio, fit putredo.Facile autẽ cognoscitur hæc ephẽmẽ permutatio ẽ modo declinationis: Si enim declinatio fiat citra omnẽ euacuationẽ, item si sit longa,difficilis,pulsus perseueret præter naturã, symptomata protrahantur: indicatur mutatio in alias febres. In quã autẽ febrem fiat permutatio, ẽ propriis signis cuiusque speciei apparet.

bres per-
mutatio
in hẽticã.

Mutatio
ephẽmera
in putri-
dam.

Signa per
mutatio-
nis.

CAPVT X.

De Indicationibus ephẽmera: deque Prognostico, & Materiis remediorum.

Indicationes ephẽmẽ sumuntur à febre,causa, & virtute: quã à febre sumuntur, primum habent locũ ratione inuentionis: quã à virtute ratione dignitatis: quã à causa,ratione exsecutionis.Quod vero Gal.cap.vlt.lib.8.meth.ait,in ephẽmeris raro indicationes capi à viribus,id non absolute, sed respectiue est intelligẽdũ, ratione reliquorum indicantium:virtus enim quia plerumque in ephẽmeris robusta est, despici solet: absolute tamen in omni ephẽmeria est consideranda. Notandum etiã est,ephẽmerã exacte exquisitam, carere causa interna: & proinde, requirere simplicem sanationẽ: cap.1. lib.10.meth, vnde in hac febris indicatio à causa nõ sumitur.

Indicantia
tria.

1. *Febris.
Dubium.*

Febris igitur indicat refrigerantia & humectantia, siue actu, siue potestate: siue per se, siue per accidens. Dubitatur autem non indicatio refrigerandi & humectandi, sit curatoria, an praeservatoria? Febris enim ephemera, euanesceat ad remotionem feruoris spirituum: unde cum refrigeratio induetur a spiritibus cordis, & non à toto corpore, indicatio videtur esse praeservatiua, non curatiua? Responsio. Indicatio quae capitur à spiritu calefacto, est curatiua: alias defendi non posset Galeni fundamentum, ephemeræ ideam esse morbum calidum, cum feruore spirituum. Sicut enim in pleuritide, ca. 4. li. 3. de crisi- bus, sanguis actu inflammationem produ- cens, id est, causa contentiua, indicationē curatiuam praebet, quia respicit ideam (vnde ut sanguis minuitur, ita magnitudo etiam minuitur) pari ratione in ephemeræ spiritus accensus praebet indicationem curatiuam. Ab idea enim ephemeræ sumitur indicatio refrigerandi: quæ idea non simplex est, sed composita è morbo & causa contentiua. Breuiter: ab idea sumitur curatiua indica- tio: ut patet in pleuritide, c. 4. li. 3. de crisi- bus: at spiritus calfacti, pertinent ad ephemeræ ideam: his enim refrigeratis, febris euanesceat. E spiritibus sumitur indicatio curatiua.

2. *Virtus.*

Virtus, id est, natura, seu substantia quanta & qualis, indi- cat alimentum ratione quantitatis & qualitatis. Virtus au- tem alimentum indicat bifariam: primo ut virtus ab alimen- to conseruatur, & sic indicat alimentum bonum, secundum quantitatem, & qualitatem: altero modo, ut virtus agit in alimentum, & sic virtus debilis indicat *ὀψις*, quæ facile cedunt. Cum igitur ephemera lædat organum facultatis co- ſtricticis, opus est alimento quod cedat.

3. *Causa.*

Causa in ephemera non exacta, est indicans praeservato- rium, & indicat sui ablationem.

*Indicatio
ephemera,
qua in a-
lias febres
mutatur.*

Indicationes ephemeræ, quatenus hæc mutatur in alias febres, sumuntur à causa. Hæc autem causa est materia, vel serosa, vel humorosa, siue sit plenitudo, siue caco- chymia: ut opus sit euacuatione: necessarium ergo est aperire poros: ne in alias ephemeræ transeat febres.

De Praesagio,

*Prognosi-
cum.*

Praedictos scopos facile implere possumus, quia virtus est robusta, & febris debilis: praeterea in ephemera non adest vehementia causæ & symptomatum: & propterea motus brevis est, facileq; tollitur morbus, nisi committatur error.

De materiis remediorum, in ephamera.

In cibo Auicennas proponit, primum alimenti vires: secundo materiam: tertio vsum. Quantum ad alimenti vires: proponit alimentum & nutriendum: deinde & nutriendum & simul vacuans. Cibus enim vim habet nutriendi, quatenus assimilatur: hic enim & roborat corpus, id est, partes viuentes, quæ nutriuntur: & auget calorem, seu substantiam calidi innati. cap. 2. lib. 3. de temperam. Cibus autem medicinalis, vel vacuat, vel alterat, præter vim alimentalem. Pro diuersitate autem causæ cibus variatur: nam in ephamera è labore, probatur cibus augens, ratione virtutis: in ephamera ex obstructione, probatur cibus minuens, ratione materiæ morbificæ. Laudat autem Auicennas panem infusum in aqua, addito vino, vt magis penetraret: & hunc cibum iubet exhiberi in ephamera, quæ cum horrore inuadit. Multi medici putauerunt hanc esse putridam, indeque innumeros errores in praxi admiserunt. Ephamera enim cum horrore inuadens, est, quæ corripit corpora biliosa: quoniam in his corporibus, dum patiuntur inedia, calidum innatum intense agens in succum alimentalem, hunc reddit mordacem, qui vbi in partes extimas transmittitur, in causa est horroris (& hanc febrem de tertio in tertium accessiones habere Gale. ait, ca. 4. lib. 10. metho.) Quoniam autem fit horror, cutis stipatur (rigor enim omnis cutem stipat, vt infra cap. 14. probabimus) vnde fuligines non egrediuntur, sed cor petunt: & hinc fit febris, quæ est ephamera, quia non habet locum putredo. Sic igitur Gale. cap. 5. lib. 10. metho. distinguit febrem putridam, à febre quæ fit propter mordacitatem succi exalcati & acris redditi, à calido ingenito corporis biliosi. In proposito autem cibo medicinali, è pane, cum vino & aqua: panis est basis, qui non eget correctione. Quoniam enim febris inuadens cum horrore, fit in corpore calido & sicco, quod inedia est passum: necessario deficit succus alimentalis: & propterea opus & alimento boni succi. Deinde, quia calidum innatum in hac febre succos attenuat, opus est alimento mediocri crassitudinis: cuius materia potissimum est panis. c. 26. l. 3. de fac. alim. Quoniam autem non tantum alimento, sed etiam refrigeratione opus est in hac febre: panis vero non refrigerat: additur adiuuans frigidum, ad basin, cuius materia est aqua. Præterea quia etiam cita & veloci opus est refectione, & panis non ita velociter penetrat: opus est adiuuante, cuius

1. Cibi facultates.

2. Cibi materia.

Ephamera inuadens cum horrore.

Examen cibi medicinalis Auicennæ.

Dubii de cibo cocto difficili. materia est vitium. Dubitatur autem hic, cur Gal. 3. l. 10. meth. in ephemerâ cum horrore, in gracili corpore, probet hâlicam integrâ, ex aqua bilidâ cum granis mali punici? hic. n. cibus non est facilis digestionis? Responsio. Auicennas proposuit panem cum vino, id est, cibum facilis digestionis: quia respexit ad nutritionem totius corporis. Gal. autem respicit ad imminuentem syncope[m], in stomacho bilioso, de quo ibi loquitur: respicit ergo ad ventriculum, & non ad totum corpus, vt Auicennas. *Conueniunt utrumque de vino.* nam Gal. c. 3. l. 10. meth. in ephemerâ cum horrore vinum exhibet solum die vndecimo propter syncope[m]. Responsio. Gal. non exhibet vinum nisi vndecimo, ratione potius: Auicennas autem ante exhibet vinum, non ratione potus, sed ratione condimenti, & adiuuantis basin. In putridis autem vinum non debet exhiberi, vt à quibuldam fit, propter hanc Galei auctoritatem, male intellectam. Quoad *usum*, Auicennas proponit *Quando cibandum*, vt magis necessarium: & ait, cibum in declinatione ephemeræ dandum esse. Excipitur autem ephemerâ cum horrore in corpore bilioso: nam in hac febre in principio cibus est dandus, ne succedat syncope: vnde Gal. beneficio panis cum vino exhibiti, & horrorem, & febrē prohibuit. c. 3. & 4. l. 10. meth. Quoniam igitur hæc febris cū horrore inuadit de tertio in tertium, prodest ante horrorem cibare: aut etiâ, si illud tēpus iā sit neglectum, imminente horrore: vel, si hoc tēpus sit neglectum, exhibendus est cibus post horrorem, de decrescente paroxysmo nec expectanda integritas. Ratio est, quia præsentia indicantis vehemētioris cibi flagitat, etiâ imminere accessione, aut horrore præsentis: vel enim syncope sequitur, vel febris fit molestior, sit autem molestior, quia nisi cibus exhibeatur, calidum inuatum efficacius agit in succum, eumque reddit acriorē ac mordaciore, vnde febris intenditur. Hoc etiâ loco in principio non adest aliquod prohibens, quia nec adest materia quæ prohibeat (vt in febribus putridis) nec febris prohibet, quæ tum imminere accessione, tū tempore horroris non dum adest, & nondū est febris. At post horrore[m] febris subsequitur: & propterea prohibet cibum in augmento, ac in statu: permittit autem in declinatione: nam in augmento & statu, per febrem organum facultatis costrictis ita est laxum, vt cibum non regat: secus autem in declinatione.

Aqua frigida.

Propterea etiâ aquam frigidā probat Auicennas: cuiusque & vires & usum proponit. Quātum ad vires: aqua datur vt medicamen

dicamentū: deinde etiā pro potione. Vt medicamentū datur: quatenus refrigerat spiritus vehementer accensos: in periculo hecticæ: c. 5. l. 10. meth. potif. quia virtus permittit, nec est materia quæ prohibeat. Frigida pro potu nō copiose sumēda; dum viscera sunt debilia: vnde Galenus c. 3. l. 10. meth. in corpore cal. & sicco, *vinum* exhibet post diem vndecimum, quia ante vndecimum prohibetur vinum à seruore in spiritibus, propter hecticam. *Vinum autem dum exhibetur, aqua sum erit:* cap. 3. lib. 8. methodi. Quoad vsum: Auicennas frigidam non prohibet in principio: nam virtus est fortis.

Proponit etiam *balneum aqua dulcis*: quod vim habet refrigerandi, humectandi, vacuandi, sensibiliter & insensibiliter, porosque aperiendi: idque præstat balneum, ratione variatū suarum partium, c. 10. l. 10. meth. Quatuor autem sunt partes principales: aer calidus, solium calidæ, solium frigidæ, sudatorium quibus licet etiam inunctionem addere, tanquā partem minus principalem. *Aer*, calefacit, laxat, fundit, vacuat. *Solium calidæ moderate*, vim habet moderate calefaciendi & humectandi. *Solium mediocriter frigida*, refrigerat mediocriter, densat, prohibet dissolutionem substantiæ calidi insiti. In *sudatorio*, sudor adhærens abluitur. *Inunctio* si fiat tantum in fundendo & leniendo, citra frictionem, stipat: vnde Galenus cap. 2. l. 8. metho. in ephamera è cutis densitate, vtitur oleo cum blaudissima frictione. Hinc igitur Galenus c. 3. lib. 1. ad Glauc. balneum secundum aerem probat, in ephamera è cutis densitate, & in ephamera ex inflammatione inguinum: in reliquis autem quam primum ab aere recedendum suadet, quia non est opus euacuatione. Solium calidæ, probatur in omni ephamera: humectat enim & attemperat calorē febrilem, acresque vapores euacuat. Solium frigidæ, non probatur in ephamera è bubone: neque in ephamera è densitate. Sudoris deterfio probatur in ephamera, vbi locum habet aer balnei. Postremo inunctio, si fiat cum oleo tenui: verbi gratia, chamæmelino, probatur in ephamera è densitate: contra, in ephamera è labore improbat, quia non est opus euacuatione. Notandum autem ne aliquid prohibeat: veluti materiæ copia, vt in ephamera è nauseabunda satietate: qualitas, vt in ephamera ex obstructione: in ephamera cum catarrho frigidus: motus, vt in ephamera cum alui fluore. Debet autem balneum in declinatione administrari.

Balneum;
eiusque partes vide
sup. pag.
117.

Frictiones.

Quin etiam in genere Auicennas *frictiones* proponit: quæ vel molles sunt, & habent vim aperiendi: vel duræ & asperæ, & habent vim stipandi. Longa efficacius agit, quam brevis. Probatur autem frictio in ephamera ex obstructione, & è repletionione, non in ea quæ est ex inanitione. Galenus tamen c. 3. lib. 1. ad Glauc. in omni ephamera frictiones molles vsurpat: interdum cum panno resiccato, quæ siccant & euacuant: vt in ephamera, quæ eget euacuatione: interdum cum panno madefacto, manibus inunctis iis quæ poros aperiunt, vt humor olei vel aquæ ingrediatur & humectet, in ephamera è vapore, & ab euacuatione. Conueniunt autem frictiones tēpore balnei, & post balneum.

Euacuatio totius.

Postremo *euacuatio totius* probatur in ephamera ex obstructione, è nauseabunda satietate, & soliditate, id est. repletione vel sanguinis, vel alterius succi. Licet igitur in ephemeris, quandoque secare venam, quandoque purgante medicamēto vtridum scilicet succus vehementer peccat, putridamque minatur. Vtimur ergo illis remediis vehementibus: non quod ephamera sit vehemens, sed quod humor vehemens sit. Et hæc de ephemeris.

CAPVT XI.

De definitione & causis febris putridæ: simul de Putredinis natura in genere.



Vicennas de Putridis loquitur in genere, & in specie. In genere, primum agit de indicationibus, secundo, de signis, tertio, de indicatis & materiebus. Hoc autem primum caput in quatuor partes diuidi potest: primum enim agit de causis putredinis: secundo, de loco in quo viget causa putredinis: ibi, & *quandoque putredo communitur toti*, &c. tertio, de numero humorum putrescentium: ibi, & *humor recipiens putredinem*, &c. primo de differentiis putridarum febrium, vt capiuntur à materia & locoribi, & *putredo cholera facit tertianam*, &c.

Quomodo generatur putrida, c. 5. lib. 1. de diff. feb.

Modus, quo generatur febris putrida, hic est: A succo putrescente vapor putridus eleuatus cor petit: & humores cordis accendit, ponitque in calefacto esse: vnde deinceps calidū cordis innatum redditur igneum: & hinc calor extraneus præter naturam impertitur toti corpori: & tunc est febris.

Putri

Putrida igitur febris, est rebus, producta ab humore co- *Putrida*
dis primum calefacto, citra putrefactionem. Dicitur *ab hu-*
more cordis, &c. propter differentiam ephemeræ & hæcticæ.
Dicitur *citra putrefactionem*: ad differentiam putridæ pesti-
lantis: putrescunt enim humores extra cor, non in corde, nisi
in febre pestilenti.

Quoniam febris putridæ causa, est humor putridus, & cor-
ruptus: de *putredine* erit dicendum: & primum de *generatione*
humorum, quæ putredini opponitur. Sic enim contraria sese
mutuo explicant. Oportet igitur cognoscere, quænam sit
materia, e qua humor generatur: secundo quodnam sit agēs:
tertio, quodnam sit opus. Materia humorum est qua, est ci-
bus, vt in chylum mutatur. c. 4. lib. 8. de placit. Agens est he-
par, ad quod totum hæc actio perfecta pertinet, ratione pro-
pria compositionis ipsius: actio autem eadem, quatenus non
consideratur vt perfecta, sed vt incipiens: tunc concurrunt he-
par per propriam carnem, & proinde per temperiem propriæ
carnis, nō per compositionem, & per calidum insitum, quod
habet permixtum spiritum naturalem. Tertio, humor est o-
pus particeps sanguinis, & vtriusque bilis: lib. 1. de natura hu-
mana. Notandum autem Galenum hoc loco excipere pitui-
tam: licet enim hæc in massa humorum etiam contineatur,
c. 4. lib. 8. de plac. & tex. 23. l. 1. de natura humana: tamen pituitæ
efficiens non est hepar, sed ventriculus. Hinc c. 8. lib. 2. de fac.
natural. dum proponit hepar, quatenus calore suo producit
humores, non meminit pituitæ. E tribus his succis, sangui-
neus est solum alimentalis: reliqui & alimentales, & excre-
mentitij. Quoniam enim à quatuor humoribus constamus,
& generamur: ex his etiam nutrimur: c. 8. lib. 1. de elementis.
c. 2. & 4. l. 2. de elem. Et si autem omnes succi sint alimenta-
les: succus tamen sanguineus primum locum obtinet, c. 4.
lib. 2. de elementis, quia calidum innatum, cum spiritibus, è
solo sanguine regeneratur: vnde hic tam naturæ est familia-
ris, vt in *inspiratione* ad extremum retineatur: text. 30. lib. 1.
de natura humana.

Iam etiam misti generationem, quæ putredini opponitur, *Generatio*
tradere oportet. Aristot. lib. 4. meteor. ait, mistum generari, *misti.*
quotiescunque elementa miscentur. Sed quomodo miscen-
tur? Calidum habet rationem agentis, humidum habet ra-
tionem passi: vtrumque tamen eget adiuuante: calidum ni-
mirum eget frigido, vt temperetur, ne absumat & dissipet

humidum, frigidum igitur ad misti generationem secundario concurrit. Humidum præterea eget sicco: quo firmetur & stabilietur, ut actionem calidi retineat. Misti ergo generatio fit à calido, per frigidum temperato, quod calidum agit in humidum, sicci beneficio stabile redditum.

*Corruptio
corporis mi-
sti.*

Putredo & corruptio misti, contraria est generationi: & fit dum misti elementa dissoluuntur: unde elementa in generatione & corruptione contrario se modo habent. Calidum enim nec terminat humidum, nec terminum gradumque suum seruat: frigidum non temperat calidum, sed exstinguit humidum à sicco non seruatur, sed separatur & egreditur, ut corpus putridum foris humidum appareat, tandemque remaneat portio sicca: omnis enim putredo tendit ac degenerat in terram, vel in finum, vel in situm, idque pro diuersitate misti putrescentis: ut in cadauere humano, cum putrescunt primum succi, in circumferentia cadaueris, apparet situs: cum putrescunt partes carnosæ, apparet finus: tandem cum ossa putrescunt, fit cinis & terra. Cum autem putredo fiat, quod calidum à frigido exstinguatur, & humidum à sicco separetur: causa horum reddenda. Ait igitur Aristoteles frigidum in misto exstinguere calidum, quoniam calidum misti imminuitur, frigidum autem suum retinet gradum, nec minuitur. Calidum autem misti imminuitur, ab ambiente calidiore: ut quemadmodum magna flamma exiguam ad se allicit, ita ambiens, calidius, misti caliditatem ad se trahit, unde misti calidum minuitur. Deinde vero calidum misti, attrahitur ab ambiente calidiore: ita simul educitur humidum: unde humidi & sicci fit separatio. Quoniam igitur calidum minuitur à frigido, & educitur etiam ab aliena caliditate, scilicet ambientis: recte dixit Aristoteles, calidum & frigidum esse causas effectrices putredinis: & putredinem esse communem passionem, frigiditatis propriam (quæ exstinguit calorem proprium) & caloris ambientis. Dum autem ait Philosophus, putredinem esse interitum proprii caloris, in quouis humore, ab externo calore factum: respicit ad omnem putredinem, tam secundum totum, quam secundum partem: tam naturalem, quam præter naturam. Quamuis illa definitio non sit integra: proponit enim, tantum modum, quo mistum, antequam putrescit, à proprio statu recedit. Putredinis autem finitio hæc esse potest: quod sit corruptio misti secundum totam substantiam, procedens à frigi

*Causa effi-
putred.*

*Putredo
quid.*

frigiditate propria, vna cum calore ambientis. Dicitur corruptio, id est, motus ad non esse, in misto iam putrefacto. Galenus autem cap. 8. lib. 11. meth. ait esse mutationem ad corruptelam: respiciens videlicet ad mistum semiputridum. Additur, *corruptio misti*: ad discrimen corruptionis elementi, quæ non est putredo, sed tantum corruptio: solum enim mistum est obnoxium putredini: & elementum si putrescit, tantum in ratione misti putrescit, quatenus admittit substantiam vaporosam, è quatuor elementis constantem. Additur, *secundum totam substantiam*: vt putredo distinguatur à corruptione animati: cum enim animal moritur, est corruptio misti, sed non secundum totam substantiam: manet enim cadauer, quod deinde putrescit. Corruptio ergo misti, quatenus hoc est animatum, fit, quando dissoluitur substantia calidi primogeniti, quod vinculum est animæ cum corpore. Per totam autem substantiam, intelligi oportet partes corporis putrescentis: si enim in Socrate putrescit vna libra sanguinis, non totus putrescit Socrates, sed tota libra sanguinis. Similiter dum aqua putrescit: non tota putrescit, sed tota substantia illius portionis impuræ. Hoc modo vinum, cum in acetum mutatur, non totum putrescit, sed pars humidior, seu ichorosa: vnde in locis nonnullis vinum decoqui solet; vt absumatur humor, qui causa esse posset corruptionis & putredinis. Cum autem finis putredinis sit terra, finis, vel situs: in aceto situs reperitur. Proinde acetum licet frigidum sit, obtinet tamen etiam quandam caliditatem, cap. 19. lib. 1. simpl. Frigidum est, quia propria vini caliditas est imminuta: vt acetum dicatur vinum mortuum, c. 17. lib. 1. Calidum vero statuitur, quoniam post ichorosa putrescit: cuius finis est situs, qui cum aceto miscetur: & cum hic sit calidus, fit vt acetum alicuius caloris sit particeps. Acetum ergo propria natura est frigidum: è putredine tamen alienam caliditatem est adeptum, c. 2. lib. 4. simpl. Cæterum, quoniã putredo est corruptio, proprii, caloris, in vnoquoque humido: ita vt fiat iactura caliditatis misti, totaq; corrumpatur substantia: breuiter iam de Calido, & Humido dicendum.

Calidum est quod patitur in putredine, & illud calidum est in misto, quatenus est mistum: non enim est calidum quod ingenitum vocatur, & per mortem dissoluitur: cum hoc pertineat ad mistum, non quatenus mistum, sed quatenus animatum est. Calor ergo ab Aristotele proprius dicitur, qui est

1. *Motus.*
Corruptio: motus ad corruptionem.

2. *Mobile.*

Putredine res corrumpitur secundum totam substantiam.

ή οί κείν
γενετός.

in 676.

est in misto: ad differentiam eius qui est extra mistum. Humidum, in quo calor corrumpitur, est cuiuslibet misti: siue hoc reperiatur in elemēto, siue in alio misto, eoque aut animato, aut in animato. Elemēta putrescunt, quatenus reddūtur impura à misto vaporoso, quod putrescere potest: excipitur ignis, c. 4. lib. 5. de gen. anim. Metalla etiam putrescere possunt, quia sunt mista: sed difficulter, propter densitatem. Hæc de sub-

3. Monens.

iecto. Quoad causam efficientem: dictum est, *putredinem produci à frigidityte propria, una cum calore ambientis*. Et hoc dicitur, ad differentiam combustionis, quæ etiam est corruptio misti secundum totam substantiam: sed hic calor naturalis misti, vincitur à calore igneo: in putredine autem à frigido & à calore ambientis. Per *ἀπορρεῖν* *ἡγεμόνισα* enim Aristoteles intelligit calorem ambientis: unde addit, tempore frigido mista minus putrescere: calor enim ambientis tum est exiguus: putredo autem non producitur, nisi ambientis calor sit intensior, alias enim internum calorem euocare nequit. Hinc ignis non putrescit: quia nil reperitur extra ignem, quod sit igne calidius. Mistum etiam quod mouetur magis seruetur à putredine: propter motum enim misti calor ambientis fit languidior. Hinc magna Aristoteles ait à putredine vindicari: quia calorem habent validiorem. Hinc etiam proble. 15. sect. 5. ait, quod putrescit, calidius inter initia euadere, ascititio calore: quod & Galenus probat, c. 6. l. 2. de temper. Eadem quoque de causa in prohibita transpiratione fit putredo: quia calor fit intensior. Hæc ergo duæ putredinis causæ sunt primæ & necessaria: frigiditas propria, & calor alienus. Præter has vero etiam causæ quædam sunt adiuuantes: ut si sanguis in parte collectus, à natura non regitur, nec diffilatur, putrescit, c. 9. l. 2. de febr. Sic etiam immobilitas auget putredinem: quia per quietem corporis putrescentis calor putrefaciens efficacius agit, sect. 1. l. 3. epid. Perpetua autem causa adiuuans putredinis, est calor ascititius impressus in misto putrescente: unde pro vi causarum, mistum, citius, vel tardius, magis vel minus, putrescit.

Adiuuan-
tes causa
putredinis.

Putredinis differentiarum sumuntur à Mobili, & Mouente. A mobili: putredo est vel secundum Totum, vel secundum Partem. Secundum totum: dum totum cadauer putrescit. Secundum partem: cum verbi gratia pomum, secundum dimidium putrescit. A mouente: mouens agit vel è lege naturæ, ut dum cadauer putrescit, & dicitur putredo naturalis: vel citra legem naturæ,

naturæ, & dicitur putredo præter naturam. Et hæc in genere de Putredine dicta sunt.

De causis febrium putridarum.

Cum putredo humoris, sit corruptio humoris secundum totam substantiam, à frigiditate propria, vna cum calore ambientis: causas putredinis humorū oportet sumere, ab humore, & ab ambiente, id est, à mobili & mouente. Mobile, seu passum, est humor putredini aptus: qui fit è cibus humidis. Humiditas hæc ciborū est Naturalis, vel Ascititia. Naturalis: est Alimentalis, vel Excrementitia: hæc magis, illa minus putredini apta. Alimentalis humiditas est, qualis est in lacte. Excrementitia, est Naturalis, vel Præter naturam. Naturalis est Serosa, vel Humorosa. Serosa: cum maior cibi portio mutatur in excrementum serosum: vt in *fructibus humidioribus, herariis, fugacibus*. Humorosa est in fructibus qui mutantur in succum crudum: vt sunt *cucumeres*. Humiditas excrementitia præter naturam, non est aquosa, nec cruda, sed praua: vt in cibo malo secundum substantiam, in *brassica scilicet, fungis, &c.* Humiditas ascititia consideratur in cibo, vel Ante assumptionem, vel Dum assumitur. Ante assumptionem, est humiditas, quæ prodit à malitia artificij: vt Auicennas vocat: Malitia autem artificij multiplex est: perpenditur enim ratione cibi Simplicis, vel Compositi. Ratione simplicis: dum frumentum, hordeum, & alia, quæ sua natura bonæ sunt humiditatis, non recte seruantur: sed ob malum artificium vitiantur. Ratione cibi compositi: dum coqui cibos male miscent, vt ratione huius missionis generentur humores, qui facile putrescunt. Humiditas ascititia dum cibus assumitur, prodit ex importuna ciborum exhibitione: vt dum vel cibus ingeritur, priore nondum concocto: quæ malitia horæ ab Auicenna dicitur: vel *ἔμπροσθεν* cibi prius quam *ὑποπύματι* assumuntur, vt caro bouina ante lac: quæ malitia ordinis est Auicennæ. Hæc de vitio ciborum. De sapore & odore nihil dictum est: quia non sunt causæ, sed signa cibi putrescibilis. Quod de cibus dictum, de potu etiam intelligendum: vt de vino corrupto, de aqua seculenta, &c. Causæ putredinis humorum, quæ sumuntur à mouente: id est, ab aëre ambiente, sunt duplices: ambiens enim redditur intensior, propter causam Internam, vel Externam, vt est aër pestilentiar, lacunarum. Interna, est obstructio: huius causa est humor, peccans Copia, vel Qualitate,

*I.
Causa putredinis in cibus.*

Causa putredinis ab ambiente sumpta.

tate, crassitie nimirum aut siccitate. Humorum autem causæ sunt Generantes, vel Detinentes. Generantes sunt Internæ, vel Externæ Internæ generant materiam vel Copiosam, vel Crassam, vel Viscidam. Copiosam, hepær calidum & humidū. Crassam & viscidam: ventriculus frigidior: maxime si hepatis iuncta sit caliditas: ab hepate enim calidiore iusto citius attrahitur chylus. Externæ quoque vel generant materiam copiosam, vt ær temperatus, copiosus cibus & potus, somnus, quies, vel crassam & viscidam: vt ær frigidus, cibus frigidus, similis portio, somnus, quies, medicamenta frigida. Detinentes causæ sunt habitus densus, temperamentum frigidū, cibi astringentes, vt cydoniū, mesphila, &c. cibi cōditi astringentibus, omphacio, &c. potus astringēs, aluus astricta, somnus, quies, medicamenta astringēria. Hæ obstructionis sunt causæ. Cæterum obstructio interdū sola est, interdū causam habet adiuantem. Obstructio sola concurrat, dum prohibetur transpiratio, seu euentatio. Causa adiuuans est vel Materia genita quæ agit, vel Cibus crudus. Si materia agit, tunc hæc actio, seu hic motus pendet, vel è faciendis, vt dum fit motus post nauseabundam satietatem: vel è foris incidentibus, vt balneo, solis ardore: vel ex assumendis, vt dum assumentur calida super repletionem. Si cibus sit crudus & incoctus, pendet è dimissione cautelæ: vt si quis solitus sit securo regere ventriculū, & dimittat: tunc enim vētriculus non potest cibum concoquere. Hæ sunt causæ, quæ possunt humores putrefacere. Notandum vero humores putrescere interdum cum prohibita transpiratione, interdum sine prohibita transpiratione. At in febre putrida semper necesse est prohibitam esse transpirationem: alias enim humoris putrescentis fuligines cor non peterent, sed egrederentur.

De loco, in quo fit putredo.

*Putredo vel
in omnib.
venis: vel
in certa
parte.*

Putredo fit vel in Toto, vel in Parte. In toto: cum materia putrescit in omnibus venis. In parte: humoris putrescentis origo pertinet ad membrum determinatum: vnde illud membrum nominatur Focus putredinis, cap. vlt. lib. 2. de differ. febr. c. 4 & 20. lib. 11. meth. Cæterum membrum determinatum euadit fomes putredinis, quoniam præter naturam repletur. Repletur autem præter naturam, quoniam, vel suscipit, vel Attrahit, cap. vlt. de differ. febr. lib. 2. Suscipit propter debili

debilitatem. Attrahit autem propter Caliditatem, aut dolo-
rem. Doloris autem causa præcipua, vel est Sensus exquisi-
tus, vel Causa dolorifica.

De numero humorum putrescentium.

Deinceps Auic. tradit putredinis differētiās, desumptas ab
humore putrescēte. Cum autē humores quatuor possint pu-
trescere, bilis, pituita, melācholia, sanguis: ob id quatuor sunt
differentiæ putredinis. Hoc loco notandū, in succis esse por-
tionē & alimentalem, & excrementitiā. Alimentalem Galen.
proponit c. vlt. l. de inæq. intem. & t. 18. l. 1. de natura humana.
Excrementitia patet in bile, pituita & melancholia. Sanguis
autem si se habeat secundum naturam, tunc portionē solum
alimentalem obtinet: sin præter naturam sanguis sit affectus,
etiam excrementitiā obtinere potest, quæ est ichor, è quo
febrem oriri putridam infra demonstrabimus.

*Humores
4. possunt
putrescere.*

De ichore autem quædam breuiter admonebimus. Esse
autem ichorem testatur Galen. c. 4. l. 1. prorhet. ait enim serū
bilis atræ, misceri cum excremento seroso: vbi serum bilis
atræ, id est, ichorem, distinguit ab excrementis serosis, id est
à lotio. Item, c. 9. lib. 1. de tuend. san. ait, sanguinem optimum,
nec seroso, nec aquoso liquore esse permistum: vbi serum
distinguitur ab aquoso humore, id est, ab ichore. Et aphor. 37.
sect. 2. lib. 6. epid. sanguinem ichorosum proponit. Sciendum
autem ichorem semper esse præter naturam: vnde Galenus
loc. cit. monet, cum omnis sanguis ichorosus sit malus, ab
Hippocrate vocari quandoque bonum, id est, minus malum.
Hinc t. 1. l. 1. de nat. hum. ait, ichorem generari in morbis gra-
uibus. Dicit autem Galen. c. 2. li. de tum. præter naturam, icho-
rem esse tenuiorem sanguine, & generari è sanguine, à calo-
re inflammatorio. Vnde & Philosophus c. 4. lib. 2. de par. an.
dicit, saniem esse portionem dilutam, siue aquosam sangui-
nis: & addit, quod sit pars vel nondum concocta, vel corru-
pta: quibus significat, saniem seu ichorem, esse partem san-
guinis aquosam, frigidam, non incoctam, quæ a calore co-
quente vel vincitur, & in sanguinem vertitur, vel non vinci-
tur, & in serum, id est, in ichorem mutatur. Et sic manifeste
ichor discernitur à lotio: quod non est materia corrupta,
nec in sanguinem potest mutari. Improperie autem Galenus
ichoris voce utitur, cap. 13. lib. 3. de natural. fac. vbi ait ven-
triculum in inedia excrementis impleri, quæ sint sanies
biliosa,

*Ichorē esse
quid distin-
git à lotio.*

*Ichor om-
ni præter
naturam.*

*Ichoris
causa.*

*Ichoris
vox im-
proprie u-
surpata.*

*Ichor quid
& quatuor-
plex.*

biliosa, pituitosa, & serosa, id est, ichor bilis, pituitæ, & lotium seu serum. Quoniam enim semper ventriculus tempore famis hæc excremēta attrahit: necesse est, ut sæper in corpore nostro, secundum naturam generetur. At ichor est contra naturam. Ergo non loquitur de veris ichoribus. Quod si quis dicat veros ichores esse secundum naturam: quæso, cur igitur ichor sanguinis & melancholiæ non etiam generatur, & à ventriculo per inedias attrahitur? Licet autem per famem attrahatur serum, & pars tenuior pituitæ, itemque bilis: non tamen à ventriculo attrahitur sanguis: quia excrementa tantum in fame trahuntur ad ventriculum, non autem alimenta: at portio sanguinis tenuior, non est excrementitia. Nec melancholia attrahitur, quæ ob crassitiem non ita trahi potest, ut bilis: & præterea excrementum melancholicum est adhuc alimentare, saltem causa lienis: excrementum autem biliosum nulla è parte est alimentare. Constitutum ergo sit, ichorem esse excrementum præter naturam, prodiens è tenui portione cuiuslibet humoris. Sicut autem humor accipitur & pro aggregato quatuor humorum, & pro vnico tantum humore: ita ichor primum est massa ichorosa: quæ potest esse sanguinea, biliosa, &c. deinde est ichor sanguineus, pituitosus, biliosus, melancholicus.

CAPVT XII.

De differentiis putridarum febrium.

*I. Diff. ab
idea humo-
rum.
Obiecto.*



N hac capitis parte Auicennas febres distinguit. 1. ab idea, seu specie humoris. 2. à loco in quo materia putrescit. 3. à materia accessionis. 4. à vehementia dignitatis, essentia & facultatis.

Quemadmodum igitur quatuor sunt ideæ humorum: ita etiam quatuor sunt species febriū putridarum: scilicet biliosa, sang. pit. melancholica. Hic vero dubitatur, cur Gal. c. 8. & 9. l. 2. hæc diff. febr. sanguineam febrem omittat? Responsio. Si quaeritur de numero febrium putridarum: tunc necessario quatuor species putridarum constituuntur, negari enim nō potest sanguinem putrescere: quod etiam Gal. fatetur, c. 5. l. de cur. per venæ sect. At si quaestio est de numero periodorum, tres tantum sunt differentia, cum sanguis non obtineat propriam periodum, ut ait Galen. c. 9. l. 2. de cris. Et huc respicit Galenus si quando 3. species putridæ proponit.

Sequuntur

Sequuntur differentia à loco. Per locum intelligitur *se-* 2. *Differ. à loco.*
des, in qua putrescit humor faciens febrem : non autem fo-
cus, seu fomes. Ait ergo Auicenna materiam putrescere vel In
venis, vnde oriuntur febres Continuae: vel Extra venas, vnde
Intermittentes. Sanguis quidem saltem in venis putrescit:
contra reliqui succi. & in venis, & extra putrescere possunt.
Intermittentium sunt tres species, Pituitosa, Biliosa, Melan-
cholica. Continuae subdividuntur, ratione Venarum, & ra-
tione Materiae. Ratione venarum: materia putrescit in Om-
nibus venis, vel saltem Plurimis, seu proximis cordi, & pro-
deunt febres continuae, continentes, quae ab Auicenna con-
clusae nuncupantur: aut contra putrescit materia Non in ve-
nis omnibus, vel proximis cordi, & oriuntur continuae pro-
portionales. Ratione materiae, datur continua sanguinea, pi-
tuitosa, biliosa, melancholica. Porro febres continentes sunt
in triplici differentia: nam si aequaliter se habent, dicuntur
Nomotonae, si inaequaliter, & quidem si augentur, dicuntur
Epacmae: si decrescunt, Paracmae dicuntur. Conti-
nuae etiam proportionatae sunt triplices: cap. 2. lib. 2. de diff.
febr. primum genus pertinet ad bilem, & dicitur tertiana
continua proportionata. Secundum genus pertinet ad bilem
& pituitam, & quotidie inuadit, sed accessiones sunt dissimi-
les, quia febris simplex non est. Tertium genus pertinet ad
melancholiam, & ad quartanas.

Alexander autem cap. 2. lib. 12. aduersus hanc Galeni differen- Obiectio,
tiam affirmat, humores in venis potius comburi, quam putrescere. humores
Si enim putrescerent, ait, generarentur in genus animalia, qua ali- in venis
quando per urinas excernerentur? Responso. Animalia non non pu-
possunt generari, nisi mistum putrescens paulatim putrescat: trescere.
at humores in venis repente putrescunt.

Dubitatur, nam materia, quae à venis extra mittitur, putrescat Num ma-
in venis, an potius extra? Alexander loco citato inquit: in fe- teria in-
bribus intermittentibus materiam putrescere in venis: quod termitten-
inde probat, quia in intermittentibus indicia sumimus à lo- tiū extra
tio: lotium autem indicat putredinem in venis. Responso. In venas pu-
intermittentibus materia putrescit extra venas: id quod ri- trescat, an
gor, quandoque apparens, indicat: dum enim rigor fit, non intra.
dum est febris, quia materia nondum est putrida. Ergo extra
venas putret. Lotium vero indicat saltem materiae disposi-
tionem ad putredinem. Haec de differ. à loco.

Quantum attinet ad differentias à materia accessionis 3. *Differ. à*

*materia ac-
cessionis
ubi quādā
primū expli-
cantur.*

desumptas: quādam prius de accessionibus & periodis dicē-
da sunt. De accessione dicendum: primo, cur inuadat: secun-
do, cur inuadat cum rigore, horrore, frigore, vel inæqualita-
te, vel sine his? Periodus vero perpēdenda ratione principij,
& ratione finis. Ratione principij, explicandum: primo, cur
febris reſſeat: secundo, cur alia velocius, alia tardius reuertat-
ur: tertio, cur reuertatur ſtatutis diēbus, vť pituitosa quoti-
die? quarto, cur redēat quādoque eadē hora, quandoque
diuerſa? Ratione finis declarandum, cur quādam accēſio
longiore tempore, quādam breuiore perducatur ad finem.

*Cauſa in-
naſionis
in nō peri-
odicis.*

*Cauſa in-
naſionis in
periodicis:
uſque
1. Citra flu-
xionem.*

aut

*2. Cum flu-
xione.*

Primum igitur, *quantum ad cauſas innaſionis*: ē ca. vlt. lib. 1.
de diff. febr. aduertere oportet, an febris habeat periodos, nec
ne. Si enim nullos habet reditus, tum vnicam tantum habet
acceſſionem, in qua nulla corporis pars præ aliis determi-
nate læſa eſt: ſed male ſe habent humores, in vaſis vel omni-
bus, vel plurimis, vel proximis: vt duret febris, quamdiu per-
ſeuerat putredo, vel calor febrilis. In febribus autem quæ
periodos habent, offeſum eſt membrum determinatum:
idque modo vnicum, modo multiplex. Vnicum: ſi materia
nō fluit de vno loco ad alium: multiplex, contra. Si ergo
febris fiat citra fluxionem: tunc pars determinate læſa du-
pliciter afficitur: primū enim ſuperfluitates generat, deinde
eas nō poteſt expellere, vnde neceſſario putreſcunt. Hinc
ergo colligitur aduerſus pleroſque, in intermittētibz citra
fluxionem, nō moueri materiam extra venas. Vnde etiam
Gale. cap. 7. lib. de trem. ait: in febre ardente, bilem contineri
in vaſis: in tertiana vero intermittēte, vel per carnes mo-
ueri, vel per carnes à natura expurgari: tanquam copioſior
humor in ipſis carnibus ſit creatus. Generantur autem ſu-
perfluitates, vel læſa facultate partis ob intemperiem, vel
ob errorem externum, id eſt, ob vitioſum alimentum. Pars
nō expellit gēnitas ſuperfluitates, vel expultrice labefacta
ob intemperiem, vel impedita ob anguſtiam, aut ob errorem
externum, id eſt, ob materiæ copiam, craſſitiem, aut viſcidi-
tatem. Si multiplex læditur membrum, materia de loco in
locum fluit. Fluxio autem ſit per modum tranſmiſſionis, vel
attractionis. Tranſmittens membrum neceſſario robuſtius
eſt ſuſcipiente: vt expultrix inſurgat ad expellendum. Inſur-
git alitem excitata vel copia, vel qualitate, vel vtraque. Hoc
tamen membrum tranſmittens, quatenus ſuperfluitates ge-
nerat, obtrinet aliquam imbecillitatem: & in febribz potif-
ſimum

simum esse solēt; ventriculus, iecur, lien, cerebrum. Suscipiēs membrum imbecillius est transmittente: inque hoc potissimum viget frigiditas, humiditas, raritas, ignobilitas. cap. 1. lib. 2. ad Glaucl. In attractione, aliud membrum est à quo fit attractio, aliud attrahens. Quoad locum à quo fit attractio: pro varia eius dispositione, variæ species materiæ attrahuntur: vt à iecore calido & humido, fit attractio sanguinis: à iecore calido & sicco, fit attractio bilis, &c. Attrahens, ratione caloris, vel doloris attrahit.

Cur autem accessio innadat cum rigore, vel sine rigore: (quod secundo loco erat propositum:) id Auicennas infra proprio explicat capite. De quo nos cap. 14.

Tertio, cur febru redeat: facile explicatur ex aph. 63. sect. 4. Si enim finita accessione nullum relinquitur vitium, in membro: non tenetur accessio: si relinquitur, contra. Differentia autem est inter primam accessionem & subsequentes, ratione materiæ putrescentis: vt colligitur è ca. vlt. li. 2. de diff. febr. In prima enim accessione, materia quæ putrescit est vnica, vt exempli gratia in tertiana est bilis flaua. At in accessionibus sequentibus, materia quæ putrescit est triplex: vna est præcipua, vt materia biliosa in tertiana: secunda est superfluitas putrida relicta in præcedente accessione in parte, id est, extra venas: tertia est sanguis, confluens à reliquis partibus in partes debiliores, qui etiam putrescit, quoniam & reliquis putridis miscetur, & in partem detrusus non diffatur. Huc igitur respiciens Gal. cap. 15. lib. 11. meth. ait saluberrimum esse, in omni putrida, non continua, quam intermittente, sanguinem mittere: cognouit nimirum etiam in intermittentibus peccare sanguinem.

Quarto queritur, cur accessiones velocius, aut tardius redeant? 4. Responso. Si plures febres cōiunctæ sint, vt tertiana & quotidiana: frequentior sit accessio. Causa autem cur plures febres coniungantur, peti potest è cap. vlt. lib. 2. de diff. febr. Nam si accessio fiat per modum attractionis: tum pars attrahens imbecillior redditur, vt putrescant & excrementa, & sanguis: vnde febris accenditur à priore diuersa: quare febre simplici perseverante, & duplices & triplices oriri possunt febres. In febribus autem simplicibus queritur, cur pituitosa citius redeat, tardius biliosa & melancholica? Plato in Timæo respiciens motum, ait, febres continuas fieri ex igræ pituitosis ex aere, hic enim celerius mouetur quam aqua: biliosas

2.

.

3.

Causa per
riodi.

4.

Causa fre
quentia pe
riorum.Cur pitui
osa citius
redeat, quā
biliosa, &
melancho
lica.

ex aqua: melancholicas è terra. Sed nos veras causas inuestigabimus. Accessiones redeunt, quoniam noua materia putrescit: ideo citius redit accessio, si materia adest quæ citius putrescit. At in febre pituitosa, causæ putredinis sunt validiores, minus in biliosa, adhuc minus in melancholica. Pituitosa igitur citius redit, &c. Causæ autem facilioris putredinis sunt in copia, & qualitate materiz: materia vero quædam regeneratur, quædam in priori accessione relinquitur. Quantum ad materiam pituitosam, & primum eam quæ regeneratur: hæc citius regeneratur, quam bilis & melancholia, in ea copia, vt nouam possit accessiõem causare: nam pituita fit è portione ciborum frigida, humida & viscida: & producitur à ventriculi calore, qui longe remissior est calore hepatis. Hinc fit vt huius materiz portio exigua dissoluatur, quia & mobile viscidum est, & mouens est calor remissus: copiosa igitur relinquitur. Bilis generatur & in ventriculo, & in hepate: vt in febre biliosa docebimus. Si in ventriculo: est bilis porracea, c. 6. l. 1. de temper. & fit è cibis calidioribus: agens autè est ventriculi calor, sed iusto intensior. Hinc fit, vt non tam celeriter: vt in pituita: iusta bilis copia queat colligi, quæ febrem excitet: maior enim fit dissolutio, quia & mobile est calidum, & mouens est vehemens. Si bilis in hepate gignatur: materia è qua, est pars tenuior ipsius chymi: agens est calor hepatis, qui intensior est calore ventriculi, à quo pituita producitur: Hinc fit materiz dissolutio, vt tam cito cumulari nequeat, quemadmodum pituita.

Melancholia denique fit è chymi portione crassa: quæ est admodum exigua: in chylo enim crassa quæ sunt, in feces abeunt: agens est hepatis calor, qui intensior est calore ventriculi. Hinc fit vt melancholia sufficiens ad febrem excitandum, longissimo tempore generetur: materia enim è qua fieri debet, est exigua: ratione vero caloris fit aliqua dissolutio. Quantum ad qualitatem materiz: pituita est frigida, humida, viscida, quandoque crassa: bilis est calida, sicca, tenuis: melancholia, frigida, sicca, crassa. Hinc, licet bilis ratione caloris & tenuitatis magis sit fluxilis quam pituita: quia tamè tardius regeneratur, ideo tardius etiam accessiõem facit. Vt melancholia omnibus modis tardius moueatur, quoniam cum exigua est, tum frigida & crassa. Portio autem relicta in priore accessiõne, vocatur inquinamentum: cap. 7. & 10. lib. 3. de puls. Hoc inquinamentum in febre pituitosa est copiosius,

1. Copia
materia
qua gene-
ratur

2. Quali-
tas.

3. Reliquia.

sius, quam in biliosa, & melancholica: cap. 4. lib. 2. de diff. feb. Cum ergo in accessione febris pituitosa, non parum iniquitamenti relinquatur: festinat secunda accessio.

Quinto queritur, cur statutis diebus febres reuertantur: pituitosa quotidie: biliosa die tertio: melancholica quarto? Responso. Causa nulla alia adest, quam propria humorum natura. Vnde si humor aliam naturam suscipit: accessio etiam variatur: cap. ult. li. 2. de diff. febr. vt dum bilis flaua mutatur in atram: sicut prius accessiones erant die tertio, ita deinde quarto reuertuntur.

Sexto queritur, cur accessiones modo cum ordine, modo sine ordine reuertantur? Vbi sciendum inordinationem in paroxysmis dupliciter sumi posse: primum, vt paroxysmi anticipant, vel postponunt: secundo, vt paroxysmus primo erat triduuanus, post euasit quatrduuanus. Si primo modo sumatur inordinatio: causa est in humoribus, in membris, in materiis auxiliorum. Humor enim, si eadem copia, & qualitate, eodem tempore regeneratur: accessiones seruant ordinem: sin minus, contra: si enim materia citius regeneratur, accessio anticipat: si tardius, postponit. Quoad membra: si accessio fuerit citra fluxionem, paroxysmus ordinem seruat, si membrum seruat eandem dispositionem: at si euadat imbecillius, paroxysmus anticipat. Si accessio sit cum fluxione materiae: & fluxio fiat per transmissionem: ordinem seruat paroxysmus, quandiu in membro mandante & suscipiente similis manet dispositio: at si, verbi gratia, in membro mandante sensus exquisitior euadit, accessio anticipat: si contra, postponit. Quod si per attractionem fiat fluxio, non mutatur ordo, si pars attrahens seruet eundem statum & caliditatis & doloris: at si calor intendatur, accessio anticipat. Materiae auxiliorum si non mutantur, seruat ordo in paroxysmis: at si febricitans vtatur cibis copiosioribus, vel calidioribus, anticipat accessio. Secundo autem modo si sumatur inordinatio: eius causa est mutatio humoris, febrem efficientis: mutatio autem illa fit dupliciter, primo cum vnus humor in alium transmittatur, vt bilis flaua in atram: deinde, si alius atque alius humor transmittitur, vt si prius bilis transmissa est, & postea transmittatur pituita. Et vtraque haec mutatio fieri potest a causa & interna & externa. Ab interna: verbi gratia, dum iecur, calidius redditum, bilem flauam mutat in atram: item, dum in febre biliosa, venter frigidus gignit

5.
*Causa fixa
rum perio-
dorum.*

6.
*Causa or-
dinis &
inordina-
tionis paro-
xysmorum.
Cur paro-
xysmi anti-
cipent, vel
postponant.*

1.

2.

3.

*Cur paro-
xysmi mu-
tantur spe-
cies.*

pituitam, vt à tertiana fiat quotidiana. Ab externa: verbi gratia, dum è victu calidiore & medicamentis, calidioribus: bilis flaua mutatur in atram: Item, dum è cibo frigido, & medicamentis frigidis, non amplius bilis, sed pituita generatur.

7. *Causa* *Septimo. & postremo quaritur, cur accessiones, modo longiores breuitatis, sint, modo breuiores?* Respondetur è c. 3. 5. & ult. l. 2. de diff. febr. cau- & *longitu* sam esse in materia, virtute, & habitu corporis. Materia enim *dimis acces* est causa longitudinis, si sit copiosa, frigida, crassa, viscida: breuitatis, si pauca, calida, tenuis: nam citius dissipatur. (*hic* *Halen. morum* & *quietem Auicenna comprehendit.*) Virtus si ro- *sionum.* busta sit, breui tempore materiam expurgare potest, vnde brevis accessio: contra debilis, longam accessionem efficit. (*hic Galenus sensum exquisitum Auicenna complectitur.*) Habi-

Continua
per subin-
gressum.

tus corporis densior, est in causa longitudinis accessio- num: rarior breuitatis. Causis ergo longitudinis concurren- tibus: interdum adeo longa est accessio, vt, licet febris sit intermittens, dicatur tamen continua, non quidem simplici- ter, sed continua per subingressum.

Nū in in-
termitten-
tibus ma-
teria sem-
per mita-
entur à ve-
nis, extra
venas.

Communis
opinio re-
ticetur.

Fernelij
sententia.

Vterum, antequam progrediamur, explicandum est, an *materia in febribus semper transmittatur à venis extra venas:* quod vt cognoscatur ad curationē per est necessarium. Cō- munis plerorumque est opinio, semper materiam è venis ex- tra ferri. At hi errant: nam cap. ult. lib. 2. de diff. febr. interdum accessio fit per transmissionem, vt materia in mesaraicis, tanquam in foco, resideat. Quod si igitur communis illa opi- nio vera esset: materia transmitteretur primum à mesarai- cis, quæ sunt debiliores, ad membra robustiora, nimirum iecur, & hinc in magna vasa, & hinc in venas, quæ collocatæ sunt in ambitu totius, & tandem extra venas. Quod tamen fieri nequit: cum in fluxione, quæ fit per transmissionem, necessarium sit, vt pars mittat ad debiliorem, non ad for- tiorem. Alia Fernelij est opinio, qui voluit intermitten- tium originem esse circa præcordia, ventriculum, diaphra- gma, caua hepatis, lienem, pancreas, omentum, & mesente- num. Has partes ait membranas obtinere sensu præditas, & nervos à sexto pari cerebri prodeuntes: vt proinde his partibus, exquisite leorientibus, totum corpus compatiatur, & pro vbertate, acrimonia & impetu materiæ, rigor, hor- ror, vel frigidus producatur. Quomodum igitur, in- quit idem, dum pars vltima ta pungitur, sit horronita etiam in intermittentibus fit, dum partes *& vltimo:* à materia morbi

morbifica molestantur. Sed contra Fernelium. ratio est demonstratiua: Si enim focus materiæ est in parte, sensu exquisito prædita: tunc in omni intermittente, esset dolor, & grauitas circa præcordia: quod falsum. Verum quidem est in punctiõne vlceraatæ partis, totum corpus horrore affici: cuius rationem suo loco afferemus: sed cum illa punctio in parte vlceraata dolore exciter acerbum, videtur in intermittentibus etiam, cum materia morbifica pungit præcordia, dolorem in his esse necessarium, cuius ratione horror totius oboriatur. Veruntamen quoniam Fernelius vir fuit summæ auctoritatis: non abs re fuerit, fundamenta eius præcipua penitus euertere. Primum ergo fundamentum esse potest: *Si materia intermittentibus à venis extra mittitur: tum in qualibet febre materia peccabit in venis. Consequens falsum: ergo & antecedens.* Responso. Hoc argumentum pugnat saltem contra communem opinionem, quod in omni intermittente materia transmittatur à venis: quam & nos reiicimus: nam in aliqua intermittente, à præcordiis ad totum transmittitur. Alterum Fernelij fundamentum: *Impossibile est, tam cito materiam in venis existentem saporari à sanguine, & ad extrema depelli?* Responso. Datur quædam intermittens, in qua materia è venis expellitur: verum illa transmissio non fit ita subito: sed principium durat etiam per horas. Quantum vero ad frigiditatem, quæ subito fit: dicendum, illam non fieri à materia, quæ extra transmittitur, non enim est frigiditas positiua, sed priuatiua. De quibus rerminis infra. Tertium argumentum Fernelij: *Quartana continua est rarissima: propterea quod materia melancholica raro in venis putrescit. Quoniam autem quartana intermittentes sunt frequentissima, & diu durant: necesse est earum materiam, quæ sane copiosa sit oportet, non esse in venis, nec è venis extra mitti?* Responso. Quartana continua raro contingit, quia melancholia raro putrescit in venis: idque ea de causa, quod melancholia in venis abundans, est excrementum, non alimentum, & quidem excrementum præter naturam, etiam bilioso excremento malignius. cap. vlt. lib. 2. de fac. nat. hinc fit vt è venis expellatur, & proinde raro in venis putrescat. Verum quoniam interdum copiosa melancholia & generatur, & colligitur (vt in propr. cap. demonstrabimus) fit vt tunc etiam ad ambitum totius transmittatur, & quartanas intermittentes, diuque durantes faciat.

cōfutatio.

Pugnatur
contra Fer
nelij ratio
nes.

1. Ratio.

2. Ratio.

3. Ratio.

N B.

*Differētia
februm à
materia
accessionis.*

Concludatur igitur febrem intermittentem esse vel Sine fluxione, vel Cum fluxione. Sine fluxione: vt cum excitatur à materia in ventriculo genita & putrescente: atque hæc solis lenientibus curatur. Cū fluxione, si materia è venis extra mittitur, vel interdum per alios fluit ductus: huc Galen. respiciens cap. 6. lib. 2. de cris. ait, materiam intermittentium deferri vel per venas, vel per totum corpus.

4. Differētia à vehementia.

Sequuntur differentia à vehementia. Alia febres sunt vehementiores, alia debiliores, ratione dignitatis, essentia, vel facultatis. Ratione dignitatis: si materia putrescat in venis, vt in continuis: ratione essentia: si febris valde accendit, vt in ardente: ratione facultatis: si pulsus sit imbecillis, præterquam in principio paroxysmorum.

CAPVT XIII.

De signis putridarum februm.



Aboluta doctrina, de essentia generica & specifica februm putridarum: de Signis agit Auicenna: indicationes enim capiuntur ab essentia nota: nota autem sit essentia per signa. De his ergo quatuor tradit. I. agit de signis februm putridarum in genere, quatenus scilicet hæc ab ephemera & hectica distinguuntur. II. de signis continuæ febris, quatenus hæc ab intermittente distinguitur. III. de signis, quæ indicant quomodo & differant, & conueniant putridæ. IIII. de significationibus accidentium februm.

I. Signum à causa.

Primum generale signum febris putridæ est, quod non oriatur è causa primitiua, sed ex antecedente. Et hoc signum soli putridæ conuenit, non autem omni: cap. 7. libr. 1. de diff. feb. quædam enim putridæ ab externa sunt causa: De ephemera ex obstructione, quæ non exacte exquisita est, Auicenna hic non loquitur: hæc enim ex antecedente causa oriatur. Nec sermo ipsi est de hectica, quæ fit ex vlcere pulmonis: confert enim putridam, cum hectica incipiente ante alios morbos.

II. Pulsus, respiratio.

Alterum signum, à pulsu & respiracione sumitur: putridarum inseparabile indicium est systoles velocitatis, cap. 7. libr. 1. de diff. feb. & ratio est, quia assunt fuligines putridæ, quæ necessario sunt expurgandæ. Hoc autem intelligendum est, dum febris perseverat: nam dum putrida intermitit, & ad integritatem perducitur (quod in quibusdam

dām fit) tum diastoles potius adest velocitas, non sistoles. Putrida igitur febris indicatur ex inæqualitate pulsus febrilis: nam in hac calidum innatum cordis magis igneum redditum est, quam in ephemeris: vnde in pulsu ephemerarum inæqualitas febrilis prorsus dissoluitur. Pulsui etiam par est respiratio nā expiratio est velox. Tertiū signum à calore totius corporis sumitur: qui mordax est, nō suavis, vt in ephemeris. Et hoc signum putridis conuenit inseparabiliter: cap. 7. lib. 1. de diff. febr. Per mordacem autem calorem intelligit Galenus fumosum & fuliginosum: ad differentiam caloris flammei, qui in ephemeris & hecticis locum habet. Dari autem talem calorem triplicem, ostendit Gal. cap. 1. lib. 3. de prælag. è puls. Hactenus de signis, quæ putridam respiciunt, quatenus est febris, id est, quatenus inuadit, quatenus est vitium cordis, quatenus est morbus totius. Deinceps signa tradit, quæ respiciunt putridam, vt fit à materia. Quartum igitur signum, est corporis præcedens dispositio ad febrem putridam, quæ soli, sed non omni conuenit: in quibusdam enim putridis præcedit lassitudo, pandiculatio, oscitatio, anhelitus constrictio, venarum hypochondriacarum tensio, capitis dolor & pulsatio, &c. quæ reperiuntur in febribus, in quibus materia mouetur de loco ad locum. Quintum signum est frequentia pulsus: pulsus coarctatus, id est, submersus & paruus: interdum magnus & vehemens, non admodum velox. Ratio est: quia in putrida facultas à materia opprimitur: præterea dum materia incalescit, pulsus fit frequens: dum facultas insurgit ad expellendum, pulsus fit magnus & vehemens. Cum ergo hinc pateat pulsum esse inæqualem: Galenus cap. 7. l. 1. de diff. febr. dixit, pulsus inæqualitatem in principio & augmento, signum esse putridarum proprium quidem, sed non inseparabile, quia soli putridæ, sed non omni conuenit. Soli putridæ conuenit, scilicet respectu ephemeræ & hecticæ: nam alias etiam vitiosis humoribus in ventriculo collectis, pulsus oritur inæqualitas. Licet vero pulsus inæqualis fiat à materia putrescente, quæ in omni putrida reperitur: in quadam tamen putrida, pulsus non est inæqualis: vt in tertiana exquisita, cuius materia adeo tenuis est, vt facultatem non oneret. Sextum signum est diuersitas caloris in principio & augmento: calor enim non semper est flammeus. Et hoc soli putridæ conuenit, sed non omni: in tertiana enim propter leuitatem

3. Calor totius.

Transitio.

4. Corporis dispositio ad putridam.

5. Pulsus inæqualis.

6. Calor inæqualis in principio & augmento.

7. *Euacuatio in prima perioda.* materię non euidenter apparet. Septimum signum, est quod fiat euacuatio in prima periodo, ad differentiam ephemerę: quia enim putrida febris à materia producitur, hæc per sudorem copiosum vacuatur. Excipitur tertiana intermittens, propter leuitatem materię. Octauum signum, est augmentum non permistum, non proportionatum, non simile, prolixum. Non permistum est illud augmentum, quod dissimile est principio: ad differentiam augmenti ephemerarum: indicat vero materiam, cuius actio in principio diuersa est, ab actione in augmento. Non proportionatum est, dum finis augmenti, dissimilis est principio augmenti: ad differentiam augmenti ephemerarum: & hoc indicat materiam, cuius diuersa est actio in principio & fine augmenti. Non simile est, dum calor in principio est fumosus, in augmento fuliginosus & flammeus: ad differentiam augmenti ephemerarum, in quibus calor semper est flammeus. Longum autem est augmentum: ad differentiam ephemerarum, in quibus ultra duas horas non durat: proinde significat materiam quę cito & æqualiter non accenditur.
8. *Transitio signum.* Sequuntur deinceps signa respicientia materiam ratione loci in quo putrescit. Febris ergo intermittens distinguitur ab ephemera, quia incipit cum rigore, aut horrore: & ut plurimum terminatur cum sudore, & habet periodos determinatas. Continua distinguitur ab ephemera: quia vel incipit cum tepore, si fuerit proportionata: vel sine tepore, si continens. Dissimilitudo etiam continuę & ephemerę iudicatur ex urina, e pulsu, e terminatione & quiete symptomatum. Sequuntur signa indicantia vehementiam maiorem in putridis, quam in reliquis: ut sunt quę indicant primum maiorem vehementiam febris: sitis, dolor capitis, nigredo linguę, impotentia quiescendi: quę proueniunt à summo calore, cuius causa est materia putrida. Vehementia putridę febris ratione facultatis indicatur e pulsu modo magno, modo forti, modo paruo, modo debili: quia materia putrida diuersimode agit in cordis humores: & hæc dicuntur ad differentiam ephemerę, in qua pulsus semper est robustus: atque ad differentiam hecticę, in qua dum pulsus euadit debilis, postea non amplius fit robustus. Vehementia materię indicatur, ratione facultatis, e pulsu magno, inæquali, in quo systole est velocior: lotium in principio crudum, aut parum coctum.
10. *Signum à vehementia morbi.*
11. *Signum à vehementia materię.*

II. Traduntur signa febris continuæ, quatenus hæc ab intermittente distinguitur: Pulsus continuarum est intensior quam intermittentium. Tempus extendit 24. horas: cap. 5. & 2. lib. 1. ad Glau. In principio continuæ non apparet rigor, vel horror, qui in intermittentibus est evidens: nam rigor fit, dum materia transmittitur ad venas remotiores. Vnde in continua exquisita non est rigor *(sui ratione)*, id est, quatenus est continua, huius enim materia in venis est: accidit tamen, vt, dum materia à venis magnis ad paruas & remotissimas transmittitur, portio quædam extra venas mittatur: at hoc non fit ratione continuæ: in intermittentibus vero rigor fit propria intermittentis ratione. Non tamen semper in intermittentibus fit rigor: quia interdum materia adeo est benigna & exigua, vt debili suo motu rigorem efficere nequeat. Quod si rigor sit longus & intensus, indicat febrem continuam per subingressum: si exiguus & brevis, indicat vere continuam proportionatâ, cuius materia in venis remotis putrescit. Augmenti symptomata variant in putridis: modo enim intenduntur, modo minuuntur.

III. Pars huius capituli continet signa differentiarum, à speciebus desumptarum. Diuiditur autem in 4. membra. Primum traduntur signa, quibus discernuntur 4. species febris, biliosa, sanguinea, pituitosa, melancholica. Secundo traduntur signa, quibus conueniunt. Tertio traditur documentum causa tactus. Quarto traditur documentum causa vehemētis. *Biliosa* igitur febris indicatur è motu: mouetur enim è tertio in tertium: nisi sit adusta, id est, ardēs, vel continens, quæ vnica accessione absoluitur. Deinde in biliosa pura, est caliditas acuta, magna, mordicās: acuta, id est, quæ cito expanditur, propter materiam tenuem, cum exquisite pura biliosa, non habeat permistam pituitam, vel melacholiam. Tertio biliosa pura indicatur, quod sit salubris, id est, debilis ratione facultatis. Quarto habet motum breuem: nam biliosa pura intermittens, raro pertransit septimam periodum, continua vero hebdomade finitur. *Sanguinea* indicatur, quia vere est continua, non per subingressum. Calor etiam vehemens est in sanguine, cum lenitate: non mordicans, vt in biliosa. Motus velox est: perducitur enim ad statum in quarto. *Pituitosa* pura intermittens quotidie mouetur: calor est lenis, motus tardus, ob frigidam materiam facultas non parum læditur, quia integritatis tempus est admodum exiguum.

exiguum. Continua pituitosa potius est debilis, quam vehemens, vt aliquo modo hecticæ sit similis : differt tamen ab ea, quod in pituitosa pulsus est mollis. Pituitosa etiam pura distinguitur à non pura, seu notha : hæc enim minorem habet paroxysmum & breuiorem, ob bilis permissionem cum pituita : quod si vero pituitæ non bilis, sed melancholia permisceatur, contra iudicandum est. *Melancholica* non est acuta, sed longa, propter frigus : virtus etiam tolerat ob longitudinem interualli.

Conuenientia.

Commune porro est quartanæ, tertianæ & continuæ & intermittenti, vt terminentur vomitu, alui solutione, per sudorem, per vrinam : sique febris sit ardens, etiam per hæmorrhagiam narium.

Præceptū, de tarditate & velocitate motus.

Tertio Auicennas proponit documentum ratione motus. Tarditas & velocitas motus referenda est ad totam febrem. Nam ratione partis fieri potest, vt febris brevis habeat principium longum, aut aliam partem longam: vt in tertiana intermittente, longius tempus est principium : in febre conclusa, id est, continente, longius tempus est status: in biliosa proportionata, est declinatio, in quotidiana, est status & declinatio: similiterque in quartana.

Præceptū de curatione.

Postremo traditur præceptum causa vehementiæ. In curatione non est committendus error : alias febris salubris, euadit lethalis.

Signorum applicatio.

In IIII. capitis parte Auicennas signorum applicationem tradit : & ex signis deducit nos in cognitionem signatorum, pertinentium ad putridas febres. Ea autem hic breuiter ob oculos ponere placuit.

1. Extra

Signa fe-
bris alia
sunt:

- | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|
| 1. praesentia. | 1. praeterita. | 1. Extra corpus: vt regimen antecedens: sic ars designata lanarum lotioni indicat putridam. | 1. Secundum naturam: Temperamentum, habitus corporis. Si enim praecessit temperamentum calidum & humidum, habitus carnosus: significatur febris sanguinea. |
| | | 2. Intra corpus. | 2. Praeter naturam: vt morbi & symptomata, Si enim vomitus pituita praecessit, indicatur febris pituitosa. |
| | 2. praesentia. | 1. Extra corpus: vt praesens regio, anni tempus, praesens constitutio: si verbi gratia ad calorem vergant: significant febrem biliosam & vehementem. | 1. Continentium: vt aetas, complexio sic aetas iuuenilis, temperies calidior. significat febrem biliosam & vehementiorem. quo gradus caloris in temperie est intensior. |
| | | 2. Intra corpus ratione | 2. Contentorum: nimirum excrementorum, quae copia, aut qualitate expultricem irritant ad expellendum. Haec autem signa sunt, pulsus, vrina, alui defectus, haemorrhagia narium. Verbi gratia pulsus velocior, vrina flava, indicant febrem biliosam. |
| 2. sequentia. | 1. | 1. Immediate, vt alio: verbi gratia sitis, pulsus inaequalis, dolor, &c. | 1. Contenta: vt sunt excrementa, verbi gratia, sudor. |
| | | 2. Medietate: & haec pertinent vel ad | 2. Continentia: vt sunt, verbi gratia, calor, forma, figura, &c. |
| | 2. | 1. Necessario, idque vel ratione | 1. Totius febris: vt est dispositio febris, verbi gratia, si adest calor admodum mordax, inaequalis: putrida indicatur. |
| 2. Non necessario. | | 1. Indifferentia, seu non coniuncta: vt fames, vel inappetentia, &c. | 2. Determinata, seu coniuncta: verbi gratia. dolor, sitis. indicat febrem biliosam: delirium & inquietudo, indicant febrem mali moris. |

De Rigore.

De rigore
quid era-
dendum.



Ntequam ad curationem putridarum accedat Auicēnas, prius de Rigore agit. Nos ergo in hac doctrina ita procedemus, vt exponamus. 1. modum generationis rigoris. 2. definitionem rigoris. 3. discrimen rigoris & cognatorum symptomatum. 4. rigoris differentias. 5. omnia febribus applicabimus.

Causa ri-
goris.

Galenus cap. 6. & 7. lib. de rigore, voluit rigorem fieri à materia frigida, calida, præterea dum vlcus irritatur, item dum inflammatio mutatur in abscessum, præterea cum occurrit obiectum aliquod horrendum, vel secundum visum, vel secundum auditum. Videndum ergo quæ sit communis causa. Idque vt appareat: modum generationis rigoris ita describemus. Ad rigorem generandum, necesse est vt corpori occurrat aliquod noxium, vi cuius corporis, partes: destinatae motui voluntario & sensui tactus, refrigerentur: vt refrigerationis iudicium in sensu fiat: & tanta etiam refrigerationis in dictis partibus sit violentia, vt frigus ipsarum calido nativo cordis communicetur: quod deinde cum impetu reconcentretur & expandatur, & hinc rursus concentretur & expandatur: hunc enim caloris cursum & recursum sequitur partium sensituarum expulsio, facultate nimirum expultrice à causa noxia irritata, & à cordis calore adiuta: ea violentia, vt fiat concussio, motus prauus, & rigor totius corporis.

Rigor quid

Forma ri-
goris.

Hinc rigor nil aliud est, quam vibratio totius corporis, dependens ab expultrice, irritata à frigiditate, mediante cordis calore refrigerato. Forma rigoris est *vibratio*, id est, motus deprauatus, seu numerosus & densus, propter breuitatem quietis, & celer, propter impetum. cap. 1. & 2. lib. 2. de caus. sympt. Quatenus ergo rigor dicitur vibratio, distinguitur à motu ablato & diminuto: item à motu palpitationis qui numerosus aut densus non est. Subiectum rigoris est totum

Subiectum
rigoris.

corpus. Et hinc rigor ab horrore distinguitur, cuius subiectum non est totum corpus, sed solum cutis. Per totum intelligimus partes externas, id est, cutim, partes carnosas, partes musculorum, cum vicinis partibus nervosis: vt viscera excludantur. Hinc Galen. cap. 5. lib. 2. de caus. sympt. ait in rigore

gore musculos omnes vibrari, & cum his articulos, vt fiant extensiones & expulsionēs & inflexiones præter voluntatē.

Efficiens principale, est *facultas expultricis*: ad differētiā conuulsionis legitimæ, quæ non est motus expultricis. c. 6. & in fine lib. 2. de caus. sympt. Notandum autem in motu prauo cōcurrere interdum solam causam morbificam, vt in legitima conuulsione: interdum solam naturā, vt in sternutatione: interdum vtramque vt in tremore. De rigore vero Gal. c. 2. l. 2. de caus. sympt. duo dicit: primum, eum instar tremoris, esse motum inistū, & naturæ & causæ morbificæ: secundo subdit, in rigore motum omnē esse expultricis. Dum igitur, inquit, rigorem esse motum solius naturæ: intelligit solam naturam cōcurrere ad vibrationē efficiēdum. At dum ait, rigorem esse motum mistum: intelligit adesse expultricem, & præterea causam morbificam, quæ expultricem irritat. Expultrix porro irritatur, tum à frigiditate, tum ab aliis causis: ita tamen vt in omni rigore frigiditas sit necessaria. Frigiditas hæc est, de qua Gal. c. 6. lib. de inæq. intemperie loquitur: vbi ait, rigore produci ab inæquali intemperie, id est, ab extremorum frigiditate, vt agit in cor calidum. Hanc frigiditatem vehementem esse oportet, quæ repellat, & cum violētia atque dolore agat. Hinc enim c. 6. l. de rig. Gal. ait, si homo in aquam frigidam coniiciatur, eum non rigere, nisi diu moretur. Præterea hæc frigiditas non solum est positua, sed potest etiam esse priuatiua: vnde c. 7. l. de rig. Gal. ait, in tertiana esse rigorem, quoniam humor motu vehemēti per sentientia corpora deferatur: vnde sanguis & calor in viscera refugiant, vt extrema frigida reddantur. Frigiditas autem illius causa est Interna, vel Externa, c. 7. l. de rig. fit enim à frigore externo, & à corporis dispositione, vt in febribus. Causa interna est materia vitiosa: idque vel propria ratione, vel ratione loci in quo colligitur. Vitium autem triplex est, Copia, Qualitas, Motus. Copia requiritur: quoniam omne agens agit in determinata quantitate: & quo copiosius, eo magis agit. Quoad qualitatem, non debet esse materia mitis: vnde Galen. cap 5. lib. 2. de cris. proponit materiā mordacem, siue sit calida, siue frigida. Id tamen verum est, materiam frigidam esse causam frigiditatis positivæ: calidam priuatiuæ: vt testatur Gal. cap. 6. lib. de rig. Quoad motum: hūc proponens Gal. c. 5. lib. 2. de caus. sympt. inquit, rigorem fieri à materia commota, & agitata: & cap. 6. lib. de rigor. ait,

Causa efficiens rigoris.

Expultrix irritatur à frigore vehemēti.

Frigiditas causa.
1.

non

non fieri rigorem, nisi materia cum impetu feratur. Externæ causæ variæ sunt, cap. 3. lib. 2. de cris. & cap. 6. lib. de rigore: nimirum aqua frigida, medicamentum calidum vlceri applicitum, ratione cuius fit dolor, vnde calor refugit ad viscera, vt in partibus extimis sit frigiditas priuatiua. Ad causas etiam externas pertinet, obiectum visus & auditus, quod tamen ita vehemens esse oportet, vt timorem efficiat, cuius ratione calor intro reuocetur, & exteriora calore priuata refrigerentur. Cæterum causa rigoris instrumentalis, est calidum in-

*Instrumē-
tum expul-
sivum est ca-
lidum natu-
rum.*

natum influens cordis: vnde rigor affectus calidi natiui cap. 6. lib. de rigor. dicitur: & cap. 7. lib. eiusd. Galenus ait, calidum innatum in rigore fieri veluti instrumentum facultatis expultricis: ait, *veluti*: nam præcipuum instrumentum cuiuslibet partis est temperamentum, & spiritus, hæc tamen à calore cordis influente iuuantur.

*Calor nati-
uus 4. mo-
dis affici-
tur.*

Cum autem rigor sit affectus calidi natiui refrigerati: inuestigare oportet, quis nam sit hic calotis affectus. Galenus cap. 6. lib. de rig. ait, natium calorem, instar flammæ, 4. modis affici posse: primum ob materiæ defectum: secundo, dum in sole splendor contabescit: tertio, dum à lignorum copia suffocatur: quarto, dum à copiosa aqua exstinguitur. Ratio horum 4. modorum inde pendet: quod calidum innatum est substantia per se & semper mobilis: vnde tria locum habent in calido innato, Substantia, Qualitas, & Motus. Ad substantiam pertinet illud vitium, quod dicitur inanitio substantiæ. Ad qualitatem, seu calorem pertinet læsio à frigido. Motus autem calidi natiui duplex est, intra & extra: cuius ratione duplex occurrit vitium: alterum, quotiescunque extra ab immodico calore dissoluitur calidum innatum: alterum, dum intus à materia opprimitur, sicuti flamma à co-

*In rigore
calidæ natu-
ræ læsum la-
ditur secun-
dum qua-
litatem.*

piofis lignis. In rigore vero calidum innatum læditur tantum secundum qualitatem: non secundum substantiam, aut motum. Si ergo calidum cordis in rigore afficitur secundum caliditatem: igitur læditur à frigido: nil enim læditur, quam calor influens, & proinde pura qualitas. Notandum autem hunc calorem in rigore reddi vaporosum: quia calor influens illiditur in ea, quæ obstant, quæ sane vertuntur in vaporem. Dum ergo calor influens euadit vaporosus, efficacius percutitur, & efficacius percutit: vnde fit, vt rigor ab initio sit remissior, mox autem reddatur intensior.

Exposita rigoris definitione: tertio iam loco sequitur, vt
rigorem

rigorem à cognatis symptomatis discernamus: nimirum ab *Rigoris &* horrore, inæqualitate, & frigore, *Horror igitur* (cap. 6. lib. de *cognatorum* rigor.) est sensus frigiditatis cum dolore, & cum concus- *symptoma-* sione cutis, reliquo non moto corpore: vnde horror est vi- *cum disci-* bratio solius cutis, non totius corporis: dependens ab eadem *men.* causa, aqua & rigor. Hinc, cum in horrore extrema refrige-
rentur: Galenus lib. ii. meth. ait, horrorem, ob cutis consi-
pationem, febres & augere si iam factæ sint, & nouas quoq;
excitare. *Inæqualitas*, quam Auicennas fractionem vocat, est,
dum quis in corpore inæqualitatem sentit, quam verbis ex-
plicare nescit: est igitur via ad horrorem, nimirum vibratio
admodum remissa solius cutis. *Frigus* est sensus frigiditatis
citra dolorem: Auicennas vocat frigus purum. Est autem
sensus frigiditatis partium extimarum, dependens à quali-
tate tactili, citra solutionem vnitatis refrigerantem. Ab his
igitur rigor facile discernitur. Conueniunt enim inæquali-
tas, horror, & rigor, quatenus sunt ab excrementis morda-
cibus, tanquam à causa interna, vt in putridis febribus: diffe-
runt autem & ratione excrementorum, vt agunt: & ratione
partium, vt patiuntur ab excrementis. Excrementa differunt
copia, morfu, & motu: partes, vt patiuntur: differunt virtute,
sensu tactus, & motu. Vnde quoad excrementa, si horum vi-
tia sint debiliora, id est, si sint pauca, parum mordacia, & de-
bilis motus, fit inæqualitas: si validiora, horror: si adhuc vali-
diora, rigor. Quoad partes: si minus sunt dispositæ, fit inæ-
qualitas: si magis ad patiendum dispositæ, fit horror: si maxi-
me, rigor. In maiori enim quanto, maior virtus: mordaciora,
efficacius stimulant: motus velocior, est causa symptomatis
vehementioris: hinc rigor vehementissimus à bile, quia fri-
gidi succi non possunt ita esse tenues, vt vehementissime
moueantur. Virtus imbecilla facile patitur: contra corpus
robustum, quod bene habet & secundum temperiem & se-
cundum calidum insitum: Sensus acutus, qui est in corpore
prædito nervis magnis & mollibus, facile patitur: ratione
magnitudinis nervorum, spiritus animalis radij copiosiores
distribuantur: ratione mollitiei, qualitas tactilis efficacius
agit: Motus quo maior, eo facilius partes rigeant. Quantum
ad frigus attinet, si intelligatur illud frigus, quod reliqua
symptomata consequitur, fit ab eadem causa, sed remissio-
re: vnde primum fit frigus, mox horror, tandem rigor. Si ac-
cipiatur frigus purum, hoc est frigus positivum: fit hoc à

collatio.

materia frigida, quæ citra unitatis solutionem refrigerat.

*Inæquali-
tas.*

Restat postremo, vt quæ iam dicta sunt febribus applicentur. Inæqualitas igitur, si cæteri affectus non subsequantur, reperitur in continuis proportionatis: si vero reliqui succedant, tum reperitur in illis febribus, in quibus reliqui existunt affectus similes. Horror. c. 8. lib. 2. de diff. febr. reperitur in quotidiana, nisi materia ad summum attenuetur: item in

Horror.

tertiana notha. Rigor. c. 6. lib. de rig. reperitur in quotidiana, tertiana, quartana, intermittentibus, sed in principio accessio-
Rigor.

nissim febre ardenti reperitur in fine, aph. 38. sect. 4. Discrimen tamen à Gal. statuitur. c. 7. li. de rig. quia rigor in quotidiana est longus, non magnus, nisi corpus vehementer agitetur: in tertiana est cum sensu punctionis: in quartana cum sensu frigiditatis, ac si quis per loca admodum frigida iter
Frigus.

ficiat. Frigus priuatiuum reperitur in febribus putridis mali moris: positiuum, in quotidiana intermittente è dulci pituita, c. 4. lib. 2. de cris. & c. 8. lib. 2. de feb. diff. reperitur etiam in quotidiana continua. c. 8. lib. 2. de feb. vbi Gale. vult, in hemitritæ esse frigus. ratione quotidianæ continuæ, quia materia pituitosa exigua extra venas propellitur, cum præsertim in hemitritæ bilis possit pituitæ esse vehiculum. Reperitur etiam frigus in primis quartanarum accessionibus.

C A P V T X V.

De curatione putridarum in genere: & primum de Prasidiis.

Transitio.



Vicennas ad curationem accedens, materias adiuvantium proponit: respicitque ad materiam morbificam in hoc s. primo capite: ad virtutem in octauo & nono: ad febris vehementiam in decimo: ad symptomata, in pluribus sequentibus capitibus. Nos autem in explicatione huius capitis tractabimus. I. de Indicationibus. II. de materia chirurgica & medicinali. III. de materia dietetica.

De indicationibus in putridis.

*Indicans
vitale.*

In putridis triplex est indicatio: Vitalis. Curatoria, & Preseruatoria. Indicans vitale dirigitur ad custodiam animæ, vt operetur: operatur autem per organa, quæ sunt partes viuentes, itemque spiritus insiti & influentes: vnde ab his
 indicatio

indicatio vitalis sumitur, non autem ab humidioribus, vel à sanguine: hic enim animæ organum non est, sed opus sanguinæ facultatis. Sanguis tamen vitiosus, quatenus rationem subit causæ morbosicæ est indicans. Prout autem virtutis custodia multiplex est, pro eo etiam indicata vitalia variant. Alia enim sunt generica, nimirum quantitas & qualitas: alia specifica, certa mensura, & apta qualitas: alia determinata, cibis, potus, spiritus: cap. 5 l. b. 11. meth. materia vero est panis, &c. & proxima sanguis, toridaque humiditas. Indicans curatorium, est causa continens ex usu, & quidem causa vel læsæ facultatis, vel læsæ functionis: vt in morbo læditur actio ob læsionem facultatis, facultas læditur ob intemperiem: quia tamen læsio facultatis est causa continens non ex usu: ab ea non sumitur indicatio, sed à causa quæ læsionem efficit, si modo hæc alicuius sit momenti: in phlegmone enim magnitudo est læsio facultatis, sed nihil vni potest indicare: vnde in phlegmone indicatio curatiua sumitur à sanguine influxo, & à morbo calido. hæc enim phlegmonis ideam, à qua indicatio capitur, constituunt. Sic putridæ febris idea constituitur à morbo calido, & à caliditate in humoribus cordis, quæ est causa continens ex usu: ab his ergo sumitur indicatio curatoria. Indicans præseruatorium, præcipue sunt humores: potest esse dyscrassa, quæ humores generat: item lumbrici, calculi. In putridis igitur ab humoribus sumitur indicatio prophylactica: non quidem à vitiis humorum in substantia, quantitate, qualitate, & motu locali. Si enim (quoad substantiam) humor prorsus corrumpitur, indicatur totalis euacuatio: vt si sanguis mutatur in bilem excrementitiam, vel putrescit. Quantitas deficiens, vel excedens, indicat additionem, vel imminutionem. Qualitas prima vel secunda mutata, indicat contraria. E motu, si non fit, oritur indicatio mouendi: si motus male fit, & quidem si imminutus est, oritur indicatio adiuuandi: si deprauatus, retrahendi, vel coercendi. Et hæc sunt indicationes genericae & specificæ: determinatæ autem indicantur à specie materiæ, & à definito gradu vitij materiæ: vt si sanguis abundat ad libram vnam, indicatur minuens sanguinem, & quidem ad libram vnam. Et sic indicatio præseruatoria capitur à materia. Sumitur deinde etiam à symptomatibus, prout hæc rationem habent causæ.

His ita positis, in febribus putridis indicatio sumitur à vi- Indicatio.

*nes in pu-
tridis, vn-
de oriatur.*

ribus, febre, & causa, cap. 8. & 10. lib. 11. metho. Virtus robo-
rantia indicat: vt superet putredinem, & succos concoquat.
A febris oritur indicatio & curatoria, & præseratoria. Cura-
toria: vt portio febris facta curetur: præseratoria: vt portio,
quæ est in generatione, prohibeatur. Curatio fit per refrige-
rantia, & per eradicantia materiam omnino putrefactam.
Præservatio respicit patiens, vel agens. Patiens, est humor
qui incipit putrescere: idque interdum fit, quia humidus est,
vnde oritur indicatio siccandi: semper vero dum humor pu-
trescit, calidior euadit, vnde oritur indicatio refrigerandi.
Quoad agens, hoc vel est principale & immediatum, vel sine
qua non & mediatum. Principale, est calor extraneus, in-
tensior calore naturali humoris putrescentis: hinc indicatio
oritur, refrigerandi. Agens sine quo non, est quod impedit
transpirationem caloris: & hoc est vel densitas, vnde indica-
tio rarefaciendi: vel constrictio, vnde indicatio fundendi: vel
obstructio, quæ vel facta est, vel est in fieri: si facta est, ipsa
obstructio nil indicat quod sit ex vfu: materia autem actu
obstruens, vtile indicat; quæ si copia peccat, minuenda: si
crassitie, attenuanda: si visciditate, detergenda: si autem ob-
structio sit in fieri, indicans in corpore quidem existit, sed
extra locum obstructum, in quem tamen potest confluere:
vnde huius causa opus est affluxum obstruentium succorum
compescere: hinc cum succus fluens sit multiplex, indicatio
etiam multiplex oritur: verbi gratia, si sit sanguis, euacuan-
dus: si vero sit succus à sanguine diuersus, & quidem supra
iecur subsistat, indicat purgans: & si succus non sit præpara-
tus, indicat præparans: si infra iecur subsistat succus, lenien-
da est aluus. Hinc igitur scopi in putrida febre sunt, *alui le-
nissio, sanguinis euacuatio, succi non sanguinei præparatio, purga-
tio, materia obstruentis minussio, attenuatio, detersio, caloris putridi
refrigeratio, materia putrescentis refrigeratio, & exsiccatio, mate-
rie putrefactæ eradicatio, febris factæ refrigeratio, virtutis corro-
boratio.* Et hæc de indicantibus.

De prognosticis in doctrina speciali tradendum.

CAPVT XVI.

De materia cheirurgica: & primum de
Phlebotomia.

PRactici tria considerare solent: indicans, indica-
tum, & materiam indicati. Sic sanguis est indi-
cans: euacuatio sanguinis, est indicatum: venæ-
sectio, est materia indicati. *Venæsectio igitur est* *Venæsectio*
materia remediij indicati à vitio vehementi, per sensibilibus & quid.
confertim sanguinem vacuans, & ex accidente refrigerans. Ve-
næsectio indicatur à vitio vehementi sanguineo: breui enim
tempore vacuat, quod in affectibus vehementibus est neces-
sarium, cap. 6. lib. de venæsect. contra Erasist. cap. 10. li. de cu-
rat. per venæsect. Facultates venæsectionis duæ sunt: vacua-
re, & refrigerare. Vacuat enim sanguinem, per se: ad diffe-
rentiam victus tenuis, qui per accidens vacuat: sensibilibus; *Facultates*
venæse-
ctionis.
ad differentiam frictionis: confertim, ad differentiam & pro-
positarum materierum, & maxime ad differentiam cucur-
bularum, & hirudinum. Dum igitur, confertim vacuat ve-
næsectio, simul impetum & cursum largitur humdribus in
venis existentibus. Deinde etiam alterat phlebotomia, dum
per accidens corpus refrigerat; detracto sanguine: comm.
apho. 13. sect. 1.

Deinceps explicandum, quid requirat venæsectio, vt ma-
teria remediij: & quid requirat, quatenus vehementer agit: id
est, quidnam venæsectionem inditet, & quid eandem vel
permittat; vel prohibeat. Sicut igitur omnis materia reme-
diij supponit aliquod indicans: ita etiam *venæsectio indicatur à*
vitio vehementi, quod vel ad sanguinem pertinet, vel ad morbum
calidum. Sanguis, vt morbificus est, indicat remedium, remo-
uens vitium sanguinis: & hoc est remedium genericum. Vi-
tium autem sanguinis pertinet vel ad substantiam, vel ad
quantitatem, vel qualitatem, vel vbi: & de his quatuor vitiis,
prædicatur vitium genericum: è quatuor autē vitiis specia-
libus nullum de altero prædicatur. Indicans ergo genericum
est vehemens vitium sanguinis: nō autem plenitudo, vt alogi
quidam tradunt. Licet autem vitium sanguinis quadruplex
esse possit: excluditur tamen qualitas, in venæsectione: si
enim sanguis simpliciter est calidus, indicat refrigerans, cu-
ius materia potius est medicamentum simpliciter refrige-
rans, quam venæsectio quæ vacuando refrigerat. Tria autem

Præfagia:

Venæsectio

Facultates

venæse-

ctionis.

1.

2.

3.

Venæse-

ctione in-

dicantia.

Vitiū san-

guinis in

substantia;

quantitate,

& motu,

indiat ve-

næsectioni.

reliqua vitia indicant venæsectionem. Nam ratione substantiæ, si sanguis propriam qualitatē non seruet, vt alere amplius nequeat, putrescit: vnde educendus est (*N.B. qualitas hic sumitur, seu signum sanguinis corrupti*) c. 11. 49. meth. Secundo, sanguis euadit inutilis in plethora, quoad vasa, & quoad vires: indicat igitur remedium minuens: cuius materia venæsectio. Tertio, sanguinis impetus, indicat remedium retrahens & reuulsorium: cuius materia est venæsectio. c. 11. 1. de venæsect. Quarto, si morbus aliquis sit vehementer calidus, eique non sit annexum aliquod sanguinis vitium, e tribus iam propositis: tutius est refrigerare medicamentis: si est annexum vitium sanguinis: locum habet venæsectio, quæ tunc materia est remedij, præseruatorij & curatorij simul, ratione sanguinis, atque curatorij, ratione morbi calidi. Dum igitur Galenus inter leopos venæsectionis proponit morbi magnitudinem: non de indicante loquitur, sed de signo, quod vitium sanguinis vehemens detegit: sicut enim in sanis, validæ tensiones vel grauitatis sensus, significant vitium sanguinis vehemens: nimirum plethoram ad vasa, vel ad vires: ita in ægris morbus vehemens, significat vitium vehemens sanguinis, & sic non est indicans, sed signum. Hactenus quid requirit venæsectio vt materia indicati.

Phlebot. Porro venæsectio, quatenus vehementer agit: confert immiam per- euacuat, spiritusque exhaurit: vnde *neccario virtus rob. & sustentia, requiritur, qua venæsectionem permittat: oportet autem vires & nimirum, iam esse præsentis, & tales etiam qua post venam apertam possint sufficere.* Vires de quibus hic loquimur, pertinent ad quantitatem & qualitatem partium viuientium & spirituum; maxime tamen ad partes spermaticas & principales (hinc Gal. præcipue ad cor respicit pulsus explorans cap. 6. & 13. 1. de venæsect.) Vnde, si imbecillitas sit secundum partes seminales, vt in pueris (in quibus substantia partium seminalium, & substantia calidi innati facile dissoluitur) etiam si virtus secundum carnem & spiritus, sit robusta: prohibetur tamen venæsectio. At si robur absit secundum partes seminales, vena est secunda: nam imbecillitas secundum partes carnosas non prohibet venæsectionem, vnde mulieri emaciatae aperta est vena, aph. 29. sect. 3. 1. 6. epid. Spirituum etiam imbecillitas, si fiat ob nimiam concentrationē, non prohibet phlebotomiam: vnde Galenus text. 23. 82. & 111. lib. 4. de ratione vict. in syncope, e concentratione, venam secat. Si autem imbecillitas

imbecillitas fit in spiritibus, quia nimirum dissoluuntur: hæc venæsectionem prohibet. vnde Galenus c. 11. l. 5. meth. in muliere affecta spuro sanguinis propter ieiunium, non secatur venam: nam in dissolutione, spiritus & secundum motum, & secundum quantitatem patiantur: in concentratione vero tantum secundum motum.

Ad virtutem autem omnia reliqua prohibentia referri possunt, ut ætas, ambiens, &c. *Ætas* enim florida solum admittit phlebotomiam, id est, quæ mediâ est inter pueritiam & senectutem, seu annum decimumquartum & septuagesimum: in hac enim ætate virtus bene se habet, secundum omnes species substantiæ, id est, & secundum partes viuentes, & secundum spiritus, secundum copiam & qualitatem: hæc ergo virtus robusta est ante & post venæsectionem. Puerilis ætas prohibet venæsectionem: licet enim ante venæsectionem virtus sit robusta, secundum omnes substantias, ratione quantitatis & qualitatis: tamen post phlebotomiam succumbit & dissolvitur calidum innatum promptissime, propter humiditatem & mollietiem, ac propter temperamenti caliditatem. c. 19. l. 4. de ratione vict. *Ætas* senilis prohibet venæsectionem: quia in hac etiam ante venæsectionem virtus est debilis: partium enim viuentium & spirituum quantitas est exigua, & qualitas est immoderata frigiditas: vnde & per venæsectionem, quæ & vacuat & refrigerat, virtus necessario cecidit. *Succorum crudorum copia*, & ipsa quoque virtutis debilis est signum: indeque venæsectionem impedit, cap. 13. libr. de venæsect. Per succum vero crudum non intelligimus biliosum, melancholicum, pituitosum, aquosum (qualis in hydrope) nam his existentibus possunt dari vehementia purgantia, quæ postulant virtutem robustam: sed intelligimus (cap. ult. l. de plen.) succum crassiores pituitoso, albicante (vnde etiam corpus albicans) & minus flatulentum, qualis in vrinis subsidet: & hic generatur in voracitate, crapula, otio, vel etiam cum cibo bonus non tantu detinetur in ventriculo, ut in bonum chylum verti queat, sicut vi balnei contingit. Distinguat autem succus crudus à pituitoso: nam hic necessario generatur, è chylî portione analogâ, potestque mutari in pituitam excrementitiâ atque alimentalem, hæc vero in sanguinem pituitosum, qui partes frigidas & exsanguis nutrit: & sic, pituita dominante, virtus potest esse robusta. Succus crudus non necessario generatur: &

*Omnia veli
que prohi-
bentia ad
virtutem
referuntur
cui signa.
1. Ætas.*

*2. Crudoris
succorum
copia.*

generatur è cibi portione non solum pituitosa, sed ex ea quæ in bonum sanguinem mutari deberet: vnde ex eius abundantia, sanguinis defectus arguitur: quo deficiente, virtus, alimentum priuata, succumbit, corpusque refrigeratur: & hinc in copia succorum crudorum virtus patitur secundum quantitatem, & qualitatem. Tandem aer circumfusus, regio, & anni tempus, ad virtutem, seu signa, referri possunt: si enim aer admodum calidus aut frigidus est, prohibet venæsectionem, cap. 14. libr. 1. ad Glauc. cap. 20. lib. de venæsect. In calido ergo aere, significat virtus imbecillis in futurum: quæ scilicet vacationem & sectionis venæ, & aeris calidioris perferre nequeat: in frigidior autem aere, virtus non potest ferre phlebotomiam: quia non fert refrigerationem & venæsectionis, & aeris.

Conclusio.

Haftenus igitur pater, venæsectionem esse materiam remedij, indicari à sanguinis vitio secundum substantiam, quantitatem, & motum, atque à vehementi caliditate: permitti- que à virtute robusta.

Restat ad-

ministratio-

phlebotom-

ia.

Vena in

omnibus

putridis se-

canda: quia

sanguis pec-

cat in om-

ni putrida.

Sequitur de recta administratione venæsectionis, id est, quantum, quomodo, quando, & ubi vena secanda: quæ indicantur ab essentia respectiua, nimirum ab actione, passione, præsentia, & substantia: prout hæc essentiam indicantis subsequuntur. Explicandus autem hic est locus Galeni cap. 15. libr. 11. meth. cur saluberrimum esse dicat, in omnibus putridis aperire venam, nisi ætas & vires prohibeant: Ratio autem est, quia primum corpus refrigeratur: deinde vacuatur sanguis, qui in omni putrida rationem habet materiæ morbificæ: hac tamē distinctione, vt habeat rationem causæ principalis in febribus sanguineis: causæ sine qua non, in febribus non sanguineis: nam in tertiana, verbi gratia, quia bilis non potest vacuari citra corporis calefactionem, oportet sanguinem vacuare, ne incalescat & corrumpatur: vel habet rationem causæ adiuantis, quatenus in periodo febrium, ad focum, & partem imbecillam confluit, cap. vlt. l. 2. de diff. febr.

Quantitas

duplex.

1.

2.

Quantitas vel respicit Quid agendum, vel vsum. Primo modo sumitur cap. 9. lib. de venæsectio. vbi dicitur, vacationis quantitatem indicari à morbo vehementi, virtute, ætate, &c. per quantitatem hic intelligitur copia sanguinis, quæ est lb j. vel lb ij. &c. vt libra sanguinis indicet quid agendum, id est remedium vacuans libram sanguinis. Secundo modo sumitur cap. 12. & 21. lib. de venæsect. quando scilicet quæritur,

NUM

num libra sanguinis vacuanda sit vna vice, an pluribus.

Quantum igitur agendum, indicatur à maiori vel minori actiuitate indicantis : & permittitur à virtute magis vel minus robusta. Hinc in continuis, sanguis paucioribus vicibus est detrahendus : in his enim sanguis peccat in maiori quantitate, & eius maior est actiuitas. Vnde cap. 16 lib. de venæsect. & aph. 23. sect. 1. & cap. 4. lib. 9. meth. in febribus vehementissimis sanguis vacuatur vnica vice, ad leiporhiniam vsque. Sed necesse est, vt virtus valida hoc permittat. Secus enim tutius est quantitatem partiri : cap. 7. lib. de venæsect. contra Erasistrat. & hoc potissimum in reliquis putridis seruandum. vnde Galenus cap. 14. libr. 11. meth. in putridis non vacuat sanguinem ea quantitate qua est auctus, ne intempestiue nutrire cogamur. Et hinc in putridis magis ad virtutē est respiciendum, quam in cæteris morbis : præsertim quia venæsectio, nec obstructionē à materia crassa, viscida, copiosa, perfecte tollit, nec putredinem auferit : cum ergo relinquatur portio materiæ putrescentis, opus est virtute, quæ & concoquendo, & vacuando materiam vincat.

Modus agendi, indicatur à vehementia resistentiæ, & consistit in foramine ampliore, aut arctiore : per amplius egreditur sanguis crassior, & vitalis spiritus copiosior. Permittitur autem à viribus. In febre igitur melancholica, ratione materiæ foramen amplum indicatur.

Quando agendum, id est, dies & hora venæsectionis, indicatur à præsentia indicantis vehementioris : siue hoc sit res præter naturam, id est, causa, morbus, symptoma : siue virtus : virgens enim est vehementius, magisque potest, sicut etiam causa potior effectu est. Diem igitur quod attinet, perpendere oportet vitium sanguinis, vehementia succi crudi, vehementiam materiæ accessionum, & vehementia symptomatum.

(hic omittitur vis febris & virtutis : febris enim à venæsectione per accidens tollitur : virtus vero si robusta sit, permittit : si debilis, prohibet : dum ergo prohibetur venæsectio, quid opus est de usu verbi facere?) In putridis igitur quamprimum vena est secanda, nisi aliquod è iam propositis prohibeat. Quo autē sanguis est vehementior, eo citius secanda est vena : vnde aph. 3. sect. 1. ob imminens periculum, statim Hippoc. venam aperit. Et Gal. c. 4. lib. 9. meth. in synocho putrida statim venā tundit : ad differentiam synochi sine putredine. Ratio est, cap. 2. l. 10. meth. quia vires in dies sunt debiliores. At vero præsentia

2. succorum crudorum, & materiæ accessio-
 niū symptomatum, conferenda est cum sanguinis vehemētia.
 Succus enim crudus vt plurimum magis vrget, quā sanguis:
 interdum tamen & sanguis magis potest. Si etenim crudus
 succus, id est, cibus non concoctus, qui residet in primis viis,
 infra hep̄ (ad differentiā crudi succi ultra hep̄) sit copio-
 sus, & sanguis non sit insignis vehementia: tum succus cru-
 dus magis potest: nā c. 5. l. 4. de tuen. san. phlebotomia mate-
 riam per iecur in totū corpus distribuit, quæ noxa maior est,
 quam vtilitas ē detracto sanguine. Hinc cap. 14. l. 11. meth. ait
 mittendum sanguinem, si ventris absit cruditas. Et c. 5. lib. 9.
 meth. itemque c. 20. l. de venæsect. ait, si præcedat cibi crudi-
 tas, differendā esse venæsectionem, dum cibus concoquatur.
 Quod si tamen sanguis vehementer vrgeat, et ā ante secan-
 da vena. Materia accessionis magis vrget quam sanguis: ve-
 na enim secanda die initiori, non circa exacerbationem: in
 accessionis materia morbifica magis potest ad prohiben-
 dum, quam sanguis ad indicandum: cum natura vim & ma-
 teriæ, & venæsectionis perferre nequeat. Symptomatis ve-
 hementibus occurrendum ante venæsectionem, nisi per ip-
 sam venæsectionem remoueri queant: vnde Auicennas ait,
 si vacuare vis, prius dolorem seda, nisi hic per venæsectio-
 nem cedat. Hinc etiam Galenus cap. 14. libr. 1. ad Glauc. pri-
 mum occurrit ori ventriculi, ante venæsectionem. Consti-
 tutum igitur sit, in putridis prima die venam esse secandam:
 nisi aliquid cogat differre: quod nil est aliud, quam succus
 crudus, materia accessionis, & symptoma vrgens, non ce-
 dens venæsectioni. Quod si vero necessarium sit venæse-
 ctionem bis terue iterare: id in euacuatione eodem die fa-
 ciendum: in reuulsione diuersis: in euacuatione enim respi-
 cimus ad vitium in quanto: in reuulsione ad vitium in mo-
 tu: magis autem potest vitium in quanto. Hinc in angina,
 omnibusque affectibus inflammatoriis, item in febribus pu-
 tridis sanguineis, eodem die venæsectio iteranda: in non
 sanguineis febribus diuersis diebus, prout videlicet rege-
 neratur sanguis peccans substantia, vel quantitate. Postre-
 mo, quoad horam: dum insignis est vehementia sanguinis:
 vena qualibet hora secanda. Vnde Galenus cap. 12. & 21. de ve-
 næsectio. in febre acutissima qualibet hora secuit. Quod si
 obster cibus, vel chyli excrementum crassum, vel sym-
 ptomatis vehementia: tunc cibus prius est concoquendus:

fecce

feces primum vacuandæ sunt clysmo: symptomatum denique vehementia fugienda: vnde intermittentibus, hora venæ sectionis procul ab accessione etiam cūtinuis proportionatis, hora erit remissionis: in continentibus, hora mitior.

Vb Secunda autem est basilica dextra in putridis, nisi sit febris melancholica, in qua basilica sinistra aperiēda. cap. 11. lib. 1. ad Glaucl. licet enim sanguis in toto affligat, ita vt per quamlibet venam euacuari posse videatur, quædam tamen partes præcipuum locum obtinent: nam in febribus sanguineis, sanguis fomentum habet à iecore: in pituitosa & biliosa febre, sanguis pendet à iecore. Hæ ergo venæ in putridis secandæ sunt: nisi aliquid impediat, nimirum vel virtus vel pars affecta. Virtus quippe in febre diuturna, si non sit, valde robusta: tutius est, secare venas remotas & exiles: vt saluatellam, quæ est inter annularem, & minimū digitum: vel eam quæ inter pollicem & indicem est. Nec huius venæ sectio prorsus à Galeno improbatur: cap. 14. lib. de venæsect, ibi enim respicit ad largam euacuationem, quæ per saluatellam fieri nequit. Quoad partem affectam: si, verbi gratia, febris putrida toueatur à sanguine menstruo retento: tunc vena pedis secanda, non brachij. Item, si caput sit affectum: humeraria externa aperienda, imo vena frontis. Et sic de reliquis.

*Quanam
vena sun-
denda. c. 16
lib. de ve-
næsect.*

De Cucurbitulis, cum scarificatione.

Cucurbitula scarificata est materia, per se sensibiliter, sed paulatim vacuans sanguinem, & ex accidente refrigerans. Et si vero paulatim vacuet: potest tamen totum corpus vacuare: vnde Galenus cap. 4. lib. 4. de tuen. sang. dicit, eam cum venæ sectione idem valere: quod etiam affirmat cap. 10. eiusdem lib. cap. 11. lib. de venæ sectio. & cap. 5. lib. 13. meth. differt igitur tantum à venæ sectione, quod non confertim, sed paulatim euacuet. Hinc venæ sectioni scarificatio proxima esse dicitur, com. aphor. 17. sectio. 2. & Auicennas vocat vicariam phlebotomiz. Porro cucurbitula scarificata, vacuat vel Totum, si sit numerosa, mediocriter profunda, sique sæpius applicetur: vel Partem, si contra. Vt autem etiam crassus effluat sanguis, secundum Auicennæ præceptum, cap. de ventosis. oportet balneare, & vnā horā morari. Quamobrem in praxi hoc obseruandū. vt sponsia madefacta in aqua dulci tepida locus foueatur, quo sanguis attenuetur & fundatur

Cucurbitula, quid.

*Facultates
cucurbitule.*

datur. Addit Auic. scarificationem venæ sectioni antepone-
dam esse : & magis conferre ad mundificandam cutim : sca-
rificatio enim primum è venis capillaribus vacuat , quæ de-
inde à proximis trahunt, vt ab intimis etiam fiat euacuatio :
at venæ sectio nisi repetatur, cutem non mundat : vt tradit
Galenus cap. vlt. lib. 4. de tuen. san. Hæc de facultatibus cu-
cubitulæ.

*Quid indi-
cet cucur-
bitulam.*

Cucurbitula scarificata, quatenus vicaria est venæ sectio-
nis, indicatur à vitio vehementi sanguinis. Licet enim hoc vi-
tium primum indicet vehemens remedium , & confertim
vacuans : quia tamen virtus minus robusta existens, non to-
lerat : querenda est materia minori vehementia agens , &
longiori tempore vacuans : ita si propter vires, non licet vi me-
dicamentis, verbi gratia, frigidis in eo gradu, quem indicat ven-
triculus calidus : tunc moderatis refrigerandus ventriculus , sed
longiori tempore, cap. 8 lib. 7. meth. Quatenus autem cucurbi-
tula propria ratione vsurpatur, indicatur à sanguinis vitio non
ita vehementi.

*Vfus.
Quatum.*

De vsu, seu recta administratione cucurbitularum. Quoad quan-
tum agendum : Si sanguis est actiuitatis vehementis , vtpote
dum scarificatio est vicaria phlebotomiæ, licet sanguinem

Quomodo.

peccantem vna vice educere : si contra , pluribus. Modus re-
spicit resistantiam, quæ pendet è copia & crassitie. Ratione
crassitie, partes aqua tepida fouendæ, ratione copię, ad-
ministrandæ sunt cucurbitulæ magnæ, numerosæ, sæpius
repetitæ : punctiones etiam erunt numerosæ , & mediocri-
ter profundæ. Sic enim sanguis copiosus & crassus vacuatur.

Quando.

Quando , indicatur dum præsens est indicans, nilque prohi-
bet. Primum ergo secanda est vena, si vires permittunt ; de-
inde, in putridis febribus, perseverante sanguinis vitio, dum
vires non permittunt, vel sanguinis peccatum minuitur, sca-
rificatione vtendum.

Vbi.

Quoad ubi : in febribus putridis cucur-
bitulæ scarificatæ non sunt applicandæ dorso : ratio, nam fe-
bris producitur à calore igneo cordis : huius autem domici-
lium est thorax : quem, vt partem affectam, inter initia tur-
bare non licet. Hinc Galenus cap. 19. lib. de venæ sectio. iu-
bet partem affectam ante totius vacuationem non esse va-
cuandam : ideoque capite affecto, per crura mollienda est eua-
cuatio. Pari consil. cap. 17. lib. 11. meth. in inflammatione tho-
racis & pulmonis, cum non expediat reprimere materiam
morbificam, sed foras trahere : non concedit Galen. vt cucur-
bitulæ

bitulæ thoraci applicentur, ante totius vacuationem: quia scilicet materiam è toto ad pulmonem trahunt, siue cum, siue sine scarificatione adhibeantur. Cucurbitulæ igitur in putridis, cum Oribasio, applicandæ sunt partibus ignobilioribus. Vnde Auicennas cap. de ventosis, ait, si cruribus applicentur cucurbitulæ scarificatæ, eas vicarias esse venæ sectionis: quoniam crurum imbecillitas, interdum non admittit scarificationem, addit Auicennas, applicatas natibus, & caput, & totum corpus vacuare. Præterea vero Auicennas ait, ventosas supra alchael, id est, inter duas spatulas positas, vicem gerere sectionis basilicæ: cum igitur in putridis basilica sit aperienda, quidam hac ducti auctoritate, male dorso applicant cucurbitulas. Sciendum ergo locum hunc Auicennæ verum esse in morbis sanguineis pectoris: in quibus cucurbitula sanguinem vacuat deriuando, vt in pleuritide: non autem valere in morbis, in quibus per basilicam totum corpus vacuatur. Hinc in febribus, cum non vrgeat sanguis in thorace: tutius est applicare cucurbitulas partibus remotis, nimirum cruribus, secundum Aetium cap. de scarificatione: cui sententiæ accedens Galen. com. aphor. 17. sect. 2. statuit tibiarum scarificationem proximam esse venæ sectioni: & cap. 4. ac 10. lib. 4. de tuen. san. iubet vel venam incidere, vel malleolos scarificare, non dorsum. Hæc de cucurbitula, vt est vicaria venæ sectionis.

Quo vero ad cucurbitulam scarificatam, quæ accipitur propria ratione, non vt vicaria: hæc probatur dum sanguinis vitium non est vehemens: & respicit euacuationem vel totius, vel certæ partis. Si primo modo: oportet scarificare partes infernas. Si secundo modo, id est, si scarificatio administretur pro euacuatione partis: toto prius vacuato, cucurbitula variis partibus applicari potest, prout variant partes affectæ: verbi gratia, si exanthemata sint in dorso, dorsum scarificandum. At notandum, in muliere prægnante, cucurbitulas, gratia euacuationis totius, nec partibus infernis, nec dorso, sed brachiis applicandas esse. Et hæc de cucurbitulis.

Cap. 1. sen.
4. lib. 1.
Error quorundam.

Vsus cucurbitulae per se & primario requisita.

De Hirudinibus.

Hirudines sunt materia, quæ pungendo aperiunt ora venarum: unde per se sensibilibiter, sed paulatim sanguinem vacuant, instar quidæ: earum cucurbitula scarificata. Differunt à venæ sectione: quod totum quæ faciunt vacuant, sed longiori tempore: sicut etiam apertio hæmorrhoidum:

rhodium : cap. 4. lib. 4. de tnen. san. Differunt à cucurbitulis : quod vacuât minori molestia. Interdum ergo cucurbitulis, interdum potius hirundinibus vtendum, causa alicuius priuati, pertinetis ad ægrum, verbi gratia. Si vires non admittunt phlebotomiam, nec homo assuetus sit sanguinem per hæmorrhoides vacuare, vel si circa hæmorrhoides sint vlcerare expedit potius crura scarificare. Cōtra, si suppressa sit hæmorrhoidum vacuatio, cruraque male affecta : hirundinibus potius vtendum. Vacuatur autem per hirundines is potissimum sanguis, qui in illis existit venis, quib. hirundines applicantur : inde consequitur vacuatio sanguinis, cōtenti in reliquis venis, siue is sit tenuis, siue crassus. Quidam tamen crassum sanguinem egredi negant, cum hirudo exiguum faciat foramen. His respondeo, foramen illud à sanguinis impetu dilatarî posse : aut, si non ampliatur, attamen, si locus spongia foueatur, vt Oribasius iubet, cap. 16. lib. 7. med. collect. crassum sanguinem attenuari, & per foramen exiguum egredi, dico : quod frequentissime experientia comprobauit.

vsus.
ubi agendum.

Quoad *vsus* : hic idem est cum cucurbitulis : sufficit quædam proponere circa *ubi agendum*. In putridis ergo febribus : si hirundines applicantur gratia totius, tunc applicabuntur hæmorrhoidibus, cruribus, brachiis, & quidem brachiis potissimum in muliere prægnante, magis enim in his probantur hirundines, quam cucurbitulæ scarificatæ, & sæpe experimur, citra abortum sanguinem fuisse euacuatum. Ratione partis si applicentur : vt variæ sunt partes repletæ, ita variis partibus applicandæ : verbi gratia, causa capitis, applicabuntur post aures, item temporibus, naribus, quandoque etiam lingule.

Hæmorrhoidum
apertio.

Cæterum hæmorrhoides variis materiebus aperiri possunt : vt fricçãoe cum foliis ficus, cum pannis asperis, item scarificatione crurum, & sectione venarum crurum : cap. vlt. lib. de hirud. Galeni, item cap. 10. & 19. lib. de venæ sect. Ratio est : dum enim hæmorrhoidum fluxus supprimitur, sanguis, qui deorsum fluere deberet, sursum mouetur : quod si igitur hirundinibus, sectioneque & scarificatione crurum deorsum moueatur : facile impetū recuperare potest. Verū differentia est inter hæc apertientia : nam hirudo est materia remedij specifici determinati : trahit enim sanguinem deorsum, & determinate ad hæmorrhoidas : venæ sectio autem & crurum

rum scarificatio, sunt materia remedij ſolum ſpecifici, non determinati: trahuntur enim tantum deorſum. Vnde, ſi maior neceſſitas eſt aperiendi hæmorrhoidas, vtendum materia remedij & ſpecifici & determinati.

Queritur autem non per hæmorrhoidas ſaltem vacuetur ſanguis melancholicus & craſſus, an vero etiam bilioſus & tenuis? Reſpondeo vtrumque vacuari. Primum, probo de melancholico: nam Hippocr. aphor. vlt. ſect. 6. lib. 6. epid. dicit hæmorrhoidas ſanguifluas, prohibere incipientem atram bilem, & ſanare durum lienem: & aphor. 11. ſect. 6. ait, hæmorrhoidas ſuperuenientes melancholicis, eſſe bonum, quia euacuetur ſanguis craſſus: quod etiam Galenus aſſerit com. aphor. 21. ſectio. 6. Secundo bilioſum etiam ſanguinem apertis hæmorrhoidibus vacuari probo: nam per ora venarum quilibet ſanguis egreditur, imo craſſiore facilius prodit tenuior: vnde miror eos, qui hoc adeo manifeſtum negāt. Hac de cauſa Hip. rex. 37. ſect. 3. lib. 6. epid. ait. hæmorrhoidib. laborantes non corripī morbo laterali, neque peripneumonia, neque phagedænis, & aliis morbis, quorum quidam producuntur a ſanguine bilioſo. Per hæmorrhoidas ergo vacuetur ſanguis non tantū in febr. melancholicis, ſed etiam in bilioſis. Hinc, dum ſanguis bilioſus impetū habet in caput, vt immineat delirium phreniticum: per hæmorrhoidas licebit ſanguinem bilioſum euacuare. Vt autem componatur pugna: quæ videtur eſſe inter propoſitas auctoritates, dicendum: ſanguinem per hæmorrhoidas vacuari, vel naturaliter, vel non naturaliter: naturaliter quidem ſanguis craſſus, non tenuis, & proinde hæmorrhoides ſuppreſſæ aperiuntur, vt ſanguis craſſus vacuetur. Et ſic intelligendus eſt Hippocrates aphor. 11. & 21. ſect. 6. præſertim cum Calen. aphor. 11. ſect. 6. dicat, venas hæmorrhoidales aptas eſſe *natura*, vt euacuent ſanguinem craſſum. Non naturalis autem vacuatio poteſt eſſe ſanguinis cuiuſlibet, id eſt, tenuis, & craſſi, quomodo Galen. loquitur, aphor. 37. ſect. 3. lib. 6. epid. Et hæc de materia cheirurgica.

*Per hamor-
hoides va-
cuatur san-
guis me-
lancholi-
cus, & bi-
lioſus.*

C A P.

*De materia Medicinali : & primum, de Lenientibus
per os, seu de Vomitoriis blandis.*

*Quid de
inceps agi-
dum.*



Materia medicinalis est Vacuus, & Alterans. Cum autem in febribus putridis respiciendum sit, & ad Materiam morbificam, & ad Partes viuentes: primo nos loquemur de medicamentis, quæ propter materiam morbificam vsurpantur: secundo de iis, quæ partem, ipsamque febrem respiciunt: infra cap. 20. Materiam morbificam igitur hic consideramus aliam à sanguine: nam sanguinem potissimum respicimus in doctrina de materia cheirurgica, quam iam absoluiimus.

*Materia
in primis
vitiis indi-
cat Leni-
es, &
per os, &
aluum.*

Materia proinde morbifica, alia à sanguine, & per consequens excrementitia, est Prima, vel Secunda: prima hæret in primis viis citra iecur: secunda vltra hepar subsistit. Prima superfluitas causa copiar indicat vacuans, seu minuens, quod determinate vocatur *Leniens*. Cum autem prima superfluitas triplex sit (in febribus scilicet putridis, non in omnibus morbis) scilicet pituitosa, biliosa, fecalis: hinc fit, vt leniens etiam triplex indicetur, respiciens nimirum superfluitatem, vel pituitosam, vel biliosam, vel fecalem: & hinc etiam triplex materia remedij, quæ vim habet vacuandi primas superfluitates. Cæterum hoc leniens duplex est: vacuat enim aut per Os, aut per Aluum. Ratio est: quia licet materiæ vitium (aph. 21. sect. 1.) pertineat ad corruptionem, autionem, imminutionem, alterationem, & lationem: in præsentia tamen vitium perpenditur tantum secundum lationem: Primæ ergo superfluitatis latio, vel Non fit, vel Male fit. Si latio non fit, sed superfluitas detinetur, indicatur mouens: idque determinate mouens vel sursum ad os, quod dicitur *Vomitivum*, vel deorsum

*Inclinatio
materiæ
sinemotus.*

ad aluum, & dicitur *Leniens aluum*. Hæc autem remedia determinata indicantur à materiæ inclinatione: in genere enim materiæ quies, indicat mouens: sed inclinatio, indicat motum determinatum, ratione termini ad quem. Inclinatio autem seu propensio, num sursum sit, vel deorsum, cognoscitur è signis præteritis: verbi gratia si suppressa sit consueta vacuatio per vomitum, cognoscitur inclinatio ad superiora. Et hæc inclinatio, est bona, vel mala: bona verbi gratia si solitus est homo pituitam per vomitum facile euacuare: contra mala, si cum

si cum difficultate, & prauis symptomatibus, vt cum syncope, &c. vnde inclinatio mala per superius, indicat vacuus per inferius: & bona per superius, indicat vacuus per superius. Quod si primæ superfluitatis latio fiat, id est, si prima superfluitas moueatur, & quidem bene: motus hic adiuuandus: sin male, retrahendus. Bene mouetur, si fertur ad loca decentia, sed debiliter, ita vt materia tota non euacuetur: vnde hic motus non vt omnino bonus, sed vt imbecillis, indicat iuuantia: com. aph. 21. sect. 1. Male mouetur, si ad loca non decentia fertur materia, vt ad partes principes, ad loca quæ effluxu carêt, verbi gratia ad cor, pulmones, thoracem. Est vero & alius motus omnibus numeris bonus: cum humor per loca vergit conferentia, vt vniuersa materia per optimam crisin vacuetur: com. aph. 20. sect. 1. Sunt autem loca conferentia, dum vacuatio conferri, & virtus sustinet, verbi gratia intestina, ventriculus, vesica, vterus, cutis, pori, palatum, nares. Constitutum igitur sit, *leniens vomitorium indicari à materia, quatenus habet inclinationem ad superiora imminutam* (ad differentiam lenientis per alium: quod indicatur à prima superfluitate, quatenus inclinationem habet ad inferiora imminutam.)

Inclinatio materia cum motu.

Vomitio-riu, à quo induitur.

Cæterum materia vomitoria licet in genere triplex sit, Vehemens, Debilis, Mediocris: hic tamen, quia verba saltem facimus de vomitorio leniente, non de vomitorio purgante: omisissis vehementibus, saltem debilia & mediocria proponemus: quæ vtraque in putridis probantur, pro materię copia, qualitate, & inclinatione ad os: nam materia copiosior, frigidior, crassior, viscidior, & inclinationem sine motu obtrahens: vomitorium poscit mediocre: quæ contra, debile.

Vomitoria differentia.

Debile vomitorium sit ex aqua hordei, è iure pulli, aceto, vel *Formula.* syrupo acetoso. Si mediocre desideratur, additur oxymeli *sem-* seu *quan-* *tum.* *plex,* succus raphani. Exempli gratia debile vomitorium hoc erit: *℞ iuris pulli ℥ x. syr. acetosi simpl. ℥ ij. dosis ab ℥ viij. ad ℥ xij.* Mediocre sic præscribetur: *℞ oxym. simpl. ℥ ij. succi raphani ℥ i. iuris pulli ℥ xiiij. pulueris cimini, ḡ v.* In hoc vomitorio, basis est *iuris pulli*, quod copia aggrauat expultricem, vt expellat. Quoniam autem hoc vomitorium debet esse mediocre, ob superfluitatem viscidam & crassam: certe ius pulli sufficere nequit, quod vim detergendi & incidendi non habet: propterea adiuuans additur, nimirum oxymeli, quod attenuat ac detergit. Adiuuat etiam basin *succus raphani*, qui ra-

tione alicuius acrimonie irritat soporam expultricem. Cyminum & iuuantis & corrigen-
tis habet rationem: iuuantis, quia
attenuat, & quia etiam satis ingratum ac iniucundum est
(vomitorius enim sunt addenda, quae ingratum habens saporem: si
enim iacunda addantur, expultrix non insurgit ad expellendum,
sed potius viget attractrix, & retentrix: unde hoc in loco cina-
nomum, quia gratum est, non additur, licet attenuandi vim habeat)
corrigen-
tis rationem potest habere, si verbi gratia ventricu-
lus sit frigidior, qui ab oxymelite frigido laedi queat, huic
frigiditati occurrimus cymino: quod etiam flatus, qui inter-
dum vigent, discutit. Hæc quoad quantum agendum. *Modum*
agendi quod attinet: oportet vomitorium administrari & li-
quidum, & tepidum: nam ratione tepiditatis equadit iniucun-
dum: unde humoris inclinatio abolita excitatur, & imminuta
intelligitur. Quoad *quando agendum*: vtendum vomitorio, dum
superfluitas reperitur in ventriculo, & nihil prohibet. Quare
interdum pluribus diebus vtendum vomitorio, si pluribus
diebus perseveret præsentia materie. Hora opportuna est,
qua ventriculus non est famelicus: nam tunc viget expul-
trix: præterea hora opportuna debet esse tepidior: nam ex-
pultrix ea hora citra dissolutionem calidi innati expellit:
vbi agendum, patet.

De Lenientibus aluum.

Leniens

aluum quas
habeas vi-
res.

Materia medicinalis aluum leniens, habet vim per inferiora
irruendi primæ superfluitatis ultra secur existentes, citra atra-
ctionem: ex autem superfluitates pertinent ad ventriculum,
ad mesaraicas, ad intestina tenuia & crassa. Porro, vt medica-
mentum aluum moueat, oportet esse humidum, lubricum,
aere vel saltum: his enim qualitatibus venter ad excernen-
dum irritatur, cap. 45. lib. 2. de fac. alim. & cap. 14. lib. 1. de fac.
alim. Si autem medicamentum simplex tale non sit, quod
has omnes qualitates obtineat: miscemus plura: vt pro hu-
miditate, miscemus aquam vel ius: pro lubricitate, oleum, bu-
tyrum: pro acrimonia, aromata, mel: pro salsedine, salin.

Differen-
tia a viri-
bis, & lo-
co admini-
strandi.

Differentia est inter lenientia: quod acriora, & magis
salsa, sunt efficaciora: quibus vtendum, si materia est copio-
sa, frigida, crassa, viscida, si inclinationem sine motu obtinet.
Hinc in febribus pituitosis & melancholicis fortiora locum
habent: in sanguineis, & biliosis, miora. Applicationis etiam
ratione differunt materie lenientes: pro varia enim materie
subsi-

subſiſtentia, adminiſtrantur vel per Os, ſi materia continēatur in ventriculo, in meſenterio, in inteſtinis ſuperiſ: vel per Inferiora, ſi in craſſis inteſtinis.

Medicamenta ergo per os exhibenda, quæ aluum leniūt, ſunt aut Debiliora, vt *ſyrupus roſarum ſolutiuus*, *ſyrupus nio-* *Materia*
latum ſolutiuus, *manna*, *caſſia*, *tamarindi*, *diaprunum non ſoluti-* *aluum le-*
um, *ſerum lactis*: aut Efficaciora, vt *mel roſarum ſolutiuum*, *mel* *nſentes.*
violatum ſolutiuum, *hiera ſimplex*: de quorum nonnullis, breuiter quædam admonebimus: nimirum de manna, caſſia, ta-

marindis, ſero lactis, hieræque ſpeciebus. *Mannam* Galenus proponit cap. 39. lib. 3. de ſac. alim. habet autem vim vacuandi ſuperfluitates tenues: ſed ob dulcedinem mutatur in bilem; dum ventriculus vel eſt calidior, vel eſt repletus ſuccis calidioribus: dulcia enim dum à calido patiuntur, amareſcunt, & hinc in bilem conuertuntur. In huiusmodi ergo ventri-

culo manna eſt corrigenda *endivia*, *ſoncho*, *cichorio*, *acetofa*, &c. *Caſſia* excedit vires mannæ: nam vacuat ſuperfluitates & tenues, & mediocriter etiam craſſas. Præterea, quia moderate calida eſt, refrigerat, obtundit acrimoniam, humectat, habetque portiones alimentales, ſed facile in ſtatus vertitur,

qui extendendo dolores inſignes excitant. Caſſia ergo antequam exhibeatur eſt decoquenda, ſecundum Rhaſim c. 83. lib. 9. ad Almanſ. coctione enim diſſoluitur portio, quæ in ſtatus mutari poſſet: quod idem euenit in hordeo, fabis, &c.

quæ portionem flatulentam deponunt, ſi coquantur: coquit autem Rhaſis caſſiam cum ſucco cichorij. Quod ſi caſſia exhibeatur non cocta, corrigenda eſt *aniſo*, *feniculo*, *ſeminibus citri*, &c. quæ craſſo modo ſunt contundenda (nam ea tantum tenuiſſime pulueriſari debent, quæ ad loca longinqua debent penetrare, cap. 7. lib. 4. de uen. ſan. alia vero ruditer ſunt contundenda.

Hinc ſpecies diaphoretici, niſtrum, cyminum, piper, ruta, ſi in puluerem terantur, prouocabunt lotium: ſin ruditer contundantur, mouebunt aluum. Idem teſtatur *Auſienna* cap. 5. traſt. 1. lib. 2.) *Tamarindi*, ſecundum Meſuem, vacuant ſuperfluitates tenues, biliolaſ, & refrigerant: vnde in febribus biliolaſ, & valde calidis probantur. Neque aſtringunt tamarindi: alias eorum uſus in putridis febribus non eſſet ita tutus. Aluum mouent, non aſtringendo, vel comprimendo, ſed lubricando: quia pingues ſunt, participes dulcedinis & aciditatis: expertes acerbitalis & auſteritalis, qui ſapores ſunt aſtringentes. Hinc Meſues myrobalanos, quæ cōprimendo

Manna.

Caſſia.

Tamarindi.

Serum lactis.

vacuant, corrigit lenientibus, inter quæ etiam tamarindos recenset. *Serum lactis* habet vim attenuandi, & aluum mouendi. Vacuat, ratione humiditatis, quæ causa principalis est: & quia etiam particeps est qualitatis acris: id quod seri generatio testatur. Est enim serum excrementum tenue primæ coctionis: genitum in ventriculo: ex assumptorum portione aquosa, excrementitia, frigida & humida: acrimoniam vero acquirit in iecinore, propter amissionem paucae bilis excrementitiæ. Hoc serosum excrementum defert sanguinem in mammas: vbi lac sit, constans triplici substantia, cap. 15. lib. 3. de fac. alim. Vix autem alit serum, quia penetratum est excrementitium: vnde Galenus cap. 10. lib. 1. ad Glauc. pro victu tenui, serum lactis proponit. Laudatur serum caprinum, vel vaccinum, permistum cum medicamento aliquo leniente.

Hiera picra.

Hiera non excedit mesenterium cap. 11. lib. 7. metho. habet tamen vim calefaciendi, siccandi, vacuandi, materias viscidas & crassas. Vis quidem hieræ purgans, non pertransit iecur, vt Gal. ait: attamen experientia comprobatum est, vim eius aperientem iecur transire; hieræ enim species, prouocant menstrua. Hiera igitur probatur solum in intermittentibus pituitosis: & est corrigenda cum frigidis, vt *castia*, & similibus. Cæterum in praxi notandum, quod tamen pauci obseruant, hieram ab initio ea ratione exhibendam, vt non trāseat vltra iecur: quia non licet inter initia, agitare materias vltra iecur, maxime in febribus putridis: vnde pharmacopoeis iniungendum, vt species hieræ conficiant cum medicamentis ruditer contusis, non tenuissime puluerisatis, inter putridarum initia.

Dosis lenientium: supra pag. 50.

Sequitur de *vsu* lenientium: & primum de *Quantum agendum*. Dosis syrupi rosati sol. & syru. viol. sol. potest ascendere ad ℥β. Mellis autem rosacei sol. ad ℥v. mellis viol. sol. ad ℥vβ. mannæ ad ℥iiij. *castiæ*, tamarindorum. diapruni non sol. ad ℥ij. seri ad ℥v. vnde Gale. cap. 15. lib. 3. de alimen. ait, veteres ad aluum vacuandam, plurimo yfos fuisse sero: secus autem statuendum de sero, quod gratia alterationis exhibetur, de quo suo loco. Dosis hieræ specierum, non transcendat ℥jβ. in febribus putridis, in quibus, cum sola hiera vti non liceat, non potest ita copiosa exhiberi: in aliis tamen morbis etiam vltra ℥ij. dari potest: vnde Aetius ca. 68. li. 16. in vteri strangulatu, ad integram alui ductionem spec. hieræ ℥β. exhibet. Tandem circa lenientium dosim obseruetur, vt in

in lenientibus simus liberaliores, in purgantibus admodum avari. Exigente igitur re, sequentia præscribi possunt. Si prima superfluitas sit summæ actiuitatis, itemque tenuis, & biliola: *℞ syr. ros. sol. ʒ v. decocti endiuidia, vel acetosa parum: fiat potio breuis.* Vel hoc modo: *℞ syr. ros. sol. ʒ iij. seri lactis caprini, optime depurati parum. fiat potio breuis: cui patiens superbibat, seri optime depurati lb iij. & hæc causa est, quod syru. ros. sol. tantum ʒ iij. præscripsimus. Vel: ℞ manna electa ʒ iij. seri ut supra præparati parum: fiat potio breuis. Vel: ℞ florum cassia nouiter extracta ʒ viij. pulpa tamarindorum ʒ β. manna electa ʒ iij. & si contingat, ut patiens sit obnoxius flatibus, addatur seminum citri mundatorum ʒ β. Misc. & cum saccharo fiant boli.* Si prima superfluitas sit quidem tenuis, sed non calida & biliola, verum aquosa: & præsertim si ventriculus febricitantis fuerit frigidior: ita præscribendum: *℞ syr. ros. sol. ʒ v. iuris pulli parum, fiat potio breuis.* Si prima superfluitas sit calida, non tenuis: *℞ mellis ros. sol. ʒ v β.* (non utimur syr. ros. sol. quia superfluitas est crassa, non tenuis) deinde, cum materia sit calida, addimus vel endiuia, vel seri parum: fiat potio breuis. Vel: *℞ florum cassia nouiter extracta ʒ x. pulpa tamarindorum, manna electa. ana ʒ ij. cum saccharo fiant boli.* Si superfluitas crassa sit & frigida: *℞ mellis ros. sol. ʒ v β. iuris pulli parum: fiat potio breuis. Vel: ℞ florum cassia nouiter extracta ʒ β. manna electa ʒ ij. ansorum ruditer contusorum ʒ j. cum saccharo, fiant boli.* Si superfluitates sint crassiores, quales in febribus pituitosis dominari solent: *℞ specierum hiera ʒ iij. florum cassia nouiter extracta ʒ j. manna electa ʒ β. cum saccharo, fiant boli.* Vel ad eandem materiam: *℞ specierum hiera ʒ j. (est basis) cassia nouiter extracta ʒ iij. (quæ corrigit, refrigeratione: & iuuat lubricitate) Mis. cum saccharo, fiant boli.* Quibus febricitans superbibat hoc medicamentum: *℞ mellis ros. sol. ʒ iij β. iuris pulli parum. Mis. & fiat potio breuis.* Mel basis est: aus adiuuans, & vehiculum. Ob hanc portionem de pondere hieræ & cassiæ aliquid in bolis detraximus.

Formula.
Materia re
nuis, cali-
da.

Materia
tenuis a-
quosa.

Materia
crassa, ca-
lida.

Materia
crassa, fri-
gida.

Materia
crassior &
pituit.

Quomodo.

Modum agendi, indicat superfluitatis resistentia, nisi aliquid prohibeat. Si ergo materia fuerit crassior, & maioris resistentiæ: prodest leniente uti forma boli, qui diutius in ventriculo moratur, & efficacius agit: si contra, forma portionis. Additum est, nisi aliquid prohibeat: verbi gratia, si febricitans non potest bolum deuorare, cogimur portionem dare. De hiera notandum, quod boli forma sit exhibenda.

Quando.

ne inuium inuicunda sit assumptio, propter amaritudinem? *Tempus agendi*, indicat superfluitas præsens citra hepar, & præsertim supra crassa intestina: nisi aliquid prohibeat. Lenientia igitur & primis diebus danda febricitantibus: & sequentibus, si procedente febre alia superfluitates primæ generentur. Quod prohibet, præter virtutem, est cibus in ventriculo existens, qui prius est concoquendus. Prohibet etiam materia actu causans paroxysmum: unde leniens non est exhibendum in die accessiōis, vel prope accessiōnem. Ad hæc prohibet insignis vehementia, tum sanguinis, tum cacochymia: dum enim insignis est vehementia sanguinis, leniens non est exhibendum, sed ilico vena secanda, præmissio tantum clystere: si autem cacochymia turgeat, & proinde sit insignis vehementia, non est leniens dandum, sed statim purgans. Et hæc de medicamentis per os exhibendis, cum materia in primis viis subsistit supra crassa intestina.

Lenientia per inferiora administranda. Clyster, eiusque figure.

Quod si materia sit in crassis intestinis, nimirum superfluitas fecalis: medicamenta per inferiora sunt administranda: & vel liquida immittenda sunt instrumento aliquo, ut Clysteres: vel solida imponenda, ut Suppositoria. Clysteres sunt vehementiores suppositoriis, & virtutem postulant robustiorem. Vacuant primas superfluitates, citra nocuumtum ventriculi: ad differentiam lenientium, quæ per os exhibentur. Exonerant autem intestina crassa, & his vacuatis, materia tenuium intestinorum descendit. Non probantur hic vehementes, sed mediocres, & debiles: quia sermo est de materia non purgante, sed leniente. Debiles conficiuntur e malis, violis, beta, hordea, quæ possunt decoqui in aqua, vel in reprobatur etiam succus beta: oleum commune, bityrum, serum, saccharum rubrum, oui vitellus. Mediocribus clystribus præbent materiam, fursures, lino, ossis, huius succus, mel rosatum, electarium lenitum, hieza, oleum chamæmelinum, sal. Dosis ultra puerilem ætatem potest ascendere ad ℥ ij. Debilis ergo clyster hæc erit formula.

Materia clysteri.

Formula.

sacchari rubri ℥ ij. p. olei communis ℥ iij. succi beta ℥ i. oui vitellum, salis communis ℥ β. decocti hordei, maluarum, violarum ℥ j. Clyster mediocris: R. mellis rosati ℥ iij. electarij lenit. succi ℥ j. beta ℥ ij. olei chamæmelini ℥ iij. oui vitellum, salis ℥ j. decocti fursurum ℥ j. Atis. pro clystino. Et hæc de quantitate. Modus administrandi, non pertinet ad instrumentum e ligno, vel alia materia, sed ad medicamenta, quæ

Quomodo.

magis

magis, vel minus calida iniiciuntur: item, magis vel minus fluida vsurpantur. Si enim materia fuerit frigidior, & viscidior: medicamenta etiam magis minusve calida & fluida erunt. Notandum tamen, vt sint calida moderate, quo detineri queant. Quoad *quando agendum*: vt oportet clysmis, *Quando?* dum intestina sunt repleta: nisi prohibeat, vel cibus iam assumptus, vel accessione materia: hora ergo paroxysmi non est iniiciendus clyster: quia virtus non potest sustinere molestiam & accessione, & clysteris. Notandum tamen, si forte contingat, vt tempore accessione materia petat os ventriculi: nos cogi etiam in accessione clysteribus vt, quia materia illa magis potest: sed propter virtutem patientes è lecto non surgent, quia insyncopen inciderent. Hora sit ante cibum.

Suppositoria etiam lenitionis gratia fiant è melle & sale, *vsus* patet, è traditis de clysteribus. Notandum tamen circa *Glandu.* *quando agendum*, vsurpanda esse suppositoria etiam post clysteres, dum è clysmo non fit lenitio.

CAPVT XVIII.

De praparantibus, seu Concoquentibus.

HActenus dictum est de medicamentis, quæ re- *Transitio.*
spiciunt materiam citra hepar existentem: iam
dicendum de medicamentis, quæ respiciunt ma-
teriam vltra hepar. Et hæc medicamenta sunt
Præparantia, ac Purgantia. *Præparantia, seu concoquentia di-* *Præparā-*
riguntur ad materiam febris putridæ, quæ cruda commode *sta.*
non vacuatur: contra, concocta cedit pharmaco. De *Coctione* *De coctio-*
igitur, & *Cruditate* quæ iam dicenda sunt. Mistum anima- *ne & cru-*
tum (vt Aristoteles docet lib. 4. meteor.) & generatur & cō- *ditate.*
seruatur: generatur generatione: conseruatur coctione.
Conseruatio autem duplex: vna secundum speciem, quæ fit
eacoctione, quam Aristoteles Maturitatem vocat, & huius
opus est semen, cuius virtute fit generatio alterius similis:
altera conseruatio est secundum indiuiduum, quæ fit per
Coctionem, vnicam quidem ratione finis, id est, conseruatio-
nis indiuidui: at duplicem ratione efficientis: nam vt fit à ca-
lore naturali inuito, dicitur Elixatio: vt fit à calore naturali
ascititio, vocatur Assatio. Coctioni autem opponitur crudi-
tas: cuius item tres sunt species, Immaturitas, Levis coctio,

Colliguid. Frixiō, seu coctio. *coctio* igitur non artificiosa (de qua Aristoteles agit, gratia facilioris doctrinæ) sed *quæ fit in animalis, nil aliud est, quā perfectio misti perfectibilis, profecta à calore naturali & proprio coquentis, causa suæ conseruationis.* Forma igitur coctionis est perfectio, id est, deductio è potentia ad actum, ex imperfecto ad perfectum. Licet autem mistum mutetur secundum substantiam, quantitatem, qualitatem, & ubi hæc tamen perfectio coctionis pertinet ad substantiā & qualitatem: ut concoctio sit motus mistus è mutatione in substantia, & motu in qualitate. In coctione enim est mutatio secundum substantiam: quia cibus mutatur in substantiam partis vel sanguineæ, vel seminalis. Est etiam motus secundum qualitatem: nam mutationem in substantia præcedit alteratio: vnde Galenus comment. 4. lib. 4. de ratione viæ. ait, quæ coquuntur euadere crassiora. Et Galenus capite quarto, lib. 2. de facult. natural. coctionem quæ ad substantiam & qualitatem pertinet, distinguit à chylosi & hæmatosi: ait enim coctionem esse alterationem: & mutationem alimenti in propriam qualitatem corporis nutriendi: sanguificationem autem tantum esse alterationem, non perfectam coctionem. Respexit autem Galenus cap. 4. l. 2. de fac. natural. & aphor. 44. sectione secunda, libro primo, epid. ad coctionem specificam: videlicet causa conseruationis indiuidui, non speciei. *Subiectum* seu mobile, quod afficitur motu & mutatione, est mistum perfectibile, non perfectum, capax tamen perfectionis: si enim non est capax perfectionis, non coquitur: ut in homine ferrum. Hoc mistum Aristoteles vocat oppositum passium, id est, aptum admittere motum & mutationem. *Causa efficiens* est calor naturalis, ad differentiam caloris præter naturam, qui causa est cruditatis & corruptionis: qui etiam calor proprius est partis concoquentis, id est, temperiem eius complet, ad differentiam non proprii, cuiusmodi est calor balnei, qui etiam ad coctionem concurrat, tanquam adiutans extrinsecum: proprius tamen calor est causa præcipua, ideoque in definitione ponitur. Hinc etiam Galenus cap. 4. lib. de natural. fac. ait, coctionem fieri à calore innato, & iuuari à materia mediocriter calida, cuiusmodi est balneum. *Finis* est conseruatio concoquentis, & secundum indiuiduum. Ex his facile colligitur, quod *cruditas sit imperfectio misti perfectibilis, à calore propria diminutio coquentis.* Forma cruditatis est mistio secundum qualitatem & sub

*Cruditatis
quid?*

& substantiam: mistum enim hoc non est aptum ad conseruationem, vel speciei, vel indiuidui: ita vt perseuerante cruditate, concoquens deducatur ad infecunditatem, & dissiperur. *Subiectum* est mistum perfectibile, seu oppositum paribile: quod in genere & coctioni & cruditati subiicitur. *Efficiens causa* est calor proprius diminutus, id est, calor proprius coquentis, qui tamen à naturali recedit, ac fit præter naturam, ratione defectus: vt in senectute, & frigidis corporibus. *Fini* ac bono caret cruditas: tendit enim ad malum.

Porro concoctio, vel recipit Speciem, & dicitur Matura- *Coctionis*
tio: vel Indiuiduum, & retinet nomen generis, diciturque *Species*.
Concoctio, quæ fit per modum Elixationis, vel Assationis. *1. Maturi-*
Vnde colligitur quod *maturitas sit concoctio misti seminalis, cau-* *ritas quid?*
sa conseruationis coquentis, secundum Speciem. Forma est conco-
ctio, id est, perfectio in qualitate & substantia, prodiens à ca-
lore naturali & proprio. Subiectum, est mistum perfectibili-
le quidem, sed seminale: ad differentiam alimentalis, quod
est subiectum in elixatione & assatione. Quoniam ergo mi-
stum in maturatione mutatur secundum qualitatē & substan-
tiam, vt euadat semen perfectum, quo concoquens secundum
speciem conseruatur: patet maturitatē nō tantū in fructibus
locum habere (vt quidam philosophastri imaginantur) sed etiā
in animalibus, quæ in testibus semen conficiunt. Vnde Ari-
stoteles exempli saltem gratia maturitatem applicat fructi-
bus, facilioris doctrinæ causa: & subdit, in cæteris etiam re-
bus scilicet animatis, simile perfectionis genus comprehen-
di. *Elixatio* (& *assatio*, sunt concoctio misti alimentalis, propter con- *Concoctio*
seruationem indiuidui. vnde Galemus ad has duas coctionis spe- *specialis, co-*
cies respiciens, aph. 44 sect. 2. lib. 1. epid. ait, coctionem esse *tra matu-*
deductionem coctibilis, id est, misti alimentalis in substan- *ritatē di-*
tiam coquentis. Hæc autem concoctio fit per modum Eli- *stineta,*
xationis, vel Assationis. Elixatio differt ab assatione solum *quid?*
per causam efficientem. Nam *elixatio est concoctio misti alimen-* *2. Elixatio*
talis, à calido humido: & similis est elixationi artificiali, cuius *quid?*
subiectum est substantia humida aquea. *Assatio est concoctio* *3. Assatio*
misti alimentalis, prodiens à calore, tum sicco, tum alieno: & sic di- *quid?*
stinguitur ab elixatione, quæ fit à calore humido, & natiuo,
Quæritur autem cum assatio sit concoctio: quomodo fiat à
calore alieno? Respondendum, assationem necessario fieri à
calore naturali ad differentiam caloris præter naturam: ac

hic calor naturalis, & proprius corporis concoquentis, vel natiuus est & insitus, vel ascititiuus: comment. aph. 22. section.

1. natiuus quidem viget in primis ætatibus, quæ participes sunt humiditatis: vnde calor iste naturalis est causa elixationis: ascititiuus autem viget ætate progrediente, cum humiditas minuitur, & qualitas caloris intenditur: vnde hic calor naturalis, sed ascititiuus causa est assationis: & à Philosopho propter exiguam humiditatem vocatur siccus: quia vero ascititiuus est, vocatur alienus. Sciendum autem in calore & natiuo & ascititio vim esse absumendi, vt propterea omnia quæ coquuntur fiant crassiora. At in elixatione partes internæ sunt sicciores externis: contra in assatione, externæ sunt sicciores internis, quia in assatione meatus contrahuntur, vt humor insitus effluere prohibeatur. Hinc etiam species cruditatis facile cognoscuntur. Nam *immaturitas est cruda materia seminalis, prodiens à calore imminuto*: siue (vt Philosophus ait) calor propria ratione exiguus sit, siue humor maturandus exsuperet. *Lenis coctio, elixationi opposita, est cruditas materia alimentalis, prodiens à calore natiuo diminuto, propter frigiditatem & humiditatem*. Vnde notandum, si hæc frigiditas & humiditas pertineat ad elixans, fieri leuem coctionem læsa facultate: vt dum ventriculus est affectus morbo frigido & humido: sin vero pertineat ad id quod elixatur, sit hæc cruditas ob errorem externum: verbi gratia, dum cibi frigidiores & humidiores copiosi ingeruntur. *Frixio denique seu tostio, quæ opponitur assationi, est cruditas materia alimentalis, prodiens à calore ascititio diminuto, qui non potest æqualiter alimentum conficere*. Imminuitur autem vel propria ratione alimenti humidioris: vt apparet in frixione arte facta. Tostio igitur sit, aut propter exterioris ignis tenuitatem: aut propter aquæ vim, qua res assanda abundat.

Cruditatis species.

1. *Immaturitas.*

2. *Lenis coctio.*

3. *Frixio.*

De coctione materia morifica.

Ex his ergo nunc statuendum, ad quam speciem pertineat coctio humoris morifici. Sciendum ergo, quod ad nullam e propositis speciebus redigi possit: materia enim morifica concoquitur, nec generationis, nec nutritionis gratia, sed vt purgetur: non est igitur legitima coctio, sed concoctio methaphorica, qualis est in tuberculis, piritua, &c. Hanc tamen methaphoricam coctionem Philosophus ob similitudinem maunt ad maturitatem referre, quam ad elixationem, vel assationem. Sicut enim in maturitate, id est, in coctione materię seminalis, minor portio mutatur in substantiam

tiā

tiam, vel testium, vel vasorum seminalium : maior vero in semen perfectū, quo species conseruetur, ita in coctione materię morbigicę, in minor portio vertitur in alimētum, & substantiam partis : maior excrementum purgādum, sed tamen mitius. Contra in elixatione & assatione, id est, in coctione materię alimentalis, maior portio vertitur in alimentum.

Maturitas igitur metaphorice accepta, est concoctio innati humoris materię morbigicę, prodiens à calore naturali : ut cedit phar- *Maturatio humoris morbigici quid.*
maco attrahenti, & naturę expellenti. Forma, est perfectio &

concoctio : quę potest tum ad substantiam & qualitatem, tum ad qualitatē tantum pertinere. Ad substantiam & qualitatem : causa portionis alimentalis, quę euadit alimentum coquentis. Ad qualitatem tantum, causa portionis excrementitię : quamuis enim mitior materia excrementitię : tamen remanet adhuc materia excrementitię, vt sit purganda. *Subiectum* huius concoctionis est innatus humor materię morbigicę, id est, portio alimentalis : materia enim morbigica in corpore viuente, vix expers esse potest portionis alimentalis. Vnde Galen. aphor. 44. sect. 2. lib. 1. epid. ait, maturitatem esse concoctionem eorum, quę sunt præter naturam : & addit differentiã coctionis materię præter naturam, & secundum naturam : si enim materia sit secundum naturam, maxima pars cōcoquitur, & minima est semicocta : contra si materia sit præter naturam, quod assimilatur exigūm est, plurimum autem semicoctum. Aristoteles igitur respiciens ad vtramque portionem, ait, in maturatione materię morbigicę, partem concoquentem alia ad se trahere, nimirum partem alimentalem : alia expellere, nimirum partem excrementitię : quod etiam de excretionē post coctionē scribit Galen. com. aph. 22. sect. 1. *Causa efficiens* maturationis materię morbigicę, est calor naturalis. Sic Galen. ait, cap. 4. lib. 2. de fac. natur. concoctionem & alterationemimenti, & excrementi, fieri à calore innato : & t. 22. lib. 2. de ratione vict. ait, coctionem materię morbigicę, fieri à calore non sicco, sed humido & vaporoso, qui in animalibus iuuetur à materia mediocriter calida, id est, à balneo, &c. calor enim vt moderatus, adiuuatur à simili.

Notandum autē varia esse, quę coctionem materię morbigicę iuuant : nimirū calidiora, frigidiora, incrassantia, attenuantia. Materia enim morbigica consideratur, vel quatenus concoquitur, vel quatenus est concocta. Primo modo

Concoquendum finem culas.

confide

considerata, vt concoquitur, permistam habet portionem alimentalem: & hæc materia, vt cruda; requirit moderate calida, quo crassior euadat: quatenus autem impedimenta habet, coctionem prohibentia, alia, eaque varia requirit medicamenta. Impedimenta illa pertinent ad qualitates primas vel secundas: Ad primas, materiæ caliditas, aut frigiditas: vnde refrigerantiâ, vel calefacientiâ miscenda. Hac ratione pituitam Galen. concoqui dicit à calore febrili, com. aph. 37. sect. 4. Ad secundas qualitates pertinet materiæ crassities & tenuitas: vnde modo incrassantia, modo attenuantia miscenda (omnis quidem coctio fit incrassando: sed ratione impedimentorum, interdum oportet crassefacere, interdum subtiliare.) Altero autem modo considerata materia morbifica, prout concocta est, & separata per maturitatem à portione alimentali: hæc materia nequaquam est incrassanda. Vnde Galen. t. 23. lib. 3. prognost. ait, corporis humores tenuiores paratissimos esse ad excretionem: & com. aph. 24. sect. 1. inquit, humorẽ purgandum fluxioni paratum, id est, tenuem esse debere. Hac distinctione, loca Galeni in specie pugnantis, vere conciliari possunt. Et hæc de coctione materiæ morbificæ.

*Materia
cocta nõ
est incrassanda.*

*Materia
coquẽtes.*

*Syrupus
acetosus
simplex.*

Oxymeli.

De materiis medicinalibus, quæ materias morificas concoquunt, in doctrina speciali dicendum. Duo tamen sunt maxime communia medicamenta, quibus in omni fere putrida febris vti licet: nimirum *Syrupus acetosus simplex*, & *Oxymeli simplex*. Syrupus conficitur ex aqua, saccharo & aceto: habetque vim refrigerandi, detergendi, incidendi, attenuandi. Dum refrigerat, remittit calorem putredinem, & infringit feruorem excrementi calidi. Incidendo, pituitam viscidam, friabilem reddit. Detergendo, pituitam viscidam temouet à parietibus vasorum. Attenuando, præparat pituitam & melancholiam crassam. Siccitate non nocet, quia ex aqua conficitur: imo siccitate prodest, quia imminuit materiæ humiditatem, quæ in causa est facilioris putredinis: vbi tamen siccitatis timor est, hic syrupus exhibetur cum diluto humectante. Frigore etiam suo non nocet pituitæ frigidæ: syrupi enim huius frigiditas remissa est, & præterea calidiora in formulis misceri possunt. *Oxymeli compositum* est, ex aqua, aceto, & melle. Strenue deterget, nec febres accendit, c. 4. lib. 8. meth. Quod si febris vehementior sit, expedit diluere: vnde secundum Galen. t. 30. l. 3. de ratione vict. oxymeli parum aceti habens

bens sitim sedat, mellisque noxam inhibet. Hæc duo medicamenta in eo conueniunt, quod vigilias faciant: vnde in putridis febribus, si vigilæ sunt pertinaces, his vel non utendum, vel in exigua copia, admittis aliis. Præterea etiam conueniunt, quod ratione aceti lædunt intestina dysenterix obnoxia. t. 32. lib. 3. de ratione vict. Differunt autem ratione mellis, quod saccharo calidius est: vnde in febribus vehementioribus potius syrupo acetoso, quam oxymelite utendum. *Ius pulli*, calorem habet admodum similem calori naturali: vnde in putridis febribus syrupi diluendi sunt iure pulli: quia hoc materiam morbificam attemperat, caloremque naturalem iuuat. Possunt etiam alij liquores cum syrupis misceri, parati è coquentibus, per Destillationem, Decoctionem & Infusionem. Destillatio fit in vase plumbeo, figlino, vel vitreo: beneficio vel solius ignis, vel ignis cum aqua. Decoctio fit vel simpliciter, vel in vase duplici. Infusio est leuis, vel insignis. Destillatio in vase plumbeo non probatur, abraditur enim portio plumbea, quæ nocet: probatur in vase figlino, & potissimum in vitreo, maxime in balneo Mariæ. Decoctio institui debet à perito pharmacopæo, vt quæ citius coquantur, tardius iniiciantur: & magis probatur in vase duplici, ore vasis occluso. Infusio maxime omnium probatur: vnde Mesue, c. de myrobal. ait, medicamenta magis fieri aperientia per infusionem, quam per decoctionem. Insignis autè est infusio, si simplicia infundantur in diluto actu calido: & dilutum, quantum fieri potest, calidum seruetur: secus enim leuis est infusio, & potius madefactio.

De Vsu. Sympliciorum dosis est ab ℥iij. ad ℥vj. Vt, R. *Syr. acetosi simpl. ℥ij. iuris pulli ℥iij. Misc. pro syrupo.* Sciendum autem dosin variari, pro actiuitate materix morbificæ. Actiuitas autem maior est, primum in maiori copia materix: deinde etiam maior est actiuitas, in materia excrementitia, separata à materia alimentali (ad differentiam materix morbificæ: permixtæ cum materia alimentali) & hæc proinde statim præparanda, & euacuanda est: alias peior redditur: quæ de causa recidiuæ etiam peiores solent esse, morbo priore. *Modus* syruporum, pertinet ad qualitates primas & secundas. Ad primas, verbi gratia, bilis, vt resistit ratione caliditatis: indicat syrupum actu frigidum exhibendum: pituita contra. Perpetuo tamen requiruntur etiam permittentia: vt, ventriculus interdum prohibet actu frigida. Quoad secundas quali-

*Quibus di-
luendi sy-
rupi.*

Quantum.

Quomodo.

tates: exhibemus syrupos magis vel minus liquidos: item medicamenta exhibentur forma pulueris, trochiscorum, electuarij: si scilicet materia præparanda est insignis resistentiæ, ut contingit in febribus diuturnis puitosis. Notandum autem cum syrapi exhibentur, vel cum diluto, vel sine diluto: item dulces, aut alterius saporis: hoc non pertinere ad methodum medendi, sed ad compositionem medicamentorum: diluta enim miscentur, ut sint vehicula syruporum: sic ius pulli vehit syrupum acetosum: dulcia autem miscentur, propter syrapi iniucundum saporem.

Quando.

Quoad quando agendum. Exhibendi sunt syrapi, dum præsens est materia concoquenda, & præparanda: nisi aliquid prohibeat. Primum ergo exhibendi sunt causa materiæ morbificæ, mixtæ cum alimentali. Deinde exhibendi sunt causa materiæ morbificæ separatæ ab alimentali. Porro prohibens est præina superfluitas: plenitudo totius: portio materiæ excrementitiæ separatæ ab alimentali: & quâdoque virens imbecillis. Dum enim prima superfluitas est præsens: tum tum ne per syrupos ultra hepar deferatur, unde obstructions augerentur: quare primo lenienda aluus, dein syrapi exhibendi. In plenitudine totius, primum sanguis est euacuandus, ne à syrapis agiteretur: nè ab his, si calidi sunt, putredo oriatur. Portio materiæ excrementitiæ separatæ ab alimentali, magis potest ad indicandum purgans, quam materia morbifica mixta cum alimentali possit, ad indicandum concoctionem: quare in febribus putridis, in quibus per vices est concoquenda materia: vna die oportet intermittere syrupos, & exhibere purgans, cuius beneficio portio excrementitia secreta ab alimentali euacuetur. Virtus denique nimium debilis, interdum cogit medicum, ut cibum exhibeat singulis quatuor horis: ut non possint dari syrapi: ubi tamen medicus prudens, iura alterata præbet, quibus nutrit, & simul concoquit. Hora, omnis esse potest, qua præsens est materia coquenda: nisi quid prohibeat: nimirum cibus, materiæ accessioniis, aut virtus. Cibus enim assumptum prius concoqui oportet: deinde exhibendus est syrupus: vnde Gal. t. 35. l. 3. de ratione vict. syrupos exhibebat ante cibum. In accessionum principio, syrapi non sunt dandi, sed ante accessionem: vnde Hipp. t. 4 o. l. 3. de ratione vict. nolebat aquam esse exhibendam dum pedes frigent, id est, in principio accessioniis, quia virtus nimis defatigatur à materia accessioniis.

Virtus

Virtus prohibet, dum est debilis, verbi gratia, propaer vigilias : vt non liceat febricantem excitare à somno, propter materiæ concoctionem.

CAPVT XIX.

De medicamentis Purgantibus.

Attenuus de medicamentis præparantibus, sequitur de purgantibus. *Medicamentum purgans est illud, quod potest euacuare materiam separatam ab alimentali; seu, purgans est materia remediij, indicati à caco-chymia.* c. 11. l. de plenitud. Breuiter ergo dicendū de caco-chymia speciebus, vehementia, & latiore, seu inclinatione. *Purgans quid.* Species caco-chymia tres sunt, Pituitosa, Biliosa, & Melancholica: vnde indicatur vomitorium, soluens, diureticum, sudoriferum, vacuans vel pituitā, vel bilem, vel melancholiam. *Purgantiū differentia à caco-chymia.* Deinde caco-chymia, quo vehementius sit oportet. Inclination caco-chymia quadruplex est, cap. 9. lib. 11. meth. nimirum ad Ventriculum, Aluum, Renes, & Poros cutis: vnde indicatur remedium vomitorium, soluens, diureticum, sudoriferum.

I. De Vomitoriis.

Caco-chymia inclinatio vel abolita est, vel imminuta: si est abolita: reuocanda & excitanda, nisi caco-chymia vitium sit in substantia, id est, nisi sit putrida: materia enim putrida, non habens inclinationem, per os ventriculi non est deducenda. Si materia habeat inclinationem, sed imminutam: hæc iuuanda: ita vt etiam putrida materia, quæ sponte impetum habet ad os ventriculi, vomitum prouocandum suadeat: quia enim inclinationem habet ad os ventriculi, non detinetur tamdiu vt lædere queat os ventriculi, sed illico pertransit: quod aperte Galen. c. 9. lib. 11. meth. affirmat. Præterea si abolita sit inclinatio: caco-chymia existens, in locis superioribus, quæ vias habent sursum, per superiora est purganda: in partibus inferioribus, quæ vias habent deorsum, per inferiora educenda est. Verbi gratia si pituita est genita in ventriculo, & nullam habet inclinationē, per vomitum est educenda: quod si inclinationem habeat ad inferiora, vacuanda est per aluū. Hinc facile conciliari possunt loca quæ pugnare videntur: Hip. enim aph. 4. sect. 4. ait, æstate per superna hyeme
Quando per vomitū euacuari liceat.
 1. Ratione inclinationis materia.
 2. Ratione loci.
 Conciliatio Hippoc. & auctoris li. de sal. dia.
 per

per inferna esse euacuandum: contrarium vero iubet auctor. l. de salub. dieta. comment. 13. vbi dicendum, Hippoc. respexisse ad inclinationem materiæ imminutam: bilis enim per ætatem in iecinore genita, inclinatio nem habet imminutam ad superiora: ideoque vomitu vacuanda: pituita autem per hyemem in ventriculo genita, inclinationem habet imminutam ad inferiora, ideoque per sedem purganda. Auctor vero l. de salubri dieta, respexit ad inclinationem abolitam: bilis enim ætate genita, in parte inferiore, nimirum hepate, nullamque ad os habens inclinationem, per aluum euacuanda: pituita vero hyeme genita in ventriculo, parte superiori, nullam habens ad aluum inclinationem, per superna est euacuanda.

*Permittē-
tia vomito-
riorum.*

Semper autem hic permittentia oportet supponere: si enim virtus sit debilis, omne purgans prohibetur: sic è morbo graciles, nullam ferunt purgationem: aphorism. 35. sectio. 2. natura autem graciles, & facile vomentes per superna purgandi sunt.

*Quādo va-
lentioribus
opus sit vo-
mitoriis.*

De vomitoriorum varietate, in doctrina febrium speciali agetur. Num autem valentioribus, an debilioribus vti debeamus. ita æstimandum. Si materia euacuanda est putrida, validioribus non vtendum: quia putrida non vacuatur per vomitum, nisi habeat inclinationem: quod si ergo inclinationem habet, facile & leui medicamēto euacuari potest. Si materia non est putrida, vehementioribus vti licet: præsertim si non absit inclinatio (quæ in materia non putri, non est necessaria) vnde in quartana album veratrum adhibetur. De vsu vomitoriorum cap. 17. satis dictum est.

II. De Soluentibus.

*A vehe-
mentibus
soluentibus
cauendum.*

Medicamenta per aluum purgantia, varia sunt, pro cacochymia specie: de quibus in doctrina febrium speciali. Hoc in genere obseruandum, è cap. 11. lib. 2 de alim. cum soluens acre sit, & calidum, in putridis febribus, à validioribus abstinendum esse: præsertim in continuis, & continentibus.

*Quātum.
Quomodo.*

Quoad quantum agendum: à summa dosi recedere tutius est. Purgantium modus, est potio, validior bolus, adhuc validior pilulæ: quibus pro materiæ resistentia vtendum. Respicere tamen oportet ad prohibentia. Si enim febris sit admodum vehemens: cauendum est à forma boli, & maxime pilularum

pilularum: quoniam medicamenta purgantia in his formis
 plus iusto calefaciunt. Quod si ægrotans non possit medica-
 menta assumere, nisi in forma pilularum: tum post pilulas
 deuoratas, aliquod decoctum refrigerans propinabimus, ver-
 bi gratia $\frac{3}{4}$ v. vel $\frac{3}{4}$ vj. *seri lactis, aut aqua bordeacea, vel iuris*
alterasi cum endiuia. Quoad quando agendum: & primum, quo *Quando.*
 die purgans exhibendum sit: mox in quaestione, de minora-
 tione materiæ explicabitur. Quoad horam: pharmacum in-
 terdum exhibetur per quinque aut sex horas ante cibum: in-
 terdum per semihoram tantum: semper tamen hora esse
 debet, qua cibi assumpti sint concocti, & infra ventriculum
 distributi: ratio petitur è cap. 13. lib. 2. de ratione vict. pharma-
 cum enim tria requirit: primum, vt è potentia in actum du-
 catur, ab alteratrice: deinde, vt ab expultrice distribuatur ac
 deferatur ad materiam purgandam: tertio, vt materia pur-
 ganda ab expultrice pellatur à circumferentia ad centrum,
 quam expultricem iuuat pharmacum, & per facultatem
 acrem irritantem, & per facultatem attrahentem. Quia igitur
 post assumptum pharmacum ventriculus exercetur &
 agitur, dum medicamentum è potentia ad actum deduci-
 tur, itemque dum distribuitur: patet, cibum tunc oblatum,
 duo incurrere incommoda: primum enim virtus agitur,
 quæ eodem tempore deberet, & expellere materiam attra-
 ctâ, & retinere cibum: deinde ob cibi præsentiam vis phar-
 maci exsoluitur, vt non succedat purgatio, quemadmodum
 deberet. Si ergo virtus permittat, pharmacum detur per
 sex horas ante cibum: si minus, detur saltem per mediam
 horam ante pastum, quemadmodum Hippoc. præbuit, tit. 12.
 lib. 2. de ratione vict. (numquam vna cum cibo) & tunc ci-
 bus sit tenuis, vt *cremor ptisanæ.* Pharmacum porro sui præ-
 sentia non prorsus prohibet somnum: quia in somno facilius *Pharmac*
 de potetia ad actum deducitur: distributionem autem phar- *superdome*
 maci somnus impedit, quam promouent vigilæ. Quod si *re licet.*
 pharmacum sit debile, ait Auicennas, quarta, primi. cap. 5.
 æger non indormiat: alias enim natura coquet medicamen-
 tum. *Vbi agendum,* patet, ratione subsistentiæ, nimirum per *vbi agen-*
 os medicamentum esse offerendum, nisi id ventriculi ali- *dum.*
 quod vitium prohibeat: tunc enim per sedem lenientia me-
 dicamenta sunt iniicienda: & si æger non admittat clysmos,
 licebit vmbilico applicare *unguentum Agrippæ, aut de cyslami-*
no, seu artanisa, vt sic cacochyimia euacuetur.

III. De Diureticis.

*Diuretica
calida &
secca.*

Humida.

*Quanam
diuretica
in febrilibus locum
habeant.
Apium pro-
ponitur
inter non
vehemen-
ter calefa-
cientia.
Cur in fe-
brilibus diu-
reticis per-
miscetur
calida.*

Quantum.

Medicamenta quæ per lotium euacuant materiam mor-
bificam, id faciunt qualitatibus primis, vel secundis. Primis:
calore, siccitate, humiditate. De calore & siccitate Gale. agit
c. 13. li. 5. simpl. quibus qualitatibus etiam tenuitas (qualitas
secunda) iuncta est, qua sanguis attenuatur, funditur, & por-
tio serosa à crassa separatur. Tale ergo medicamentum est
calidum in tertio, tenuis substantiæ, & acre: vt *semen apy, pe-
troselinum, feniculi, dauci, ammios, &c.* Quæ per humiditatem
agunt, sunt valde aquosa: vt *fructus humidiores, semina melonis:*
sic c. 6. li. 2. de alim. Gal. ait, *cucumeres minus humidos esse pepo-
nibus, ideoque minus urinam mouere.* Hæc autem humiditas, te-
nuis & aquosa vt sit oportet: tali enim humiditate renes
gaudent: unde ad renes fluens, materias morbificas secum
desert. Diuretica etiam quædam agunt per qualitates se-
cundas: vt *hordeum ceterach.* Semina frigida tum maiora, tum
minora, humiditate & tenuitate lotium prouocant: vt *semina
cucurbitæ, cucumeris, melonum.* Ex his igitur variis diureticis, in
febre continente, dum putredo totum corpus occupat, pro-
bantur, quæ citra valentem calorem & siccitatem lotium
prouocare possunt: vt *cremor ptisanæ, mulsæ, oxymeli, apomeli,
apy radix decocta in aqua potabili.* c. 9. li. 11. meth. Sed dubitatur
quare apium proponatur inter ea, quæ non vehementer calefaciunt
cum tamen cap. 13. li. 5. simpl. apium dicatur valenter calefacere:
& propterea cap. 4. li. 8. meth. in febribus improbat mulsæ cum
apio, calefacit enim ut vinum. Responsio. Apium lib. 11. meth.
proponitur in aqua: vbi non ita calefacit, ac in mulsæ, lib. 8.
meth. Deinde lib. 11. meth. radices apij proponuntur, at lib. 8.
meth. & lib. 5. simpl. de apij semine instituitur sermo. Dubi-
tatur etiam, quare in febribus putridis, non utamur diureticis so-
lum frigidis? Responsio. Quoniam materia putrefacta quam-
primum euacuanda est: at quæ tantum sunt frigida, non
sunt ita efficacia, sicuti quæ moderate sunt calida, vt *radix
apy, vel petroselinum in aqua.* Vnde prout calor febrilis maior,
aut minor est: pro eo, magis aut minus calida, eaque in ma-
iori aut minori dosi misceri possunt.

Quoad usum: & primum ad Quantum agendum: id in praxi
obseruandum, vt diuretica exhibeantur in maiore dosi, quam
preparantia: & proinde vsque ad 3 x. secundum hanc for-
mulam: & *capsulorum Veneris viridium, fol. betonica, ceterach,*

ana p. j. rad. petroselini ʒ β. aqua hordeacea, alterata cum liquiritia ʒ viij. fiat infusio suffrag. & facta expressione add. syr. acetosi sim. l. ʒ j β. seminum melonum ʒ ij Misc. per diuerſa. Quoad *Quomodo.* modum: diuretica actu calida, non frigida sunt administranda. Efficaciora redduntur, si pulueres propositorum simplicium misceantur in aqua hordeacea.

Quoad *quando.* Diureticis utendum non est primis diebus, dum materia cruda est: alias enim non vacuatur, sed solum agitur à diureticis: lib. i. ad Glauco in cura febris pituitosa. Hora autem qualibet exhiberi possunt, nisi quid impediat, nimirum cibus. Hic enim prohibet diuretica medicinalia, non alimentalia, quæ cum cibus misceri possunt. Diuretica siquidem medicinalia, vt beconica, ceterach, quia ventriculo non sunt familia, tamdiu in ventriculo non detinentur, donec cibus concoquatur, sed cibum crudum secum ducunt. Alimentalia vero, vt semina melonum, radices petroselini, asparagi, ob familiaritatem in ventriculo detinentur, donec cibus assumptus coquatur.

IIII. De euacuantibus per poros cutis.

Vacuantia per meatus cutis sunt, quæ materiam morbosam à *Impellentia,* centro ad circumferentiam mouent: idque vel Impellendo, vel *& attractantia.* Attrahendo. Quæ impellendo mouent, habent naturam diureticorum: eadem enim materia & lotium, & sudorem potest ciere: cap. 9. lib. 11. meth. Lotium quidem: si renes sint calidiores, cutis densa, si materia residet in conuexo hepatis, & inclinationem habet ad renes. Sudorem contra, si renes sunt frigidi, pori cutis rari, si materia resideat in venis cuti proximis, & inclinationem habeat ad cutim. Horum igitur materia patet è iam dictis. Attrahentia autem sunt, quæ moderate calefaciendo, cutim rarefaciunt, vt chamamelum, balneum tepidum, cap. 9. lib. 11. meth. Vnde oleo chamamelino vel licet, quod non constipat, vt quidam dicunt, qui ratione visciditatis omnia olea stupare existimant: sunt enim quædam olea laxantia, vt Sabinum, cap. 2. lib. 8 metho. Hinc & Auicennas probat inunctionem cum oleo chamamelino, & vititur frictione cum vino albo, & aqua tepida.

Balneum in putridis summe utile esse potest: sed iam in Balneum usu non est, dubio procul cum detrimento agrotantium. in putridis. Gale. cap. 10. li. 11. meth. balneum in putridis, omnibus materiis anteponitur: quia vacuantia per aluum, vrinam, sudorem,

sunt calida: balneum autem minus calidum. Probat item balneum in putridis, cap. 7. lib. de marcore, siue putridæ sint solæ, siue cum hecticis. Præterea cap. 20. lib. 11. meth. ait, balneum in putridis iuuare: quia humor abunde vacuatur, & calor febrilis transpirat: balneum enim excrementa humida & fuliginosa educit. Ad notandum ex eodem cap. 20. lib. 11. meth. balneum materiam morbosicam trudere ad articulos, id est, ad partes ignobiles, humores liquando, & vias dilatando: vnde cauendum, ne febricitantes sint obnoxij doloribus articulorum, ita vt sint sensus exquisitoris: virtus enim præ nimio dolore succumberet. Prohibetur autem balneum, secundum Galenum loco citato, si adest imbecillitas vlcusculi alicuius principalis, vel consentientis cum principali.

Quomodo.

Quoad modum. Galenus cap. 10. lib. 10. meth. ait, in febribus quæ oriuntur ex inflammatione, vel putredine, probari balneum caloris moderati: tepidum scilicet non actu frigidum: in hecticis autem febribus probari balneum actu frigidum: ratio est: quia in hectica opus est refrigeratione: in putrida opus est, vt materia per cutim euacuetur, capite 20. lib. 11. metho.

Quando.

Quoad quando agendum. Balneo vtendum, dum materia per cutim vacuanda est præsens, & non adest prohibens. Prohibet febris vehemens: cap. 20. lib. 11. meth. tunc enim balneo in declinatione vti licet, non in statu. Præterea prohibet materia copiosa, cruda, cap. 10. lib. 11. meth. & hinc ca. 7. lib. de marc. vult, balneum esse administrandum post materiæ concoctionem. Sed notandum, quod cap. 9. lib. 11. meth. Galenus ait, si febris sit vehemens, vt est continens, non esse vtendum vino, lauacro, nec inunctione cutim rarefacientē.

*Inunctio
Ætj in
febris
malignis:
infra c. 31.*

Ratio est: quia febris vehemens habet rationem vrgentis, cum calidum innatum & secundum substantiam consumat, & secundum motum extra moueat, ac dissipet: vnde, si adhiberentur rarefacientia, calidum innatum prorsus euanesceret. Obicere hic quis posset inunctionem resoluētē Ætj, ex oleo, aqua & nitro: quæ præctici in febribus malignis & continentibus vtuntur. Responso: in febribus malignis, accedentibus ad febrem pestilentem, optimum est, vt inunctione Ætj, quæ materiam morbi veneficam vacuat: licet enim hic & febris vghemens sit ratione essentia, quia intensissima: & materia vehemens ratione essentia, quia maligna, plurimumque à naturali statu recedit: magis tamen potest

vehe

vehementia materiæ quam febris: quia nisi materia hæc vacuetur, imminet etiam vehementia facultatis, nimirum casus virtutis. Cæterum Aetius ita occurrit materiæ, vt interim febrim non omnino negligat: quare propter materiam, vtitur nitro: propter febrem, miscet aquam. Quod si autem materia non sit maligna: tunc febris vehementia magis potest: quo respiciens Gale. cap. 9. lib. 11. meth. prohibet inunctionem. Tempus autem inunctionis sit hora ante cibum.

De iis quæ impulsione euacuant, hoc notandum est: vt, cum per os exhibeantur, in maiori *dosi* administrentur, quam diuretica, nimirum ad lb j. *Modus* sit, vt actu dentur calida. *Tempus*, vt dentur post diuretica, deinde, vt prius exhibeantur impellentia, post attrahentia: materia enim in gibbo hepatis existens, primo est vacuanda diureticis: deinde vtendum impellentibus, quæ materiam attenuant, & in vaporem mutant: postremo attrahentibus quæ tantum attrahunt.

Appendix: de tempore exhibendorum soluentium.

Quando purgantia exhiberi debeant, breuiter Hippoc. proponit, aph. 22. sect. 1. inquit. Πίπορα φαρμακίων, ἢ κρίνῃ, μὴ αἰμῶ: μὴ δὲ ἐν ἀρχῇ, ἢ μὴ ὀργῇ τὰ δὲ πλεῖστα: καὶ ὀργῇ. Quibus verbis statuit materiam morbosam esse purgandam, dum adest indicans ita vehemens, vt nihil prohibeat. Prohibens autem est Virtus, & Materia. De virtute Hippoc. nil dicit: quia communis est, in administratione cuiuslibet materiæ. Proponit igitur solum materiam, quæ non est sanguis, sed materia excrementitia præter naturam: quæ vel concocta est, vel cruda: item, vel turgens, vel non turgens. Hæc igitur materia vel Similia indicat, vel Dissimilia. Similia, si per omnia indicat purgans, vt materia morbifica concocta: hæc enim quatenus est excrementitia, indicat purgans: quatenus concocta, non prohibet, sed potius permittit. Dissimilia: si è parte indicat purgans, è parte prohibet: vbi vires interdum magis prohibent purgans, interdum magis indicant. Primum enim si materia cruda est: vires magis prohibent, quam materia excrementitia indicet purgans. Deinde, si materia est turgens & furiosa: vires magis indicant purgans, quam prohibeant: quia materia turgens magis potest ad indicandum, quam cruda ad prohibendum. Furiosa enim ma-

*Recta ad-
ministra-
tio impel-
lentium.*

*Purgan-
dum, quā-
do adest
indicans:
abest pro-
hibens.*

*Indicans,
est mate-
ria præter
naturam,
cocta.*

*Prohibens
est crudi-
tas, si tur-
gent mate-
ria.*

teria vrget: quoniam ex ea periculum imminet, ne partem aliquam ruat principem. Postremo addit Hippocr. plurimum vero non turget. Vbi medicos monet, vt, licet raro turgeat materia, non tamen raro purgantibus vtantur. sed frequenter. Nam reperiunt materiæ, quæ magis vrget, quam materia furiosa, id est, maius periculum portendunt: & per consequens etiã magis indicant purgans. Tales autem materiæ sunt & Venenatæ, & Actu ad partem aliquam principem ruentes. Venenata enim materia, celerrime cor occupare, & hominem interficere potest: magis ergo potest, quã furiosa, & proinde statim purganda: præsertim si talis sit venefica qualitas, quæ alterantibus non cedat. Hinc Galen. c. 4. l. 1. de diff. feb. & lib. 8. meth. ait in pestilentia illos sanitati restitutos esse, qui per vomitum, & alui fluxum sint purgati. At aphor. 57. sect. 3. lib. 3. epidem. inquit, in constitutione pestilenti, cum alui fluxu, neminem esse sanatum. Vbi sciendum, non contigisse mortem, è fluxu alui: sed è copia crudorum humorum, cum quibus virtus consistere nequit. Nec etiã obstat, quod aphor. 12. sectio. 4. dicitur, bilem atram, morbis incipientibus exeuntem, lethalem esse: hæc enim bilis atra non est venefica, nec furiosa, nec impetu petit partem principalem: sed cruda est, & permixta cum materia alimentali. Quamobrem si indicantium est dissensio, è duobus malis, minus est eligendum. Materiam quidem crudam, non purgare ab initio, sed expectare coctionem, & declinationem, bonum est: attamen si turgens est, aut venefica: necesse est, vt vel crudam educamus, vel declinationem expectantes mortem ab illa materia illatam videamus. Mius ergo timenda est noxa cruditas, quam veneni, *ἢ τὸ ἐν γαστρὶ*. Secundo, materia, quæ euidenter habet impetum in partem præcipuam, id est, quæ actu ad partem principem mouetur: magis vrget, quam furiosa, in qua solum imminet impetus in partem principalem. Hinc Galenus cap. 8. lib. de venæ sectione: ait, incipiente inflammatione, si suspicemur inflammationem fore magnâ: curationem auspicandam esse à vacuatione, id est, phlebotomia, aut purgante (*ecce, purgat inter initia*) ne materia impetum habens ad partem, magnam inflammationem susciteret: nec enim preparantia, si ea ante purgans dare vellemus, inflammationem prohibere possunt: & facta iam inflammatione, non amplius tutum est purgare: materia enim collecta & impacta, non cedit pharmaco. Cæterum, expedit etiam

etiam purgare materiam, dum habet impetum ad partem non principem, quæ tamen cum principali consentit. Hinc capite secundo, libro sexto, meth. Galenus in punctura nerui succum vitiosum protinus purgat, non exspectat coctionem: priusquam enim absoluator coctio, cerebrum traheretur in consensum, homoque moreretur.

Dubitatio autem hic oritur: nam Galenus dum incipit in- *Num ma-*
flammatio hepatis, non utitur pharmaco: cum tamen materia im-
petum habeat in partem principem? Responſio. Ea materia, qua- *teria iecur*
petos pur-
 gans est excrementitia, indicat purgans: quatenus cruda, *ganda.*
 prohibet: quatenus impetum habet in iecur, indicat pur-
 gans, sed tale quod retrahit. Cum autem omne purgans
 attrahat ad hepar, fit vt in inflammatione iecoris purgans
 prohibeatur. Longissime enim materiam à parte affecta re-
 trahere oportet, non ad partem attrahere. Vnde quoque in
 principio inflammationis oculi Galen. purgat: quia sic ma-
 teria ab oculis retrahitur.

Vt autem breuiter totum comprehendamus negotium, *Breuis aia*
 sic statuendum. Materia morboſa alia à sanguine, vel est Co- *ni phala-*
 cta, vel cruda. Si cocta: purganda. Si cruda: vel Non admit- *uitur*
 titur coctionem, vel Admittit. Si non admittit: ea cruditas non
 prohibet purgans: vt in ascite aquam liceat ex abdomine
 euacuare, etiam non coctam, quia coctionem omnē respuit.
 Si materia cruda coctionem admittit, vel Venenata est, vel
 Veneni expers. Si venenata: ilico purganda. Si materia cruda
 est expers veneni: vel Quiescit, vel Mouetur. Si quiescit: pri-
 mo concoquenda est, deinde purganda. Si mouetur: tunc ter-
 minus ad quem vel Latet, vel Patet. Si latet, vt in materia
 furiosa: ilico ante coctionem materia hæc purganda. Si patet:
 tunc impetus fit ad loca vel Conuenientia, vel Non conue-
 nientia. Si ad conuenientia: tunc iuuandus est, & primum
 materia coquenda, deinde purganda. Si ad non conuenien-
 tia loca fiat impetus, id est, ad partem vel principem, vel con-
 ſentientem principi: cohibendus est impetus, id est, ma-
 teria ilico purganda est, neglecta concoctione: nisi purgan-
 tis vi, impetus augeatur, vt dum materia iecur petit, vbi
 à purgante deſiſtendum.

CAPVT XX.

*De medicamentis alterantibus.**Transitio.*

Ateriam medicinalem, cap. 17. in duo summa diuissimus genera, nimirum in materias Vacuantes, de quibus haecenus: & in Alterantes, de quibus iam pauca. Alterantibus utimur causa partium viuentium: de quibus in doctrina speciali febrium agemus accurate: nunc de eorum usu & applicatione pauca subnectemus.

Topicis nō utendū, to- so repleto.

Galenus igitur, cap. 3. libr. 12. meth. ait, non utendum esse perfusionibus antequam superfluitates magna è parte coctæ sint & euacuata: nec sola admouenda esse relaxantia sed *absinthium* addendum, nisi febris sit magna. E quibus colligimus, topica non debere usurpari, toto corpore repleto: nam vel laxant & trahunt à toto corpore, vel astringunt, & cogunt materiam. Obiter quoque colligitur, in febribus ardentibus non esse utendum *absinthio*: sufficit oleum masticinum: de quo alibi.

Quantum.

Quoad *quantum agendum*: Cum vna vncia conferuæ iussit permiscere specierum 3 β. ad 3 j. præsertim ætate: nam hyeme ad 3 β. licet ascendere. Exempli gratia, B.

Quomodo.

conserua cichoracea, ex acido citriana 3 β. specierum diarrhod. abb. 3 β. Miste. pro duabus vicibus. Modus agendi multiplex esse potest: alterantibus enim uti possumus & liquidis, & consistentibus, ut forma boli, pilularum, &c. item, dum extra applicantur, licet uti inunctionibus, linimentis, vnguentis, emplastris, ceratis, fomentis, sacculis, stillicidio, &c.

Quando.

Tempus applicandi alterantia, id est, cum præsens est indicans, nihil impedit: potissimum autem impedit materiæ præsentia. Vnde Auicennas probat trochiscos refrigerantes, post coctionem & vacuationem materiæ: id quod Galenus etiam iubet, capite decimoquinto, & decimosexto, libro vndecimo, metho. item, capite decimoquarto, libro primo, ad Glauc. *Vbi agendum variat*, pro variatione partium alterandarum: modo enim medicamenta sunt applicanda ventriculo, modo alteri parti.

Vbi.

CAPVT XXI.

De materia diatetica in febribus.

Ratio nu-
mers sex re-
rū non na-
turalium.

Res non na-
turales, seu
materia dia-
tetica dirigū-
tur ad custo-
diam virtu-
tis: qua duo
postulas, ut
sunt.

- | | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 1. obiectum, seu
alimentum. | { | Spiritus, Aer. | { | Somnus qui
concoquit. cap. 3.
l. 12.
Vigilia, qua
digerit. meth. |
| | | partium vitalium, Cibis, cuius
vehiculum Potus. | | |
| 2. facultas a-
gēs in obiectū,
id est, vis co-
ēctrix, qua re-
quiris cōmode-
rationem om-
nium functio-
num, quatenus
diriguntur ad
coēctricem. Fun-
ctiones autem
sunt vel: | { | 1. communes
natura & a-
nima, ut | { | expulsio, per
quam fit
Inanitio.
& attractio, &
retētio, quib.
fit Repletio. |
| | | 2. deter-
minata | | |

animo

Quies
per
quā ca-
lor cō-
cētra-
tur, ut
deti-
neat.
& conco-
quat.
Motus
per quē
fit di-
stribu-
tio in
partes

cū cognitione, ut
animi accideria:
in quorū cōmo-
deratione calidū
innatū, nec dis-
sipatur, nec om-
nino cōcētratur.

De Aere.

Aer estima Aer in febre putrida sumitur, vt materia iuuans; & habet
seria, tum rationem vel Alimenti, vel Remedij. Vt materia alimenti in-
alimētis, si dicatur à virtute: vnde Galenus cap. 3. lib. 11. meth. ait, virtu-
remedy. tis substantiam spirituofam, custodiri respiratione & transpi-
Quia aer ratione: quod idem affirmat cap. 5. libr. 12. meth. Vt materia
cōueniat in remedij, indicatur à re præter naturam, c. 14. l. 9. meth. Quare
putridus. cognoscendum, qualis aer in putridis febribus sit vsurpādus.
 Cum ergo tria sint, quæ in putridis agendorum indicatio-
 nem præbent, virtus, causa febris, & febris ipsa: c. 1. l. 10. meth.
 quantum attinet ad virtutem, aer debet esse purus, nō putri-
 dus & infectus, c. 5. l. 12. meth. Quoad causam: si hæc sit mate-
 ria putrida: quæ calida est & humida (ratione enim humo-
 ris fit putredo: & ratione putredinis materia illa euadit cali-
 dior) egemus refrigeratione & respiratione, c. 8. lib. 11. meth.
 ideoque inspiratio debet esse aeris frigidi & sicci (hoc ac-
 cipere de aere qui respiratione in corpus ingreditur) aer
 autem qui extra administratur, debet esse temperatus: cali-
 dior enim febre auget: frigidus poros cutis densat, & tran-
 spirationem impedit. Si materia non sit putrida: varius pro-
 batur aer, prò discrimine materiæ morbificæ, verbi gratias;
 si materia sit biliosa: aere opus est frigidus & humidus: &
 sic de reliquis. Ratione febris, aer eligi debet frigidus &
 humidus.

Cam igitur constet, aerem in putridis debere esse purum,
 frigidum, siccum, temperatum, non astringentem, non
 densantem, frigidum & humidum: si aer præsens talis sit,
 seruandus: sin minus, arte talis est parandus, c. 8. l. 10. meth.

Aer arti- verbi gratia, impurus redditur purus, beneficio *rosarum, aqua*
fritose, vs *rosacea, aqua violacea, succo citri, aurantiij, &c.* hic enim aer in-
alterādus. spiratus, roborat spiritus, & materiam putridam iuuat, maxi-
 me si alteretur aceto. Non inspiratus, sed extra occurrens aer,
 erit temperatus: vnde febricitans non debet corpus nudum
 aeri exponere, non debet brachia, & pedes detegere. Hac
 ratione virtutis, & causæ. Ratione febris: si aer sit calidior,
 eligi debent ædes subterraneæ, ad boream spectantes, homi-
 num frequentia arcenda, nam & hæc aerem calidiorem
 reddit: solum aspergendum est frigidis, & irrorandum: vn-
 de *folia viui, nymphae* probantur, &c. de quibus in febribus
 hecticis, cap. 28.

De Cibo: & primum, vt est alimentum.

Cibus est materia primum alimenti, ratione virtutis, & dicitur materia vitalis: deinde remedij, idque vel ratione materię morbificę, & dicitur materia præseruatoria: vel ratione febris, & dicitur materia curatoria. Materia cibi quatenus est alimētum, & ad virtutem dirigitur, sumitur ē plantis & animalib. cap. 39. lib. 3. de alim. ē quibus modo materia ē plantis, modo ex animalibus magis laudatur. Nam c. 2. l. 8. methor. olera & fructus postponuntur ouis, & carnibus: quia in his plurimum alimentum, exiguum excrementum: in illis contra. At c. 26. lib. 3. de alim. quædam animalia postponuntur quibusdam plantis: vt pisces pani. Probatur etiam caro pullorum, caponum, hœdorum, vitulorum, phasianorū: perdices & francolini omnibus anteponuntur, vt & auiculæ montanæ. Sed quoniam discrimen est, circa *carnes, oua & pisces*, de his breuiter dicendum.

Discrimen inter *carnes* sumitur à specie, à partibus, à vi testium, ab ætate, ab alimento, à loco, à vitæ instituto, & præparatione, cap. 2. 19. & 21. li. 3. de alim. Quoad *speciem*: Suilla caro generat sanguinem optimum & copiosum, nullumque alimētū magis nutrit. Bouina minus est lenta, sed crassior, vt gignat sanguinem melancholicum. Ouilla est succi deterioris. Caprilla etiam mutatur in succum vitiosum. Volucris minus alunt, sed facilioris sunt coctionis, quam gresilia. Et, si inter se comparentur, caro turdorum, merularum, est durior carne perdicum & attagenarum (sunt francolini.) Adhuc durior est calor turturum, & palumborum, anatum: phasianorum autem caro similis est gallinarum carni, sed suauior. Pauonum caro est durior. Quoad *partes*: Carnosæ vertuntur in sanguinem bonum: neruosæ in pituitosum. Viscera laudatorum animalium, generant sanguinem meliorem. Hepar anserum (quod optime norunt Ibræi) est iucundissimum, boni & copiosi nutrimenti. Alæ etiam anserum sunt facilis coctionis: his tamen alæ gallinarum anteponuntur. His antecessunt gallorum testiculi, qui gignunt succum bonum, copiosum, facile coquantur. Testes contra suum, bouum, capri, sunt mali succi, & difficilis coctionis. cap. 7. lib. 3. alimēt. Quoad *vim testium*: prout hæc magis viget, pro eo caro peior redditur: vnde caro castratorum suauior est, & non infecta.

Quoad

Quoad .m: Carnes animalium augescentium sunt præstantiores; quam eorum quæ florentis sunt ætatis: his adhuc peiores sunt carnes animalium nouellorum & seniorum: hæ enim duræ, siccæ, neruossæ, difficilis coctionis, exigui alimentum: illæ mucosæ, scatentes humiditate excrementitia, sed facile descendunt, ac proinde sua lubricitate ad aluum astrictam profunt. *Quoad alimentum*: Bonum alimentum in causa est, vt bonæ sint carnes: praua edulia, contra. *Quoad locum*: Quæ in stagnis, & locis palustribus degunt, carnes habent humidiores, excrementitias difficilis coctionis: contra, quæ in montibus degunt. *Quoad viam insuntum*: animalia domestica sunt humidiora: syluestria contra. *Quoad* 8. à præparationem: hæc spectant vel coctionem, vel ea quæ iniiciuntur. Coctio est assatio, elixatio, frixio: elixatio vel simplex est, vel in patinis. Carnes assæ & frixæ, habent vim siccandi: elixæ simpliciter, humectant: elixæ in patinis, medio modo se habent. Pro variis autem iniectis, carnes varias nanciscuntur facultates, vt si aromata iniiciantur, carnes habent vim siccandi. Et sic de reliquis.

OVORVM
difficilia.

Quoad OVA: horum differentia sumuntur, à specie animalium, à tempore, & decoctione. cap. 22. lib. 3. alimen. Gallinarum enim & phasianarum oua sunt præstantissima: praua sunt anserum. *Ratione temporis*: recentiora sunt meliora. *Ratione coctionis*: perpenditur vel Gradus, vel Modus coctionis. Gradus: quatenus magis, vel minus coquuntur: hinc forbilia minus nutriunt: dura difficulter coquuntur: tremula id est, medio modo se habentia inter forbilia & dura, optime nutriunt, nec sunt difficilis coctionis. *Quoad modum coctionis*: oua elixantur, assantur in cineribus, friguntur in sartagine, & suffocantur, quando scilicet coquuntur in vase obturato foramine. Tremula optima sunt, & præcipue suffocata: secundum locum tenent elixæ: tertium quæ coquuntur in cineribus: pessima sunt frixæ. Notandum autem oua forbilia esse eligenda, dum volumus vt alius fluat, & ventriculus non est nauseabundus: vbi autem nausea vexatur ventriculus, maxime à forbilibus cauendum.

Pisces.

Quoad Pisces: saxatiles optimi sunt: cap. 28. & lib. 3. alimen. generant enim sanguinem mediogrem: & huiusmodi pisces perpetuo sunt boni: nec enim mutant alimentum, nec locum, nec vtuntur aquis dulcibus. At coctio est quadruplex: nam elixantur, friguntur, assantur in craticulis, & in pati

in patinis. Elixatio bona est : frixio & assatio probantur in sanis : coctio in patinis est causa cruditatis. Febricitantes ergo potissimum vti debent elixis : quia in febribus egemus cibus facilis coctionis, cum in iis semper coctio lædatur. c. 8. lib. 2. de facult. natur. Et hæc de materiis ciborum, respiciunt virtutem.

De Cibo medicinali, vt respicit materiam morbosicam.

Cibus respiciens materiam morbosicam, est indicatum non vitale, sed præseruatorium. In putridis autem materia morbosica est Putrida, vel Non est putrida. Si sit putrida: probantur cibi refrigerantes & sicciantes, non humectantes: vt succus aurantij maturi, endiuia, acetosa, acetum acetositas citri. Hic autem quædam de aceto, & acetositare citri dicenda sunt. Acetum est potentia frigidum, tenuissimum : quia tamen iunctam habet aliquam caliditatem & siccitatem. ideo, si refrigerare & humectare volumus, aquam miscere debemus, ea copia, vt bibi possit : dum autem exsiccare volumus, non humectare : acetum exhibere debemus, non cum frigida, sed potius cum acido citri. Quoad acidum citri: de toto fructu breuiter differemus. Galen. cap. 3. lib. 2. alim. malum citrium perpendit Theorice, & Practice. In theoria habet Physiologiam, Semeioticam, Pathologicam. In physiologica parte, proponit Structuram & Facultates. Quoad Structuram : tres partes describit, tegumentum, carnem, succum : semen ibi omittit, quia loquitur de citrio, vt habet rationem alimenti : semen autem nec alimentum est, nec condimentum alimenti. Quoad facultates : tegumentum est aromaticum, suavis odoris & saporis, suauem obtinet acrimoniam, & difficulter coquitur : pars media nec acida est, nec acris : intima est acida. Semeioticam partem insinuat Galenus, cum ait : per duritiem & callositatem nos cognoscere, tegumentum esse difficilis coctionis. Pathologicam supponit, ex alibi dictis : verbi gratia, si malum citrium sit putrefactum, euadit causa morbosica : & sic pertinet ad *παραλογίζαν*. Quoad practicam partem: addit Galen. corticem esse vtilem in ratione alimenti, quamuis difficulter coquatur : partem intimam conijci in acetum imbecille, vt reddatur acrius : carnem comedi cum aceto & garo, id est, sale, vt saporis hebetudo inminuatur, & fiat sapor acutus.

Qualicib. conueniat, si materia sit putrida.

Malum Medicum: cuius exemplo ratio simplicia tractandi docetur.

Si mate

*Qualis cō-
ueniat cib.
in materia
non putri-
da.*

*1. Ratione
vitiij mate-
rie.*

*2. Ratione
vehementia
materie:
qua indi-
catur, à
morbo.*

Si materia non sit putrida, oportet perpendere & vitium huius materie, & vitiij effectum, id est, febrem. Vitium materie multiplex esse potest, prout multiplex est materia in febribus, verbi gratia, si materia sit biliosa, probatur cibus refrigerans & humectans. In genere autem cum putrida ab obstructione oriatur, probatur cibus attenuans, detergens: vt *semina melonum, pisana hordeacea*: Vitari autem debent *caro agnina, anates, anguilla, &c.* Si consideratur materia, vt efficit febrem magis vel minus acutam: opus etiam est cibo magis vel minus minuente. Victus enim minuens indicatur à materia, non à virtute: materia enim morbifica, indicat euacuationem: cuius remedij materia est cibus, per accidens vacuus: si namque resolutio quæ sit à calore, & reparatio quæ sit ab alimento, sint æquales: virtus seruetur, & eundem retinet statum: si autem cibi portio minuatur: calor naturalis agit in materiam morbificam, & illam dissipat. Si victus parum minuit, dicitur Tenuis: si multum, Tenuissimus. Et vterque subdiuiditur. Tenuis enim vel est Simpliciter tenuis: cuius materia, est *pisana hordeacea integra*: vel Exquisite tenuis: cuius materia est *cremor hordei, in moderata copia*. Tenuissimus vel Non in extremo est: cuius materia est *mulsa*: vel In extremo: cuius materia est *oxymeli*. De inedia breuiter dicemus. Inedia est priuatio: sola existens non vacuat, nec per se, nec per accidens, nisi longo tempore: oportet ergo cum ea coniungi, vel acrem calorem, vel corporis motum: & hinc animalia in latebris degentia, non vacuantur: quia sola est inedia, non adest acris caliditas, neque motus. Inedia igitur neque indicatum est, neque indicati materia: sed sequitur per consecutionem quandam: vt virtus indicat alimentum: materia morbi vehementissima prohibet: quod si ergo virtus robusta sit, materie indicatio præualeat, id est, alimentum prorsus prohibetur, vnde subsequitur cibi abstinentia: non aliter atque si sanguis vehemens, phlebotomiani indicet, virtus vero debilis eam prohibeat: tum enim per quandam consecutionem emergit abstinentia à venæ sectione.

Inedia.

*cibus, quæ
febris in-
da. at.
olera.*

De cibo medicinali, quatenus à febre indicatur.

Cibus à febre indicatur refrigerans & humectans. Materia sumitur ab oleribus, à fructibus, à granis. Quoad olera, probatur *cichorium domesticum* (agreste enim recte à Galeno improbatum).

probatnr, lib. de cib. boni & mal. succi) probatur etiam borago, bu-
glossa, lactuca: cum his carnis coqui possunt: licet etiam hac aque
incoquere, & condire oleo atque aceto.

Fructus omnino sunt vitandi, quia facile corrumpuntur: *Fructus.*
quidam tamen causa appetitus probantur, vt *pruna*, *cerasa*,
poma, *pyra*, sed non astringentia: neque improbantur in febr-
ibus *amygdala dulces*, nam attenuant & detergunt, c. 12. lib. 2.
alim. nec despiciendæ *passula dulces*, quæ stomachum nō dis-
soluunt, nec aluum subducunt, sed contemperant, mediocri-
ter abstergunt, & exiguum oris ventriculi mordicationem
obtundunt, cap. 10. l. 2. alim. *passulae dulces* aluum non mo-
uent, sicuti falso quidam credunt, nisi addantur quæ possunt
lubricare. *Cucurbita* propter succum aqueum, tenuem, resi i-
gerant & humectant, sed parum alunt, facile subsident, nec
ægre coquantur, nisi corrumpantur, id quod fit, ob vitiosam
præparationem, aut succum prauum in ventriculo febrici-
tantis coaceruatum, aut si nimis diu in ventriculo hæreant.
Pepones sunt illi fructus, quorum caro prope semen est iniu-
cunda: sunt frigidi, & valde humidi, cum vi deterforia, quæ
magis viget in seminibus. c. 4. lib. 2. alim. *Melopepones* sunt illi
fructus, quorum caro, semen continens, est iucunda, & es-
culenta, vt qui *Clodix* nascuntur: c. 5. l. 2. alim. & huius quo-
que classis est *anguria*, cuius caro, semen continens, est tatur:
melopepones minus humidi sunt, quam *pepones*, nec ita
prauī succi, minus mouent vrinam, tardius descendunt, nec
ita celeriter in ventriculo corrumpuntur. Vade colligitur
febricitantibus potius *melopepones* & *angurias*, quam *pe-
pones* concedi posse.

Quantum graua attinet: breuiter de *Tritico*, *Halica*, & *Hor.* *Grana.*
deo agemus. *Triticum* densum, est alimentum copiosioris: Ra-
rum, habet copiosius excrementum fursuraceum. Panes va- *Triticum.*
rie inde conficiuntur: puri enim fermento egent copioso,
& insigni subactione, nec statim post subactionem sunt co-
quendi, & præterea diu sunt assandi: contra, panes fursura-
cei, egent fermento pauciori, subactione leuiori, assatione
breuiori. Addit Galenus, eum panem facile concoqui, qui
plurimum fermentatus & subactus est, & moderato igne
æqualiter coctus, & assatus (ignis enim ardentior, primo oc-
cursu partem extra indurat, vt intus crudus permaneat. Unde
obiter colligitur, plurimum eos errare, qui in luc venerca panem
assatum, seu biscottum exhibent: qui sane in luc non conuenit,
nisi

nisi ventriculus sit robustus, & corpus nec obstruendum, nec emaciatum, cum talis panis exigui sit alimenti, & agre distribuatur)

Panis furfuraceus parum nutrit, sed vim habet detergendi & lubricandi: cap. 11. libr. 1. alim. In febribus probatur panis lotus, qui nimis alit, & non obstruit, cap. 5. lib. 1. alim. estque in medio calefacientium, & refrigerantium, cap. 9. lib. 1. alim. Est autem panis lotus, qui in frusta diuiditur, inque frigidum

Halica.

sæpe immergitur. *Halica* est alimenti copiosi & lenti: ideoque nocet in hepatis obstructione, & dum calculi est suspicio. cap. 6. lib. 1. alim. Potest autem mitigare vehementem ventriculi mordicationem, maxime si coquatur, & coletur, ut cremor hordei. Iuuat etiam in superflua alui deiectione, cap. 3. libr. 12. meth.

Hordeum.

Hordeum est frigidum & siccum in primo gradu, lib. 7. simpl. Et cap. 9. lib. 1. alim. ait: siue ex hordeo fiat panis, siue ptisana, siue polenta, vim habere refrigerandi: pro varia autem præparatione, hordeum modo siccare, modo humectare: habet vim siccandi, si frigatur: humectat, si fiat ptisana, vnde cap. 1. lib. 1. alim. dicitur. hordeum elixatione humi-

*Ptisana
præparan-
da.*

dum, & natura frigidum esse. Quoniam vero *ptisana hordeacea* magni est vsus, eius præparatio enarranda erit. Galenus lib. de ptis. & cap. 9. libr. 1. alim. hordeum primo coquit igne valido, ut in tumorem attollatur, & hinc flatus dissipentur: secundo coquit lento igne, æqualiter, ne portio alimentalis dissoluatur: tertio, coquit ad consistentiam chyli, seu cremoris: si enim superflua fiat decoctio, hordeum redditur viscidum, quod facile obstruit. Cæterum Galen. cap. 9. lib. 1. alim. hordei decocto quædam ammiscet. In principio enim dum incipit concoqui: miscet ea, quæ tumefactionem hordei conferunt, ut oleum, anethum, porrum, &c. Cum intumuit hordeum, addit ea, quæ concoctionem faciunt æquabilem, ut acetum, quod incidendo portiones crassas æquales reddit tenuibus. Cum hordeum exacte coctum est: sub tempus edendi immiscet *salem tenuem*, qui vim habet attenuandi, & detergendi: ne cremor sit crassior aut viscidior. Ex hoc coctionis modo, prodit liquor moderate humidus, sitim arceps, refrigerans & humectans: lentus, lævis, continuus, la-

vires ptisana.

*Ptisana
magnicom-
posita.*

bricus, vnde aluum seruat lubricam: abluens, detergens, aperiens, non astringens, nec tormina gignens. Porro cum hordeo in febribus misceri possunt, & alimenta, & condimenta. cap. 18. lib. 1. alim. Alimenta: ut *carnes probæ*, quo ptisana magis nutriat. Condimenta, causa suauitatis, & alterationis,

verbi

verbi gratia propter attenuacionem & deterfionem miscetur *oxymeli*: propter refrigeracionem & humectacionem *lactuca*: propter lotij prouocationem, *semina melonum*: propter visciditatem *sal*, in sanis quidem misceri potest, sed in febribus à sale abstinendum. De aqua dubitatur, quando hordeo sit affundenda? Si à principio affundatur aqua, quæ ad finem vsque sufficiat: periculum est, ne longa decoctione salia reddatur: quod etiam in optima aqua, diu decocta, fieri solet: cap. 32. lib. 3. alim. Quod si affundatur ea copia in principio, vt sufficiat pro tumefactione: & hac abiecta, mox noua infundatur, quæ ad finem sufficiat: tum fiet iactura succi alimentalis, quem hordeum in aquam solet deponere: cap. 44. lib. 2. alim. cap. 32. lib. 3. alim. Quare à principio aqua est affundenda, quæ sufficiat pro tumefactione: deinde relicta portione illa exigua, addenda noua aqua, vt sufficiat ad perfectam cōcoctionem. Quod si vero, prisanam albicantem quis desideret: aquam post tumefactionem abiciat: & causa nutritionis carnem addat.

Aqua,
quando
affunden-
da.

De recta ciborum administratione.

Quoad *quantum agendum*: Si cibus sumatur pro alimento: virtute debili existente in febricitatibus, plus cibi dandum: virtus autem robusta, despicienda est. Si cibus sumatur pro materia remedij: tunc pro vehementia materie morbosæ & febris, cibi copiosiores exhibendi: verbi gratia, si materia sit calidior, si febris intensior: augeri debet dosis *aceti, acerosæ, & similium*. Hinc Galenus comm. aph. 7. sect. 1. ait, dum corrupta est materia, cibos copiosiores esse exhibendos, sci. icet medicinales, non alimentales: impura enim corpora (aph. 10. sect. 2.) quo magis nutriuntur, eo magis læduntur. Cæterum si opus sit cibo medicato copioso: virtute existente robusta, dari debet multum, & raro: si contra, parum & sæpe. *Modus* capitur ab indicante, vt resistit cibo. Hinc cibus alimentalis, si virtus debilis sit, liquidus debet exhiberi, forma contusi, destillati. Cibus autem medicinalis modo actu calidus, modo actu frigidus datur: calidus, si materia sit pituitosa, frigidus, si biliosa. Quoad *quando agendum*: Cibus alimentalis indicatur à virtute, prohibetur à materia morbosica: dabitur ergo quando virtus magis potest, nimirum semper in declinatione, vt plurimum vero in principio (loquimur hic de temporibus vniuersalibus) contra in augmento & statu,

Quantum.

Quomodo.

Quando.
De tempo-
ribus uni-
uersalibus.

*In declina-
tione &
principio
virtus po-
test cibum.*

res præter naturam plus possunt. Declaratione in declinatione res præter naturam superatæ sunt: virtutes autem ob pugnam præcedentium temporum debilis, refectione indiget: in principio virtus seruanda est, vt ad statum perdurare queat: & tunc etiam res præter naturam sunt leuiiores, ac minus possunt. Dictum est, virtutem *vt plurimum* in principio magis posse, quam materiam: nam interdum materia plus potest: si nimirum, licet in principio non admodum agat tactu, magnam tamen potentiam habeat ad agendum, ita vt immineat vitium vehemens, & pene incurabile: tunc enim indicat victum minuentem, & tenuem. Vnde Auicenna. Paulus, Mesues, in principio paralyseos (morbi longi) victum probant tenuissimum: nam periculum est, ne materia deducatur ad neruos, & paralyfis fiat incurabilis. Eodemque consilio Hippoc. tex. 48. & 49. lib. de fract. in principio luxationis magni articuli, prohibet cibum, quamuis sit morbus

*In augmē-
to & sta-
tu res præ-
ter naturam
perhibens
cibum.
Quando ci-
bus medici-
nalis dan-
dus.*

diuturnus. In augmento & statu, magis possunt res præter naturam, quam virtus: idque vt plurimum: nam interdum virtus debilis magis potest, dum nim. virtutis substantia dissoluitur: verbi gratia, in pleuritide, si materia in augmento copiosa per tussim euacuetur, ita dissoluitur virtus, vt magis cibum indicet, quam materia eundem prohibeat, maxime quia materia morbifica euacuatur. Cibus, vt materia existit remedij: in augmento, & potissimum in statu, maiore dosi exhibendus, isque & vacuus, & alterans: tunc enim res præter naturam sunt vehementiores. In statu igitur causa vacuationis, probatur victus tenuissimus: causa alterationis, maior copia ciborum alterantium: *lactuca, acetosa, &c.* Ha-

*De tempo-
ribus par-
ticulari-
bus.*

tenus de temporibus vniuersalibus. Quoad particularia tempora: prohibetur cibum, & à materia quæ replet totum corpus, & à materia quæ est causa accessionis. Vnde Gale. lib. de pris. respiciens ad materiam, replentem totum: cum eadem die sit vena secunda, & cibum exhibendus, iubet primum venam esse secandam. Respiciens vero ad materiam, quæ accessionis causa est: cum Hippoc. aph. 11. sect. 1. in accessionibus à cibo abstinendum esse ait. Hora cibandi ita ediscenda. Si febris sit intermittens, & interuallum longum obtineat: possumus exhibere cibum per quatuor, quinque, aut sex horas, ante accessionem: virtus enim adest indicans, & nil prohibet. Si vero intermittens breue habeat interuallum: cibum exhibendus vel in statu, vel imminente accessione: vt

*Hora ci-
bandi.*

modo

modo vna hora, modo alia sit eligenda, prout virtus magis potest: si enim virtus resoluitur, virtus magis potest, & propterea imminente accessione dandus cibus: si autem virtus suffocatur, materia morbifica magis potest, & proinde circa statum cibus exhibendus. In febre continua proportionata, eligenda est hora minoris afflictionis: hac enim materia minus potest. In non proportionata, id est continenti, secundum cap. 5. lib. 11. meth. eligenda est hora, qua æger facilius cibum sustinere potest: hæc autem est hora diei tepidior, & hora consueta tempore sanitatis.

Circa cibos dubitatio oritur. Nam Galenus tex. 35. lib. 3. de ratione vult. ait, cibos multiplices, & facultate dissimiles, ventris perturbationem facere: ut oxymeli non sit exhibendum, nisi ingessu cremor hordei prius sit coctus: Attamen practici exhibent ptisanam cum amygdalis, cum confuso: imo eodem prandio, exhibent, ouum, panatellam, carnes. Responsio. Ea quæ exhibentur, vel omnia habent rationem cibi: vel vnum habet rationem cibi, reliqua condimenti, seu opsonij. Id quod habet rationem condimenti, licet cibus permiscere: nam alimentum seruat vires proprias, & virtute condimenti, redditur iucundius gustui, ac olfactui, & efficacius contra materiam. Hinc Gale. lib. 1. ad Glau. in tertiana notha, probat ptisanam, cum pipere: quare & oxymeli, prout habet rationem condimenti, in parua sc. copia, ad 3 ss. (nam ratione cibi potest dari ad 3 iij. & 3 iiij.) Si omnia quæ miscentur rationem habent alimentitunc febris vel est brevis, vel longa. Si brevis, præstat cibum simplicem exhibere: vel saltem permiscere cibos facultatis similis (non cremorem ptisanæ, qui est materia vilius tenuis, & oxymeli, quod est materia vilius tenuissimi.) Cæterum, si in febre acuta virtus sit debilior: eodem prandio licet exhibere cremorem ptisanæ, cum destillato: quia hæc non sunt adeo dissimilia facultatibus, ut ventrem perturbare possint: alimentum enim ex his cibus permixtum, nutrit ratione destillati, confusi: refrigerat & humectat, ratione hordei: præterea lotium potest prouocare, ratione seminum melonum: & somnum inducere, si misceantur amygdala. Si febris sit chronica: optimum est cibos exhibere pauciores: sed tamen quia morbus est longus; ægrique assueti, ac nauseabundi: plures cibos offerre cogimur: ut oua, panatellam, carnes, fructus.

Dubium
de varie-
tate cibo-
rum.

Nota.

De Potu.

Potus est cibi vehiculum: & consideratur, ratione virtutis, materię, & febris. Quoad virtutem: potus probatur purus: cuius materia est *aqua*, quę interdum nutrit, & *vinum*, quod semper nutrit. Aqua cruda, quoniam crassa, diutius moratur, & in bilioso ventriculo amarescit: tit. 40. lib. 3. de ratione vict. proinde coqui debet, vt euadat tenuior, & bonum cibi vehiculum: non nutrit autem aqua, nisi decoquatur cum *carne*, vel *miscetur saccharum*, aut *mel*. Vinum probatur purum, non recens, tenuis substantię, confectum ē bonis & maturis vuis, puri odoris & saporis, album vel rubrum, nam rubrum est crassum, sicut & dulce crassum est, tit. 2. lib. 3. de ratione vict. aquosum probatur, quod caput non lædit, & vrinas mouet: cap. 4. lib. 12. metho. Ratione materię morbificę, si hæc sit putrida, laudatur potus refrigerans & siccans: vt *aqua cum aceto*, cum *acido citri*. Si materia non sit putrida, varius conuenit potus, pro discrimine materię: verbi gratia, in materia pituitosa, prodest *aqua cum melle*, cum *cinamomo*. Ratione febris, conuenit *aqua hordei*, cum *intepo violaceo*.

Vinum igitur & aqua, in ratione potus maxime locum habent: vinum enim potissimum indicatur à virtute, & causa: aqua potissimum indicatur à febre. Videndum ergo quinam potus conueniat febricitantibus. Quoad virtutem, si hæc sit robusta, vinum non est dandum: quia febris magis potest ad prohibendum: cap. 6. lib. 7. meth. Hinc, cum febris magis possit in principio, augmento, & statu, virtus autem in declinatione: vinum exhibendum est in declinatione. Aqua autem si propinetur, non debet alterari *calamintha*, *origano*, &c. quia sic nimis calefaceret, vt vinum, cap. 4. lib. 8. meth. Si debilis est virtus: vel debilis est per suffocationem, vel per resolutionem: si per suffocationem: hæc fit ab humore vel tantum copioso, vel copioso & crudo. Si suffocatio fiat à succo tantum copioso: minus potest virtus, vnde cap. 14. li. 1. ad Glauc. à vino prorsus abstinet Galenus, in hoc casu. Si virtus sit resoluta, & hæc resolutio pertingat ad solida, non est vinum dandum: vnde in marasmo torrido, vino Galenus interdicit lib. de marc. cap. vlt. Si resolutio pertineat ad spiritus: vinum est dandum, quia virtus magis potest ad indicandum. Quoad febrem: hæc est vehemens, aut mediocris. Si vehemens est, & acuta, in qua appareant symptomata secundum caput, vel

saltem

Quando
vini con-
ueniat fe-
bricitanti-
bus.

1.

2.

saltem suspicio delirij: penitus à vino vinoso, & à vino aquoso sincero abstinendum: & danda est vel aqua: vel vinum aquosum, non sincerum, sed aqua permistum, si videlicet virtus debilis sit, vt magis possit, quam materia petēs caput: tex. 41. lib. 3. de ratione vict. Gal. cap. 3. li. 8. meth. Et tunc etiam ad prohibendam vini euaporationem, frigida superbibenda. Si mediocris sit febris: moderate vinum exhibendum, nisi aliquid prohibeat: diligenter enim perpendenda sunt, virtus, materia morbifica, febris & symptomata: si ergo virtus non sit robusta, materia concocta, febris moderata, nec symptomata prohibeant, verbi gratia, capitis grauitas, aut delirium, &c. vinum est dandum, sed aquosum, quod febricitantibus minori noxa datur, quam reliqua, cap. 3. lib. 8. meth. tex. 4. & 7. & 41. lib. 3. de ratione vict. qui postremus locus, à multis male intellectus, plurimis causa fuit exitij. Quoad materiam morificam, febris, vel est continua, vel intermittens. Si continua: materia cruda prohibet vinum: prohibet item materia concocta, si sit copiosa: non copiosa, permittit vinum aquosum, nisi febris vehementia prohibeat. In intermittente, vinum prohibetur tantum à materia cruda, non cocta (vt in continua.) Vnde Galenus cap. 9. lib. 1. ad Glauc. ait, à vino esse abstinendum, antequam materia concoquatur: quod verum est, si febris est intermittens, & longum habet interuallum, vt est exquisita tertiana & quartana: secus statuendum est in febre tertiana notha, & quotidiana, quia breue est interuallum. Hæc de cibo & potu.

De reliquis rebus non naturalibus.

Reliqua ad viuendi rationem pertinentia, manifesta sunt. Constat enim somnum probari moderatum, & non in principio accessionum: aph. 1. sect. 2. Aluus erit lubrica seruanda. Quiescant febricitantes in lecto: præterquam in quartana. Spes sit salutis, &c.

CAPVT XXII.

De febribus putridis in specie: & primum de febribus biliosis.



Actenus putridarum febrium doctrina generalis: specialis sequitur. Speciales autem febres quatuor sunt, Biliosa, Sanguinea, Pituitosa, Melancholica. *Biliosa febris, est febris putrida, qua*

Causa. producitur à bile putrescente. Causæ bilem generantes sunt, calida intemperies, præsertim hepatis, interdum etiam ventriculi, præterea victus calidior, medicamentum calidius. *Differētia.* sumuntur à Materia, & Loco. A materia: ut bilis est vel alimentaris, vel excrementitia: excrementitia potest esse, pallida, flava, vitellina, porracea, æruginosa, cærulea: ut testatur Gal. aph. 14. sect. 3. l. 6. epid. Porracea bilis generatur in ventriculo, ē cibis calidioribus & pravi succi: c. 6. lib. 2. de temperam. Additur à Galeno bilis rubra: c. 4. l. 1. de natura humana, quæ tamen nihil aliud est, quam ichor sanguinis, quod etiam colligitur ē cap. 2. de atra bile. Pallida ergo bilis minus est calida: cærulea calidissima. Quoad differētiās à loco: materia biliosa putrescit vel extra venas, vel in venis: unde oriuntur febres Intermitteutes, vel continuæ. Primum ergo de biliosa intermitteute,

- nos 16. *De tertiana intermitteute exquisita.*

Definitio. Tertiana intermitteute exquisita, est febris putrida, producta: à bile sine qua, extra venas putrescente. Dicitur, à bile sincera: ad differētiā bilis, mixtæ cum aliis humoribus, & dicitur extra venas: ad differētiā tertianæ continuæ.

Causa. Causa bilem generans, est Error externus, vel Intemperies calida.

Differētia. Differētiæ capiuntur à Materia & Loco: ut colligere licet ē Galeno, c. 8. l. 2. de diff. feb. aph. 5. sect. 3. l. 1. epid. aph. 23. sect. 2. l. 6. epid. A materia si capiantur: tum vel à Copia, vel à Qualitate sumuntur. A copia: si bilis est exigua, fit tertiana exquisita exacte, quæ non excedit 12. horas: si copiosa, fit tertiana, quæ simpliciter tertiana vocatur, & hæc ad differētiā prioris excedit horas 12. ut paroxysmus perduret vsque ad horā vigesimā: si maxima bilis sit copia, oritur tertiana extensa vocata, cuius accessio potest produci, vsque ad 40. horas. A qualitate sumuntur differētiæ, ut bilis magis vel minus est calida: minus calida, est pallida: calidior est flava: dein vitellina, porracea, æruginosa: calidissima cærulea. Hæc autē febris, de qua nos loquimur, à quacunque fiat bilis, semper est exquisita, non notha. A loco sumuntur differētiæ, ut materia prodit vel à iecinore, seu venis proximis hepatis, vel à vesica fellea, vel à ventriculo: quamvis ut plurimum prodeat ab hepate. Vnde, ut locus est vel vnicus, vel multiplex: ita etiam febris prodit simplex, duplex, vel triplex. Duæ vocantur tertianæ, dū ab vno

foco

foco vno die, ab alio, alio die, prodit materia: duplex autem vocatur febris, si materia à duplici foco eodem die prodeat.

Febris hæc cognoscitur, non vt febris, nec vt putrida, quia hæc signa suo loco fuerunt proposita: sed cognoscenda est, vt sit à bile. Signa ergo omnia vergūt ad calidum & siccum: quare & causæ externæ, vt victus calidior, medicamenta calidiora: & causæ internæ, vt temperamentum calidum & siccum hepatis: & symptomata, vt rigor cum sensu punctionis & caliditatis: sitis: excrementa omnia biliosa, lotium biliosum. Signa differentiarum à materiæ copia: minor copia indicatur à paroxysmo, qui non pertransit duodecim horas: maior, cum paroxysmus durat ad horam vigesimam: maxima, cum protrahitur ad horas quadragesimas. Differentiæ à materiæ qualitate, cognoscuntur è vehementia symptomatum: vt si bilis sit calidissima, quemadmodum cærulea, omnia symptomata vehementissima sunt: cognoscuntur etiam exeuntibus mutatis: verbi gratia, si euomatur bilis porracea, statuendum est, à bile porracea febrem oriri, &c. Differentiæ è loco, sic noscuntur: si vnicus sit focus, febris est simplex: si focus duplex, est febris duplex. Quis vero sit locus, num scilicet ventriculus, an hepar: cognoscitur è signis, quæ illarum partium affectiones indicant: de quibus suo loco.

Indicationes hic nō sumuntur à febre, nec à putrida: de his enim alibi dictum: sed à bile. Bilis ergo per contrarium est alteranda, & vacuanda. Virtutis indicatio patet alibi.

Quoad *prognosis*. Tertianā intermittens periculo vacat. aph. 5. sect. 3. lib. 1. epidem. & aph. 43. sect. 4. nam febris non est admodum vehemens, ratione essentiae, quia est intermittens, materia morbifica, non est admodum vehemens ratione dignitatis, nam putrescit extra venas: nec adest vehementia, ratione facultatis, cum virtus resistat. At differentia est, ratione materiæ, & loci. Quoad materiā copiosior & calidior, est peior: vt si fiat à bile cærulea. Quoad locum: si iecur est focus, peior: sic, si plures sunt fomites, peius.

Materiæ remedium. Primum cheirurgica. In hac febre conuenit venæsectio: peccat enim sanguis, vel vt sine quo non, vel saltem vt habet rationem adiuuantis: quemadmodum supra è Galeno cap. vlt. l. 2. de diff. feb. diximus. Virtus autem in exquisita exacte prohibet venæsectionem: vnde Galen. l. 1. ad Glauc. c. proprio. de cura tertianæ intermittētis

Signa:

Indicationes.

Prognostica.

Vena sectio.

exquisita; non secet venam: hæc enim febris necessario fit, anni tempore calido, regione calida: constitutione calida & sicca: quibus existentibus, virtutem debilem esse, necesse est, vt venæsectionem sustinere nequeat. In reliquis autem febribus exquisitis, sed non exacte, licet venam secare: cum nihil prohibeat. Vtus venæsectionis, patet alibi.

Lenientia. Sequitur materia medicinalis. Primū lenientia: *℞. flor. cass. non extrah. ʒ j. pulpa tamarind. ʒ ij. manna electa ʒ ij. Misc. & cū saccharo fiant boli.* Notandū, hic non proponi calida, quia febris est tertiana exquisita, à bile sincera. Si patiens cupiat lenies in potu. *℞. syr. ros. solut. viol. sol. manna electa, ana ʒ j ss. decocti hordei, cum ʒ ij. pulpa tamarindorum, q. s. Misc. fiat potio brevis.*

Præparantia. Quoad præparantia: *℞. decocti hordei, alterati endiuia, aceto sa lactuca, ʒ vj. pro syrupo.*

Notandum, saccharum & dulcia hic non proponi: quia in corpore biliosq̃ dulcia facile bilescunt. Præterea notandum, si in febre propoſita bilis sit calidior, cuiusmodi est vitellina, porracea, æruginosa: addendam esse lactucam in decocto iam præscripto, maiore copia: ita vt quantitas lactucæ excedat quantitatem endiuie: adiungenda etiam tunc est *nymphaea*. Prodest etiam pro præparatione materiæ biliosæ vti tñ *j. ferri caprini, optime depurati, cum succo endiuie, vel etiam lactucæ usque ad ʒ j.* Vtus syruporum è generalibus patet.

Purgantia. Quoad electiue purgantia. *℞. flor. cass. non. extra. ʒ vj. rhab. el. puluerisari ʒ iij. manna el. ʒ ij. Misc. & cum saccharo fiant boli.* In hoc medicamento ponitur rhab. quod bilem trahit: miscetur cassia, quia alias rhab. nimis calefacit: beneficio manna, facilius & citius fit purgatio: Purgans in modum potionis *℞. rhab. electi, minimum incisi, non puluerisati ʒ j ss. fiat infusio in decocto hordei: & facta diligenti expressione, adde manna el. syr. ros. sol. ana ʒ ij. Misc. & fiat potio brevis.* Obiter hic notandum non corrigi rhab. hoc in loco spica, schœnantho, vel vino aromatico: quia versamur in curatione tertianæ exquisitæ: vbi à calidis abstinere oportet.

Alterantia. Quoad alterantia, seu refrigerantia: his vti licet Intus, & Extra. Intus. *℞. feri lactis caprini, optime depurati tñ j. emulsionis sem. melonum, ʒ ij.* Licet autem loco emulsionis sem. melon. vti *ʒ j. succi endiuie.* Et si intentior sit caliditas, licet admiscere *ʒ ss. succi lactucæ.* Notandum hic non proponi saccharum rosaceum, conseruam rickonaccam, &c. quia propter saccharū in hac febre exquisita non approbantur. Extra: *℞. succi endiuie, succi lactucæ,*

lactuca, ana ꝑ j. acetū ꝑ ij. Misco, & applicentur hepati. Pro ventriculo: *℞. succi cyborij ꝑ j. ꝑ. acetū ꝑ ij. olei mastich ꝑ ꝑ. admista hic vides calida: nō item in iecore: quia ventriculi calor exiguus.*

Quoad materiam dieteticam: Si febricitans non sit delicatus, satis est uti cremore præsens hordeacea. Delicatis autem licet exhibere lactucam, cucurbitam, anguriam, ovis, pisces saxatiles, carnes volucrum pullorum, &c. Possunt etiam concedi fructus, ut poma, pyra, pruna. Alexander etiam in hac febre cōcedebat persica, carnes peponum, & maxime meloneponum, præsertim ubi sitis urget. Sed fructus parcedandi, saltem ad degustandum. Quoad potum: Galenus l. i. ad Glauc. delicatis concedit vinum aquosum tenue, in exigua quantitate, dum morbus incipit concoqui: in maiori quantitate, dum morbus prope est ut solvatur, nimirum in declinatione: ratio est, quia virtus eo tempore indicat, & materia non prohibet: at ante declinationem tutius est, uti aqua.

Diaeta.

De tertiana intermittente notha.

Tertiana intermittēs notha, spuria, seu non exquisita (quā sit e bile non sincera) est febris putrida, producta à bile mista prædominante, putrescente extra venas. Proponitur in hac febre bilis: ut distinguatur à sanguinea: proponitur bilis mista: ut distinguatur ab exquisita, quæ sit à bile sincera. Notandum autem in hac spuria, non modo bilē oportere esse coniunctā cum alio humore, sed mistam: Si enim, verbi gratia, fiat febris è pituita & bile, non exacte mistis, erunt duæ febres, vna biliosa, altera pituitosa: ut in hemitritæo: at ubi exacta mistio est facta, febris est simplex, sed spuria. Adtitur in definitione, prædominante: nam si, verbi gratia, bilis cum pituita misceatur, ut pituita prædominetur omnibus modis, id est, & ratione quantitatis, & ratione vigoris, febris erit pituitosa, non tertiana. Extra venas, dictum fuit, ad differentiam, biliosæ nothæ continuæ. Porro mistio bilis fit interdum cum humore omnibus modis contrario, nimirum cum pituita, quæ frigida est & humida: vnde cōstituitur tertiana notha exacte, de qua loquitur Galenus l. i. ad Clauc. c. proprio (non loquitur ibi de qualibet notha, quod non cognoscens Alexander, temere Galenum reddarguit) interdū vero bilis miscetur cum humore non prorsus contrario, nim. cum melancholia, quæ frigida est & sicca: vnde producitur tertiana notha, sed non exacte.

Definitio.

Causæ febris, & putredinis patent è generalibus. Cau- causa.

ſæ generantes bilem propoſitæ fuerunt in febre bilioſa ex-
quiſita. Cauſæ aliorum humorum pituitæ & melancholiæ,
proponentur ſuo loco.

Differētia.

Bilis miſta eſt cum Pituita, vel cū Melancholia: præterea
miſta eſt vel cum Vnica tantum materia, vel cum Vtraque.

Signa.

Signa indicantia bilem, propoſita fuerunt in bilioſa ex-
quiſita. Signa pituitæ & melancholiæ patebunt ſuo loco.

*Indicatio-
nes.*

Indicationes dirigi debent ad humorem, & intemperiem
membrorum affectorum. Quoad humorem, ſeu materiam,
quæ eſt bilis permixta pituitæ, aut melancholiæ: indicatur al-
terans & purgans. Quoad dyſcrasiam: indicatur alterans
per contrarium: verbi gratia ratione pituitæ, quæ genera-
ri poteſt à ventriculo frigido & humido, oritur indicatio
calefaciendi & ſiccandi: aut ſi ventriculus exiſtat ſiccus,
humectandi. Præterea ratione bilis & melancholiæ, oportet
iecur refrigerare: quia iecur calidius, generat humorem bi-
lioſum, & melancholicum.

*Prognofi-
tis.*

Vt hæc febris intermittens eſt, vacat periculo. At ob mi-
ſtionem bilis cum pituita, vel melancholia, longiori tempo-
re curatur.

*Vena ſe-
ctio.*

Sanguis ſi mittendus videtur, ab initio ſtatim ſecunda ve-
na: cap. 10. lib. 1. ad Glauco. nam virtus ab initio robuſtior eſt,
& phlebotomiam permittit.

Lenientia.

Leniens eſſe poteſt huiusmodi: *℞. mellis roſ. ſol. ſyr. roſ. an. ʒ
ij β. iuris puli parum, fiat potio brevis.* Hic mel roſ. ſol. proponi-
tur cauſa materiæ pituitoſæ: ſyr. roſ. ſol. propter bilem: diſſol-
uuntur autem in iure: quia in hac febre ventriculus, pituitæ
auctor, non ita ſuſtinet aquam: vnde ius potius probatur. Bo-
lus fiet hoc modo. *R. flor. caſſ. nou. ext. ʒ j. mannæ el. ʒ ij. ſpe-
cierum hieræ ſimplicis ʒ j β. Miſc. & cum ſaccharo fiant bo-
li.* Hiera ponitur cauſa pituitæ.

*Præparā-
tis.*

Præparans bilem pituitæ permixtam: *℞. ſyr. de cich. ſimpl.
mellis roſati an. ʒ j. decocti cichory, betonica ʒ iij. Miſ. pro ſyrupo.* Si
autem bilis ſit permixta melancholiæ: *℞. ſyr. de endiu. de bora-
gine, an. ʒ j. decocti cichory, borag. ʒ iij β.* Dum autem febris hæc
progreditur, aſcendere oportet ad ſyrupos valentiores, id eſt,
magis detergentes & attenuantes: vt, *℞. ſyr. de cich. comp. Sy-
Zantini, de 2. rad. an. ʒ β. decocti endiuia, petroſelini, feniculo, me-
liſſæ ʒ iij. Miſ. pro ſyrupo.*

Purgantia.

Purgantia: ſi bilis miſta ſit cum pituita: *℞. rhab. el. ʒ iij. aga-
rici trochiſcati ʒ j. fiat infuſio in decocto endiuia & betonica, infu-
ſione*

ficiente autem & facta diligenti expressione, adde manna electi. mellis ros. sol. an. ℥ij. Mis. & fiat potio brevis. Et hoc seruandum, si bilis est copiosior pituita. Purgans etiam exhibetur in infusione, hac formula: ℞. rhab. el. ℥j. agarici ℥j. infundantur in decocto cicborij & beton. deinde facta diligenti expressione adde, mellis ros. sol. manna el. an. ℥j. fiat potio brevis. Notetur hic dosi agarici maiorem esse, quam rhab. licet in hac febre bilis prædominetur: nam interdum non ratione quantitatis, sed solum ratione vigoris prædominatur: & propterea dosi agarici debet esse maior. Boli forma est talis: ℞. flor. cass. recens trita ℥j. manna el. ℥ij. pulu. rhab. electi, agarici trochisc. an. ℥j. Mis. & cum saccharo fiant boli.

I I. Si bilis mista sit cum melancholia: ℞. rhab. el. ℥iij. fiat infusio in decocto fructuum, cum xij. sol. sena. & ℥j. passularum: & facta diligenti expressione, adde syr. ros. sol. manna el. an. ℥ij. Mis. & fiat potio brevis. Notetur in hoc medicamento non esse agaricum, nec mel ros. quia non peccat pituita. Bolus: ℞. elect. lenit. flor. cass. nou. ext. an. ℥j. confect. Hamech ℥ij. rhab. el. ℥i. Mis. cum saccharo fiant boli.

Medicamenta roborantia, respiciunt hepar calidum, vt generat bilem, vel melancholiam: & respiciunt ventriculum frigidum, vt generat pituitam. Quare si intus medicamentum est assumendum: ℞. conserua è flor. cich. conserua beton. an. ℥j. spec. diarh. abb. aromatici ros. an. ℥j. Mis. & poterimus exhibere à ℥ij. ad 3vj. pro singulis vicibus. Alterans extra ad mouendū, causa ventriculi: ℞. ol. mastichini ℥j. spec. arom. ros. ℥j. cera ℥j. Mis. ad ignem. Causa hepatis: ℞. succi cich. ℥j. aceti ℥ij. spec. diarh. abb. ℥j. Mis. Modus administrandi patet è doctrina generali: verbi gratia, medicamentum causa ventriculi magis actu calidum esse vsurpandum.

Quoad materiam dieteticam: Cibus debet esse medicus: nam febris non est brevis. Debet esse refrigerans, propter bilem: calefaciens, propter pituitam: humectans propter melancholiam. Parabitur ergo è ptisana, endiuia, acetosa, ratione bilis: addetur oxymeli, vel piper ruditer confusum, petroselinum, propter pituitam: addetur cibus borago, bugl. melissa, ratione melancholix. Potus erit aqua cum oxymeli: probatur etiam aqua saccharata, aqua cum boragine, præsertim causa melancholix: nec ius improbat. Vtrum in declinatione conceditur: nam in hac febre prohibet materia cruda, prohibet etiam febris, quia breue habet interuallum.

CAPVT XXIII.

De tertiana Continua, primum exquisita:
deinde notha.

Definitio.



*B*iliofa continua exquisita, est febris putrida, producta à bile sincera, in venis putrescente. Bile hęc sincera, & non permista cum alia specie materiæ, est alimentalis, vel excrementitia: excrementitia est

Causa.

humorosa, vel ichorosa: vt colligitur è text. 1 & 13. lib. 4. de ratione viſt. aph. 59. ſect. 4. cap. 3. & 6. lib. 2. de criſib. Cauſæ bilem generantes, ſunt calefacientes & exſiccantes: vt dictum eſt in tertiana intermittente exquisita: Differentia eſt: quia in continua, cauſæ & internæ, & externæ ſunt vehementiores.

Definitio.

Differentiæ ſumuntur à Materia & Loco. A materia: vt eſt alimentalis, vel excrementitia: & excrementitia, vel humorosa, vel ichorosa. Sed notandum tertianam continuam exquisitam exacte, ſeu exquisitiſſimam, fieri è bile ſua excrementitia humorosa: in quam bilem omnes cauſas & internas & externas cōſpirare oportet: vnde ſi febris fiat à bile vitellina, æruginosa, vel crulea, febres ſunt bilioſæ cōtinuæ, ſed nō exacte exquisitæ: hæ autē dicuntur febres *colliquantes*, ob inſignem caliditatem. Differentiæ loco, ſeu venis: Venæ ſunt vel proximæ cordi, vel remotæ: & remotæ vel admodū ſunt remotæ, vel medio modo ſe habent: vnde, ſi venę ſint proximæ, vehemens eſt caliditas, vt calor vniuerſus ad interiora cōfugiat, vt interiora vrantur, exteriora algeant: & hæ febres dicuntur *Leipyria*.

Signa.

Signa bilem indicantia, propoſita ſunt in bilioſa intermittente: ſed in hac febre ſunt intensiora: vt, pulſus eſt velocior, ſitis magis moleſta, vigiliæ magis cōtynaces, &c. Signa indicantia bilem in venis putreſcentem, ſunt, abſentia rigoris, non adēſt ſudor, non integritas ſeu interuallum. Signa differentiarum à materia: ſi materia bilioſa ſit alimentalis: cognoscitur è difficili tolerantiā, ægri vix ſe mouere poſſunt. Si materia ſit excrementitia ichorosa: cognoscitur è facili tolerantiā: quæ non erit ita facilis, ſi materia excrementitia ſit humorosa, & præſertim ſi ſit calidior, cuiusmodi eſt bilis vitellina & reliquæ. Signa differentiarum à loco: Si materia putreſcat

trescat in venis omnibus: cognoscitur, quia vnica est accessio: & hæc febris dicitur *ardens exquisita*. Si materia putrescat in venis tantum remotioribus: cognoscitur, quia est febris continua proportionata, id est, quæ habet plures accessiones, proportionem respōdentes tertianæ intermittenti. Si materia putrescat in venis mediis: erit febris cōtinua proportionata, quæ accedit ad continentem, satisque cōuenit cum exquisita, & *communiter dicitur febris ardens*. Si materia putrescat in venis circa aliquod viscus (*N. B. facit enim ad curam*) vt circa iecur: in ea parte summa est noxa, & grotantes circa iecur percipiunt insignem feruorem.

Indicationes respiciunt bilem: quare oportet alterare & vacuare.

Continua febris periculosa est, aphor. 43. sect. 4. adest enim vehementia & febris, & materiæ, & symptomatum. Febris est vehemens ratione essentia: quia maxime calida & sicca. Materia est vehemens ratione dignitatis, quia putrescit in venis: materia etiam vehemens est ratione essentia: quia valde est calida. Symptomata semper vehementia sunt ratione essentia: interdum etiam vehementia sunt ratione dignitatis & facultatis, vt facultas non ferat, sed cedat, & periculum augeatur. Ratione differentiarum à materia: periculosior est febris, si materia sit alimentalis: & si materia sit excrementitia, periculosior est humorosa, minus periculosa ichorosa. Materia etiam, quo calidior (vt si sit æruginosa) eo magis auget periculum. Ratione differentiarum à loco: periculosior est, si materia putrescat in venis cordi proximis. Intenditur periculum, si vires debiliores.

Circa materiam cheirurgicam: Cum bilis peccet in venis, necessario sanguis incalcescit, vt possit putrescere: quare sanguis vacuandus, nisi per venam sectam immineat periculum *ebullitionis choleri-corum*: nam tunc phlebotomia mortis esset causa. Hoc autem periculum imminet, dum bilis putrescit in venis, non totius corporis, sed alicuius partis determinatæ: tunc enim post venam sectam, deducitur in venas communes totius, quarum sanguis iam est imminutus: dum ergo bilis post venæ sectionem petit venas communes, miscetur cum exiguo sanguine, qui restat: & sic post venæ sectam maior copia bilis reperitur in venis, quam ante venæ sectionem: vnde necessario fit ebullitio choleri-corum.

Leniens: R. flor. cass. non. ext. 3. x. pulpa samarind. 3. β. manna el. ij.

Indicationes.

Prognosticum.

Vena sect.
Ebullitio
choleri-corum. Anic.
ca. 20. fen.
4. lib. 1. &
c. 42. 17. 2.
fen. 1. li. 4.
Vide enar.
2. lib. 2.
Valleriol.

Lenientia.

el. ʒij. Mis. & cum saccharo fiant boli. Vel. ʒ. syr. ros. solutini, manna el. an. ʒij. aqua hordei, cum ʒij. pulpa tamarindorum, parum: fiat potio brevis. Notandum hanc dosin esse magnam: quia summa est actio bilis: vnde Auicen. vult, has febres in principio lenificationem fortioiorem, id est, lenientia in magna dosi postulare.

**Præparan-
tia.**

Præparetur hoc modo: ʒ. aqua hordeacea, alterata soncho, lactuca, nymphæa (¶) papauere interdum ʒ viij. Hic non imponimus saccharum, quia bile sceret. Ascendimus ad nymphæam, papauer, quotiescunque fit à bile æruginosa feruente: vt exhibere liceat hos syropos actu frigidos: & bis in die.

Purgãtia.

Purgans in continua non debet esse acre: vnde medicamenta non sunt conficienda à scammonio. Si ergo, febris fuerit biliosa proportionata, hoc medicamentum præscribetur: ʒ. rhab. el. ʒij. infundantur in sero lactis caprini, optime depurato, & alterato lactuca: (¶) facta diligenti expressione, adde syr. ros. manna el. succi ros. an. ʒj ʒ. Mis. & fiat potio brevis. Bolus: ʒ. pulueris rhab. electi ʒj. flor. cass. non. extracta ʒ viij. pulpa tamar. ʒij. manna el. ʒj. cum saccharo fiant boli: & inbeatur patiens post deuoratos bolos, seri lbj. superbibere.

**Frigide po-
tius in feb.
cristinensi.**

Si febris biliosa sit continens, non tantum à scammonio, sed etiam à rhab. abstinendum: vt colligitur è tex. 11. lib. 2. de ratione vict. ratio est, quia hæc febris est feruidissima. Quare. ʒ. manna el. ʒ iij. feri lactis caprini, optime depurati, parum: fiat potio brevis: dein & inbeatur patiens superbibere seri lb iij. Vel etiam loco propositi medicamenti licet exhibere frigidam, cap. 5 lib. 9. meth. hæc enim bilis feruorem extinguit, & huius etiam beneficio bilis euacuatur. Sic ergo frigida est materia remediij, indicati & à bile, & à febre: quin & à siti, quæ in hac febre vrget. In febre igitur ardente, de qua nunc loquimur, maxime prodest potus frigide, vt admonet Galenus tex. 12. lib. 4. de ratione vict. sed oportet, vt virtus permitrat, quemadmodum Galenus scribit cap. 5. lib. 9. meth. & cap. 9. lib. 11. meth. Prohibetur autem frigida, à virtute debili: deinde ab indicante, quod contrarium frigidæ, id est, calidum & siccum remedium postulet: vt est, verbi gratia, materia frigida. materia etiam calida, sed impacta, (quæ vacuari nequit, nisi medicamento calefaciente, & attenuante) vt contingit in inflammatione, Sed notandum febris vehementiam interdum adeo esse insignem, vt magis possit ad indicandum frigidam, quam materia impacta ad prohi

prohibendum. Quod cognoscens Aëtius, ad vtrumque indicans respicit, & probat frigidam fractam, verbi gratia, si misceatur aqua calida quinta pars, cum frigida: vnde etiam expedit dare aquam decoctam hordei, vel anguria. Quoad vsum, & primum quantum agendum: si frigida exhibeatur causa totius febris: æger maximam copiam hauriet, quantum potest: cap. 5. lib. 9. meth. si vero detur non causa totius febris, sed ratione alicuius symptomatis, vt sitis ratione: debet exhiberi ea copia, quam homo vno hauſtu haurire potest: tex. 43. lib. 1. de ratione vict. Et sic hæ auctoritates facile conciliantur. Quoad modum: aqua exhiberi debet actu frigida, nisi aliquid prohibeat, cap. 5. lib. 9. method. Quoad quando agendum: frigida exhibenda est, dum materia est concocta. cap. 5. lib. 9. method. Et, si febris sit insignis caliditatis, sufficit coctio mediocris, non integra, cap. 16. lib. 9. meth. nam si, existente febre insigni, expectare velimus exactam coctionem, homo corripitur febre hectica.

Quoad medicinas alterantes. Refrigerantia probantur, *Alterantia.* maxime, si aqua non est exhibita. Medicamentum ergo intro dandum, tale esse potest: *℞. feri lbjss. succi lactuca 3j. Mif.* Vel: *℞. aqua hordei lbj. succi endivia 3ss. nymphaea 3ij. Mifc. & fiat potio.* Vt hinc colligatur, non esse dulcia miscenda: nec semper benedictis illis conseruis esse vtendum. Extra vsurpari potest hoc: *℞. Succi endiu. lactuca, pampinorum vitis, cucurbita, an. 3ss. acetositis citri 3ij. (causa penetrationis) Mifc.* Hoc medicamentum applicandum est hepati: sed præterea etiam thoraci, propter hecticam imminentem.

Quoad materiam dieteticam. Aër admodum frigidus *Victus.* probatur: quare aqua frigidissima prope os ægri ponenda, vt aërem illum refrigeratum inspiret. Cibus debet esse frigidus & humidus: vt *prisana cum lactuca.* Potus sit aqua. Reliqua sunt manifesta.

De Tertianâ continua notha.

Bilioſa continua notha, est febris putrida, procedens à bile mixta prædominante, putrescente in venis. *Definitio.*

Differentiæ ſumuntur à materia & loco. A materia, vt dictum est de tertiana intermittente notha, eodem prorsus modo. A loco: vt dictum est de continua exquisita. *Differentiæ.*

Quoad Signa: hæc patent, quatenus est febris, quatenus *Signa.*
nus

*In declina-
tione &
principio
virtus po-
test ab-
stineri.*

res præter naturam plus possunt. Declaratio: in declinatione res præter naturam superatae sunt: virtutes autem ob pugnam præcedentium temporum debilis, refectione indigent: in principio virtus seruanda est, vt ad statum perducere queat: & tunc etiam res præter naturam sunt leuiiores, ac minus possunt. Dictum est, virtutem *vt plurimum* in principio magis posse, quam materiam: nam interdum materia plus potest: si nimirum, licet in principio non admodum agat tactu, magnam tamen potentiam habeat ad agendum, ita vt imminere vitium vehemens, & pene incurabile: tunc enim indicat victum minuentem, & tenuem. Vnde Auicenna. Paulus, Mesues, in principio paralyseos (morbi longi) victum probant tenuissimum: nam periculum est, ne materia deducatur ad neruos, & paralytis fiat incurabilis. Eodemque consilio Hippoc. tex. 48. & 49. lib. de fract. in principio luxationis magni articuli, prohibet cibum, quamuis sit morbus

*In augmen-
to & sta-
tu res præ-
ter naturam
prohibent
cibum.*

diuturnus. In augmento & statu, magis possunt res præter naturam, quam virtus: idque vt plurimum: nam interdum virtus debilis magis potest, dum nim. virtutis substantia dissoluitur: verbi gratia, in pleuritide, si materia in augmento copiosa per tussim euacuetur, ita dissoluitur virtus, vt magis cibum indicet, quam materia eundem prohibeat, maximo

*Quando ci-
bus medici
malis dan-
tur.*

quia materia morbifica euacuatur. Cibus, vt materia existit remedij: in augmento, & potissimum in statu, maiore dosi exhibendus,isque & vacuans, & alterans: tunc enim res præter naturam sunt vehementiores. In statu igitur causa vacationis, probatur victus tenuissimus: causa alterationis, maior copia ciborum alterantium: *lactuca, acetosa, &c.* Ha-

*De tempo-
ribus par-
ticulari-
bus.*

tenus de temporibus vniuersalibus. Quoad particularia tempora: prohibetur cibum, & à materia quæ replet totum corpus, & à materia quæ est causa accessionis. Vnde Gale. lib. de pris. respiciens ad materiam, replentem totum: cum eadem die sit vena secanda, & cibus exhibendus, iubet primum venam esse secandam. Respiciens vero ad materiam, quæ accessionis causa est: cum Hippoc. aph. 11. sect. 1. in accessionibus à cibo abstinendum esse ait. Hora cibandi ita ediscenda. Si febris sit intermittens, & interuallum longum obtineat: possumus exhibere cibum per quatuor, quinque, aut sex horas, ante accessionem: virtus enim adest indicans, & nil prohibet. Si vero intermittens breue habeat interuallum: cibum exhibendus vel in statu, vel imminente accessione: vt

*Hora ci-
bandi.*

modo

modo vna hora, modo alia sit eligenda, prout virtus magis potest: si enim virtus resoluitur, virtus magis potest, & propterea imminente accessione dandus cibus: si autem virtus suffocatur, materia morbifica magis potest, & proinde circa statum cibus exhibendus. In febre continua proportionata, eligenda est hora minoris afflictionis: hac enim materia minus potest. In non proportionata, id est continenti, secundum cap. 5. lib. 11. meth. eligenda est hora, qua æger facilius cibum sustinere potest: hæc autem est hora diei tepidior, & hora consueta tempore sanitatis.

Circa cibos dubitatio oritur. Nam Galenus tex. 35. lib. 3. de ratione vict. ait, cibos multiplices, & facultate dissimiles, ventris perturbationem facere: ut oxymeli non sit exhibendum, nisi ingestus cremor hordei prius sit coctus: Attamen practici exhibent ptisanam cum amygdalis, cum confuso: imo eodem prandio, exhibent, ouum, panatellam, carnes. Responsio. Ea quæ exhibentur, vel omnia habent rationem cibi: vel vnum habet rationem cibi, reliqua condimenti, seu opsonij. Id quod habet rationem condimenti, licet cibus permiscere: nam alimentum seruat vires proprias, & virtute condimenti, redditur iucundius gustui, ac olfactui, & efficacius contra materiam. Hinc Gale. lib. 1. ad Glauc. in tertiana notha, probat ptisanam, cum pipere: quare & oxymeli, prout habet rationem condimenti, in parua sc. copia, ad 3 β. (nam ratione cibi potest dari ad 3 iij. & 3 iiij.) Si omnia quæ miscentur rationem habent alimentitunc febris vel est brevis, vel longa. Si brevis, præstat cibum simplicem exhibere: vel saltem permiscere cibos facultatis similis (non cremorem ptisana, qui est materia vultus tenuis, & oxymeli, quod est materia vultus tenuissimi.) Cæterum, si in febre acuta virtus sit debilior: eodem prandio licet exhibere cremorem ptisana, cum destillato: quia hæc non sunt adeo dissimilia facultatibus, ut ventrem perturbare possint: alimentum enim ex his cibis permistum, nutrit ratione destillati, confusi: refrigerat & humectat, ratione hordei: præterea lotium potest prouocare, ratione seminum melonum: & somnum inducere, si misceantur amygdala. Si febris sit chronica: optimum est cibos exhibere pauciores: sed tamen quia morbus est longus, ægrique assueti, ac nauseabundi: plures cibos offerre cogimur: ut oua, panatellam, carnes, fructus.

Dubium
de varie-
tate cibo-
rum.

Alia.

De Potu.

Potus est cibi vehiculum: & consideratur, ratione virtutis, materię, & febris. Quoad virtutem: potus probatur purus: cuius materia est *aqua*, quę interdum nutrit, & *vinum*, quod semper nutrit. Aqua cruda, quoniam crassa, diutius moratur, & in bilioso ventriculo amarescit: tit. 40. lib. 3. de ratione vict. proinde coqui debet, vt euadat tenuior, & bonum cibi vehiculum: non nutrit autem aqua, nisi decoquatur cum *carne*, vel misceatur *saccharum*, aut *mel*. Vinum probatur purum, non recens, tenuis substantię, confectum ē bonis & maturis viuis, puri odoris & saporis. album vel rubrum, nam rubrum est crassum, sicut & dulce crassum est, tit. 2. lib. 3. de ratione vict. aquosum probatur, quod caput non lædit, & vrinę mouet: cap. 4. lib. 12. metho. Ratione materię morbificę, si hæc sit putrida, laudatur potus refrigerans & siccans: vt *aqua cum aceto*, cum *acido citri*. Si materia non sit putrida, varius conuenit potus, pro discrimine materię: verbi gratia, in materia pituitosa, prodest *aqua cum melle*, cum *cinamomo*. Ratione febris, conuenit *aqua hordei*, cum *intepo violaceo*.

Quando
vini con-
ueniat fe-
bricitanti-
bus.

1.

Vinum igitur & aqua, in ratione potus maxime locum habent: vinum enim potissimum indicatur à virtute, & causa: aqua potissimum indicatur à febre. Videndum ergo quinam potus conueniat febricitantibus. Quoad virtutem, si hæc sit robusta, vinum non est dandum: quia febris magis potest ad prohibendum: cap. 6. lib. 7. meth. Hinc, cum febris magis possit in principio, augmento, & statu, virtus autem in declinatione: vinum exhibendum est in declinatione. Aqua autem si propinetur, non debet alterari *calamintha*, *origano*, &c. quia sic nimis calefaceret, vt vinum, cap. 4. lib. 8. meth. Si debilis est virtus: vel debilis est per suffocationem, vel per resolutionem: si per suffocationem: hæc fit ab humore vel tantum copioso, vel copioso & crudo. Si suffocatio fiat à succo tantum copioso: minus potest virtus, vnde cap. 14. li. 1. ad Glauc. à vine prorsus abstinet Galenus, in hoc casu. Si virtus sit resoluta, & hæc resolutio pertingat ad solida, non est vinum dandum: vnde in marasmo torrido, vino Galenus interdicit lib. de marc. cap. vlt. Si resolutio pertineat ad spiritus: vinum est dandum, quia virtus magis potest ad indicandum. Quoad febrem: hæc est vehemens, aut mediocris. Si vehemens est, & acuta, in qua appareant symptomata secundum caput, vel

saltem

saltem suspicio delirij: penitus à vino vinoso, & à vino aquoso sincero abstinendum: & danda est vel aqua: vel vinum aquosum, non sincerum, sed aqua permistum, si videlicet virtus debilis sit, vt magis possit, quam materia petēs caput: tex. 41. lib. 3. de ratione vict. Gal. cap. 3. li. 8. meth. Et tunc etiam ad prohibendam vini euaporationem, frigida superbibenda. Si mediocris sit febris: moderate vinum exhibendum, nisi aliquid prohibeat: diligenter enim perpendenda sunt, virtus, materia morbifica, febris & symptomata: si ergo virtus non sit robusta, materia concocta, febris moderata, nec symptomata prohibeant, verbi gratia, capitis grauitas, aut delirium, &c. vinum est dandum, sed aquosum, quod febricitantibus minori noxa datur, quam reliqua, cap. 3. lib. 8. meth. tex. 4. & 7. & 41. lib. 3. de ratione vict. qui postremus locus, à multis male intellectus, plurimis causa fuit exitij. Quoad materiam morificam, febris, vel est continua, vel intermittens. Si continua: materia cruda prohibet vinum: prohibet item materia concocta, si sit copiosa: non copiosa, permittit vinum aquosum, nisi febris vehementia prohibeat. In intermittente, vinum prohibetur tantum à materia cruda, non cocta (vt in continua.) Vnde Galenus cap. 9. lib. 1. ad Glauca. ait, à vino esse abstinendum, antequam materia concoquatur: quod verum est, si febris est intermittens, & longum habet interuallum, vt est exquisita tertiana & quartana: secus statuendum est in febre tertiana notha, & quotidiana, quia breue est interuallum. Hæc de cibo & potu.

De reliquis rebus non naturalibus.

Reliqua ad viuendi rationem pertinentia, manifesta sunt. Constat enim somnum probari moderatum, & non in principio accessionum: aph. 1. sect. 2. Alius erit lubrica seruanda. Quiescant febricitantes in lecto: præterquam in quartana. Spes sit salutis, &c.

CAPVT XXII.

De febribus putridis in specie: & primum de febribus biliosis.



Actenus putridarum febrium doctrina generalis: specialis sequitur. Speciales autem febres quatuor sunt, Biliosa, Sanguinea, Pituitosa, Melancholica. Biliosa febris, est febris putrida, quæ

Causa. producitur à bile putrescente. Causæ bilem generantes sunt, calida intemperies, præsertim hepatis, interdum etiam ventriculi, præterea victus calidior, medicamentum calidius. *Differentia.* sumuntur à Materia, & Loco. A materia: vt bilis est vel alimentitia, vel excrementitia: excrementitia potest esse, pallida, flaua, vitellina, porracea, æruginosa, cærulea: vt testatur Gal. aph. 14. sect. 5. l. 6. epid. Porracea bilis generatur in vetriculo, è cibis calidioribus & prauis succis: c. 6. lib. 2. de temperam. Additur à Galeno bilis rubra: t. 4. l. 1. de natura humana, quæ tamen nihil aliud est, quam ichor sanguinis, quod etiam colligitur p. cap. 2. de atra bile. Pallida ergo bilis minus est calida: cærulea calidissima. Quoad differentias à loco: materia biliosa putrescit vel extra venas, vel in venis: vnde oriuntur febres Intermitteutes, vel continuæ. Primum ergo de biliosa intermitteute,

De tertiana intermitteute exquisita.

Definitio. Tertiana entormistens exquisita, est febris putrida, producta: à bile sinera, extra venas putrescente. Dicitur, à bile sinera: ad differentiam bilis mistæ cum aliis humoribus, & dicitur extra venas: ad differentiam tertianæ continuæ.

Causa. Causa bilem generans, est Error externus, vel Intemperies calida.

Differentia. Differentiæ capiuntur à Materia & Loco: vt colligere licet è Galeno, c. 8. l. 2. de diff. feb. aph. 5. sect. 3. l. 1. epid. aph. 23. sect. 2. l. 6. epid. A materia si capiantur: tum vel à Copia, vel à Qualitate sumuntur. A copia: si bilis est exigua, fit tertiana exquisita exacte, quæ non excedit 12. horas: si copiosa, fit tertiana, quæ simpliciter tertiana vocatur, & hæc ad differentiã prioris excedit horas 12. vt paroxysmus perduret vsque ad horã vigesimã: si maxima bilis sit copia, oritur tertiana extensa vocata, cuius accessio potest produci, vsque ad 40. horas. A qualitate sumuntur differentiæ, vt bilis magis vel minus est calida: minus calida, est pallida: calidior est flaua: dein vitellina, porracea, æruginosa: calidissima cærulea. Hæc autẽ febris, de qua nos loquimur, à quacunque fiat bilis, semper est exquisita, nõ nothia. A loco sumuntur differentiæ, vt materia prodit vel à iecinore, seu venis proximis hepatis, vel à vesica fellea, vel à ventriculo: quauis vt plurimum prodeat ab hepate. Vnde, vt locus est vel vnicus, vel multiplex: ita etiam febris prodit simplex, duplex, vel triplex. Duæ vocantur tertianæ, dũ ab vno

foco

foco vno die, ab alio, alio die, prodit materia: duplex autem vocatur febris, si materia à duplici foco eodem die prodeat.

Febris hæc cognoscitur, non vt febris, nec vt putrida, quia hæc signa suo loco fuerunt proposita: sed cognoscenda est, vt sit à bile. Signa ergo omnia vergūt ad calidum & siccum: quare & causæ externæ, vt victus calidior, medicamenta calidiora: & causæ internæ, vt temperamentum calidum & siccum hepatis: & symptomata, vt rigor cum sensu punctionis & caliditatis: sitis: excrementa omnia biliosa, lotium biliosum. Signa differentiarum à materiæ copîa: minor copia indicatur à paroxysmo, qui non pertransit duodecim horas: maior, cum paroxysmus durat ad horam vigesimam: maxima, cum protrahitur ad horas quadragesimas. Differentiæ à materiæ qualitate, cognoscuntur è vehementia symptomatum: vt si bilis sit calidissima, quemadmodum cærulea, omnia symptomata vehementissima sunt: cognoscuntur etiam exeuntibus mutatis: verbi gratia, si euomatur bilis porracea, statuendum est, à bile porracea febrem oriri: &c. Differentiæ è loco, sic noscuntur: si vnicus sit focus, febris est simplex: si focus duplex, est febris duplex. Quis vero sit locus, num scilicet ventriculus, an hepar: cognoscitur è signis, quæ illarum partium affectiones indicant: de quibus suo loco.

Indicationes hic nō sumuntur à febre, nec à putrida: de his enim alibi dictum: sed à bile. Bilis ergo per contrarium est alteranda, & vacuanda. Virtutis indicatio patet alibi.

Quoad *prognosis*. Tertianâ intermittens periculo vacat. aph. 5. sect. 3. lib. 1. epidem. & aph. 43. sect. 4. nam febris non est admodum vehemens, ratione essentia, quia est intermittens, materia morbifica, non est admodum vehemens ratione dignitatis, nam putrescit extra venas: nec adest vehementia, ratione facultatis, cum virtus resistat. At differentia est, ratione materiæ, & loci. Quoad materiâ copiosior & calidior, est peior: vt si fiat à bile cærulea. Quoad locum: si iecur est focus, peior: sic, si plures sunt fomites, peius.

Materiæ remediorum. Primum cheirurgica. In hac febre conuenit venæsectio: peccat enim sanguis, vel vt sine quo non, vel saltem vt habet rationem adiuuantis: quemadmodum supra è Galeno cap. vlt. l. 2. de diff. feb. diximus. Virtus autem in exquisita exacte prohibet venæsectionem: vnde Galen. l. 1. ad Glauc. c. proprio. de cura tertianæ intermittens

Signa:

Indicatio-
nes.Prognosis.
ca.Vena se-
ctio.

exquiritur; non lecat venam: hæc enim febris necessario fit, anni tempore calido, regione calida: constitutione calida & sicca: quibus existentibus, virtutem debilem esse, necesse est, vs venæsectionem sustinere nequeat. In reliquis autem febribus exquisitis, sed non exacte, licet venam lecare: cum nihil prohibeat. Vfus venæsectionis, patet alibi.

Lenientia. Sequitur materia medicinalis. Primū lenientia: *℞. flor. cass. nou. extract. ʒ ij. pulpa tamarindz ʒ iij. manna electa ʒ ij. Misc. & cum saccharo fiat boli.* Notandū, hic non proponi calida, quia febris est tertiana exquisita, à bile sincera. Si patiens cupiat leniēs in potu. *℞. syr. ros. solut. viol. sol. manna electa, ana ʒ jss. decocti hordei, cum ʒ iij. pulpa tamarindorum, q. s. Misc. fiat potio brevis.*

Præparantia. Quoad præparantia: *℞. decocti hordei, alterati endiuia, actiosa & lactuca, ʒ vi. pro syrupo.*

Notandum, saccharum & dulcia hic non proponi: quia in corpore biliosq̃ dulcia facile bilescunt. Præterea notandum, si in febre proposita bilis sit calidior, cuiusmodi est vitellina, porracea, æruginosa: addendam esse lactucam in decocto iam præscripto, maiore copia: ita vt quantitas lactucæ excedat quantitatem endiuia: adiungenda etiam tunc est *nymphaea*. Prodest etiam pro præparatione materiæ biliosæ vti tñ *j. feri caprini*, optime depurati, cum succo endiuia, vel etiam lactucæ usque ad ʒ j. Vfus syruporum è generalibus patet.

Purgantia. Quoad electiue purgantia. *℞. flor. cass. nou. extra. ʒ viij. rhab. el. puluerisati ʒ iij. manna el. ʒ ij. Misc. & cum saccharo fiant boli.* In hoc medicamento ponitur rhab. quod bilem trahit: miscetur calsia, quia alias rhab. nimis calefacit: beneficio mannae, facilius & citius fit purgatio: Purgans in modum potionis: *℞. rhab. electi, minimum succi, non puluerisati ʒ jss. fiat infusio in decocto hordei: & facta diligenti expressione, addit manna el. syr. ros. sol. ana ʒ ij. Misc. & fiat potio brevis.* Obiter hic notandum non corrigi rhab. hoc in loco spica, schœnantho, vel vino aromatico: quia versamur in curatione tertianæ exquisitæ: vbi à calidis abstinere oportet.

Alterantia. Quoad alterantia, seu refrigerantia: his vti licet lotus, & Extra. Intus *℞. feri lactis caprini, optime depurati tñ j. emulsionis sem. melonum, ʒ ij.* Licet autem loco emulsionis sem. melon. vti ʒ j. succi endiuia. Et si intentior sit caliditas, licet admiscere ʒ ss. succi lactucæ. Notandum hic non proponi saccharum rosaceum, confectam tichoraceam, &c. quia propter saccharū in hac febre exquisita non approbantur. Extra: *℞. succi endiuia, succi lactucæ,*

lactuca, ana ʒ j. aceti ʒ ij. Misco & applicentur hepati. Pro ventriculo: *ʒ succi ex bori ʒ j ʒ. aceti ʒ ij. olei mastich ʒ ʒ. admista hic vides calida: nō item in iecore: quia ventriculi calor exiguus.*

Quoad materiam dieteticam: Si febricitans non sit delicatus, satis est uti cremore perſe & hordeaceo. Delicatis autem licet exhibere *lactucam, cucurbitas, anguriam, oia, piſces ſaxatiles, carnes volucrum pullorum, &c.* Poſſunt etiam concedi *fructus, ut poma, pyra, pruna.* Alexander etiam in hac febre cōcedebat *perſica, carnes peponum, & maxime melopeponum,* præſertim ubi ſitis vrget. Sed fructus parce dandi, ſaltem ad deguſtandum. *Quoad potum: Galenus l. i. ad Glauc. delicatis concedit vinum aquoſum tenue, in exigua quantitate, dum morbus incipit concoqui: in maiori quantitate, dum morbus prope eſt ut ſoluatur, nimirum in declinatione: ratio eſt, quia virtus eo tempore indicat, & materia non prohibet: at ante declinationem tutius eſt, uti aqua.*

De tertiana intermittente notha.

Tertiana intermittēs notha, ſpuria, ſeu non exquisita (quia ſit bile non ſincera) eſt febris putrida, producta à bile miſta prædominante, putreſcente extra venas. Proponitur in hac febre *bilis: ut diſtinguatur à ſanguinea: proponitur bilis miſta: ut diſtinguatur ab exquisita, quæ ſit à bile ſincera.* Notandum autem in hac ſpuria, non modo bilē oportere eſſe coniunctā cum alio humore, ſed miſtam: Si enim, verbi gratia, fiat febris è pituita & bile, non exacte miſtis, erunt duæ febres, vna bilioſa, altera pituitoſa: ut in hemitritæo: at ubi exacta miſtio eſt facta, febris eſt ſimplex, ſed ſpuria. Additur in definitione, *prædominante:* nam ſi, verbi gratia, bilis cum pituita miſceatur, ut pituita prædominetur omnibus modis, id eſt, & ratione quantitatis, & ratione vigoris, febris erit pituitoſa, non tertiana. *Extra venas,* dictum fuit, ad differentiam, bilioſæ nothæ continuæ. Porro miſtio bilis ſit interdum cum humore omnibus modis contrario, nimirum cum pituita, quæ frigida eſt & humida: vnde cōſtituitur tertiana notha exacte, de qua loquitur Galenus l. i. ad Clauc. c. proprio (non loquitur ibi de quilibet notha, quod non cognoscens Alexander, temere Galenum reddarguit) interdū vero bilis miſcetūr cum humore non prorsus contrario, nim. cum melancholia, quæ frigida eſt & ſicca: vnde producitur tertiana notha, ſed non exacte.

Cauſæ febris, & putredinis patent è generalibus. Cauſa.

ſæ generantes bilem propoſitæ fuerunt in febre bilioſa ex-
quiſita. Cauſæ aliorum humorum pituitæ & melancholiæ,
proponuntur ſuo loco.

Diffinitio.

Bilis miſta eſt cum Pituita, vel cū Melancholia: præterea
miſta eſt vel cum Vnica tantum materia, vel cum Vtraque.

Signa.

Signa indicantia bilem, propoſita fuerunt in bilioſa ex-
quiſita. Signa pituitæ & melancholiæ patebunt ſuo loco.

Indicationes.

Indicationes dirigi debent ad humorem, & intemperiem
membrorum affectorum. Quoad humorem, ſeu materiam,
quæ eſt bilis permixta pituitæ, aut melancholiæ: indicatur al-
terans & purgans. Quoad dyſcrasiam: indicatur alterans
per contrarium: verbi gratia ratione pituitæ, quæ genera-
ri poteſt à ventriculo frigido & humido, oritur indicatio
calefaciendi & ſiccandi: aut ſi ventriculus exiſtat ſiccus,
humectandi. Præterea ratione bilis & melancholiæ, oportet
iecur refrigerare: quia iecur calidius, generat humorem bi-
lioſum, & melancholicum.

*Prognosti-
ca.*

Vt hæc febris intermittens eſt, vacat periculo. At ob mi-
ſtionem bilis cum pituita, vel melancholia, longiori tempore
curatur.

*Vena ſe-
ctio.*

Sanguis ſi mittendus videtur, ab initio ſtatim ſecunda ve-
na: cap. 10. lib. 1. ad Glauc. nam virtus ab initio robuſtior eſt,
& phlebotomiam permittit.

Lenientia.

Leniens eſſe poteſt huiusmodi: *℞. mellis roſ. ſol. ſyr. roſ. an. ʒ
ij ſ. in vis pulvi parum, fiat poſtio brevis.* Hic mel roſ. ſol. proponi-
tur cauſa materiæ pituitoſæ: ſyr. roſ. ſol. propter bilem: diſſol-
uuntur autem in iure: quia in hac febre ventriculus, pituitæ
auctor, non ita ſuſtinet aquam: vnde ius potius probatur. Bo-
lus fiet hoc modo. *R. flor. caſſ. nou. ext. ʒ j. mannae el. ʒ ij. ſpe-
cierum hieræ ſimplicis ʒ j ſ. Miſc. & cum ſaccharo fiant bo-
li.* Hiera ponitur cauſa pituitæ.

*Præparā-
tio.*

Præparans bilem pituitæ permixtam: *℞. ſyr. de cich. ſimpl.
mellis roſati an. ʒ j. decocti cichory, betonica ʒ ij. Miſ. pro ſyrupo.* Si
autem bilis ſit permixta melancholiæ: *℞. ſyr. de endiu. de bora-
gine, an. ʒ j. decocti cichory, borag. ʒ ij ſ.* Dum autem febris hæc
progreditur, aſcendere oportet ad ſyrupos valentiores, id eſt.
magis detergentes & attenuantes: vt, *℞. ſyr. de cich. comp. Ely-
xantini, de 2. rad. an. ʒ ſ. decocti endiuæ, petroſelinæ, feniculi, me-
liſſæ ʒ ij. Miſ. pro ſyrupo.*

Purgatio.

Purgantia: ſi bilis miſta ſit cum pituita: *℞. rhab. el. ʒ ij. aga-
rici trochiſcati ʒ j. fiat infuſio in decocto endiuæ & betonica, ſuf-
ficiens*

ficiente autem & facta diligenti expressione, adde manna elect. mellis ros. sol. an. ℥ij. Mis. & fiat potio brevis. Et hoc seruandum, si bilis est copiosior pituita. Purgans etiam exhibetur in infusione, hac formula: ℞. rhab. el. 3j. agarici 3j. infundantur in decocto cichorij & beton. deinde facta diligenti expressione adde, mellis ros. sol. manna el. an. ℥ij. fiat potio brevis. Notetur hic dosim agarici maiorem esse, quam rhab. licet in hac febre bilis prædominetur: nam interdum non ratione quantitatis, sed solum ratione vigoris prædominatur: & propterea dosis agarici debet esse maior. Boli forma est talis: ℞. flor. cass. recens trita 3j. manna el. 3j. pulv. rhab. electi, agarici trochisc. an. 3j. Mis. & cum saccharo fiant boli.

I I. Si bilis mista sit cum melancholia: ℞. rhab. el. ʒiij. fiat infusio in decocto fructuum, cum ʒij. sol. sena. & ʒj. passularum: & facta diligenti expressione, adde syr. ros. sol. manna el. an. ʒij. Mis. & fiat potio brevis. Notetur in hoc medicamento non esse agaricum, nec mel ros. quia non peccat pituita. Bolus: ℞. elect. lenis, flor. cass. nou. ext. an. ʒss. confect. Hamech ʒij, rhab. el. ʒj. cum saccharo fiant boli.

Medicamenta roborantia, respiciunt hepar calidum, vt generat bilem, vel melancholiam: & respiciunt ventriculum frigidum, vt generat pituitam. Quare si intus medicamentum est assumendum: ℞. conserua e flor. cich. conserua beton. an. ʒj. spec. diarth. abb. aromatici ros. an. ʒj. Mis. & poterimus exhibere a ʒj. ad ʒvj. pro singulis vicibus. Alterans extra adinuendū, causa ventriculi: ℞. ol. mastichini ʒj. spec. arom. ros. ʒj. cera ʒj. Mis. ad ignem. Causa hepatis: ℞. succi cich. ʒj. aceti ʒij. spec. diarth. abb. ʒj. Mis. Modus administrandi patet e doctrina generali: verbi gratia, medicamentum causa ventriculi magis actu calidum esse vsurpandum.

Quoad materiam dieteticam: Cibus debet esse medicus: nam febris non est brevis. Debet esse refrigerans, propter bilem: calefaciens, propter pituitam: humectans propter melancholiam. Parabitur ergo e prisa, endiuia, acetosa, ratione bilis: addetur oxymeli, vel piper rudiser confusum, petroselinum, propter pituitam: addetur cibus borago, bugl. melissa, ratione melancholice. Potus erit aqua cum oxymelite: probatur etiam aqua saccharata, aqua cum boragine, præsertim causa melancholicæ: nec isus improbat. Vt in declinatione conceditur: nam in hac febre prohibet materia cruda, prohibet etiam febris, quia breue habet interuallum.

Roborantia.

visum.

CAPVT XXIII.

*De tertiana Continua, primum exquisita:
deinde notha.**Definitio.*

Biliofa continua exquisita, est febris putrida, producta à bile sincera, in venis putrefcente. Bilis hæc sincera, & non permista cum alia specie materiæ, est alimentalis, vel excrementitia: excrementitia est

causa.

humorosa, vel ichorosa: vt colligitur è text. 1 & 13. lib. 4. de ratione vict. aph. 59. sect. 4. cap. 3. & 6. lib. 2. de crisib. Causæ bilem generantes, sunt calefacientes & exsiccantes: vt dictum est in tertiana intermittente exquisita: Differentia est: quia in continua, causæ & internæ, & externæ sunt vehementiores.

Definitio.

Differentiæ sumuntur à Materia & Loco. A materia: vt est alimentalis, vel excrementitia: & excrementitia, vel humorosa, vel ichorosa. Sed notandum tertianam continuam exquisitam exacte, seu exquisitissimam, fieri è bile flaua excrementitia humorosa: in quam bilem omnes causas & internas & externas cōspirare oportet: vnde si febris fiat à bile vitellina, æruginosa, vel exulsa, febres fiunt biliosæ cōtinuæ, sed nō exacte exquisitæ: hæ autē dicuntur febres *colleqnatiuæ*, ob insignem caliditatem. Differentiæ loco, seu venis: Venæ sunt vel proximæ cordi, vel remotæ: & remotæ vel admodū sunt remotæ, vel medio modo se habent: vnde, si venæ sint proximæ, vehemens est caliditas, vt calor vniuersus ad interiora confugiat, vt interiora vrantur, exteriora algeant: & hæc febres dicuntur *Leipyria*.

Signa.

Signa bilem indicantia, proposita sunt in biliosa intermittente: sed in hac febre sunt intensiora: vt, pulsus est velocior, sitis magis molesta, vigilie magis contumaces, &c. Signa indicantia bilem in venis putrescentem, sunt, absentia rigoris, non adest sudor, non integritas seu interuallum. Signa differentiarum à materia: si materia biliosa sit alimentalis: cognoscitur è difficili tolerantiā, ægrī vix se mouere possunt. Si materia sit excrementitia ichorosa: cognoscitur è facili tolerantiā: quæ non erit ita facilis, si materia excrementitia sit humorosa, & præsertim si sit calidior, cuiusmodi est bilis vitellina & reliquæ. Signa differentiarum à loco: Si materia putrescat

treſcat in venis omnibus : cognoscitur, quia vnica eſt acceſſio: & hæc febris dicitur *ardens exquisita*. Si materia putreſcat in venis tantum remotioribus : cognoscitur, quia eſt febris continua proportionata, id eſt, quæ habet plures acceſſiones, proportionem reſpondentes tertianæ intermittenti. Si materia putreſcat in venis mediis: erit febris cōtinua proportionata, quæ accedit ad continentem, ſatisque cōuenit cum exquisita, & communiter dicitur *febris ardens*. Si materia putreſcat in venis circa aliquod viſcus (N. B. facit enim ad curam) vt circa iecur : in ea parte ſumma eſt noxa, ægrotantes circa iecur percipiunt inſignem feruorem.

Indicationes reſpiciunt bilem : quare oportet alterare & vacuare.

Indicationes.

Continua febris periculosa eſt, aphor. 43. ſect. 4. adeſt enim vehementia & febris, & materia, & ſymptomatum. Febris eſt vehemens ratione eſſentiæ : quia maxime calida & ſicca. Materia eſt vehemens ratione dignitatis, quia putreſcit in venis : materia etiam vehemens eſt ratione eſſentiæ : quia valde eſt calida. Symptomata ſemper vehementia ſunt ratione eſſentiæ: interdum etiam vehementia ſunt ratione dignitatis & facultatis, vt facultas non ferat, ſed cedat, & periculum augeatur. Ratione differentiarum à materia : periculoſior eſt febris, ſi materia ſit alimentalis : & ſi materia ſit excrementitia, periculoſior eſt humorosa, minus periculosa ichorosa. Materia etiam, quo calidior (vt ſi ſit æruginosa) eo magis auget periculum. Ratione differentiarum à loco : periculoſior eſt, ſi materia putreſcat in venis cordi proximis. Intenditur periculum, ſi vires debiliores.

Prognosticum.

Circa materiam cheirurgicam : Cum bilis peccet in venis, neceſſario ſanguis incaleſcit, vt poſſit putreſcere : quare ſanguis vacuandus, niſi per venam ſectam immineat periculum *ebullitionis cholicorum* : nam tunc phlebotomia mortis eſſet cauſa. Hoc autem periculum imminet, dum bilis putreſcit in venis, non totius corporis, ſed alicuius partis determinatæ : tunc enim poſt venam ſectam, deducitur in venas communes totius, quarum ſanguis iam eſt imminutus: dum ergo bilis poſt venæ ſectionem petit venas communes, miſcetur cum exiguo ſanguine, qui reſtat : & ſic poſt venæ ſect. maior copia bilis reperitur in venis, quam ante venæ ſectionem: vnde neceſſario fit ebullitio cholicorum.

Vena ſect.
Ebullitio
cholicorum.
Ausc.
ca. 20. ſen.
4. lib. 1. &
c. 42. 1r. 2.
ſen. 1. li. 4.
Vide enar.
2. lib. 2.
Valleriol.

Leniens : R. ſor. caſſ. non. ext. 3 x. pulpa tamarind. 3 β. manna
el. ij.

Lenientia.

prohibendum. Quod cognoscens Aëtius, ad vtrumque indicans respicit, & probat frigidam fractam, verbi gratia, si miscetur aqua calida quinta pars, cum frigida: vnde etiam expedit dare aquam decoctam hordei, vel angurie. Quoad vsum, & primum quantum agendum: si frigida exhibeatur causa totius febris: æger maximam copiam hauriet, quantum potest: cap. 5. lib. 9. meth. si vero detur non causa totius febris, sed ratione alicuius symptomatis, vt sitis ratione: debet exhiberi ea copia, quam homo vno haustu haurire potest: tex. 43. lib. 1. de ratione vict. Et sic hæc auctoritates facile conciliantur. Quoad modum: aqua exhiberi debet actu frigida, nisi aliquid prohibeat, cap. 5. lib. 9. method. Quoad quando agendum: frigida exhibenda est, dum materia est concocta. cap. 5. lib. 9. method. Et, si febris sit insignis caliditatis, sufficit coctio mediocris, non integra, cap. 16. lib. 9. meth. nam si, existente febre insigni, expectare velimus exactam coctionem, homo corripietur febre hectica.

Quoad medicinas alterantes. Refrigerantia probantur, *Alterantia.* maxime, si aqua non est exhibita. Medicamentum ergo intro dandum, tale esse potest: *℞. seri lbjss. succi lactuca 3j. Mis.* Vel: *℞. aqua hordei lbj. succi endivia 3ss. nymphae 3ij. Misc. & fiat potio.* Vt hinc colligatur, non esse dulcia miscenda: nec semper benedictis illis conseruis esse vtendum. Extra vsurpari potest hoc: *℞. Succi endiu. lactuca, pampinorum vitis, cucurbita, an. 3ss. acetositis citri 3ij. (causa penetrationis) Misc.* Hoc medicamentum applicandum est hepati: sed præterea etiam thoraci, propter hecticam imminuentem.

Quoad materiam diæticam. Aër admodum frigidus *Vitius.* probatur: quare aqua frigidissima prope os ægri ponenda, vt aërem illum refrigeratum inspiret. Cibus debet esse frigidus & humidus: vt *ptisana cum lactuca.* Potus sit aqua. Reliqua sunt manifesta.

De Tertianâ continua notha.

Biliosa continua notha, est febris putrida, procedens à bile m- Definitio.
sa prædominante, putrescente in venis.

Differentiæ sumuntur à materia & loco. A materia, vt dictum est de tertiana intermittente notha, eodem prorsus modo. A loco: vt dictum est de continua exquisita. *Differentia.*

Quoad Signa: hæc patent, quatenus est febris, quate- *Signa.*
nus

nus putrida, & quatenus continua. Quoad materiam biliosam permistam: & hæc signa patent ex doctrina nothæ intermittentis.

Indicationes.

Indicationes etiam manifestæ sunt: siue sumantur à virtute, siue à febre: siue à materia permista: nam de indicatione huius materie, locuti sumus in tertiâ intermittente nothâ.

Prognosticum.

Febris hæc periculosa est, quia est continua, in qua materia putrescit in venis.

Vena secunda.

Quoad materiam cheirurgicam. Cum vena secunda sit in nothâ intermittente: cap. 10. lib. 1. ad Glauc. multo magis in continua febre vena est secunda.

Pharmacia.

Materia medicinalis eadem probatur, quæ proposita fuit in nothâ intermittente. Differentia est, quod in hac febre probentur & minus calida, & magis frigida: quoniam febris est continua. Et idem de diætâ dicendum.

CAPVT XXIIII.

De Febre Sanguinea.

Definitio.



Ex febrem sanguineam, intelligimus omnē sanguineam, excepta pestilēti: de qua suo loco. *Febris ergo sanguinea est febris procedēs à sanguine peccante in venis, citra venenositatem* (non dico citra malignitatem.) In definitione hac communi, nō dicimus, quod sit febris putrida: quia quædam sanguinea non est putrida.

Dicimus, *procedens à sanguine*: ad differentiam aliorum humorum. Addimus, *peccante*: scilicet & ratione putredinis, & citra putredinem. Per sanguinem autem hic intelligimus &

Febris sanguinea species.

Massa sanguinea.

massam sanguineam, & quartum succum: vt colligitur ex aph. 3. sect. 1. c. 9. lib. 1. de diff. feb. & cap. 12. lib. 2. de cris. Massa autem sanguinea, vel Efferuescit tantum, vel Putrescit. Efferuescit Remisse, vel Intense. Si feruor remissus sit: oritur febris sanguinea, quæ *Synochus sine putredine* dicitur. Si intensus sit feruor, necessario generantur ichores, & portiones quædam excrementitiæ, putredini obnoxia, quæ putrescunt: vnde sit febris sanguinea, quæ *Synochus cum putredine* dicitur. Si vero massa sanguinea putrescat: sit febris sanguinea, quæ dicitur *Synochus pestilens*: de qua in præsentia non loquimur. Porro succus ille quartus, vel Feruet tantum, vel Putrescit. Feruet Remisse, vel Intense. Si feruor est remissus: tū febris imminet. Si intensus: tunc quartus ille succus, degenerat

in mate

in materias excrementitias, vt alia febris species oriuntur: verbi gratia, si ob insignem feruorem sanguinis, portio tenuis degeneret in bilem flauam, fit febris biliosa, non sanguinea, &c. At, si quartus putrescat: putredo vel est remissa, vel intensa. Si remissa: sanguis putrescit sub forma sanguinis: & tunc febris fit *sanguinea*, quæ tamen vocatur febris quoddammodo biliosa, propter similitudinem: est tamen sanguinea. Si putredo sit intensa: tunc sanguis degenerat in excrementum, vt fiat febris non sanguinea, sed alterius speciei.

Dictum etiam fuit in definitione, sanguinem putrescere in *venis*: vt pateret febrem sanguineam esse febrem continuam: & distingui à febre, quæ fit ex inflammatione. Postremo addidimus, *cura venenositatem*: vt hanc febrem distinguere-
mus à pestilenti.

Causæ sanguinem generantes, sunt calefacientes, & humectantes: vt, hepar calidum & humidum: cibi calidi & humidi, itemque boni & copiosi succi: potus vini, otium, &c. *Causæ sanguinis.*

Differentiæ sumuntur à Materia, & Loco. A materia: *Differentia.* Sanguis vel accipitur pro massa, vnde synochus Cum putredine, & Sine putredine: vel pro quarto succo vnde febris sanguinea, quoddammodo vel biliosa, vel melancholica. A loco: Sanguis peccat in venis vel Totius, vel Partis. Si totius, vel in magnis venis, vnde synochus oritur: vel in paruis, vnde oritur febris sanguinea proportionata. Sic in parte est febris, quæ oritur ex inflammatione: de qua alibi.

Signa febris sanguineæ in genere sunt, quæ indicant sanguinem peccantem: vt sunt, pulsus magnus, plenus, velox: caliditas mitis, non valde mordax. cap. 3. lib. 9. cap. 9. lib. 2. de differ. febr. Præterea signa sunt sanguineæ febris, causæ generantes sanguinem: vt hepar calidum & humidum: victus, producens copiosum sanguinem. Signa differentiarum à materia: si materia sit massa sanguinea: cognoscitur inde, quod febris est synochus, seu continens, non habens accessiones, præter vnicam. Hæc est putrida, vel non putrida. Si putrida: lotium à naturali est mutatum, pulsus inæqualis, calor in toto mordax: quemadmodum de putridis in genere dictum est: Si hæc signa non assint, synochus est sine putredine. Si materia est quartus succus: cognoscitur inde, quod febris est proportionata, plures habens accessiones. Signa differentiarum à loco: Si sanguis putrescat in magnis vasis: cognoscitur inde, quod vnica est accessio: si in *Signa.*

paruis: cognoscitur è pluribus accessionibus.

Indicationes.

Quoad indicationes: sanguis alterandus, id est, refrigerandus: & vacuandus.

Prognostica.

Febris sanguinea non est lethalis: quia ratione sanguinis, non est vehementia insignis penes essentiam: vel enim feruor est, vel leuis putredo: dum vero insignis est putredo, febris oritur pestilens, de qua iam non agimus. Cæterum febris sanguinea est minus periculosa, si effluat sanguis: & præsertim si feruor non sit insignis, ut in syncho sine putredine. Si ad copiam materię respicimus: synchus increfcens, minus tuta est, quam decrefcens, & homotona: portio enim putrescens excedit portionem quæ resoluitur. Cæterum, si recte vsurpentur materię, febris hæc vincitur: sin minus, interficit.

Venalectio.

Quoad materiam cheirurgicam: si phlebotomia omittatur, summum imminet discrimen, cap. 4. lib. 1. metho: nam sanguinis vitium est vehemens. Quare etiam ad leipothymiam (non ad synopen.) confertim sanguis est vacuandus: quia virtus in hac febre admodum est robusta. Reliqua administratio patet è generalibus.

Leniens.

Materię medicinales probantur, quales in febribus biliosis. Vnde leniens medicamentum sit: *℞. flor. cass. nou. ext. ʒj. pulpa tamarind. ʒiij. m. inna el. ʒij. cum saccharo fiant boli.*

Preparans.

Preparans esse potest: *℞. syr. acetosa. (syn. de succo acetosa, ano ʒ v. decocti acetosa, hordei, lupulorum, ʒiij. Mista.*

Purgans.

Medicamentum purgans, sic leniens modo propositum: nisi contingat, ut sanguis mutetur vel in bilem, vel in melancholiam: tunc enim addere licet, propter bilem quidem *rhabarb.* propter melancholiam vero *senam.*

Alterans.

Medicamentum alterans (secundum Galen. cap. 5. lib. 9. meth.) debet esse frigida, si venalectio est prætermissa. At si secta fuit vena, refrigerantibus uti licet remissioribus, ut *serum lactis, cum succo endiuia, & reliquis,* de quibus in febre biliosa.

Pista.

Quoad materiam dieteticam: cum sanguis sit copiosus & calidior: ob id probatur victus minuens, & refrigerans: vnde cibi alterandi quemadmodum in biliosa febre dictum est.

CAPV.T

De Febre Pituitosa.

P Er febrem pituitosam, intelligimus omnem febrem pituitosam, excepta pituitosa syncopali: de qua suo loco. *Febbris autem pituitosa est febris putrida, procedens à pituita putrescente.* Pituita est Alimentalis, vel Excrementitia. Alimentalis, est portio chyli frigida & humida, quæ in sanguinis penuria, in sanguinem mutari potest. Et hæc alimentalis pituita putrescere potest, vel vt alimentalis, vel vt excrementitia. Si putrescat, vt alimentalis: oritur febris *pituitosa continua*, è pituita dulci. Quod si pituita alimentalis, antequam putrescat, euadat excrementitia: variae produnt febres, & *continua*, & *intermittentes*: prout alimentalis pituita in variam excrementitiam mutatur. Mutatur vero à causa calefaciente, aut refrigerante: *Cap. 6 li. 2. de diff. feb.* calefaciens, pituitam alimentalem mutat in calidam: siue hoc fiat per putredinem: siue per admixtionem salis serosi: quæ humiditatis: siue, vt Auicennas ait, ob permissionem amaræ bilis: omnibus enim his modis, vapor calidus & exustus, cum materia aquea permiscetur, quæ vera salis saporis causa est secundum Philosophum. Ob putredinem salis fit pituita: quoniam calor putredinalis, agens in pituitam nondum salisam, producit vapores exustos, qui cum portione aquea permisceruntur. Deinde citra putredinem salis fit pituita: quando serosa humiditas salis, pituitæ non salis permiscetur: genita autem est illa salis humiditas à calore, qui in serosam humiditatem agens, produxit vapores exustos: hi deinde misti cum aquosa portione humiditatis, serositatem illam salisam reddiderunt. Ita etiam amara bilis, permixta pituitæ, calore suo in pituitam agens, producit vapores exustos, qui cum portione aquosa pituitæ misti, causa sunt caliditatis. Sic igitur pituita salis, quæ secundum Alexandrum est calida, & sicca, à causa calida generatur. Secundo pituita alimentalis à causa refrigerante mutatur in acidam, in quo si intensum sit frigus in acidam vitream. Hæc de pituita alimentali. Excrementitia pituita, vel generatur in ventriculo, & proprie pituita dicitur, vel in cerebro: & vocatur mucus pituitosus: vel etiam in nerviosis partibus, capite & libris 13. *ta ut sit febris causa* metho. quæ improprie pituita vocatur. Pituita in ventriculo, vel cerebro genita, febris causa esse potest non item, *sa.*

Definitio.

Pituita alimentalis
vt putrescat.Cap. 6 li. 2.
de diff. feb.

di

A. 100

1139

Excrementitia
pituita
ta ut sit
febris cau

quæ in partibus neruosis gignitur. Cæterum, pituita hæc excrementitia, vel est naturalis, vel præter naturam. Naturalis expers insignis qualitatæ, est insipida instar aquæ, vel subdulcis (*non dulcis: nam hæc est alimentalis:*) Pituita excrementitia præter naturam, particeps est qualitatæ effatu dignæ: nimirum caliditas, vt falsa pituita: vel frigiditatis, vt acida, & vitrea, text. 31. lib. 1. de nat. hum. cap. 1. lib. de atra bile, cap. ult. lib. 2. de fac. natural. Cypseam omittimus, quia non est causa febris. Hinc ergo colligere possumus, pituitam calidam & falsam, produci à calore, qui viget vel in capite, vel in hepate, vel, quod raram est, in ventriculo: pituitam vero frigidam, falsedinis expertem generari à causa frigida, quæ in capite, aut ventriculo viget, maxime si prægressus sit victus pituitosus, id est, frigidus & humidus.

Cur hyeme copiosa pituita reperitur: cum tamò æstiuæ diuina & æstiuæ.
ca. 8. lib. de atra bile. Hoc loco dubium quoddam dissoluendum, de pituita, quam Hippocrates hyeme generari asserit, text. 31. lib. 1. de nat. hum. Contra vero aphor. 15. sect. 1. hyeme ventres natura calidissimos esse ait: ut proinde potius sanguis, quam pituita hyeme produci videatur? Responsio. Hyeme quidem calor nativus ventriculi, copiosus est secundum substantiam, quoniam non dissoluitur, nisi aliquod violentum occurrat: nihilominus pituita admodum copiosa hyeme reperitur, ob tres causas. Prima, quia hyeme copiosa generatur: nam homines tunc vescuntur cibis pituitosis, & bibunt vinum recens, quæ omnia materia sunt pituitæ generandæ. Secunda, causa est, quia pituita hyeme genita, non mutatur in sanguinem, sicuti aliis anni temporibus: mutatio in sanguinem, fit in hepate & venis: at frigus hyeme penetrat ad iecur, & potissimum ad venas: ac proinde pituita iam genita non potest ita mutari in sanguinem. Tertia causa est, quia pituita hyeme non potest dissolui, vt æstate: pori enim corporis sunt stipati. Vnde hyeme copiosa pituita viget.

Differentia.

Differentiæ sumuntur à Materia, & Loco. Materia est Alimentalis, vel Excrementitia: Alimentalis est dulcis. Excrementitia est Naturalis, vt insipida: vel Præter naturam, quæ aut Calida, vt falsa: aut Frigida, vt acida & vitrea. Febris tamen exquisitissima, fit à pituita naturali excrementitia. Differentiæ à loco. Pituita putrescit Extra venas, vel In venis: & hinc febris pituitosa, est intermittens, vel continua. Quod si continua febris pituitosa producatur à pituita falsa, vocatur *casis noster*.

Pituitosa

Pituitosa febris indicatur in genere, in causis internis & *Signa.*
 externis, pituitam generantibus: cap. 4. lib. 2. de diff. feb. cap. 5.
 lib. 1. ad Glau. de quibus supra. Præterea indicatur ex exeun-
 tibus pituitosis, vt è vomitu pituitoso, similique alui deie-
 ctione, &c. Signa differentiarum. Si salsa sit pituita: signa
 sunt caliditatem indicantia, vt sitis: adest etiam vomitus salsæ
 pituitæ. Si pituita sit acida: signa sunt frigiditatis, vomitus
 materiæ acidæ. Si pituita sit vitrea: signa sunt frigoris inten-
 si, verbi gratia signa admodum frigidi ventriculi, vomitus
 pituitæ vitreæ, similisque alui deiectio. Quoad differentias à
 loco. Si pituita putrescat in venis: signa sunt febris conti-
 nuæ, de quibus suo loco: si extra venas: signa sunt intermit-
 tentis, de quibus etiam in doctrina generali egimus. Cæter-
 um febris continua, à pituita subdulci, vel insipida, ab Aui-
 cen. *Latica* dicitur, similisque est hecatica: ne igitur medici de-
 cipiantur, has ita ab inuicem distinguere oportet: in latica
 singulis diebus aliqua intensio obseruatur: & cutis non euadit
 arida, vt in hecatica, sed albicans, & subhumida, ratione pi-
 tuitæ: præterea etiam signa pituitæ assunt.

Pituita est alteranda, & vacuanda. Alterantia, sunt calefa-
 cientia: exceptis iis, quæ salsam pituitam alterant refrige-
 rando, quatenus est calida: alterantia dein sunt attenuantia,
 & detergentia, ratione crassitie, & visciditatis. *Indicationes.*

Pituitosa febris, non est prorsus salubris: & potius diutur-
 na, quam brevis: vnde longo tempore potius expugnatur. *Prognostica.*
 At periculum maius est, minus veritate materiæ, & loci.
 Quoad materiam: minus est periculosa, quæ fit à pituita in-
 sipida: magis periculosa, quæ à salsa, vel acida. Longiori tem-
 pore curatur, quæ fit à pituita acida, maxime si etiam sit vi-
 trea: cap. 6. lib. 2. de diff. febr. in vitrea enim est insignis vehe-
 mentia essentia. Quoad locum: magis periculosa est, si ma-
 teria putrescat in venis, quam si extra: additur enim vehe-
 mentia dignitatis.

Venæsectionem Gal. c. 12. l. 1. ad Glau. non proponit, quia *Phlebotomia.*
 non conuenit, in quotidiana exacte exquisita (de qua ibi Ga-
 lenus loquitur) nam in hac febre necesse est, vt omnes cau-
 sæ in vnâ pituitam dirigantur: vt nimirum aër sit frigidus,
 tempus hyemis, constitutio frigida, & regio frigida: quibus
 existentibus, virtus venæsectionem permittere non potest:
 vt è doctrina generali patet. Quod si febris non sit exacte
 exquisita: licet venam secare. Vt è generalibus patet.

Leuius, si pituita non sit falsa: R. mellis ros. sol. ʒ v. ss. in r. e. parum: fiat paruo brevis. Si pituita sit falsa: R. flor. cass. nou. extr. ʒ j. manna e. q. d. ʒ ss. anisorum rudier. consusorum. ʒ ij. Misc. cum sacch. in fiant boli. Si pituita sit acida. & febris intermittens: R. specierum hiera ʒ ss. cum melle ros. sol. fiant boli.

Preparā.
na.

Præparans, si pituita sit falsa: R. syr. de cub. simpl. de beton. an. ʒ j. decocti. cub. beton. ʒ ij. Misc. pro syrupo. Si pituita sit frigida: R. oxymelitis simpl. syr. de beton. mellis ros. ana ʒ ss. in vis alterati cū beton. mentha, & cich. ratione febris, ʒ ij. Misc. pro syrupo. Si frigidiior sit pituita: utendum est syrups compositis, hoc modo: R. syr. de bet. n. cōpositi, oxymelitis scillitici, a. ʒ ss. syr. de starch. ʒ vj. decocto petroselin. f. aniculi, hyssopi, cichori propter febre, ʒ ij. ss. Misc. pro syrupo.

Purgātia.

Purgans, si pituita sit falsa: R. agar. trochiscati ʒ iij. infundatur in suff. j. decocti beton. a. & cichori: & facta diligēt. expressione, adde, mellis ros. sol. ʒ ij. ss. Bolus, ad pituitam falsam: R. agar. trochisc. ʒ iij. flor. cassia. propter salsam pituitā. ʒ j. manna el. ʒ ij. Misc. & cum saccharo fiant boli. Si pituita non sit falsa: & primū si fuerit insipida: R. agar. trochisc. ʒ iij. diaphan. seu electarij de dactylis ʒ ij. propter febrē: flor. cass. nou. ext. ʒ ij. ss. Misc. cū saccharo fiant boli. Si pituita fuerit acida: R. agar. trochiscati ʒ j. ss. fiat infusio sufficiens aqua in decocto starch. & facta diligēt. expressione, adde diaphan. ʒ ij. ss. mellis ros. sol. ʒ ij. ss. Misc. & fiat potio brevis. Poterimus etiam uti hoc inedicamēto: R. pil. coh. ʒ j. ss. mastichinarum ʒ ss. cum melle ros. sol. fomentur pil. vj. post assumptas has pilulas, patiens superbibet in alteratum cichorio, ratione febris.

Roborātia.

Medicamentum roborans respicere debet non tam febrē, quam partes generantes pituitam. Quare causa falsæ pituitæ hepat. calidius eget refrigerantibus: causa pituitæ insipidæ & acidæ ventriculus atque caput postulat calefacientia. Ratione igitur falsæ pituitæ, huiusmodi medicamētum intus usurpari potest: R. conserua viti ʒ j. onf. betonica ʒ ss. specierum diarrhod. lb. ʒ ss. Misc. pro tribus vicibus. Extra hoc applicabitur suæ cub. ʒ vj. succi absinth. ʒ ij. etati gratia penetrationis ʒ j. Misc. & applicetur hepati. Causa autem pituitæ frigidæ, medicamentum hoc intus exhibeatur: R. conser. beton. diarrhod. ana ʒ j. specierum diarrhod. piper. diarrhod. ana ʒ ij. Misc. & sit cy. pro quatuor vicibus. Probantur etiam magna antidota hac febre, nimirum pherisq. & mulbridiatum. Si medicamētum extra est adhibendum, causa ventriculi, R. oleorum de spina, de absinth. mastich. n. & nuc. moscata, ana ʒ. ss. pulueri

*pulueris mactis, nucis moschata, carapophyll. ana ꝑ v. cera lota vino
maluatico 3. j. Misce & applicetur ventriculo: dummodo ven-
tricus non modo sit frigidus, sed etiam humidus: nam
si siccitas dominetur, ab hoc medicamento abstinendum: sed
de his potius dicendum in affectibus ventriculi. Causa capitis
Et puluerum beton. stoch. byssopi ana ꝑ ss. Applicetur hic pulvis su-
per coranali: & superponatur ceratum de beonica, vel etiam cera-
tum sacrum Dieta ad proportionem respondeat.*

CAPVT XXVI.

De febre Syncopali.

Febriis pituitosa, nō modo ea est, de qua iam dixi-
mus, sed etiam syncopalis, quæ & pituitosa, & in-
terdum etiam biliosa est. Sic autem vocatur, quia
syncope vel adest, vel imminet. *Febris ergo synco-
palis, est s. b. s. putrida, procedens à materia, vehementer ladente os
ventriculi. Hæc materia est pituitosa & biliosa, c. 2. 3. 4. 5. libr,*
12 meth. Materia pituitosa, est pituita copiosa, crassa, cruda,
quæ aliquando coctionem non admittit: est item succus
crudus, qui improprie pituita dicitur: & secundum Auicennā
interdum est pituita tenuis, sed raro. Causæ generantes pa-
tent e febre pituitosa. Materia biliosa est bilis flaua, dein etiā
quæ deterior, vitellina, & ruginosa, &erulea: potestque mate-
ria biliosa, tum crassa esse, tum tenuis. Causæ generantes pa-
tent e febre biliosa. Additur in definitione, materiam illam
*vehementer ladere os ventriculi, ut cor in consensum trahatur: e
vehementi enim oris ventriculi latione, spiritus modo dis-
solvuntur, modo alterantur, modo vtrumque patiuntur: vn-
de leipothymia, vel syncope oritur.*

Differentiæ sumuntur à materia: quæ est Pituita, vel Bilis:
quarum vtræque vel crassa, vel tenuis. Si materia est crassa:
dicitur *syncopalis humorosa*: quæ si fiat à pituita crassa, dicitur
exquisita exacte Si materia est tenuis: dicitur *syncopalis minu-
ta*: quæ, si fiat à bile tenui, exquisita exacte dicitur: at si fiat
pituita à tenui, nequaquam dicitur exquisita exacte.

Febris syncopalis facile cognoscitur: quia vel imminet, vel
adest leipothymia, aut syncope: ægrī noxam percipiunt se-
cundum ventriculum. Signa differentiarum, sunt signa indi-
cancia pituitam, vel bilem: de quibus suo loco dictum fuit.

*Definitio,
& causa:*

Differentia,

Signa.

Indicationes.

Indicationes sumuntur à materia, vt est alteranda, & vacuanda. Alteratio est multiplex; nam materia cruda est concoquenda: frigida pituita, calefacienda: materia bilis refrigenda: materia crassa humorosa, attenuanda: materia tenuis quæ peccat in febre syncopali minuta, crassefacienda. Et in hac febre virtus potissimum secundum spiritus custodienda.

Prognostica.

Periculosa est hæc febris: nam adest vehementia materię, & ratione essentię, quia admodum recedit à naturali statu: & ratione dignitatis, quia afficitur os ventriculi: & ratione facultatis, propter deliquium animi. Quoad syncopalem humorosam: periculosior est, quæ sit à pituita admodum copiosa. c. 3. l. 12. meth. Quod si crudus succus ea cruditate affectus sit, vt coctionem non admittat: febris hæc est mortalis: quia id quod est præter naturam, est vehementissimum, & virtus debilis. Si non sit tanta copia materię: aliqua salutis spes esse potest, quamuis hæc materia cruda non admittat coctionem: ratio est: quia, dum hæc materia summe cruda, est exigua, natura admittit alimentum: nõ autem, si sit copiosa: & præterea, materia cruda exigua, licet non admittat coctionem causa nutritionis: attamen præparationem quandam & maturationem admittit, vt possit expelli. Vnde nõ est è toto despetandum. Syncopalis vero minuta, curationem admittit. vlt. l. 12. meth. quamuis producat etiam à materia æruginea, nisi virtus sit admodum imbecillis, vel aliqua sit inflammatio in visceribus: tunc enim mors prædici potest.

Vena sectio.

Quoad materiam cheirurgicam: non conuenit venæsectio: quia adest cacoehymia, succus crudus, & virtus est debilis. In syncopali autem humorosa, probatur *frictio*, tanquã materia euacuans. cap. 3. l. 12. meth. primum frictio debet esse sicca, linteis mediocriter asperis: postea oleo relaxante, vt *anethino*, fricare oportet. Frictio statim in principio fieri debet: vacuatione enim opus est in hac febre, cuius materia est frictio: aliam enim vacuationis materiam hic vlturpare non licet. Frictio debet administrari superne deorsum, & primo fricanda crura, secundo brachia, tertio spina dorsii: deinde artus, id est brachia, crura, rursus spina, vltimo artus: à frictione ergo artuum incipiendum, & in ea desinendum. Hæc frictio in febre syncopali minuta improbat: vt testatur Galenus cap. 6. lib. 12. meth. Nõ ergo in qualibet syncopali fricare licet.

Lentitudo.

Quoad materiam medicinale: in syncopali humorosa proban

probatur lenientia, infra administrata: tutiusque est *supposito-
rius uti quam clysteribus*: è qua vero materia parentur, dictum
est in loctrina generali Lenientia autem per os exhiberi nō
possunt, quia os ventriculi non permittit.

Præparantia nō seorsim, sed vna cū cibus danda: verbi gra- *Præparā-
tia.*
tia si velimus *oxyneli* exhibere, cū *cremore hordei* exhibemus.

Purgans nequaquā dandū: permearet enim per os ventri- *Purgātia.*
li, excitaretque syncopen, si non adesset, & mortem inferret.

Roborantia ventriculū, locum habent: quorum materia, *Roborātia.*
in syncopali humorosa, *oleum de absinthio*. Non tamen illico
die, vt quidam faciunt, ventriculus est inungendus, sed præ-
cedere debent frictiones, & materiam magna è parte cōco-
ctam & euacuata esse oportet. In syncopali minuta, proba-
tur medicamentum adstringens, cap. 6. l. 12. meth. cuiusmodi
est *oleum melinum*. Ad inhibendum sudorem, qui in hac febre
copiosus esse solet: inspergere oportet puluerē, paratū è *ro-
sis*. Vnde Auicenna inungebat pectus cū *santalini* & aqua rosacea.

Quoad materiam dieteticam: in syncopali humerosa, *Dieta: in
syncopali
humerosa.*
probat aer temperatus: in minuta refrigerans & adstringens,
ac proinde alteratus *rosis, cydoniis, foliis cydoniorum, foliis myrti.*
c. 3. & 6. l. 12. meth. Quod cibum attinet: in syncopali humo-
rosa, probatur *mulsæ cum hyssopo*. Quod si æger ab hoc cibo
abhorreat, Galenus probat *cremorem hordei, cum oxymelite*.
Galenus etiam admonet, si forte pulsus fiat imbecillior: exhi-
bendum esse panem, è vino deluto, aquoso, nisi prohibeat inflam-
matio: hac enim præsentē, actum est. N B. *Mulsæ* probatur *Mulsæ.*
minus cocta, si aluus est stiptica, vel saltem non fluit immo-
derate: magis a cocta, dum aluus immodicē fluit, hæc enim
magis nutrit, & aluum non subducit. Quod si plus iusto alui
fluxus vigeat, loco *mulsæ* probatur *cremor hordei*, vel potius
cremor halicæ. Circa *oxymeli* notandum, è cap. 3. libr. 12. meth.

illud æstiuo tempore actu frigidum esse exhibendum, licet
patiens assuetus sit vtī calidis actu: contra hyeme actu cali-
dum *oxymeli* dandum est, licet consuetudo sit frigidorum *Oxymel.*
actu, vbi Galenus magis respicit, quam consuetudinem: ratio
est: quia in hac febre aer calidior rationem habet causæ mor-
bificæ, liquat enim materiam, quemadmodum aer frigidus
vim habet cogendi: dum vero aer calidior crudum humo-
rem liquat, periculum imminet, ne materia liquata, pulmo-
nes & cor petat. Cibus a, in syncopali minuta conuenit, qui *In syncopa
li minuta.*
non facile dissipatur, vt *sorbis ex halicæ mala punica, pyra,*

utelli ouorum, testiculi gallorum, cerebrum suillum, sed diligenter
assatum. Potus sit vinum aquosum, actu frigidum. Reliqua pa-
tent è doctrina generali.

CAPVT XXVII.

De febre quartana: & cognatis aliis.

Definitio.

Bilis nigra
quadru-
plex.

1.



Ebris quartana, seu melancholica, est febris putrida, pro-
cedens à bile nigra putrescente. Bilis nigra, est Me-
lancholica, Sanguinea, Cholericæ, & Pituitosa.
Nigra bilis melancholica, est Alimentalis, vel
Excrementitia. Alimentalis, est quartus succus massæ san-
guineæ, vergens ad frigidum & siccum: vt propterea sit ali-
mentum ossium, partium frigidarum, & siccicarum. Excre-
mentitia, est Naturalis, vel Præter naturam. Naturalis est
excrementum crassum hepatis, è quo producitur *quartana*
exquisita exakte. Præter naturam nigrabilis, generatur ex ali-
mentali, & ex excrementitia: si vis exurens remissa, genera-
tur excrementum, quod melancholia dicitur: si intensa, ori-
tur excrementum, quod atra bilis nuncupatur. Bilis nigra san-
guinea, fit è sanguine: eius nimirum portione vel tenuiore
vel crassiore. Si è portione tenuiore: primum fit bilis flaua,
mox atra. Si è portione crassiore: exustio vel remissa est, vel
intensa: si remissa, fit melancholia, excrementum sit intensa
fit atra bilis. Bilis nigra cholericæ fit è flaua bile, & vocatur,
atra bilis. Bilis nigra phlegmatica, ab Auicenna proposita, nõ
fit è quolibet phlegmate, sed è falso: hoc enim primum de-
generat in flauam bilem, deinde in atram, vt colligitur è cap.

Causa. 2. lib. 4. simpl. & aph. 42. sect. 7.

Causæ in hac febre concurrunt calefacientes & siccantes:
vt vel generant melancholiam, vel humores assant: & mo-
do in melancholiam mutant, si sint remissiores: modo in
atram bilem, si sint calidiores: siue hæ sint internæ, si-
ue externæ.

Differentia.

Differentiæ sumuntur à Materia, & Loco: Materia, seu bi-
lis nigra, est melancholica, sanguinea, biliosa, pituitosa. A lo-
co: materia putrescit in venis, aut extra venas: vnde febris
continua, vel intermittens.

Signa.

Febris hæc in genere facillime cognoscitur. Nam præter
periodos quadriduanas, causæ generantes melancholiam, vel
præcesserunt, vel sunt præsentis. Signa differentiarum: si fit
à mate

à materia melancholica, omnia sunt initiora: si ab atra bile, intensiora. An vero sit melancholica, sanguinea, biliosa, pituitosa: cognoscitur è signis, indicantibus dominium huius vel illius humoris.

Indicationes monstrant alterantia, & vacuantia. Alterantia modo calefaciunt & humectant, si materia sit melancholica: modo refrigerant & humectant, si materia sit bilis atra. Cum autem qualibet materia, siue melancholica, siue bilis atra, sit crassa: semper etiam oportet attenuare. Indicationes.

Prognostica variant pro vi differentiarum. Quoad differentias igitur à materia: salubris est febris, si materia sit melancholica: nam vehementia essentia est remissa. t. 4. f. 3. lib. 1. epid. Si materia sit atrabilaria, febris est admodum periculosa: quia maxima essentia vehementia. Quoniam vero materia melancholica est crassa, in causa est longitudinis: unde quartana per annos durare potest. Quoad differentias à loco: intermittens non est periculosa ratione dignitatis loci: continua contra, non loquor hic de vehementia febris, sed causa: alias enim ratione febris, quartana etiam intermittens, satis periculosa esse potest. Prognostica.

Venæ sectio probatur in quartana continua, in intermittente exquisita exacte (secundum Galen. lib. 1. ad Glauc. cap. de cura quartanæ exquisitæ exacte) in melancholica sanguinea. Non autem ita probatur venæ sectio in quartana phlegmatica, & minus in biliosa, nam coxymia potius viget. Notandum vero (& hoc potiss. in intermittente exquisita exacte) tum deum venam aperiendam esse, cum sanguis melancholicus reperitur in venis pertinentibus ad totum corpus: si enim biliosus sanguis, in venis totius corporis residet, melancholicus vero in venis circa hepar: venam nequaquam tundenda. Hoc vero ut cognoscamus, post venam sectam observare debemus, quisnam sanguis effluat: si egrediatur niger & melancholicus, permittamus effluere: si flavus egrediatur, statim suppressere oportet: indicat enim sanguinem melancholicum non residere in venis totius: unde per venam sectam copia eius non minueretur, sed eius vires potius intenderentur, detracto humore contrario. De administratione venæ sectionis, & de apertione venarum hæmorrhoidalium, in generali doctrina dictum.

Medicamentum leniens, in quartana melancholica non atrabilaria: ℞. elect. lenissimi ℥x. manna el. ʒij. cum sacch. fiant boli. Lenientia.

Si febris

Si febris melancholica sanguinea: *R. flor. cass. non. exp. elect. lenit. ana ʒv. manna el. ʒij. cum sacch. fiant boli.* Notandum in prior formula, cassiam non proponi, quia in quartana non sanguinea, color tam insignis non est, vt in sanguinea, in qua cassiæ flor. refrigerantes misceri debent. In quartana pituitosa. *R. flo. cass. non. tr. ʒj. specierum hieræ ʒj ʒ. manna el. ʒij. cum saccharo fiant boli.* Hic species hieræ respiciunt superfluitatē pituitosam, quæ habent rationem materiæ antecedentis: cassia est corrigens, quia materia pituitosa putrescens, versa est in atram bilem, valde calidam. Potio in eadem, *R. mel. ros. sol. ʒiij. mell. viol. sol. ʒij ʒ. iuris, alterati boragine, parum, fiat potio brevis.* In quartana biliosa, *R. flor. cass. non. ext. ʒx. manna el. ʒij. cum saccharo fiant boli.* Species hieræ non additur, neque electarium lenitiuum, propter feruorem materiæ biliolæ, & atrabilariæ. Potio in eadem, *R. syr. viol. sol. manna el. ana ʒij ʒ. decocti endiuie, boraginis, parum: fiat potio brevis.*

*Prepara-
tanta.*

Præparans in quartana melancholica, *R. syr. de borag. de liquiritia, de lupulis, ana ʒj ʒ. decocti borag. melissæ, ceterach ʒiij. Mis. pro syrupo.* In quartana pituitosa, *R. oxymelitis simplicis, syr. de succo buglossæ ana ʒj. decocti beton. melissæ, borag. ʒiij. Mis. pro syrupo.* Hic betonica & oxymeli proponuntur propter pituitam, in priori recepta non proponuntur: quia illa respicit febrem quartanam melancholicam. In quartana biliosa, *R. f. violatæ, syr. de pomis simpl. ana ʒvj. decocti bord. endiu. lactuca (non utimur betonica) ʒiij. Mis. pro syrupo.* Hic violis, hordeo, lactuca utimur, quia materia est atra bilis, humor calidus & siccus.

*Vacuans
sensibili-
ter.*

Purgans, seu vacuans medicamentum Sensibiliter, vel Insensibiliter. Vacuans sensibiliter, in quartana melancholica, *R. corticum radicum hellebori nigri ʒiij. feniculi, cinamomi (correctionis gratia ana ʒv. fiat infusio in decocto ceterach, & cichor. cum ʒij. fol. sene. & ʒj. passul. dulcium & facta diligenti expressione, adde manna el. syrup. do polypodio ana ʒij ʒ. Mis. & fiat potio brevis.* Bolus in eadem, *R. elect. lenitini ʒij ʒ. conf. Hammech. manna el. ana ʒij. Mis. & cum saccharo fiant boli.* Albo vero non utimur: quia nimis est periculosum medicamentum. In quartana pituitosa, *R. agar. tro. h. ʒiij. fiat infusio in decocto beton. cum ʒiij. fol. sene. & ʒj. passul. & facta diligenti expressione, adde mellis ros. sol. ʒiij. Mis. & fiat potio.* Vel, *R. agar. troch. ʒj. electarij len. ʒvii. manna el. ʒij. cum saccharo fiant boli.* In quartana biliosa, *Recipe rhab. electi ʒiij. fiat infusio in decoctione*

coctione endiuizæ, cum ꝑijß. fol. sena, & xj. passul. & facta diligenti expressione, adde manna el. syrups de polyp. ana ꝑijß. Mis. & fiat potio brevis: cui patiens superbibat tt ijß. feri lactis caprini, optimè depurati: & hoc ob febrem immensam, cuius materia atrabilaria: & ob iecur calidius. Bolus in eadem. Reciper pul. rhab. el. xj. (ratione bilis) confectiois Hamech (ratione atrae bilis) ꝑij. flor. cassia zvi. (vt attemperetur medicamentorum propositorum caliditas) manna el. ꝑij. cum saccharo fiant boli. Cum autem febris valde sit calida, non sufficit cassiam adiciere, sed prodest etiam, vt patiens superbibat tt ijß. feri.

Medicamentum vacuans insensibiliter, est calidum, sic cum, tenuis substantiæ, cuiusmodi est diatrionpiperon, diaspersion, quod fit è pipere, ruta, cymino & nitro. Huius classis est medicamentum, quod conficitur è feniculo, petroselino, & similibus, quorum forma est exiguæ actiuitatis ad differentiam magnarum antidotorum, quarum forma est magnæ actiuitatis.

Vacuantia
insensibiliter.

Notandum autem hæc medicamenta insensibiliter vacuantia, in quartana atrabilaria nequaquam vsurpari debere: Galenus enim ea proponit in melancholica exquisita. Præterea dum hæc medicamenta administrantur, oportet miscere boraginem, buglossam, &c. Vt, Recipe diatrionpiperon ꝑij. deinde de patiens superbibat decocti borag. vel buglossæ, vel cich. ad ꝑij. Quod si febris melancholica (non atrabilaria) sit contumax, vt sæpe fit, probatur radix china cum boragine decocta: patiens autem dum hoc decoctum assumunt, sudare debent.

At vtero hic notandum, medicamenta magnæ actiuitatis secundum formam, vt est Theriaca, & Mithridatium, non probari, nisi post concoctionem materiæ, & aliquam etiam materiæ euacuationem, quod de reliquis non est statuendum, verbi gratia, possumus vt diatrionpiper, &c. & aliis, quorum forma non est magnæ actiuitatis, ante theriacam, & mithridatium: vnde Galenus magnas antidotos tam cito exhiberi prohibet, ne è quartana simplici, fiat duplex, vel triplex: ex intermittente, continua: ne augeantur obstructions, febresque intendantur: quando scilicet ob summam actiuitatem, materia cum impetu plus iusto agitur.

De theriaca, & mithridatio.

Alterantia.

Medicamenta alterantia duorum sunt generum. I. Calefacientia, ratione ventriculi generantis pituitam: & ratione lienis, qui frigidityte affectus excrementum melancholicum exacte nec suscipit, nec regere potest: probantur igitur in quarta

quartana melancholica & pituitosa. E. G. *Recipe conserva ton. dianth. sacch. borag. ana ℥ss. Mis. pro tribus vi. ibus.* II. Refrigerantia, causâ iecinoris calidioris, quæ probantur in quartana biliosa & atrabilaria, verbi gratia, *Recipe sacchari violati ℥ss & eger super bibas it j. feri: vel ℥ss. aqua hordeacea, alterata endiuâ, & quandoque lactuca.*

Dietâ medicamentis proportionem respondere debet. Vitæ igitur erit mediocris, quia longa est quartana. Cæterum, modo debet esse cal faciens, ut in quartana melancholica, & pituitosa: modo refrigerans, ut in biliosa. Vinum probatur in melancholica & pituitosa: non in biliosa & atrabilaria. Reliqua patent.

*Quartanis
affines.*

De Febribus Quintanis, Sextanis, Septimanis, Nonanis.

Febres quintanæ, sextanæ, septimanæ, & nonanæ, referuntur ad quartanam melancholicam, eandemque admittunt curationem. Notandum autem quintanam fieri atrabile: reliquas non ab atra, sed à materia melancholica: unde quintana febris, deterior est, & maxime periculosa, quoniam maior est vehementia essentia. com. 2 7.9. sect. 3. lib. 1. epid.

CAPVT XXVIII.

De febribus Hæcticis.

Nomen.

Definitio.

*Non omnis
hæctica est
morbus calidus in
habitu.*



Athenus de febribus putridis egimus: sequuntur Hæctica: Hæctica a febris, secundum Gal. cap. 7. lib. de diff. febr. dicitur, quia habitum corporis ita comprehendit, ut si progrediatur, ad differentiam reliquarum febrium, euadat morbus in habitum. *Hæctica igitur est febris, producta à primaria accessione solidorum cordis, circa venositatem.* Hæc definitio est explicanda, è cap. 1. hæctica est & 9. lib. 1. de diff. febr. Quatenus igitur hæctica dicitur, febris morbus calidus in habitu, necesse est, ut sit morbus calidus in toto, & in facto esse, qui tamen modo est in habitu, modo in habitudine. Errant igitur vehementer, qui credunt omnem hæcticam esse morbum calidum in habitu: nam morbus in habitu, ad differentiam morbi in habitudine, semper est difficilis curatur: at datur hæctica, quæ inter initia facile curatur. Ergo etiam datur

tur

tur hectica in habitudine. Additur in finitione : *producta à Differentia primaria accensione solida substantia cordis* : ad differentiam *hectica, ephemeræ, quæ sit à primaria accensione spirituum* : & *putrida, quæ producitur à primaria accensione humorum* : at *putrida.* in hectica cordis actiones læduntur, læsa facultate : in ephemeræ & putrida tantum ob errorem externum. Hic morbus calidus in corde, modo est in habitudine, modo in habitu : si est in habitudine : virtus cordis nondum patitur, quia hoc tempore substantia virtutis cordis nondum est imminuta, sed solum calefacta : unde etiam facilis est curationis. Per *primariæ accensionem*, intelligimus principalem, non primam in tempore. Nam cor modo primo afficitur, vt si hectica fiat ex ira : modo cor non primo afficitur, vt si fiat hectica ex inflammatione ventriculi, pulmonisve vlcere, cap. 8. lib. 10. meth. Quia ergo primata accensio non semper ad cor spectat, principalis autem semper : ideo hæc in finitione proposita est.

Causæ, quæ efficiunt principalem illam accensionem, sunt calefacientes, & exsiccantes, sed *citra venenositatem* (*ad differentiam febris pestilentis, quæ etiam est morbus in corde, sed producitur à causa venenosa.*) Causa igitur hæc calefaciens & siccans, citra venenositatem, est Interna, vel Externa. Interna, est soboles, seu effectus morbi Communis, vel Determinati. Communis morbi soboles est, nimirum febris, siue hæc sit ephemeræ hecticam produciens, siue putrida diuturna, & potissimum febris ardens. Est autem effectus morbi determinati, verbi gratia empyematis, vlceris pulmonis, inflammationis diuturnæ plerarumque partium, vt ventriculi, intestini, coli, renum, &c. Præterea alui fluxus in causa esse potest, maxime si febrem habeat annexam. Externæ causæ, sunt medicamenta calefacientia & siccantia, plus iusto vacantiæ viuendi ratio similis : Ira etiam non infimum locum obtrinet.

Explicandum iam est, quomodo principalis accensio, id est, calor febrilis, agat, tum in partes similes extra cor. Sciendum igitur, è cap. 6. lib. 7. meth. & cap. vlt. lib. 10. meth. humiditates partium similarium, extra venas existere, ad differentiam quartæ humiditatis ; quæ resistet in venis calidis roridis pillaribus. Hæc partium similarium humiditas : extra venas existens, in duplici est differentia : nam vel Mutatur, vel Non mutatur. Humiditas quæ mutatur, est humiditas rorida,

rorida, quæ conuerti & mutari potest in alias humiditates. Humiditas, quæ non mutatur, vel est Sanguinea, vel Spermatrica. Sanguinea, est humiditas adiposa, seu carnosa. Seminalis, est humiditas radicalis, quæ conseruat vitæ radicem, scilicet calidum primogenitum. In has ergo tres humiditates, quæ & in corde, & extra cor reperiuntur, agit calor febris hecticæ. Quoad cor: calor febrilis primum agit, in humiditatem cordis roridam, eamque feruidam, seu efferuescentem reddit: deinde eandem incipit consumere: postremo eam prorsus absumit. cap. 9. libro primo, de differ. febr. At extra cor (quoniam ultimum quod siccatur, est cor) primum, dum calor febrilis humiditatem roridam cordis feruidam reddit: hoc eodem tempore consumit humiditatem roridam partium similariū extra cor: postea, cum calor febrilis incipit absumere humiditatem roridam cordis: hoc eodem tempore absumi humiditatem carnosam extra cor: postremo, dum febrili calore, cordis rorida humiditas consumpta est, iam consumitur radicalis humiditas, non corde, sed extra cor.

Differentia.

Differentiæ capiendæ sunt à Calore cordis, ab Humiditate, & Causis efficientibus. A calore: vt est in Habitudine, vel Habitu. Ad humiditate: vt cordis humiditas rorida, vel Effervesceat, vel Incipit absumi: vel Consumpta est, vt in marasmo, siue hectica tabida. A causis: vt causæ sunt Internæ vel Externæ: item, causæ sunt Morbi, vel Non morbi: vnde datur hectica incipiens, & non incipiens, vt Galen. testatur, cap. 8. lib. 1. de diff. febr.

1. Signa generalia.

Hectica febris in genere cognoscitur, è calore mordaci, quia calor febrilis solidas partes afficit: vt hic calor potissimum sentiatur in corpore arteriæ, etiam post balneum: c. 9. lib. 1. de diff. febr. Calor etiam debilis est: nam hectica est parua ratione essentia, quoniam solida (ad differentiam humorum) eundem statum seruant, & in corde, & extra, lib. 3. de prælag.

2.

è puls. Tum etiam calor est æqualis: quia non adest materia, quæ accendatur, nec spiritus accenduntur, sed solida, quæ æqualiter afficiuntur, licet primo in habitudine, deinde in habitu. Præterea hectica in genere cognoscitur, quod caliditas pertinet ad cor, per vnam vel alteram horam à cibo augetur & intenditur: idque hac ratione: nam propter calorem febrilem in corde, rorida humiditas effervesceat, & procedente febre incipit etiam absumi: ob hanc igitur necessitatem,

3.

è puls. Tum etiam calor est æqualis: quia non adest materia, quæ accendatur, nec spiritus accenduntur, sed solida, quæ æqualiter afficiuntur, licet primo in habitudine, deinde in habitu. Præterea hectica in genere cognoscitur, quod caliditas pertinet ad cor, per vnam vel alteram horam à cibo augetur & intenditur: idque hac ratione: nam propter calorem febrilem in corde, rorida humiditas effervesceat, & procedente febre incipit etiam absumi: ob hanc igitur necessitatem,

4.

è puls. Tum etiam calor est æqualis: quia non adest materia, quæ accendatur, nec spiritus accenduntur, sed solida, quæ æqualiter afficiuntur, licet primo in habitudine, deinde in habitu. Præterea hectica in genere cognoscitur, quod caliditas pertinet ad cor, per vnam vel alteram horam à cibo augetur & intenditur: idque hac ratione: nam propter calorem febrilem in corde, rorida humiditas effervesceat, & procedente febre incipit etiam absumi: ob hanc igitur necessitatem,

sitatem,

fiatē, dum cibus est assumptus, portio liquidior & tenuior, antequam totus cibus in iecur distribuatur, perducitur in cor, ad restaurandum id quod absumitur, vnde calor cordis augetur, vt calor fiat inæqualis, & per consequens fit sensus caliditatis (*vbi enim inæqualitas, ibi sensus caliditatis*) alias autem hectici calorem febrilē non sentiunt, ob caloris æqualitatem: c. 5. li. 1. de inæq. intempe. Insupet hæc febris cognoscitur, si causæ febris hecticæ, vel præcesserunt, vel præsentēs sunt: vt si vlcus est in pulmone, &c. Hectica igitur in genere facile cognoscitur, etiam in principio: falsumque illud vulgatum est axioma, hecticam in principio facilis esse curationis, sed difficilis cognitionis: nec enim hæc Galeni est sententia, cap. 9. lib. 1. de diff. febr. vbi statuit hecticam, cui putrida annexa est, difficulter cognosci in principio: eam vero quæ sola est, facilis esse cognitionis. *Signa differentiarum:* &

1. *primum à calore:* Si calor sit in habitudine: præsentia sunt signa ephemerarum, cap. 9. lib. 1. de diff. febr. quare pulsus non est debilis (*vt male quidam volunt, hecticam indicari ex pulsu debili: hoc non est verum in principio, dum calor est in habitudine*) quia scilicet virtus nondum aliquid est passa: febrem hectici tunc sentiunt aliquo modo: sed vix. Si autem calor sit in habitu: ægri non sentiunt febrem (secundum Auerr. comm. 33. lib. 4. collect.) & pulsus habent debilem, quia scilicet virtus à calore in habitu maxime patitur. Secundo, *signa differentiarum ab humiditate.* Si torida humiditas efferuescat: sunt signa, quæ diximus iam comitari calorem in habitudine: si torida cordis humiditas incipiat absumi: tunc pulsus est debilis, & calor magis mordax, corpus emaciari incipit, quia iam extra cor consumitur humiditas sanguinea, id est adiposa, seu, carnosa. Si denique torida cordis humiditas sit consumpta: pulsus non modo debilis est, sed etiam durus, ob siccitatem: & æger nil nisi ossa & cutis esse videtur. Tertio, *signa differentiarum à causis:* num hectica sit incipiens, vel ex aliis morbis orta: cognoscitur è propriis signis: Exempli gratia: si corpus donatum sit calido & sicco temperamento, & febris ardens prægressa fuerit: facile cognoscimus, præsentem febrem esse hecticam, quæ ex ardente febre duxerit originem.

Indicationes per se sumuntur à febre, & virtute: febris indicat refrigerantia & humectantia: virtus indicat alimentum. Ex accidenti autem interdum capiendæ sunt indicatio-

5.
Hectica etiam ab initio facile cognoscitur.

1.
Signa differentiarum.

2.

3.

Indicationes.

nes à materia, quæ impedimento esse potest, quo minus & febris, & virtuti occurrere possimus: hæc autem sunt corporis excrementa, quæ ob id sui euacuationem indicant.

Prognostica.

Prognostica variant ratione differentiæ: Iccirco quoad differentias à calore: hectica in habitudine facile curatur, quia non adest vehementia ratione facultatis: in habitu, contra. Quoad differentias ab humiditate cordis torida: si hæc humiditas tantum effervescat, febris facile curatur: si incipiat absumi, cum difficultate tollitur: si sit consumpta, è toto curari nequit: cum enim hæc febris sit morbus calidus & siccus, curari potest ut morbus calidus, non autem potest curari ut siccus: dum enim partium humiditas radicalis seu seminalis consumitur, usque adeo labefactata est illarum partium facultas alteratrix, ut nullo pacto semen possit regenerari, quod sufficiat ad reparandum humiditatem seminalem deperditam. Quoad differentias à causis: si hectica fiat ab ulcere pulmonis, est incurabilis, etiam in principio, id est, quando calor est in habitudine, seu quando solum effervescit humiditas: causa enim incurabilis est, nimirum vlcus pulmonis.

Venesectio.

Quoad materiam cheirurgicam: venæ sectio non probatur in hac febre: quia potius defectus est sanguinis.

Lenientia.

Medicamenta interdum probantur, dum scilicet excrementa in corpore redundant: cæterum sint lenientia, non purgantia: quæ cum acria sint, calefaciunt & siccant, ideoque faciunt ut habitudo in habitum transeat. Vti ergo possumus *castis, mannæ, syr. ros sol. species hieræ* vitandæ sunt. Proposita autem medicamenta, si administrantur in potione, cum iure dissolui debent. Clysteres similiter parentur ex oleo & iure. Præparantia hic locum non habent, nec purgantia: quia febris est immaterialis. Si gratia vacuationis medicamentum sit reperendum, id semper leniens erit, nunquam soluens.

Alterantia inter-
na.

Alterans usurpatur Intus, & Extra. Intus: si corpus biliosum sit, dulcia sunt fugienda, quia bilescunt, Si corpus non sit biliosum: probatur *saccharum rosaceum*, quia refrigerat & humectat. Cæterum in quolibet corpore hectica laborante, siue biliosum sit, siue non biliosum, probatur *decoctum bordei, lactuca*: probatur tñ *seri* optime depurati, cum succo lactucæ. Præterea etiam probatur *frigida* ad tñ *ij.* dum febris est in habitudine, vel dum incipit esse in habitu, ut immineat maras-

mus:

mus: non ergo differenda est exhibitio frigida: nam quo citius exhibetur, eo magis efficax est, ad expugnandum febrem, & virtus est robustior, & proinde magis permittens. Alterans, quod extra administratur, potest esse *balneum aquæ dulcis*: quoad primo tepidum est administrandum, deinde frigidum, ita vt ne sudent ægri: vtinur enim balneo, non vt vacuante, sed vt alterante, id est, refrigerante & humectante. Vt vero alimentum, balnei beneficio attractum, non dissipetur: præter balneum frigida, probatur etiam *inunctio*, quæ fiat secundum artus, & secundum thoracem. Secundum artus, licet corpus inungere oleo amygdalino, violaceo & vino subdulci, vel posca aquosa, quæ ad penetrationem largitur, & refrigerat atque humectat. Sic ergo possumus præscribere: *℞ ol. amygd. dulc. violacei, ana ʒ ss. posca aquosa ʒ ij. Misc.* Ne autem inunctione ægri lædantur, oportet pharmacopœia iniungere, vt oleum amygd. sine igne conficiat, si modo humectare debet. Ad thoracem hoc probatur: *℞ ol. violacei, succi lactucae ana ʒ ss. causa penetrationis, posca diluta, vel acetositas citri ʒ j. Misc.* Probatur etiam *infrigidans Galeni*, maxime in principio, dum torida humiditas efferuescit. Quare non expectandum, vt progrediatur malum: sed tempestiue occurrendum.

Quantum ad dietam: aer sit frigidus & humidus. Cibus *Dietæ* sit augens, non minuens: quia deficit alimentum: præterea sit optimi succi, facili concoctionis & distributionis: itemque sit refrigerans ac humectans. Optimæ igitur carnes, & reliqua proba cibaria condienda sunt *seminibus melonum, cucurbitæ, lactuca, boragine*. Probatur *lac optimum, ut est humanum, Lac.* deinde *asininum, & caprillum*: nisi assit prohibens, pimirum materia febris putridæ, materia catarrhi frigidi, materia catarrhi copiosi, dolor capitis, materia tendens hypochondria: quibus præsentibus, lac cum maximo detrimento datur. Quod si æger frigidum habeat ventriculum lacti miscere possumus $\frac{1}{2}$ vel $\frac{1}{4}$ *saccharis si exhibentur lactus ʒ j ss. permisceatur sacchari ʒ j.* Quod lactis *vsus*. Exhiberi potest ab ʒ ij. vsq; ad ʒ x. quæ dosi non excedenda: c. 10. l. 10. Quoad modum: lac exhibendum actu calidum. *Tempus exhibendi*, est ante somnum, & ante cibum: cibus dari non debet, nisi lac prius sit concoctum. Potius contra plerosque præcticos, non erit *vinum*, hoc enim *habitudinem in habitum mutat*: vnde & Galenus

cap. vlt. lib. de marcor. vinum improbat, in hectica tabida. In marasmo quidem syncoposo probat: sed id tantum propter resolutionem spirituum, vinum enim celerrime reficere potest spiritus, qui sane cito egent refectione. Hæc ergo de hecticis,

CAPVT XXIX.

*De Febris Pestifera Definitione, Causis,
Differentiis, Signis.*

Nomen,



Definitio,

Er febrem Pestilentem intelligimus febrē quæ cito potest interficere: & intelligimus febrem contagiosam, siue fiat ex aëre, siue ex aliis causis, quomodocunque. Sic ergo accepta, nihil aliud est, quam *febris, producta à veneno calido putrefactius*. Cum dicimus, quid sit *febris*: febrem pestilentem à peste distinguimus, quæ interdum esse potest sine febre, dum vitium partes exteriores afficit, nec cordi communicatur: vt colligitur è balneo, aph. 3. & 57. sect. 3. lib. 3. epidem. & lib. 9. simpl. cap. de bol. Arm. Dicimus, *producta a veneno*: ad differentiam reliquarum febrium, quæ non sunt pestilentes. Addimus, *à veneno calido*: ad discrimen morbi venefici frigidi. Tandem adiungimus, *putrefactius*: ad differentiam morbi venefici calidi, non putrefactiui, vt contingere solet vi arsenici.

*In pestilenti
febre esse
venenum
calidū &
putrefa-
ctiuum.*

Iam vero confirmandum ratione & auctoritate, in febre pestilenti, esse venenum calidum & putrefactiuum. Ratio. *Venenum* est, quod, licet copiosum non sit, cito tamen potest interficere: at talis est materia febris pestilentis. Ergo est venenum, *calidum* autem est hoc venenū, quia habet effectum calidum, scilicet febrem. Est etiam *putrefactiuum*, quia producit febrem putridam & contagiosam. Auctoritate quoque hæc confirmantur. Quod sit *venenum*, testatur Gal. comm. 4. lib. 2. de nat. hum. vbi dicit, in euaporationibus quandoque affici corpora, potius substantiæ proprietate, quam nuda qualitate; innuens, vehementem formæ actiuitatē, & proinde vim veneficam. Hoc venenum esse *calidum*, idem statuit, aph. 29. sect. 1. li. 1. epidem. c. 11. ait, in febre pestilenti interiora exuri. Venenum hoc esse *putrefactiuum*, fatetur Gal. c. 5. li. 1. de diff. febr. vbi ait, omnē febrem pestilentē fieri à putredine.

*Quomodo
venenum*

Intelligendum autem est, *quomodo iam dictum venenum concurrat ad producendum febrem pestilentem*. Concurrit ergo quatenus

quatenus vehementer agit in cor: obrinet enim formā magnæ actiuitatis: vt; licet instrumentum, id est, calor non sit cor agat. *pestilent in cor agat.*

vehemens, nihilominus vehemens noxa imprimatur. Quoniam autem cor constat spiritibus, humoribus, & solidis: videndum, quidnam hæc tria à pestifero veneno patiantur.

Spiritus in genere affici possunt, secundum substantiam, vel qualitatem, c. 5. l. 12. meth. secundum substantiam, dum corumpuntur, quoniam nimis vel diffunduntur, vel concentrantur: secundum qualitatem, dum alterantur, id est, incallescunt, aut refrigerantur, id quod fit ab alterante, cuius forma est magnæ, vel exiguæ actiuitatis. Cæterum spiritus putrescere non possunt: nam, vt aliquid putrescat, oportet continens esse calidius: vnde ignis non putrescit, quia igne nihil calidius: deinde requiritur etiā, vt id, quod debet putrescere, euadat impurum: vnde aer, aqua, terra, non putrescunt, nisi secundum partem euadant impura: at spiritus cordis vitales, non admittunt impuritatem, id est, humiditatem putredinis capacem: putrescere igitur nequeunt. Quamobrem statuendum, venenum pestilens ita agere in spiritus vitales, vt eos vehementer calefaciat, vnde calidum cordis innatum redditur igneū, & hoc deinde primum in spiritus agens, ephemeram producit pestilentem, quæ putrida etiam est, sed non formaliter, verum ratione causæ efficientis, quatenus à veneno putrefactiuo producit. Notandum vero hanc febrem necessario degenerare in putridam vel hecticam: quia venenum, non solum in spiritus, sed etiam in humores ac solida agit: qua de causa Galenus non meminit febris ephemerae pestilentis. Quoad humores cordis: hi vel tantum à veneno calefiunt, dum scilicet humores extra cor putrescunt, & ab his vapores prodeunt, qui cordis humores tantum in calefacto esse possunt, sed non putrefaciunt: vel simul etiam putrescunt, dum nimirum insignis est vis veneni, & potissimum dum inspiratur, nam ilico perducitur in cor, vt humores cordis & calefiant & putrescant. *Solida vero cordis* ab hoc veneno semper afficiuntur intemperie calida morbosa (ad diffinitionem febris putridæ non pestilentis, quæ licet ardens sit, solida tamen non afficit dyscrasia calida morbosa, vt pestilens) quod Gale. docet, cap. 3. lib. 3. de prælag. è puls. ratioque est: quoniam venenum formam habet magnæ actiuitatis, ita vt efficaciter agat, & solidam quoque cordis substantiam morbo afficiat: qui tamē morbus calidus, nō semper est in habitu: sed primo

*Spiritus
vt afficiā-
tur in fe-
bre pesti-
fera.*

N.B.

*Humores
vt afficiā-
tur à ve-
neno pest.*

*Solida, vt
afficiātur
à veneno
pest.*

etiam in habitudine esse potest: hinc ergo pestiles hectica oritur. Notandum vero solida cordis caleheri quidem, non autem putrescere: quia sic vita stare non posset. c. 2. l. 3. de loc. aff. Ad hæc tria respiciens Auicennas, ait, aerem pestilentem corrumpere complexionem spiritus cordis, id est, calefacere spiritus: deinde putrefacere, quod circumdat spiritum, id est, humores; tertio accendere calorem præter naturam, scilicet in solidis: quarto, hunc calorem diffundi in corpus, id est, excitari febrem.

c. 1. traß. 4.
sen. 1. l. 4.

Causa ve-
neni pesti-
feri.

1. Externa.

1.

3.

2.

Porro de origine veneni pestilentis agendum: de qua Gal. c. 3. & 4. lib. 1. de diff. feb. & ab initio l. 1. epid. & c. 3. l. 3. de præfag. è pulsu. Venenum ergo pestilens, vel Extrinsecus accedit, vel In corpore generatur. *Extrinsècus* accedit, aer, cibus, potus, seminarium contagij, & venenum putrefactiuum. *Aer pestilens*, est causa febris pestilentis exquisitæ, non omnis febris pestilentis, vt multi credunt. Aer autem euadit pestilens, dum mutatur, non secundum qualitatem solum, sed secundum substantiam, vt vel suscipiat vaporem veneficum, vel putrefcat. Vaporem veneficum quilibet aer suscipere potest, calidus, humidus, frigidus, siccus. Putrescit autem non quiuis aer, sed tantum calidus, ac humidus: vt ait Gal. ab initio lib. 1. epid. & ab init. sect. 3. l. 3. epid. Cæterum inficitur aer, à causis Infernis, vel Supernis. Ab infernis causis infectus aer, est Conclusus, vel Liber. Conclusus, vt aer carcerum, sepulchrorum, putei diu occlusi. Si liber sit aer, venti vel Dominantur: vel Non dominantur. Si dominantur venti: hi vel Ferunt venenum pestilens, vel Non ferunt. Deferre possunt, venti quilibet, non tantum austrini. Si venti venenum non secum vehunt, sed alio modo excitant, tantum sunt australes: quia hi aerem calidiorem & humidiorē reddere possunt. Si venti nō dominantur, tunc vapor pestilens, quem aer suscipit, prodit à propinquis, nimirum ab Elementis, vel Mistis. Ab elementis: vt cū putrescit aqua proxima, vel terra: omnia enim elementa secundum partem possunt putrescere, excepto igne. A mistis: v. g. à cadaueribus non combustis, à pannis pestilentibus veneno infectis. Hæ sunt causæ infernæ. Supernæ causæ, aerem inficientes, sunt certi siderum aspectus: quorum causa certo tempore aer humectatur, & putrescit. Quoad cibum, & potum: producitur febris pestilens, dum cibi putrescunt, dum aqua est putrida quæ bibitur, vt contingere solet tempore caritatis annorū, & in præliis. *Seminarium pestilens*, est mate-

ria

fia quædam pannis in hærens, inuisibilis: sunt autem reliquæ
 misti intigniter putrefacti: & est potius situs, quam terra, aut
 fimus. Tale fuit seminarium, quod vixit Venetiis, locisque
 proximis, & in hac etiam ciuitate, ante decennium: *Ve-*
nenum calidum putrefactum, vel inspiratur, agitque per vapo-
 rem: ideoque primum in cor agit: vel cum esculentis ingre-
 ditur, & primum agit in ventriculum, hepar, venas, deinde
 in cor. Quodnam autem hoc sit venenum, impium est do-
 cere: ideo non exspectabitis. Hactenus de veneno, quod ex-
 trinsecus accedit. Illud quod *in corpore gignitur*, nihil aliud est,
 quam excrementum veneficum: de cuius generatione in
 doctrina venenorum agemus. Notandum vero hoc excre-
 mentum non totum esse veneficum, sed habere etiam
 portionem aliquam excrementitiâ non veneficâ: se-
 cundum veneficâ tamen portionem agere, calefacien-
 do & putrescendo succos vicinos, tum excrementitios,
 tum alimentales modo extra cor, modo in corde: vnde fe-
 bris oritur pestilens.

Differentiæ sumuntur à Febre, & à Veneno. A febre: pe-
 stilens febris est vel Putrida, vel Hæctica: ephemera omitti-
 tur, quia necessario statim in putridam, vel hæcticam dege-
 nerat. Differentiæ à veneno, sumuntur tum ab eius Specie:
 tum à Causa efficiente. A specie est, aer, cibus, potus, semina-
 rium, venenum externum, excrementum in corpore. Ab ef-
 ficiēte: vt venenū generatur vel extra corpus, vel in corpore.

Signa alia sunt febris pestiferæ imminētis, alia præsen-
 tis. Signa febris imminētis, sumuntur è corporis dispositione,
 & præsentia causarum. Si enim corpus sit impurum, aut im-
 becille ex aliqua euacuatione, facile inficitur tempore pe-
 stilentie. Quomodo autem cognoscantur præsentis cau-
 sæ, infra docebimus.

Præsens autem febris, in genere indicatur, si causæ sunt
 præsentis, & homo febricitat, & virtus robur non seruat:
 quoniam cor morbo afficiatur calido, quo nec in ephemeris,
 nec in putridis non pestilentialibus afficitur.

Signa differentiarum à febre. Putrida pestilentis signa pro-
 ponit Gal. c. 1. l. de cibis boni & mali succi. c. 3. & 4. l. 3 de præf.
 e pul. c. 8 l. de inæq. intemp. aph. 48. sect. 4. & aph. 37. sect. 3. l. 1.
 epid. & aph. 29. sect. 1. l. 6. epid. & l. 9. simpl. c. de terra Samia. &
 cap. 4. l. de atra bile. Ea autem sunt: delirium, sitis, sensus in-
 ignis feruoris, vt æger intus vri videatur: venenum enim

calidum, vapores mittit in caput, vnde delirium: in os ventriculi: vnde sitis: in viscera, vnde vri videntur. Indicatur etiam febris putrida, ex anhelitu magno & frequenti: nam succi vehementer putrescunt. Item ex impotentia quiescendi: vnde loco consistere non possunt: quia materia pestilens turbat partes musculosas. Indicatur etiam è vigiliis: è pulsu plerunque frequenti & paruo, quia virtus plerunque est debilis: è excrementis, cum foetore, & colliquatione, foetoris causa est summa putredo: colliquationis causa est calor intensus. præsertim quatenus instrumentum est formæ magnæ actiuitatis. Non semper autem quæ excernuntur, sunt cum foetore & colliquatione: sed dum alius est lubrica. Adest etiam tepiditas extremorum: nam intro calor refugit: adsunt vibices, & maculæ citra tumorem, pustulæ, carbunculi, bubones, parotides, tumores circa axillas, vlcera maligna, & potissimum oris inflammatio, ob euaporationem. *Hæctica* indicatur ex anhelitu foetido: nam in hæctica pestilenti cordis facultas ita succumbit, vt succos regere nequeat: quare putrescunt. Indicatur etiam è pulsu debili: nam in hæctica pestilenti, morbus celerrime, & necessario est in habitu, non in habitudine tantum. Pulsus autem secundum velocitatem & frequentiam non multum mutatur, in hæctica pestilenti, quæ fit ab initio: non in omni: in tali enim hæctica, cordis contenta sunt frigidiora, & continentia calidiora, vt propterea in pestilentiali constitutione, continentia, tanquam magis disposita, primum accendantur, fiatque potius febris hæctica, quam putrida. cap. 3. libr. 3. de præf. è pulf. hinc ratione contentorum cordis, quæ, quod frigidiora sint continentibus, primo non afficiuntur, pulsus deberet esse rarus & tardus: ratione autem continentium, quæ calidiora sunt, deberet esse velox & frequens: proinde medius est inter rarum & frequentem, interque tardum & velocem, vt hac ratione similis videatur pulsui sanorum: differt autem quod medius non sit secundum debilitatem & vehementiam, secundum paruitatem & magnitudinem: est enim debilis & paruus, quia maxime languet facultas. Indicatur etiam hæctica, quod æger febrem non sentit: præterea lotium non mutatur, quia vitium non est in succis: calor etiam in hac febre est acris, sed debilis, & æqualis: vt supra quoque de febre hæctica retulimus.

Signa specierum veneni.

Signa differentiarum à veneni tum specie, tum causa efficien- te, sequuntur. At cognoscitur esse pestilens, cum aues nidos relin-

relinquunt, & animalia pleraque è putri materia generantur, eaque admodum sunt frequentia: item si panis, caro, aut quippiam simile, aeri expositum, iusto citius putrescat. Cum autem aer sit pestilens propter vapores, aut propter putredinem: cognoscitur pestilens esse propter vapores: quando non apparet humidus, non crassus, non turbulentus: vapor enim pestilens aërem non crasse facit: cognoscitur autem pestilens propter putredinem: cum aer apparet humidus ac turbulentus, vt Sol exoriens vix deprehendatur. Cum deinde inficiatur aer, à causis supernis, vel infernis: si sit causa superna, cognoscitur inde, quod prægressa est constitutio calida & humida, constitutio pluuiosa. Si causa sit inferna: facile apparet, vtrum aer sit conclusus, an apertus: & si est apertus ac liber: facile scire possumus, num aer infectus sit propter ventos: venti enim seipsos manifestant. Si venti ferant pestilentiam: non sunt necessario australes, spirant vero è loco pestilentiali, & aer non est turbidus. Si autem venti non deferant vapores pestilenciales: id cognoscitur, quia necessario sunt venti australes, & aer apparet humidus, ac turbidus. Quod si venti nulli spirent: vapor veneficus prodit ex elementis, aut mistis. Si ex elementis: & primum si ex aqua: hæc est pinguis, & tactu tepida, virescens, multiplicantur ranæ, & alia animalia è putri materia in aqua orta, pisces etiam quandoque moriuntur. Si è terra procedit vapor: cognoscitur inde, quod terra euadit sterilis præter consuetudinem, vigent terræ motus, animalia cauernas fugiunt. Si vapor è mistis procedat: cognoscitur, quia mista sunt præsentia, siue sint cadauera, siue panni infecti copiosi. Quoad cibum, & potum: facile possumus intelligere, num febricitans vsus sit cibis aut potionibus corruptis & putrefactis. Quoad *seminarium*: cognoscitur, si febris oborta est propter indumenta. *Venenum externum* non ita facile cognoscitur, quia clam & dolose ab hominibus perfidis administratur: at ex aliarum causarum absentia coniectari licet, venenum extrinsecus datum esse. *Excrementum* cognoscitur: si signa aliarum specierum non asint: & potissim. si ante febrem corpus erat cacoehymicum, & male dispositum.

Quoad *veneni causas*, an venenum extra, vel intra corpus sit genitum: cognoscitur, si causæ externæ præcesserunt, vel *farum*. non præcesserunt: id quod असिदentes indicare possunt.

De ratione Præcauendi febrem pestilentem.

Indicationes præseruatoriæ.



- Indicationes aliz sunt Præseruatoriæ, aliz Curatoriz. Quando ergo febris pestilens imminet: indicantur præsidia, quorum beneficio corpus munitur, ne afficiatur à veneno pestilenti. Cum autem indicatio sumatur ab eo quod est intra corpus, non extra: hic etiam desumetur à Veneno in corpore existente, & ab ipso Corpore: ita vt & venenum non agat in corpus, & corpus non patiatur à veneno (*Medici occurrunt quidem aeri, unde numera comburuntur de Hipp. sententia: non tamen propterea sumitur indicatio ab aere, nam hoc est extra medendi methodum, ut in differentia generali de methodo diximus.*) Venenum quodlibet, cum toto genere præter naturam sit, indicat eradicās. Quoad corpus: perpendere oportet tum Contenta, tum Continentia. Quoad contenta: pro vario vitio contentorum, variz oriuntur indicationes: si enim contentum peccet secundum substantiam, indicat eradicans: si secundum quantitatem, minuens, &c. Sic etiam pro varia specie contentorum, oriuntur variz indicationes, sed determinatæ: verbi gratia, si contentum copia peccans, est sanguis: hic minuendus, &c.
3. Continentia pertinent, vel ad Totum corpus, vel ad Cor. Si continentia ad totum pertineant: respicimus vel ad completionem, vnde si humidius est corpus, oritur indicatio exsiccandi: vel ad conformationem, vnde si densus est corporis habitus, indicatio oritur rarefaciendi. Quantum cor attinet, licet in corde multa reperiantur, vt anima, facultas, variusque domicilium, & instrumentum: nullum tamen ex iis vim habet indicandi, præter domicilium & instrumenta: per domicilium intelligo propriam cordis substantiam, peculiari proportionem donatam: per organa vero cordis constitutionem, & potissimum temperamentum cum calido innato, & spiritu vitali. In præsentia autem remedia potissimum respiciunt proportionem substantiæ cordis, & temperiem: si enim hæc bene habent, non est indigentia calidi innati, vel spiritus vitalis. Cordis ergo proportio indicat remedium, cuius propria substantia sit domicilium facultatis, cuiusque forma adeo insignis sit actiuitatis, vt cordi humano robur addat, viresque largiatur supra facultates humani corporis, & supra venenum: ne cor à veneno opprimatur,

tur, sed illud potius expellat. Complexio cordis, si bona, seruanda: si improba, bona efficienda. Hinc Auicenn. cap. 4. tract. 1. lib. 2 ait: *cheriaca* proprietatem esse, temperare membri essentiam, id est, propriam substantiam, seu proportionem, & complexionem quoque eius membri temperare. In materia ergo remedij, ratione cordis, duo sunt necessaria: primum, propria substantia, vt domicilium maioris actiuitatis, deinde, complexio.

Prognosticum sumi debet è conditione veneni, & corporis. Si enim summa sit vis veneni, corpus resistere nõ potest, nisi fugam arripiat. Si contra, sperare oportet, posse præseruari. Verbi gratia. Si aër sit vehementer putrefactus, corpus humidius, impurum, densum: præseruari non potest. Si contra, potest præseruari.

*Prognostici-
cum præ-
phylactico.*

Quoad materiam cheirurgicam: in sanguinis abundantia probatur venæ sectio, si virtus eam admittat. Sin minus, conueniunt hirudines, cucurbitulæ scarificatæ. Probantur etiam fonticuli in brachiis, vel cruribus, vt assidua fiat euacuatio.

*Materia
chirurgica*

Materia medicinalis, & in primis leniens, varia est administranda, prout varia est prima superfluitas. Cauendum autem est ab humidioribus, vt à *castia*, à *styr. ros. sol.* Auicennas probat *pitulas ex aloë, myrrha*, & *croco*: euacuant enim primas superfluitates, habent vim exsiccandi, & suffragantur proportioni cordis: exhibebat quotidiana 3 j. vos frequenter poteritis exhibere.

Lenientia.

Præparantia etiam varianda, pro varietate contentorum. Causa pituitæ, probantur calida, vt *betonica, myrrhis, ruta*, *semina citri*, &c. quibus tamen in curatione nequaquam vti licet: febris enim prohibet calida. Cauendum autem ab astringentibus, cuiusmodi est *aqua agrestis*, &c. licet enim Auicennas probeat aquam agrestem, & astringentia: is tamen ibi non respexit ad materię præparationem, sed ad dissolutionem calidi innati.

*Præparan-
tia.*

Purgantia multiplicia esse possunt, prout materia variat. Notandum autem in præseruatione expectandam esse concoctionem: in curatione nequaquam: cum venenum præsens sit, & tuto purgationem differre non queamus: quam primum ergo purgandum. Quoniam vero interdum imminente febre pestifera, venenum actu in corpore reperitur: exhiberi potest medicamentum vacuans insensibiliter, quod

Purgantia.

venenum

venenum è corpore attrahat, & à tota forma, & ratione caliditatis. Formula talis esse potest, quam nonnulli pro secreto habent: *℞. arsenici ʒ j. dictamni Cretici, sinapi, cinamomi an. ʒ x. ambra odorata, benzē ii, ana ʒ v. Mif. ʒ fiat sacculus, qui debet applicari sub axillis.* Hic balis est arsenicum: reliqua sunt adiuuantia: quatenus enim sunt tenuis substantię, vehiculum sunt arsenici: quatenus calida, attrahunt extra ad circumferentiam: odorata sunt corrigentia, vt cinamomum, ambra, asa odorata.

Alterantia. Alterantia, quatenus agunt à tota forma, respiciunt proportionem & substantiam cordis: quatenus autem calida sunt vel frigida, respiciunt complexionem cordis. Si enim corpus verbi gratia, est frigidius, causa vel temperamenti, vel ætatis, vel aëris, &c. probantur calida: si contra, frigida. Quæ ergo agunt à tota forma, si sint calida, iis frigida miscere oportet, quando corpus præseruandum est calidius. Calida autem

Calida. sunt, tum simplicia, tum composita. Simplicia sunt, angelica, cardus benedictus, cortex citri, semina citri, dictamnus Creticus, myrrhis, scorzonaria (aliqui enim habent pro secreto) melissa, cortex ligni aloes, moschus, ambra odorata, benioinum, trifolium, betonica, pimpinella, sassifera (quod admirabile) Zedoaria. Compositum medicamentum hoc esse potest: *℞. pulu. fol. ruta xxx. nucum ʒij. salis, caricarum, ana ʒ v. Dosis est à ʒ j. ad ʒ ʒ.* Inter composita etiam laudantur, diamoschu, gallia moschata, magna antidoti.

Frigida. Quoad frigida: probantur acidum citri, acetosa, succus quinque folij, anruum, margarita, cachura, corallia, hyacinthus, santali, bolus Arme. terra sigillata. Notandum autem in his medicamentis miscendis, calida esse temperanda frigidis astringentibus permittis, nimirum margaritis, santali, corallis: quæ astringendo calidi innati dissolutionem impediunt, quam calidiora facere possunt.

Formula calidorū. Quoad usum horum medicamentorum: Exempli gratia. Calidum intus administrandum: *℞. conferva e beton. flor. rosmar. ana ʒij. Methridatij antiqui ʒ iij. pulueris myrrhidis, scorzonaria, sassifera, ligni aloes, fol. ruta, Zedoaria, ana ʒj. gallia moschata ʒ ʒ. cum syrupo de corticibus citri, fiat electuarium, cuius dosis sit à ʒij. ad ʒvj.* Calidum extra administrandum: *℞. Methridatij antiqui, theriaca antiqua ana ʒj. pulueris sassifera, dictamni Cretici, Zedoaria, ana ʒ ʒ. gallia moschata ʒ v. vini aromatici parum. Mif. ʒ applicetur regioni cordis. Vel: ℞. myrrhidis,*

vidis, dictamni cretici, sassafras, cardui benedicti, ligni aloes, Zedoaria, pimpinella, corticis citri ana ʒ ij. croci ʒ β. gallie moschata, moschi odorati, ambra odorata, ana ʒ v. Misc. & fiat culcitra, vel sacculus, quem continuo agri gestabunt, applicitum regioni iecinis, & cordis. Intus etiam licebit vti scorzonaria condita. Et extra non improbat oleum Magni Ducis, quod potissimum fit d magnis antidotis, & hyperico.

Frigida medicamenta intus adhibenda: *℞. seri lallis caprini Formula vel vaccini, optime depurati lbj. succi citri ʒ β. Misc. quotidie po- frigidorū. test exhiberi in præseruatione. Vel ℞. aqua extracta ex fabis viridibus lbj. succi acetosa ʒ β. Misc. Vel, Recipe. conf. ex acetosa, ex acido citri ana ʒ ij. fol. aurinum vj. margaritarum, trium santalorum ʒ vj. Misc. dosis à ʒ ij. ad ʒ j. Frigida extra admouenda: ℞. fol. aurantij, citri, limoni, rosarum, acetosa, ana P. j. caphura ʒ j. irinum sans. ʒ β. Misc. fiant culcitra. Prodest etiam applicare cordi, succum citri, succum acetosa, & aqua rosa. ad ʒ β. cum aceti ʒ ij. Pulvis lapidis bezoar. ad ʒ v. probatur.*

Quod dietam attinet: Aer alterandus est: calidior enim non corrigendus frigidis: & frigidus calidis, quæ fuere propo- sita. Aer autem multis modis potest alterari, potissimum tamen pilulis, seu pomis, quæ pro olfactu manibus versan- tur: Exempli gratia tempore calidiore: *℞. flor. siccatorum ci- tri, limonis, aurantij, nymphae, rosarum, santalorum, an. ʒ β. corticis mali citri ʒ j. β. ambra odorata ʒ v. tragacatha ʒ ij. Cum aqua ros. vel aceto fiat pila, seu pomum. Tempore autem frigidior: ℞. nucis moschata, macis, sassafras, caryophyll. ligni aloes, styracis cala- mita an. ʒ j. benzoïn. ʒ β. moschi ʒ vj. ambra ʒ ij. ladanij ʒ ij. cum aqua cinamomi, vel vino aromatico, fiat pasta, pro pila, seu pomo. In prima recepta nō proponitur moschus, nec benzoïn. quæ calidiora sunt: sed sola ambra, quæ minus est calida. Quoad cibum in præseruatione, si corpus sit repletum, probatur ci- bus minuens: si vero sit inanitum, augens cibis conuenit: oportet vero cibum condire frigidis & siccis, vt aceto, acetosa, acido citri, succo aurantium, limonum: & nisi immineat obstru- ctio, vel alius fluxus, licet etiam cibos condire omphacio, agrestia, granatis. Cibis ergo his refrigerantibus & siccantib. conditur, vt mutetur in humorem non facile putrescibilem. Si esculenta sint vitiosa, vt tempore caritatis annonæ, vel si aer sit pestilens: tunc carnes priusquam coquantur mace- randæ sunt in aceto, vel omphacio, cum exiguo sale: mox ex aqua abluenda, vt sal remoneatur: & deinde coquenda, sunt, ac cōdenda,*

*visus va-
tio.*

suimus.

ut supra proposuimus. Potus cibis respondere debet : notandum id solum, potum sic esse administrandum (de Auic. sentent.) ne homo sitiat : quia sitis corpus accendit, taleque corpus accensum, à veneno pestifero calido promptius afficitur : hac que de causa potus etiam talior improbatur. Cauendum est ab immodico motu & corporis, & animi : ne corpus incalescat.

CAPVT XXXI.

De curatione Febris Pestifere.

Præsidia.



Actenus προφυλακτικῇ febris pestilentis, sequuntur θεραπευτικῇ. Indicationes ergo Curatoriae sumuntur à Febre, à Causa & Virtute. Indicationes à febre patent è doctrina generali. Quântum ad causam febris pestilentis : ea est vel materia, in quam agit venenum, vel est venenum. Materia vel est putrefacta, vel imminet ne putrescat. Putrefacta indicat eradicans, quod à specie materiæ determinatur : verbi gratia, bilis putrefacta, indicat eradicans bilem. Si autem immineat ne materia putrescat : ratione copię indicat minuens : ratione qualitatis indicat siccans : nam materia copiosa & humidior facillime patitur à veneno putrefactiuo. Quoad venenum pestilens : ut venenum, indicat eradicans, & à tota forma alterans, nimirum alexipharmacum : ut calidum, indicat refrigerans : ut putrefactiuum, nil indicat : dum enim vacuatur, & à tota forma alteratur, & refrigeratur venenum, dum item occurritur materiæ putrescibili, venenum putrescere non potest : ideoque ut putrefactiuum non indicat. Quoad virtutem : Virtus totius indicat alimentum : virtus cordis requirit boæarticum per proportionem.

Prognost.

Febris pestilens multos solet perimere, & cito, aph. 20. sect. 3. lib. 3. epid. nam insignem habet vehementiam essentię, quia adest exustio : & vehementiam dignitatis, quia exustio est intus, & afficiuntur solida cordis : postremo vehementiam facultatis, nam virtus facile succumbit. Proinde, si perpendimus febrium differentias : hectica pestilens est prorsus incurabilis. cap. 3. lib. 3. de præf. puls. Causa febris pestilentis, vehemens est ratione, quia materia est venefica, toto genere præter naturam, & præterea summę actiuitatis. calculus renalium etiam est toto genere præter naturam, sed non est summę actiuitatis : adest etiam vehementia dignitatis, hæc enim causa

cor

zoz petit: ex vehemētia facultatis, quia vi huius causæ prom-
pte virtus succumbit. Quoad symptomata, hæc quoque in
febre pestilenti omnibus modis sunt vehemētia. Quoad vir-
tutem, hæc vt plurimum debilis euadit. In hac salutis vnica
spes est sita, si nimirum robusta sit, vt excrementum vene-
ficum possit expellere: cap. 12. lib. 5. meth. aphor. 20. sect. 3.
lib. 3. epid. Maximum ergo salutis indicium est, si virtus ita
est robusta, vt materiam ad partes extimas detrudat,

Quoad materiam cheirurgicam. *Venæsectio* locum habet,
si sanguis peccet: nam vitium vehemens est in hac febre: si
sanguis non peccet, non est tundēda vena. Hinc Gal. venam
secat, aph. 26. sect. 3. lib. 1. epid. vbi sermo est de Critone, reple-
to sanguine: non autem secat venam, cap. 1. lib. de cibi bon.
& mal. succi, vbi respicit ad annonam, cuius causa adest ca-
cchoymia. Verum si vena est aperienda, præter sanguinis
vitium, etiam permittentia oportet adesse: vt in doctrina
generali diximus. Vfus venæsectionis ē generatibus pater:
vnicum saltē notandum: in putrida pestilenti ilico, prima
hora venam esse secandam, quia statim virtus concidit: hac
de causa Hippocrates aph. 26. sect. 3. lib. 1. epid. non secuit ve-
nam, quia ab initio non accesserat: æger proinde tertio die
obiit. Quoad *cucurbitulas*: si vsurpentur loco venæsectionis,
secundum Oribasium partibus infernis sunt applicandæ: si
vsurpentur causa symptomatum, vt vibicum, macularum,
aut pustularum, sunt administrandæ post totius euacuatio-
nem, possuntque non tantū partibus infernis, sed etiam
aliis, vt dorso, applicari. Reliqua patent ē doctrina generalis
vbi & de hirudinibus.

*Venæse-
ctio.*

*Cucurbi-
tula.*

Medicamenta lenientia per os, non probantur ante *ve-* *Lenientia.*
næsectionē, nam statim vena est secanda, vt nulla mora in-
terponatur: nec probantur post venæsectionē; quia tunc pur-
gante, non leniente opus est, in febre nimirum pestilēti con-
tagiosa, de qua iam loquimur. Sufficit ergo in hac febre
quam primum tali clysmo vtī, ante venæsectionem: *℞. mellis*
℞. ʒiij. elect. de psyllio ʒss. olei communis ʒiij. salis communis ʒj.
iuris alterati furfuribus & malua lbj. Misc. pro clystere.

Præparantia non probantur, quia materia est venefica, *Præpara-*
quæ non præparanda, sed illico expurganda: nisi forte con- *tia.*
tingat, vt febris pestilens mutetur in non pestilentem: tunc
enim materia non est venefica, & potest præparari medica-
mentis, de quibus in febrium doctrina speciali diximus.

Vacuan

Vacuātia. Vacuantia, vacuant per Vomitum, per Aluum, per Vesciā.
Vomitoria. per Cutim. Vomitorium non probatur, nisi febris pestilens oriatur ē veneno assumpto: vnde *℞. succi raphani ℥ j. oxymelitis simpl. ℥ ij. butyri recentis ℥ ij. iuris pinguis ℥ viij. Misc.* pro vomitorio: cuius beneficio & acrimonia veneni assumpti attemperabitur, & venenum ipsum vacuabitur.

Purgātia. Quoad medicamentum per aluum vacuans, vtendum est validioribus, propter venenum pestilens. Hinc causa bilis, oportet vt *dacrydio, non rhab. santum.* Causa pituitæ, oportet vt *colocynthide, non agarico, sed trochiscis albandal.* Causa melācholiæ, oportet vt *helleboro nigro, non sufficit sena.* Vnde quidam in Germania pro maximo secreto habent *pilulas comitum de Solms*, quæ nū sunt aliud, quam *pilula de euphorbio*, vt accepi ab vno ex generosis illis Comitibus. Equibus intelligitur, ad vehementissimam esse confugiendum. Cæterum propter febris feruorem, miscenda sunt refrigerantia: si enim medicamentum datur in bolo, addenda *castia*: si in potione, miscendum *serum*: si in pilulis, *serum est superbibendum*. Verbi gratia, pro purgatione bilis: *℞. dacrydij ℥ β. flor. ass. nou. extr. ℥ j. cum saccharo fiant boli.* Pro purgatione pituitæ: *℞. pilu. cochiatarum, de euph. ana ℥ β. mastichinarum ℥ j. cum succo citri fiant pil. numero v. & ager superbibat tb ij. seri.* Pro melancholiæ purgatione, *℞. pilu. cochiatarum cum helleboro preparatarum, fatidariæ ana ℥ β. de fumaria ℥ j. cum syr. de pomis fiat pilula, numero v. & ager superbibat seri tb ij.* Cæterum hæc medicamenta statim post venæsectionem exhibēda sunt, id est, intra horas decem aut duodecim à venæsectione: materia enim venefica, magis vrget, quam turgens: quod etiam in doctrina generali est explicatum. Vnde Auicē. ait: inchoādum esse à venæsectione vel pharmaco.

Diuretica. Quoad medicamentum vacuans per vesicam: probantur frigida, non calida: vt *serum, hordeum, capillus Veneris, semina*: de quibus in doctrina generali. Maxime probatur *aqua extracta ē siliquis fabarum, vna cum fabis.* Vsu: hæc medicamēta post venæsectionem & purgationem administranda.

Attrahētia foras. Medicamenta vacuantia per cutim, non debent per os exhiberi: alias enim caliditas *αἰσθητή* fit *ἐνὶ τῷ αἵματι*. Tantum ergo extra sunt administranda, vt venenum foras trahant. Attrahunt autem vel per Similitudinem, vel per Caliditatem, vel per vtramq; Ratione similitudinis, seu formæ, quæ magnam habet actiuitatem, attrahit *arsenicū*, de quo in præseruatione.

Attrahens

Attrahens ratione caloris: vel attrahit citra excitationem vesicæ, vel excitando vesicam. Citra excitationem vesicæ ^{Supr. c. 19.} attrahit inunctio *Aetij*: *℞* olei communis, aqua communis ana \bar{z} iij. nitri \bar{z} iij. *Misc. &* fiat inunctio secundum totum corpus. Quod si extrema sint frigidiora, loco olei communis uti potestis, oleo anethino ad \bar{z} iij. & aqua ad \bar{z} j. & nitro ad \bar{z} β Vesicantia, id est, quæ attrahunt excitando vesicam, maxime probantur: vnde Galenus cap. 12. lib. 5. meth. omnes fere euasisse scribit, quibus scatebat corpus vlceribus. Hæc autem inedicamenta confici possunt è ranunculo, flammula *tonn*, allio, & potissimum è cantharidibus. Verbi gratia *℞* cantharidum oraparatarum \bar{z} iij. sinapi \bar{z} j. fermenti x β . cum aceto scillitico fiat pasta pro vesicatorio. Huic vesicatorio superimponi debet *drachylon simplex*, vel cum gummi: ut nimirum vesicatorium detineri queat (est enim per vigintiquatuor horas detinendum:) Postea remota vesica, applicetur butyrum, & deinde ceratum sacrum per aliquot dies: debetque artubus applicari. Nec hoc medicamentum nocet calefaciendo, ut quidam somniant: nam per accidens refrigerat: neque etiam proprietate nocet, nam cantharides primum agunt in vesicam, quod nocumentum ut subito apparet, ita subito et possumus occurrere. Cauteria in curatione non habent locum: quia operantur post octo dies: probantur autem in præseruatione. Medicamentum denique attrahens, ratione & similitudinis, est oleum viperinum, & potissimum oleum Magni Ducis. Cæterum quæ operantur ratione similitudinis, efficaciora euadunt, si addatur arsenicum: hoc enim per similitudinem validissime attrahit.

Quoad medicamentum roborans, seu alterans: hoc alterat vel Qualitate manifesta, vel Tota forma. Si manifesta qualitate: probatur alterans frigidum, quia febris est calida, & venenum etiam pestilens est calidum. Si tota forma agit, habet organum Frigidum aut Calidum. Quod habet organum frigidum, probatur: omnibus enim modis iuuat: quod organum habet calidum, improbat. Vnde *theriaca* improbat, quia habet formam magnæ actiuitatis, calefacit vehementer, caloremque cordis *exulnōs*, facit *inulnōs*: & hoc maxime, quia necessarium est, ut in magna quantitate exhibeatur, & bis in die, ob veneni præsentiam, cap. 1. lib. 1. de antid. Hinc Auicennas in præseruatione probat magnas antidotos, in curatione vero saltem proponit refrigerantia:

vnde aërem & cibum frigidis saltem corrigit, & non calidis: metuit etiam calorem in sacchari: vnde multo magis theriacæ calor formidandus. Obiectio. *Scribitur cap. 16. lib. de ther. ad Pisonem, theriacam etiam peste correptis mederi?* Responsio: primum liber ille non est Galeni: deinde locus ille recte est intelligendus: hoc modo: Si theriaca exhibeatur ante febrem pestilentem, eam in causa esse, ut vel homo non corripiatur, vel saltem correptus non ita lædatur. Porro probatur theriaca in peste actu existente, sed sine febre. Nec improbat in aliis febribus non pestilentibus: cap. 7. & 16. lib. 1. de antid. vnde probatur in quartana intermitte. Auicennas alterantia hæc probat: aquam frigidam copiosam, trochiscos de caphura, serum lactis cum aceto, & aqua rosacea, item aquam cum aceto: præterea succos refrigerantes sine saccharo (metuit enim calorem sacchari) ut succum eichorii, endiniae, sonchi, præsertim acetosa & citri. Huius loci etiam sunt, folia auri, margarita, cornu cerui, hyacinthus, succus quinquifolij: nam siccant, citra calorem, & sunt bezoartica. Quamobrem R. fol. auri, num. 3. cornu cerui ʒ j. lapidis bezoar ʒ xv. hyacinthi ʒ ss. margarit. ʒ viij. succi citri quantis sufficit, & redigantur in formam pilularum, vel boli: distribuatur in portiones quatuor, vel quinque, tot vicibus assumendas, bis in die, idque vel ilico ante cibum, vel per horas quatuor ante cibum. Extra probantur frigida, sed citra astringentem: vnde R. aqua acetosa ʒ iij. acidi citri, aceti ana ʒ iij. Misc. & applicetur cordi.

Dietæ.

Quoad dietam. Aër frigidus est alterandus. Cibus conditur aceto, acetosa, acido citri, succo limon. arantiorum, ut cibus euadat refrigerans & siccans. Potus nequaquam sit vinum, nisi syncope urgeat: sed aqua, vel ius, alteratum propositis.

FINIS LIBRI SEPTI.



PRACTICÆ
MEDICINÆ,
 LIBER SEPTIMVS.



DE VENENIS.

CAPVT I.

*De Nomine & Definitione Veneni: tum quo
 modo in corpus agat.*



N Veneni natura explicanda, breuiter ac perspicue ita progrediemur. 1. agemus de nomine seu voce Veneni. 2. de Essentia. 3. de Differentiis & Speciebus. 4. de Signis, quibus deprehendi venena possunt. 5. de Præfidiis seu indicationibus. 6. de Prognosticis. 7. de Materiis præfidiarum. 8. His in genere

*Propositio
 tractando-
 rum.*

ita traditis, quasdam etiam Venenorum species explicabimus: nimirum præstantiores: vt sunt, Napellus, Anacardus, Opium, Veratrum album, Cantharides, Canina rabies, &c.

Quantum ad Nomen, notanda est differentia, inter alimentum, medicamentum, & venenum: è ca. 4. lib. 3. de temperam. Alimentum enim est mistum quod secundum totam substantiam (& proinde etiam secundum qualitates: nam ubi forma amittitur, etiam temperies perit) vincitur à corpore nostro (si decenti quantitate sumatur: mistum enim copiosum non vincitur) vt in substantiam corporis nostri transeat. Medica-

*Nomen.
 Venenum
 vt distet
 ab alimen-
 to & me-
 dicamēto.*

mentum est mistum, quod secundum quamlibet qualitatem mutatur & alteratur à corpore nostro. Venenum est mistum, quod nequaquam secundum substantiam mutatur

Quomodo

Gale. dicat

medicamē

tum vinci

à corpore.

à corpore nostro, sicque corpus nostrum lædit. *Dubitari autem potest, quare medicamentum hic definiatur, quod à corpore alteretur: cum tamen medicamentum potius alteret ipsum corpus, ut lactuca refrigerat, quatenus est medicamentum, cap. 1. lib. 1. de alim.*

Respondendum. Gal. lib. 1. de alim. agere de vi medicamenti erga corpus, id est, de facultate eius, qua in corpus agere potest: hac enim actione vincuntur causæ morbificæ, At lib. 3. de temp. docetur de vi humanæ naturæ erga alimentum, medicamentum, & venenum: ubi alimentum vincitur secundum totam substantiam, medicamentum secundum omnem qualitatem, venenum nec secundum substantiam, nec secundum qualitatem vincitur, sed hoc potius vincit corpus: (Notandum his per naturam Galenum intelligere & substantiam, & temperiem, qua è quatuor qualitibus elementorum consurgit: substantia autem ista nihil est aliud nisi forma substantialis: non materia, qua nihil agit Hinc functiones manifestæ sunt, qua à temperamento prodeunt: constat enim num temperies sit cal. frig. &c. functiones autem occultæ, qua à forma prodeunt:)

Gradus

agendi effi

cacia mi-

storum.

Ut autem intelligatur, quomodo medicamentum à corpore vincatur, hæc consideranda sunt. Mistum, quæ cum natura humana conferuntur, habent formam similem, vel dissimilem: & vtraque habent agendi facultatem vel infimam, vel summam, vel mediocrem. Mistum ergo formæ similis, sed minimæ actiuitatis, vincitur à natura humana secundum formam, quia hæc maioris est actiuitatis: & hoc mistum dicitur alimentum. Si forma similis sit actiuitatis summæ: non potest vinci à corpore: & hæc in minima dosi prodest, in maxima obest, id est, rationem habet veneni: huiusmodi sunt omnia Bezoartica, id est, alexipharmaca, & alexiteria. Si forma similis sit facultatis moderatæ: tum interdum vincitur quoad actum secundum, id est, secundum accidens: est enim medicamentum (solum autem alimentum secundum actum primum) interdum non vincitur, & tunc iuuat, quia forma si-

1. Forma

similis.

milis est, Mistum formæ dissimilis nullum secundum actum primum vincitur, sed tantum quoad secundum. Forma ergo illa dissimilis, si sit minimæ facultatis: vincitur à natura humana: sicuti etiam vincitur magnes ab adamante, ut ferrum non trahat. Forma dissimilis, si sit summæ actiuitatis: vincit naturam

2. Forma

dissimilis.

naturam

Naturam humanam, & est venenum. Si forma dissimilis sit facultatis mediocris: modo vincit, modo vincitur. Dictum ergo est à Galeno, medicamentum vinci secundum omnem qualitatem, id est, remitti & refringi: ad differentiam alimenti, quod secundum substantiam vincitur: & veneni, quod secundum nullam qualitatem vincitur, sed vincit. (*Diffat venenum à medicamento deleterio: Venenum habet formam dissimilem naturæ humanæ, & interficit in dosi summa, minima, mediocri: nec unquam potest esse medicamentum. Sed medicamenta deleteria formam habent similem, & in minima dosi iuvant, in summa interficiunt, quia sunt summa attinuitatis: & hæc venena sunt pessima, quia ob similitudinem iucunda sunt, ac interficiunt sine ullo signo.*)

Differentia veneni, & medicamenti deleterij.

Veneni porro vocem hic non ita accipimus, ut Dioscorides lib. 6. ubi omnia, quæ in copia immodica interficere possunt, venena nominat: ut vinum, mustum, crocum, &c. Nec etiam loquimur de veneno, quod est extra corpus humanum, & sic est res naturalis: sed quod reperitur in corpore, in id agit, præter naturam est, ac causa morbifica.

In qua significatione vox veneni hic usurpetur.

Venenum ergo ita acceptum est qualitas corruptiva confortis cordis hominis. Genus est qualitas: quia hoc omni veneno competit: & quidem hæc qualitas interdum pura & sincera est, interdum vero necessario in substantia. Venenum, quod sit pura qualitas, est in basilisco (ut colligitur ex lib. de ther. ad Pison.) qui solo intuitu hominem interficit, id est, sincera qualitate, non substantia. Sic Avicennas ait, esse serpentem, qui, si ab homine hasta percutiatur, hominem interimat, dum scilicet per medium illud lignum, qualitatem veneficam brachio hominis communicat, quæ deinde cor petit. *Obicit autem hic potest, quod Gale. cap. 19. lib. 3. simpl. ait, frigida venena agere quantitate: calida qualitate?* Responsio. Galenus id propterea dicit, quia frigida venena in minima dosi non corrumpunt corpus, sed à corpore vincuntur, & secundum portionem alimentalem in alimentum vertuntur. cap. 4. lib. 3. de temperam. atque sic ratione quantitatis debent interficere, quia hæc subiectum est qualitatis copiosioris, & quia in maiore quanto est maior virtus, non quod à quanto procedat actio. Calida autem venena in summa, minima, & mediocri dosi interficiunt (non tamen si dentur infra minimam: quia cuiuslibet medicamenti determinata est dosis, sic ut scintilla ignis non calefacit, &c.) Et licet in calido etiã venenaq

Definitio. 1. Ven. est qualitas.

Obiectio. Calida venena maioris sunt activitatis, quam frigida.

*Toto genere
venenarum
naturam
dupliciter
dicitur.*

*Venenae
calidae
interdum
iuvant.*

*Venefica
qualitatis
differentia.*

*Subiectum
qualitatis
veneficae
extra cor-
pus huma-
num.*

sunt portiones alimentales: non tamen vinci possunt à natura humana, ob summam admissi veneni actiuitatem, quod abradit & putrefacit, antequam in alimētum vertatur, quod in frigido non fit. Hinc calidae venenae toto genere præter naturam sunt, & quidem simpliciter, id est, in qualibet dosi: frigida toto genere præter naturam sunt, id est, secundum genus, speciem & indiuiduum: sed non simpliciter, verum secundum quid, id est, secundum dosim summam & medio-crem. Venenae autem calidae, licet toto genere & simpliciter sint præter naturam: interdum tamen corpus humanum non corrumpunt, sed iuvant: primo, quando alias materias permiscemus, nimiam actiuitatem tollentes: vt si cum cantharidibus miscentur ea quæ acrimoniam auferunt. Secundo, cum exhibentur infra minimam dosim. Sic ergo patet *venenum non agere, nisi per insignem qualitatem*: com. 75. sect. 3. lib. 3. epid. Galen.

Sequitur, vt explicemus quenam sit illa qualitas. Est ergo Euidens, vel Recondita, cap. 4. l. 3. de temperam. Auic. lib. 2. fen. l. tract. 4. Auer. 5. coll. 22. Euidens: calor, frigus, &c. Recondita, vel Dissimilis est corpori humano, vt in venenis toto genere præter naturam & absolute, vt in napello: vel Similis, vt in iis quæ toto genere præter naturam sunt, secundum quid: & hæc rursus vel est Alterans, vt in bezoarticiis, in theriaca: vel Attrahens, vt in purgantibus.

Deinceps de *subiecto* huius qualitatis. Venenū igitur generatur vel Extra corpus, vel In corpore. Extra corpus, ex Elementis, vel mistis. Ex elementis, iisque impuris, omnibus, præter ignem, qui calore omne venenum absorbit: huius qualitatis subiectum est vapor, ab aqua, aere, vel terra procedens. Ex mistis ortum venenum, vel ex Inanimatis, vel Animatis oritur. Ex inanimatis, vt mineralibus: cuius subiectum est substantia, misti inanimati, eaque vel terrestres, vel aquosæ, vel vaporosæ: terrestres, quando mista in puluerem minimum rediguntur: aquosæ, quando à pestiferis humoribus extrahitur humiditas aquosa, & oleaginosa: vnde hæc substantia humida aquosa in vaporem vertitur. Ex his, pulvis tardius interficet, qui non tam facile penetrat: vapor celerius. Venenum è mistis animatis est vel à Plantis, vel Animalibus. Quod à plantis oritur, subiectum triplex habet: puluerem, aquam, vaporem: & hoc, cæteris paribus, magis est mortiferum, quam quod ex inanimatis sumuntur. Venenum ex animalibus or

bus ortum, subiectum habet interdum brutum, interdum hominem. Si brutum subiicitur: interdum pars terrestris, interdum aquosa, modo vaporosa subiicitur: terrestris, ut caro, quæ vel per se, vel ex accidente est venefica: per se, ut caro Scorpionis: ex accidente, ut caro animalis. à venenato animali deorsum (N B. non omnium animalium carnes sunt venenatae, licet venenum suscipiant: ut, cum cerui & apri vulnerantur sagittis venenatis, carnes non redduntur veneficae, sed excrementa: venenum autem per abluionem & decoctionem carniū è toto exstinguitur, ut carnes tuto comedi possint. Sic etiam gallina scorpiones comedunt, quia vincunt portionem alimentalem, cum habeant fortio rem ventriculum, quam homo; conficiunt enim fabas, & cibaribus quadam cruda, qua homo vel non, vel difficulter coquit: veneficam autem portionem, tanquam excrementariam expellunt. Longo tamen usu, carnes etiam ab alimentis inficiuntur, ut docet Galen. 11. simpl. cap. de viperarum carne. Hominis denique substantia veneno subiicitur, quoties impertitur sola qualitas, ut à basilisco, &c. li. de ther. ad Piso. huius qualitatibus subiectum est aer, dum extrinsecus accedit. Et hoc venenum, quod ab animalibus procedit, cæteris paribus deterrimum est.

Carnes animalium non protinus ab alimentis venenatis inficiuntur, aut à venenata cruciatiōne.

Venenum etiam interdum in humano corpore generatur tom. 17. sect. 2. l. 1. prophet. & cō. 75. sect. 3. l. 3. epid. Huius materia potest esse Contentum, & Continens. Contentum: & excrementum & alimentum; ut sanguis menstruus, semen, materia alimentalis. c. 5. l. 6. de loc. aff. Continens, ut partes solidæ, in quibus calor putredinalis & veneficus etiam agere potest. cap. 5. l. 21. meth. Causa efficiens est calor, non simpliciter alterans, sed corrumpens, & novam formam, humanæ contrariam, introducens. Nisi enim forma sit contraria, non est venenum. Sic in corruptione naturali, si bonus cibus corrumpitur, id est, interit, & in chylum conuertitur, nova quidē inducitur forma: inter hanc tamen & præcedentem, non est contrarietas, sed similitudo, & altera solū maioris, altera minoris est actiuitatis: ut in carne & sanguine patet: caro enim fit è sanguine, non contra: quia maior est actiuitas in forma carnis, quam sanguinis. Sed neque venenū statim est in corruptione præter naturā: ut dū sanguis mutatur in bilē flauā, id est, in excrementū simile naturali: licet nō possit nutrire, est. n. maioris actiuitatis, quā ut à calore corporis vinci queat: forma tamen nondū est contraria. Præterea in corruptione

Corruptiones in quibus mixtum non dissolvitur.

1.

2.

3.

præter naturam dum sanguis mutatur in excrementum præter naturam: semper lædit, non semper autem est venenum: ut bilis vitellina, æruginea, atra, non semper est venenum: quia adhuc cedit medicamentis attrahentibus ob formæ similitudinem. Si vero quæ corrumpuntur, formam acquirunt

Contenti venenati subiectum & causa efficiens.

Contenti venenati subiectum.

naturæ humanæ contrariam, tunc demum sunt venena. Si ergo contentam euadit veneficum: tunc eius subiectum semper est excrementum. Agens vero modo in contento est: ut si quis mordetur à cane rabido, tunc excrementum veneficum, etiam reliqua excrementa in suam naturam conuertit: modo in continente: ut in febre pestilenti, dum calor partium solidarum redditur igneus præter naturam: modo & in contento & continente: ut dum homo rabie corripitur, & calor est igneus in contentis & partibus solidis (¶ *Venenum caninum magis est pestilens, quàm simile canino, quod in homine generatur: illud enim contagiosum, hoc autem non.*) Si autem continens est veneficum, subiectum veneni est continens, ut in sphacelo, à quo ascendens vapor, & corpetens, homines celerrime interimit. Totum tamen corpus, quandiu homo viuit, non potest esse veneficum, seu subiectum veneni secundum totum: & proinde falsum est, quod quidam dicunt, puellam illam napello nutritiam, secundum totum corpus euasisse veneficam. Puella enim ab initio vsa est napello in exigua copia, & sensim assuevit eius vsui: ut progressu ætatis ob consuetudinem, semper minus ab eo passa fuerit (à consuetis enim non fit passio) vnde napelli portionem alimentalem, in substantiam partis couertit, manente adhuc in finibus speciei humanæ: portionem vero veneficam expulit, tum per alias vias, tum per os, vnde etiam osculo homines interfecit: ipsam tamen puellam illud venenum non læsit, propter proprietatem & consuetudinem. Obiectio: *Simile generat simile: caro ergo carnis gignit, non venenum?* Responso: hoc verum est, nisi aliquod occurrat impedimentum, vel in obiecto, vel in agente.

Corruptio, in qua mistum dissoluitur, id est, putredo.

Haecenus de veneno intra corpus generato, per corruptionem, in qua nulla fit misti dissolutio: sequitur de ea corruptione, in qua mistum dissoluitur in finem, terram, ac cineres: id quod fit per putredinem. Putredo autem duplex est: alia naturalis: alia præter naturam. Naturalis, quando mistum quod putrescit non calidius, sed potius frigidius euadit. l. 4. meteor. Aristot. hic enim ambientis calor non est admodum intensus, nec in misto putrescente imprimitur, sed natius calor

euoca

euocatur, vt mistum in finum abeat. c. 9. l. 2. de diff. febr. Putredo præter naturam est, quando mistum quod putrescit redditur calidius, & fit per exustionem, vel superaffationem, à calore intēso. vt mistum in cinerem degeneret. In vtraque autem putredine quidam sunt gradus, ita vt non omnis putredo venefica sit, sed tātum summa putredo. In febre enim pituitosa. v. g. humor adhuc seruat formam pituitæ, seu formam nondum veneficam, quæ agarico potest ob similitudinem euacuari: at si pituita ita putrescat, vt venefica euadat: tunc prorsus corrumpitur, & nouam induit formam: nec agarico educi potest, sed saltem diureticis, sudorem ciētibus, vel calidis attrahentibus ad extimas corporis partes. Putredo igitur magis vel minus est praua ratione loci in quo generatur, ratione materiæ, & ratione causæ efficientis. Ratione loci, dum putrescens in venis putrescit, peius est, quam extra venas. Ratione materiæ: si materia alimentalis putrescit, deterius est, quam si excrementitia: vnde deterius venenum è semine, quam è sanguine menstruo, cap. 4. lib. 6. de locut. aff. natura enim magis tuetur alimentum, quam excrementum, & proinde si natura amplius tueri nequit, sed deserere cogitur, necesse est, calorem præter naturam esse admodum potentem, ac proinde venenum inde fieri magis deleterium. Ratione agentis: quo hoc potentius, eo peius venenum generatur.

Altera definitionis particula est, *corruptiua*. Venenū enim hominis complexionem corrumpit. Vnde improprie loquuntur, qui vel torpedinem, vel gallicam virulentiam, veneficam esse dicunt: licet enim in his qualitas sit, corpori nostro infensa: venefica tamen non est, quia non interficit: qualitas enim torpedinis potissimum infensa est facultati animali: qualitas luis gallicæ facultati naturali: qualitas veneni, facultati vitali atque cordi. Venenum ergo non simpliciter alterat, sed corrumpit: ita vt ij etiam periclitentur, qui tractant cadauera eorum, qui venenum assumpserunt. Vnde Plato in Phædro refert, quòd corpora eorum, qui ad supplicium destinati venenum assumebant, ante venenum, non post assumptum, lauari solita: ne scilicet & homines qui lauabant interficerentur.

Modus quo venenum hominem corrumpit, explicatur c. 18. l. 3. simpl. nimirum quod simili qualitate corpus afficiat: calidum caliditate, frigidum frigiditate, à toto forma agens

*Non omnis
putredo est
venefica:
alias enim
omnis pu-
trida fe-
bris esset ve-
nenata.*

*Quanam
putredo
malignior.*

2.
*Venenum
omne po-
test inter-
ficere homi-
nem.*

suo etiam modo: venenum ergo calefaciendo, vel refrigerando corrumpit, id est, calorem natium dissoluit, vel extinguit: medicamenta autem simpliciter alterant. Licet vero quædam venena dicantur calida vel frigida: omnia tamen tota forma contraria sunt, & à tota forma agunt, vt corpus simili affectione afficiant: vi enim veneni abolentur actus secundi facultatum, & ita imminuuntur, vt tandem vigeant actus secundi seu operationes veneni.

Venenipassio, seu à potestate in actum deducit.

1. Alimentum vt alteretur.

Sic igitur venena agunt: modo explicandum est, quid ea ipsa à corporibus patiantur, & quomodo è potentia in actum deducantur. Hoc Galen. c. 3. l. 3. de temper. explicat. Omne mistum, ait, est alimentale, vel non. Si est alimentale: vel à corpore vincitur, vel non. Si vincitur, ita deducitur è potentia in actum, vt conuertatur in substantiam partis, & augeat substantiam caloris natui: vnde omnia mista alimentalia calefaciunt, siue sint calida, vt caro columbrarum, siue frigida, vt lactuca. Si mistum alimentale non vincitur à colore humano: tunc hoc alimentum secundum vnâ rationem semper refrigerat corpus secundum alteram, interdum conseruat calorem natium, aliquando minuit, aliquando intendit. Declaro hæc. Secundum primam rationem, dum alimentum non vincitur: non fit nutritio & reparatio substantiæ caloris: minuitur ergo calor, & proinde corpus refrigeratur. Secundum alteram rationem, accipimus calorem, non ratione subiecti & substantiæ, sed ratione qualitatis. Quod si ergo alimentum temperatum est, & non vincitur, sed vincit, ac proinde agit: conseruat caloris natui quantitatem: nec enim auget, nec imminuit, quia est temperatum. Si alimentum sit frigidum, nec vincatur: imminuit quantitatem caloris, & refrigerat. Si alimentum calidius non vincatur, vt allium, cepa, &c. auget calorem. Mistum non alimentale, agit frigiditate, caliditate, vel tota forma. Quod frigiditate agit, id est, quod potentia frigidum est, nil patitur à calore nostro, nec de potentia in actum ducitur. cap. 3. & 4. lib. 3. de temper. etiam si enim actu calidum exhibeatur, caliditas tamen illa sponte dissipatur, non vi caloris natui. Quod calore agit, id est, quod potestate calidum est, siue simpliciter calefaciat, siue etiam abradat & putrefaciat: dum actu frigidum exhibetur, à calore humano alteratur, ac de potentia in actum ducitur (Obiectio: supra dictum fuit medicamentum alterari & scindi à corpore, venenum non: quomodo ergo his dicitur quod

2. Veneni vt à corpore alterentur.

venen

venenum à corpore alteretur? *Responsio*: ibi per alterationem intelligitur exalta victoria, & sic venenum alterationes quasdam suscipere quidem potest, vinci autem a corpore nequit. In eo quod tota forma agit, similis est ratio: formæ enim organum, modo caliditas est, modo frigiditas.

Obiectio: dictum est, frigidum à corpore non pati. At conera Galenus cap. 20. lib. 3. de simpl. ait, commune esse cuilibet medicamento, ut patiaturs à corpore: imo frigidum magis patitur, quam calidum, hoc enim sua sponte ad partes remotas penetrare potest: illud non, nisi per modum quendam ascititium? *Responsio*. Secundum primas qualitates, medicamentum patitur à corpore, frigidum non patitur. Secundum qualitates secundas, tum alteratiuas, tum motiuas, calidum à corpore nil patitur, sed frigidum (& hoc modo loquitur Galenus lib. 3. de simpl. ubi facultates medicamentorum considerat, quæ non tantum à primis, sed etiam à secundis qualitatibus proficiuntur.) Quantum ad alteratiuas: ut medicamentum agat, oportet in vaporem abire, quod calidum insito calore præstare potest, nec corporis calore ad id est opus: frigidum autem per se in vaporem verti nequit, resistit enim evaporationi, ac proinde corporis calore opus habet. Quoad motiuas: calidum proprio calore mouetur, & ad corporis partes etiam remotas decucitur: frigidum vero alieno calore opus habet: quia frigus per se quietis est causa.

Tertia definitionis particula est de tempore quo fit corruptio. Dictum igitur est venenum confertim & celerissime corrumpere: (spatio diei 1. vel 2. vel ad summum 3. secundum Galeum tex. 75. sect. 3. lib. 3. epid. Vnde febris hectica & putrida, licet cor corrumperet, non tamen est venenum, quia non confertim corrumpit. Nec venefica etiam erat aura illa frigida cap. 7. lib. 3. de loc. aff. quæ puero (antequam remedia adhiberentur) quotidie epilepsiam concitabat. Confertim autem venenum agere, duæ sunt causæ: primum vis & actiuitas veneni insignis, quæ celeriter sanguinem, carnem, & cor inficit: secundo, dispositio animalis, quæ talis est, ut facillime vis intensa toti corpori impertiat, cap. 16. li. 3. simp. si quis enim tempore frigidore, digitum in aquam frigidam immittat, repente tota manus refrigeratur, confertim etiam totum brachium, totumque corpus. Venenum ergo, quando in cor cœpit agere: hoc celerissime corrumpit: quando vero nondum cœpit agere, sed in via adhuc est, & ad

Frigidum à corpore patitur, & non patitur.

3. Venenis confertim corrumpitur.

Venenum, modo citius, modo tardius ad cor perducitur.

cor perducitur : modo longius, modo citius interficit, quia modo cito, modo longiore tempore ad cor perducitur, ob copiam, dispositionem viarum, & crassitiem. Copia enim & quantitas, nisi debita sit, venenum cor non petit: sic qui à cane rabido morfi sunt, non moriuntur, nisi post quatuor, aut quinque menses: interim sensim illud venenum se multiplicat, & ubi ad debitam quantitatem reductum est, cor petit, & iugulat. In corporis dispositione, si viæ sint strictæ, non ita facile permeat venenum. Sic quando venenum crassum est, ut opium, vel non interficit, quia non penetrare potest: vel serius interficit, si ope vini attenuetur. Dicendum vero etiam est, quæ ratione à veneno cor corrumpatur. Homo moritur, ob insignem cordis intemperiem: cap. 8. lib. 3. simpl. Cor autem afficitur, quia dissipatur ipsius calor, secundum vnum aliquem ipsius motum: cordis enim calor duplici conservatur motu, quorum unus est sursum, alter deorsum: & quamprimum unus motus deficit, illico etiam alter deficit, ut homo pereat. Venenum calidum, tollit motum deorsum: frigidum, tollit motum sursum, deprimit enim ad inferiora. Si venenum agat tota forma: hæc vel similis est, vel dissimilis: si similis, tollitur motus deorsum, quia hoc venenum agit ad similitudinem magnæ flammæ, quæ in minorem flammam agit. Si dissimilis, tollitur motus sursum, hoc enim venenum, ad similitudinem veneni frigidi, extinguit calorem naturalem.

*Quando à
veneno cor
corrumpatur
cor.*

*4. Venenū
afficit cor,
mediate,
aut imme-
diate.*

*3. Cor ho-
minis.*

Quarta finitionis pars est cor: omne enim venenum habet proprietatem cordi aduersam. Afficitur autem cor vel immediate, si venenum non respicit aliam partem determinatam, præter cor, ut cicutia, napellus: vel mediate, cum venenum partem determinatam respicit, & per mediam istam partem cor afficit: sic lepus marinus pulmones corrumpit, & per hos medios, etiam cor: cantharides vesicam, & per hanc, cor.

Quinta finitionis pars est, quod venenum corrumpat cor hominis: multa enim mista homini venenum sunt, alius animalibus alimentum: ut cicuta sturnis alimentum est, homini venenum. Et hæc de veneni definitione.

CAP.

CAPVT II.

De Speciebus, & Differentiis Venenorum.

Differentias venenorum tradituri, tantum de Simplicibus, quæ à natura fiunt, loquemur, non de propositis, quæ arte fiunt. Differentiæ autem sumuntur à Veneno ut est agens, & à Corpore humano ut est patiens. In veneno autem tria considerantur, primum id quod producit venenum: secundo natura veneni, id est, materia & forma: tertio, id quod est productum. Ab his igitur fontibus sumendæ sunt differentiæ.

*Differentia
venenorum
unde sumenda.*

Quantum igitur ad causam efficientem: venenum gignitur In corpore, vel Extra. In corpore, vel In venis, vel Extra venas. In venis, Simile est canino, Pestilens, Putrefactum. Extra venas, est sanguis grumescens Si venenum generatur extra corpus: tunc procedit ex Elementis, vel Mistis. Ex elementis impuris, *aere, aqua, terra*: ut fiat in febre pestilente. Si è mistis: vel ex imperfecte mistis, ut è *glacie veneno affecta*: vel perfecte mistis, iisque aut inanimatis, ut *arsenicum*: aut animatis, plâis nimirum vel animalibus: plantis, ut è *napello*: animalibus, ut è *cane rabido, scorpio, &c.*

*1. A causa
efficiente.*

Differentiæ à materia in qua, id est, à subiecto. Subiectum qualitatis veneficæ, est Indeterminatum, aut Determinatû. Indeterminatum: cuius qualitas spiritalis est, & modo vnum, modo aliud subiectum occupat, ut qualitas quæ procedit à *basilisco, & à serpente per hastam*. Determinatum: cum qualitas materialis proprium habet subiectum, nec alteri subiecto impertitur: ut *venenum caninum* pro subiecto habet contentum excrementum, quod in cane reperitur.

*2. A sub-
iecto.*

Forma veneni, id est, qualitas, est Euidens, aut Recondita. Euidens, calida, frigida, humida, sicca. Recondita est Alteratoria, vel Purgatoria. A caliditate igitur procedunt venena calida: de quibus cap. 18. 19. 22. lib. 3. simpl. Calidum autem venenum aliud est simpliciter calefaciens, ut *euphorbium*: aliud etiam attrahens, ut *arsenicum*: aliud corrosium, vel putrefaciens. Discrimen inter hæc est: nam simpliciter calefacientia venena non sunt viscida: at quæ abradunt, vel putrefaciunt, viscida sunt, & crassioris substantiæ. Difficilius enim soluitur continuum, quam introducatur dyscrasia: & propterea abradentia diutius in corpore manere oportet, quod

*3. A for-
ma: &*

*4. A ve-
neno iam
producto.
Calidum
venenum.*

quod sit visciditatis ope, quam calefaciētia simplicitet. Corrodentia etiam ac putrefaciētia à se inuicem distinguuntur: illa enim agunt in continētia tantum, & crassioris sunt substantiæ: hæc etiam in contenta agunt, & substantiæ sunt tenuioris. Putrefaciens etiam variū exiit: nam interdum introducit calidam dyscrasiam: interdum putrefactionem præter naturam, vt si admodum est calidum, quemadmodum venenum caninum & pestilens: interdum introducit putrefactionem similem naturali, in qua quod putrescit refrigeratur, vt si venenum remisse calidum est, quemadmodum *funges putrescunt* (*Vide lib. 2. simpl. ubi fungi frig. & hum. statuuntur*; in putrefactis tamen mixta portio calida affertur.) Hæc de veneno calido. Frigidum venenum, vt colligitur è can. 2. Auicennæ, vel interficit refrigerādo, & inducendo cordi frigidam intemperiem: vnde cordis actio aufertur, vel interficit per mediantem malam compositionem, id est, angustiam viarum. Refrigerando interficit *semen hyascyami, mandragore, succus papaueris*: quoties confertim in cor produciuntur: si enim diutius in corpore morantur, tum ita alterati possunt, vt secundum portiones alimentales vertantur in alimentum. Quoniam igitur venenum cito ad cor perducitur: fit vt à veneno frigido promptius interficiatur corpus calidius, quam frigidum: vi enim caloris venenum frigidum attenuatur, facilius movetur, venæ sunt latiores, cor etiam ob calorem attrahit. Hinc Gal. dicebat *opium* potissimum interficere quoties post ipsius assumptionē bibitur *vinum, nec copiosum, nec generosum*: vino enim opium attenuatur, viæ recluduntur: At copiosum & generosum vinum, plus iusto exalfacit, & frigiditatem opij e toto vincit. Hinc *cicuta* alimentum est sturnis, homini venenum: in hoc enim viæ latiores sunt, vt cicuta citius ad cor perducatur: in illis viæ sunt angustæ, vt diutius in corpore hæreat, & secundum portione[m] alimentalem in substantiam sturni vertatur. Nec hoc repugnat historia de verula Atheniensi, quæ citra noxam cicutam comedit: hoc enim è consuetudine factum est: nam primo in exigua copia comedit, deinde sensim in maiore, ita vt consuetudine aliam quasi naturam cōtraxerit. Venenum frigidum per mediam angustiam interficiens, est *plumbum vstum*: & hoc quoniam crassioris est substantiæ, & astringens hominem calidiorem celerius quam frigidiorē iugulat. Siccum venenum, interficit vel exsiccando simpliciter,

citer, vt *calx viua*, *venenum caninum*; vel abradēdo, vt *realgar*. Et hoc etiam corpus calidius citius interficit: tum quia ob caliditatem citius ad cor ducitur, tum quia cum calidiore temperamento facilius & frequentius sicca, quam humida intemperies coniungitur. Venenum humidum est, quod interficit per mediam intemperiem humidam, non putrefaciendo. Vnde historia illius serpentis, cuius morfu tacta erat cutis & carnes, vsque ad ossa, vt marcor secutus fuerit: huc non pertinet: sunt enim effectus illi putredinis ac putrefacientium venenorum, non humidorum, sed calidorum. Tale ergo venenum reddit corpus humidius, humiditate non alimentali (vt in athletis) sed excrementitia, quæ obsidet partium & præcipue corpus porositates, & hinc calorem cordis extinguit. Hoc autem mistum non tantum venenum esse oportet, sed etiam necesse est, vt talem adeptum sit substantiam, vt facile ducatur ad cor: & tale est *argentū viuum*, quod facile permeat, ita vt in internis ossium partibus repertum sit, post dissectionem eorum qui hydrargyro inuncti fuerāt.

Hæc de manifesta qualitate venenorum. Recondita est Alteratoria, vel Purgatoria. Alteratoria est Similis, vel Dissimilis. Simile mistum est, quod è toto est Bezoarticum, vel ferme è toto, vt *theriaca*, quæ in ampliore dosi interficit, ad similitudinem magnæ flammæ. Dissimile mistum, quod tota forma contrarium, vt *napellus*. Purgatoria seu attrahens qualitas constituit medicamenta purgantia. Purgantia attrahunt sanguinem, vel alios succos. Quæ sanguinem trahunt, admodum sunt venefica, nec ulli hominum cognita: quidam enim qui hoc vsus erat veneno, ligatis oculis ad supplicium ducebatur, ne hoc pestiferū aliis patefaceret: vt Galenus prodidit memoriæ. Purgantia reliquos succos, dupliciter redduntur venefica, primo, si nimis intensa & violenta est eorum actio, vt in *veratro albo*, quod interficere potest, licet non euacuet humores. Secundo, dum immodicam succorum quantitatem alliciunt in superpurgatione, vnde postremo etiam sanguis vacuatur, & homo perit: hoc vitium non tantum committi potest à vehementi medicamento, vt à *veratro albo*, sed etiam à mediocri, vt ab *agarico*, à *rhubarbaro*.

*Recondita
& alteras
veneni
qualitas.
Purgato-
ria.*

Porro doctrina purgantium magni est momenti, & diligenter tradenda. Omne purgans attrahit ratione similitudinis. i. propter similem proprietatē cum proprietate humoris

*Purgantia
attrahunt
ratione si-
militudi-
nis.*

euacuandi:

euacuandi: vnde proprietates purgantium, similis est proprietati corporis humani: humor enim qui à purgante attrahitur, non semper est veneficus, sed sæpe excrementitius vel secundum, vel præter naturam: tale autem excrementum naturale, corpori nostro est simile, & quoque salutare (nisi in quanto vel quali peccet) quare etiam purgans hoc excrementum simile est corpori nostro.

Purgantia tum simile est corpori nostro. Purgantia medicamenta, secundum Galen. cap. 24. & 25. libr. 3. simpl. alia habent permixtas portiones alimentales nullas veneficas, ut *Syrupus rosæ* *lut. cassia*, & forte etiam *rhabarb.* quæ si non purgant, sed à corpore vincuntur, mutantur in humorem familiarem, & in alimentum, ut *rhabarbarum* in sanguinem biliosum: alia permixtas habent portiones veneficas (hæc tamen non attrahunt ratione portionis veneficæ, quæ dissimilis est corpori nostro, sed ratione ammissæ portionis alimentalis) ut *cammonium*, *turbith*, *colocynthis*, utrumque *veratrum*: & hæc si non purgant, corrumpuntur in corpore, & generatur materia venefica: nec enim portio alimentalis, propter portionem veneficam vinci potest.

Num pur- Hic autem dubia quædam soluenda sunt. Primum: *gantia si-* in purgantibus sit portio similis proprietati corporis humani, seu *milia sint* humorum? Negatur hoc: primum, quia Galenus in lib. quos *corporibus* purg. &c. ait, si medicamentum detur corpori sano, non fieri euacuationem, sed colliquationes: si non sit euacuatio, & *mano.*

1.

tamen omnis generis humores in corpore sano existunt: medicamentum sane non trahit ob similitudinem: alias enim in corpore sano etiam traheret? Responsio. Purgatio hic nulla sequitur, non quod soluens simile non sit humori, sed quia materia humorem gratum non expellit, sed eum retinet, & medicamento soluenti refragatur: vnde colliquationes fiunt, & difficiles purgationes. Secundo sic negatur: 2. Theriaca inhibet vim purgantiam, ob proprietatem suam, quæ dissimilis est proprietati medicamenti, est autem similis proprietati corporis nostri. Quod sit theriaca similis est corpori nostro, & dissimilis medicamento: quomodo medicamentum simile erit corpori nostro? Responsio: theriacæ proprietates maximæ sunt actiuitatis, & agit tam in veneficam, quam in similem medicamenti proprietatem, eiusque actus secundos tollit: sicut magna flamma dissipat minorem: maior enim actiuitas minorem superat.

Dubitatur etiam, quænam proprietates maiori sit actiuitatis, medicæ.

medicamentine, an vero humoris? Et ratio esse videtur, proprietatem in humore esse efficaciorē, quia humoris maior est quantitas: in maiori autem quanto vis maior. Responsio: medicamenti vis maior est: nam attractio fit ratione alicuius indigentis: sicut caro sanguinem attrahit, quia eget sanguine, non contra. Sic magnes est quasi rudimentum ferri, & attrahit ferrum, non attrahitur à ferro. Rhabarb. est quoddam bilis rudimentum: & propterea bilem attrahit, non attrahitur à bile. Ut autem hæc rectius intelligantur, & ut Galeni sententia defendi queat contra Auicennam, (qui ait, si attractio fieret propter simile: tunc ferrum attrahi potius a ferro, quam à magnete: sciendum proprietatem esse triplicem: genericam, specificam, & individualement. Generica, ut animalis. Specifica, ut humana, equina, gallinacea, &c. Individualis, vel determinati individui, ut Socratis: vel partis determinatæ, ut iecoris, cordis, &c. Iam proprietas similis in similem debiliorem agit, non eadem in eandem: ut proprietas animalis, non agit in proprietatem animalis, sed plantæ: Proprietas humana, non agit in humanam, sed in bouinam, gallinacæ, &c. Proprietas individui Socratis, non agit in proprietatem individualement Socratis, sed in proprietatem individualement alterius individui. Proprietas iecoris non agit in proprietatem iecoris, sed in proprietatem lienis, ovis, &c. in eodem individuo: unde omnium partium conspiratio, & consensus mutuus.

Quæritur, num omnia purgantia sint venefica? quod Galenus asserere videtur comm. 12. lib. 2. de vict. ratione. Ut hoc dissolui queat, notandum, purgantia alia esse vehementia, alia debilia. Vehementia sunt, quæ cum impetu attrahunt, & à partibus remotis, & tollunt impedimenta, quæ purgationem tardare possunt: Si enim impedimentum est in humore crasso & viscido: medicamenta ob calorem & amaritudinem attenuant ac detergunt: Si in viis est obstructio à crassis & viscidis humoribus: medicamenta hos detergunt: si expultrix sopita sit: excitatur medicamenti mordacitate & malignitate. Et hæc vehementia purgantia sunt venefica: de quibus etiam Hippocrates & Galenus loco citato loquuntur, ut de poplo, de veratro, &c. Debilia purgantia sunt, quæ attrahunt à proximis, nec impedimenta remouere possunt. Et hæc non sunt venefica: nihilominus & hæc corrigenda sunt, propter os ventriculi quod sincera purgantia ferre

Quam
purgantia
sint venefica.

nequit. capite vltimo, libro tertio de simplic,

*Quomodo
pharmaca
interficiantur.*

*Quo ordi-
ne humo-
res in vni-
uerso
educantur.*

Denique cognoscendum, *quomodo pharmaca sint venenata* nimirum dum non castigata, & in maiore dosi exhibentur: tunc enim fit *ὀνίξ καὶ φρενός*, id est, sanguis euacuatur, & mors sequitur, ob dissipationem caloris vitalis. Cur autem fiat superpurgatio, patet e fine libri 2. de elementis, vbi dicitur, & in nutritione & in purgatione fieri attractionem non modo conuenientis, sed etiam noxij. Vt in nutritione, si caro sit temperata, & sanguis frigidior, caro etiam optima attrahit sanguinem frigidiores. Sic in purgatione, principaliter quidem attrahitur humor familiaris: sed in superpurgatione, cum succus familiaris attractus est, trahitur humor qui proprius euacuatur, id est, qui magis est fluxilis, & simul magis familiaris humori qui primo fuit attractus. Vt, si rhabarbaro bilis educatur, post bilem vacuabitur pituita (*licet enim sanguis magis sit fluxilis, pituita tamen magis familiaris est succo bili-oso, quam sanguis, ac proinde prius educitur*) mox melancholia, quæ minus est fluxilis quam pituita, & licet crassior sit ac minus fluxilis, quam sanguis, prius tamen euacuatur, quia familiarior est succo bilioso, & pituitoso, quam sanguis: quia illi succi sunt excrementitij: postremo sanguis euacuatur, qui succus est alimentalis. Hic tamen notandum in superpurgatione à scammonio non omnem prorsus vacuari bilem, antequam sanguis effluat, sed maximam saltem eius partem: vita enim sine 4. succis stare non potest. com. 33. lib. 1. de natura humana. Præterea superpurgatio non tantum fit propter pharmaci attractionem: sed potius propter læsam retentionem & expulsionem: cap. 27. & vlt. lib. 3. simpl. Quia enim in superpurgatione, succus familiaris eductus est: non restat alius familiaris medicamentum succus, ac proinde maxima e parte cessat attractio, quia agens non agit, nisi absit patiens. Fit ergo tunc superpurgatio læsa retentione & expulsionem: læditur autem facultas retentrix ob morbum vasorum, qui vel in via est, vel in intemperie. In via vasorum, id est, nimia apertione orificiorum, propter copiam & impetum materię expurgatæ. In intemperie, & præsertim frigida, quia in *ὀνίξ καὶ φρενός* partes corporis ita fatigantur, vt calor hebescat, vasa refrigerata langueant, nec succos detinere queant. Læditur ergo expulsio, non læsa facultate, sed ob errorem externum: qui sumitur e praua qualitate, seu acrimonia medicamenti purgantis. Hæc de venenorum differ-

*Alia super-
purgationis cau-
sa.*

rentiis,

rentiis, quæ è causa efficiente formali, & materiali desumuntur. Auicennas etiam à corpore patiente sumit differentias: quæ facile è dictis patebunt.

CAPVT III.

De signis Venenorum.

Venenum in genere modo facile, modo difficulter cognoscitur. Facile: si in corpore agit, vt appareant symptomata venefica, syncope stomachi, anxietas, pallor totius corporis, pulsus imbecillius, &c. Difficulter: si venenum non agit, sed otatur, quia est in minima copia, & in partibus remotis: & tunc considerandæ sunt causæ prægressæ: ac dispositio patientis. Causæ prægressæ: si forinsecus accedit venenum: vt si quis à cane rabido sit demorsus, facile suspicatur venenum latitare: Ita si quis cum inimicis, & veneficis versatus est. Dispositio patientis: si intus venenum latitat: quories corpus est insalubre, vsum est prauis cibis, dum est suppressa consueta euacuatio vel seminis vel sanguinis.

Signa veneni in genere.

Signa differentiarum: & primum num in corpore venenum sit genitum, an extrinsecus accesserit? Si igitur homo sanus repente moriatur, cadaver foetet: liuescat præter consuetudinem cadaveris, foris accessit venenum: si vero corpus insalubre fuit refertum prauis succis, & euacuatio consueta fuit cohibita, venenum intus genitum ipsum iugulauit: vt Galenus docet cap. penult. lib. 6. de loc. affect. In corpore viuente eadem est ratio.

Num genitum sit in corpore, an extra.

Si in corpore genitum est venenum, vel Extra venas, vel In venis. Si extra venas: an à sanguine grumescente, in cavitatibus, vt ventriculo, vesicæ: confugiendum ad signa particularia, de quibus in doctrinâ de sanguine grumescente. Si in venis: hæc signa non aderunt, sed potius erunt signa febris pestilentis, prægressa est suppressio seminis, vel sanguinis menstrui.

Num in venis, an extra venas.

Si extra corpus generatum est venenum: vel ab elementis procedit, vel à mistis. Si ab elementis: signa sunt impuritatis elementorum, de quibus in febre pestilenti. Si à mistis: facile cognosci potest, an procedat à mistis animantis: modo clam non sit exhibitum: hoc enim cognoscere fere est impossibile.

Num ab elementis, an à mistis.

Haftenus de signis differentiarum à causa efficiere: sequitur de signis differentiarum à causa materiali, id est, à subiecto veneni.

Signa subiectorum veneni.

Ratione igitur subiecti, veneni qualitas est spiritalis, vel corporea. *Spiritalis* cognoscitur, si aliquis afficitur post serpentem hasta percussum, item post aspectum basilisci, & quoties præsens fuit animal, quod quantitatem veneficam spiritalem impertiri potest. *Corporea* qualitas est terrestris, aquea, vaporosa. Terrestris: si venenum in puluere est exhibitum: aquea: si in diluto & destillato: vaporosa, si homo solo odore afficitur.

Signa qualitatis manifesta veneni. Sequuntur signa differentiarum à causa formali. Venenum calidum, simpliciter calefaciens, indicatur, cum patiens feruorem in capite sentit: afficitur siti, & corpus tactu calidum apparet, venæ turgentes conspiciuntur. à calido enim veneno sanguis funditur, vnde etiam oculi rubent. Venenum calidum corrosiuum, indicatur ex insigni ventriculi dolore. Putrefaciens indicatur è graui & inuicundo corporis odore: ructus enim & anhelitus sunt fœtidi. Putrefactiuum autem modo intense, modo remisse calidum est: si intense, signa erunt intensæ caliditatis. Frigidum simpliciter refrigerans, cognoscitur è somno profundo, stupore, absentia sitis, è frigiditate totius corporis. Frigidum constipans, seu angustans, adiunctam etiam habet difficultatem anhelitus. De sicco & humido, nil Auicennas: nec enim hæc facile dantur, nisi caliditas, vel frigiditas absit. Siccum tamen à macie & tabe indicatur. Humidum ex insigni corporis imbecillitate, vt statim corpus iusto grauius euadat: ob nimiam enim humiditatem ligamenta laxantur, vt membra quasi onerosa fiant.

Signa qualitatis alterantis. Hæc de qualitate manifesta. Abdita est alterans, vel purgans. *Alterans*, est similis corpori, vel dissimilis. Si simile sit quod exhibetur, vt theriaca, tunc (licet alias salutare esset) pestiferum euadit, quia datur in maiori dosi, quam oportet, & hoc exhibitum est, vel à plebeio, ab empirico, vel à medico indocto. Si autem à docto daretur: cognosci non posset, cordis enim proprietatem dissipat, propter summam actiuitatem: sicut magna flamma minorem exstinguit: & minus adhuc cognosci posset, si nec sit amarum, nec ingrati odoris: vt homo pereat, antequam sciamus venenum esse in corpore, & post mortem nulla veneni apparent vestigia. *Alterans* qualitas dissimilis cognoscitur, quia mutatur pulsus, fit syncope, erumpunt sudores frigidi, præsertim in fronte: maxime si napellus assumatur.

Qualitas

Qualitas purgatoria. Si purgatur sanguis, facile cognoscitur: huius generis tamen venenum nemini notum, hoc secundo. Si purgans materia alios attrahat succos: bifariam nocet: intensiue, id est, actione violenta: & extensiue, id est, actione immo- dica. Si laedit intensiue: fiunt tormina, conuulsiones, nec corpora euacuuntur. Si extensiue, insignis fit euacuatio.

A dispositione corporis etiam sumuntur differentiae, quae facile cognoscuntur. Si enim venenum agit in totum corpus: non est noxa aliqua in membro particulari. Si agit in partem determinatam: noxa in primis in parte illa percipitur: verbi gratia, si cantharides assumantur, patiens noxam sentit in vesica.

Hoc igitur modo prima venenorum genera cognoscuntur. De speciebus enim specialissimis, in capitibus propriis agendum erit. Monet autem Auicennas, indicia à visu, olfactu, & sapore sumi posse: è visu, vt si quis euomat hydargyrum: ex olfactu, si quis percipiat odorem opij: è sapore, eadem ratione.

CAPVT IIII.

De praesidiis venenorum.

Gemus iam de curatione veneni in genere: specialia suum in locum seruantes. Praesidia igitur ab essentia veneni sumenda sunt. Et quoniam venenum est qualitas corruptiua cordis hominis: necessario indicationes praesidiorum sumuntur à qualitate, à corde, & ab homine.

Praesidia quae sumuntur à veneno, seu veneni qualitate, sunt alterantia vel euacuantia, vt colligitur è c. 7. li. 3. de loc. aff. & c. 6. li. 13. meth. & c. 18. li. 3. simpl. Alterantia sunt, modo calida, modo frigida, modo à proprietate occulta iuuant: prout varia est veneni qualitas. Nos potissimum agemus de alterantibus per qualitatem reconditam. Auicenn. remediū bezoarticum ita definit, c. 4. fen. 1. li. 2. Albezoar est remedium, quod pro sua proprietate conseruat sanitatem & virtutem in spiritu, vt veneni noxam à se expellat. Vnde colligitur bezoarticum habere proprietatem similem proprietati corporis humani. Patet etiam hinc bezoarticum extirpare venenum, non quod agat in venenum, sed quia agit in corpus humanum, & illud roborat, vt veneno expellendo sufficere queat. Et sic venenum à bezoartico quasi per accidens curatur: bezoarticum per accidens, & mediatè in venenum agit.

ticum enim non agit in venenum, sed per similem proprietatem (quæ tamen maioris est actiuitatis) corpus immutat, vt huius actus secundus, vi veneni iam deperditus, reuocetur. Hinc Galenus cap. 18. lib. 5. simp. ait bezoartica obtinere mediam quandam naturam, inter corpus humanum, & venenum: vt, quæ est proportio corporis humani ad bezoarticum, eadem sit bezoartici ad venenum. Quo dicto significatur ita administrandas esse antidotos, ne si largiore dosi exhibeantur, maxima sua actiuitate corpus lædant. Sicut enim bezoarticum vinci non debet à veneno ita etiam corpus à bezoartico, vinci non debet. Ait etiam loc. cit. bezoarticum esse medium inter medicamentum, & venenum: medicamentum enim iuuat, venenum interficit: bezoarticum iuuat si recte administretur, & interficit, si non recte, sed in maiore dosi exhibeatur. Præsidia euacuantia explicantur: cap. 15. lib. 5. simpli; & hæc vacuant qualitate vel manifesta, vel recondita. Manifesta qualitas attrahit, vel calefaciendo simpliciter, vel simul abradendo & corrodendo cuticulam, atque excitando vesicas. Simpliciter calefaciens, est remedium calidum, & tenuis substantiæ, quod venenum è profundis, id est, è centro ad circumferentiam attrahit. Corrodens & abradens, est calidum & crassæ substantiæ, cuius ope parti adhæret: vnde abradit, doloremque excitat: Et sic vacuatio fit non tantum per attractionem caloris & doloris, sed etiam per modum receptionis, quia pars redditur imbecillis, & proinde apta ad recipiendum. Occulta qualitas vacuat non per expulsionem, sed per attractionem, propter proprietatem, similem proprietati veneni: vnde Galenus ait, omne venenum vacuari à medicamentis extrinsecus applicatis. Quod tamen dictum non ita est intelligendum, tanquam venena semper sint applicanda, & nunquam exhibenda: nam & cantharides, & hydrargyrum vtiliter nonnunquam exhibentur: tutius tamen est, venena applicare, quam exhibere. Venena autem applicanda sunt, non aduersissima corpori humano, quæ interficerent: sed quæ mediam quandam naturam habent inter corpus humanum, & venenum: vt est caro vipera, caro scorpij: quæ media sunt ratione actiuitatis & similitudinis, non enim sunt summæ actiuitatis, vt arsenicum, nec proprietatis vel omnino similis, vel admodum dissimilis.

2. Præsidia à corde indicata. Hæc de præsijs quæ à veneno sumuntur. A corde languente indicatur remedium cor roborans: & hoc vel eu-

dens

dens est, vel occultum. Euidens est, quod cordis calorem & complexionem conseruat. Reconditum est, quod cordis proprietatem respicit: & est bezoarticum. Bezoarticum autem requiritur, veneno & præsente, & imminente. Si præsens est venenum: tum bezoarticum requiritur, ratione & ipsius veneni, & proprietatis cordis. A veneno enim requiritur aliquid, quod proprietatem veneno habeat contrariam, vt virtute huius remedij, ab expultrice cordis venenum expellatur. Cordis autem proprietas postulat remedium simile; quo roboretur, ad resistendum proprietati veneni. Quatenus ergo bezoarticum requiritur à veneno, est præseratorium: quatenus requiritur à proprietate cordis, est vitale. Si immineat venenum, in aere pestilenti, vel ab hostibus: requiritur bezoarticum, quod cor ita roboret, vt si forte ingrat venenum, homo non pereat. Bezoarticum igitur sanitati etiam tempore requiritur à proprietate cordis (*non à veneno, quod præsens non est: cum tamen indicatio à præsenti sumatur*) tanquam remedium vitale.

Halucinatus ergo AVERROES est, qui materiā bezoartican tempore sanitatis non admittit: nam & experientiam labet repugnantem, & rationem. Si enim bezoarticum exhibitum, præsente veneno, non dissipat cordis proprietatem, multo minus absente veneno destruet: nam cum venenam in cor agat, si in bezoartico facultas est dissipandi cordis proprietatem, adhuc magis destruetur ambabus causis coniunctis, quam si vna tantum adest. Sed forte excusari potest Auerroes, hoc modo: Bezoarticum duplex est: alterum maximæ actiuitatis, præditum tamen proprietate simili proprietati cordis è toto, vt est *confectio Misbridatica*; quæ sanis etiam dari potest. Alterum non est tantæ actiuitatis, & habet proprietatem mediam inter corpus & venenum, qualis est *caro vipera*, & *scorpij*, extracto inde veneno: & hæc tempore sanitatis præter rationem exhibentur: de quibus etiam locutum esse Auerroem vero est simile.

Præsidia etiam à toto sumuntur. Nam repletio corporis prohibet, quo minus tuto & festinanter liceat venenum expellere, cap. 7. libr. 3. de loc. affect. Quare si corporis repletio est æqualis, indicat remedium euacuans: si inæqualis: purgatorium, seu electiue ducens.

*Dubium est
Auerroes.*

*3. Præsidia
à toto sum
pta.*

De prognosticis venenorum.

Rinum proponemus prognostica differentiarum à causa formali & materiali: nec enim causæ efficientes hic perpenduntur. Secundo signum trademus lethalia, è quibus sciamus, num homines sanitati possint restitui, nec ne.

Prognostica differentiarum à subiecto. Quantum ergo ad differentias à subiecto: qualitas spiritalis est efficacissima, præcipue quia non habet determinatum subiectum, & momento per corpus in cor irruit, nihil quod resistat inueniens. Non est tamen omnino desperandum: inuenitur enim remedium, cor ita roborans, ut qualitas illa spiritalis dissoluatur, sicut tenebræ dissipantur à lumine Solis. Qualitas materialis, si subiectum sit determinatum, minus est periculosa, & præsertim si subiectum sit terrestris: magis periculosa, si subiectum sit aqueum: adhuc magis, si aereum: celerissime enim homines per prauos odores intereunt.

Prognostica differentiarum à causa formali. Quantum ad causam formalem. Venenum agens à tota forma est magis periculosum, quàm manifesta agens qualitate: in corde enim duo sunt, complexio & proprietates complexio stante vita mutari potest: proprietates, maxime penes innotum, mutari nequit: quamprimum enim admittitur actus proprietatis, id est, motus, homo statim moritur: quia mors nihil est aliud, quam quies & immobilitas cordis. Inter venena autem à tota forma, illud magis est pestiferum, quod est

Prognostica cum qualitate manifesta. maioris actiuitatis. Qualitas manifesta in genere, prout instrumentum est maioris, vel minoris actiuitatis, pro eo etiam vehementiores habet operationes. Non solum enim numerus graduum, sed etiam vis & vehementia (quæ à forma substantiali procedit) attendi debet: opium enim venenum est, non aqua: quia frigiditas aquæ est organum formæ elementaris minimæ actiuitatis, frigiditas autem opij, est organum formæ misti, quæ forma corpori nostro est contraria. Sic euphorbium est venenum; non sinapis: licet utrumque in quarto sit calidum. (Ut autem melius hac intelligantur, paulo erunt altius repetenda, Formam misti, est Similis corpori humano, vel Dissimilis. Si similis, est Altiua, vel Passiua. Passiua: cum mi-

Qualitates venenorum agunt pro ratione formæ, magis vel minus efficace. nus est illud est alimentale, nam alimentum patitur à corpore. Quo fit, ut qualitas, quæ est organum formæ minimæ actiuitatis, pa-

rum etiam agat. Hinc theriaca calida in primo, magis calfacit quam piper vel sinapi, qua calida sunt in quarto, & pueris piper dare possumus, non theriacam: caliditas enim piperis & sinapi est organum forma alimentalis passiva: caliditas autem theriaca, est organum forma quidem similis, sed summa activitatis, cui corpus cedit, non resistit, ut calor in habitum corporis imprimatur. Idem de forma dissimili, seu venefica statuendum. Lices enim omne venenum corpori humano à toto forma sit contrarium: hac tamen forma interdum est summa activitatis, interdum minima, interdum mediocris. Hinc venena; qua formam habent maxima activitatis, homines interficiunt: etsi in calido, frig. hum. sicco sit summus excessus: ut est napellus. Venena autem qua exiguam habent activitatem, non dicuntur agere à tota forma, sed per manifestas qualitates intensas, ut euphorbium, opium, &c. qua tamen ipsa non interficerent, nisi organa essent forma contraria. Hinc ergo patet, in venenis manifesta qualitate agentibus, vim & actionem vehementem, seu veneficam; dependere è qualitatibus, quatenus sunt organa forma contraria. Præterea siue venena sint calida, siue frigida: celerius nocent corpori calido, quam frigido: in calido enim vis ipsorum citius ad cor perducitur. Calida & frigida venena magis sunt periculosa, quam humida & sicca: quia illa maioris sunt activitatis, si venena calida cum frigidis comparemus, cæteris paribus, calida magis sunt periculosa, ut cito, & in exigua quantitate homines lugulare possint: Frigida vero à natura superari possunt: ut alimentales portiones in alimentum vertantur, veneficæ extra corpus protrudantur.

Signa lethalia sunt sequentia symptomata, quæ de salutē hominis desperandum esse indicant, secundum Avicennam c. 4. I. Syncope, quæ cor insigniter affici ostendit. II. Si pupilla occultatur, indicat vehementer lædi cerebrum, ob consensum cum corde: cor enim si læditur, spiritus vitalis extinguitur: hic cum materia sit spiritus animalis, animale etiam languere necesse est: vnde insignis in pupilla fit mutatio. III. oculorum rubor, ob noxam cordis, ita cerebrum lædi arguit, ut sanguinem continere non valens, in oculos defluere sinat. IIII. Si lingua intra os detineri nequit: quoniam ita languet cerebrum, ut partes relaxentur. V. Si pulsus cadit, & non percipitur, maxima cordis noxa est. VI. Sudor frigidus significat maximam imbecillitatem secundum omnes corporis partes, ita ut partes alimentum proprium non possint con-

Signa de-
viciis.

tinere, vnde humiditas alimentalis erumpit. Quod si ergo hæc conspiciantur signa: spes salutis nulla relinquitur: contra; si non appareant.

CAPVT VI.

De materiis praesidiarum.

Cito agendum.



Roponemus materias cheirurgicas, medicinales & dieteticas, in genere: in quibus etiam rectam administrationem, quantum licet in curatione generica patefaciemus. Cōmune autē est cuilibet materiae circa rectā administrationē seu *Quādo agendum*, vt adhibeatur celerrime, antequam cor à veneno petatur.

I. Materia cheirurgica. Phlebotomia.

Materia cheirurgica sunt Venæsectio, Fonticuli, Vesicatoria. Venæsectio locum habet in veneno calido, si corpus sit refertum sanguine, qui vi venenī necessario acrior & feruidior est redditus: quinetiam funditur sic sanguis, & fusus ampliore occupat locum, vnde venæ apparent turgidæ. Si ergo hoc indicans principale adest, & virtus vel coindicat, vel saltem permittit: vena est aperienda: quæ & per se confert, & per accidens, totum corporis habitum refrigerando. In veneno autem frigido à tota forma, licet corpus indigeat venæsectione: hæc tamen administrari non debet: veneno enim frigido adeo repente corpus refrigeratur, vt virtus nequaquam possit sustinere venæsectionem: geminaretur enim refrigeratio.

Fonticuli.

Cauteria etiam probantur, quibus corpus ab excrementis mundatur, vt non tantopere à veneno lædatur. Probantur autem potius pro præseruatione ante venenum, quam post, id est, in aere pestilenti: potius ante febrem, quam tempore febris: item potius ante sumptum venenū, quam post: ratio est, quia fonticuli non euacuant superfluitates, nisi post remotionē crustæ, quæ excitatur ab igne, vel à caustico: at hic cito opus est auxilio. Post venenum tamen, non omnino negligenda sunt cauteria, si modo venenum non sit admodum copiosum: vt inter initia morsus canis, dum venenū adhuc est exiguum. Notandum etiam, vt quamprimum eschara remoueatur, primo aut secundo die: alias tamen in morbis chronicis solent demum remouere die octauo, aut quindécimo, aut etiam vigesimo.

Vesicatoria.

Vesicatoria spatio trium aut quatuor horarum, euocant venenum.

Cum

Cum Auicenna etiam licet vti ligaturis, frictionibus, cucurbitulis siccis : vt venenum retrahatur à corde, in partes ignobiles.

Materiae medicinales proponuntur à Galeno cap. 18. lib. 5. simpl. Sunt autem vel Euacuantes (quo pertinent Epispastica, id est, attractoria, ratione vel caloris, vel similitudinis) vel Alterantes. De euacuantibus primum dicendum : quia hæc & substantiam, & viam veneni tollunt : alterantia vero substantiam non adimunt : Prius ergo de remedio efficaciori, id est, de vacuante. Vacuans, aut ratione Copiæ vacuat, aut ratione Qualitatis. Vacuante ratione copiæ, vti possumus in quocunque veneno, siue cognito, siue incognito, cap. 7. lib. 2. de antid. Est autem medicamentum *hydrelæum* dictum : vnde hoc vti possumus : *R. aqua 3 x. olei maturi vel communis vel amygd. dulc. 3 iij. Mif.* Hoc medicamentum per vomitum euacuat, & qualitate sua omnem veneni vim attemperat, siue calidum sit, siue frigidum : accedit enim ad temperiem. Præterea efficit hoc medicamentum, vt venenum in corpore existens non ita facile possit partibus adhærere, nec abradere queat, licet sit corrosiuum. Sic etiam si corporis pars hoc inungatur, nulla ab adhibitis vesicatoriis (vt à cantharidibus) fiet corrosio, quia prohibet substantia oleaginosa, & pinguis. Oportet autem hoc medicamentum in magne copia dare 3 iij. vel xv. summa enim cum sit veneni actio, summam etiam exhibere dosin conuenit. Oportet etiam dare quamprimum : quia nihil prohibet, & adest præsentia indicantis urgentis. Pluribus etiam vicibus hydrelæum est dandum, bis aut ter, in summa dosi, donec venenum sit vacuatum. Sed quia venenum aliquando in ventriculo residet, aliquando in intestinis : propterea Auicennas hydrelæo etiam alia ammiscet, quæ per inferiora venenum educunt : nimirum *semen lini mercurialis decoctum, cinerem è vitis confectum ramentis*. Aduertendum etiam, az aliquid noxi post vomitum succedat, vel propter venenum, vel propter vomitorium. Si vis veneni sit noxia, post vomitum probat Auicennas *exhibitionem lactis, vel crudi di pasius butyri*. Si vomitorium lædat, ita, vt maximus ipsius impetus, ac violentus motus, inflammationem oesophagi excitet : conuenit exhibere *lac refrigeratum, aquam hordei, imo oleum rosaceum frigidum*. Quod si venenum in inferioribus subsistat partibus, probatur purgans per inferiora, ne id

4. *Materiae medicinales.*

Vacuatiua; Primæ expellentiæ.

1. *Ratione copiæ hydrelæum.*

Noxa à vomitu vs succurrendum.

Purgatio per inferiora.

tamen

tamen sit veneficum. Maxime autem laudatur *agaricus*, qui portiones habet bezoarticas, & alexiterias: euacuat autem venenum non per se, sed per accidens: per se enim ob proprietatem similem pituitæ, attrahit succos pituitosos, & sic ex accidente venenum etiam euacuat. Semper tamen obseruandum, vt purgans medicamentum exhibeatur, quod humori in corpore redundanti respondeat. Optimum etiam est secundum Auicem. confugere ad clysteres, acres quidem, si in superioribus intestinis venenum (vt sic à partibus longinquis attrahant) mites vero si in inferioribus. Nunquam tamen, siue in superioribus, siue inferioribus intestinis venenum contineatur, à pinguibus oleaginosiis desistendum: quæ scilicet veneno transeunti occurrunt, ne intestinis adhæreat, sed facile præterlabatur.

Clysmi.

2. *Ratione
qualitatis
vacuatis,
seu ab-
sistentia.*

*Calida at-
trahentis.*

Hæc de iis, quæ ratione copię vacuant. Sunt etiam non nulla, quæ potius qualitate, quam quantitate euacuant: non expellendo, sed attrahendo. Attractio fit qualitate vel Manifesta, vt caliditate: vel Occulta; sed simili.

Quantum ad caliditatem, Galen. cap. 7. lib. 3. de loc. affect. probat medicamentum è *thapsia*, *sinapi*, *simo columbino*: Quæ tamen medicamenta probantur, quoties venenum non est in ventriculo, id est, si non est per os exhibitum, sed potius applicatum aut ingressum per inortum alicuius animalis: tunc enim propter subsistentiam per partem demorsam venenum educitur. Quod si exhibitum venenum in ventriculum commearit, & hinc in venas: subsistentia non amplius est in parte determinata, sed in toto corpore: vnde calefacientia toti corpori applicamus, quæ venenum à centro ad circumferentiam attrahant: & huius generis est *balsum aqua dulcem calidum*: quod vna cum bezoarticis usurpari potest. Eodem etiam modo confert, si magna anima in, vt equi, boves, &c. discendantur, & in horum ventres potiones colloentur, hoc enim

*Ratione si-
milisudi-
nis atra-
hentis: pri-
mum si ve-
nenum non-
dum est
presens.*

In viris principibus experientia comprobatum est. Quantum ad qualitatem occultam, seu ea quæ ratione similitudinis attrahunt: videndum num venenum sit in corpore, necne? Interdum enim licet venenum nondum sit in corpore, vt i-
mur tamen materia vacuante, quæ mediam habet naturam inter corpus & venenum, cap. 14. lib. 3. simpl. & proinde tutius hæc applicantur, quam exhibentur: quale est hoc, quod axillis applicatur: & *arsenici* 3 j. *dictamni cretici* 3 j. *sinapi*, *cinnamomi ana* 3 ss. *nos. lib. 3. iij. ambræ* 3 iij. Ratio huius medica-
menti

menti est talis: Arsenicum admodum efficax est venenum: cum autem opus sit materia, quæ nec à toto sit venefina, nec corpori omnino similis (alias enim non attraheret venenum) propterea arsenicum corrigimus, ea tamen ratione, ne ipsius operatio, id est, attractio impediatur: miscemus ergo dictamnum, sinapi, cinam. moschum, quæ proprietates corpori nostro similes habent, & è parte yim arsenici deleteriam summam corrigunt, non tamen omnino adimunt, quia in parua quantitate miscentur, quia etiam calida sunt, id est, tractionem iuvantia. *Obiectio. Indicatio sumitur à presenti: Si venenum nondum est in corpore, quomodo indicatur arsenicum. Elia, unde* *Prophyl-*
venenum nondum est in corpore, quomodo indicatur arsenicum. Elia, unde
indicetur.
 Responsio. In aëre pestilenti, ubi venenum imminet, vitimur arsenico, tanquam materia remedij requisiti à veneno presenti, licet nondum sit in corpore: ope enim arsenici, cum venenum in corpus ingreditur, euocatur & attrahitur extra corpus. Quod si venenum actu est in corpore, vel Ignotum est, vel Notum. Si ignotum: vitimur arsenico, ex aliqua parte tamen castigato, quod ratione similitudinis, & vehementis attractionis, quodlibet venenum potest attrahere. Notum venenum vel apit tota Forma, vel manifesta Qualitate: & in hoc satius est uti determinata materia: ut, si quis morsus esset à scorpio, satius esse scorpionum applicare, quam arsenicum: si à vipera, carnem viperæ; si à cane rabido, ventres cantharidum. *Dubatur autem, qua ratione scorpini morsus proprio venenum præferat? Respondetur: ante scorpionum applicationem, venenum cum impetu in cor ruit: post applicationem vero, venenum illud è corpore trahitur: ne amplius ad cor ruat: attrahens enim vi magis est efficax in scorpio, quam in eius veneno: sicut etiam alias caro trahit sanguinem, non contra. Errant igitur, qui negant scorpionum suum venenum extrahere: quod simile trahat simile, non idem, idem. Hic enim non est identitas, sed similitudo, cum duo sint mista, Caro scorpionum, & Venenum contentum, non continens: caro igitur proprietate simili attrahit venenum. Vnde etiam fit, ut in scorpionum morsu, idem scorpium probetur, à quo patiens est morsus, quia per morsum maxima è parte venenum est imminutum: cuius argumentum est etiam hoc, quod si scorpium duo mordeat individua, magis primum afficitur, quam secundum, quia ab initio venenum magis copiosum est ac deleterium. Cum vero scorpium præsens non est, probatur à scorpium, quod similitudinem habet carnis, ac mediam naturam*
Attrahens venenum, ut in corpore existens.
Quomodo scorpium morsus proprio me-
deatur.

inter

Carni viperæ & scorpij, calida sunt addenda. inter corpus & venenum. Quoniam vero secundum Auic. in carnibus viperæ & scorpij, debilis attrahendi vis est, cū mediam naturam habeant inter corpus & venena: iis semper addenda sunt calida, attractionem promouentia, vt *sinapi, euphorbium*. Hæc autem attrahentia, aliquando applicanda sunt parti demorsæ, aliquādo axillis, interdum vtriusque: sumpta indicatione à veneni subsistentia. Si enim venenum per os sit exhibitum: tunc quoniam facile fieri potest, vt venenum in corde habeat subsistentiam, medicamenta sunt axillis applicanda. Si homo ab animali venefico morsus fuerit: tunc inter initia parti demorsæ medicamenta applicanda: si morsus recens non sit: tunc medicamenta & parti demorsæ, & axillis applicanda: temporis enim progressu, cor petit venenum: vnde duplex substantia veneni, duplicem etiam applicationis locum indicat. Et hæc de materia medicinali vacuante.

Alterantia bezoartica. Alterantia medicamenta, vel alterant per qualitates Reconditas, vel per Manifestas. Primum autem agendum de his quæ agunt per qualitates reconditas: his enim vti licet, non tantum ad venena à tota forma agētia, sed ad ea etiam, quæ qualitate eidenti agunt, vt *opium*, quoniā hæc quoque formam habent cōtrariam. Agentia igitur à tota forma, si venenum in corpore non adest, sunt materia remedij præseruatorij, & requiruntur à proprietate contraria veneno: si autem in corpore sit venenū, sunt materia remedij vitalis, & requiruntur à proprietate cordis. Hæc autē medicamenta, siue venenum exhibitum sit notum, siue ignotū, sunt materia remedij bezoartici. Præstantissima autem proponuntur alexiteria & alexipharmaca *Theriaca, & Mithridatium* c. 1. l. 1. de antid. c. 1. l. 2. de antid. à Galeno, & c. 4. ab Auicenna. De horū vsu pauca dicenda, quia multi medici peccant. Theriaca superat mithridatium in vno veneno viperino: in morsu enim viperæ vtilius theriaca, quam mithridatium exhibetur. In reliquis autem venenis (præter calida) mithridatium vtilius quam theriaca datur: vt si venenum est incognitum, non tamen viperinum: si agit à tota forma: si agit frigiditate. In venenis calidis manifesta qualitate agentibus, nec theriaca nec mithridatium vtendum: illa tamen minus nocet, quam hoc: quia theriaca non excedit primum gradum calidi, mithridatium ad secundum ascendit: Quod autem theriaca & mithridatium, in venenis impenitē calidis sunt pestifera, sic patet:

De Theriaca & Mithridatio.

Theriaca & Mithridatio in venenis calidis non est vtendum.

Theriaca & Mithridatio in venenis calidis non est vtendum. In venenis calidis manifesta qualitate agentibus, nec theriaca nec mithridatium vtendum: illa tamen minus nocet, quam hoc: quia theriaca non excedit primum gradum calidi, mithridatium ad secundum ascendit: Quod autem theriaca & mithridatium, in venenis impenitē calidis sunt pestifera, sic patet:

patet:

patet: Venenum manifesta agens caliditate, vehementer corpus calefacit: theriaca autem & mithridatium vehementissime etiam calefaciunt: licet enim theriaca in primo tantum gradu sit calida, magis tamen calorem in corpore imprimere potest, quam cinamomum quod in tertio est calidum, quia caliditas cinamomi est organum formæ minimæ actiuitatis. Neque admodum prodest theriaca ratione formæ dissimilis: quia sermo hic est de veneno calido, cuius forma est minimæ actiuitatis, & proin opus non habet, vt per formam theriacæ maximæ actiuitatis expugnetur. Hinc sequitur maxime eos errare, qui in febribus pestilentibus theriacam exhibent, ac mithridatium: in febre enim pestilenti adest venenum calidum putrefactiuum, interiora exurens, vt frigeant exteriora, cuius etiam vi solida cordis substantia (ad differentiam aliarum febrium putridarum) est posita in calefacto esse, sed in habitudine, non in habitu. Dum autem theriaca exhibetur, caliditas illa in habitudine firmatur, habitumque contrahit: vt necessario febris pestilens degeneret in hecticam, & homines moriantur, etiam si optima fuerit theriaca. Auicennas etiam cap. 4. alias habet materias, quæ venenis tota forma aduersantur, & eas quidem non ratione, sed experientia inuentas & comprobatas. Ex Galeni igitur sententia cap. 3. lib. 7. de antid. probatur medicamentum confectum à cariciis: quis enim hoc ieiuno sumat stomacho, is à veneno vix vincitur. Conficitur autem à cariciis, nucibus, ruta, exiguo sale. Dosis à ʒij. ad ʒʒ. prout veneni actio magis vel minus est vehemens. Zedoaria etiam omnibus modis veneno aduersatur. Profunt quoque semina napi siluestria, ad ʒ ij. cum maluatico exhibita. Semen citri ad ʒij. cum maluatico datur: vt vinum sit materia vehiculi, cuius gratia citius cor roboratur. Crocus secundum Auicennam spiritum viniificat, dilatat, solidat: ad dosin tamen ʒ ij. iungat: quia licet proprietatem habeat proprietati cordis similem, tantæ tamen est actiuitatis, vt in nimia copia exhibitus, instar magnæ flammæ spiritus & calorem vitalem dissipet. Postremo Auicennas proponit medicamentum efficax, à succo & radicibus laserpii (conferunt proprietate, & odorata sunt) à semine absinthij santonici (est cordiale) cum melle (vt consistetiam acquirat, & præterea vt medicamentum euadat iucundum) & exhibet cum aqua. cum decocto pomorum (est enim hac materia cordialis) & cascerprum etiam caliditatem attemperat.

*In febrib.
pestiferis,
non sunt
danda thq-
riaca, &
mithrida.*

*Theriaca
russicorri.*

Moderni

Moderni hæc quinque simplicia proponunt, non contemnenda: *hypericum, vincetoxicum, helenium, aristolochiam longam, & herbam quam vocant dragoncellum.* Valet plurimum cornu cerui, & unicornu: item lapis qui bezoar dicitur *Auicennæ.* Smaragdum nonnulli pro secreto habent, & exhibent ad ʒij.

*Modus
admini-
strandi.*

Sequitur, vt agamus de ratione administrandi hæc medicamenta, siue sint euacuantia, siue alterantia. Medicamenta quæ per spiritalem qualitatem operantur promptissime iuant: sed talia inuenta nondum sunt. Dicunt quidam *admantem orientalem* sinistro alligatum brachio, omne venenum superare; sed hoc experientia non respondet. Potius ergo medicamenta administranda sunt in puluere, in substantia

*Oleum è the-
riaca & mi-
stridatio.*

aquosa, maxime autem in aëria, vt quam citissime expellatur venenum. Parandum igitur *destillatum è magnis antidotis, the-riaca & mstridatio*: unde oleum illud Magni Ducis non est contemnendum, præsertim cum experientia testetur vim illud contra venena habere maximam. Substantia autem illa est oleaginosa, quæ dum applicatur corpori, ilico in vaporem vertitur. Medicamentum autem hoc efficacissimum redditur, si *ambra & moschus* misceantur, quæ facile in vaporem abeunt: oleis destillatis etiam aliquid *caphura* addendum, hæc enim cordialis est & theriacalis media, & promptissime in aërem resoluitur, & sic facit vt etiam oleum facile in vaporem vertatur: præterea quoque caliditate olei nimiam frangit. Proin si oleum illud calidius perferre corpus non queat, miscenda *caphura*: si vero facile admittat, loco *caphuræ, ambra & moschus* miscenda, vt vi hac calidissima

*Quantum
agendum.*

feliciter expugnentur venena. Obseruandum quoque est, si venenum actu sit in corpore: antidotos in magna dosi, vt quintupla, vel quadrupla proportionem esse exhibendas: hoc enim requirit & præsens venenum, & proprietas cordis: Secus, si nondum sit in corpore, quia tunc proprietas cordis solum indicat. Præterea si actu venenum sit in corpore, exhibemus quotidie, & his etiam de die: quia summa est veneni actio. Et sane præsentia veneni tantum apud *Auicennam* potuit, vt vomitorio antidotos adiunxerit: eodem videlicet tempore vacuans & alterans. Notandum tamen vomitoriis quidem theriacam esse addendam, verbi gratia, *oleo & aqua permixtis*: at si *rhubarb. agaricus, vel aliud soluens* exhibeatur, theriaca miscenda non erit, quia hæc tractionem soluentium impedit: vt tutius sit prius dare purgantia, quæ

*Antidoti
vomitoriis
non pur-
gantibus
misceri
possunt.*

non quidem similitudine trahunt venenum, sed hoc tamen per viam consecutionis cum materia excrementitia vacuant: deinde veneno magna è parte educto, licet antidotos exhibere, quarum vi è toto vincatur venenum.

Quoad materiam *diurnam*. Auicen. cap. 4. improbat *3. Materia*
Aerem conclusum, probat autem odoratum, & alteratum *diurnam*.
 suaibus odoribus, quibus spiritus reficiuntur.

De victu. Si venenum nondum est in corpore, Auicen. maxime probat victum pleniorē, pro præseruatione à veneno. si timor est, ne venenum exhibeatur: à cibo enim copioso vis veneni frangitur, & facile prouocatur vomitus, quo vna cum cibo venenum expellitur: cibo etiam pleniore meatus venarum replentur, vt corpus tam facile veneno non sit peruium. Fieri etiam potest, vt è variis cibis, aliquis donatus sit facultate bezoartica. In victu tenui, omnia sunt contraria. Quantum ad victus qualitatem, ante venenum assumptum, fugienda sunt cibaria & potiones, in quibus est vapor & odor euident: dum enim vtimur dulcibus, salitis, acris, odoratis, non facile percipitur venenum ammissū. Monendi ergo sunt homines, si suspicio est de veneno, vt antequam cibos deglutiant, prius optime mastigent, & degustent. Summa etiam cauendum est diligentia, ne cibi inficiantur: quod multis modis accidere potest: verbi gratia, si inter decoquendū è testō in lebetē scorpionū decidunt: aut si in doliā viperæ (quæ vino maxime delectantur) ingrediuntur.

Quod si venenum iam sit exhibitum: vires cito reficiendæ aqua carnis & vino. Si tamen venenum per manifestam caliditatem agat: à vino abstinendum, & aqua carnis administranda, correctâ tamen refrigerantibus, nîm. acetosa, acidocitri, in quibus etiam vis inest bezoartica. Homines etiam post venenum nequaquam dormiant, cap. 7. lib. 2. de antid. Gale. Frictionibus & aliis quoque materiis veneno est occurrendum. De quibus hæc sufficiant.

Dubitatio hic de vino viperino dissoluenda est. Dioscorides enim mortiferum esse dicit. At Galenus lib. 11. simpl. cap. de vipera, salutare esse ait, quod experientia in pluribus elephantiacis comprobauit. Galeni etiam sententia Auicennas cap. de lepra suffragatur. Vt autem dubio huic occurratur, sciendum per vinum viperinum intelligi vinum, in quo extincta sit vipera. In hoc vino duo reperiantur: venenum pessimum, & caro vipera. Venenum, proprietatem habet cordi hominis aduersam: proprietatem

*Victus in
prophyla-
xi.*

*Victus in
veneno
actu præ-
sente.*

*Vitium vi-
perinum
quomodo
elephanti-
cis proficit.*

tamen habet similem proprietati alterius multi, nimirum virulentia elephantica. Sicut enim similitudo est inter magnetem & ferrum: ita etiam inter venenum viperinum & elephantiasin. Fortior tamen est proprietates elephantica virulentia, remissior veneni: unde virulentia elephantica venenum attrahit, non contra. Carnes viperina vim habent discutiendi, digerendi, dissoluendi, expellendi materias in cute existentes: unde carnes viperina in affectibus cutaneis admodum sunt utiles. Venenum igitur viperinum prædictum est facultate & veneni viperini, & carnis viperina. Dum igitur elephantico exhibetur: venenum trahitur ad partes cutaneas à virulentia illa elephantica. Confluens autem venenum ad partes extimas, & *exima* simul est & vehiculum illius facultatis, quæ in carne est viperina: Carnis ergo qualitas à veneno viperino delata ad exteriores partes, agit in virulentiam illam, digerendo, discutiendo, attenuando, ut è toto expellatur elephantiasis. Quod si autem hoc vinum exhibeatur corpori non læso, siue venenum in corpore sit, siue non: semper mortiferum est: non enim tunc à partibus cutaneis attrahitur, sed in cor impetu ruens, necem affert.

CAPVT VII.

De veneni quibusdam speciebus: & primum de Napello.

Transitio.



BSoluta doctrina venenorum communi: ad specialia accedemus. Venenum ergo procedit à mistis, vel inanimatis, ut *arsenicum*: vel animatis. Animata illa, sunt plantæ, vel animalia. Plantarum venena vel agunt secundum qualitates manifestas, nimirum vel caliditatem, ut *anacardus*, vel frigiditatem, ut *opium*: aut agunt secundum qualitates reconditas, earque vel alterantes, ut *Napellus*, vel purgatorias, ut *veratrum album*. Venenum porro ex animalibus prosectum duplex est: aut enim ipsum animal exhibetur, ut *cantharides*: aut venenum per morsum communicatur, ut in *rabie canina*. Nobis igitur sufficiat agere de *Napello*, *Anacardo*, *Opio*, *Veratro albo*, *Cantharidibus*, & *Veneno canino*.

Natura
napelli.

Napellus est planta venefica utraque qualitate, & recondita & manifesta: à tota enim forma summe homini aduersatur.

satur, ita vt exhibitus ad 3. s. altero, aut primo etiā die interficiat. In summo etiā calidus est & siccus. Est autem venenum tam dirū, vt sagittis hoc veneno tinctis vulnerata animalia, vi veneni, non vulneris, obeant. Auicennas napellum in lepra & morphæa conferre ait: vbi procul dubio, non sin-

Vide animalia aduersio nestechsi, & Mubio li, in hunc Auicenna locum.

Cognoscitur napellum fuisse exhibitum: si tumor inflammatorius labia, os, frontem, oculos corripit, vt oculi præ magnitudine in loco destinato non continentur. Lingua etiā intumescens, in ore detineri nequit. Totum quin etiā corpus tumore afficitur: nam cum venenum hoc summe calidum sit & siccum, fit vt sanguis fundatur, agiturque, vt spatio ampliore sit opus, vnde tumores existunt. Oriuntur præterea vertigines & epilepsia: ob calidi huius veneni euaporationem in caput. Syncope sequitur, & crura collabuntur: quia venenum est summæ actiuitatis, tota forma cordi inimicum, vt omnes vires frangat.

Atus napelli: pro quo muscā legunt Angli Botanici.

Venenum hoc, vt substantia, indicat remedium vacuans: ratione autem qualitatis & proprietatis, requirit bezoarticum: ob euentem qualitatem, indicat refrigerans, & humectans.

Prasidia.

Huius autem veneni summa est: vt, nisi diligenter occurramus, celerrime interficiat. Et si forte festinanter non iungulet, periculum impendit vel febris hæctica, vel phthisis: ratio, cum enim napellus celerrime interficiat, occurrendum est remediis, quæ occulta proprietate aduersantur. hæc enim vt plurimum sunt calida: quibus tollitur quidem vis recondita, non autem operatio quæ à manifestis prodit qualitatibus: vnde napellus sua caliditate, in solidis partibus cordis imprimit calorem in habitu, à quo hæctica febris. Deinde cum napellus sit calidus, & erodens: pulmones erodendo phthisin facit. Cito igitur & summa cum prudentia veneno huic occurrendum.

Prognostica.

Materia medicinalis vel Euacuans est, vel Alterans. Euacuans est Expellens, vel Attrahens. De expellente. Auicennas proponit vomitoria à decocto napi, & vino, cum butyro, Expellētia cum decocto corticum glandium. In hoc autem vomitorio remedia.

Materia prasidiōrū.

respicit, non tantum ad napelli substantiam, sed omnes etiam eius qualitates. Substantiam respiciens, proponit vomitorium, id est, euacuans. Cortex glandium, vim habet astruendi, ideoque vomitum non promouet, sed tardat potius; adhibetur vero alia de causa, scilicet, ne venenum adeo repente ad cor transeat: ne etiam lac & butyrum, vias nimium laxent & aperiant. Qualitatem occultam respicit semen napi, & cortex etiam glandis: in his enim est vis bezoartica: misceri etiam vomitorio potest aliquid theriacæ, vt simul utriusque materia vomitorij, & intercipientis, & bezoartici. Evidentes qualitates respiciunt lac & butyrum: quæ siccitatem, calorem, & insignem acrimopiam huius veneni obtundunt. Decoctio etiam fit seminum & corticum in aqua, quæ vim habet refrigerandi. Hinc ergo discimus, eodem tempore exhibenda esse medicamenta, omnibus numeris contraria veneno: maxime vbi potens est.

*Attrahens
præstidia.*

Attrahens remedium est oleum viperinum, è scorpiis: nec improbo oleum Mathioli è scorpiis destillatum. Prodest etiam oleum Magni Ducis, applicatum arteriis manuum & pedum: axillis etiam, si cor infici incipiat, temporum arteriis, si vertigines & epilepsia assint.

*Alterantes
materie.*

Materia alterantes respiciunt qualitatem Reconditam, vel Manifestam. Quantum ad reconditam: probantur magna antidoti, theriaca, Zedoaria, bezoar, vel huius loco potest exhiberi 3 j. diambra, aut diamoschu. Notandum tamen, siue exhibeatur theriaca, siue Zedoaria, siue diamoschu, aut aliud calorificum, semper miscenda esse refrigerantia, quæ tamen sint bezoartica: alias enim hæctica vel phthisis metuenda. Probat etiam Auicennas quendam murem è genere soricis, qui frequenter in agro Tridentino reperitur: datur caro & puluis: efficacius esset destillatum, nõ amplius ligatum à substantia terrestris: Sed hic mus vix capi & comprehendendi potest.

*Musca napello
victis
rantes.*

Musca napello Medicamentum bonum est, quod conficitur è muscis illis magnis, quæ nutriuntur napello. Nec improbatur planta, prope rantes, dicem napelli orta, quæ mus dicitur: radicis huius pulueris latæ dari potest 3 β. & 3 j. est enim alexipharmacum napelli.

*Num tuto
vis quea-
mus mu-
scis napel-
li.*

Num tuto Dubitatur autem quæ ratione tuto assumi queant muscæ quæ napello aluntur, & planta illa: ratione alimenti enim est similitudo inter muscas & napellum: & quoniam inter hominem & napellum est dissimilitudo, inter hominem quoque & muscas erit dissimilitudo. *Responsio.* In napello partes aliæ sunt alimentales, aliæ veneficæ. Secundum partes igitur qualdam

quasdam alimentales, similis est proprietas muscis cum proprietate napelli: in hac tamen similitudine proprietas muscarum fortior est, ut muscæ napellum vincant, & partes alimentales in suam substantiam mutant. Quantum ad portiones veneficas napelli, hæ muscis sunt contrariæ: verum quia in muscis est summa vis, partes alimentales vincuntur, & veneficæ expelluntur, ut muscæ veneno careant, & proprietate sua efficacissima, dum exhibentur, napelli venenum expellere & superare queant.

CAPUT VIII.

De Anacardo.

Per *anacardum* intelligimus non corticem, vel semen, sed liquorem qui inter corticem & semen residet: qui è sententia Auicennæ lib. 2. & 4. est venenum per manifestas qualitates, calorem nimirum & siccitatem in quarto gradu. Cum autem *sinapi*, & *napellus*, & *anacardus*, sint mista in ordine quarto calida: differentia horum notanda est. Caliditas enim in *sinapi* est organum formæ alimentalis, hoc est, formæ similis humanæ naturæ: caliditas ergo non est venefica. Calor in *anacardo* & *napello*, est organum formæ dissimilis, & proinde veneficus est calor: discrimen tamen in eo est, quod forma napelli est summæ actiuitatis: vnde napellus est venenum secundum qualitatem manifestam & reconditam: *anacardi* autem forma est minoris actiuitatis: vnde *anacardus* venenum statuitur, non vtraque qualitate, sed euidente solum.

*Natura
anacardi.*

*Discrimen
caloris in
sinapi, na-
pello, ana-
cardo.*

Indicatur è feruore in ore, gula, ventriculo, è febre acuta. Est enim *anacardus* in summo calidus, vnde calidos habet effectus.

Signa.

Substantia igitur *anacardi* est euacuanda: oportet etiam refrigerare & humectare bezoarticis, ut forma dissimilis, etiamsi minimæ sit actiuitatis, è toto tamen opprimatur.

Præsidia.

Celerrime autem oportet occurrere: alias enim homines obeunt, ratione tum febris acutæ, tum delirij.

*Prognosti-
ca.*

Proinde Auicennas vomitorium probat è lacte, butyro, iuribus pinguibus: ut simul & euacuetur venenum, & eius immodica caliditas ac siccitas reprimatur, quam ad rem laudat aquam hordei, aquam lactuca, oleum violarum, in sektionem in frigidam. Suadet, ut non tantum utamur potentia, sed actu etiam frigidis: quia hoc venenum non ita prompte cedit, ob

*Materia
medica.*

insignem caliditatem & siccitatem. Auicennas autem non proponit materias attrahentes ad circumferentiam: immo-
dicus enim huius veneni calor prohibet. A proprietate con-
ferant bezoartica, ut *noces*: si quis enim anacardum cum nu-
ce masticet, non læditur, nisi in maxima copia sit anacardus.
Probantur etiam *grana pini*, quæ proprietate sua anacardo
aduersantur. Vtile denique est *oleum illud, quod conficitur e se-
mine Anacardi*. Naturæ ergo mirum in anacardo est opus:
portio enim eius alia venefica est, alia bezoartica.

CAPVT IX.

De Opio, & Meconio.

Opium &
meconium
ut disse-
rant.



Opium, secundum Galenum cap. 7. libr. 2. de antid.
est lacryma & liquor, qui extrahitur e capitibus
papaueris syluestris. Meconium vero succus est,
qui extrahitur non modo e capite papaueris syl-
uestris, sed etiam e foliis, dum ex vniuersa planta contusa,
succus exprimitur. Vtrumque frigidum est in quarto gradu:
meconium quidem in principio quarti, opium ultra princi-
pium: ita ut differant tantum secundum magis & minus.
Natura autem opij mirabilis est, habet enim vim inducen-
di somnium profundum: præterea etiam excitat pruritum
insignem, adeo ut homines excitentur a somno profundo:
insuper etiam sensum insignis amaritudinis infert. Qua er-
go de causa hi effectus diuersi ab opio proficiuntur? annon
enim somnus profundus frigidi: pruritus vero & amaritu-
do calidi sunt effectus? Dicendum ergo opium substantias
habere diuersas: sicut etiam lac & sanguis. Opium enim ha-
bet partes frigidas, & crassas: habet etiam partes calidas & te-
nues. Vnde si exhibetur opium, partes illæ calidæ, ad tenui-
tatem, facilius expelluntur, præsertim quia sunt veneficæ, &
ad similitudinem carnis viperinæ sponte feruntur in habi-
tum corporis, vnde pruritus producitur. Partes autem frigi-
dæ, quia sunt crassæ, in centro commorantur: ut nisi alsit ve-
hiculum, non ita facile partes illæ ad cor perducantur. Hinc
qui opium exhibent ut interficiant, miscent vinum, aut aro-
mata: nec enim portiones opij calidæ possunt esse vehicu-
lum frigidarum, quia ut veneficæ expellunt, irritantes ex-
pulticem: & sponte etiam instar viperinæ carnis ad cir-
cumferentiam mouentur: ac vinum & aromata possunt esse

Opij de par-
tes, ita etia
effectus di-
uersi.

Expectar-
tum opij
frigidari.

esse vehicula, quia non expelluntur à natura, sed potius à iecore & corde attrahuntur.

Quæritur autem, cum opium habeat partes & calidas & frigidæ: cur frigidum saltem esse dicatur, & non potius calidum, præsertim quia forma partium calidarum est venefica: & quia opium excitat pruritum, insigniter sane erit calidum? *Opium nō potest calidum dici.* Responsio. Frigidæ opij partes & quantitate plures sunt, & qualitate seu gradu intensiores, quam calidæ: frigidæ enim in quarto sunt gradu, calidæ in tertio. Licet autem forma utraque sit dissimilis: quia tamen utraque etiam non est summæ, sed remissæ actiuitatis, & altera tantum qualitas in summo: sit ut secundum solas partes frigidas opium dicatur venenum. Nec etiam opium potest esse medicamentum calidum: medicamentum enim dicitur, quatenus iuuat: iuuat autem refrigerando, non calefaciendo: itemque interficit suffocando & extinguendo calorem natium.

Signa opij sunt somnus profundus, & pruritus insignis: illo à reliquis venenis calidis, hoc à reliquis frigidis distinguitur. Partes enim calidæ dum expelluntur ad ambitum corporis, pruritum excitant. *Signa.*

Substantia opij vacuanda: Qualitas euidens contrarium requirit, occulta vero bezoarticum. *Præsidia.*

Celerissime agendum, alias ita imprimat suas qualitates, ut non cedat. *Prognosticum.*

Materiæ præsidiorum chæirurgicæ sunt, & medicinales. Chæirurgicæ sunt frictions vehementes institutæ asperis linteis, manibus iniunctis oleo de castorio, cum sapore acerrimo. Utendum etiam ligaturis vehementer adstringentibus, cucurbitulis cum magna flamma, citra scarificationem, ut fiat euacuatio à superficie cutis. *Materia præsid. chæirurgica.*

Materia medicinalis, est Euacuans, & Alterans. Euacuans, est Expellens, vel Attrahens. Expellens est vomitorium: secundum Auicennam. Galenus autem cap. 7. libr. 2. de antid. ad meconium exhibet olea, oxymeli: ad opium, quod frigidius est, exhibet vinum miracum plurimum, ut sic simul & alteretur per calorem, & euacuetur vomitu per magnam vini copiam. Quando autem homines vomere nequeunt, aut etiam si ad intestina descendit opium, probantur clysteres, fortes quidem secundum Auicennam & Dioscoridem, secundum Galenum autem fortes in meconio, mites in opio. *Cociliatio Dioscor. & Galen.* Quia discrepantia ita solui potest: mediocribus & fortibus clysmis in meconio

vti licet, & in opio: vtriusque enim veneni substantia satis est rebellis: sed in meconio expedit tātum vti acribus: in opio interdum acribus, interdum etiam mitioribus, qui acrimoniam partium opij calidarum attemperare queant. Attrahēs materia est oleum valde calidum, & tenuis substantiæ, vt penetret, quale est *oleum de castorio & euphorbio*, quibus corpus inungendum. Aliquando tamen esset tutius vti *balneo aqua dulcis*, aliqua tamen ē parte calidio, vt acrimonia partium calidarum temperetur, & propter calorem venenum euocetur.

Alterātia.

Alterantia per qualitat. manifestas: probatur *medicamentum* ē *satureia, origano, cinamomo*: deinde etiam probantur ob partes calidas, *acetosa, las caprinum, ius pingue v.g. cum adipe vituli*. Bezoarticum est *Castorium, piper, crocus; asa odorata, theriaca, mithridatium*. Et si pruritus plus iusto infestet, expedit cum *magnis antidotis miscere conseruas refrigerantes*.

CAPVT X.

De albo veratro.

*Natura al-
bi hellebo-
ri.*

Albo veratro vis lethalis duplex est: primum, vt nimia violētia attrahit: secūdo, vt superpurgatiōē facit. Substātia eius duplex est: altera similis dissimilis altera: vtraque tamē venefica. Similis est qua determinatus succus, scilicet melancholia, ratione similitudinis attrahitur: & hæc venefica est propter immodicam actiuitatem: tanto enim impetu humor attrahitur, vt homines strangulentur. Dissimilis est etiam portio in veratro albo, quia est purgans validissimum & quia dum nō euacuat, non in alimentum vertitur, sed in venenum, & causa est, vt succi corrumpantur. Qualitate calidum & siccum est in secunda mansione tertij gradus.

Signa.

Si exhibitum est album veratrum, nondum tamen purgat: cognoscitur, inde, quod patientes asserunt, sensibilibiter se percipere, violenter à capite & partibus remotis attrahi materiam: vt conuulsiones succedant, anhelitus difficiles, & veluti suffocari videantur. Adeo enim vehementer albus helleborus attrahit, vt quandoque cum impetu tanto confluant succi, vt ob viarum occlusionem non fiat purgatio, sed proposita potius oriantur symptomata. Si vero exhibitum veratrum purget: manifesta est superpurgatio, & copiosa euacuatio, quam difficulter ægri ferunt, vnde animi defectus & syncope oritur.

Cum

Cum autem aibus helleborus, violenter succos attrahat per venas, & tantopere viribus coceat, vt interdum mors sequatur: præsidia à tribus sumenda: primum à veneno: secundò, à viis per quas materia fuit attracta: tertio à viribus. Quà- rum ad venenum: substantia indicat euacuans. Qualitas recondita dissimilis, indicat bezoarticum. Qualitas recondita similis, quæ scilicet succum melancholicum attrahit, quatenus violenter attrahit, requirit medicamentum contrarium: quatenus autem à circumferentia ad centrum attrahit, requirit diureticum, tanquam deriuatorium: & sudoriferum, tanquam reuulsorium: Qualitas euident, indicat refrigerans & humectans. Quantum ad vias: quia mors succedit, in superpurgatione, eo quod viæ nimis recludantur: indicatur adstringens, & claudens. Virtus denique indicat sui custodiam: & virtus cordis, cordiale requirit.

Hellebori vis summa est: vnde conuulsio oritur. Quod, si conuulsio fiat ab inanitione, desperandū. Si autem fiat ob affectum oris ventriculi, & neruorū, ita vt facultas nō ob inanitionem lædatur, sed ob errorem externum: tum occurrere quidem malo potest, sed difficulter: maxime si sanguis egrediarur, si syncope succedat, si cadat pulsus.

Materia cheirurgica. Venæ sectionem Diosc. & Auicennas in tractatibus de venenis, non proponunt. At Auicennas quarta, primi cap. 8. ait: si pharmacum soluens exhibeatur, & non succedat euacuatio, sed symptomata sequantur vehementia, præsertim circa superiores partes, tunc necessariam esse venæ sectionem: quia adest principale indicans, nimirum sanguis vi vehementi affectus: adest etiam virtus permittens, alias enim pharmacum dari non potuisset. Dum igitur corpus est robustum licet non sit pharmacum, sed potius caco-chymum: potest tamen affici plenitudine determinata, quæ inflammationem efficiat. Virtus autem interdum, adesse potest, vt dum helleborus à medico exhibetur, io dosi maiuscula, & minus correctus, ob ignorantiam: interdum virtus non adest, vt dum à carnifice proponitur, hoc sine, vt vires collabantur, vnde tunc venæ sectio locum non habet. Cum igitur hic sermo fiat de helleboro albo, vt de veneno, non licet cū Auicenna venam secare: sed vtendum calidis frictionibus, ligaturis vehementibus, cucurbitulis sine scarificatione cum magna flamma.

Materia medicinalis multiplex est. Ratione substantiæ

veneni est euacuans, interdum per superius, interdum per inferius: prout veratrum vel in ventriculo, vel in intestinis residet:& hoc potissimum intelligitur, dum in *irriguata* non egreditur sanguis. Vomitorium potest esse oleum cum *qua tepida*. Si non educere volumus per inferiora, ut debemus lubricis, deterforiis & comprimentibus. Hinc probatur *uqua hordeacea*, oleum *amgdal.* Substantiam veratri detergunt *mulsa*, *decoctum*, *saccharum rubrum*. Si deteria est: tum propinanda, quæ vim habent comprimendi, ut *myrobalani*, *samarindi*. Clysmi etiam profunt, maxime si nō sit purgatio (dum enim perfidi homines veratrum exhibent, purgatio fieri nequit, quia corpus non est præparatum) clyster autem fieri debet ex eclegmate sequenti: *Recipe radicularum hellebori albi*, lb j. *aqua fontis* lb iij β: *fiat infusio per tri-duum: deinde fiat decoctio ad consistentiam eclegmatis*. Quod si eclegma nō adsit, nec etiam tres dies expectare liceat: breuiori temporis spatio fieri poterit infusio, nimirum hora vna, si pro lb j. veratri, accipiamus aqua lb j β. Et hoc eclegmate in modum clysmi utemur, cum aqua sufficiente diluto. Possumus etiam hoc eclegma ulterius coquere, ut formā accipiat suppositorij: est enim efficacissimum remedium.

Sequuntur medicamenta, quæ respiciunt hellebori albi qualitatem. Ratione ergo qualitatis occultæ dissimilis, nil præstantius *theriaca*: quæ, si bona est, actum secundum cuiuslibet purgantis adimit. Ratione qualitatis occultæ similis, quatenus nimis vehementer attrahit, probatur *theriaca*, ad hanc violentiam compescendum: *theriacæ* enim proprietates fortior est proprietate veratri. Auicennas etiam & Dioscori laudant *pulverem & floribus nymphae*, qui proprietate quadam violentiæ hellebori albi aduersatur. Quatenus autem qualitas occulta similis ad centrum trahit, utendum diureticis & sudoriferis: vnde Auicennas proponit *capillum veneris*, *feniculum*, *petroselinum*, *semen melonum*. Sudorem cient *balnea sicca calida*. Ratione qualitatis manifestæ, refrigerantia & humectantia ex usu sunt: ut *nymphaea*, *lactuca*, *malua*, *hordeum*, *viola* &c. Ob vias proponuntur adstringentia, ut *rhiz opsoniorum*, *rosa*, *cydon*, quibus post euacuationem materiæ noxiæ seu veneni utendum: dum scilicet sanguis euacuatur, qui salutaris est materia.

CAPVT XI.

De Cantharidibus.



N *Cantharidibus* partes quædam sunt veneficæ, *Canthari-*
 vt venter, quædam alexiteriæ, vt partes, alæ, ca- *dum par-*
 put. Quamdiu autem cantharides viuunt, vires *tes due.*
 vna animalis forma ita ligantur, vt altera pars
 in detrimentum alterius agere nequeat: nec enim alæ ven-
 tri, nec venter alis officit. Dum autem obierunt cantharides
 partes illæ destitutæ vinculo, & priuatæ forma illa commu-
 ni. secundum vires proprias operantur.

In *ventre* substantia seu forma est venefica, aduersaria pro-
 prietati humanæ, & præsertim vesicæ: licet autem cantha-
 rides partibus extremis applicentur, vt occipitio, manibus,
 pedibus: interdum tamen patientes sanguinem mingunt:
 cantharides enim sponte vi sua deleteria ad vesicam ferun-
 tur. Cantharides sunt calidæ & siccæ in quarto. Et licet ven-
 tris forma sit venefica, quia tamen non est summæ actiui-
 tatis, vt in napello: ideo ventres non annumerantur vene-
 nis à tota forma, sed calidis tantum venenis. Quoniam au-
 tem venenū calidum, aliud corrodēs est, aliud non corrodēs:
 hoc venenum est corrodens: vnde ventris substantia potius
 crassa, quam tenuis arguitur, è cap. 12. & 13. lib. 3. simpl.

In *partibus alexiteriis* substantia & forma est similis corpo-
 ri nostro, maxime vesicæ: hinc recte medici, qui vtuntur vesi-
 catoriis, non applicant extremitates, sed tantum ventres. Pro-
 prietas autem harum extremitatum est summæ actiui-
 tatis, alias non possent superare proprietatem ventris: cum
 omnis actio fiat in proprietate maiore inæqualitatis, præ-
 sertim in venenis: & proinde etiam vehementior est pro-
 prietas in extremitatibus, quam in vesicæ: vnde liquet, vesi-
 cam nō attrahere proprietate sua extremitates, sed in extre-
 mitatib. esse vim, qua sponte in vesicam perducuntur. Calidæ
 sunt & siccæ extremitates in tertio & substantia sunt tenui.

Exhibitas esse cantharides cognoscitur, è feruore circa ve-
 sicam oborto, ex ardore lotij, è mictu sanguinis, è vertigine,
 delirio, tandem è syncope.

Substantia euacuanda est. Qualitas euident, indicat refri-
 gerantia & humectantia. Occulta qualitas requirit alexite-
 ria vesicæ propria.

Quoniam vero venenum est corrosiuum, antequam abradat
 occurren

De ventre.
Forma.

Qualitas.

Extremi-
tates can-
tharidum.

Signa.

Presidia.

Prognost.

occurrendum : si enim facta est abrasio, difficilis est curatio
cap. 12. & 13. lib. 3. simpl. Galeni.

*Materia
medicina-
les.*

1. Euacuans præsidium potest esse vomitorium, clyster, bal-
neum aquæ calidæ: vt venenum hoc omnibus modis per
vomitum, aluum, poros cutis educatur: Præcedat autem vo-
mitorium, quia tutius est, vt venenum euacuetur, antequam
descendat. Notandum autem cum venenum sit calidum, à
calidis abstinendum esse: & proinde vomitorium atque cly-
steres conficiantur è lacte, aqua hordei, & similibus refrigeran-
tibus.
2. Ratione qualitatis euidentis, vtimur, lacte cum portu-
laca, seminibusque frigidis maioribus, & minoribus, vt sic & ve-
neni exstinguamus calorem, & vesicæ occurramus. Vtimur
etiam diureticis, quorum vi venenum residens in vesica ex-
tinguitur: quod fit in sessione in decocto aliquo refrigerante
ex hordeo, lactuca, portulaca. Expedi etiam lac & serum in ve-
sicam intermittere. Postremo probantur alexiteria, vt oleum li-
liorum, & quod efficacius, oleum cydon. Dioscorides maxime laudat
theriacam & mithridaticam, quia conficiuntur è pluribus sim-
plicibus, vt rationi sit consentaneum, esse aliquas proprie-
tates, similes proprietati vesicæ: semper tamen refrigeran-
tia miscenda: quia venenum hoc est calidum. Vnde multum
probantur semina alkekengi, & extremitates duarum canthari-
dum cum lacte suo exhiberi possunt.

CAPVT XII.

De rabie canina.

*Natura
veneni ca-
nini.*



*V*enenum caninum Gelen.com. 17. sect. 2. lib. 1. pro-
phet. vocat hydrophobiam: quod tamen nomen
veneno canino ab initio non conuenit, sed longe
post Auicem. cap. 7. lib. 4. ait: rabiem canis esse
conuersionem suæ cōplexionis ad melancholiam malignam
& venenosam. Vnde nil aliud intelligit per venenum cani-
num, quam inquinamentum atrabile. Est inquinamētum:
quia affectus est contagiosus & proinde adest putredo. Est
a hoc inquinamētum non finosum, sed cinerulentum: quia
succus putrescens redditur calidior, & producit ab insigni
caliditate, vt in atram vertatur bilem, quæ affata putrescit.
Substantia seu forma huius veneni est dissimilis, non tamen
summx actiuitatis: & proinde non est venenum à tota for-
ma, quia nec syncope tam facile oritur, nec sudores frigidi
erumpunt,

Erumpunt, vt in venenis à tota forma fieri solet. Temperamentum est igneum, calidum & siccum, cap. de cancri, l. 11. simpl. com. 17. sect. 2. lib. 1. prorhet. Et sane venenum hoc ordine quarto esse calidum, testatur experientia: cum enim dissectum esset monachi cuiusdam cadauer, tria notanda apparuerunt: primo, nulla aderat humiditas aquosa in pericardio, tota erat consumpta ab hoc igneo veneno. Secundo, sinus cordis conspiciebantur aridi, & sanguine prorsus destituti. Tertio, in pericardio portio quædam fuit obseruata ferme combusta, & in puluerem redacta. In definitione ergo sua Auicēnas non proponit naturam & essentiam huius veneni, sed effectus, qui ab hoc veneno in corpore humano & canis producuntur. Per complexionem melancholicam, hic non intelligit temperamentum, quod à contento, id est à succo melancholico, qui frigidus & siccus est, producitur (l. 2. de temper. Gal.) sed eam complexionem melancholicā, quæ generare potest succum melancholicum atrabilem, calidum & siccum. Complexionem a hanc Auic. malignam statuit, id est, contumacem in habitu, quæ maxima cum difficultate amouetur: vnde etiam vlcera cacoethe: ratio: quia caliditas in habitum imprimitur, cum qualitates sint summę actiuitatis, & organa etiam sint formę contrarię.

Sensit autem Auicē. huiusmodi venena non incontinentia solum agere, sed etiam in contenta: ait enim: accidit creaturæ vt varietur, & accidit eius complexionī vt alteretur. Insinuans igitur actionem huius veneni in contenta, ait, accidere creaturæ vt varietur. Per creaturam intelligit succos; sic enim sanguis cum iecore collatus, creatura est: iecur, creator. Per variationem intelligit, non alterationem solum, sed mutationem formę & corruptionem. Ista autem corruptio duplex est, primum citra dissolutionem misti: cum sanguis veneno canino corrumpitur, & mutatur in atrabilem: secundo cum dissolutione misti: quando sanguis veneno ita corrumpitur, vt putrescat, & in cinerulentum inquinamentum dissoluatur. Respiciens autem ad complexionem continentium, ait, accidere complexionī vt alteretur.

Hoc inquinamētum, hoc opus, in cane sequitur actionem læsam, id est, coctionem canis. Hæc autem læditur (cap. 1. l. 3. de symp. caus.) vel læsa facultate, vel ob errorem externum. Læditur & labefactatur facultas ob intemperiem calidam & siccam: & hoc potissimum accidit cani, animali satis calido & sicco, vt facile eius caliditas & siccitas incrementum su-

Tēperies.

Historia
rabie in-
terempti.Venenum
caninum
agit in co-
tenta &
continētia.Generatio
venenica-
nini in ca-
ne.

nat.

mat, & ita hoc venenum producat. Hoc igitur fieri potest, impedita facultate ob obstructionem, quā plus initio calor accenditur. Error etiam externus facultatem laedit: quem duplicem Avicennas proponit: nimirum aerem, cibum, & potum. Aere enim tum calido, tum frigido succi reddantur atrabilarij & venefici: calore enim succi, accenduntur: frigore stipantur corpora, ut succi, qui vacuari nequeunt, inflammentur. Hic respicientes Diosc. Aetius, Paulus, aiunt rabiem hanc potissimum inuadere aestate & hyeme: oculos enim hi dirigūt ad generationem huius veneni, & rabiem incipientem. At Avicen. non tantum de incipiente, sed etiam inualecente loquens, addit ver & autumnum, quibus rabies vigere solet: vere enim commouentur succi hyeme geniti: & qui aestate procreati sunt, succedente autumno non possunt dissiliari, unde rabies excitatur. Quoad cibum & potum: ait Avicen. produci hoc venenū, si canis sanguinem putrefactum sorbeat, aut carnes putridas deuoret.

*Generatio
veneni ca-
nis in ho-
mine.*

Idem dicendum de orto huius veneni in homine. Quoad laesam facultatem: differentia est inter hominem & canem, quod in hoc frequentius generatur, quoniam caliditas canis facilius intenditur. Præterea venenum caninum magis est deleterium, quam quod interdum in homine ob intemperiem calidiorem generatur. Quantum ad etio-rem externam potissimum in homine gignunt hoc venenum ob præsentiam virulentiae caninae per morsum illatae, quæ initio exiguae est copiae, postea vero agens in sanguinem eum in suam naturam conuertit: unde fit, ut à cane rabido demortui, modo post mensem primum, modo post sextum, modo etiā elapso anno, rabidi fiant: quod fit ob variam corporis conditionem. Si enim, verbi gratia, canis ei aculetur virulentiam copiosam & admodum aerem, per morsum: & homo qui mordetur corpus habeat beliosum, præditum succis calidis, qui facile atrabilarij euadunt: tunc brevi tempore, etiam vno mense, homo rabidus euadit.

*Signa ve-
neni adhuc
in corpore
latitantis.
Canis rabi-
di indicia.*

Virulentia hæc inter initia, dum adhuc pauca est, & à corde remota, non agit in cor, & proinde signa rabiei nondum vlla apparent. Cognoscitur tamen venenum esse in corpore hominis à cane demortui: primum è signis rabiei in cane, qui non mordit, apparentib. c. 16. lib. de ther. ad Pis. Si enim canis est gracilis, si oculos habet flammeos, toruos & squalidos, si linguam ore continere non potest, si huc & illuc vagatur, auribus pendulis, caput deorsum inclinans, ymbra suam al-

latrans

larrans, spumam ore ostendens, solus currens, aliis canibus fugientibus, indiscriminatim homines mordere tentans: facile apparet canem esse rabidum, & proin hominem etiam demorsum contagio esse infectum. Præterea alia quoque secundum Paulum & Aetium sunt experimenta: Dum enim vulnus adhuc est recens, sumantur nuges, & confusæ applicentur vulneri, detineanturque per noctem integram, & exhibeantur gallinis, vt deuorent. Si enim ab harum esu per-eunt, venenum latere patebit, Panis etiam secundum Aetium applicandus est vulneri, vt sanguine inficiatur, & tunc cani exhibendus: quod si canis nec comedere, nec olfacere velit, in corpore venenum esse statuendum.

Si venenum copiosum est, progressu temporis vehementer agit, & cor occupat: & tunc signa sunt evidentissima, quorum ratio reddi tere nulla potest: timent ergo aquam, & omnem humiditatem, licet aqua non sit præsens: interdum intenditur timor, & oritur imaginatio canis: interdum non

Signa veneni copiosi, iam manifesti.

intenditur, sed patientes euadunt nauseabundi, adeo vt maxima cum difficultate aquam hauriant: & tandem cum aquam bibunt, illico strangulantur, & pereunt. Ratio ergo videtur talis asferri posse, e cap. 16. lib. 2. de ther. ad Pis. In rabie canina, ob nimiam siccitatem, est indigentia, & proinde quoque desiderium humidi: sed quia rabidi mente sunt alienati, humiditatem despiciunt, & ob delirium auersantur id quod iuuare posset. Vt autem hæc melius intelligatur, quæ-

Cur rabidi aquam timeant.

dam sunt explicanda. I. Cur homines rabie affecti timeant. Responsio. Id fit propter abundantiam succi atrabilarij, à quo vapor ater, melancholicus, ad cerebrum fertur, & spiritum animale tenebricosum reddit, vnde actio læditur, ob errorem externum, id est, ob spiritum animale tenebricosum redditum. II. Cur potius aquam timeant, quam aliud obiectum? Responsio. Quia adest indigentia humidi: vt propterea species humida aquæ in cerebrum imprimatur. III. Cur, si aqua affertur, quandoque intendatur timor: & quandoque nauseabundi euadant? Responsio. Si aqua præsens non est, timeant: præsentem ergo aquam magis augetur timor, dum oculis obicitur. Interdum est recordatio morsus, vt imaginentur adesse canem. Nauseabundi autem euadunt, quia os ventriculi à veneno afficitur, vnde in ore ventriculi sensus quidam tristis excitatur, qui impertitur sensui interiori, estque in causa, vt à cerebro impertiatur vis illa appetens infesta & noxia: vnde quæadmodum si ori ventriculi vis animalis à cere-

bro recte offertur, bonus fit appetit^{us}, cui famulatur attractrix ventriculi: ita dum vitata offertur facultas appetens à cerebro, nausea fit, cui expultrix famulatur: inde fit, vt aquam hauſtam rursus euomant. *III. Qua ratione Auicenna dicat, rabidos aquam bibentes perire. Galenus vero afferat, aquam rabidos iuuare posse, ab ipsis tamen respuere.* Responsio. Rabies canina, vel est inter initia, vel in progressu. Si est in initio, aquæ potus iuuare potest. Si in progressu, & timor perdurat tunc è potu aquæ homines pereunt, quia spiritus vitalis è toto ferme est dissipatus, vt facile & celerrime exstinguatur.

Indicationes.

In præſidiis inueniendis, oportet respicere ad Venenum, & ad Corpus, quod venenum admittit. Veneni substantia est euacuanda. Forma requirit bezoartium seu alexiterium: quod feliciter cum vacuantibus coniungitur: nisi enim operatio venefica adimatur, in corpus agit venenum, nec ita facile cedit vacuantibus. Manifestæ veneni qualitates, indicant refrigerans & humectans. Præter venenum, oportet perpendere corpus rabie affectum: in quo ratio habenda & Contentorum, & Continentium. Quantum ad Contenta: oportet totum occurrere: vnde indicatur remediū euacuans, præsertim succum atrabilarium. Quoad continentia: intemperies calida siccaque, indicat refrigerans & humectans: proprietas autem cordis, requirit medicamentum Cordiale.

Prognostica.

Hoc malum curari potest, si homo nondum rabie est affectus: potest enim venenum extirpari, & cordis proprietas roborari. Sed si homo rabie afficitur, & adest timor aquæ: etiam si omnia adhibeantur, curari nequit. Mentio fit duorum qui sint sanitati restituti: sed Aëtius inquit, hos non fuisse demorsos à cane, sed ab alio homine: & hi interdum curari possunt, etiam cum incipit aquæ timor.

Vena sect.

Materia chirurgica. In morſu canis rabidi, & cuiuscūque animalis venefici, optimum est venam secare, si corpus sit repletum, & venenū sit dispersum: neque sit tale venenum, quod ratione similitudinis facile ab alio veneno attrahatur: tunc enim venæ sectione non est opus: vt in morſu scorpij, cui sanando applicatur scorpius. Non autem oportet secare venam primo die, sed cum iam venenum dispersum est, ob absentiam medicorum qui inhibere debebant. Ab initio autem venenum in parte vulnerata hærens, indicat euocationem ad superficiem: quod si tunc secetur vena, introducitur venenum.

Laudantur

Laudantur etiam cucurbitulæ & hirudines. Ampliandum est *Cucurbitula: scarificatio.*
vulnus. Vicinæ partes scarificandæ sunt, vt sanguis egrediatur,
& cū eo venenū. Locus ferro inurēdus, & eschara celerrime amovenda,

vt cito euocetur venenū: id quod spatio bidui possumus assequi, vt etiam magnū escharā euellamus, dū frequēter applicamus butyrū adeo calefactum, quantū patiens sustinere potest. Apertus autē locus per 40. dies seruandus est. Quod si pars demorsa sit exquisiti sensus, hæc adhiberi nequeūt: sed partibus vicinis non demorsis, quæ facilius ferre possunt, prædicta sunt adhibenda: parti autem demorsæ mitia applicari possunt medicamēta, de quibus in materia medicinali. Cum demorsus minimus habere potest, qui ore exfugat venenum, id non est improbandum: est autem pium, vt fiat citra detrimentum minimi: fiet autem citra noxam, si vlcuscula in ore nulla apparent: & præterea os ipsius fouendum est oleo, quod venenum hære non permittit. Vlcus autem satis diu apertum est detinendū.

Materiæ medicinales sunt Euacuantes, & Alterantes. Euacuans, *Pharmacia.*
est Expellens vel Attrahens. Expellens est, quod proprietate recondita ita roborat proprietatē corporis nostri, calorē & spiritū, vt hoc venenū facile expellatur. Huius farinæ est medicamentum *Expellens.*
à cancris, fluxu sibilibus vltis, & puluerisatis. E cæcris, puta, cauda destitutis, qui vulgo Mollucci dicuntur: Exhibetur hoc ad quantitatem magni cochlearis, quoties primis diebus occurrimus: si vero non primis diebus, est exhibendum ad duo cochlearia. Probatur quoque *alyssum*: item, coagulum catuli adhuc lactentis. Ficus syriacus cortex ad 3j. Magna etiam laudantur antidoti, præsertim cum aqua acetosa exhibita. Hæc tamen medicamenta non sunt exhibenda, quando homo iam rabie afficitur, sed ante illud tempus, & quam primum, nisi quod impediatur.

Attrahens, qualitate Occulta, aut Manifesta attrahit. Occulta qualitas, similis est vel humoribus, vel veneno canino. Humores enim dum purgantibus euacuantur, simul etiam venenum educitur: vnde probantur *cataplasia ex helleboro, elaterium, veratrum album: item, vehementissima medicamenta, vt antimonium.* Et si corpus non sit ita robustum, vt hæc ferre queat, fiant medicamenta à *sena, polypodio, epithymo, helleboro nigro.* Hæc autem ab initio vsurpanda non sunt, quia materia est cruda, & venenum tantum est in parte demorsa. Post tres autem dies (semper enim præsentia indicantis est respicienda:) si venenum per corpus sparsum est, pharmacum exhibendum, etiā si materia nec cocta sit, nec turgeat. Attrahunt etiam quædam similitudine cum vene-

H h h h

no canino; nimirum medicamentum è ventre cantharidū, cū aquali
 portione lentium excorticatarum: quod ad ℥ss. per plures dies exhiben-
 dū, quia præsentia indicantis per plures dies persenerat: prodest
 autem hac ratione: cum enim medicamentum ad vesicam per-
 ducitur, attrahit venenum, & id cum sanguine excernit, mictu
 cruento. Inter initia quoque cantharides loco demorso applicanda,
 & præcipitatum quoque applicari potest; ut etiam hepar canis rabidi.
 3. Quædam denique manifesta qualitate attrahunt. Vnde per ini-
 tia, dum patientes ratione loci affecti nolunt admittere cātha-
 rides, possumus animalia viua nuper dissecta, parti applicare, ut ca-
 tulos, columbas, gallinas: hoc enim calore virulentia euocatur, &
 dolor mitigatur. Vel hoc imponatur: ꝑ. cineris cancri fluuiat. allij,
 menta, gentiana, aristolochia rotunda ana ℥ij. hacc. lenri, boli Arm.
 ana ℥j. cum succo mentha fiat emplastrum. Progressu etiā temporis,
 cum venenum per corpus dispersum est, probatur balneum aquæ
 dulcis calenti, ut aperiantur pori, & venenum euacuetur.


Alteran-
 tia,

Materiæ alterantes, agunt qualitate Occulta, aut manifesta.
 Occulta, quæ modo sunt proposita, quæ vincunt calorem cor-
 poris & spiritus, ut venenū expellatur. Talia possunt esse ma-
 teriæ expellentes & roborantes: ut serum, aqua fabrorum, aqua
 acetosa & lactuca. Hæ aquæ faciliè ægris dari possunt, ante timo-
 rem aquæ: at cum timoris iam adest principium, insciis ægris
 dandas: quare vas aqua repletum sit occlusum; & arte etiam po-
 test confici vas, in cuius parte superiori sit vinum, in posteriori
 aqua, ut sic decipiantur. Bibere autem poterunt aquam per fi-
 stulam longam, ut sic aquam non intueantur.

Victus.

De dicta pauca dicenda. Obest victus tenuis, quia succi red-
 duntur acriores & maligniores: sit igitur mediocris. Cibi inter-
 dum acriores, interdum mitiores conueniunt: vnde secundum
 Actium inter initia allium exhiberi potest, non autem tempo-
 ris progressu, sic enim venenum redderetur efficacius. A potu
 vini abstinendum. Progrediente malo etiam à theriaca desisten-
 dum: & potius refrigerantibus vtendum. Inter initia, post tri-
 dum, aut quatrimum exhibito pharmaco, & secta vena, pro-
 batur agrimonia, quæ contra virulentiam caninam plurimum
 valet.

F I N I S.



I N D E X

R E R V M E T V E R B O R V M

memorabilium in hac Practica Medica
contentorum.



- A** Garicus partes habet
alexipharmacas. 1196
Agendi efficacia, seu
actiuitas in mistiua
ior vel minor. 1173
Agglutinatio: vide, vlcus agglut.
Aquadja. 380. 383
αἰνιὺν κυνελινόν. 396
akilus Auicenna. 341
albugo oculi. 329
albugo ut tingenda. 333
albuginei humoris in oculo vitia. 352
album profusum. 901. & seq.
alchasi, affectus oculi. 302
alchattrab Auicenna. 128
Alex. Tralliani lapsus. 1129
Alexander notatur, quod temere
Galenum reprehenderit. 268
alkalkangi Auicenna ad hydro-
pen. 767
alexipharmaca. 582
alexipharmaca roborant expultri-
cem omnium partium: nec tan-
tum sudoribus virulentiam exi-
gunt. 992
alexipharmaca sanitatis etiā tēpo-
re locum habent. 1191
alexipharmaca nimia dosi rationem
habent veneni. 1172. 1190
alexipharmaca roborantia cor. 1191
alexipharmacum medium est inter
corpus & venenum. 1190
alexipharmacum quid. 1189
alexipharmacū primo in corpus a-
git, non in venenum. 1189
alexipharmacorum natura. 780
algiehar Auicenna. 330
alimenta venenata longo vsu carnes
animalium inficiunt. 1175
alimentales portiones veneno admi-
sta, aliquando vincuntur, ali-
quando non. 1173
alimenti ē potentia in actum dedu-
ctio. 1178
alimentorum differentia. 1115
alimentum vincitur solum secundum
actum primum. 1172
alimentum quid. 1171
alintisar Auicenna. 312
abdominis musculorum inflamma-
tio. 796
abdominis perforatio: vide παρα-
πνεύσις.
abortus causa. 940. curatio 943
differentia & signa 941. indica-
tiones & prognostica. 942
abortum facientia. 936
abortum prohibentia. 944
abscessus ē phlegmone. 560
abscessus internos rūpentia. 568. 492
accidentia quoque constant mate-
ria & forma. 112

INDEX

- acetum, vinum est mortuum. 1051
acetum in arthritide vitandum.
964. & seq.
acetum nervi inimicum. 249. 437. 885
acetum ad sitim. 611
acetum ladi vterum. 885
acetum vigilas inducit. 65. & seq.
acetum an in cephalalgia conue-
nias. 65
acetum diuersis constat partibus.
1117. 1051
acetum in alui fluxu vitandum. 719
achores. 17
acida famen intendunt. 604
acinus. 258
aclus secundus saepe remouetur, ma-
nente primo. 372. 602
acuta febris indicia. 1029
adamus orientali gestatus ad ve-
nena. 1200. & seq.
aer auri ingentis. 361
aer in phlebotomia consideratur ut
signum virtutis. 1080
aer pestilens. 1158. 1162
aer quis conueniat in febribus pu-
tridis. 1115
Aeris locus difficilis. 950
agilops. 340
aetas consideratur ut signum virum.
1080
affectio circulari in vertigine. 148
affectio ignea spirituum in mania. 137
affectio primaria, & per essentiam,
non sunt idem. 112
angor, vide, cardialgia.
anguria. 1119
angustia species & causa. 156. 187.
204. & seq. 224. 411. 486. 667.
869
anhelatio difficilis. 411
aniden Auenenna. 492
animalis facultas redditur visoria in
crystallino. 349
animi deliquium. 476
anodyna dolorifica. 41. 51. 684.
anodyna stupefacientia & opiat.
43. 51. 209. 289. 382. 434.
444. 651. 686. 721. 733. 895.
967
anodyna calida digerentia. 43. 432.
684. 968
anodyna humectantia. 901
anodyna frigida non opiat. 289.
381
anodyna, calidum natium seruau-
it. 43. 53. 306. 432. 684. 732.
anodynum in genere. 41. 424. 684.
963
apoplexia: vide, inapetentia
in viadis. 258
antidoti vide, alexipharmaca.
antimonium ad arthritidem. 966
antimonium in melancolia. 131
antimonium raro & vix luem cu-
rat verecram. 985
apoplexia. 614
apilepsiam concitat. 174. 185
apoplexia per consensum datur. 188
apoplexia 186. &c. eius cause. 187.
curatio. 194 definitio. 186. diffe-
rentia & signa. 189. indicatio-
nes & prognostica. 190. & seq.
apoplexia distinctio à cognatis af-
fectibus. 189
apoplexia: vide, abscessus,
appetitus naturalis. 585
appetitus quatuorplex. ibid.
appetitus animalis, seu sentiens. ibid.
appetitus, & sensum suctionis ob-
tundentia. 604
apri dens ad plenitudinem, 434
aqua carnis instaurans. 652
aqua in ascite ubi, cur, & quomodo
colligatur. 746
aqua

IN OAPIVACCIVM.

aqua inter cutem: vide hydrops.		αὐτὸ λανία.	ibidem.
allium an situm excites.	694	amentia: vide, ratiocinatio lesa.	
allium theriaca rusticorum.	ibid.	anacardina confectio.	147. 236
allium appositum exulcerat, assum-		ἀνὰ σπινθός.	409. 448. 726. 887
tum nequaquam.	80	anasarca. 847. eius causa.	747
aloe non videndum venis actu resera-		anchilops.	340
lis.	454	aurisma.	472
aloe aperit orificia venarum.	ibid.	angina. 396. &c. curatio.	390
alopecia.	3	angina exquisita & notha.	387
altarfatī Avicenna.	323	aqua oculi: vide, suffusio.	740
alterantia in lue Venerea.	992	aqua frigida vsus, in ephamera, in	
Altimarus notatur. 717. 743. 765.		febre continenti.	1134. 1046
948		aquam hydropicorum exsiccantia,	
alui constipatio.	668	& absorbentia.	
alui profluvium: vide, fluxus.		aquam hydropicorum vacuantia.	
alucinatio eorum, qui ephemeram		740. 906	
cum horrore inuadentem putri-		ardens febris.	1133
dam statuunt.	1045. & seq.	area. 2. harum curatio.	7
alucinatio quorundam in morbo de-		argemum affectus oculi.	302
finiendo.	1036	Argentarius notatur. 744. 820.	
alucinatio practicatorum in designan-		argentum vivum: vide, hydrargyri.	
da externa pleuritide.	422	argutus vide, icterus.	
alucinatio multorum circa diabe-		argenicum gestatum, contra pe-	
tem.	814	stem.	1164. 1169. 1169
alucinatio eorum qui resolutis pi-		arteriozomia.	47. 157. 288.
nearum copiam imperant.	238.	arthritis. 958. &c. eius causa.	959.
alucinatio multorum circa catho-		curatio. 964. differentia 961. in-	
rum.	211	dications & prognostica. 963.	
alucinatio statuentium omnem he-		signa.	961
cticam esse morbum calidum in		arthritis catarrhalis.	287
habitu.	1150	arthritis tephacea incurabilis.	964
alucinatio vulgaris, hecticam inci-		arthritis sit repletis ligamentis.	959
pientem facile curari, difficulter		arthritis quando admittat pur-	
cognosci.	1152. 1153	gantia.	966
alucinatio eorum qui dorso adhi-		artes constituuntur memoria, sensu	
bent scarificationes in febribus		& mente.	144
putridis.	1084. 1109	articulos roborantia.	968
alucinatio multorum de loco unde		articulorum dolor: vide, arthritis.	
materia intermittens trans-		artus leduntur inunctione hydrar-	
mittitur.	1062. & seq.	gyri: utique succurrendum.	994
amara necant lumbricos.	702	ascarides.	700
ἀσκαρίδες.	352. & seq.	ascites. 735. eius causa.	745
		N h h h	3

aspasia meretricium fucus. 910
assatio. 1097
asthma. 412
astringentia in malis ventriculi à quo indicentur. 507. & *sus eorum.* 521. 523. 651. 658
astringentia. 457. 581
astringentia ut valeant contra calculum. 828
astringentia. 719. 730. 894. 910
attenuantia. 776. 790. 806. 811. 812. 966
atheroma. 341
atrophia oculi. 343
attractio ventriculi lasa. 620
attrahentia per cutis meatus in febribus patridis. 1197. & *seq.*
attrahentia venenum è profundo. 1196. 1197
attractio sic derivatione & reuulsione. 88
attractio non fit ab eodem, sed à simili 1185
Auditus basio. 359. & *e. causa efficiens & definitio. ib. curatio.* 368.
differentia, & signa 364. *indicationes* 366. *prognostica.* 367
Auerroes Galenum impugnans confutatur. 118
Auerroes de alexiteriis sano nō exhibendis. 1191
augmentum febris. 1020. 1021. 1023
Auicenna codex emendatur. 804
Auicenna laus. 348
aulunum Auicenna. 301. & *seq.*
aurigo: vide, icterus.
auribus instillandum ad oculi dolorem. 290
auris nomine quid intelligatur. 359
auris pars principia est nervus expensans. *ibidem.*

B

B *Alani: vide suppositoria*
Balnea sulphurea ad tremorem. 221. *in mensili stillicidio.* 901
ad arthritidem. 998
Balneum aqua dulcis in Melancholia. 132. 135. *in mania* 141. *in epilepsia.* 186. *in tremore* 221. *in spasmo & in catharro* 248. *in sicca dyscrasia crystalini.* 358. *in cal. & sicca dyscrasia ventriculi* 326.
in cholera 659. *in colica* 685. *in alui fluxu* 719. *in ictero* 786. *in mensibus suppressis.* 884
balneum cum vino medicato paratum in paralyti 237. *in spasmo.* 250
balneum ex oleo in spasmo. 248
balneum è lacte in spasmo. ibidem.
balneum in ephamera 1047. 132
balnei partes. *ibid.*
balneum in hecticis. 1155
balneum in putrida febre. 1107
balneum siccum in paralyti. 227.
balnei & sus in materia venenata. 193
barba alba segnes in exercenda venere indicat. 351
basilisci venenum est qualitas sinceris. 1173
bechica: vide, expectorantia.
bexoar. 1200. 1165. 1170. 1203 1204.
bezoartica: vide, alexipharmaca.
βη. 994
bilis nigra quadruplex. 1146
biliosa febris. 1126. 1135
bilis abundantis signa. 504
bilis quo tempore educenda. 131
βελιον, oculi affectus. 301
bubones Gallici. 997
bubone interdum litem Gallicam penitus

IN CAPIVA CCIV M.

penitus eradicant.	979	canceri fluviatiles ad morsum carnis	
Culculos: vide, fames vacina		rabidi.	1117
Gradu peris.	615	cancerosus cerebri tumor.	1780
brassica ebrietatem arceat.	64	caninum venenum seipsum multi-	
		plicat.	176
C ochlexia 742. eius signa si-		canis rabidi indicia.	1214
gna 750. indicationes. 752.		canities.	13
prognostica. 754. curatio. 787		cantharides ad fatuum mortuum	
tachochymiam preparantia & pur-		eiiciendum.	947
gantia.	16	cantharides ad ischuriam hydropi-	
cacitas nocturna.	333	corum.	764
calculus intestinum.	667	capilli et fulvi ac nitidi faciendi.	16
calculus renum. 820. &c. curatio.		capillorum color vitiat.	15
825		capillorum defluuium. achinus cura-	
calculus comminuentia.	827	sio.	11
calculi natura & causa.	821	capillorum defluuium in lue Galli-	
calefacere intus est quam refrigera-		ca.	ibid.
re.	846	capillorum defectus.	2
calidam intemperiem corrigentia.		capillorum unctura.	15. & seq.
54. 97. 135. 209. 268. 357. 383.		capitalia, seu capiti appropriata: vi-	
522. 603		do, cephalica.	
calidi innati vitia secundum qualita-		capitis affectus externi.	2
tem & quantitatem.	225	capitis affectus interni.	25
caliditas cur venenata in euphor-		capitis dolor. 25. eius curatio.	47
bio, non in sinapi.	1192	capitis dolor ab aere vel ventis.	19
calidum innatum quot modis leda-		capitis dolor ex ebrietate	65. 70
tur.	586	capitis dolor ex odoribus	70
calidum insitum differt a tempera-		capitis intemperies et curanda	54
mento.	554	caput vacuantia.	60. 61. 95
calidum innatum ratione operatio-		cardiaca.	573
nis dignius est spiritu animali.		cardialgia 573. &c. causa 574. cu-	
150		ratio 580. differentia 576. indi-	
calidum innatum cerebri.	143	cationes 578. prognostica 579.	
caligo, ob cornea crassitiem & hu-		signa.	577
miditatem.	351	Caries in lue Gallica.	999
calor innatus, & spiritus innatus		caro magis nutrit quam panis.	250
sunt idem.	734	carnem generantia in cilice.	304.
calor in febre.	1004	308. in lacrymalis penuria.	338. in
calor natus quatuor modis ladi		ulcere ventriculi.	571
potest.	ibid.	carnes animalium solis venenatis	
caluitium. 2. eius curatio.	11	vulneratorum, tuto edi nonnun-	
cancer superari nequit.	571	quam possunt.	1175

<i>Carnis differentia.</i>	1115	184.163	
<i>carus communiter dictus.</i>	198	<i>ceratum quid.</i>	68
<i>carus proprie dictus.</i>	203. & seq.	<i>cerebrale profluvium.</i>	711
<i>caro detentus num sentiat.</i>	204	<i>cerebrum factus e qua materia.</i>	918
<i>castia.</i>	1091	<i>cerebrum est frigidissimum mem-</i>	
<i>castratorum carnes suaviore.</i>	955	<i>brorum principalium.</i>	199
<i>cataplexis vide, cathocus.</i>		<i>cerebrum est sedes facultatum anima-</i>	
<i>cataphora somnolentia.</i>	198	<i>li.</i>	ibid.
<i>cataphora vigil phrenitica.</i>	210	<i>cerebri ventriculi singuli singulis</i>	
<i>cataphora vigil pigra & non pi-</i>		<i>functionibus destinati.</i>	82
<i>gra.</i>	ibid.	<i>cerebri facultates tres sunt determi-</i>	
<i>cataracta: vide, suffusio.</i>		<i>nata.</i>	143
<i>catarrhale profluvium.</i>	711	<i>cerebro facultates interiores sedibus</i>	
<i>catarroxi rix sunt splenitici.</i>	204	<i>disculsa sunt.</i>	82
<i>catarrhus 255. &c. eius causa 258.</i>		<i>cerebri crassum excrementum.</i>	296
<i>curatio. 265. definitio. 255. differe-</i>		<i>xipxros.</i>	394
<i>rentia & signa. 260. indicatio-</i>		<i>chalybis preparati vsus in melan-</i>	
<i>nes. 262. prognostica.</i>	263	<i>cholia.</i>	134
<i>catarrhus fit etiam ab intemperie</i>		<i>chalybis limatura. 786. 791. 807.</i>	
<i>calida.</i>	259	812	
<i>catarrhus sequitur malam coctio-</i>		<i>cathemam Avicenna, affectus oca-</i>	
<i>nem cerebri.</i>	258	<i>li.</i>	302
<i>catarrhus morborum plurium pa-</i>		<i>cheiragra.</i>	958. 960
<i>rens.</i>	263	<i>chemosi oculi.</i>	281
<i>cathartica medicamenta.</i>	340	<i>china natura & facultates.</i>	984
<i>catochus nothus interdum coma vi-</i>		<i>cholera, vel cholerica. 653. &c. cura-</i>	
<i>gil dicitur.</i>	211. & seq.	<i>tio.</i>	657
<i>catochus nothus mistus est ex infla-</i>		<i>cholera arida.</i>	654
<i>matione phrenitica & lethargi-</i>		<i>chylicatio laesa. 614. &c. eius cau-</i>	
<i>ca.</i>	212	<i>sa. 615. curatio.</i>	626
<i>catochus exquisitus.</i>	211	<i>chylosus fluxus.</i>	711
<i>catochi exquisiti & nothi discrimen.</i>	ibid.	<i>chylus quid.</i>	614
<i>catochi & tetani discrimen.</i>	ibid.	<i>cibi fastidium vide, inappetentia.</i>	
<i>causa continens morborum.</i>	396	<i>cibi putredini apti.</i>	1053
<i>causus exquisitus. 1133. nothus.</i>		<i>ciborum recta in febribus putridis</i>	
1139		<i>administratio, &c.</i>	1121
<i>canteria vide, fonticuli.</i>		<i>ciborum varietas fugienda.</i>	1123
<i>canterij & vesicatorij differentia.</i>		<i>ciborum mala preparatio.</i>	1111
760		<i>cibus medicinalis in febribus putri-</i>	
<i>cephalalgia: vide capitis dolor.</i>		<i>dis.</i>	1117. & seq.
<i>cephalica medicamenta. 71. 73. 164.</i>		<i>cibus quando exhibendus in ephemeris.</i>	1046
			1046

IN CAPIVACCIVM.

cicatrix oculi. 329
 cicatricem inducentia. 305. 308
 cicatrisans in vlceribus internis non
 habet locum. 463
 cicuta sturnis alimentum, homini
 venenum. 1182
 cinamomi aqua seu decoctum in ca-
 put evaporat. 184
 citri mali consideratio. 1117
 Kéδu. 598. vide, pica.
 clysmi acres, num irritare possunt
 apoplecticos. 196
 clysteres lenientes in febribus. 1094
 cocta vacuenda. 1109
 coeundi impotentia. 849
 colica. 711
 cana parciore esse debet prandio in
 vitio capitis. 185
 cogitationis domicilium. 82
 cognitio alia cum alia sine discursu.
 144
 Κοίλον, oculi affectus, 301. 302
 coitus secundum naturam ut fiat.
 840
 coles: vide, penis.
 colica catarrhalis. 357
 colica: vide, intestinorum dolor.
 colica appropriata remedia. 694
 colica à constipatione alius curatio.
 693
 colica ab inflammatione curatio.
 692
 colica biliosa curatio. ibid.
 colica & nephritidis diagnosi. 673
 colica pituitosa curatio. 689
 colica flatulenta curatio. 688
 color è mixture elementorum extra
 oculum saltem conspicitur. 350
 color è mixture lucis & tenebrarum
 etiam in oculo generatur, &
 conspicitur. 352
 colligantes febres. 1132

colligatus fluxus. 711
 collyria anodina opata, in ophthal-
 mia. 288
 collyria anodina non opata, frigi-
 da. 289. 308
 collyria ad vlcera oculorum. 308
 collyria astringentia, in proptosi ex
 vlcere. 308. in proptosi vera. 310.
 in mydriasi. 314. in sugillatione.
 326. in expositione oculi. 346
 collyria attenuantia & detergentia
 in suffusione 322. in albugine. 331.
 in cornea crassitie. 358
 collyria attrahentia, nim. acris &
 rarefacientia, in phlogi pupillae.
 316. milia in atrophis. 345
 colliria calida digerentia. 291. 357
 colliria carnem superfluum eradi-
 cantia, in pterigio. 34. in encan-
 thide. 340
 colliria cicatrisantia, in vlcere. 308.
 in rhoead. 338
 colliria dolore urgente, non sunt ex-
 cipienda aceto. 310
 colliria ex opio quando locum ha-
 beant. 289. & seq.
 colliria emollientia, in cicatrice. 331
 colliria humectantia in mydriasi.
 315. in phlogi: 316. in siccitate cry-
 stallini. 388
 colliria, in metu phlegmonis, non
 sunt excipienda vino. 310
 colliria incrassantia, in suffusione
 qua deponi debet. 323
 colliria intercipientia fluxum in lip-
 pitudine. 292. in epiphora. 336
 colliria mundificantia, in ophthal-
 mia. 291. in vlcere corneae. 308
 colliria reprimentia fluxum, in lip-
 pitudine. 293
 colliria resolventia in lippitudine.
 294. in hyppopryo. 311. in mydri-

I N D E X

fi. 315. in sugillatione 326. in vi-
 sioso colore cornea. 359
colliria siccantia, in vesica cornea
 300. in phlogia. 316. in epiphora.
 336. in humiditate cristallini.
 357
colliria visum acuentia, ex astri-
 gentibus. 193
collirium album. 289
coma proprie dictum. 198
coma vigil. 210
combustionis & putredinis distin-
ctio. 1052
comitialis morbus: vide, epilepsia.
complexio est tria qualitas secun-
 da. 494
conceptoria facultas. 1
conceptio secundum naturam. 911
conceptionis facta signa. 923
conceptionis vitia. 863. 911
concocta materia non est incrassan-
 da. 1100
concoctio ventriculi corrupta. 615
concoctio ventriculi tarda. 614
concoctio ventriculi laesa: vide, chy-
 lificatio laesa.
concoctio in corpore animalis, quid
 1906. eius species. 1907
concoctio materia morbosica. 1908
concoquentia: vide, preparantia.
concupiscibilis facultas: vide, appe-
 titus.
constitutio cerebri. 143
contenta urina. 1036
continens febris, & eius species. 1057
continua febris per subingressum.
 162
continuarum febrium subdivisio.
 1116
continui solutio non est morbus. 420
continui solutio duplex. 29. 420
contracta membra a ligamentis dis-

ferunt a convulsis, quae scilicet a
neruis contrahuntur. 239
convulsio. 239. & causa ibi. curatio.
 248. definitio. 239. differentia
 243. indicationes & signa. 244.
 245. prognostica. 246
convulsio est motus inuoluntarius.
 239.
convulsio est mot. prauus non abla-
tus. 166
convulsio canina. 244. 251. &c.
convulsio e repletionem. 240. ex inan-
 tione. 241
convulsio flatulenta puerorum. 243
convulsio puerorum vi sananda. 251
convulsionis legitima tantum due
sunt species. 244
cor pro ventriculi orificio. 578
cor factus e qua materia. 918
cor est sedes facultatis communis-
sima. 199
cor quomodo Aristoteli sit origo
functionum animalium. 796
cor quatuor constat substantiis.
 1004
cor est radix somni. 796
cordialia. 135. 474
cordis calor motu sursum & deor-
sus conseruatur. 1180
cordis dolor: vide, cardialgia.
cordis motus deprauatus: vide, pal-
 pitatio.
cordis palpitatio: vide, palpitatio.
cordis proprietates, seu proportio mu-
tari nequit, citra vite dispen-
dium. 1191
cordis solida non putrescunt vino
animali. 1157
cordis temperies mutari potest, vino
animali. 1191
coryxa. 258
coxendicis dolor. 958. 962
 crampe.

IN CAPITULO ACCIUM.

craspe, i. m. p. s. p. u. c. d. n. s. 242
 crassus est precipuum instrumentum
 facultatis naturalis. 494
 criticus fluxus quando sistendus. 376
 crocomagma. 54
 crocus necat immodico vsu. 1199
 cruda non vacuanda, ni surgant.
 1109.
 cruditas quid 1096. eius species.
 1098
 cruditas humorum est signum vir-
 tutis debilis. 1079
 cruditas ventriculi. 614
 crystallini humoris morbi. 349
 cucumeris agrestis radix ad hydro-
 pen. 690
 cucurbitula. 48. 94. 233. 248. 267.
 288. 454. 683. 759. 877. 891.
 899. 965
 cucurbitula in putridis febribus nō
 sunt dorso applicande. 1084
 cucurbitularum recta administra-
 tio. ibid.
 cucurbitula facultates. 1083
 cucurbitulas indicantia. 1084
 cucurbitula magna adhibita in
 phrenitide. 94. in hamorrh. na-
 rium. 377. in hamoptoe 454. in
 stomachi inflammatione. 561. in
 vomitu 649. in cholera. 657. in
 colica. 683. in alui fluxu. 718. in
 hydropisia. 740. 759
 tuzi ē carne creatur. 305
 tuzis vera degenerari nequit. ibid.
 tynanche. 388
 typhocides. 730

D

D Declinatio febris. 120. 1011.
 1013.
 Declinatio morbi vera & falsa
 1034
 Declinationem morbi assingens me-

mo moritur. 1017. 1018
 decoctio artificiosē instituēda. 1101
 definitio formalis & causali. 1005.
 1006
 deglutitio lesa. 484. &c. curatio.
 491
 deglutitio secundum naturam.
 485
 deglutitioni facilitanda compar-
 sum instrumentum. 393
 deleteria in dosi summa tantum pe-
 rimunt. 1073
 delirium ex affecto diaphragmate.
 67. 83
 delirium melancholicum. vide, melan-
 cholia.
 dentes excellentia medicamenta. 384
 dentes qua cautione extrahendi.
 381
 dentes rade sentiant 379
 dentium affectus. 377
 dentium casus in lue venerea. 997
 dentium dolor. 379. curatio. 382
 dentium dolori appropriata. 384
 dentium hebetudo. 385
 dentium mobilitas. 385
 dentium nigror. 386
 dentium orius difficilis. 378
 dentium perforatio. 384
 dentium preservatio. 378
 dentitio. ibid.
 depilatio Gallica. 1060
 derivatio. 89
 destillatio in vase plumbeo impro-
 batur. 1101
 destillatio: vide, catarrhus.
 Derentio: vide, cathochus.
 dextra corporis pars robustior est si-
 nistra. 920
 diabetes. 813. &c. curatio. 817
 discoralium ad arthritidem. 966
 Diacordeium vsus in destillatione ad
 pulmo

pulmones. 269 in tussi. 406
 diacrydonites diacrydium. 603
 diadictamnium emplastrum. 760
 diata febrium putridarum. 1114
 Diapnoësis. 375. 448. 726. 887.
 Διαπνοήσις. 375. 448. 725. 887
 diaphoretica: vide, discutientia.
 Διαφωρά ventriculi. 615
 diaria febris: vide, ephamera.
 diarrhoea. 711
 diarrhoea catarrhalis. 358
 diasatyrium diuterium. 815
 diei & anni partium in febr. col-
 latio. 1229
 dierum medicorum computatio. 1020
 dies medicorum. ibid.
 differentia affectuum non sunt pe-
 tenda à coniunctis. 301
 digerentia: vide, discutientia.
 difersus: vide ratio.
 discutientium materia. 67. 97. 132.
 133. 197. 236. 249. 254. 392. 438.
 521. 527. 565. 638. 687. 802.
 966
 dolor capitis. 25. &c.
 dolor dolorem sedat. 52
 dolor è quo symptomatum genere. 27
 dolor est actio & passio. 27
 dolor thoracis: vide, thoracis dolor.
 dolor, num maneat ad centrum, an
 ad circumferentiam. 579
 dolor refertur in sensum internum.
 419
 dolores luis Gallicæ. 999
 dolorem mitigans: vide, anodynum
 in genere.
 doloris differentia. 34. &c. signa. 37.
 indicationes. 41. prognostica. 45
 doloris causa efficiens. 29. 32. 420.
 574. 664
 doloris generatio. 26. 419
 dormientibus calor intro vocatur.

200
 dosis minima & ipsa desinita est.
 1174
 diuretica. 720. 807. 827. 842.
 diuretica in peste. 1168
 diepticorum usus in febribus pu-
 tridis. 1106. 1107
 dropax. 106
 dulcia facile accenduntur & bilef-
 cunt. 981
 duritiei causa. 544. 552
 dysenteria. 725. 72
 dysuria. 833

E

Ebrietas ut praevenienda. 613
 Ebullitio cholicorum Aus-
 cenna. 14. 1133
 eclogmata. 437
 Ectropus. 345
 Expansio: vide, obstructions ex-
 pedientia.
 efficiens causa in medica definitione.
 elaterij usus in asthma. 415. in
 hydropse. 741. 767. in iliaca. 690.
 in abortu. 944
 elementa ut concurrant ad genera-
 tionem mistorum. 1050
 elementum non putrescit, nisi sub ra-
 tione misti. 1501. 1052. 1507.
 elementorum dissolutio, misti est cor-
 ruptio.
 elephantiascos alexipharmaca. 849
 elephantiasis vino viperino expu-
 gnatur. 1208
 elixatio. 1097
 emollientia prasidia triplicia. 552
 emollientia habent vim resolvendi.
 564
 emollientium materia. 565. 790.
 807. 812. 936
 emollientium materia. 967
 emplastrum quidnam dicatur. 68
 emplastrum

IN CAPITULO ACCIVM.

emplastrum indicatur in methodo
componendi, non medendi. 555
empiema. 440. & c. curatio. 443
encanthis. 339
ephemera pestilens. 105
ephemera invadens cum horrore, non
est putrida. 1045
ephemera febrü. 1034
ephemera febris duorum generum.
1016. 918
ephemera re tantum est synochus
imputri. 1035
ephemera num etiam à causa in-
terna oriri queat. 1035
ephemera signa. ibid.
ephemere indicationes. 1043. pro-
gnostica. 1044. curatio. 1045
ephemera transitus in alias febres.
1040
ephemerarum causa. 1034
epibiales: vide, incubus.
Επὶ τῆς αἵματος in vena sectione. 266
epiphora. 333
epiphora catarrhalis. 259
epilepsia per consensum. 170
epilepsia. 164 eius causa. 169. cura-
tio. 183. definitio. 165. differentia.
175. indicationes. 178. prognosti-
ca. 178. signa. 179
epilepsia media est inter carum &
apoplexiam. 168
epilepsia non semper sit ab obstru-
ctione. 174
epilepsia non est convulsio legitima,
167
epilepsia per essentiam. 169
epilepsia appropriata. 184
epilepticos excitantia. 182
Επὶ τῶν οφθαλμῶν.
Errhina. 36
errhina in affectibus oculorum de-
bens esse mitissima. 257

error: vide, alucinatio.
erysipelas externum. 79. internum.
80.
erysipelas cutaneum non sit à flava-
bile sincera. 80
erysipelas quando phlebotomiam ad-
mittat. 93
ethmoedis ovis obstructionem tollen-
tia. 373
ivααιδνoia signi habet rationem,
non indicantia. 507
ivααιδνoia tollentia. 386
exanthemata in cute capitis. 17
excrementa duo cuiuslibet coctionis.
256
excrementum coctionis venarum tri-
plex. 661
excrementum coctionis ventriculi
triplex. ibid.
excrementum coctionis venarum
duplex. 929
expectorantia. 407. 437
exornatoria pars medicina. 1. 331
expulso ventriculi lesa. 622
expultrix etiam contra sensum tactus
agit. 196
extrahentia venenum in peste. 1169
F

Faba insomnia pariunt. 208
Faciem splendidā reddentia. 16
facultas animalis influens & non
influens. 108
facultas anima est organum incor-
poreum. 150
facultas principalis cerebri, quomo-
do viatur spiritu animali. 108
facultas non operatur, nisi determi-
nata. 143
facultates determinantur seu restrin-
guntur proportionem instrumento-
rum. 143
facultates simpliciter necessariae ad
viam

INDEX

<i>vitam sunt quatuor.</i>	585	<i>febris omni caloris genere conditur.</i>	1006
<i>facilitatis unius unica tantum est</i>		<i>febris subiectum.</i>	1007
<i>functio.</i>	143	<i>febris tollit spasmi è repletionem.</i>	246
<i>fames canina. 598. curatio.</i>	604	<i>februm causa evidentes.</i>	1008
<i>fames est appetitus calidi & sicci.</i>		<i>februm differentia.</i>	1009. 1011.
586. 589		1014	
<i>fames est symptoma ad actiones at-</i>		<i>februm signa communia.</i>	1005
<i>tinens.</i>	589.	<i>februm tempora medica.</i>	1019
<i>fames morbofa. 585. &c. eius causa</i>		<i>fellis differentia, ratione atrimonia.</i>	
<i>589. curatio. 602. differentia &</i>		323	
<i>signa. 598. indicationes & pro-</i>		<i>famina mare calidior, Hippocrati.</i>	
<i>gnostica.</i>	600	865	
<i>fames quomodo sit causa vertiginis.</i>		<i>Fernelius refellitur. 820. 822. 918.</i>	
154		927. 960	
<i>fames vacina. 589. curatio.</i>	606	<i>Fernelius de origine intermittetium</i>	
<i>famis naturalis generatio.</i>	587	<i>confutatur.</i>	1062. 1063
<i>fastidium cibi: vide, inapetentia.</i>		<i>ferrum candens ad apoplexiam,</i>	
<i>faintas: vide, ractocinatio lasa.</i>		<i>pro capite inurendo.</i>	196
<i>faucium inflammatio: vide, angina.</i>		<i>ficus in cute capitis.</i>	17
<i>fani.</i>	17	<i>finis in definitione medica.</i>	27
<i>febris qui facileprehendantur.</i>		<i>status etiam generantur à calore</i>	
1018		<i>fortiori.</i>	856.
<i>febricitantis calor p. n. & secundum</i>		<i>status indicia.</i>	505
<i>naturam subiecto num unus sit.</i>		<i>fluor muliebris seu uterinus.</i>	901
1006		<i>fluxio: vide, catarrhus.</i>	
<i>febrilis calor num siccitatem habeat</i>		<i>fluxus alui in genere. 710. &c. cau-</i>	
<i>coniunctam.</i>	1007	<i>sa. 712. curatio. 716. differentia</i>	
<i>febrilis catarrhalis, latica.</i>	257	<i>& signa. 713. indicationes. 714.</i>	
<i>febris quid.</i>	1071. 1703	<i>prognostica.</i>	715
<i>febris generatio.</i>	1004	<i>fluxus alui sanguinolentus. 725.</i>	
<i>febris animam agentis mutatur in</i>		<i>&c. eius cause. ibi. curatio. 229.</i>	
<i>affectedum frigidum.</i>	1006	<i>differentia & signa. 727. indi-</i>	
<i>febris curat apoplexiam.</i>	194	<i>cationes. 728. prognostica. 728</i>	
<i>febris curat paralyfim: unde excita-</i>		<i>fecunditatis signa.</i>	912
<i>tur confectione anacardina. 236</i>		<i>fecus alimentum in utero.</i>	940
<i>febris è chilo in ventriculo putrescen-</i>		<i>fecus formatio.</i>	917
<i>te.</i>	1016	<i>fecus formationis quatuor tempora.</i>	
<i>febris Gallica.</i>	940	939	
<i>febris hectica ab ulcere pulmonum.</i>		<i>fecus involucria tria.</i>	918
460		<i>fecus in utero mortui signa.</i>	942
<i>febris indicat refrigerans & hume-</i>		<i>fecus numerosi signa.</i>	914
<i>ctans.</i>	1008	<i>fecus</i>	

IN CAPIVACCIVM.

Fetus parenti similis, vel dissimilis.	gemelli, cur sexus eiusdem, vel diversi.
920	921
fetus vnicus vel multiplex vnde	generatrix facultas est insita in calido primigenio, nec spectat ad vterum.
919	536
fœtus excludentia.	943.946.747
fomenta in pleuritide.	429
formationis fœtus principium.	917
formatricis facultatis subiectum.	931
formicalis ruptura cornea.	308
fossula, affectus oculi.	301
forticuli. 49. 268. 465. 739. 772.	760
760	forticuli in lue Gallica.
forticuli in lue Gallica.	980
forticulorum vsus ad venena.	1194
fictions.	1048.1144
49.2374.481.657.674.	frigida caute applicanda praeordinis.
frigida caute applicanda praeordinis.	523
frigida perfusio in spasmo.	249
frigidam intemperiem corrigentia.	54.146. 238.322.358. 508.583.
54.146. 238.322.358. 508.583.	523.577
523.577	frigida venenata in opio, non in aqua.
frigida venenata in opio, non in aqua.	1192
frigus in febribus.	1074
frusimelica calculum ano excreuit.	functiones cerebri principes tria requirunt.
functiones cerebri principes tria requirunt.	143
furfures.	19
furor: vide, mania.	

G

Alenus notatur.	928
galeni locus difficilis, de mydriasi.	314
galli decrepiti ius.	693
gallica lues facultati naturali aduersatur, nec venefica proprie dici potest.	1177
gallina venena sumit innoxie.	1175
gerab Auicenna.	340
gargarismi.	62.264
geuassius confutatur.	499
	guaiaci natura & facultates.
	982
	Guaiaci vsus ad melancholiam.
	134. ad obstructionem nervorum
	opticorum. 359. ad tremorem. 221.
	ad asthma. 417. ad arthritidem.
	966
	guaiaci decoctum cum aqua.
	965.
	cum iure, cum vino.
	966
	guaiacum non est sudoriferum primario, sed roborat naturam quibuscumque viis vacuantem.
	986
	guaiaco que permiscenda.
	985.986
	guaiaci vsus ad luem Veneream.
	986
	gula situs.
	491
	gulosi cur non augeantur.
	532.

Gummata

I N D E X

gummata gallica. 998
gutta serena. 353. ut curanda. 359

H

Hæmoptoe: vide, spiritum sanguinis.
Hæmorrhagia narium. 374. &c.
 causa, differentia. signa. 375. curatio. 375
hæmorrhagia critica & symptomatice. 374. 375. 450. 408
hæmorrhoidalis fluxus. 727
hæmorrhoides vacuant sanguinem melancholicum & biliosum. 1087
hæmorrhoides commode fluunt atrabile vexatis 126
hæmorrhoides non aperienda, superpresis mensibus. 878
hæmorrhoidum apertio. 1086
hælica. 1120
handacocha. 221
hæctica febris. 1150
hæctica febris est immaterialis. 1154
hæctica pestilens. 1151
hæctica non semper alijs febribus succedit. 1018
hæctice gradus. 1151. 1152
hellebori nigri usus. 130. 164
helleborus albus in melancholia
 131. in obliuione. 147
helleborus albus spasmus inducit. 241. 243
hepar factus è qua materia generetur. 919
hepar in hydropse semper afficitur per essentiam. 744
hepar in hydropse semper laborat dyscrasia frigida. 744
hepar inuestientis membrana inflammatio. 796
hepar totum causa est perfecta sanguificationis. 1049
hepatica, seu hepatis, appropriata.

773
hepaticus fluxus. 725
hepatis affectus. 734. &c.
hepatis & splenis affectuum discrimen. 804
hepatis imbecillitas, seu affectio hepatica. 743. eius signa. 749. indicationes. 752. prognostica. 754. curatio. 756
hepatis inflammatio. 792. curatio. 799
hepatis intemperies. 742. eius differentia. 749. signa. 749. indicationes. 752. prognostica. 758. curatio. 756
hepatis obstructio. 767. &c. causa. 768. curatio. 772. differentia & signa. 769. indicationes & prognostica. 771
hepatis obstructio cum intemperie ut curanda. 774
hepatis scirrhus. 787. &c. curatio. 789
hepatis sima per aluum, gibba per lotium vacuanda. 800
hepatis vlcus. 791
hepatis vlcus sanatum. 792
herculeus morbus: vide, epilepsia.
hiera Alexandri. 234
hiera è colocynthide desis. 147
hiera picra. 1092
hiera picra obest ventriculo calido. 516
hiera magna seu composita. 880
hiera species menses mouens, nec pregnantibus danda. 605. 879
hippocrates contra Galenum defenditur. 273
hippocratis locus difficilis de curanda pleuritide. 427
hircinus odor in puberibus vnde. 955
hirudines. 1085
 hirudi

IN CAPIVACCIVM.

<i>Virudines.</i>	48.900	<i>Etandum.</i>	994
<i>hordeum.</i>	1120	<i>hydrelaum pro vomitorio, in mate-</i>	
<i>humida discrasia omnium facillime</i>		<i>ria venenata.</i>	1195
<i>curatur.</i>	510	<i>hydrocephalus.</i>	276
<i>humidam intemperiem emendan-</i>		<i>hydrops. 734.743. &c. causa. 734.</i>	
<i>na. 148.316.317.357.385.524</i>		<i>744. curatio. 739. definitio. 734.</i>	
<i>humidum excedere potest quanti-</i>		<i>744. differentia. 736.749. indi-</i>	
<i>tate & qualitate.</i>	498	<i>cationes. 737.753. prohydrops ca-</i>	
<i>humores constant parte alimentali,</i>		<i>pititis: vide, hydrocephal.</i>	
<i>& excrementitia, sanguine exce-</i>		<i>hydrops exquisitus & notus. 744</i>	
<i>pto.</i>	1055	<i>hydrops pulmonis.</i>	743.754
<i>humores partis similis.</i>	497	<i>hydrops quinam periculosior.</i>	756
<i>humores num in venis etiam putres-</i>		<i>Hydrops spurius ratione curatios</i>	
<i>cant.</i>	1057	<i>in febris.</i>	
<i>humores omnes putredini sunt obno-</i>		<i>hydrotica: vide, sudorifera.</i>	956
<i>xij.</i>	1055	<i>hymen membrana.</i>	
<i>humores tres partium similarium</i>		<i>hypercatharsis causa.</i>	1186
<i>extra venas.</i>	1151	<i>hypercatharsis eueniente, quo ordine</i>	
<i>humorum corporis generatio &</i>		<i>humores vacuentur.</i>	1186
<i>causa.</i>	1049	<i>hypercatharsis oboriente, sanguis po-</i>	
<i>humorum in venis aggregatum quot</i>		<i>stremo vacuatur.</i>	1049.1186
<i>constet partibus.</i>	1049	<i>hypercatharsis etiam à mediocri-</i>	
<i>hydragoga: vide, aquam hydropico-</i>		<i>bus, purgantibus oriri potest.</i>	
<i>rum vacuantia.</i>			1184
<i>hydragryi natura & facultates</i>		<i>hypnotica: vide, anodyna stupefa-</i>	
	984	<i>cientia.</i>	
<i>hydragryi inunctio, qua tutior est</i>		<i>hypochondriaca: vide, melanco-</i>	
<i>suffumigio.</i>	992	<i>lia.</i>	
<i>hydragryi suffumigium.</i>	993	<i>hypofarca: vide, anaserca.</i>	
<i>hydragryi vsus ad luen Gallicam.</i>		<i>hy,lerica mulieres.</i>	938
	992	<i>Hlos, affectus oculi.</i>	309
<i>hydragryi vsus dissuadentia.</i>	994		
<i>hydragryum corrigentia.</i>	992		
<i>hydragryum cum auro habet sym-</i>			
<i>ptacur.</i>	994		
<i>hydragryum medullas penetrans.</i>			
	1183		
<i>hydragryum nervos ledit.</i>	994		
<i>hydragryum per os exhiberi potest.</i>			
	693		
<i>hydragryum reè corpore eorum, qui</i>			
<i>sine effectu, inuncti fuerunt, prole-</i>			

Ichor quid: eiusque natura, causa
& generatio. 1055.1056
ichor improprie ita dictus. 1055
ichoris & feri distinctio. 726
icterus. 778. &c. curatio. 785
icterus criticus. 783
icterus flavus & niger. 778.782
Idionadrias, & συμπαδrias, διά-
γνως. 40
iecur: vide, hepar.

INDEX

ignis venenum calore absumit. 1174	temperie definitur. 78
ileos stranguria superveniens : ubi difficultas Hippocratea. 671	inflammatio quo ordine topicis ca- randa. 96
iliaca: vide, intestinorum dolor.	inflammatio oculi: vide, ophthalmia.
iliaca pilula Rhafis. 690	inflammatio ventriculi.
imaginatrix pro parte animæ sum- pta, imaginatur & recordatur. 145	infusione vires simplicium vi extra- hantur. 1101
imaginatrix etiam indicat & con- templatur. 144	instrumentorum actio à forma ma- gis vel minus efficaci regitur. 1193
imbecillitas ventriculi. 494	instrumentum precipuum cuiusque partis est crasis, & spiritus infi- tus. 1072
impellentia per cutis poros in febr- bus putridis. 1107	intemperiei species. 498
impotentia coeundi. 849	intemperies quatenus doloris causa sit. 30
impulsio. 88	intemperies est indicans modo cu- ratorium, modo præservatorium. 87
inæqualitas, horrore affinis. 1023	intemperies ex usu, & non ex usu. 167
inappetentia. 598. curatio. 602	intemperies cum & sine materia. 174
incubi affectio comprimens & ag- gravans, cur. 160	intercipientia. 89. 157. 184. 269. 291. 336. 406. 456
incubus. 159	intermittens febris, pituitosa, bilio- sa, melancholica. 1057
indicans verum non nisi unum in- dicat. 88	intermittentium materia num sem- per è venis transmittatur. 1061
indicatio non sumitur ab aere. 1161	intermittentium februm materia num putrescat extra venas, an intra. 1057
indicatio vitalis. 1074	intestina chylum distribuunt, & amplius excoquunt. 660
indicatio curatoria. 1075	intestina non attrahunt à ventri- culo. 660
indicatio non sumitur à lesa facul- tate, sed à causa. 1075	intestinorum affectus. 660
indicatio præservatoria. 1075	intestinorum dolor. 664. &c. eius caussa. 664. curatio. 682. diffe- rentia. 672. indicationes. 679. prognostica. 679. 674.
indicatio prophylactici unde peti- tur. 1197	intestinorum dolores quinam sint atrociore. 670
indicatio curativa sumitur ab idea: que modo simplex est, modo com- posita è morbo & continente caussa. 1043. 1075	intesti
inedia. 1118	
inedia tempore ventriculus excre- menta attrahit. 1056	
in sæctu liberantia: vide, obstructio nes expedientia.	
inflammatio hepatis pugnans non admittit. 1112	
inflammatio cerebri meningum. 78	
inflammatio modo tumore, modo in-	

IN C A P I V A C C I V M.

intestinorum natura & usus. 660
 inunctio Aetij ad febres malignas. 1169
 inunctio propriè qua vocetur. 68
 ira vitalem spiritum accendit. 148
 ischias. 961
 ischuria. 833. curatio. 837. 842
 iudicium datur à frigido. 145
 ius carnis longa decoctione salsum redditur. 989

K

Arabius Arabum.
 καρδιασμός. 470
 καρδιά affectuum. 1018

L

Labiorum & oris ventriculi consensus. 182
 lac oculis dolentibus commodum. 290
 lac siticulosus noxium. 532
 lactis usus in phthisi. 466. in sicca ventriculi intemperie. 532. in macie ob profusum album. 910
 lactis usus in hectica. 1155
 lacrymarum causa in mœstitia, letitia, ira. 333
 lacrymalis carnis imminutio. 337
 lacrymalis carnis imminuentia nimia. 339
 lacrymalium apostema. 340
 lacrymarum effluxus. 333
 latificans compositio. 135
 laevis intestinorum: vide, leienteria.
 lambitina: vide, eclegmata.
 lapides in vesicula bilis. 779
 lapis: vide calculus.
 latica febris, & quid ab hectica distet. 1141
 lenientia alium. 190. 191. 192
 lenientia, in lue Venerea. 980
 leienteria. 711. 721. &c. curatio.

724

leipothymia. 476
 leipyrria febres. 1133
 lepus marinus pulmones corrumpit. 1180
 lethargus nothus. 99
 lethargus 98. &c. eius causa. 99. curatio 103. diffinitio. 95. differentia. 101. indicationes, & prognostica. 102. signa. 101
 λικνωμα oculi. 329
 lien vehementiora fert auxilia, quam hepar. 805
 lieni appropriata. 806
 lienis & hepatis affectuum discrimen. 804
 lienis schirrhus. 806. 808
 ligatura. 49. 481. 657. 684. 892
 linimenti nomine quid audiendum veniat. 68
 lippitudo: vide, ophthalmia.
 lithiasis: vide, calculus.
 lotium: vide, urina.
 lue venerae detenti quam diutam observare debeant. 1001
 lues Venerea è qua materia generetur. 972
 lues Venerea extrinsecus omnis accedit. 969
 lues Venerea non nisi alexipharmacis expugnari potest. 970
 lues venerea contumax, ut curanda alexipharmacis, forma electarij adhibendis. 991
 lues venerea. 969. &c. eius causa. 970. curatio, differentia. 973. indicationes. 977. prognostica. 978. signa. 973
 luis venerea effecta. 970
 luis venerea sedes. 971
 luis Gallica symptomatibus ut occurrendum. 996

I N D E X

<i>luluma Auicenna.</i>	301
<i>lumbrii intestinorum 696. &c. eorum causa, & curatio. 696. differentia. 700. & indicationes. 702. prognostica. 703. signa.</i>	701
<i>lumbrii generantur in variis corporis partibus.</i>	697
<i>lumbrii num in ventriculo generantur.</i>	697
<i>lumbriicorum materia.</i>	698
<i>lumbricos necantia. 708. allicientia. 708. expellentia.</i>	709
<i>lumbriicus quid.</i>	697
<i>lusciositas.</i>	353
<i>luxatio vertebrarum spina quando posset excutere paralyfin.</i>	229
<i>M</i>	
<i>Maciei & gracilitatis discrimen.</i>	615
<i>macies: vide, tabes.</i>	
<i>macies oculi.</i>	343
<i>macies e senio.</i>	460
<i>macies ex intemperie frigida & sicca.</i>	460
<i>macula oculi.</i>	324
<i>malacia: vide, pica.</i>	
<i>malignus affecluum.</i>	1018
<i>mania, &c. 136. eius definitio & causa 136. curatio.</i>	140
<i>manna.</i>	1091
<i>malum, oculi affectus.</i>	308
<i>masticatoria. 62. 254. 381</i>	
<i>masticatoria non conueniunt in dolore dentium.</i>	381
<i>materia furiosa petens partem principem, vel consentientem principi. statim vacuanda.</i>	1110
<i>materia quomodo pertineat ad essentiam intemperiei.</i>	500
<i>matrix: vide, uterus.</i>	
<i>maturatio: vide, concoctio.</i>	
<i>maturitas.</i>	1097

<i>medicamentum quid.</i>	1172
<i>medicamentum & vincitur a corpore, & vincit.</i>	1172
<i>melancholia. 106. &c. eius causa & definitio. 107. curatio. 127. differentia. 116. indicationes. 120. prognostica. 114. signa. 119</i>	
<i>melancholia hypochondriaca non admittit sectionem vena cubiti.</i>	128
<i>melancholia per consensum a toto.</i>	113
<i>melancholia per consensum a toto respondet quartana exquisita.</i>	131
<i>melancholia per essentiam num admittat vena sectionem.</i>	127
<i>melancholia copiosa indicia. 504</i>	
<i>melancholia hypochondriaca causa. 113. curatio. 128 indicationes. 122. prognostica 126. signa. 131</i>	
<i>melancholica materia ab initio non est agitanda fortibus.</i>	131
<i>melancholicarum materiam generantia.</i>	114
<i>melancholici humoris species & qualitates.</i>	112
<i>melancholici quo tempore purgandi.</i>	131
<i>melancholici nonnunquam sanantur abiecta medicina.</i>	131
<i>meliceris.</i>	341
<i>meliceris in capitis cura.</i>	17
<i>melopepones.</i>	1119
<i>memoratrix facultas.</i>	144
<i>memoratrix etiam indicat.</i>	144
<i>memoria laditur ratione posterioris cerebri.</i>	143
<i>memoria parum firma, indicat cerebrum humidum.</i>	142. 144
<i>memoria detrimentum.</i>	142
<i>memoria sedes.</i>	81
	mensēs

I N C A P I V A C C I V M.

menfes decolores.	901	melchridatij temperies	1198
menfes immodici. 886. horum cauſa. ibid. curatio. 890. diff. & ſigna. 888. 889. indicationes & prognſtica.	889	mithridatium non conuenit in rene- no calido, nec in febre peſtifera.	1198 1199
menfes mouentia, horumque recta adminiſtratio.	882. 937	mola.	934
menfes quando fluere incipiant. 866. deſinant. ibidem.	866	monſtroſus fatus. 930. &c. curatio.	934
menfes quibus vii pragnantibus fluere queant.	923	monſtrum non eſt error natura.	931
menſis lunaris & apparitionis.		morbi deſinitio. 395. 396. 1012. 1014	
menſis lunaris cum anni partibus comparatio in febris.	1029	morbi forma & materia.	1012
menſium periodi cauſa.	867	morbi ſpeciem conſtituentia, perti- nent ad eſſentiam morbi.	500
menſium ſtillicidium. 896. &c. cu- ratio.	898	morbus Gallicus: vide, lues vene- rea.	
menſtrua purgationis vitia.	863	morbus in quo predicamento.	396
menſtrui ſanguinis & natura & uſus.	865. 866	mors accidit ob inſignem cordis in- temperiem.	1180
menſtrui ſuppreſſio. 864. &c. eius cauſſe. 867. curatio. 875. deſini- tio. 864. differentia & ſigna.	870. 872. 873	mors eſt immobilitas cordis.	1192
mentis ſedes.	109	morbus ſacer: vide, epilepſia.	
meſenterij inflammatio.	796	morbus totius inſtrumenti, vel pri- mi, vel ex accidente.	81
metalla quia denſa, difficulter pu- treſcunt.	1052	morſus cordis.	470. 573
metallorum preparatio vt ſiant magis attenuantia.		mortis & putredinis diſtinctio.	1050. 1051
melchridus tradendi affectuum p. n. & cogitationem, & curatio- nem.	28	motus eſt actio & paſſio.	419
melior, affectus oculi.	309	motus febris tardus aut relox.	1028
miſtio imminuta & ablata.	833	mucus.	256
miſtio num ſit actio voluntaria.	833	mulier cur non fiat amphidexia.	347
miſtio naturalis vt fiat.	833	muſca in iuuenibus bileſcit.	185
miſti corporis ex elementis genera- tio.	1049	mundificantia: vide, vlcus mundi.	
miſti corruptio & putredo.	1050	muſca napello viſitantes.	1204
		muſculi faciei.	252
		muſculi oculum mouentes.	346
		muſculus oculum firmans.	345. 347
		mydriafis.	312
		μυρίαμα.	309
		myringa Barbarorum.	362
		μυρία.	353
		μυρία.	350

I N D E X

N	
<i>Napelli mus.</i>	1203
<i>Napello nutrita virgo.</i>	1176
<i>napellus.</i>	1202
<i>naturales actiones semper leduntur affecto organo.</i>	616
<i>nausea.</i>	619.639 &c
<i>nervi auditorij densitas.</i>	360
<i>nervi in cathocho afficiuntur secundum partem medullarem & membraneam.</i>	211
<i>nervi in paralyfi afficiuntur secundum partem medullarem.</i>	212.
	228
<i>nervi in spasmio afficiuntur secundum partem membraneam.</i>	212.
	228
<i>nervi motui duriores sunt sentientibus.</i>	212
<i>nervi pars medullaris & membranea.</i>	212
<i>nervi quo magis recedunt à cerebro eo duriores.</i>	217
<i>nervi appropriata medicamina.</i>	220.237
<i>cephritidis & colica dignotio.</i>	674
<i>nigredo vnde.</i>	ibidem.
<i>nigredo sanguinis, vnde.</i>	6491
<i>nubes affectus oculi.</i>	301
<i>nutricum purgandarum ratio, gratia infantum.</i>	183
<i>nymphaeae cfr albi veratri alexiterium.</i>	1210
<i>nyctalops.</i>	353
O	
<i>Oblivio : vide, memoria detrimentum.</i>	
<i>obstructiones expedientia.</i>	776.785
<i>obstructionis à vapore consideratio.</i>	152.160.168
<i>obstructionum causa.</i>	1053

<i>ocularium medicamentorum mior dactas & asperitas corrigenda.</i>	292
<i>oculi conturbatio.</i>	281
<i>oculi debilitas, ob raritatem crystallini.</i>	350
<i>oculi exitus.</i>	345
<i>oculi expressio.</i>	345
<i>oculi imminutio, Celsi.</i>	343
<i>oculi inflammatio : vide, ophthalmia.</i>	
<i>oculi inflammationem reprimentia.</i>	292. resolventia.
	294
<i>oculi sani indicia.</i>	248
<i>oculi vacillatio.</i>	281
<i>oculi vlcus coronale.</i>	302
<i>oculis adhaerentia vt detergenda.</i>	291
<i>oculorum affectus.</i>	280. &c.
<i>oculorum affectibus sudor coactus noxius, quia caput replet.</i>	359
<i>odontalgia : vide, dentium dolor.</i>	
<i>odoratus : vide, olfactus.</i>	
<i>odoratus vt fiat.</i>	369
<i>odorum ingratorum delectatio, vnde.</i>	370
<i>oedema poscit etiam adstringentia cum resoluentsibus.</i>	566
<i>oophagi inflammatio ex impetuosa vomitione.</i>	1195
<i>oophagi situs, ubi topica applicanda indicet.</i>	487
<i>oleum dormire facit.</i>	203
<i>oleum pretiosum Magni Ducis Hertruria.</i>	1165. 1169.1200.1201
<i>oleum oculis inimicum, quia mordax.</i>	290
<i>oleum scorpionum Marthioli.</i>	1204
<i>oleum viperinum in peste.</i>	1169
<i>olfactus laesus. 369. &c. causa & differentia. 371. definitio. 370. curatio. 373. indicationes, & prognostica</i>	

IN CAPIV ACCIVM.

gnostica.	372. signa.	371
contactus organum principale sunt		
caruncula mamillares.		370
omnes vis anodyna.		433
operationes manifesta produnt a		
crasi occulta a forma.		1172
operationis tres causa.		1012
ophiasis.		2
opiata.		52
opiata quando purgantibus miscen-		
da.		687
opiata quoque convulsionem inue-		
hunc.		242
opiata suffusionis causa		319
opisthoromus.		244
opii correctio.		1026
opii veliculum nequeunt esse partes		
calida permista.		1206
opium, &c.		1206
opium calidum dici nequit.		1207
opium diversis constat partibus, & p-		
de variis effectus.		1206
opium in tussi vitandum.		405
opium promptius agit, si parum vini		
non generosi superbibatur.		1182.
		1206
opthalmia. 280. &c. eius causa &		
definitio. 281. curatio. 287. diffe-		
rentia. 282. indicationes & pro-		
gnostica. 286. signa.		285
opthalmia exquisita & notha. 281		
opthalmia in suffusione mutatio. 318		
opthalmica: vide, oculis appropriata		
ophticorum obstructio ut curanda. 352		
orbicularis affectio oculi.		309
oris tortura: vide, convulsio canina.		
oris ventriculi dolor: vide, cardial-		
gia.		
oris ulcera post hydrargyri usum ut		
sananda.		995
orthopnoea.		412
osbis corruptio in lue venerea.		929

ouorum differentia.		1116
oxymelitis compositi vires.		1100
oxyrrhodini vsus in apoplexia, cum		
cautione. 196. in epilepsia.		184
Oxyrrhodinum.		66
Oxana. 371. curatio.		373

P

Palati litus.		63
Palpitatio cordis. 468. &c. cu-		
ratio.		473
palpitatio legitima est a flatu.		471
palpitatio legitima & notha.		470
panis assus in lue Gallica.		896
panis assus seu bis coctus num con-		
ueniat lue Gallica affectis.		1001
panis bis coctus in lue venerea.		1119
panis delectus.		1119
papaver rhoeas, ad pleuritidem.		
		434
papaveris vsus in destillatione ad		
pectus.		269. 406
paracetivnois.		740. 761
parasyranche.		389
paralysis lingua num fieri queat a		
melancholia.		118
paralysis. 227. &c. causa. 227. cu-		
ratio. 232. definitio. 227. diffe-		
rentia & signa. 230. indicatio-		
nes & prognostica.		231
paralysis per essentiam & per con-		
sensum.		229
paralysis non fit ab intemperie cali-		
da vel sicca.		228
paralyseos subiectum est musculus.		
		228
parasyranche.		388
πασιδυα.		258
παρόγοις.		351
paroxysmi species nonnunquam		
mutatur.		1061
paroxysmi cur stasis reuertantur		
diebus.		1061

- paroxysmi cur anticipent, vel postpo-
 nant. 1061
 paroxysmi primi & sequentium
 differentia. 1059
 paroxysmorum febrilium causse.
 1058
 paroxysmorum duratio unde esti-
 manda. 1062
 partu corporis humani diuisio. 862
 partus difficilis. 945. &c. causse.
 945. curatio. 949
 partus secundum naturam. 937
 partus octimestris non est vitalis.
 938
 pagulis. 379
 passula alium non mouent. 1119
 passula laxatiua. 130
 parturitionis vitia. 863. 937
 pedicularis morbus. 23
 pediculorum ortus & causse. 23
 penis erectio. 849. 831
 pepones. 1119
 perforatio thoracis in empyemate.
 443
 periodorum febrilium frequentia,
 unde. 1059
 periodorum febrilium causse. 1053
 periodus febris. 1012
 peripneumonia. 444
 peritia. 144
 pestem praeuentione remedia. 1163.
 &c.
 pestilens febris ab humoribus in cor-
 de putrescentibus. 1049
 pestilens febris roborantia frigida
 admittit, non calida. 1170
 pestilens venenum in corpore geni-
 tum. 1163
 pestilens venenum ut agat in spiri-
 tus, humores, & solida cordis.
 1157
 pestilens febris. 1157. causse. 1158.
 differentia. 1159. signa. ibid.
 prophylaxis. 1188. curatio. 1172.
 1173
 pestilens febris omnis fit à putredi-
 ne. 1156
 pestilentis veneni origo. 1158
 pestis è quo sit febrilium genere.
 1016
 pestis nonnunquam potest esse sine
 febre. 1156
 pestis veneta. 1159
 phlebotomia: vide, renasectio.
 phlyctena: vide, vesica cornea.
 phrenitis. 75
 phrenitis exquisita est cum delirio
 perpetuo & febre. 75
 phrenitis inmultuosa & hectica.
 77
 phrenitis ferina. 83
 phrenitidis causse. 76. curatio. 92.
 definitio. 75. differentia. 75. ge-
 neratio. 81. indicationes. 86.
 prognostica. 89. signa. 83
 phthiriasis. 23
 phthisis. 460. &c. causse. 461. cura-
 tio. 465. differentia & signa.
 461. 462. indicationes. 463. pre-
 gnostica. 464
 phthirasis spuria, è distillatione.
 463
 pica. 593. curatio. 605
 pilorum causse & generatio. 23
 pilorum denigratio. 15
 pilorum excessus. 15
 pilorum incrementum prohibentia.
 14
 pilorum tardus ortus. 12
 pilos attenuantia. 14
 pilos extirpantia. 13
 piula de euphorbio ad pestem. 1168
 piula pestilenciales Arabum.
 piula de plumbo. 693

IN CAPIVACCIVM.

<i>pilularum foetidarum dosi.</i>	233	<i>spiratione vincere queant</i>	192.
<i>pineae crassi sunt succi.</i>	238	951	
<i>pineae purgantes.</i>	693	<i>prafocatio ab viro.</i>	948. &c. caus-
<i>piscium vsus in febribus.</i>	1118	<i>sa.</i>	949. <i>curatio.</i> 953. <i>differentia</i>
<i>pituita acida, vitrea.</i>		<i>& signa.</i>	951. <i>indicationes &</i>
<i>pituita proprie dicta & improprie.</i>		<i>prognostica.</i>	952
1139. 1140		<i>praparantia in prophylaxi febris po-</i>	
<i>pituita lacrymalis.</i>	281	<i>stifera locum habent, non in cu-</i>	
<i>pituita unde fiat salsa.</i>	1139	<i>ratione.</i>	1163
<i>pituita cur hyeme copiosa reperia-</i>		<i>praparantia in lue venerea.</i>	980
<i>tur.</i>	1140	<i>praparantibus quomodo utendum.</i>	
<i>pituita insipida & subdulcis.</i>	1140	1101. 1102	
<i>pituita gypseae non excitat febrem.</i>		<i>praparantium facultates.</i>	1099
1140		<i>praparantia humores.</i>	38. 318
<i>pituita generatur in ventriculo &</i>		<i>priapismus.</i>	855. &c. <i>curatio.</i> 859
<i>cerebro.</i>	546	<i>principium febris.</i>	1020. 1021
<i>pituita differentia : & quomodo</i>		<i>procidencia ragooidis.</i>	308
<i>hac putrescens febrem excitet.</i>		<i>procreantia: vide, generatrix.</i>	
1139		<i>prae fluxum: vide, fluxus.</i>	
<i>pituita cursus, Celso.</i>	333	<i>prognostica unde sumantur.</i>	49
<i>pituita efficiens non est hepar, sed</i>		<i>prognosticandi ars in quibus sita.</i>	
<i>ventriculus.</i>	1049	89	
<i>pituita redundantis signa.</i>	504	<i>proportio dissimilarium partium</i>	
<i>pituitosa febris.</i>	1139	<i>pendet à compositione.</i>	143
<i>pituitosa febris cur reliquis citius</i>		<i>proportio similarium partium pen-</i>	
<i>redeat.</i>	1059	<i>det à mixtione elementorum.</i>	
<i>pituitosus mucus.</i>	1140	143	
<i>pleuritidis dextra ad nonas costas.</i>		<i>proprietas compositionis quid.</i>	143
796		<i>πρόσληκτος παρ' οὐδὺς.</i>	308
<i>pleuritidis quando renafectionem,</i>		<i>pruritus in lue venerea.</i>	1000
<i>quando purgans flagitet.</i>	427	<i>psilothra.</i>	13
<i>pleuritidis tactu foris dolens est ab</i>		<i>psydracia.</i>	17
<i>inflammatione periostij.</i>	422	<i>ptarmica.</i>	
<i>plenritidis appropriata.</i>	434	<i>πτερόγυρος.</i>	326
<i>plenritidis causse.</i>	421	<i>ptisana re praparanda.</i>	1120
<i>pneumonica.</i>	409. 446	<i>pueri retentricem facultatem ha-</i>	
<i>podagra.</i>	958. 961	<i>bent debilem.</i>	621
<i>polypus.</i>	371. <i>curatio.</i>	<i>puerorum praeservatio à strabositate.</i>	
331		348	
<i>porrigo.</i>	19	<i>pulmonis inflammatio.</i>	444. &c.
<i>potius febribus putridis conveniens.</i>		<i>pulmonibus appropriata.</i>	409. 418.
1124		446	
<i>prafocata ab viro, quomodo sine re-</i>			

I N D E X

pulvisca facultas est naturalis, non voluntaria.	470	purgantis medicamenti definitio & differentia.	1103
pulsuum cognitio.	1040	purgantium usus in febribus.	1104
pulsuum causse in specie.	1039	purgantia non omnia sunt venefica.	1183
pulsuum differentia.	1037	purgantia num sint similia corpori humano.	1184
pulsus ephemerarum causse.	1041	purgantia quomodo reddantur venefica.	1183. 1184. 1188
pulsus in genere quibus de causis mutetur.	1039	purgatio materia venefica per inferiora.	1195
pulsus trium consensu produciuntur.	1038	puris evacuatio.	560
pulsus quid.	1037	puris generatio est maturitas quaedam.	553
punctio hydropicorum.	740. 741	puris optimi vota.	547
punctio, in suffusione.	312	puris collectio in oculo.	310
pupilla tabes.	315	parulenti fluxus.	712
pupilla dilatatio, seu effusio.	312	pus e thorace purgantia.	443
pupilla profunditas.	343	pus mouentia: vide, suppurantia.	
pupilla contractio.	315	pus legitimum & spurium.	441
purgamenta partus quandiu durent.	939	pus omne calidum est.	547
purgamenta partus retenta, vim habent exitiosam.	940	pus quid? a quo, & quomodo generetur.	547
purgantia.	59. 520	puscula cornea: vide, vesica cornea.	
purgantia attrahunt ratione similitudinis.	1183	puscula Gallica in ore & aliis partibus.	998
purgantia foris applicanda.	1106	putredini minus vel magis obnoxia.	1051. 1053
Purgantia habent mistas partes alimentales, & quedam etiam veneficas.	1184	putredinis differentia.	1052
purgantia cum aliis mista & fermentata, possunt ultra summam dosin exhiberi.	1234	putredinis febrilis locus seu fomes.	1054
purgantia in alui fluxu.	718. 724	putredinis gradus.	1177
purgantia in lue venerea.	982	putredinis humorum causse.	1053
purgantia in peste valida requiruntur.	1168	putredo.	1051. 1052
purgantia materiam lumbricorum.		putredo astringentibus augeatur.	848
purgantia per aluum quando cum guaiaco possunt misceri.	986	putredo defluit in terram, simum, vel solum.	1050
purgantia quando exhibenda.	1109	putredo est inanimatorum.	1051
purgantis maior est efficacia quam humoris qui trahitur.	1185	putredo naturalis & prater naturam.	1176
purganti quando indormire liceat.		putredo.	

IN CAPIVACCIVM.

putredo nō omnis est venefica. 1177
putrescens fit calidius ascititio calore. 1052
putrida pestilens. 1058
*putrida febris semper habet inu-
 etam transpirationem prohibi-
 tam.* 1054
*putrida febris differentia ab idea
 humorum.* 1056. *putrida febris
 causa.* 1053. *curatio.* 174. *defini-
 tio & generatio.* 1048. 1049.
differentia. 1052. *indicationes.*
 1076. *signa.* 1064
*putrida est continua, vel intermit-
 tens.* 1057

Qualitas alia materialis, alia
 spiritualis. 171. 206. 242
*Qualitates manifesta venefica sunt
 ratione forma contraria, cuius
 organa ipsa sunt.* 1192. 1193
quartana continua cur rarissima.
 1063
quantitas prima & non prima. 539
*quantitas materia auxiliorum est
 duplex.* 1012
quantitas nihil operatur. 1173
quartana febris. 1146
quies non indicat ex vsu. 508
*quies seu immobilitas membri tri-
 plex.* 227
quinctana febris. 1150

R

Rabidi cur aqua timeant. 1215
*Rabidi sunt à morsu, modo
 citius, modo tardius.* 1254
rabies canina. 1215
*ratio leditur ratione media cerebri
 partis.* 142
rationcinatio laesa. 142
raucedo. 258
receptio specierum leditur à siccō.

145.

regius morbus: vide, icterus.
relaxantia nocent ventriculo. 530
renibus appropriata. 828
renum affectus. 813
renum vlcus. 829. &c. *curatio.* 831
repellentia. 64. 582. 392. 561. 801
*repellentia in tumoribus internis
 non debent esse acris.* 562
repellentia thoraci caute admoenda.
 436
*reprimens dirigitur ad materiam
 fluentem & fluxam.* 38
*repellentia non conveniunt in motu
 critico.* 64
reprimens non est indicatum. 88
reprimentia: vide, repellentia.
res non naturales. 1114
resoluentia: vide, discutientia.
resolutio nervorum: vide, paralyfis.
respiratio deprauata. 409. &c. *cuius
 causa.* 410. *curatio.* 414. *diffe-
 rentia.* 411. *indicationes & pro-
 gnostica.* 412. *signa.* ibid.
respiratio est actio voluntaria. 339
respiratio secundum naturam. 410
*respirationis laesa quatuor differen-
 tia.* 191
respirationis organa. 410
*respiratio unde seruetur in apople-
 xia.* 187
*resolutio omnium partium est apo-
 plexia.* 226

*retentio specierum leditur ab humi-
 do.* 145
retentio ventriculi laesa. 621
retractionis modi. 88
reuulsio. 89
*reuulsio spectat materiam qua non-
 dum fluxit.* 641
rhabbarbari vsus. 775
rhigades lun Gallica. 999

I N D E X

Pigritas.	308	sarsa pariglia natura & facultates.	983
rhoeas.	337	sarsa parilla decoctum vi parandam.	990
rhyas.	ibid.	sarsafrasie Indica natura & facultates.	984
rhythmus in pulsu quid.	1039	saryriasis: vide, priapismus.	
rigor in febris.	1070	scammonium offendit ventriculum.	602
rigoris causa est sola expultrix.	213	siarificatio: vide, cucurbitula.	
rigoris & cognatum symptomatum discrimen.	1073	sciencia.	144
risus sardonius: vide, convulsio canina.		scilla, & inde composita, ad epilepsiam.	183
rob. granatorum.	658	scorpius morsui proprio medetur.	1197
rosarum conserva ad phthisim.	467	Exortuua.	154
tubia non morietur menses.	882	sebel Arabum.	327
tubrificantiâ.	8. 134. 164. 237	sectio abscessus ad pus educendum.	560
tupitura cornea.	308	sectio thoracis in empyemate.	443
		seme ab utroque sexu emittitur.	913
S Alsedinis causa.	546	semen facundum quid, & quibus constet partibus.	912
Salinis. Auccenna, & crampe.	242	semen mulieris in coitu effunditur in utero cervicem, & fundum.	916
saluatella sectio in chronici morbi.	94	semen unde decidatur.	913
sanguificatrici organum.	734	seminarium pestilens	1158
sanguificatrici sedes.	738	seminis effluvium: vide, gonorrhoea.	
sanguinea febris.	1057. 1136	seminis eiectio.	915
sanguinea febris proportionata.	1136	seminis generatio, quam requirat complexionem & aetatem.	915
sanguinem concretum dissecantia.	456	seminis in coitu eiectio.	849. 853
sanguinis exsuperantis nota.	504.	seminis potentia & vis.	917
sanguinis fluxum sistentia.	376	senibus cornea rugosa redditur.	351
sanguinis sputum: vide, sputum sanguineum.		septica medicamenta.	340
sanguinis fluxus è naribus: vide, hæmorrhagia narium.		sensus communis qua cerebri parte rigeat.	82
sanguis menstruus: vide, menstruus sanguis.		sensus ratione receptionis est passio.	166
sanguis natura thesaurum.	1045. 1186		
saphati Arabum.	17		
sarcoma. 370. curatio.	373		
sarsa parilla decoctum in scirrhus hepatis.	790		

sepultura

IN CAPITULUM C C C I V M.

sepultura in apoplecticis quando tardanda.	192.193	somni causa finalis.	200
seri & ichori distinctio.	715	somni causa est vapor condensatus angustans.	199
serum in ventriculo generatur.	661	somni secundum naturam causa.	
serum lactis.	1092		198
seraceum in suffusione. 322. in laeo auditu. 508. in hydropse. 737. 761		somni tempore cessant principes fun- ctiones.	199
sexus in utero quibus natus depræ- hendatur.	924	somni tempore quis decubitus con- ueniat.	270
sibare Auicenna.	75	somni tempore quis decubitus pro- betur.	626
sibilus.	362. 566	somnus durans post succos confectos est morbosus.	200
sicca intemperies triplex.	496	somnus est affectio partis sensitiva.	199
siccâ intemperie tollentia. 55. 134. 141. 209. 314. 331. 358. 583. 417. 525			
sies: vide, collyrium.			
signa non capiuntur à iuuantibus & ledentibus, sed ab horum ef- fectu seu alteratione.	1042	somnus replet caput.	270
signorum medicorum fontes.	282	somnus præter naturam.	198
signum medicum quid.	282	somnus duplici via perducitur ad sensorium auditus.	365
signum sumitur à causa & effectu.		soporifera: vide, anodyna stupefa- cientia.	
282. 283		soporiata: vide, anodyna stupefa- cientia.	
singultus. 626. &c. eius causa. 628. curatio 637. differentia. 634. indi- cationes & signa. 634. 635. pro- gnostica.	635	stupefacientia: vide, anodyna stupe- facientia.	
singultus est motus solius expultri- cis.	168	spasma quid.	239
singultus tres species.	244	spasmus: vide, convulsio.	
singultum sedantia.	637	spasmus cynicus: vide, convulsio ca- nina.	
sinistra partis affectus sunt vehe- mentiores ratione facultatis. 218		spasmus non sensatus.	175
siren calidum Auicenna.	75	spasmus siccus Auicenna, ab aliis prætermittitur.	242
sitis pulmonum quæ.	403	spermatice partes interdum repara- ri possunt.	914
sitis est appetitus frigidi & humidus.		sphacelus ut intermittat hominem.	
586			1176
sitis morbofa. 607. &c. eius causa. ibidem. curatio.	607. 611	spiritus animalis qua ratione ad audium concurrat.	361
sitis fallentia.	612	spiritus animalis tenebricosus in melancholia.	107
spasmus non proportionatus ad ma- teriam.	242	spiritus animalis num etiam repe- riatur in anteriori cerebro.	107
soluentia: vide, purgantia.			spiritus

I N D E X

<i>Spiritus est instrumentum corporum functionum sensitiviarum.</i>		<i>Stertoris causa.</i>	191. 413
150		<i>Stillicidia.</i>	268
<i>Spiritus partes habet igneas & aerias.</i>		<i>Stillicidia pro ventriculo.</i>	525
<i>Spiritus putrescere non possunt.</i>	972	<i>Stillicidium in colica.</i>	685
<i>Spiritus resolvuntur, vel suffocantur.</i>		<i>Stomachale oleum calidum compositionum.</i>	524
477		<i>Stomachica: vide, ventriculo appropriata.</i>	
<i>Spiritus resoluti, vel oppressi.</i>	1078.	<i>Stomachus: vide, ventriculus.</i>	
1079. 1157		<i>Strabismus.</i>	244. 346
<i>Spiritus sunt instrumenta facultatum.</i>	108	<i>Stranguria.</i>	833. 843. curatio. 845
<i>Spiritus vitalis cenebriosus in melancholia.</i>	111	<i>Stridor.</i>	244
<i>Spiritus ut reficiendi.</i>	583	<i>Stultitia: vide, ratiocinatio lesa.</i>	
<i>Spirituum qui ad visionem concurrunt vitia.</i>	352	<i>Stupescientia nocens oculis.</i>	289
<i>Splen: vide, lien.</i>		<i>Stupidum membrum dum movetur dolet, alias non.</i>	225
<i>Sputio cruenta: vide, sputum sanguinis.</i>	194. 450	<i>Stupor.</i>	222
<i>Spumofus sanguis à solo pulmone prodit.</i>	450	<i>Stupor dentium.</i>	380. 383
<i>Sputum sanguinis.</i>	446. &c. causa. 447. curatio. 453. differentia. 449. indicationes & prognostica. 452. signa.	<i>Stupor exquisitus non est nisi in nervo.</i>	223
<i>σπύλη.</i>	258	<i>Stupor num à melancholia fieri queat.</i>	118
<i>σπύλη, oculi affectus.</i>	309	<i>Stuporis & tremoris eadem curatio.</i>	226
<i>Status febris.</i>	1020. 1023.	<i>Subesh.</i>	198
<i>Steatoma.</i>	341	<i>Subiectum aliud forme, aliud efficientis.</i>	82
<i>Stercoralis fluxus.</i>	710	<i>Subsurdities.</i>	359
<i>Sterilitas.</i>	924. &c. eius causa. 925. curatio. 929. signa. 922. 929	<i>Sudor frigidus in syncope rube.</i>	478
<i>Sternutamentum.</i>	271	<i>Sudor ut compescendus in cardialgia.</i>	583. 584
<i>Sternutatio est symptoma præter naturam.</i>	272. 274	<i>Sudorem proleclandi modi varij.</i>	990
<i>Sternutatio virtutem robustam indicat.</i>	275	<i>Sudorifera.</i>	766
<i>Sternutationem cohibentia.</i>	276	<i>Suffocatio ex asthmate ut prohibenda.</i>	417
<i>Sternutationis commoda, & noxa.</i>	275	<i>Suffusio sanguinis in oculo.</i>	324
<i>Sternutatoria.</i>	481	<i>Suffusio oculi.</i>	317. &c. eius definitio & causa. 317. 318. curatio. 322. differentia & signa. 319. indicationes & prognostica.
		<i>Stica.</i>	321
			<i>Suffusio</i>

IN CAPIVACCIVM.

<i>Suffusio morbus in numero, & in</i>		<i>Τακμήσιον.</i>	282
<i>via.</i>	318	<i>tempora particularia.</i>	1022
<i>Suffusionis spuria & exquisita di-</i>		<i>tempora februm singularium.</i>	1022
<i>stinctio.</i>	318	1023	
<i>Sugillatio oculi.</i>	324	<i>tempora februm vniuersalia.</i>	1015.
<i>Superfluitates.</i>	56.515	<i>temporum febris partitio.</i>	1019
<i>Suppositoria in febribus.</i>	195	<i>temporum differentia.</i>	1021.1022
<i>Suppositoria in thorace.</i>	440	<i>temporum particularium in febr-</i>	
<i>Suppurantia vnde indidentur.</i>	553	<i>bus cognitio.</i>	1033
<i>Suppurantis temperamentum.</i>	553.	<i>temporum vniuersalium in febr-</i>	
554		<i>bus cognitio.</i>	1028
<i>Suppurantium materia.</i>	566	<i>tempus medicum quid,</i>	1019
<i>Suppuratorium tenue, & viscidum.</i>		<i>tempus anni consideratur in vena-</i>	
306		<i>sectione vt signum virtutis.</i>	1079
<i>Surditas.</i>	359	<i>tenebra pauorem incutunt.</i>	107
<i>Synopalis febris.</i>	1143	<i>tenebrosa affectio in melancholia.</i>	
<i>Syncope.</i>	476	107	
<i>Syncope pertinet ad vim pulsificam,</i>		<i>tertiana intermittens exquisita.</i>	
<i>non ad facultatem vitalem.</i>		1126. &c. notha.	219
476		<i>tertiana simplex vel multiplex.</i>	1126
<i>Synopen patientes excitantia.</i>	481	<i>tertiana duplex, & tertiana dua,</i>	
<i>Symptoma primum & secundum.</i>		<i>vt differant.</i>	1126.1127
447.712		<i>tertiana continua exquisita.</i>	1132.
<i>Synanche.</i>	389	&c. notha.	1135
<i>Synochus imputris ephemeris annu-</i>		<i>testes semen elaborant.</i>	913
<i>meratur.</i>	1016	<i>tetanus.</i>	244
<i>Synochus cum putredine.</i>	1136	<i>theriaca non debet misceri purgan-</i>	
<i>Synochus pestilens.</i>	1136	<i>tibus.</i>	913
<i>Σύνωχης.</i>		<i>theriaca è caricis, ruta, &c.</i>	1199
<i>Syrupi ad calculum.</i>	837	<i>theriaca cur magis calefaciat quam</i>	
<i>Syrupi acetosi simpl. vires.</i>	1100	<i>piper, sinapi.</i>	1193
<i>Syrupi quomodo in febribus di-</i>		<i>theriaca in febre pestifera reuici-</i>	
<i>luendi.</i>		<i>tur, licet in prophylaxi, inque</i>	
		<i>peste sine febre probetur.</i>	1159
		1170	
		<i>theriaca in febribus caute danda.</i>	
		134	
		<i>theriaca inconueniens ad venenum</i>	
		<i>calidum.</i>	1198
		<i>theriaca temperat membrorum om-</i>	
		<i>nium complexionem.</i>	1163
		<i>theriaci vim purgantium compe-</i>	
		<i>scit</i>	

T

TAbes: vide phthisis
 Tactus organum, aliud reci-
 piens, aliud iudicans. 420
 Tactus sensorium. 574
 Tamarindi. 1091
 Τάραξις ὀφθαλμοῦ. 281
 Teinismus, 725.726.733

<i>cit.</i>	1210. 1184	tumor est morbus compositus.	540
<i>theriaca temperies.</i>	1199	tumor est interdum morbus, inter-	
<i>therma factitica sulphurea.</i>	55	dum symptoma. 78. 734. 744	
<i>thoracis affectus</i>	394	tumor necessario est morbus in in-	
<i>thoracis dolor. 421. &c. causa. 420</i>		temperie: non semper in mala	
<i>curatio. 427 differentia, & si-</i>		compositione.	77
<i>gna. 421. indicationes. 424. pro-</i>		tumor ventriculi: vide ventric.	
<i>gnostica.</i>	426	tumores calidi liuescentes degene-	
<i>linea.</i>	17	rant in frigidos.	1006
<i>timitus.</i>	363. 566.	tumoris species.	542
<i>timitus aurium in lue Gallica.</i>		tumorum causa.	542
1000		tussis morbofa. 394. &c. eius causa.	
<i>topica non debent usurpari toto re-</i>		398. curatio, & prognostica.	
<i>pleto.</i>	1113	495. definitio. differentia & si-	
<i>torpedo aduersatur facultati ani-</i>		gna 397. indicationes.	404
<i>mali, nec proprie est venefica.</i>		tussis est accidens naturale.	397
1177		tussis sicca, arida.	400
<i>torpor.</i>	222	tussis ut generetur.	396
<i>torpor & paralysis differunt ma-</i>		tympautes ventriculi.	541
<i>gnitudine.</i>	223. 229	tympautes. 736. eius causa.	748
<i>torporis & tremoris discrimen.</i>	223	typus febris.	1022
<i>transmissio noxiorum semper fit ad</i>			
<i>partes debiliores.</i>	1062		
<i>transpiratio interdum sola ad vi-</i>			
<i>tam sufficit, sine respiratione.</i>			
192			
<i>transpositio non est indicatum, sed</i>			
<i>modus euacuationis.</i>	317		
<i>tremor. 213. &c. huius causa. 215.</i>			
<i>curatio. 216. definitio. 214. dif-</i>			
<i>ferentia. 216. signa & indica-</i>			
<i>tionem. 217. 218. prognostica.</i>			
218			
<i>tremor cordis: vide, palpitatio.</i>			
<i>tremor mutatur paralyfin.</i>	218		
<i>Tripliciter.</i>	244		
<i>tritum.</i>	1119		
<i>trochisci Amari.</i>	651		
<i>trochisci de charta combusta.</i>	731		
<i>trochisci de olivano.</i>	658		
<i>tuberculi in asthma curatio.</i>			
417			
		V acuante primam corporis	
		superfluitatem.	
		vacuante in lue Venerea.	982
		vacuante per poros cutis in febr-	
		bis putridis.	1107
		vacuationem indicantia, per os, aut	
		per anum.	1088
		vapor abstruens.	152. 161. 169
		vai denegi Auicenna.	281
		vehementia triplex affectuum. 1011	
		1017	
		vehementia affectum triplex.	89
		venam febribus qua mudeda. 1083	
		venam quo die & hora secanda.	
		1081. 1082	
		vena secta foramen amplius, vel ar-	
		elius.	1081
		venefica qualitatis differentia. 1174	
		veneseccio. 47. 92. 194. 232. 248.	
		265. 287. 427. 453. 480. 513.	
		683.	

IN CAPIVACCIVM.

683. 729. 739. 756. 757.	venena ut vacuanda.	1190	
825. 875. 890. 898. 954.	venenata materia celerrime vacuanda.	1110	
964	veneni acrimoniâ obliuidentia.	1195	
venasectio absoluitur simul, vel partite.	1080	veneni forma contraria est formæ humane.	1173. 1176
venasectio ad leipotomiam.	1081	veneni & deleteriij medicamenti discrimen.	1173
venasectio in pragnantibus.	847	veneni nomine quid veniat intelligendum.	1173. 1174
venasectio in omnibus putridis febribus conuenit.	1080	veneni nota, quibus signis lethales deprehendantur.	1193
venasectio in veneno calido, non in frigido locum habet.	1149	veneni præseruatio requirit victum pleniorum.	1201
venasectio in lue venerea.	979	veneno non indormiendum.	1201
venasectio non indicatur à morbi magnitudine.	1078	venenorum alexiteria probata.	1200
venasectio quando in febre pestilenti locum habeat.	1163. 1164	venenorum differentia.	1181
venasectio quid: eiusque facultates.	1077	venenorum indicationes.	1187
venasectio tentatiua in melancholia.	128	venenorum indicia.	1188
venasectione quantum sanguinis demendum.	1080	venenum quid.	1173
venasectionem indicantia.	1077	venenum corpore non potest vinciri.	1178
venasectionem permittentia.	1078	venenum calidum putrefactum pestem suscitans.	1159
venasectionis iteratio, quo die commoda.	1082	venenum celeriter agit.	1179
venasectionis recta administratio.	1080	venenum citam desiderat opem.	1194
venena agunt tota forma.	1178	venenum citius interficit corpus calidum, quam frigidum.	1182
venena candida.	1181. frigida	venenum è brutis.	1175
1182. sicca. 1182. humida.	1183	venenum è corpore foras trahentia.	1196
venena calida efficacius operantur quam frigida.	1173	venenum è mineralibus.	1174
venena etiam pessima, nonnunquam inuare possunt.	1174	venenum ex elementis.	1174
venena frigida, quomodo dicantur agere quantitate.	1173	venenum è plantis.	1174
venena quam magis periculosa.	1193	venenum in homine generatiu.	1175
venena sanguinem attrahentia ignota.	1183. 1189	venenum modo citius, modo tardius ad cor perducitur.	1180
		venenum omne aduersatur cordi & facultati vitali.	1177.
			1180
		venenum omne est qualitas, vel p.	

ra. vel in substantia. 1173
venenam quandoque latitat. 1187
venenum sub qualibet dosi potest interficere. 1173
venenum venereum est calidum. 970
venenum ut à corpore alteretur. 1178
venenum ut corrumpat cor. 1180
venenum ut vacuandum. 1195
venereum stimulantia. 852. 853. 854
venereorum impotentia. 842
ventose: vide, cucurbitula. -
ventriculi affectus. 493
ventriculi intemperies. 493. &c.
causa. 494. *curatio.* 514. *differentie.* 498. *indicationes.* 505. *prognostica.* 508. *signa.* 501
ventriculi tumor. 539. &c. *causa.* 541. *curatio.* 560. *differentia & signa.* 547. *indicationes.* 551. *prognostica.* 554
ventriculi paritas. 534. &c. *eius causa.* 535. *curatio.* 532
ventriculi subversio. 649
ventriculi quasi tremor. 629
ventriculi vlcus. 568. *curatio.* 571
ventriculo appropriata. 529
ventriculum roborantia. 605
ventriculus male affectus contrarium appetit. 574
ventris imi affectus. 483
ventris medij affectus. 394
vermes, & vermicularis morbus: vide, lumbrici.
vermium in intestini generatio. 663
verruca Gallica. 998
vertiginosi cur concidant. 149
vertigo. r. &c. huius causa. 150. *curatio.* 157. *definitio.* 149. *differentia & signa.* 154. *indicationes & prognostica.* 155. 156
vertigo sit tantum ob errorem eternum. 151
vertigo minatur epilepsiam & apoplexiam. 156
vertigo tenebriosa. 154
vesica cornea. 297
vesica urinaria affecta. 833
vesicatoria. 50. 739. 759. 810
vesicatoria ad venena. 1194
vesicatoria in peste.
veterinus: vide, leihargas.
vibratio ventriculi. 629
vigilia morbose. 205. &c.
vigilia vires prosternunt. 208
vigilia dependunt ab effusione spirituum animalium ad organa sensus & motus. 206
vigiliarum tempore calor naturalis immodice foras mouetur. 206
vinum r. s. in capitis dolore. 74. *in phrenitide.* 98. *in mania.* 141
in vertigine. 158. *in epilepsia.* 185. *in paralyti.* 238. *in spasm.* 251. *in catharho.* 270. *in ophthalmia.* 296. *in hamorrhagia parium.* 377. *in pleuritide.* 440. *in hamoptoe.* 452. *in pluri.* 468. *in syncope.* 482. *in cardialgia.* 584. *in cholera.* 659. *in cholica.* 695. *in alui fluxu sanguinolento.* 733. *in hepatis phlegmone.* 803. *in scirrho lienis.* 808. *in priapismo.* 806
vinum comoda. 185
vinum fastidium ut conciliandum. 613
vinum ad dolores oculorum. 987
vinum coctura sit magis durabile. 1051

212477

- vinū desert materias in nervos. 238
vinum quando concedatur in febris
ephemeris 147. in hecticis.
155. in peste. 1170. in putridis.
1024
vinum quando concedi queat in
curatione lūi Gallica. 1001
vipera morsus sanguis mutatur in
bilem. 779
vipera morsus theriaca vsu potius,
quam mithridati curatur. 1198
vipere vino delectantur. 1201
vipere carne facultates. 1201
viperini vini vsus ad lepram.
1201
vires considerantur in partibus car-
nosiss. & potissimum in spermati-
cis. 1078
vires vnde & quomodo estimanda.
953
virginitas certo deprehendi nequit.
955
viriditas oculi Avicenna. 349
virilitas exstincta. 848
virium dissolutio. 476. &c.
virtus vnde signa sumenda. 1075
vitriolatis quando intro possumus
viri. 562
visio obscura. 351. 352
visio lasa, citra morbum euidentem.
348. definitio & causa. 349.
curatio 358. differentia & si-
gna. 354. indicationes & pro-
gnostica. 356
visus cur remota minora iudicet.
312
visus imaginatio Avicenna. 351
visus alucinatio. 351
visus destructio. 352
realis facultas est alteratrix cor-
dis. 476
vitrioli oleum, in vngue oculi. 329.
in ematibide. & in sanguinis
spuio. 458. in phthisi. 468
ulcera gallica lūi. 999
ulceris curandi tres scopi, qui à na-
tura expleantur. 303. 464
ulceris sanationem impediencia.
303. 570
ulceram differentia. 129
ulcerum indicationes in genere.
302. 570
ulcus agglutinantia. 305. 308. 457.
467. 572. 732. 831
ulcus corneae iuncta. 300. &c.
ulcus mundificantia 466. 571.
731. 792. 832
ulcus pulmonis vide, phthisis.
ulcus non madefaciendum nisi vi-
no. 306
vnguentum quid nominis. 68
vnguis oculi. 326
ungula oculi affectus. 301. 326
voci grauis & acuta causa. 956
voci mutatio in pubertate. 956
voluptas rei venerea. 916
vomitiones sincera deteriores. 647
vomitoria. 189. 1103. 1104
vomitoria. 56. 195. 580. 602. 649.
720. 965
vomitoria in materia reuena. 1195
vomitorium in peste. 1168
vomitus cohibentia. 650
vomitus. 639. &c. eius causa. 640
curatio. 649
vomitus bilis à cerebri vulnere.
543. 207
vomitus natura opus, & præter na-
turam. 640
vomitus criticus & symptomaticus.
646
vomitus violētus si a sophagi phleg-
monem excitet, vi occurrendum.

INDEX IN CAPIVAC.

1195	
urina quæ optima.	1036
urina quid.	1036
urina formam recipit in	venis.
1036	
urina unde coloretur.	924
urina coctionem vel cruditatem	
indicans.	1030
urina in ephemeris naturali simi-	
lis est.	1038
urina in hectica pestifera non ma-	
tatur.	1160
urina hypostasis unde.	1036
urine stillicidium: vide, strangu-	
ria.	1160
urina potius ad hydropem.	765
utro in asthma? 414. in empie-	
matico.	443

viseri affectus.	362
viseri situs visiosus quas causas ha-	
beat.	927
viseri strangulatus: vide, praefocatus	
ab viro.	
vicinum profluvium.	90
vicum purgantia.	909
vicum roborantia.	930
viseris femina non habet cellulas,	
instar brutorum.	919
vna & vneatio, oculi affectus.	309
ὕπνιον.	310
ὕπνιον φασμα.	324
ὕπνιον, ὑπνιον: vide, suffusio.	
ὕπνιον αἱματώδης.	324
ὕπνιον.	324

Z

Z Aara Avicennæ.

201

F I N I S.




Errata qua irrepsisse animaduertimus.

Pag. 2. lin. 21. est. 3. 4. autem, pro enim. 9. 11. anseris. 10. 10. colorem. 20.
13. permistis. 19. 20. 19. 30. quæ 13. 20. tantum. lin. 25. proinde. 25. 11. per-
licariz. 29. 25. Auerhoes. l. exedente. 33. 25. at. pro aut. 35. 33. quæ
43. 1. raptum. 45. 12. agendum. 53. in marg. 2. causa doloris. 48. 10. poss. lin. 39.
materiam. 51. 8. substantia. 53. 19. crasis. 61. 33. oxim. scil. 70. 13. anethinum.
77. 16. tex. 96. 17. 97. 5. 8. digerentia. 145. 33. memoria, pro obliuio. 158. 10.
plantagin. 199. 33. collectam. 200. 6. interius lin. 23. comedat. 235. 8. 3 iijß.
260. 6. compositionem. 276. 2. putrefacere. 316. 18. inxqualitatem. 341. 22.
ruptus. 343. 2. si os sit. lin. 25. promouere. 352. 36. vt nom. 361. 38. & 362. 44
myringa. Cætera beneuolo Lectosi notanda relinquimus.

TYPIS IACOBI ROVSSIN,
IN GRÆCIS ET LATINIS
Typographi Regij.

1596.



ETHEL B. B. ROSSON

NEW YORK, N. Y.

1911

1911

